





Galenī
Operū.
Epitom

C. 32. 6

EPITOME

GALENI PER- GAMENI OPERVM,

IN QVATVOR PARTES DIGESTA,
PVLCHERRIMA METHODO VNIVERSAM ILLIVS VI-
ri doctrinam complectens: per Do. AND. LACVNAM Se-
cobiensem, Equitem auratum, & Medicum longè excellentis-
simum, summa fide studiòque collecta.


ACCESSERUNT EIUSDEM AND. LACV-
NÆ Annotationes in Galeni Interpretes: quibus varij loci, in quos hactenus
impegerunt lectores, & explicantur & summa fide restituntur.

Item,
De ponderibus & mensuris medicinalibus vtilis Commentarius:

Index rerum & verborum maxime memorabilium copiosissimus.



Cornelio



Grancesucci



BASILEÆ,
PER THOMAM GVARINVM,
M. D. LXXI.

AD LACUNAM.

Debemus tibi plurimum *Lacuna*,
Quicunq; egregias amamus artes,
Et Cui studius senis tenemur.
Tu, quicquid pater afferit *Galenus*
Versu multiplici & laborioso,
Paucis contrahis, explicasq; chartis,
Et suum statuis modum labori.
Felix o iter & amplius vocandus.
Non frustra tibi contigit *Lacuna*,
In re difficili, & parum expedita,
Ἀπάντων μέτρον ἑμμετρεῖν ἄριστον.
Pyrrhus.

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDIS-
SIMO D. D. FRANCISCO A BOVADILLA ET MENDOZ-
za, Cauriensi Episcopo, ac sanctæ Romanæ Ecclesiæ Senatori vigilantissimo,
Patrono suo, & optimo Meccenati, ANDREAS LACVNA Se-
cobienſis, Doctor Medicus; Miles S. Petri,
S. P. D.



*Prostratum illum insolentissimum haud immerito infamāt, conuiciſq;
profundunt literæ, Pater amplissime, quod combuſſerit antiquiſſimum
illud ac celeberrimum Ephesiæ Diana delubrum: idq; non odio aliquo
in deam ipsam accensus, sed vt tantum memoria ſui, poſteritati relinque-
ret: quæ ſane vel hodie viget, piaculari tamen, & flagicioſa, nimirum qualis fuit ille.
Siquidem ſi non aliud, at certè verifiſimile eſt, nebulonem illum fuiſſe caduci, viliſ atque
deiectionis animi: qui cum potuiſſet optimis inſtitutis & artibus iuuare mortalium genus;
ſimulq; immortalẽ ſe reddere, maluerit tamen facinus tam indignum perpetrans, o-
mnibus innotescere, ſamamq; ſibi eam conciliare, quam præſtituſſet illi ſi conſecutus nõ
fuiſſet. Contra verò fecerunt veteres illi patres, philoſophiq; grauiſſimi, bonorũ nobis o-
mnium auctores, qui ob admirandã illam ſapientiã ſuam ſtrenuèq; in cõmunem uſum
nauatã operam, hodie celebrantur ab vniuerſis, atq; inter diuos relati ſunt. In quibus il-
li, mea quidem ſententia, ſumma laude videntur digni, qui arti Medicæ, totius huma-
ni generis tutrici, conſeruatriciq; ſummo ſtudio incubuerunt, eamq; opibus & ſaculta-
tibus ſuis auxerunt, atq; locupletarunt: cuius porrò inuentionem Græci ſerè vniuerſi, in
deos ipſos, atq; illorum amicos, reſerunt. Tradunt quippe Aſculapium ab Apolline pa-
tre inſtitutum, filios ſuos poſtea Medicinam doctuiſſe, atq; in hunc modum artem ipſam
captam diuinũ auſpiciũ, ſucceſſiue quadam hæreditaria, à parentibus propagatã ſem-
per in libros, ad Hippocratem uſque (qui oriundus etiam ab Aſculapio fuit) perueniſ-
ſe. Cautum ſiquidem erat in illa Aſclepiadarum familia, ne quis artem & indiſtriã
medendi poſſeſſionem planè diuinam, à Deoq; ſolis ipſis conceſſam, cuiſpiam cõmunem
ſaceret, qui ab eodem non eſſet genere exortus. Id quod fuiſſe in cauſa, videtur, vt peri-
ros artu illius, τῶν ἰατρῶν νόμος hoc eſt, filios Medicorum, Græci ſemper vocarint: ac
ſi fieri illo modo non poſſet; vt legitimè quiſpiam Medicinam proſiteretur, quam mi-
nimè à genitoribus ſuis accepiſſet. Nec perperam quidem illi, in iudicio meo, ſactitabant:
quandoquidem vel optima quæq; inſtituta vileſcunt, & dilabuntur, variſq; ſunt ob-
noxia adulterio, dum citra delectum vllum ab omnibus proſanantur: multoq; aptio-
res ad quamcunq; artem capeſſendam, exercendamq; ſunt ij, qui à parentibus ſuis, v-
nã cum generationis primordiis contraxerunt quandam veluti inclinationem, propen-
ſionemq; in eam ipſam artem, cui poſtea indulſerint: quàm quibus natura & mens, ob-
diuerſam generam, ad contraria inclinatur. Quare ſæpe ſoleo admirari, cum ad cõ-
denda numiſmata Principes admittant tantum eos viros, qui & ingenui ſunt, & indu-
ſtriã moribusq; integerrimũ præditi: cur ad conſeruandam inſtaurandãq; ſalutẽ ho-
minum (quæ quibũſſimũ gemmũ & margaritũ longe præcioſior eſt) vt deligant quidem
inculpatiſſima ingenta; ſed ſolu prouinciã adeo periculoſam committant: abigant
aut illos à tam ſacro & herico munere, qui ad aurigandum vel remigandum ſunt, po-
tius quàm ad medendũ, aptiores, non ſint æquẽ ſolliciti. Hoc ſiquidem maxime ſua ipſo-*

EPISTOLA DEDICATORIA.

rum intererat. Ut igitur ad Hippocratem redeam, ille omnium primus artem Medicam rationali methodo condidit, nobisq; volumina octoginta reliquit, quæ incorporabilem doctrinam eius, vitæq; innocentiam, testantur. Eum postea secuti sunt Diocles Caristius, Praxagoras, Chrysippus sophista, Erasistratusq; ex filia Aristorelis genitus: qui antistites Rationalis sectæ existerunt. Nam sub Philino Coo, eodem fere tempore, factio Empiricorum est orta: cuius fautores fuerunt Serapion Alexandrinus, Apollonius Antiochenus, & Menodotus. Qui sanè dissidebant à Rationalibus, quod illi quidem ratione simul & experientia uterentur ad inuestiganda præsidia, morbis ipsis congruentia: hi autem solo visu contenti essent, eorum quæ alias obseruauerant. Ab utrisq; recesserunt ex æquo Medici nuncupati, causarum abdicarum indaginem (quæ Logici summo studio explorabant) respicientes: nec tribuentes quicquam experimentis particularibus, quibus nitentur Empirici. Reducebant aut hi, ut omnes particulares affectus ad generales duos, nempe astrictionem & laxum: sic vniuersas curationes ipsorum, ad duas similiter: astrictionem videlicet eorum quæ laxa essent, & relaxationem illorum quæ stricta. Auspicia huic sectæ dedit Themison Laodicenus: absoluit aut eam Theophrastus ille Trallianus, qui pollicebatur se docturum artem ipsam accuratissimè, vel sex mensibus tantum. Post quos omnes tandem Galenus secutus, Medicinam in tot sectas diuisam, laceratq; suæ integritati atq; nitori restituit: explodens quidè omnia peruersa dogmata, quæ grassabantur suo tempore, diramq; exercebant tyrannidem: reuocans autem Hippocraticam rationem medendi, quæ iam plus quàm sexcentos annos sepulta fuerat, eamq; & explanans, & validissimis rationibus roborans. Cuius viri doctrina & methodus, ob dulcedinem insitam, atq; sublimitatem, adco allucit omnium studiosorum animos, ut quis semel illam gustarit, amplius abstinere ab ipsa non possit. Ceterum cum ob crebras digressiones, quas facit, dum prauas opiniones aliquantulum morose refellit, nonnulli quibus cordi est breuitas, à lectione illius deterrerentur: rem non minus gratam, quàm vilem vniuersis, me facturum existimaui, si omnia Galeni opera in Epitomen succinctam redigerem, excutiens quidem illa, quæ nihil succi in se haberent, colligens verò reliqua, ex quibus tota ars constaret. Quod hercle institutū meum mirum in modum promouit, ac veluti cocalfecit clarissimus & ornatisissimus vir, amplitudinisque tuæ amantissimus, Ioannes Aquileius, Medicus Pontificius: qui quidem quo seruet sapientiæ incredibili amore, nunquam destitit me hortari, monere, instigare, & (ut ingenue fatear) cogere, donec ad laborem me accinxi. Quam prouinciā difficilem, ac meiq; humeris impare, equidem vix suscepissem, nisi ille institisset tanta vehemētia. Quantū verò laboris exbauferim, dum huic saxo volūdo incumbō, nemo aquè nouit ac tua Celstudo, Antistes reuerendiss. sub cuius vmbra & auspiciū omnia fuerunt elaborata: Quamquam vel ex ipsius operis mole, atq; difficultate, perpendere lectores candidi poterunt, non potuisse hunc nostrū partū in lucem edi, curæ enixæ atq; conatus maximo: cum nobis necessum fuerit, in primis quidem, instaurare deprauata exemplaria, in tertia, quàm græcæ: dein ea mutuo inter se cōferre: postea lapsus omnes corrigere, lucemq; obscuris sententiis addere: demū succum omnē atq; medullam elicere, eamq; digerere in ordinē: ac deniq; vniuersos locos communes, præcipuosq; sententiis, ad margines annotare. Quod si ad id idem, quoties mihi opus fuerit eadem ipsa relegere, examinare, & transcribere, prius quàm traderetur prælo, nec modum nec finē fecero. Perpetuū autē sum-

EPISTOLA DEDICATORIA

ma cū religione curauimus, ne aut aliquid infereremus huic operi, quod Galeni non esset: aut ex doctrina illius quippiā relinqueremus, quod pertinere videretur ad artem. Iam verò præcipua loca quæ restituenda censuimus, ætatis anno tanuimus, quo videlicet Lector admonitus, possit si quādo vellet, codices græcos consulere, iudiciūq; suum interponere. Ex annotationibus margini appositis, quæ esse vice scholiorū possunt, cōstat uimū copiosissimū Indidem, ut omnium rerum cōsentientiarū, quæ præcipuā in Galeno habentur, lectori ad manū largā semper copia suppeteret. Porro vniuersum opus in quatuor sectiones, siue classes, digessimus: quarum prima quidem continet ea omnia, quæ ad artū constitutionē, humaniq; corporis fabricam atq; compositionem pertinent. Secunda autem, quæ tum ad sanitatem tuendam, tum ad morborum cognitionem spectant. Tertia verò, omnes differentiās morborum, generalemq; medendi methodum, ambit. Quarta deniq; vendicat sibi historiam omnium medicamentorum simplicium, atque compositorū. Harum autem nostrarū lucubrationū eam partem cōferare T. C. statui, quæ ut lectū iucundissima est, sic in se veram philosophiā, adeoq; (si Galeno credendū sit) exactissimā Theologiam amplexatur: cum exercitatio meditatioq; assidua circa res naturales, ac præsertim circa nostri structuram corporis, nostrā erga Deum fidem, propensionēq; multum adaugeat, ac veluti concalsfaciat. Nam cognitū iū perfecte quæ sapientia & boni: ate sua fecit ille conditor noster, in maximā admirationē, cōmendationēq; sui, omnium animos reuocat. Tali autem admirationi, charitas, fides, atq; firmissimæ spes, euefigio succedunt. Sed ex hac etiam naturalium rerum contemplatione, cōtinetur auitatem exercere & iustitiā: quandoquidem & elementa ipsa, & cæteri vniuersi partes, sibi inuicem cedere, & suum amare quæq; ordinē, æquabilitatēq; seruare geometricā, nemo tam cecutiens est, qui nō cernat. Unde ab ambitione, possidendiq; libidine, naturalis Philosophia pars nos reddet alienos. Hanc etiam nō vulgarem fortitudinem comparamus contra mortis formidinem: cum didicerimus hominē esse portūculam vix perceptibilem vniuersi, cunctaq; si genita sint, etiā corruptioni esse obnoxia.

De verò hanc naturalium rerum historiam dicarem T. C. eadem me cause impulerunt, quæ iampridem conciliarunt tibi omnium studiosorū animos; Patet obseruandis, nempe singulari prudentia tua, rara temperantia simul & continentia, nō vulgaris animi magnitudo, constantia insignis, admiranda clementia, incomparabilisq; omnium linguarum, artium, atq; disciplinarum peritia. Eo siquidem semper sapientiæ amore flagasti, ut quarum vnam tantum aut alteram, vel optima quæq; ingenia vix tandem post multos annos assequi mediocriter possunt, eas omnes disciplinas, non per transennā (quod aiunt) aut primoribus degustandas labris, sed consummate, integre, tibi esse indispensandas putares. Quem seruiorem ac diuinum affectum animi, adeo labore improbo, vigilisq; immensis fouisti, ut non modo tui voti compos, sed promptuarium etiam omnium Artusarum, quid dico promptuarium? imò sacratissimū quoddam templum, nobis euasisse viderarū. In quo quidem, si latine, græce, atq; hebraica lingua puritatem ac proprietatem requirat quis: si artium omnium liberalium ornatū: si Iurisprudentia, Theologiaq; veluti summū apicem, vniuersas inquam has scientias & facultates reperiet absolutissimas. In quarum singulis tam feliciter es versatus, ut ex æquo omnes didicisse videaris. Quæ immortales virtutes tuæ, adeo, tanquam per gradus quosdam, te ad maximum dignitatis fastigium pari amoris vicissitudine promouerunt, ut pri-

EPISTOLA DEDICATORIA.

mò quidem, dum egressus pueritia fines vix esses, cum maximo bonorum omnium applausu creatus fueris Gymnasiarcha celeberrima Academia Salmanticensis: quam ita singulari prudentia tua & consilio rexisti; ut eorum qui eo in munere te precesserant gloriam prorsus obliteraueris. Haud multò post factus es Toletana Ecclesia Archidiaconus: quæ dignitas quantopere in Hispaniis illustris sit, nemo est qui vniat & nesciat. Nec intercesserunt multa mensium curricula, quin iam Episcopus Caurenſis euaderes. Quod pastoris tam insigne munus, ad eò pie religioſeq. hactenus semper administrasti, ut si ceteri Ecclesiastici procures eandem, quam tu, viam ingrederentur, non tot cladibus hodie afficeretur Ecclesia: non tot indies sauciaretur vulneribus: sed semper contra hostes suos prauales. Postea verò PAVLVS III. Pont. max. fama tuarum virtutum adductus, à Deoq. ipso inspiratus, te, vltro (ut solet complures alios, quos & pietate & doctrina ceteris antecellere intelligis) in ordinem Patrum amplissimorum censuit esse accersendum. Inter quos ad eò splendens & fulgens, ut de te cunctis varam quandam expectationem exhibeas. Nihil dicam impræſentiarum de antiquissima & nobilissima, ex qua oriundus es, Mendozarum familia: quandoquidem illa vniuerso innotescit orbi: & animus nobis est persequi, non quæ natura tibi, sed quæ virtutes tuæ præstiterunt. Ut autem reliqua expediám: quemadmodum ingenuissimus iste animus tuus Mendazarum omnium delubrum atq. sacrum est, sic ædes tuæ semper Academia, quædam hominum doctissimorum quam absolutissima existit: quos ad eò semper foves, auges, cohoneſti atq. muneribus, ut eruditus tantum viri natus esse videatur. Quam sanè tibi insitam, cognatamq. in studiosos omnes benignitatem, abunde etiam sum ipse expertus: quippe cum me anno quadagesimo sexto supra millesimum, ex Germania redeuntem, ubi primum attingi Romam, quam munificentissime exceperis, exceptumque præſeceris curæ valetudinis tuæ, ac postea indies magis summa liberalitate locupletaueris. Hac itaq. omnia adduxerunt me, ut hæc mei ingenij primitiæ, calore splendoris tui consecræ, ad maturitatemq. perducas, Tuæ Celsitudini offerrem. Tuæ igitur partes erunt, Pater amplissime, eorum meditationes contra malefactorum morsus defendere, quos in tutelam tuam recepiſſi quam benignissimè. Vale. Venetius, ex adibus illustrissimi D. D. Ioannis Furtado à Mendozæ, in hac insigni Republica Cæsaris Oratoris circumspectissimi.

XV. Calend. Maias, M. D. XLVIII.

GALENI LIBRORVM ELENCHVS.

SOELENCHVS LI-
BRORVM GALENI, QUI IN
quaq; sectione habetur, cum eorundem interpretibus,
quorum uerbores, dum Epitomen condere-
mus, sequuti sumus.

PRIMAE SECTIONIS LIBRI.



Xhortatio ad artium li-
beralium studia, Eras-
mo Rotero. interprete.
col. 1

De optimo docendi ge-
nere, lib. 1. eodem Erasmo interpre-
te. 3

Quod optimus medicus idē sit & phi-
losophus, lib. 1. eod. interp. 4

De sectis ad eos qui introducitur, lib.
1. Augustino Ricco Lac. interp. 5

De optima secta ad Thrasylulum, lib.
1. Iunio P. Cracouensi interp. 9

De constitutione artis Medicæ, lib. 1.
Victore Trincauelio interprete. 20

De partibus artis Medicæ, lib. 1. Victo-
re Trincauelio interprete. 31

De elementis, lib. 1. Victore Trinca-
uelio interprete. 33

De temperamentis, lib. 1. Thoma
Linacro interprete. 39

De inæquali intemperie, lib. 1. Thoma
Linacro interprete. 61

De optima corporis constitutione, lib.
1. Augustino Ricco interp. 65

De optimo corporis habitu, lib. 1. Au-
gustino Ricco interp. 67

De animi morum & corporei tempera-
menti mutua cōsecutione, lib. 1. Ioan-
ne Paul. Craff. interp. 68

De naturalib. facultatib. lib. 1. Thoma
Linacro interprete. 73

De naturalib. facultatū substantiā, lib. 1.
Victore Trincauelio interprete. 89

An sanguis in arteriis natura cōtinea-
tur, lib. 1. Victore Trincauelio inter-
prete 90

De motu musculorum, lib. 1. Nicolao
Leonicensio interprete. 91

De uetri dissectione, lib. 1. Iano Corna-
rio interprete. 103

De semine, lib. 1. Iano Cornario inter-
prete. 108

De foetū formatione, lib. 1. Iano Cor-
nario interprete. 121

De septimestri partu liber 1. Augusti-
no Ricco interprete. 126

De instrumento olfactus, lib. 1. Victo-
re Trincauelio interprete. 128

De ossibus ad tyrones, lib. 1. Ferdinan-
do Balamio interprete. 131

De dissectione vcnarū & arteriarū lib.
1. Antonio Fortolo interp. 141

De nervorum dissectione, lib. 1. Anto-
nio Fortolo interprete. 149

De anatomicis administrationibus, li-
bri 1 x. Ioanne Guinterio Anderna-
co interprete 151

De usu partium humani corporis, libri
x vii. Nicolao Regio interprete. 194

De placitis Hippocratis & Platonis,
lib. 1 x. Ioanne Guinterio Anderna-
co interprete 321

SECUNDAE SECTIONIS LIBRI.

Num ratio tuendæ sanitatis. ad medici-
nalem, an ad exercitatoriam spectet.
Iunio Paul. Pat. interprete. 359

De exercitio parua sphaeræ, lib. 1. Ioan-
ne Fichardo interprete. 365

De alimentorum facultatibus, lib. 1. 111.
Martino Gregorio interprete. 368

De euchymia & cacoehymia, lib. 1. Fer-
dinando Balamio interprete. 404

De attenuate victus ratione, lib. 1. Mar-
tino Gregorio interprete. 413

De cognoscendis curandisq; animi af-
fectibus, lib. 1. Bernardino Donato
interprete. 419

De consuetudine, lib. 1. ex veteri trans-
latione restitutus. 426

De sanitate tuenda, lib. 1. Thoma Li-
nacro interprete. 428

De usu respirationis, lib. 1. Iano Corna-
rio interprete. 484

De causis respirationis, lib. 1. Iano Cor-
nario interprete. 488

De difficili respiratione, libri 111. Iano
Cornario interprete. 489

De pulsuum usu, lib. 1. Thoma Lina-
cro interp. 505

Introductio in pulsus, Martino Grego-
rio interprete. 510

De differentiis pulsuum, lib. 1. 111. Her-
manno Cruerio interprete. 519

De dignatione pulsuum, lib. 1. 111. Her-
manno Cruerio interprete. 538

De causis pulsuum lib. 1. 111. Herman-
no Cruerio interprete. 552

De præcognitione ex pulsib. lib. 1. 111.

GALENI LIBRORVM ELENCHVS.

Hermanno Cruferio interprete.	579	Ars medicinalis, Nicolao Leoniceno interprete.	813
De diebus decretoriis, lib. 111. Ioanne Guinterio Andernaco interp.	607	De methodo medendi, lib. X1111. Thoma Linacro interprete.	840
De crifibus, lib. 111. Nicolao Leoniceno interprete.	622	De arte curatiua ad Glaucōnē, lib. 11. Nicolao Leoniceno interprete.	955
De præcognitione, lib. 1. Leonardo lachino interprete.	645	De venæ fectione aduerfus Eraſiſtratū lib. 1. Iosepho Teſtādro interprete.	985
De præſagio ex inſomniis ſumendo. col.	652	De venæ ſect. aduerſus Eraſiſtratos Romæ degentes, lib. 1. Iosepho Teſtādro interprete.	987
Quomodo morbum ſimulātes ſint cogarguendi, lib. 1. Ioan. Ficardo interprete.	652	De curādi ratione per venæ ſectionē, lib. 1. Theodorico Gerardo interp.	989
TERTIAR SECTIONIS LIBRI.		De hirudinibus, reuulſione, cucurbitula & ſcarificatione, lib. 1. Theodorico Gerardo interprete.	999
De differentiis morborum, lib. 1. Guilielmo Copo Baſilienſi, & Thoma Linacro interpretibus.	657	De purgantium medicamento rum ſcultatibus, lib. 1. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.	1000
De cauſis morborum, lib. 1. Guil. Copo, & Thoma Linacro interp.	660	Quos purgare, quādo, & qualibus medicamentis oporteat, liber 1. Ioanne Guinterio Andernaco interp.	1002
De ſymptomatum differentiis, lib. 1. Guilielmo Copo, & Thoma Linacro interpretibus.	664	De ptiſana, lib. 1. Auguſtino Ricco interprete.	1008
De ſymptomatum cauſis, lib. 111. Guilielmo Copo, & Thoma Linacro interpretibus.	668	Conſilium puero comitiali morbo laboranti, Auguſtino Ricco interprete.	1004
De cauſis procatarctiſis, lib. 1. ex antiqua reſtitutione verſione.	694	QUARTAR SECTIONIS LIBRI.	
De plenitudine, lib. 1. Victore Trincauelio interprete.	696	De ſimplicium medicamentorum facultatibus, lib. X1. Theodorico Gerardo interprete.	1012
De atra bile, lib. 1. Auguſtino Ricco Luccenſi interprete.	702	De ſubſtitutis lib. 1.	1144
De tumoribus præter naturā, lib. 1. Auguſtino Ricco interprete.	705	De compoſitione medicamentorum ſecundum genera, lib. V11. Ioan. Guinterio Andernaco interp.	1148
De tremore, palpitatione, cōvulſione & rigore, liber 1. Dominico Monte ſauro interprete.	710	De compoſitione medicamentorum ſecundum partes, lib. X Iano Cornario interprete.	1188
De morborum temporibus, lib. 1. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.	716	De theniaca ad Piſonem, lib. 1. Ioanne Guinterio Andernaco interp.	1270
De rotitis morbi temporibus, lib. 1. Ioanne Guint. And. interprete.	719	De antidotis, lib. 11. Ioanne Guinterio Andernaco interprete.	1280
De locis affectis, lib. V1. Guilielmo Copo Baſilienſi interprete.	722	De ponderibus & menſuris libellus, Andrea Lacuna Secobenſi, autore. col.	1289
De differentiis febrium, lib. 11. Nicolao Leoniceno interprete.	780	Vita Galeni, eodem autore.	1294
De Marafmo, lib. 1. Victore Trincauelio interprete.	802	FINIS.	
Contra eos qui de typis ſcripſerūt, lib. 1. Victore Trincauelio interp.	809		
De typis, lib. 1. Auguſtino Ricco interprete.	810		

GALENI

PERGAMENI EXHORTATIO AD BONAS ARTES DISCENDAS.



FAMULI animalia bruta nō habent rationem illam enunciantem, scilicet enatiticeve, qua nos ipsi praxim sumus: eam tamen quæ secundum animam intelligitur, quam *indolūti* vocant, hoc

est, rationē intus delectentem, fortasse nobilicū habere omnia, cōmūem, licet alia magis, alia minus. Ceterum cum animalia omnia sint artis omnino experta (paucis quibusdam exceptis, quibus natura magis quam institutione cōtingit videntur artes) solus autem homo scientie capax, quancūque velit percipiat, ac tum ea quæ subter humum, tum ea quæ supra caelos sunt, contempletur: ac denique omnium bonorū maximū, nempe philosophiā, sua sibi parat induit, merito solus is dicitur rationalis, quod ratione ceteris omnibus antecellat. Quare longē turpissimū est, hanc ipsam rationis vim, quæ nobis inest cōmūis cum Deus, negligenter, caducarum rerum studio cōtemi, ac sēprens artibus, nos improbe fortune cōmittere, quæ plerūque bonis virtutibus possiditis, quorū oportebat habere rationē, locupletari indignos, ac ut id quidem cōstanter, sed tamen per donec, pari qua dedit temeritate, cursus eripiar desolati. Quā deam qui infelices sequuntur, omnes infelicitate preunt. Contra verō qui Mercurio, rationis domino, omnesq; artis aurores, se adducit, nunq; deſeruitur ab eo, sed qua ndū sequuntur illum, semper eius providentia, patrocinio, & splendore fruuntur. Qui igitur pendentes ex ipsius solo nutu fortunæ, honestissimas artes & disciplinās, seu viros, toruē intuentur, & cum interim equos ipsos & canes artium exercitū erudiant, famulum autē ignavū, nullūq; peritiam artis, nullo precio dignum exultant, cūnt præterea & agros, & ceteras possessiones, vt quęq; sit qua mopimē excultra, solos seſprens negligunt, abdicantq; ab omni liberali iustitio, ac hoc quidē intelligētes, aumā habeant nec ne, an nō q, quam vis Creso ditiores sint, omniū abiectionem exiliunt, cōtempnissimūq; famulus similes? Eundem farinæ videntur, qui nobilitatē sui generis venditant, atq; hui; sibi placentes, erigunt cristas: quanquā non vident infelicitissimū, qui generi non respondit suo, eos nō igit cōtemnū, quā obſcuro loco natos. Siquidē imperiti, qui genere sunt vehēmenter obſcuro, hoc lucraſciunt, quod plerūq; stercorē, quales nam illi sint. At quos decus & claritudo generis non ſinit latere, quid aliud fructus ſequit ex illa nobilitate, nisi vt eorum infelicitas sit illiſterior. Proinde si quis ſapit, ac exercendam artem cōſiderat, per quam illi nobilis fuerit, id debuit genere non indignus: ſin minus, ſuum ipſe genus nobilitabit. Sed nec ob elegantem corporis formam, quę nūi arte fuerit exculta, prius ad omnia, est iuvalis, debemus animū veniſſimū negligere, quę tanto illa dignior

& excellētiore est, quanto ipſe animus corpore videtur eſſe quippiā pravitanti. Oportet itaq; adoleſcentem ſuam ipſius formam ad ſpeculum contemplari: qui ſi ſe cōſpexerit facie pulchra, advigilandum eſt, vt talis ſit etiam animus: exiſtimetq; vehēmenter abſurdum, in formoſo corpore animū habitare deformem. Ruſus, ſi ſe viderit eſſe forma corporis infelici, tanto magis illi curandum eſt, vt elegantem efficiat animum, quo audire poſſit illud Homeri:

Eſt ille qui, cui forma parum ſit corpore ſcite.

Sed compoſit formam verbis Deus eruat, &c.

Quod autem nec ipſa Athletarū profeſſio, quę pollicetur maximū robur, gloriāq; apud vulgus conſulat, etiam compoſiti debeat cum artibus homine libero dignis, vel hinc nobis licet colligere, quod cum varie ſint bonorū ſpecies, quę natura hominibus inſunt, pari quę ad animū, quę ad corpus, & quę ad ſculturales exteriorē ſpectat, nullam hanc Athletę, ne in ſomniis quidem, agnoſcunt. Siquidē quod ad primam attinet, animam habent nec ne, proſuſ ignorat Athletę: tantum abeſt, vt illam ſciant eſſe rationis participē. Etenim cum ſemper maximam vim carniū, linguarūq; coaceruent, habent animam ſuam veluti multo immerſam ceno, vt nihil poſſit intelligere, verū nō minus ſuſpici ſit, quā dūtorū animę. Cum autē ſupra modum laborent, ſupra modūq; (vt dixi) expleantur, maniſeſtum vtiq; eſt, eorū habitudinē maximē periculoſam exiſtere: id quod ſentient Hippoc. ait, ſummē bonam habitudinē Athletarū in maximo verſari diſcrimine: affectionēq; Athlencam nō eſſe ſecundū naturā: meliorem autē eſſe habitudinē ſalubriorem. Quibus verbum nō ſolū negatur palam eorum exercitacionem naturalem exiſtere, ſed ne habitudinē quidem illam dignatur eſſe appellare, quod obnoxia periculo ſit, ſicilicet in diuerſum mutabilis. Iam quod ad formā corporis attinet, ſic illi habet res, vt nō ſolū exercitatio Athlētica nihil ad pulchritudinē conferat, verum etiam plurimum obſit, ob ingluuiē illam, qua diſtenduntur, ac ſupra modum ingurgitantur. At fortaiſe nihil quidem ex iis quę expoſita ſunt, ſed robur ſibi vendicabant Athletę. Quod per deos robur, aut ad quid videretur ad agrum colendum? Perpulchre igitur vel fodere, vel metere, vt aliud quidpiā, quod ad agricultacionem pertinet, poſſunt. Sed fortaiſis ad res bellicas valet. Audi Euripidem igitur, qui laudes eorum canit, dicens:

Nam aduerſi hoſtem præbiterunt, maras diſcem ſiſcentes: Nilone ſubſtrato ſpſide, Pedibus eni hoſtem ſubuerunt perſe.
Nullus proſeſſio: nunc ſunt heri,
Vt cōtus ſiſtem mittere corpore.

Ergo inde forte gloriatur, quod præ ceteris plurimum colligit, eo ceruētiq; peculiarit. Atqui viderelicet omnes iſtos in alieno obſtrictos, non ſolū id temporis, quo exercent artem Athlencam, verum etiam dum ab ea diſmiſſi ſunt. Quāquam ne id quidem præclarum eſt, ex arte parate diuitias, ſed enim potius artem ſcire, quę fracta nūi, ſimul cum domino enaſcit. Ex diſſis igitur evadit perſpicuum, o ingenuiſſimi adole-

Animi veniſſimū præſentia pulchritudinis corpore.

Athletarum proſeſſio.

Bonorum ſpecies tres.

Athleta omni genere bonorū ſunt digniſſima.

Athletarū animam eſſe veluti multis demerſam ceno.

Athletarū habitudinem maximē periculoſam exiſtere.

Athlētica exercitacione pulchritudo obſiſcit.

Athletarum eſt ſi robur ualeat.

Athletas omnes eſſe arti alieno obſtrictos.

Arti quę paranda.

Beata iſſeſſe raſionē recordatā & iſolūti & arq;

Beata eſſe artem experta. Homo ſolus ſciens capax.

Homo ſolus dicitur rationalis, quod ratione ceteris antecellat. Ratio nobis inest cōmūis cum deo. Fortuna improbitas, inſolūtiſſimū.

Mercurio cōmūis datus, seu omnium artium aurores.

Inuenditorem bonum non iſolūtiſſimū.

Imperitiū infelicitas dicitur, quod non respondit suo generi, quod obſcuro eſt clauis.

Pulchritudo ad rem non exercitā, eſt munitio.

scientes, nec diuinitis, nec generis claritate, nec pulchritudine formæ, nec exercitio aut robore Athletico fretos, oportere nos studia liberaliū artium negligere. Verumenimverò cū in geminū discrimen ipsæ artes distribuantur, quarum quedam ratione cōstant, suntq; in genū & honēstæ: quedam contrā, cōtempnibiles, quod corporis laboribus cōstent, quas sedentarias & manūarias vocant: præstent vtiq; ex priori genere quampiam ediscere. Nam postērius alterū ge-
10 uis destituere solet senectute cōfectos artifice. Prioris porrō generis sunt, Medicina, Rhetorica, Musica, Geometria, Arithmetica, Dialectica, Astronomia, Grammatica, & Legum prudentia. Adde his si velis, fingendi, pingendiq; artificii. Quāquā enim hæc in manūaria consistunt opera, eorum tamen exercitatio nō eget robore iuuenili. Ex his itaq; artibus aliquam eligere cōvenit, & in ea exercere optimē iuuentutē, cui mens nō sit omnino pecunia: vel præstantissimā harū omnīū, quæ quidē iudicio meo, est ars medendi, quod deinceps nobis est demonstrandum.

GALENI PERGAMENI de optimo docendi genere, liber vnus.



Auorinus censet illud esse optimū genus doctrinæ, per quod vtrāq; in partem præparamur. Quam doctrinā Academicū vetustiores existit
10 mabāt definire in epochen, hoc est suspensam sententiā. Si quidem cū argumentis cōtrariis in vtrāq; partem suo more agitaissent aliquod dogma, tandē permittēbant discipulis, vt quod venis ipsis videretur, eligerent. Ceterū cū nonnulla videamus nobis videre, aut aliquo alio sensu percipere, vt in somniis, aut per insaniam: nonnulla item re vera videamus, aut alio quouis percipiamus sensu: hæc quidem postēriora, omnes homines, exceptis Academi-
40 cis & Pyrrhoniis, credunt ad certam cognitionē pertinere. Quæ verō per somnium, aut mentis errorē apparent animo, ea falsā prorsus existimant. Quod quidem si sic habere Academicū nobis concesserint, delectant oportet & libris suis, quod inibi scriptum est, in rerum iudicio nec fas-
50 esse magis fidē habendā, quā in infano: nec rectē valenti magis quā in ægro, nec vigilanti magis quā in dormienti. Quippe si istis nihil est cognoscibile, quā in iis qui sunt diuerso modo affecti, nimirum veritatis iudicia confusa erunt: nec ipsæ præceptor Academicus, neq; etiam eius discipulus poterit iudicare rationes, quæ in ambas partes inter se pugnantur differuntur. Atq; hoc ipsum est, quod veteres illi docuerunt, nullum esse datum a natura iudicium homini, quo exactē possit dignoscere: eōq; nulla de re pronuntiandū esse absolūtē, sed de omnib; semper suspendendam esse sententiā. Verū si nobis pliy-
60 ficiis concedant (vt decet) sensus iam nihil opus habebimus in vtrāq; exerceri partem, sed opus tantum erit repetitione eorum, quæ fuerint exemplis tradita. Lubens autem Faueriū inter-rogarem, num homini naturalis quedam iudicanda vis insit, quæ sermones veros discernat a

falsis: an potius ars quedam & ratio sit, vtrūque cognoscenda. Si natura, qui sit, vt non omnes inter nos consentiamus, nec similes iudicemur: Si ars est, & ratio, hæc omnīū primū erat discenda. Dein conueniente ludimagistro variis modis exercere discipulos, multis exemplis propofinis. Nam dicere, nullū adesse nobis verū ac falsū iudiciū, est omnem agnitionis spem prorsus exterminare. Ignorū quamvis iudicium nature, sophistæ contendunt nullum, eo tamen nullū nec antiquius habemus, nec generosius. Cui quidē naturali iudicio licet credere, vel non credere: ipsum autem per aliud iudicari non potest, cū nimirum eo cetera iudicentur omnia. Quoniam autem ex ipso naturali iudicio artem omnes parant sibi & instrumenta, & iudicandi secundum artem, organa: per quæ quidem alia sibi cōponunt homines, alia rursus ab aliis eomposita iudicant: docebo equidem in vniuersum & instrumenta, & iudicia, tum ea per quæ nbi parabis veros sermones, tum ea per quæ iudicabis ab aliis dictos. Nam quod ex sese eviderentur a paparent sensibus, aut intellectū, ad id nihil est opus inquisitione. Ceterū si nihil sit tale, necessum est vt accedat cognitio, quæ aliunde petatur. Etenim si perinde ac in corpore oculus, sic firmitellectus in animo, hoc est, non pariter acutus omnibus, consentaneis profectō rationi est, vt quemadmodū qui cernit acutius, adducit ad id quod videtur, eū cui visus hebetior est: ita qui bus coningit in rebus intelligibilibus perspicere clarē, quod intellectus offertur, veluti manu ducant ad contemplationem & cognitionem eandem, illos qui hallucinantur. Atq; hoc quidem est præceptoris officium.

GALENI PERGAMENI, quod optimus medicus idem sit & philosophus, liber.



Vod accidere solet Athletarū ple-
70 riq; qui cupiunt quidem in Olympiis victores evadere, ceterū vt id assequatur, nihil exercēt, curantq; tale quippiam cōpluribus medicis vsu venit. Nam laudant quidem Hippoc. ac medicis omnibus reponunt: vt autē similes illi evadāt, quidvis studio habēt ponus q̄ loco: quippe qui ne legūt quidem illius cōmentarios, nec si id faciūt, intelligunt quæ dicuntur: aut si quis id quoq; cōsequatur, nō perducit speculatiū artis rationē ad experientiā, vt confirmet quod didici-
80 t. Quorū si desit altervtrū, necessum est sui vni vterū studij atq; instrui sine frustretur. Nullū autem nunc nasci, qui natura satis cōpositus sit ad percipiendam artem tam familiarē, tamq; amicā humano generi, dictū absurdum videretur, cū idem sit nunc mundus qui olim. Probabile tamen est, ob præuam educatiōē, quæ hodie in istis runtur mortales, & ob diuinitas virtutē antepo-
90 sitas, ita neminem amplius existere, qualis fuit vel Phidias inter statuarios, vel Hippocrates inter medicos. Si quidē fieri non potest, vt qui plus facit diuitias, quā in vltutē quig artem non in hoc didici; vt bene de hominib; mereret, sed
vt di-

Tasoribus con-
uincitur.

Iudicio natura
lib singula iudi-
cantur

Præceptoris of-
ficiū.

Speculatiue ar-
te rationali con-
firmatū esse
experientiā.

Artem diuinitas
in liberales
sedentarias.

Artes liberales
quæ alia sunt
præparanda.

Artes liberales
quæ

Pingendi fingendi
duos artes cor-
porales docen-
tur.

Medicinam of-
fisi ingenuarum
omniū præstā-
tissimam arti.

Doctrina genus
optimū quod.

Epochē.

Pyrrhoniū.

Academicū
falsum dogma.

quandoquidem & de phlegmone, & de meatibus, plurima absurda prodiderunt Methodici, pauca adversus eos dicere est animus, qui iuventuti erudiendæ nonnulli videntur adherent. Inflammatio est tumor præter naturam, dolorificus, tactui renitens, durus & calidus, partem ipsam, quam antea (contrà quam illi existimant) nec rationem, nec densiorem, nec etiam duriorum efficiens: sed affluxu humorum supervacui repletam, atque ea de causa diffusam. Cuius quidem curatio, evacuatio est humorum: quibus vacuatis, partes laxiores redduntur. Tensio igitur, necessarii comitatur repleta: sicut laxitas, eas, quæ evacuata fuerint, particulas. At densitas & raritas horum neutri sunt ex necessitate annexæ: sicut nec fluxus, nec retentio. Quæ enim si rarum quippiam exiit, etiam ex ipso quid effluere prolixius necesse est (quod enim si crassum & pusillum fuerit quod continetur) nec si densum sit, nec cessari quodcumque continetur. Nam multum & tenuis, etiam per densos meatus distillat. Prestabat itaque didicisse illos, externi quod prius in particula contenti est, rarefacto eo quod ipsum continet: & eo quod continetur, attenuato, copiosiorque effecto, & vehementius moto, & ab ali quo exteriori attracto, vel ab aliquo interiori expulso: non autem ipsam evacuationem referre ad solam raritatem meatuum. Frequenter etiam natura ipsa impetu vehementiori insurgens, quicquid sentit supervacui in corpore, expellit, exprimitque. Oculis præterea nonnunquam fluxione affligitur, aut copiosior existente quod fuit, aut etiam tenuiori effecto, aut à natura per eam partem expulso, nihil illis corporibus à naturali constitutione mutatis. Et oportet quidem, si velimus mederi affectui, tenuem fluxum crassum reddere, copiosum vero evacuare. Opinari autem inflammationem unam affectum astric tum esse, & complicari aliam, quemadmodum opinantur methodici, depravati certe est iudicij. At quia is, qui introduci sunt, ista sufficit, huic præsentij sermoni iam suum finem imponam.

GALENI PERGAMENI de optima secta ad Thrasibulum, liber unus.



Edicorū * theorematū singulū, atque vniuersū omne theorema, in primis verū esse debet: secūdo, vti tertio, iactis dubitantis cōsen-
sū quorū si desit vni, ne theorema quidem dici mereatur. Quatenus enim sub cōprehensione omne theorema cadit, eatenus verū sit est necesse. Falsi namque cōprehensio nulla est. Quatenus autē ad finem aliquem vite cōmodo quæritur, eo vtile esse affirmandum est. Quia verō quemadmodū sub vno principe subditorum multitudine mente concipitur, sic & theorema ipsum ad antea dictum principij refertur: ob id omne theorema verū, vtile, consentaneū, nec cessariū dīcedum. Quare si omne aliud, liquidū certū est, medica enī theoremata his tribus esse diiudicanda. Igitur quandoquidem nec verum ipsum, quale nam sit, nec vtile, nec etiam consequens, facile aut æstimari, aut deprehendi pos-

sunt, notas horū aliquas iudicandū instrumētū in primis tradere, præcō operæ fuerit. Ipsum porro verum, ex orationis cum rebus cōcordia æstimabitur. At rerum, aliquæ sensibus evidentibus sunt, aliquæ sensum latent. Evidentium rursus aliquæ per se innotescunt, ut albus atque color alius ab albis evidentiū adipiscuntur, ut quæ deprehenduntur signis. Ad hæc, rerum sensus abditariū aliquæ intellectui & perspicue sunt, & dicuntur: vt, bis duo, quatuor constituunt alix cognoscuntur per ostensionē: vt si dixeris, quo bene vti licet, eodem & abvni. Oportet autem semper sermonem, atque omne theorema ad proposita res spectem referre. Iam verō iudicia de rebus sensui evidentibus atque occultis differunt. Quæcumque enim sensui evidentium rerum, per se de seipsis notitiam faciunt, sensui diiudicantur: vt album & atrium. Quare illi medicis iure sunt deridendi, qui de rebus sensui evidentibus, sententiam, non sensorij, sed ferre demonstratione conantur. At evidentium quidem sensum, non autem per se cognitoriū, iudex est observatio. Præterea, sensui abstractarum rerum, ut plures sunt differentię, ita & diuersa iudicandū instrumenta. Ex abstractis autē sensui, aliqua intellectui perspicua sunt: vt hoc, si ri non posse, vti dem homo Athenis simul atque in Aegypto sit. Aliqua per ostensionem agnoscuntur. De perspicuis intellectui iudicium ex cōmuni omnium hominum conceptione habetur. At quæ ostensione percipiuntur, per consensum abis, quæ ab omnibus conceduntur, diiudicantur. Rursus, concessi diiudicatio in plura diuiditur. Aut enim ex cōsensu cum sensui apparentibus, aut cum intellectu perspicuis, aut cum demonstratis, consensum disceruntur. Igitur quo modo verum, & ad iudiciū veri ductū, iudicari oportet, iam explicauimus. Deinceps de vtili dicamus theoremate. Vtile theorema, cuius ad artis finem refertur, dignoscitur. Oportet autem ipsum, primū quidem cōprehendi posse: alioquin in vtile theorema redditur. Deinde, ipsius apprehensionem non conuenit vulgaribus esse communem, sed artibus propriam. Idcirco namque eos falsos esse nos dicimus, qui sensui evidenti inuiti artis existimant. Neque enim ex sensui evidentibus ars constitui tur, nec per sensui evidentia sit eius traditio: quandoquidem nemo sensui nota tradit, sed ea quæ ex sensui notis præcepta oriuntur, quæ planè sensui subiecta nō sunt. Hæc igitur artis principij esse, haud ab re quippiam existimauerit: de eo enim theoremata, ex evidentibus sensui nata, quod principium tradenda ad sensui evidentibus artibus evadūt. Itaque sensui nota, principij inventionis theorematū esse iure dicuntur: principium verō artis nequaquam. Nam artis principia vulgo ignota esse debent, sicuti & ipse artes illi omnes ignote sunt. Præterea, artium principia traduntur: evidenti autem sensui haudquam traduntur. Theoremata namque, aut in sensui nota, aut in his quæ aliis percipiuntur, aut in his quæ prædictis fore, aut in manifestis intellectui consistunt. Quod igitur ex manifestis sensui cōsensu, aut in his quæ manifesta sunt sensui, ratione inventū est, & vniuersum prolatum,

Verum vnde
æstimatur.
Rerum diffi-
cultas.

Inflammatio
fuit phlegmonæ,
quid.
Phlegmonæ affi-
ctam partem
autem rarior-
em, nec durio-
rem efficit.
Phlegmonæ co-
rat.
Tensio renitens
tumor repleta.
Lentus conti-
nuitur vacua.

Exortio quib.
modo fiat.

Totus fluxus
oculorum cras-
sum esse reddo
dam.

Theorema a-
ma verum, v-
tile, cōsentaneū
que esse debet.

Falsi comprehē-
sio nulla.

Vtile theorema
quomodo de-
gnoscatur.

Artem non cui
finis ex evidē-
tibus nascitur.

Artem principia
vixit esse igno-
ta.
Artem vulgo ef-
fignotat.
Theoremata in
quibus consen-
sant.
Theorema
quod dicitur,

Theorema o-
mnino æternum,
firmū atq; per-
petuum esse.

Artis suū di-
noscī.

Medicam arti-
ficis salutem
sumā cōser-
vare.

Medicina esse
proprium at-
que suū vici-
um.

Consequens
quā dicantur.

Sella medicio-
rum triū, ratio-
nalis, empiricæ,
methodicæ.

Sellarum triū
centum.

Methodici ex
rationalis qui
servantque in-
ter se.

Empirici me-
thodici, quib-
us se sunt con-
cedit.

id appellatur theorema. Omne autē theorema,
æternum, firmum, atq; perpetuum est. Quamob-
rem hallucinantur illi, qui ab ipsis theorematibus
medicinam appellari existimant attem coniecta-
tricem: cum ab actione, & medentium opera, quæ
incertum habet eventum, ea coniectrix reddat-
tur. Cæterum quoniam vtile diiudicandum esse
prohibetur, si referretur ad finem, artis finem
nempe proponere iam tempussum fuerit. Artū
igitur alique, ea quæ non sunt efficient: vt na-
usum structuram. Nonnullæ, quæ facta sunt, con-
servant: vt navium gubernatoria. Aliæ vitæ
præstant: vt ædificatoria. Porro in facientibus ar-
tibus, aut servantibus, unus est consequendi fi-
nis modus: ac proinde in his simplex est vtilis
æstimatio. At in his quæ iuxta faciunt & servant,
non ita facile fuerit diiudicare. Ars itaq; medica
inter eas est, quæ faciunt, atq; conservant: nou ob
id tamen geminū esse eius finē credere cōvenit,
& quod nō est facere, vt pote sanare: & eam
quæ est, conservare. Si quidem ipsius artis viciū
est propriū, sanitas scilicet finis: vicius, nem-
pe ad eptio illius: quamvis modi sint ipsius ad-
eptionis multiplices. Quippe dum submouemus
adversā & noxia, sanitatem acquirimus: dum vi-
tamus illā, præsentem sanitatem tuemus. Quare
vtile in medicina recte æstimabimus, nonnunq̃
si ad sanitatē ascendamus, nonnunq̃ si ad eam
retinendam confert, nobiscū reputantes. Conse-
quens autem ipsam diiudicare oportet ex eo,
quod sublatū vno, aliud necessariū aufertur: si-
cut & posito, ponitur. Talia namq; consequen-
tia, consociatq; iure putanda sunt. Neq; enim
quod medicinale theorema verum vtileq; sit, co-
gnoscere sanis fuerit, sed nihil fecius ipsum cum
aliis colligere, cōsentireq; opus est. Quandoqui-
dem igitur omnis oratio, omnique theorema, tri-
bus locis perpenditur. tres autē in medicina sectæ
celebres sunt, Rationalis, Empirica, Methodi-
cæ, æge & huius iudicandi rationibus vti, earū
singulas diligentius examinemus, vt syncretæ &
salutari, cæteris possit haberi, ad hæreamus. In pri-
mis itaque quid inter eas conveniat, & quid cui-
usque sit proprium, exponere videtur necesse.
Dein autem, singulas ad examen reducere. Por-
ro cōvenit inter illarum trium sectarū profes-
sores, quod evidentiā theorematum vtilia sunt, ana-
logismus, observatio, historia, ad simile transi-
tus. Præterea quod historia sine iudicio nō admi-
tenda: quod instrumenta, & remediōrū applicando
rum modus ex vfu sint: quod ex aliis alia dep-
renduntur: quod idem præsentibus malis ead-
em sint faciēda: quod adiectionibus & subtra-
ctionibus sanitas cōservatur, atq; fugitur mor-
bi: q; ad materiam adhibendæ nonnā, experien-
tia potēs atq; vtilis est. Si quidem quæ nutriūt, &
quæ nō nutriunt, purgantia & letalia omnia, ex
perientia cōperta sunt. Verum Methodici & Ra-
tionales eatenus inter se conveniunt, quatenus
vtriq; vtile percipi ex indicatione arbitrantur.
Quatenus verō à diversis accipiūt, eatenus sunt
discordes. Si quidem methodici ex evidentiā
sensu, vilia iudicari existimant. At Rationales,
ab huiusmodi quidem minime, sed ab occul-
tis, hoc est, à causis. Quæ ut etiam Empirici

Rationalibus suffragatur. Rursum, hoc loco in-
ter Empiricos methodicōsq; convenit, occultū
ex evidentiā nō agnoscī, ex quo cōferentium
indicatio oritur. Obiciunt autem Empirici &
Methodici Rationalibus, invtile esse rerū ab-
dicatum nominā: nihil enim abditum vtile re-
periri. Ad hoc Rationales Empiricos quidē re-
spondent, sensu cognita non satis esse, vt in ipsis
vtilia observatio deprehendantur, cum ne ipsi
quidem Empirici in omnino sensu percepti,
vtrantur observatio. Ac proinde occultis esse
opus, vt à quibus cōferentium indicationes na-
scentur. Vltra dicta etiam, quandoquidem Em-
pirici asserunt, & in præteritis & in præsentibus
observandum esse, cum infinita sint, tum præ-
terita, tum præsentia, in infinitis autem observa-
tio fieri nō possit, planē eorum observatio nem
ex us esse, quæ fieri non possunt. In Methodicos
autem, sensu perspicua cōferentium esse indi-
cationes putantes, hinc Rationales adducunt: Sen-
sus nota ex seipsis percipi possunt: vulgo igitur
nota erant. Quoniam verō & cōmunitates indi-
cant, simulq; cum indicantibus sese indicata of-
ferunt, vulgaribus vtiq; indicantibus cōmunita-
tes: atq; ita nihil à vulgaribus, o Methodici, dif-
ferentis. Quod ab affectibus verō cōferentium
indicatio non proveniat, hinc maxime licet cer-
nere: quod eodem affectu, exempli gratia, phle-
gmone, occupante differentes corporis partes,
vt oculos, iecur & gulam, nō vtritur eadem ra-
tione medēdi, cum numerū desideretur diversā.
Oculo namq; inflammato, succus farniculi, & lac
muliebri cōveniunt. Gula autē, aut iecori, aliud
quod piat: cum tamen idem semper in omnibus
eodem affectu applicandum esse prædicunt, si
affectus ipsi cōferentia indicantur. Non appli-
catur autem, affectus igitur cōferentia nō indi-
cant. His summatim expositis, quidnam sit ipsa
indicatio, atq; etiam analogismus, & qua ratione
ab illis, necud ab observatio sumat vtile, ex-
pedet aliquid dicere. Quemadmodū igitur sen-
sus evidentiā aliqua per seipsa percipiūt, vt
album, & nigrum: nōnulla, adhibita observatio-
ne, vt ea quæ dignoscuntur per notas: ita & iu-
vantia quidem per indicationem pateant, nul-
liusq; cogitationis ope indigēt. Quare quod in
apertissimis & sine cōtroverfia cōsensu reperit
id nimirū & in perceptis ex indicatione conige-
rit. Observatio autē, proportionē ad ea respo-
det, quæ per signa & notas comprehenduntur.
Verum ex analogismo iuvant ipsum percipiūt,
quando causa ipsa ignoratur, nulliq; observa-
tio habetur, sed affectus quissimilimus ex sym-
ptomatis est. In huiusmodi enim ab indicatione
prostatum colligi nequit, cum ignoretur cau-
sa. Idcirco nulla præterea facta observatio, ca-
sum similitudinem intrinsecus, cogimur ad simi-
le transgredi. Analogismus itaq; per transitū ad
simile fit: quo ventres, à similia ad similia transi-
mus. Empirici verō secus ac nos (hoc est, nullo
profus iudicio adhibito) transitum huiusmodi
viurpant. Est igitur indicatio, iuvantis cōprehen-
sio, simul cum cōprehensione infestantis adven-
tia, sine observatio aut ratio cinio. Experien-
tia verō, est eius quod frequenter & eodem modo
vifum

Empiricorum
methodicorū:
in rationales
obicit. Rationales
contra Empiricos
cōrrespondit.

Rationales
asserunt contra
methodicos.

Indicationem
cōferentiam
non fieri ab af-
fectibus.

Oculi inflama-
to succus far-
niculi, & lac
muliebri con-
veniunt. Affectus
cōferentia autem
inducit.

Humana per
indicatioem pa-
teant.

Tumens quoque
per seipsum
ex analogismo.

Analogismus
fieri per transi-
tū ad similia.

Indicatio
quod.

Experientia
quid.

*Observatio et
experientia
dem.*
*Analogyum
quid.*

*Empiricorum
propria.*
*Rationalium
obscure ad-
versus Empiri-
cos.*

*Observatio
abſque ratione
fieri non poſſe.*
*Observatio
non poſſe colligi
in ſimilium
accidentibus
conſiſtens.*

*Observatio de
bet fieri in pla-
nitate.*

*Portulaca an-
tiliator ſym-
ptomatum.*

vidium eſt, cōprehēſio & memoria. Ceterū obſervatio & experientia ſunt idem. Analogiſmus autem eſt comparatio, & perceptio cauſarum iuuantium, per ſimilitudinem. At deinceps, propria cuiusq; ſecū cum expoſuerimus, adverſus ſingulas aliquod inducimus. Empiricorum ſunt propria, iuuantium in concuſſibus obſervatio, iſtoria, diuerſiq; à ſimili tranſitus. Ab iſtis tamen cauſa iure petenda eſt, cur non in omnibus acciduntibus, ſed in certis quibuſdam, ſe conferentia obſervare fateantur: cum accidunt, qua tenus ſenſui evidētia ſunt, tam illa in quibus fit obſervatio, quā cetera omnia invilia, nulla ex parte diſſidant. * Dicant igitur nobis, quid nam accidentia vilia cōmonſtrent: appaſine, an occulta? Si enim appaſe dixerint, quo vilia accidentia producantur, & in quibus eſt obſervandum, inferemus iterum, hoc appaſe, quatenus conſpicuum eſt, nihil ab invilibus diſſerre accidentibus. Quod ſi occultum eſſe id quod indicat vilia accidentia, aſſimēt, occulta ad accidentium obſervationem conducere, neceſſum eſt fateantur. At occulta nulla vī alia, quā ratione cōprehendi queunt. Quare ſi occulta vilia ſunt, in concuſſibus occultorum eſt obſervatio. Et ſi nihil aliud quā ratio cōprehendit ea, apertum iam eſt, abſque ratione obſervationē fieri nō poſſe. Quod autē in ſimilium accidentiū cōcurſibus obſervatio colligi nequeat, per hęc eva det perſpicuum. Cū enim proſus oporteat ipſa concurrentia, nō modō genere eadem, numero æqualia, magnitudinēq; ſimilia eſſe, ſed etiam idem tempus, eundēq; ordinem ſervari neceſſum ſit (ut etiā conſentiat Empirici) ſi debeat integra, abſolutaq; obſervatio fieri: cūq; in omni vita, ne duobus quidē ægrotis, nedum pluribus, omnia ſymptomata quæ comitantur morbos, accidere ſimiliter queant, clarū eſt luſuſmodi obſervationē fieri haudquāquā in iſtis concuſſibus poſſe. Quod ſi duo etiā ægri nulla in re diſſerentes inventi fuerint, non ob id tamen cōcedenda obſervatio eſt: quandoquidem ipſa in pluribus fieri debet. Porro in quibus poſitis vtile ipſum aut invile nos obſervemus, iam dicamus Empiricos. Non ſcilicet in ſoliſ ſymptomatum generibus obſervare, in quibus nec potentia, nec tempore, nec magnitudine, nec ordine, nec alio quopiam eſt opus: ut in dentū ſtupore: quæcūq; cauſæ, loci, facultatiſve ſymptomata ſunt, ea reputantes vilia: quæ verō nō luſuſmodi, ſeu in viliis exploſcentes. Ceterū ſi dicant, moriū hæmorrhoi plura ſymptomata comitantur, vos autem nihil in his obſervatione ad hęc eis reſpondebimus, non in illis ſymptomatis, ſed in antegreſſa cauſa, nos obſervationem facere ſymptomata verō ad antegreſſum cauſarum cognitionem, in quibus obſervationē ſtatimus, expendere. Cauſa namq; ignorata, & facultate curādi ex indicatione carentes, obſervationē in antegreſſis cauſis præſtatimus. Etenim cū dentes ſtupent, minime portulaca obſervatur, ſed aſſectus ab acidis acerbisq; ortus: quod ſi ex illudione, aut vomitu, aut ſecūſis ſeræ ſtindore productus ſit, nihil in portulaca præſidiū fuerit. Præiſa itaq; cauſam rimati, dein portu-

laca vtemur. Iam verō Empiricorū hiſtoriā, qua videntur, cum vī remediis cōtra omnes morbos abvident, tum vī ipſa traditio ſit brevis, inanem omnino eſſe, nec conſui poſſe, mox pateſciam. Omnis enim hiſtoria, aut præſentium, aut præteritorum eſt. Siquidem futurorum non hiſtoria, ſed porius diuiniſtio eſt dicenda. Etenim ipſi Empirici frequenter præteritorum hiſtoria ſunt vī: quā definiūt eſſe narrationem rerum ſæpius circa eadem probatarum. Cū autem omnia in hiſtoria enarrata vera eſſe aſſimēt, aliquem proſectō iudicem habere deberent, qui reſtē hiſtoriam inſtitutam eſſe, diiudicaret. Is cū non adſit, aliquod diiudicandæ hiſtoriæ inſtrumentum eſt rependiendum, quo à falſis vera diſcerni poſſint. Siquidem circa vnam eandēq; rem, non ſolum non conſentiant medici, ſed etiam contraria opinantur. Quare cū ipſi fatentur cogantur, vtile eſſe hiſtoriam admittere, inter rogandi ſunt, experientia, an ratione, hiſtoriam iudicent. Ratione quidem nequeunt, cū ipſam exterminēt, et alioqui eo iudicare debent, quo iſtorū vnum quodq; percipitur. Atqui experientia, quæ iuuant, deprehēſiſſe prædicat: experientia igitur etiā iudicat ea eſſe a neceſſe. Quare neceſſario etiā Empirici de hiſtoriis per experientiam iudicium faciunt: id quod ſi ita eſt, reliquitur, ſupervacuum inviliſſimū eſſe hiſtoriam. At Rationalis medicus, per cauſam diiudicare hiſtoriam poterit: qui vbi cauſam nanciſci non poteſt, hiſtoriæ iudicium experientia cōmittit. Nullus autem iuuantis notitiam haberi poſſe ex hiſtoria, nō magno quis negotio probaverit. Siquidem per quæ conſueſimus in concuſſibus obſervationem fieri non poſſe, per eandem efficitur, neque hiſtoriam poſſe conſtitui. Neq; enim obſervationem fieri non poſſe, poſſe autem non obſervata deſcribi, quipiam dixerit. Videntur autem ipſo tranſitu à ſimile Empirici, nonnunq; ab auxiliis ad auxilia, nonnunq; à locis ad locos: eſt cū à vitiis ad vicia. Ab auxiliis quidem ad auxilia, ut quando meſpilos, viciæ cotoneorū, torminofis exhibent. A locis autem ad locos, ut quando ea quæ in muſculis membris obſervantur, talibus etiā applicuerunt. A vitiis verō ad vicia ita tranſeunt, veluti cū remedia ad ſanguinis fluxum probata, ad hæmorrhoi morſum accipiunt. Quomodo autem intelligant ipſam ſimilitudinem, ſi interrogetur, facili ipſos cōvinces, atq; in abſurditates in numeras præcipitabis. Nunc verō declarandum ſuper eſt, quo modo Rationales tranſitum à ſimile (quem nonnulli vocant analogiſmū) viſuſpent. Ipſorum ſymptomata, aliqua quidem cauſas, aliqua paſſos locos, aliqua facolorates, aliqua ægrotantes ſequuntur. Hęc Rationalis omnia diſtinguit, noſciturq; vbi obſervandum ſit, nec ne. Quod alia verō adſint, abſintve, non laborat, cū nihil ad corationē conferant. Quin etiā, vbi concuſſus ipſe in aliquo ſymptomate invili vāriare videtur, haud ſecus iſdem vnitur, quā ſi penitus conſimilis concuſſus adeſſet. Quocirca vilia ſymptomata diſtinguēt Rationales ab invilibus (qua facultate carent Empirici, cū ſecundū concuſſum aut abſentiam ſimilium

*Hiſtoriā eamq;
eſſe præſentis
aut præterito-
rum.*
*Futurorum ad
hiſtoriam, ſed
divinationem
eſſe.*

*Hiſtoriam hodi-
ernā ab Empiri-
co per experientiam,
ex a Rationaliſ-
mū per cauſas.*

*Ex hiſtoria nō
poſſe haberi no-
titiā iuuantis.*

*Empirici quo-
modo videntur
tranſire ad ſi-
milia.*

*Rationalis quo-
modo viſuſpendit
ad ſimile tranſi-
tum.*

symptomati, solantur semper curatione variare) sepeus dissimili in multis apparente concursu, eadem medicamenta sectantur, ut in emprosthotono, opisthotono, & tetano: qui affectus diuersum cōcursum habere videtur. Intelligi siquidem copiam sanguinis (si sic evenit) in causa esse illorum affectuum, musculorumque esse vitium, atque vnum eundemque morbum, eadem via incedit. Nam in priorē, aut in posteriorē, ut æqualiter in vtraque partem convelli, patientis symptoma est: quod observatum, nullum ad curationē momentum addit: quemadmodum nec lachrymarum. Contrā nonnunquam simili apparente concursu, ubi causam animadverit, discreti curatione videntur: ut in illis qui ob erosionem, aut fracturam, cruenta ore emittunt. Dividens enim symptomata Rationalis, ad vniuersū indicantia respiciens, atque vniū tantū ex ipsis diligens, auxiliū contra ea pugnare valentibus vitis, pleuraque diuerso apparente concursu, eodem ipse semper modo curabit: aut contrā, apparente simili, diuersam curationē instituit, remedia nempe causis symptomata producentibus, contraria adhibens. Sed quo modo, dicit aliquis, vniū symptomata à vniuersis, ipse Rationalis distinguit? Ad indicantia propostia referendū, respondeas. Quemadmodum autem concursus, ita & curationem distinguit: atque in prima perspicuum habet, quoniam curationis auxilia, symptomata quæ à causis producta sunt, aduersantur: quæ symptomata à loco, facultateve exortis. Sciens namque hoc à causis symptoma enasci, à locis illud, aliud denique à facultate: causa præterea, auxiliū genus indicari, à loco vtendi modum, siue nā à facultate mensuram, si quidem eadem causa sit, & causam prodentia signa simul etiā apparent, sed nec locus sit idem, nec facultas eadem, vique idem remedium genus accipiet, sed mensuram, & vtendi rationē variabit. Contrā, si causa planē diuersa fuerit, sed locus & facultas sint eadem, nō idem auxiliū genus, sed mensura, & vtendi ratio seruabitur. Postquam igitur Rationalis medicus & concursus & curationes metiri est idoneus, potest secundum cōcursum similitudinem, aliquas curationis partes pro suo arbitratu mutare. At Empiricus neque causam, neque causarū, aut loci, aut facultatis proditoria similitudo symptomata, id nequam facere poterit: quo circa neque ad simile transitum inter curandum ritē usurpauerit. Obtenimus itaque ea quibus Empiricorum secta insignitur, atque informatur: nempe observationē, historiam, & ad simile transitum, frustratoria esse, minimèque consistere posse. Modō superest vniuersa acies cum Methodicis depugnanda, quorum sanē instituta sunt hæc. Cum eadem symptomata sunt, affectus autem, quibus hæc inherant, differunt, nō eadem in quibus ratione esse vtendum: ut in plerumque generis astricti, atque laxi. Rursus, si eadem à sint affectus, symptomata autē differant, eadē (inquā) curatione vtendum: ut in costarū, cerebrique phlegmone, si vtrique sub astrictiōnis genere continantur. Quādoquidē igitur symptomata eadem cum sint, dissidente tamen ratio ne in medendo vitimur, cumque illa differant, eodem nō

nam modo curamus, ideo inuiliā prolixas ad curationē pronunciat esse symptomata. Cum autē sublati affectibus, ipsa perant symptomata: positis autem, perdurent, viles esse affectus contendunt, ut qui hæc exorientes producant, extinguant autem evanescentes. Quod autem per ea quæ methodici faciūt, cogantur vniā facere symptomata, facile cogniti sunt. Nam homines vtiuntur infantes, siue ob fluxum, siue ob astrictiōnem infantes, collocant in tenebricoso cubiculo, lucē ipsam addere ad infaniam existimantes. At veterinosos, siue astrictiōne, siue etiam fluxu laborent, loco splendido conditi conantur. Tenebris enim veterinū augescere putant. Cum igitur delirantes ex astrictiōne, in tenebris, quæ adaugent ipsam astrictiōnem, detinentur: luce autem, veterinosos ex fluxu, licet lux ipsa fluxum reddat magis exorbitantem, videtur certe mihi affectus ipsos negligere, solāque intrinsecus symptomata. Sed neque affectus conferentia indicare, ut opinatur Methodici, iisdem illis rationibus, quibus ipsi inuiliā esse symptomata nitentur probare, etiam elici poterit. Nam si idem affectus sint, causæ verō differant, non eandem curationē admittunt. Vrinæ namque suppressio, vnius quidem affectus est. Verum si calculus sit in causa, excidimus: si phlegmone, cataplasma illinimus. Si vesicæ supra modū distentio, oricularū speculum, aut catheter imponimus: aut egrum in genua decubientes, aphronitro extremum vrinæ fistulæ perficimus. At vniū cum est causa, licet affectus differant, idem curandi genus admittimus. Cholera namque & arthriticus morbus, quamvis dissimiles, eadem feremus & ipsi ratione curantur. Quamobrem, quoniam sublatæ causæ affectus auferit, postre coheretur: item diuersæ causæ, quilibet affectus sint idem, diuersam: eadem, licet affectus variant, eandem curationem postulant, non iniuria nos & causas, & affectus, & passios locos expendimus. Et quemadmodum symptomata ipsi Methodici, quoniam à diuersis affectibus eadem, & ab iisdem diuersa proveniunt, nihil cōmōdi in dicere testantur: item nos, à diuersis causis eosdem, ab iisdem diuersos gigni affectus cernentes, eos ad viliū indicationē in cōmōdos esse dicimus: ad curationē autē sufficere perceptionē causæ, dignonem perspicui loci, necnon ipsius facultatis mensuram. Quādoquidem sit ne suor, aut astrictio, supervacane puto cognoscere, cum affectus nō quid agendū sit, aut quo modo, sed suam ipsorū sublationē indicet: id quod ne bruta quidem ignorat. At artifices tali indicatione nō egent, sed illa kire exopiant, per quæ languores pellantur. Nam si morbi sui ipsorū remedia edoceret, laborites ipsi, per quæ ad sanitatem redirent, intelligerent. Quin & ex auxiliis adhibitis, non morbos, sed causas indicare mediam, deprehendunt. Auxilia namque non effectis, sed efficiētibz aduersantur. Itaque non prolixas in cōmōda esse symptomata, nec à morbis conducibile, sed à causis, indicari, satis ample est ostensum. Iam verō cum Methodici medicā facultatem definiat esse cognitionem per se evidentis cōmutatum, manifeste etiam hallucinantur,

Rationalis contra methodicos. Infantes ob morbum collocant in tenebris. Lucem augere infaniam. Tenebris veterinum augescere.

Affectus confusio proinde non indicat.

Vrina suppressio varia curatione, pro diversitate causarum.

Curationis quæ sufficiens.

Affectus formam ipsorum sublationem indicant.

Causa modis indicant. Auxilia non effectis, sed efficiētibz aduersantur.

Causa genus auxilij indicat. Locus indicat vtendi modum. Facultas morborum prædicti indicat.

Rationalis positi curationem variare, id quod non licet empirico.

Methodicorum dogmata.

atq; convinci possunt: quandoquidem cōmunitates ipsæ, quas vocant, neque evidentes sunt, neque per se perceptibiles. Siquidem cum non omnis densatio & retentio attractio sit, neque omnis raritas aut excretio fluor (in pygæntibus enim retentio mensuratur nō est attractio: sicuti neque fluor, expulsio illa materiem involvit, cum in musculis mollibus victus ratione nō vīs excreta singula mensibus solet) relinquatur manifestum, qui sola ipsa symptomata respicit, cum nec fluxus, nec attractio nem deprehendere possit. Sed hæc ex aliis enī esse duadicanda. Siquidem densitas ipsa & raritas, nonnullis quidem ingens, alius adventitias, & præter eorum naturam sunt: ac proinde oportet, in aliud quippiam affectiones eas referentes, ita secundū naturam ne sint, an vinctis, iudicium ferre. Amplius, id quod immoderatū, atq; præter naturam est, evidens non est: quandoquidem vt cognoscatur, magna est opus inquisitione, necnon collatione ad vires. Atqui cōmunitates (quod farentur enī Methodici) præter naturam sunt, atq; immodica quedam, cōmunitates igitur evidentes nō erunt. Illud etiam considerandum est, num quispiam vni quod medicum accersierit, ipsi situdine aut immodica raritate vexatus. Quod si nemo vnaq; cōmunitates percipit sensu, cur ipsi artem medicam desinunt esse notitiam per se evidentium cōmunitatum, quas quidem investigare & cognoscere, Erasistratus & Hippocrates oppido quim difficile & laboriosum existimant: Ceterū etiam cōmunitates ipsæ evidentes sint, nec ob id tamen eas aliquid vnde indicare est fatendum, cum aliunde ipsa vera indicatio inuestigari debeat, nempe ab efficientibus causis, quarum differentia cōmunitissima est duplex: aliæ siquidem in nostro corpore continentur, aliæ accedunt extrinsecus. Verū cum ab aliqua externa causa pulsamur, minimè lædi possumus, nisi alia intestina causa in corpore delitescens, impetum externū illius excipiat. Porro Methodici nō duas tantū cōmunitates, sed plures etiam statuunt. Alias namq; in victus ratione, alias in clivis collocant. In victus quidem ratione, vt attractum, & diuens, adiunctamq; magnitudinē, & morbi tempora quatuor, & longinquitatem, & accretionem, et intermissionem. In manaria autem opera, quod si natura alienum est, ponit, loco, & tempore, & pluribus aliis. Sed de utraque cōmunitatibus, que ad victus rationē pertinent, satis fuerit in præsentiarum aliquid dicere: quas quidem intro duxerunt, nihil repertientes, quod auxiliorum differentias indicaret, vt scilicet iuxta ipsarum diversitatē, diversim inveniunt medendi rationem. Quod autem magnitudo cōmunitatum non indicet magnitudinem remedium, hinc nobis discernere licet, quod in ipsis morbis curandis, non simpliciter auxiliorum magnitudine egemus, sed huiusmodi certa magnitudine. At magnitudo cōmunitatum, non hanc huiusmodi auxilij magnitudinem, sed simpliciter magnitudinē indicat. Deinceps neque morbi tempora vtile quippiam indicare ostendimus: prius tamen aliqua de temporum differentia tractanda sunt. Dux igitur temporū

differentie apud medicos celebrantur. Aliqua enim morborū, aliqua auxiliorū dicuntur tempora. Atq; hinc iam manifeste curatio fiet. Cautarum autē monitiones morbi esse tempora dicunt. At monitionis differentie sunt quatuor: initium, incrementum, status, & declinatio. Hæc eadem sunt & temporum nomina. Auxiliorū verō tempora: ea que ad ipsorum exhibitionem idonea sunt prædicant. Sunt autem idonea, quando remedium postulanti quidem adsint: prohibens verō, nullum. Plenius autem auxiliorū morborumq; tempora, non re ipsa, sed cogitatione tantum differre existimant: quod auxilij morbiq; tempus simul incidit, interdumq; eodem tempore & morbus sit, & auxilij optima reperitur occasio. Hallucinatur autem non leuiter. Nam si eadem auxiliorum morborumq; tempora forent, nec re ipsa distaret, oporteret quocumque morbi tempore, tempus etiam auxilij adesse: nō autē quocumq; morbi tempore auxilia adhibemus, nō eadem igitur auxiliorum morborumq; sunt tempora. Plerumq; etiam administramus remedia, cum morbus quidem non adeit, sed futurus timetur. In morbi autem vigore & imperio, auxilij cōmodum tempus nō est. Contra verō in ipso vno declinationis tempore, plura quis auxiliorū tempora, & quidem opportunissima accipiet. Ad hæc, morborum quatuor tempora habentur, initium, augmentum, status & inclinatio, que quidem in auxilij minimè reperire licebit. Quinetiam morborū tempora, aliqua vniuersalia, aliqua particularia sunt. At remedium, generalia quidem describi possunt, particularia verō nō item. Ex quibus liquet consistat, non sola cogitatione, sed re ipsa etiam, distinguuntur huiusmodi tempora. Ac tempora quidem id quod vtile est indicare, methodici hæc ratione impulsi putarūt, quod tempora nō omnia ad cibi medicamentive assumptionem apta esse cernebant: cūq; temporibus nonnullis hæc vtiliter exhiberi, nonnullis verō noxi spectarent, id ob temporū discrimina accidere arbitrabantur. Quare ex eodem fonte & cibi propostia, & remedium tempora manare prohibebantur. Thessalimque inter illos fessellit Hippocrates, dicens: Quando morbus in summo est, tunc victu tenuissimo vitandum. Suspensus est quippe, ipsum naturæ temporis ductum, alimentij qualitatem tunc præscripsisse, cum tamen à tempore facultas tem illic mensus fuerit, ac secundū ipsius facultatis mensurā, cibi qualitatē accepit: id quod ex his que subiunxit, declarat. Constatandū enim, inquit, an æger possit durare. Plerūq; enim tempora, quod si facultate requiritur, interuenit, & ne accipiat impediri: nonnunquā autē quid faciendū sit, edocet. Cum igitur id quod aliquid postulat, eius quod postulat propostum sit: quod verō nos postulatū sumere impedit, propostū nequaquā dicatur: vtiq; morbi tempora nobis interdum postulatū sumere prohibentia, propostia minimè fuerint. Neq; alia ratione constat duxisse Hippocratem. Inter morborum initia si quid videretur mouendū, moue: vigenibus autē, quiescere melius est: quā quod circa ipsa principia, vires nondum infirmas esse intellexerit,

Temporū differentia duplex.

Conferam ut tunc differentia sunt quas mor,

Tempora auxiliorum.

Tempora auxiliorum remedium: non eadem esse.

In vigore morbi existens nō esse opportuna auxilia.

Dulcitate morbi opportuna esse auxiliorū vnum.

Morborum tempora quatuor.

Tempora interdum interuenire quod si facultate requiritur.

Morborum remedia, nō est attractio, sicuti neque fluor esse naturalis, excreta.

Communiter in evidentes non esse.

Conferam des. fortis duplex.

Causa externa non laedit, nisi intestina causa adjuvat.

sed posse eas facile inanitiones perferre: at circa morbi statum, & invalescere causas morbosas, & virtutem languidam effici, prosterni, atq; labefactari. Cui accedit, neq; impunè posse administrari remedia, cum omnia præter naturâ sint, ob idq; naturales facultates infestè, nec possint adeo morbosas causas rescindere, quæ vnâ cum illis, aliquid etiam benignæ substantiæ rapiant.

*Remedia o-
mnino esse præ-
ter naturam.*

*Auxilia per se
causas morbo-
sas extirpare
non possunt, sed
saltem morbi
materia inuol-
vit.*

*Facultatem in-
dicat reme-
dia.*

*Facultas prohi-
bet non accipit
remedia id quod re-
quirunt.*

*Convalescen-
tibus modicum ci-
bum præbent.*

*Tempus nec
qualitas nec
quantitas ali-
menti indicat.
Facultas indicat
alimenti ge-
nus.*

*Facultatem ef-
ficaciorum qua-
ritati scopum.*

litatem, nec quantitatē ostendere. Nam si morborum tempora ciborum quantitatē & qualitatem præscriberent, aut in sui conferantione, aut abolitionem id facerent. Primum autem est omni ex parte ridiculum. Ex secundo verò inferitur, talem tantumq; cibum, aliquæ ad versus tempora contrarietate esse prædictum. A solis namq; contrarius tolluntur. At temporibus nec talis, nec tantus cibus cõrarius datur, cum nõ sub eodem genere continerantur, nec possit quod vnum est, dici contrariis pluribus. Hac eadem ratione efficietur, vt nec remediõrum differentiam morborum tempora indicent. Quod autem iungunt, principium indicare, quod augmentum prohibet, scopum autem agnitiõis indicare nihil, extremè ridiculum est. Cuius erroris origo ipsi ex altera falsâ opinione manauit. Credentes enim quilibet morbum transire per quatuor tempora, verisimile arbitrati sunt, vt morborum initia suppresionem incrementi indicarent. Id igitur ipsos latuit, non omnem morbum incipere, augeri, in summo cõsistere, ac declinare. Accurrit namque morbi, qualis apoplexia est, simulatq; invaserunt, ad extremam ascendunt magnitudinem. Et qui iudicantur morbi, vno tempore, declinatione scilicet, manant. Siquidem indicationes, in sua veliementia morbos, adhuc etiam augentes, discunt. Potest præterea inter initia, remediis abhibitis, eleri morbus: atque ita cetera morbi tempora præverti, facidiq; cõtingerit. Id præterea Methodicorũ decretũ est factum, quod inter morborum initia astringentibus semper vrendũ censent. Causam verò inde placitum illud accepit, quod multæ phlegmonæ per astringentia, reprimuntur, inter initia desinunt. Cum autem quælibet secundũ ipsos phlegmone, astrictio sit, absurdũ plane videtur, astrictos astrictus per cõdensantia tolli: id quod se hoc nomine facere profitentur, nõ vt causæ reprimantur, sed vt corpora firmitiora, minuscule panibilia reddantur. Quibus ita respõsum velim, minime fieri posse, vt nocentibus causis simul auctis, corpora ægrè panibilia reddantur. Ceterũ quod inchoantibus phlegmonis, cõmodè astringentia admoveantur, ob repercussionẽ humorũ sedentium, nõ vt cõcolitur solus particulus, vt illi existimant, nemo id nõ faretur. Nam si ex astrictione ratione firmitudo conciliaretur corporibus, cutem rigidã distentantq; præ egestate habentes, valentiores bene facis, senesq; iunioribus longè vegetiores existeret. Qui igitur corporibus robur firmitudinemq; cõparare studuerit, minime qui corpus durũ reddatur, cogitet opus est: sed quæ ratione membrorum vires augeantur, quibus liberè atq; expedite proprios vias exhibeant.

*Contraria aq;
in ceteris sol-
li.*

*Vnũ pluribus
diebus cõrarius
non possit.
Morborum tem-
pora, remediõ-
rũ differentia
non indicant.*

*Morbi non o-
mnino quatuor
temporibus tem-
pora.*

*Acuti morbi si-
mulatq; in vni-
versũ, ad extre-
mam perveniunt
magnitudinem.
Morbi qui iudicantur
cancer, motu-
lancie declina-
tione.
Morbi possit in
initio desinere.*

*Phlegmonis in-
choantibus, cõ-
modè astringentia
admoveantur.*

*Robur quæ ra-
tione conciliatur
dum corpus.*

GALENI PERGAMENI de Constitutione artis medicæ, li- ber VIII.



Vandoquidem diuino quodã prædictis affectu, Patrophile, mihi videris, vt qui omnia cū demonstrator ne & methodo indispici desideres, nec soli eam provinciam tibi cõmitte-

*Art. quilibet à
fina autem
fuit habet effi-
cacionem.
Methodus quo
alios artus ipsi
quoque medica-
na continentur.*

re audeas, statui alacritati tuæ obsecundare, atq;
in tuam gratiam duos commentarios conscribere,
alterum in quo monstratur, quamlibet artem à
finis notione suam habere constitutionem? alterū
(quē habemus præ manibus) ubi ostendimus,
methodum eam quæ omnes alias artes, ipsam
quoque medicinā constituisse: id quod iam nobis
est exordium. Ceterū igitur artum ipsarū alie
quidem in sola naturæ rerum contemplatione,
quas sibi proposuerūt considerandas, suum ha-
beant finem, ut astrologia & physica: alie edant
præterea nonnullas actiones, à quibus cessantes,
nullum permanentis officium ostendunt, ut sal-
tariora: alie officium aliquod possint ostende-
re, ut ars edificatoria & fabrilis: alie deniq; ni-
hil efficiant ipse, aliquid tamen aucupari conen-
tur, ut venatoria: manifestum vitæ igit, artem me-
dicam ex effectuarum genere existere: habet .n.
est exordium officii, qd' finita actione possit osten-
dere. Quare iam operæ precium fuerit, eandem
methodū, quam in ceteris factis artibus prio-
ri commentario tradidimus, ad hanc, quē in præ-
sentē constitutere conamur, transferre, posito hie
quoque eodem principio, quod in aliis est statu-
tum, nempe finis notione. Prima igitur quæ in
nobis suboritur cognitio, est hominum rectē va-
lentium: altera ab illa, eorundem, cū morbis
impliciti sunt. Vnde mox in nobis bene valendi
desiderium assurgit, artēq; aliquam sanitaris
conciliatricem constituendi. Vt autem proponi-
mus efficere integram valetudinem, sic ex facti-
uarum numero ars ea futura est, quam constitu-
re volumus. Dein, cū duplices factiuarum artes
sint (nonnullæ quidem res ipsas constituunt, alie
labefactas instaurant, corrigētesq;) hanc quam
investigamus, in eis potius erit, quæ rem iam fa-
cta reficiunt, quam quæ aliquid, quod pridē
non esset, edunt. Quænam modum igitur illi qui
edificaturus, aut collapsas instauraturus est æ-
des, necessum est prius omnes zedū particulas,
earūq; constitutionē accuratè novisse: sic etiā
qui artem, quæ circa humanū corpus versatur,
constitutus est, illius partes omnes sigillatim
necessariō debet cognoscere: quali nimirū sub-
stantia, quæ magnitudine, quali figura & nume-
ro prædite sint, quāq; inter se structuram for-
tiantur. Et quænam dmo illi qui extruit domū,
nunquam cognitionē particulari, nisi ex resolu-
tione assequi poterit, ita nos corporis humani
notitiā, ex illius dissectione consequimur. Deus
quippe & natura, instar illius qui primū zedes
est fabricatus, prænormant partes, earum officio
pro exemplari vti. Nos verō illum qui extructā
domum contemplantur, imitamur. Vbi autem ex
dissectione ipsa, naturā, formam, magnitudinē,
numerum, & concretionē partium similium ap-
prehenderimus, compositorū pariter membro-
rum (quæ nonnullis & instrumentaria vocan-
tur) scientiā assequemur. Quo fit deinde, ut du-
plices partium actiones in corpore reperiantur,
simplices nempe, atq; compositorū: cū & crus
universum moveri, & sigillatim musculorū crus
omnes videamus: cūq; musculo quocunque
per transversum secto, necessum sit deperire
ipsius motū aliquem cruris: vulneratōq; nervo,

primū quidem, musculum cui inferitur, exper-
tem motus & sensus reddi, mox vero & articu-
lum q̄ ab eo movebatur. Quare hanc nobis ar-
tem constituturū, necessariū fore arbitror, eiusq;
partium actiones cognoscere: id quod sanē ab æ-
dificatoriūbus nos distinguit. Duplex igitur est,
ut particularum, ita & actionū natura: una quide-
m prima, & maximē propria, dum panier o-
mnes simplices partes agunt: altera verō ex acci-
denti, aut secundaria, quæ totius est instrumenti.
Vt, tonus quidē cruris actio incessus est, qui fit,
dum articuli illius vicissim nunc extenduntur,
nunc inflectuntur. Ipsius porro facultatis motri-
cis à cerebro descendens, nervus veluti via
quædam est. Cerebrū namq; efficit nervus omnibus
humusmodi facultatis originē, principium ve,
inde perdiscas licet, quod secto quocūq; nervo,
in supremis partibus, quod cerebrū continentes
sunt, actiones seruantur integræ, cū tamen o-
mnes in inferioribus pereāt. Incessus itaq; actio
est tonus cruris, cui actioni musculorum præest
genus. Ossa siquidem, cartilagine, adēps, glandu-
læ, arteriæ, cutis, venæ, membrana, ligamēta-
q;, à musculis habent initium motus. Primum
enim ab ipsis ossa moventur, mox cætera vni-
cum ipsis etiam moventur oportet. Ad quæ
motum necessaria fuit optima cum ossium, tum
etiam ligamentorū cōmoderatio, constitutiōq;.
Ac de cæterarum partium actione & vīu, simili-
ter differendum, ut quæ opmē constitutæ sunt,
servantur, quæ autem vitio nō carent, ad melio-
rem statum ducantur: id quod munimē nobis li-
cebit, nisi vniuērsalē partium actionē, tum
vīum, atque adeo etiam structuram examinaue-
rimus. Structuram porro cuiuspiam rei, an vi-
tiosa sit, an ab omni probris immunis vitio, ne-
mo pendere poterit, nisi hie magnitudinē, nu-
merum, figuram, & situm omnium partium, ex
quibus talis res constat, optime scrutatus pridi-
cit. Quandoquidē omnium instrumentariorū cor-
porū, quæ ex cōpositione suam essentia sortuntur,
tum vitio, tum integritas, affectusq; omnis,
quatuor generib; his cōnectur. Quod si partes
vniūis quog; ex natura participēs sint, quiniū
hoc genus his addendū est corporibus: ita ut
quod in ipsis se præstantissimē habuerit, sit opti-
mas habiturū actiones: quænam dmo pessimas,
quod deterrimē. Si ergo etiam vniū solutur, ta-
lis affectio erit morbus, quem vnitatis deuortū
vocalamus, quod nō solum instrumentaria, sed fini-
læres etiam assignantur particule. Ceterū in osse
is affectus fractura dicitur: in carne verō mus-
culorū parte, si cum distentione accadat, fissura,
hoc est, scissura. Vbi autem sic filamenta tesu-
duntur ut disrumpantur, convulsio: vbi caro citra
tensionē soluitur, vlnus. In nervo dicimur af-
fectus is, scissio. Si vlnus ab acuto telo infliga-
tur, punctio vocatur: si à graui, cōtussio: si à cor-
rosione ortum habeat, in osse quidem, canies:
in aliis autem partibus, vlcus vocatur. Tot er-
go, talēq; in hoc quinto morborum genere,
quom simplices particulas occupat, differētiæ
erant. Instrumentariis verō sæpe accidit, atq;
diuisionē dicuntur. Sed si similis quæpiam
particula dissecta in totū, affectio illa, a partem

*Musculum autē
constitutum, ne-
cessaria est por-
tionem actionū
capitulum.*

*Cerebrum esse
arguunt facili-
tatem motum
per nervos de-
lata.*

*Musculi præst-
antissimū.*

*Instrumentaria
vniūis integritas
tensionē, ma-
gnitudinē, nu-
merum, figurā &
situm constituere.*

*Vitiosa solu-
tione communis
morbus est finis
læsi & instru-
mentaria particula.
Fractura.
Scissura.
Convulsio.
Vlnus.
Scissio.
Punctio.
Contusio.
Cancer.
Vlcus.*

Diuisione.

*Medicam arti-
em efficiantur
genere existere.*

*Factiuarum
duplices.*

*Medicam arti-
em in osse qua
labefacta in-
stantur.*

*Medicam arti-
em constituturū
corpore huma-
no particulas
requirit debet
cognoscere.*

*Deus & natu-
ra prænormant
partes, earum
officio pro
exemplari vti.*

*Alios partium
duplices,
simplices nempe,
& compositorum.*



illic quæ se ulla est, dicitur, partem tonius instrumens: quamvis nonnunquam huius non nisi ex accidenti dicenda sit, ut cum aliquis musculus patitur. Quod si autem etiam primum, ut cum aliquo d ligamentum: quemadmodum igitur in hoc vno morborum genere fecimus, sic in aliis quatuor differentie nobis scrutanda sunt. Quibus examinatis, nosse oportet, posuit ut pars quæ prius in alterius locum restat, aut minime. Quod si quidem si refectus carnem vitiatam, facile poteris similem aliam reficere: secus autem si nervus, vel ligamentum dissectum fuerit. Neque enim alia refectus, qualia erant priora: cum illa qui dem ex sanguine generetur, hæc vero ex semine ducant originem. Os quoque in us est, quæ per primam efformationem constructa sunt. Ceterum in locum ipsius aliquid suggerere possumus, quod osi quamvis simillimum sit. Verum iam methodus ipsa nos cogit ad inquirendum, verum vnaqueque pars, earum quæ & simplices, & similes videntur, vnu sit, an potius ex pluribus constructa. & præterea, quis sit earum compositio modus. Quæ inquirendo, quidvis non philosophis in modum, sed etiam medicorum nonnullis admodum sit vasa difficilia, nam in quibus adfuit septem adimentorum quæ subdam, facile cum illius, tum aliarum omnium diffcultatum, ipsam veritatem invenire: aut si minus, falsam non omnino de inventionem desperabunt.

*Adimenta sunt
quæ ad veritatem
in abstrahendo
rebus perveniendū
sunt.*

Septem igitur illa sunt, natura perspicax, educatio optima, præceptores ingenui, labor improbus, veritatis ardentissimus amor, optima methodus, exercitatio denique assidua. Quod si vel vnum desideretur, qui ad viam veritatis introducere dicitur, non est admodum sperandum, illum posse sui voti compotem fieri: si vero omnia cum mulata adfint, quod deinde vetat, quo minus veritatem, bona etiam spe, exquiramus? Revertamur autem eo, unde digressi est oratio, disquiramusque primum, an carnis (exempli gratia) elementum, vnu specie sit. Deinde vero, si secus videatur, an plura. Mox quot ea sint, & quæ, & quem habeant compositionis modum. Profecto si caro cum vel secatur, vel impensius calsit, dolet, fieri nequit ut ex vno elemento consistat: ut ex atomo, quem admodum Epicurus existimavit. Quare pulchre diu inquit Hippocrates: Si vnus existat homo, neutiquam dolebit: quia in alterum nequit mutari, si vnu est, cum nihil præterea relinquatur, in quod mutetur. Quod si est mutatio, erit quoque alterationis expertus, atque imparibilis, ac proinde nulli dolori obnoxius. Si itaque elementum carnis esset specie vnu, nunquam illa doleret: dolet autem igitur elementum carnis non est specie vnum. Rursum, si imparibilis esset elementum carnis, non doleret: atqui dolet, non igitur est imparibilis. Quibus rationibus, subvertitur dogmata eorum, qui tum atomos, tum similitudines, tum elementa quatuor, sed quæ mutuo inter se transmutari nequeant, introduxerunt. Quippe si duos digitos simul comburis, in modum diffingas iterum, neque eorum conventus, nec diductio, aliquid excutitbit dolorem. Ut enim aliquid dolet, ita patitur. Si quidem pars, ab his duobus prodit, ab altera nonne per totum, & a continui dissolutione, Quandoquidem igitur nec conventus, nec sepa-

Carnis elementum non esse vnus.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Carnis elementum non esse imparibile.

*Partes constitutæ
aliquid, et al
terationem ex
sistentem con
stituit.*

rano corporibus vel manifestè palpabilibus, vili adfert dolorē, minus profectō adfert imparibilibus. Etenam quodcumque in dolore futurum est, necessum habet, ut cum patiens, tum sentiens facultate præditū sit. Nulla tamen necessitas cogit, id quod sentit, ex illis primis consistere, quæ ipsa etiam vim habent in sentiendum: nam sit etiam si palpabilibus sit. Dū enim patitur, alteraturque, potest aliqui sentiens vim aliquid. Cum innumeraque possint esse alterationes elementorum, vnde mox innumera particularū poterunt proprietates oriri, sic ut alix evadant sensus expertes, alix illo præditæ sint. Ex dictis igitur consistit, elementa esse plura vno, eaq̃ alteratione esse obnoxia. nunc vero numerus eorū nobis investigandus est. Necessum autem est, ut illa que rem quampiū alterant, primum quidem illud contingant, quod aliis alterandū est, atque ita mox ipsum tandem immutent, idque per tactiles qualitates, quæ alterare totam proximæ rei substantiam possunt. cuiusmodi sunt caliditas, frigiditas, humiditas, atque siccitas: quæ quidem a tactu qualitates planè & sunt, & dicuntur: ex eisq̃ vel maxime oppositio prima, atque in hac ipsa, caliditas. Præter has quatuor, nulla reperitur qualitas, quæ corpora quæ, occurrent, alterare potest. Vnde si numerum ad innumera visq̃ secueris, iuxta quidem servabitur: sed simulacra caliditatis, desinent actum non esse. Quare quæcumque corpora has quatuor qualitates sibi vendicaverint primum, erunt omnium corporū elementa: sunt autem hæc, terra, aqua, aer, ignis. Ac proinde vniuersi, qui demonstrationi parent, philosophi, hæc esse omnium quæ gignuntur, intereuntque, vera elementa, necnon mutuo se transmutant, habereq̃ omnia subiectum quoddam commune, autumant. Igitur ex quatuor elementis simul contemptatis, corpus vnu simile gignitur: quod pro varia temperatione ratione, aut particeps sensus, aut illius expertis evadit. Vnde corporū similitudinem differentia, quæ simplices quidem sunt, tot sunt, quot elementa: calidiores nempe, frigidiores, humidiores, atque sicciores. Tondē verò & compositæ, ut quæ simul calidiores & humidiores sunt: quæq̃ frigidiores & humidiores: & præter has, alia tertia, siccior atque calidior: & quarto deinde loco, quæ siccior est, & frigidior: si tamen, ut quæ temperatissima est, & horum omnium prima, non negligatur. Cum igitur ab vnde sit iam ostensum, similitudinem partium integritatē & vnitatem in elementorum tuum moderatione, tum immoderatione consistere, superest ut inquiramus, quomodo ab ære vno morbus sit datusque videtur. Distinguetur autem a rei cuiusq̃ nonone. Porro salubris constitutio corporis, actioque sibi ex natura debitas, inoffensas habet: morbosus, offensus. Idcirco si quis sanus quidem sit, altero tamen, qui inde prospera valetudo fruatur, a cūctis habeat mibecilliores, res sane ut imtemperatior illo, necdum tamen ægerat: itaq̃ inter salubres habitus vniuersos, vnus ex temperatissimus, octo autē imtemperat. At inter morbos, nullū temperatum in venias: eundem tamen numerū complectur, quem imtemperatū salubres: ac de his hæc tenus. Deinceps autē dicendum est, quomodo

*Dolentia corpora id est effe
dunt potest
et sentiens
Sentientia corp
non manifestat
et sensibilibus
conficit.*

*Elementa esse
plura, plura v
no, tam altera
tione obnoxia.
Alteratione fi
ri abq̃ tactu
non possit.
Tactiles qua
litates.*

*Alia qual
itates, caliditas,
frigiditas, hu
miditas, siccitas.*

*Elementa v
num sunt,
terra, aqua,
aer, ignis.*

*Similitudinem
partium integritatem
et vnitatem
in elementorum
tuum moderatione,
tunc immoderatione
consistere.*

*Similitudinem
partium integritatem
et vnitatem
in elementorum
tuum moderatione,
tunc immoderatione
consistere.*

*Morbi sunt sex,
quæ constitutio
temperatissimus
salubres.*

modo quis morbos curet, quo modo & sanitate curatur. Enim vero medendi Methodus ex ipso cum saniori, tunc aegriori corpori affectu, sui principium habet. Cum .n. id quod exquisitè sanum existit, omni ex parte sit moderatè: quod verò aegrum, immoderatè: advertendū in primis est, quænam ea sit illius immoderatio. Quippe necessariū est illud inveniri immoderationē contrariā, per quā illam exterminemus. Reditus siquidem ab immoderatione ad temperiē, in omnibus erit per immoderationē contrariā. Vt tandem necessum sit, id quod præter naturam affectū est, dum ad naturalem statum redit, illam eandem quā viam incedere, quā prius consecerat, præter quod ordine contrario. Quare generalissimus curandorū morborū scopus erit, Contraria contrariis remedia esse, & particulis particulariā contraria. Calido enim morbo, frigidum: & frigido calidum, ita etiā siccū, quod humectat: humidū quod exsiccet. In similibus siquid res se habet hoc modo. In instrumentariis autem, oportet in vnoquoque prædictorū quatuor generū, morbose immoderationē eorūq; adhibere contrariā, donec ad moderationē, naturalemq; statum per ventum fuerit. Vt, si (exempli gratia) caro plus quā par sit, viceri excreuerit, crodenda est. Sin autem nimis cauum sit vlcus, implendum. Similiter & in aliis faciundum. Considerandum autem in omnibus generibus est, num habemus facultatem, ea quæ ex indicatione se offerūt, perficiendi. Siquidem morbi species, curationis tantum modum indicat. Id autē fieri potest nec ne, haud item indicat. Etenim eorum omnium quæ profunt corpori, in causa est, cum ipsa natura, num eriam medicus. Quædam tamen medicus, quædam enā natura præstare nequit. Quæ nimirum ita perfectum, vt de suo loco partes decedant, membrūq; distortum reddatur, haud potest natura corrigere aut conformare, sicut potest medicus. Sed natura potest vlcus cauum implere: quædam odō quæ semicōcta sunt, aut etiam cruda, concoquere: id quod negariū est medico. Quauisq; adhuc peragenda, medici minime naturæ potest ex visu esse, vt dum congruis medicamentis vlcus reddit purissimū, & eis quæ concoctione egent, ea offert quæ modicè calfaciant. Iam verò natura ipsa, nonnulla enā primum à se confecta, denuo non valet reficere: vt venam, artē, aut ligamentū, neruū, & alia id genus. Si quidem ob inopiam materię, nullum eorum naturā reficere valet, quæ ex semine suum ortum duxerunt. Igitur scopus ipse à Methodo medendi reperitis, eos in particulares materias inducere oportet: vt deinde comprehendantur, quæ aut omniū, aut ex parte aliqua, aut aliquo etiam tempore, secundū eam fieri possint, quæq; fecus. Nec verò est exiguū huius artis portio, remedium omnium materię, tam similitum partium, quā dissimilium morbis congruentium, adiuvenire. Quorum vniuersum genus, in ostendendis, efficiendis, & euacuandis, & iis præterea quæ extrinsecus accidunt, planè consistunt. Quæ omnia, vbi artis constitutor ad amussim perfecutus, et consecutus fuerit, iam causas omnes salubres, vt nihil illi præterea ad artem medendi de-

fit, absoluisse purissimè est: his omnibus reductis in capita duo, nempe corpori cognoscitur, quibus remedia ostendenda sunt, arg ipsam remedium naturam. Verum hoc mox illi quoque supererit, vt sibi aliquam affectuum omnium dignoscendorum facultatē comparat, maxime verò eorū, quæ partes in alio sitas occupant: quos exactè cognoscere, vni cum affectus particulis, haud fuerit obuiū cuiusq;. Quocirca de his suam aliquam impræsentiarū dicendum. Tria sunt genera rerum præter naturā. Primum, affectus qui se dāt naturales functiones. Secundum, horū causæ. Tertium, symptomata. Sed causæ prorsimū appellantur, cum agunt: quāvis ita nonnunquā dicitur, quod vim habeant agenda. Symptomati verò genus in tres differentias digeritur: in actionis lesionem, in ea quæ corpori accidunt, & in excrementorū exuperantias. Quocirca omnium symptomatiū causā ipse affectus: ob idq; merito ex illis agnoscitur. Symptomatiū porro nonnulla affectus ipsos necessariō concomitantur.

Alia non ex necessitate, sed aut sapibus, aut raro, aut equaliter. Sicut alia rursus, affectui differētia necessariō sequitur: quæ dā sepe, alia raro, alia in anopis sunt. Ea itaq; symptomata, q̄ morbos ex necessitate sequitur, quod affectui in se cognitionē habeant, dicitur Græcis pathognomonica, & pro morborum notis habenda sunt. Quæ verò non necessariō, ea vel morbi differentiam, vel illius mores, vel magnitudinē indicat. Vt rorūq; autem vim vno eodemq; apenamus exemplo. Costas succingēs membrana teneatur inflammatione: quæ affectum necessariō sequitur tumor præter naturam, rubor, & dolor velti pungens circa ipsas costas: quoniam illi substantia affecte partis membranæ. Latè etiam vagabitur dolor, quod ea ipsa membrana latè etiam diffunditur. Febrim quoq; tum ex ipsa phlegmone, tum ex vicinia cordis, sequi necessarium est.

Quorū si vel alterū desit, iam non ex necessitate febris adent. Nam si digitis inflammatione laboret, aut costas cingens membrana serro, & de matre affligatur, nō cōtinuō adoriētur febris. Quin & spirandi difficultas incidet, quā affectus ipse pro ducet, ponis quāvis læsa pars. Dolor namq; respiracionis operā eius viū nondum expleto dissoluit: vt mox necessum sit alterū celerius illi succedere actionem, vnde spiritus frequēs & parvus reddunt. Adent enī, præter eam quæ se iungit à febre nō potest, & pulsuum quoq; alteratio, nempe durities tensionis iuncta: quia pars phlegmone obfessa, nervosa est. Cum autē duplex lex ea tunica quæ costas velat, si ea pars quæ exteriōs ossibus hæret, valde aliquid laboret, facilius ægri in latum decumbūt oppositū. Nam si decumbant in latus, cōpressio molestā adfert. At si interior (quod frequenter contingit) vehementius dolent, si in oppositum latus reclinant, cum nimis pensilis sic reddatur inflammata particula. Quod si vtrūq; membrana afficiatur, par in vtroq; latere decubitus fuerit. Ad hæc, si inflammatio in supremis illius partibus excreuit, clauicula trahi deorsum videtur. Si in infernis, dolor præcordia pertingit. Quam obrem exiguā inflammatio erit, & secundū partes costas

Rarum præter naturam effectus tria genera. Affectus. Causæ. Symptomata.

Symptomatum differentia tres. Affectus cognoscitur ex symptomati.

Pathognomonica.

Febris etiam symptomata.

Dolorem latere evolvere respiracionis operam.

Reditus ab immoderatione ad temperiam, per immoderationem contrariam fieri debet.

Contraria contrariis remedia sunt.

Morbi species curationem tantum indicat.

Natura quæ nequit præstare, & quæ potest.

Medicis offensa natura minime.

Natura nihil valet in qua à se immutata sunt, posse denuo reficere.

Remedium vniuersum generis in quibus consistat.

medias, si in neutram se inclinet partē. Quod ve-
rō tenue quid, purulentumque, ex inflammatione ef-
fluat particula, cum ex morbo ipso, tum ex parte
lesā procedit. Suboritur etenim inflammatio ex
humore affluxu. Vbi igitur multus, tenuisq; is
humor fuerit, qui inlustr in inflammationem par-
tem, atq; pars etiam ipsa est rarior, plurimum est
quod effluit. E contrario autem, si fluxio fuerit
tum exigua, tum crassa, corpūq; præterea den-
sum, minūm erit quod transfundetur ac proin-
de excitabit rufum, ita vt nihil inde excernatur.
Quemadmodū si copiosum fuerit, rufusient plu-
rimum, nec parum expunt. Hunc itaq; affectū
semper ac necessariū sequitur rufus. Sciatū au-
tem post rufum, non semper: at maiori ex parte.
Quod spurio reicitur, necesse est semper esse
infectum colore, non tamen perpetuō eodem,
cum nec excrementū in inflammatione particula sem-
per sit eiusdem nature. Etenim cum sanguino-
lentum fuerit, biliosūve (eiusmodi siquidem
fere semper ea fluxio est, quæ in pleuriciis phleg-
monem gignit) a detento succo in inflammatione
particula, spurū colore inficitur: rubes quidem,
si sanguineum id fuerit: flavo autem, si biliosum.
Ceterum si pituitosus primū fuerit is succus,
qui & conclusus demū putrefact, ac deinde sit in
causa fluxionis gignens phlegmonē, tunc spur-
mosa excreantur. Sed quandoq; cernitur screa-
tus niger, dum biliosa, sanguinolentive fluxio
prævaluit. Quare omnia hæc, cum partis affe-
ctū, affectūq; ipsius dignotione, etiam fluxio-
nis indicant differenciam. Ex dictis igitur con-
stat, pernecessariū esse ad affectū, locūq; affectū
inventionē, tum vniuersūq; affectū partis sub-
stantiam, actionēq; tum eiusdem cum vicinis
consensum callere: necnon morborū & sympto-
matum geniturā, adeoq; morborū effectūtes
causas, prius investigasse. Porro in nuper propo-
sito exemplo, perniciosissimus succus est atra bi-
lis: omnī mīutissimas, sanguis. Medium in sim-
plicitate & malignitate reliqui duo obinērēt.
Ex symptomatibus autē, vt nihil omnino expur-
re, perniciosissimū & atrata screatus fa cūs, saluberrī-
mus, præcipue si concocta expuratur. Pulsuum
etiam symptomata morborū mores ostendunt:
sicvī & quæ lege conformi accidunt, vt deliria,
somnia quidam inexpugnabiles, fastidia, vrinæ,
desectioēq; alius. Ex quibus omnibus erit pe-
tenda ratio cum præfagienti, tum cōmodē vren
di remediis. Præfagia namq; & medicum ab om-
ni mortis culpa reddunt immunē, & ægros ad
obtemperandū faciles, occasionēq; remediō-
rum præmonstrant. At verō quod aptus reme-
diōrum vltus, id sit, quod in arte est præcipuum,
liquet. tam excrementorū species, multorū noti-
tiam dāfert, cūm & corpus secum cōnexum ha-
beat, & quo illa excerni videmus. Locus autē per
quem sit excretio, poterit certius nos ad affectū
partes perducere. Nam si per inferiorem aluum,
membraneum quid excernatur, vltus in indicabit
in intestinis. Si per superiorem vomatur, in ventri-
culo. Si per rufum excreetur, abrid tunicas alpe-
re arterie, indicium erit. Sicvī si mingatur, vel
vesicam, vel pudendū meati. Sed non parū præ-
terea ad rem faciet, ea quæ primario affectū, ab

is quæ per consensum laborant, distinguere. In
vniuersum autem maximē necessariū est ad cō-
modum remediōrū vltus, partis, quam curatu-
ri sumus, substantiam, figurāq; & positum, ac-
curate cognoscere. Substantia enim affectus pri-
mus, qui in intemperie consistit, quantū & na-
turali itatu aberrant, ostendit, quantūq; resfri-
gerate, calfacere, humectare, aut exicare ope-
tear. Figura verō, morbos qui ad ipsam spectāt,
eorūq; magnitudinē indicat: actionē quoq; si
sit opus ad naturalem habitum per contraria re-
ducere. Obstructiones autem ad hoc genis per-
tinentes, quāq; habent aliquā cōmunem cum
illis indicationibus, quæ de cōmuni a situ: de
quibus iam agam, vno proposito exemplo. Ob-
structio affectus est partium instrumentarū,
qui præcipue iecori solet negotium facessere.
Nam venæ quæ a portæ oriūtur, per vniuersam
huius viscens partem cauam disseminatæ, tan-
dem illas quæ in gibba sunt, per quædam oscu-
la sensum effugientia ap plicatæ. Vniuersum ve-
rō alimentū, quæ ventriculo in hunc vnum locū,
qui ob id ipsam, quod nuper diximus, portā ap-
pellatus est, suggeritur. Quemadmodū enim in
vrbes nihil inveni nisi per portas potest, ita fetti
nihil potest in iecur, nisi in hunc prius locum fe-
ratur: vnde in totam iecoris partem cauam de-
mittitur: inde verō, per eos quos diximus termi-
nos, in ipsam gibbā. Quare nihil mirum videri
tur, si viscus hoc, & ob vtriusq; angustiam, & ob
copiam petransiens substantia, assidue ob-
structionibus compariatur. Et igitur curatio adli-
benda est, prius quam obstructiones excrectis,
atq; accendatur febris, tū cibis, tum medicamē-
tis attenuantibus administrans. Nam si auctē il-
le fuerit, evacuatione erit opus, quæ per quem
locum molenda sit, mētiē figura & situs dicta-
bunt. Quippe si quid iecoris cauo adhaerescat, id
per intestina detrahemus. Quæ autem in gibbā
comprehenduntur, vrinari debentibus evacuabi-
mus. Eodem enī modo, quæ in pulmone & pe-
ctore delitescunt, per rufes sunt expurganda: si-
cuti deducenda ad nares, quæ in cerebro sunt.
Nec minus a membri figura & situ desumpta ra-
tio est, sanandi phlegmone detentas particulas.
Siquidem fluxiones quæ decubere in coxam,
femlis venis in poplite aut in talo, evacuantur et
eas pariter quæ in vtero cōprehensæ sunt. Quæ
in thorace aut pulmone, per cubiti interiorē vren-
nam. Sicvī eas quæ in capite & collo, per hume-
rales. Ea quæ vacuano facillimē & optime
fier, quæ per vicinas venas, & affines parti affe-
ctæ, sunt admonstrata. Porro & suam ex mor-
bo haberi indicationē, in halitū distillandum esse,
quod in inflammationē locum defluxit. Situs tamē
affectus partis, variū deinde insinuit particula-
rum auxiliōrū vltus. Etenim quæ cūq; in sum-
ma cute ortum habent, tale exposcunt diffuso-
rium remediū, quale ipsa indicat inflammatio-
nis species. At quæ in profundo, edegent medi-
camentis acrioribus, quod magis ab exterioribus
recellere: vt quandoq; cucurbitulis fit vtrūq;
si sedem plurimū profundam habeant, quod tamen
inflammationibus quæ in summa cute cō-
sistunt, quam ad vtriusq; est. Nec minus etiam
situs

Effluxio ratio.

Fluxio necesse
satis sequitur
basia.

Spontaneum colo-
re variegatū va-
riatatem hinc
pach. gignens
p. rufitatem
fiant.

Attra bilis per-
niciosissima
succus.

Screatus qui se
laborem.

Præfagium
vren.

Remediōrū vltus
suis aptus, est in
arte præcipuum.
Excrementorū
species.
Locus per quē
sit excretio.

Substantia parte
quid indicat.

Figura partis
quid indicat.

Obstructiones
effusæ
partium instru-
mentarum.

Porta vena cui
sit datus.

Lenis alitudo
obstructionis
comp.

Interiori partem
cauā gibbāq;
per quā res re-
pugnat purgan-
ti. Pulmone prius
ruffi, excremita
expurganda
per vrenam.

Vena secunda
retrahit fluxio-
nem quæ de-
cumbit ad co-
xam, vrenam,
dolorum, caput
morum, caput
crallum.
Vacuatio o-
mnimoda
quæ.
Sunt variæ
autem variæ
particularum v-
renarum.
Cute summa
efficitur, qua-
li remedia po-
tissimum.
Profundum
partū affectus
quæda vren-
dia potissimum.
Cucurbitulis
vrenis in effu-
sionibus suis.

fitus loci æstimandus est, quidlo astringente medicamento opus fuerit. Quia si medicamentum ipsum astringens potest eo pervenire, nil vetat quo minus ipsum administremus. Sin minus, caucendum tunc, ne humorem ex vicinis partibus in affectum locum pellamus. Quare vel aliquid admiscendum astringenti medicamento est, quod eo virtutem illius perducatur: vel ab illius visu in totum fuerit superfluum. Ac delus quidem iam dicta sufficiunt. Deinceps nonnulli de præfagio dicendum, cuius artem qui constituere voluerit, is necesse habet prius examinasse, an scilicet

Astringentium visu quidlo vitiosum.

Animæ et moribus propriam vitam spiritum constitutum esse à natura.

Errores circa ægrum admissi prædicant morbum, vel etiam mortem adesse. Præfagia quoque de vitæ et mortis. Medicum scire natura et morbum.

Robor naturæ magni vel parvi visus alio nobis, ac maxime ex pulsi. Morbus magnitudinem corporis ex ratione symptomatum. Cancro quid indicet. Cerebrum quid indicet. Ductus, Vena, Salivæ. Morbum nonquam solari, nisi convulsionum signa in convulsionibus præfereant. Cancro quid indicet. Cerebrum quid indicet.

ne conservare, doceamus. Ergo ex symptomatibus, quæ medium inter ea quæ sanis insunt, & ea quæ eveniunt ægris, serviant, deprehenduntur ipsa in morbos proclivitas. Affectiones verò quæ rationem proclivitatæ gignunt, per contraria sunt corrigendæ: si nam hæc res summam tractanda est: nam si transigenda particulatim, omne exuberans est vacuandum: sic ut prius sit distinguenda exuberandi ratio, quantatène aut qualitate, aut utraque enam ratione exberet. Ac deinde, quod potest iterum ad naturalem statum redire, sic per contraria alteretur, ut quod crassum lenitiusque est, tenue fiat: quod tenue, crassius reddatur: ambo vero pariter concoquantur: obstructions præterea aperiantur: quæ toto genere existunt præter naturam, quemadmodum venena animalia, cum alterentur, cum evacuentur. Alteratio autem per contraria fiat, quæ vel tota subflantia adversantur, vel altera, vel utraq; qualitate. At evacuatio, per ea quæ trahendi vim habet.

Proclivitas in morbo vult deprehendi.

Exuberans omne vacuandum esse.

Tenuis succus esse incrementum, ut contraquantur: crassus autem remanens. Venena altera da contrarianda esse.

Alterationem per contraria molientes. Vacuatio fiat per trahentia. Solitudo vna convulsionum vacuatio plethoræ.

Purgatio quibus debetur humorem, qualisque.

Pituita dulcis est emulsa facilius.

Cancrosum quæ conducti.

Obstructiones aperientia.

Analeptica.

Exercitationes visu.

Sanitatem vitæ.

Cæterum hæc omnia quibus sint peragenda remediis, ab ipsis morbis petendū est. Quin si omnes pariter morbus accreverint, præcipua ipsorum vacuatio est perfectam venam. Deinde verò perunctiones, per exercitia, per balnea, per mediam. Nec alia etiam erit vacuandi ratio, cum solus sanguis excelsit. Vbi autē fluxus vel atque bilis succus, vel serosus humor continetur in primis venis, purgandi tales humores sunt iis, quod alium commoveant. Si in aliis tenuia & aquosa excrementa fuerint, per vinis: si biliosiora, per purgatoria. Possunt tamen & tenuia etiam alui deiectione purgari. Sed quæ totum corporis habitum occupaverint, cum tenuia fuerint, aut sudore, aut medicamentis, quæ cum appbica, vim excitandi habent: cum verò biliosa, primum quidem purgatione egent, mox evacuatione per curam. At cum pituitosus succus exuberarit, si salivæ sit, est purgandum. Si acidus, expurandum aut potissimum cum alterare: & longe etiam magis si dulcis fuerit, erit enim is concoctio facilius. Porro ad concoctionem conductus quæ, calidatio modica, cibi parvus usus, boni tamen succi, potius vini parvi caliditatis, moderata frictio, medicamentis moderatè caliditatis. Obstructiones referant quæcumque vel esculentia, vel medicamenta attenuantia. In quibus autem nulla causa, nulliusque affectus præter naturam est, sed cum gratitudine, sola imbecillitas vinum, quæ facile in naturalem habitum reducentur, si moderatis cibis & motionibus reficiantur. At materias quibus hi alendi in statuandique sint, in opere de sanitate futura exhibemus. Ne tamen deesse aliquod lucis sermoni videatur, non modò ipsius an lepreus, sed vniuersi etiam salubris negotii methodus, hoc quoque loco repetenda est. Si solum hoc eveniret corpori, ut in halitus diffunderetur, & subinde inaniretur, cibis potius defectu illum farcire posset. Quia vero humorum copia, prælonga excrementa gignunt, egemus exercitationibus: quarum nimis est munus, superfluum succum vacare, excrementa vero concoquere et expurgare: si tamē causæ omnes vitentur, à quibus solet vitæ sanitas, refrigeratio inquam, æstus,

lascitudo, cruditas, remulencia, ira, furor, & confimilia. Ergo vt vniuersam medicam rationem per capita referamus, medicina est & numero factuarum artium, quae res viciatas rescitant. Ea autem sibi exemplar nullum confingit, sed cooptentur quidem omnia ex corporis affectione deinde, si quid vici sit, corrigere id conatur. Sed hoc differt ab aliis artibus, quod maxima ex parte se operanti naturae ministram praestet.

GALENI PERGAMENI

de partibus artium medica lib.



On ableg ratione & mihi quidem, Iuste clarissime, de partibus artis medicae dubitare videtur: quippe cum aliis alio modo eas partem animadvertis & quidem maxime Romae, ubi arte ipsam medicam, in membra innumera refecit: ita vt alios oculos medicos vocent, alios auriculares, & eos etiam qui aui cunctis medentur, peculiari suo nomine appellent, totum in summa medicos faciant, quos sunt corporis humani particulae. Quamquam certe mirum non est, si ars ea, quae omnis maxima sit, tot in se admittat sectiones: atque etiam, si in maxima ciuitate, pro vnaquaque harum partium aliquis reperitur, qui inde dicatur medicus. Neque enim in oppido quodam exiguo posset quis victum sibi parare, qui tantum suffusiones pungeret colorum, aut hernias incideret. Roma vero & Alexandria, praeter mortalia in eis molitudine, possunt quencumque alere, qui vel vnicam tantum ex artibus his profiteantur. Vnde huiusmodi medici vrbes Graeciae saepe mutare conantur, vt idem tota Graecia illis afferat, quod alius qui in Italia sunt, sola Roma. Igitur vt sermonem, quatenus ego semino, institui: quemadmodum in corporis humani sectionibus, particulas omnes ad minimam vsque scrutamur secundum speciem, quae elementa etiam sensibilia appellantur: sic artium minimas oportet etiam inuestigare particulas, quae & ipsae sunt earum sensibilia clementia. Etenim instrumentum quoddam est caput (exempli gratia) cuius partes, praeter alias, sunt aures & nasus. Harum quaelibet in alias diuiditur, vixita in carnem, nervum, venam, arteriam. Arteria duplici tunica constat: quarum altera obliquas habet fibras, altera rectas. Quas fibras non amplius in aliam quam ampliam speciem partiri possumus, vtpote minimas & indiuiduas specie. Ex eis autem vni quodque instrumentorum contextum est. Pro istius itaque exempli similitudine, punctioriam suffusionem artem, talem vniuersae artis medicae partem existimabimus, qualis ea est corporis pars, quam instrumentum huius organum appellamus. Cuius vnaquaque particula, proportionem respondet sensibilibus corporis elementis. Huiusmodi artis partes sunt, theorematia, siue notiones. Quarum prima est cognitio illius instrumenti, quod est pungeudum. Secunda, illius particulae huius instrumenti, ubi pangere oportet. Tertia est mensura, pro affectu ratione. Quarta conuersionem respicit. Quinta remotione suffusionis & loco quod occupabat. Sexta circa restrictionem versatur. Atque haec sunt notiones vltimae & minimae, quae

in alias simpliciores hand quidem secari possunt. Vniuersa tamen ratio curandi suffusiones, aliis quibusdam notis eget, & illis quidem duplicibus secundum genus. Sunt autem haec, prima quidem preparatoria. Secunda vero illa, quam apotheraeuti Graeci vocant. Siquidem si quis velut aliquem numis replet, ut praeuis plenum liminibus, vel etiam dolentem secundum caput, ad huiusmodi operacionem deducere, in inflammacionibus in membranis quae punctae fuerint, facile excitabit, & male vniuersum caput afficiet. Quod ne fiat, arte preparatoria erit & pos: cuius institutum est, totum corpus ab excrescentiis, succisq; exundantibus vacuū, atque etiam caput ab omni dolore immune reddere. Nec vero eodem modo se habet notitia inflammacionis curanda, quo illam se habere diximus, quae succis & exundantibus suffusionibus. Quatenus alia est ars curandae inflammacionis secundum genus:

alia eius, quae ex certa particula desinitur: vt ophthalmice, quae inflammacione externae oculorum tunicae existit aut peripneumoniae, quae pulmonis: aut pleuritidis, quae membranae costae ambiens. Porro si secundum corporis affectiones velit quis ipsam artem partiri, primae maxime eius partes erunt, curatrix, salubris, prophylactica, analeptica, senum custodiendorum ratio, edicatrix infirmis, necnon optimi habitus conchiatrix. Est tamen & alia partio, quae & ratione

operacionum, & earum differentiarum depromi potest: quemadmodum chirurgicam, pharmaaceuticam, & dieteticam, esse primas atque praecipuas artis medicae partes pronuntiat. Quae partio quibusdam penes materierum differentias fieri videtur. Nam cum omnis particula corporis iungi & separari possit, aut victus ratione, aut medicamentis, aut manuum opera, inde tres illas medice partes distinctisse videntur. Dicamus itaque primas, & aprias, & quae maxime est artis medicae partes eas, per quas ipsius artis finis consequitur: alias autem esse his superiores. Ac tot quidem secundum numerum primum proximique sunt, quot sunt maxime propriae rationes medendi. Licebit porro medicam ipsam artem in suas partes diuidere duplici modo: vno quidem, si summam in irum ab ipsius artis prima & maxime propria materia, vt constat per multumebrem illam diuisionem, quam assignauimus. Al

tero vero, si secunda materia, nec ita propria, hoc est, & corpore humano (quod quidem per accidens, eatenusque artis medicinalis, necnon philosophiae materia existit, quatenus sanitate & morbum recipit, generationisq; & interitum sub) initio diuisionis exordio. Ceterum non modo partio quae ex huiusmodi materier sectione elicitur, ad vltimas vsque deducitur, & elementares ipsius artis particulas, verum & illa etiam, quae & praecipua totius artis materia oriebatur. Praeterea autem & alio modo fieri haec artis partio potest, si vnum quodque morborum propositum genus, per proximas differentias ad vltimas vsque particulas animus sit diuidere: quae partio si recte fiat, consequenter etiam perueniet ad elementares vsque notitias. Nihil igitur est, cur ex multiplicitate partionum turberis. Quin potius tecum perpende, an nihil sit praeter

Suffusiones curanda, quae notitiae sunt necessariae. Notitia preparatoria. Notitia apotheraeuti.

Partio debet notitiam ex se habere, ante rationem humorum peruenit.

Ophthalmica quid. Peripneumonia quid. Pleuritidis quid. Notitia partium in secunda parte afflictae.

Medicina partium secundae operationis distincta.

Partes separari vult ratione, medicamentis, aut manuum opera.

Indicant partes maxime propriae sunt, per quas artem finem suum attingit.

Medicina partium duplici.

Corpus humanum re accedit in duos subiectos medicinae philosophiae.

Medicina est numero factuarum artium, quae res viciatas rescitant.

Medicina acculatoria naturae.

Romani esse medicos multiplices.

Medicina omnis artium maxima.

Roma Alexandriaque populosissimas ubi possit quare medicina alere, qui vel vnicam tantum curare possit. Graeciam vniuersam vix posuisse praestare medico, quod sola Roma.

Artem consistere duplicem.

Paulioria ars.

Theorematia.

*Medicina dicitur
fieri ex elementis
quod est a me-
dicis: proprie
ipsum actu ma-
teria.*

prætermisum, ex iis quæ occurrere possunt. Optimum tamen iudicio meo fuerit, si initium à maxime propria sumperimus ipsius artis materia: cui mox ex prædicta methodo addiderimus cætera.

GALENI PERGAMENI de elementis lib. I.

*Elementum est
minima res,
quam efficiunt
partes.
Sensum non ip-
se iudicat pro-
prio elementum.*



Vando quidem elementum est minima res, quam constituit, portio: nec id ipsum quod videtur, est etiam reverbera minimis: manifeste sane liquet, sensum minime coram fore iudicem, quæ vera, & ex ipsa natura sunt res vniuersusque elementa. Idcirco nos cum Hippocrate, neglectis iis quæ prima, sensus iudicio, simplicissimæ habentur, illa statim quæ verè sunt nature humane elementa, quæ in alia dissoluti non possunt, nec minus curandos morbis ex vñ sunt, quam hæc, quæ sensui talia videntur, summo studio inquiramus: nempe an vnum tantum specie, an plura potius & dissimilia sint. Quod si non tantum vñ, sed plura sint atque vana elementa, quærendum rursus, quorū numerum sint illa: sciri & quæ, & qualia, quæque inter se eandem cõmunionem sortiantur. Quod igitur primum id elementum, ex quo tum nostrum, tum aliorum omnium corpora constant, nec forma, nec potestate sit vnum, hæc docet ratio Hippocrates. Si homo esset vñ, neutquam doleret. Quod si doleret, vñcum ne cessant medicamentum desideraret. recte quidem ille & breuissimè totam res summam demonstrat. Nam si homo esset vñ, hoc est, vñco elementum constans, nõ esset ex quo dolorem posset accipere. Quod si aliquo dolore corperetur, vñca tantum esset merendi ratio. Nam cum à nulla causa externa perperam posset, necessarium à sua ipsius natura, interne pati deberet. Cum autem vñca tantum fuerit vniuersusque natura, vñcum erit affectus, ratione redeundum ad naturalem statum vñca: id quod absurdum est, cum insinuat se fieri, vt morborum, sic prædictorum species. Eadem quoque ratione licet eorum sententias conuelleret, qui atomos, omnis profusius qualitatibus atque alterationibus expertes, necnon incompactula corpuscula introduxerunt, vñuerit generationis primordia. Quippe nec homo doleret, si tales esset natura illius. Si quid necesse est, vt id quod dolet, cum sensus, tum etiam alterationis sit capax. Quod si ab omni penitus sit alteratione alienum, eundem omnino statum, quem ab initio sortitus est, perpetuo seruabit. Lam verò, si transmutetur quidem, sed nulla illi sit innata sentiendi vis, nihil propterea magis affectiones ipsæ sentire poterit, quam ipsi lapides sentiunt. Cum igitur vñque horum atomus in alternis illis corpusculisque desideretur, certè si ex eis, aut alia quæpiam simili atque vñformi natura concret eilemus, non vñque doleamus: dolemus autem, nequaquam igitur sumus ex vñca simplici vñformis substantia conditi. Porro cum duo sunt instrumenta, quibus omnia inveniuntur dogmata, ratio videlicet atque experientia, neutrum horum vñque ita illis inserviet, vt aliquod sint respectu cõcretum ex iis,

quæ pariter incompatibilia, & sine sensu sint: quod ipsum deinde patibile sit, atque sensus particeps. Imò verò quantumlibet illæ omnes atomi insinuat habere sensum, essent tamen incompatibilia impenetrabilisque, ita vt ex solo mutuo earum complexu, ipsa caro generaretur, nihilo magis impactata acui periclitemur, quam cum acul ipsa digito iunctos disungimus. Reliqui igitur erit, vt sentiens corpus vel ex iis sit, quæ pariter vim habeant sentiendi & patiendi: vel ex iis, quæ pati quidem possunt, sed nullum deinde sensum habeant. Nos autem mox perperam, vtrum horum sit verum. Si igitur elementum non potest esse impenetrabile, nõ erit etiam specie vñ. Si quidem quod est vñum, semper est incompatibile: cum nihil reliquum sit, in quo transmutari, aut à quo pati queat. Quicquid enim transmutatur, in alterum transmutatur: & quod patitur, ab altero patitur. Quare plura esse elementa, iam compertum cum sit, eorum numerum inquiramus. Prius tamen sectas omnes eorum, qui in vñuersum de elementis disserunt, distinguamus. Rediguntur enim in quatuor, quarum prima est, quæ ex sensu vacuis, pariter & incompatibilibus: altera, quæ ex sensu quidem præditis, ceterum incompatibilibus, consistere quæ sunt alterationi obnoxia, pronunciat. Quæ ambe in hoc cõveniunt, quod ex incompatibilibus statuunt. Quare cum impossibilia tradant, eas misis faciamus.

*Elementum autem
posse esse impenetrabile.*

*Transmutatio
fieri non potest
ex elementis
ab altero
vel ex vñque
de elementis
disserunt, esse quæ
sunt.*

*Elementum
corpus non esse
vñum.*

*Atomus habet
posse quidem
se elementa
corpora.*

*Dolentium,
necesse est
efficitur sensus,
tum alteratio-
nem capax.*

*Instrumenta
quibus omnia
inveniuntur
dogmata, esse
duo, rationem
& experientiam.*

Super sunt itaque duæ: altera, quæ corpus sentiens, ex primis elementis facultatem cum patiendi, tum sentiendi habentibus, constituit: altera, quæ ex patibilibus, sed sensu expertibus. Inter quas item ea est cõmunitio, quod ambe ex patibilibus aiant. Quarum sectarum vtrique possibile quid profiteretur. Nam si ipsas particulas explorare, rationeque examinare volens, ea quæ corporum sunt vñque sentiendi habentium, omnes & patibiles sunt, & facultate sentiendi præditæ. Quod si prima respectus elementa, facile fieri poterit, vt quævis ea nullum habere sensum dicatur, modo possint in se muris, multifariamque & agere & pati, aliquid inde, multis intercedentibus, particularibus alterationibus, sensu præditum corpus gignatur. Quotiescunque enim ex pluribus quicquam componitur, si ea quæ in compositionem veniunt, qualia sunt, talia ad extremum durauerint, nunquam profectus ad nouam aliquam, aduentitiamve adipiscetur formam, quæ in eis non præfuerit, ex quibus constituebatur. At si ea multifariam varientur, transmutentur, & cõmiserantur, poterit tunc in composito aliquid suboriri, quod ab iis quæ prius in primis illis elementis repperiebatur, sit generis alterius. Quare qui ex igne, aqua, aere & terra, inuicem transmutatis atque alteratis, & ad temperamenti quoddam reductis, gigni corpus volunt sentiente facilitate præditum, hi cõsentrane pronunciant. Qui verò ex illis ita vt sunt permanentibus, & permixtis tantummodo, perinde vt tritum hordeis, & fabæ sunt in acervo, h. nimirum ea quæ fieri nequeunt, sectantur. His igitur, & quod vno plura omnino sint elementa, & quod pati etiam possint, monstratur esse: id quod confirmans Hippocrates, ait: Qui, obsecro, fieri po-

*Elementum autem
posse esse impenetrabile.*

*De elementis
omnino cõsuetudo
non rationis.*

test, vt ex vno quicquam constituitur, cum ne ex pluribus quidem possit, nisi ea probe fuerint contempta: An vero ex us primis elementis, quibus omnibus vis inest sciendi, cōstent sensibilia corpora: an ex illis ponas quæ illa careant, nondum monstratur est. Porro nonnulla quidem omni carere sensu inde percipiu est, quod ex compositis etiam quedam huiusmodi sint. Fatua itaq; est lex: tam naturalium philosophorum, quam medicorum opinio, qui vnum vel hominis, vel etiam ipsius vniuersi elementum asserunt. Thales etenim, Anaximenes, Anaximander, cum illisq; etiam Heracitus, ex elementorū transmutatione mutua, quod singula in vicina alia cernant degenerare, vniquodq; ex illis esse elementum vniuersale, prorsus demonstrare conantur, sic tamen vt aliud aliud statuatur. Qui sane illi videntur omnes cōmunem illam formam esse materiam primam, omnibus elementis subiectam, quam vt vnicam videntur, sic etiam vnicam esse elementum putarunt. Ceterum qui vniuersa pronuntiant vnum, tam ipsius naturalis philosophorum, quam Medicinæ principia destruiunt, ob idq; contra eos disputandum nō est. Id autem ab omni ratione est alienū, si propter ea quod nullum ex elementis quatuor, solum syncerūq; in corpore cernitur, velut quis iudicari, ea omnia simul in eo reperiri. Nam cur vis tu in animalium corporibus repente teratam (exempli gratia) impermixtam & puram, quā nec in vniuerso quidem eiusmodi a te ostendi queat? Quamcūq; enim particulam eius acceperis, ea statim erit alicuius caloris humorisq; & aëreæ substantiæ percipies: cum tamen ea terra, quam opinamur esse elementum, sit maximè densa, grauissq;, ac preterea frigida & sicca. Quod si tu in mundo mali ostenderes lapidem, terræ sane corpus: ego tibi aliquid illi simile in animalium corporibus, ossum nempe, castilaginū, pilorum, testarūq; genus ostendam. Ne igitur amplius imperitium quicquam exquiras in animalium corporibus, quando quidem nec in ipso orbe id reperies, adulterio carere. Sed quoniescūq; aliquam videntem particulam frigidam, siccamq; & densam, ea satis sit, ad reuocandam tibi in memoriam terram. Satis etiam sit humidum aliquid conspexisse, rarissimq; & fluens, ad concipiendam mentem aquam. Calor quoq; animantis, ignis tibi representet memoriam: nec non naturā spiritus, citra quem animal consistere nequaquam potest, aënis in primis, ac mox ignis, tibi memoriam reficiet. Nec vero inficiari poteris, vniuersos fructus ex terra gigni & ex aqua, cum inde suum habere ortum videantur. Quod autem aënis ignisq; per tota simul temperatū etiam participes sint, illuc plane licet cognoscere, quod si aqua maceraueris terram, nihil præter lutum efficies: fructus autē lutum non sunt. Si igitur fructus omnes ex elementis vniuersitatis suam ducunt originem, nō est quod de ipsis animalibus dubites, cum numerū & ab illis lauratur. Audenter itaq; profitemur est, terram, aquam, aërem & ignem, prima esse, cōmuniq; & simplicissima rerum omnium elementa, & primordia: ex quibus vniq; tum

stirpes, tum animalia omnia gignuntur, aluntur, atq; augmentum suscipiunt. In ipsis enim solæ summæ qualitates reperiuntur, absque ulla mixtura aut temperie. In igne nempe, summam caliditatem & siccitatem. In terra, summam frigiditatem & siccitatem. In reliquis, reliquas qualitates, prout sui cuiusq; naturæ postulat. Affirmare autem esse aliquid elementū summe humidum, simileq; arbitrarī illud esse quippiam ab aqua diuerium, extreme cuiusdam in eptia est. Porro quod summus calor igne simplicior sit, quodq; illo accedente ad materiam, ignis gignatur, pro confesso ab omnibus habetur philosophis: qui quidem in vniuersum fatentur, materiam quandam prorsus qualitatem experire (quæ omnibus elementis subicitur) atq; etiam calorem summum, qui in ea productur, igni existerē suæ generationis principium. Quoniam materiam ipsam esse ab omni penitus generatione & interitu immūnem: qualitatem autem id esse, quod in illa tum gignatur, tum pereat. At elementum edā a principio differt, quod minimè sit necesse principia in eodem esse genere, cum his quorum sunt principia: elementa verō, sō idem semper generis pertineant. Simplex namq; qualitas compositæ, & simplex corpus, corporis compositi elementum existit. Cum igitur calidum, frigidum, humidum atq; siccum, dicantur tripliciter: nempe vel sicut qualitas, vel sicut impermixtum corpus, vel sicut illud quod mistum est: nec ipsa deinde qualitas esse elementū videatur, nec enī mistum, temperatūq; corpus: reliquum est, vt elementum id esse corpus dicamus, quod est omnium temperamenti atq; mixturæ expertū, necquod qualitatibus simplex. Quare ad ipsum ignē, aërem, aquam & terram, tandem ac necessario devenimus: in quibus primis summus est calor, summum frigus, summus humor, & summa siccitas. Quibus etiam elementis vniuersalibus, vel syncens, per se vtuntur: quemadmodum aqua quotidie, cum bibimus, aut lauamur: et aëre, qui nos vndiq; ambit, dum illum inspirandum attrahimus. Igne enim, dum frigemus, vt caleamus vtuntur. Animalia præterea quæ vel arena, vel terra, vel lapidibus, vel etiam luto, osibusq; ve sciuntur, terram manifeste introducunt in corpus. Quare nō video equidem, cur dicant nonnulla, nec ignem, nec aërem, nec aquam, nec terram, vel detrahe ex corpore nostro, vel illi enī apponi: ac prorsus ea minime nostris corporis elementa existere. Quod si qui ob id non putent viliū nos corpori elementum offerre, quod nemo eatenus caliat, donec vtatur: vel bi bar, quoad disumpatur. nō intelligunt, si vel vnum elementū omnino intereat, statim etiam interitū animalis. Interibit autem frigidum elementum, si comburatur: calidum, si nimis refrigeretur: humidum, si arescat impenso: siccum deniq; si plus quam par sit, humectetur. Vnde aliter se habet res, quam illi sentiunt. Semper enim aut eximitur elementū aliquid, aut apponitur corpori: id quod moderate fieri debet ab us, qui seruare incolume animal ipsum conantur. Si quidem immoderate elementorū vñs, ad interitū ducit. Ergo cum nulla qualitas reperiri scōrum

Elementa solæ summæ qualitates inest.

Aquā esse summe humidam.

Calore summo accedente ad materiam, compositū ignem.

Materiam ingenerabilem, nec reprobabilem. Qualitatem quæ in materia præterit. Elementū, et prout opus distinetur.

Calidum, frigidum, humidum et siccum tripliciter dicitur.

Elementū quod esse corpus dicitur.

Elementa vniuersalibus nec ipsos per se vtuntur.

Animal interitum, si vel vnum ex elementis intereat.

Elementum semper aut eximitur, aut apponitur corpori nostro. Elementum in usum immoderate, ad interitū ducit.

Materiam primam vnicam quatuor elementis subiectam esse.

Elementum prout nullo reperiri possit.

Terra elementum cuiusmodi esse debeat.

Elementum singula esse quod simile in animalium corporibus.

Fructus vniuersos ex terra gigni et ex aqua.

Elementa prima esse terrā, aquam, aërem et ignem.

Qualitas nulla
esse absque sub-
stantia patet.

si substantias queat, cogimur eas una cum sub-
stantiis assumere, atque ita corporibus, quæ illis
egent, offerre. Quæ si illas summas exposcant,
ipsum elementum adprimamus: ignem ita
quam, aut aquam, aut terram, aut ætherem. Vbi ve-
rò medicorum opus est qualitate, misce ex elemen-
tis medicamentum, atque interdum nutrimento uti-
mur. Neque sane quæquam ex medicina elemen-
tum ex vii est, nisi dum corpus summa qualita-
te indiget. Quod autem Hippocrates nomine qua-
litas, corpus summa prædixit qualitate sæpe-
numero intelligat, ex dictione illius licet nobis
colligere. Si quidem ubi ait, cum interit homo,
necesse est vnumquodque ad propriam natu-
ram reverti, siccum ad siccum, humidum ad hu-
midum, calidum ad calidum, frigidum denique
ad frigidum: non solas profecto qualitates, sic-
cum, humidum, calidum, & frigidum vocat, sed
substantias illas, in quibus qualitates ex repe-
tiuntur. Ipse enim fuit, quæ animalia vita
abest, quæque elementa vniuersitatis misce-
scentur. Qualitates autem dixerimus animante
mortuo interire: ad propriam verò eas iaturam
reverti, non item. Quare non est quod quisquam
amplius perscrutari conetur, illum ex qualitati-
bus, quæ ne foris quidem à corporibus con-
sistere possunt, animalia gigni arbitrari: sed ex
corporibus, quibus summa illæ qualitates in-
sunt. Ea quippe sunt cùmuna elementa omnium.
Quæ verò calidum, frigidum, humidum, atque
siccum, ob aliquam ex elementis horum, dicun-
tur, propria sunt vnicuique. Homo igitur constat
ex simplicissimis sensibilibusque elementis, quæ
similiana vocantur. Ipsa autem ex quatuor hu-
moribus. Qui rursus ab elementis & potentibus
sua ducunt originem. At hæc, ex ære, igni, a-
qua, & terra gignantur. Quæ sanè ex nullo am-
plius corpore constituta sunt, sed ex materia &
qualitatibus tantum: quas ipsorum esse princi-
pia concedimus, elementa autem nequaquam:
tamen elementa, ab ipsis qualitatibus habeant,
quod elementa sunt. Si quidem si summus calor
materiam accedat, iam id totum elementum ignis
evadet: similiterque ex cæteris qualitatibus tri-
bus, dicendum. Ex nulla autem qualitate alia,
præterquam ex his quatuor, iudicari esse ele-
mentum. At verò de propriis animalium elemen-
tis, hoc est, de ipsis humoribus, in sequenti com-
mentario tractandum est. Ex eis enim partes si-
miles gignantur. His rursus simul cōcūtiun-
tur, primum id, ad simplicissimum instrumentum
absoluitur, quod vniuersi functionis grana à
natura produciuntur. Mox autem, quum hæc
item vni componuntur, aliud natiui instrumenti
tum perficitur: ac dein, vniuersi integritas cor-
poris. Ergo, ut rotam repetamus disputatōnem,
si nos dolemus, neque specie vna erit, nec impa-
ribilis nostra substantia. At qui dolemus, non igitur
erit specie vna, neque imparibilis. Rursus, si pa-
tiamur, oportet vi calidita, vel frigida, vel hu-
medata, vel resiccata patiatur: qui nulla alia
qualitate possunt quæ proxima sunt, alterari to-
ta per tota. Quocirca manifestum est, calidita-
tem ipsam, frigiditatem, humiditatem & siccita-
tem, substantiam cuiusque rei constituere. Quo pa-

cto autem ea quæ miscentur, tota per tota mi-
scentur, solum ne qualitatibus (ut Aristoteles sen-
sit) an potius ipsi enim substantias in sese pen-
etrantibus mixtus, non est opus medicum expo-
rasset. Hoc tamen dixisse imperitiarum libi fuit
na, quod si vinum (exempli gratia) quæ misce-
tur, particule vtriusque horum infringuntur in
minima: mixtus inter se mixtus agunt, atque pa-
tiantur: eorum facilius sibi invicem qualitates co-
municant, quod in minutiora redacta, diutiusque
commota, & cōmixta fuerint. Tempore namque
est opus, ut eorum quæ cōmiscuntur mixtus, par-
ticule inter se invicem exacte agant, exacteque
etiam patiantur, ac ita totum id vnum & sibi vni-
dique & penitus simile evadat.

GAL. DE PERGAMENTI de elementis lib. II.

Citur ut calidum, frigidum, humidum atque
siccum, omnium rerum communia sunt ele-
menta: sic nimirum sanguis, pituita, ac bilis
tum atra, tum flava, omnium animalium sangui-
ne prædixit propria elementa existant. Cæ-
terum hominum propriæ sunt similes particu-
lar: quamvis & hæc nonnullis sanguine prædixit
etiam communes addunt, ut boui, canis, & e-
quæ: non tamè vsque adeo humanis similes. At
verò quod omnes sanguineorum animalium par-
tes, ex materno gignuntur sanguine, satis omni-
bus constat: qui cum sit non modo pituitæ, sed
vtriusque etiam bilis particeps, demonstratum
est, quæ ratione adductus Hippocrates, ipsos
quatuor humores materiam esse generando ho-
mini tradidit. Caro porro & nervus particule si-
miles existit. Cùm autem caro sanguinea sit,
præterea mollis & calida: at nervus exanguis,
durus & frigidus: similiterque alix particule a-
lias differentias sortiantur: rationi consentaneum
videtur, ipsam sagacem naturam, quo tempore
ex sanguine menstruo efformabatur factum, quod
crassius in eo erat, ad solidiora: quod tenuius,
ad molliora: sicvis quod calidius, ad calidiora:
& quod frigidius, ad frigidiora corpora consti-
tuenda, attraxisse. Subsequentem autem tempore v-
namqueque ex concretis particulis, sibi habuisse
alimentum incrementumque, ex propria & peculia-
ri materia. Nam quemadmodum in lacte reperi-
tur & serum, & quædam caseosa substantia: sic in
sanguine reperire licet quendam tenuem exquo
ferro lactis perisimilem, nec non veluti limam
quemdam, ac præterea ipsas fibras, quibus à san-
guine exempta, ut non à ipsis ipse sanguis con-
creverit, licet à colore variabitur. Vnde sanguis
mixtus simplex erit. Alioquin in omnibus qui in
animalibus, tum hominibus esset perpetuo si-
milis. Contrariū autem licet experientia cogno-
scere, cū ex variate colorum, tum vel maxi-
mè ex his quæ vacuantur ope medicamentorum
purgantium. Quæ quidem si propinquant, ut de-
cer, pro differentia morborum, differentes ac pe-
culiarias sibi succos eliciunt: contra quum Ascle-
piades perscrutare conatur, nempe medicamen-
ta ipsa haud quidem familiares sibi succos attrahere,
sed transmutare illos contrariumque, ac in sui
naturam, qualescunque fuerint illi, convertere.

Substantias ele-
mentorum, &
animalia vita
functio, reverts
ad propria ele-
menta.

Qualitates ele-
mentorum inter-
eunt, animalia
intererant.

Elementa scien-
dum substantias
miseri.

Homini consti-
tans.

Elementa ex
materia et qua-
litate consti-
tuta sunt.

Elementa ex
qualitatibus
habere quod o-
limenta sunt.

Elementa ani-
malium propria,
quatuor humo-
res.

Similares par-
tes.

Instrumentum
primum vni
functionis gra-
tia est produ-
ctum.

Instrumentum
maius.

Substantia co-
muni per a qua-
litate pri-
mum constituitur.

Mixtus corpo-
rum exactissi-
ma, plurimum
tendens com-
munionem,
et in ipso con-
gressu motum.

Elementa com-
munia.

Elementa pro-
pria.

Similares par-
ticule homini
sue proprie.

Menstruo ex
sanguine gigni-
tur omnes sangui-
nis partes.

Homini qua-
tuor sunt mate-
ria humane ge-
nerationis.

Solidiora per-
tenent ex solidioribus
menstruo parti-
bus constituta
sunt.

Alimentum, incrementumque
materiam.

Sanguinis par-
tes diversæ.

Sanguinem ad
concreverit, si
aliquid a terra
haurit.

Sanguis non est
simplex.

Asclepiades opo-
no resistit
circa medica-
menta purgan-
tia.

Purgatio medicamentis humorum propriis tribuitur, et quoniam ordinem.

Quæ sanè ut sunt absurdissimæ, sic ea quæ per immodicas purgationes indices fieri videmus, ostendunt evidentissimè, quemadmodum proprium humorem quodlibet pharmacum attrahat. Siquidem quoniamque aliquis medicamentum hauserit, quod vim habet balem supra modum vacuandi, primò quidem, vomitu talem humorem eiecit, mox prius, postmodum bilem atram, postremo sanguinem purum, quo evacuato agunt animam. Quòd si medicamentum purissimum solvens propius, illa in primis vacabitur: dein flava bilis, quod educta sit facili: postquam atra, ad motum rebellis & contumax: ultimo autem omnium semper educitur sanguis, quod naturæ is admodum affinis existat. Vbi igitur primus ille humor prorsus vacuatus est, non potest iam esse incolume animal, cum vnum ex suis elementis amiserit: sed dissolutur prorsus, & perit. Mox autem ex reliquis profuit humoris, qui aprior est ut vacetur. Quippe naturalis quædam vis rei vnicuique inest, ea quæ conveniunt sibi, trahendi. Sicut in magnete vis est attrahendi ferrum. Atque per hanc facultatem tum nutritionis, tum vacationes fiât: ipsa quidem semper id quod expeditur est, attrahente, nonnunquam tam cum hoc, aliud eius quod non est congruum: ut in purgantibus medicinis vsu aliquando venit. Quæ quidem, ubi universum id bilis, aut prius, quod in corpore stuit, attraxerint, peculiarem solidarum partium humorem, ut & labore arripiunt, eas quasi dissolventes & colligantes, deducunt & ad elementa, atque animal ipsum internecioni tradentes. Violentior vero illius attractionis, alius quispian humor consequitur illi affinis, qui primum ut attraheretur.

Sanguinem vitæ omni vicio coart, quod si affluat natura.

Attrahit famulatio rem esse singulis. Magna trahit ferrum.

Purgatio immodica.

Confusio animalis ex dispari elementorum miscella.



Onitare animalium corpora ex calidi, frigidi, siccis, humidisq; mixtura, necq; esse horum omnium parem in temperatura portionem, demonstrant antiqui abvnde est, tum philo sophorum, tum medicorum præcipuis. Cum autem ex calidi, frigidi, humidis & siccis temperie constari corpora dicunt, deus quæ summo gradu sic se habeat, ipsis scilicet elementis, intelligendum aiant. Cum verò animal, suspensæ, calidam, frigidam, humidam, aut siccam esse, non item. Neque enim vllum animal aut calidum in summo esse posse, ut est ignis, aut in summo humidum, ut est aqua. Pari modo nec frigidum, sicut in summo: sed ab eo quod in mixtura pollet, appellationem fortis. Non posse autem differantur temperamentorum esse plures quam quatuor, hinc docere conatur, quod duxerit quatuor sint qualitates, quæ in se agere pariter possunt nempe calor, frigus, siccitas & humiditas: ex quibus quatuor tantum (iudicio suo) oriuntur temperamentorum cōiugationes, quæ cōsistere possunt: nempe calidum & humidum, calidum & siccam, frigidum & humidum, frigidum & siccam. Siquidem coniugia tria duo, quæ ex contrariis qualitatibus constant, calidum nem-

pe & frigidum, necnon siccam & humidum, minime cōsistere posse. Quæ verò illi mihi prætermissis videntur, nunc adducenda reor. Vbi igitur & primū id est, quod temperatam naturam, quæ & virtute & vinibus, reliquis præstat, sine qua de illis ne loqui quidem poterunt, omnino ac si nulla sit, omiserunt. Quippe quod vel in calida temperie calidum prævalet frigidum, vel in frigida temperie frigidum prævalet calidum, id ne intellexisse quidem est, nisi prius ponantur euctatos, siue temperata: ad quæ sunt intenti, cum videtur sanitaris tuendæ investigat, efficeretq; temperatum quendam statum conitit. Ergo quem asiduo sectantur, & quod semper respicietis, in temperatos status corrigunt, hunc ego quidem primū omnium statum censuerim. Hi autem tantum abest ut eius eminent, ut etiam totū prætereant. At non præteritis, inquit ex his aliqui: in calido namq; & humido cōprehenditur.

Temperatam naturam esse à veteribus prætermissam.

Temperatam naturam esse regulam constituende vitæ rationi.

Quam sententiæ Atheniæ sectatores fouentes, ipsas quatuor temperatas, quæ annuorum temporibus comparant. Hyemem itaq; frigidam & humidam dicit. Aestatem autem, calidam simul & siccam. Autumnum, frigidam atq; siccam. Ver deniq; tum temperatum, tum calidum & humidum vocat. Ad eundem modum & ex ætatis, puerilem quidem tum temperatam esse, tum verò calidam humidamq;. Sed & mortem auit autumnum corpora ad frigidum & siccam perducere. Vnde colligunt, vitam, cum illi cōtraria sit, calidam & humidam esse: ac proinde calidum & humidum temperamentum, optimum & temperatissimum esse. Bisannum autem hallucinant. Primū quidem, quod in quatuor anni temporibus, quartam temperamentorum coniugationem inveniri contendunt: id quod non videtur necesse. Dein, quod ea ratione concludunt, ver calidum & humidum esse, quod sit hyeme quidem calidius, citate autem humidius. Siquidem eodem nomine dicitur frigidum simul & siccum, propterea quod æstas frigidus est, sicut & siccus lyeme. Quare nec æstas, nec hyeme ver compare est æquum, sed potius ipsum per se æstimare: cum quodlibet anni temporis, non ex alterius comparatione, sed suapte æstimatum natura, iudicari debeat tale, vel tale. Ad quam formā si expendas ver, videbitur nbi plane in omnis excessus medio consistens. Proinde rectè ab Hippocrate est dictum, vel saluberrimū esse, minimeq; morbis perniciosius obnoxium. Est & autumnum, ut quàm æstas minus calidus, sic vng quàm lyeme minus frigidus. Quare ratione hac nec calidus absoluto sermone est, nec frigidus: quippe cum ambo sit, ac neutrum ad sum mum. Ceterum alterum in eo est incōmodum, nempe inæqualis ipsa temperies, quæ autumnum maxime morbosificam facit. Quod Hippocrates etiā significavit, dicens: Calm eodem die modò calor, modò frigus nos afficit, expectandos esse autumnales morbos. Itaque non rectè frigidus, siccusq; dicitur. Nec tamen æquabiliter est temperatus, ut ver quin potius hoc maxime ad illo tempore disidit, quod in mediā temperiem & æqualitatē perpetuo parem nō seruet. Quippe mendie multo est calidior si mane, aut vespere:

Veterum duplex lapsus est: ta aliquoties temperamentorum.

Ver esse per se æstimandum.

Ver in media omni excessus consistit.

Ver saluberrimum est.

Autumni inæqualis temperies: illam morbis cōiungit.

*Autumnus ad
siccam decli-
nat.*

*Ver non esse de
credum calidum
& humidum.*

*Temperiem a-
rii calidum atq;
humidum, esse
omnium alio-
rum potius aut,
nec repari pos-
se in quatuor
annis temperi-
bus.*

*Incorrupta ser-
uati ad frigido
& sicco anni,
potius a cal-
ido et humido.
Boream seruat
et imputria re-
mota.*

*Animum fletu
tam potius facit
et singula.
Ver tempera-
tam, et salubre
rimum.*

*Animantia di-
cta esse calida
et humida, non
absoluta, sed col-
lata ad stirpem.*

*Canis siccior
humane.*

*Canis humi-
dior ferocior et
apibus.
Temperantius
rum collatus
nec doctior.*

*Elementa sola
divi absque
lida, aut humi-
da, aut frigida,
aut sicca.*

spere: nec in humido & sicco omnino medium
statum obinet, quemadmodum ver, sed ad sic-
cum declinat. Idcirco patere arbitror, nec autum-
niū absolute feruere, & citra exceptionem, fri-
gidum & siccuū dicendum esse: sicut neque ver
calidum atq; humidum. Ego siquidem, tantum
abesse ut ver, aut si quid aliud est temperatum, ca-
lidum & humidum esse credam, ut quod planē
contrarium est, id affirmem, omnium scilicet aë-
ris temperamentorū id psumum esse, quod hu-
midum est & calidum. Quod sanē temperamen-
tum in quatuor anni temporibus uenire non
possis: quamvis id in pestilentis aëris constitutio-
ne incidere aliquando videatur, quemadmodū
Hippocrates olim contigisse in Craione memo-
rat, ubi nimium asidue per ætū multo largi im-
blerat (quod calidi humidique status est pro-
prium) quam intemperiem aëris comitari sunt
uarii & grauissimi affectus, haud dubiē dū re-
putatis soboles. Nam ut a frigido & sicco om-
nia in corrupta seruati, sic a calido & humido
facile cōputrescunt. Borex etenim status sic-
cus & frigidus, omniaq; diuissime imputria cō-
seruat. Austrinus autem status, qui calidus & hu-
midus est, illa subito ad corruptionem perducit.
Ver itaq; laudatūq; calidum & humidum pro-
nuunciamus, cum nec tale sit, nec si esset, utiq; sa-
lubre esset, aut sanitati accommodum. At quatuor
qualitatum mixtionis & qualitas, & medius tem-
peraturæ eius, & salubritatis est causa. Perperam
etiam faciunt, dum ætatum temperamenta, ad
quatuor anni tempora transferunt, quomodo
idem sit, aut similiter dicatur animalis tēperies
calida & humida, sicuti aëris temperamentum
calidum & humidum dicitur. Qui error inde il-
lis videtur ortus, quod nō meminerint, animan-
tia veteribus pronuntiata fuisse calida & humi-
da, nō propria temperaturæ ratione, nec sermo-
ne absolute, sed ad stirpes, & de mortua, collata.
Quippe de mortuis & stirpibus, animantia cali-
diora humidioraq; sunt. Quin etiam ex animan-
tibus ipsis inter se speciatim collatis, canis quidē
est siccior, homo autem humidior. At si formi-
cæ, vel api ipsū cinem compares, illas siccio-
res, hunc humidiores inuenies. Ita idem ani-
mane, prout homo, siccior: prout apicula, hu-
midum fuerit. Rursus ad lionem collatum, ca-
lidum: ad leonem, frigidum est. Calidus etiam
est canis, ut uiuens (cum mortuus non amplius
calidus sit) non calidus autē, si ad alterum com-
paretur canem. Atq; hæc quidem omnia per col-
lationē inter se dicuntur. Quæ uerō in animan-
tum genere conferuntur, alia ratione: sicuti et-
iam quæcumq; in aliqua animalium specie. Cā-
nis namq; ad formicam est humidus: in animan-
tum genere est siccus. Rursus, ipsorum specia-
tum canum, hic siccus, ille humidus, alius (ut fas
est eam) temperatus existit. Quod ergo absolu-
to sermone, nec ad aliud viliū collatum, voca-
tur siccum, id in solis est elementis: similiterq; de
ceteris qualitatibus est sciendum. Nullum e-
nim ceterorum corporum, prout calidum aut
frigidum est, sed sola elementa. Quicquid præter
hæc ceperis, ex his mixtis constat. Ac propterea
per secundam significationem, nō amplius ab-

soluta ratione, veluti syncerum & à mixtione alie-
num, reliquū quodvis calidum aut frigidum
dicitur. Ac duo quidem signifiata calida, frigi-
da, humida & sicca, lux sunt alterū, absolute ser-
mone loquentium, mixtura carens atq; syncera:
alterum contrariis quidem mixtis constans, ce-
terum ex pollentis in mixtura nomine appella-
tum. Quo genere sanguis humidus dicitur, si-
cuti & os siccuū. Formica uerō sicca est, & vermis
humidus: scilicet ut sunt animalia. Dicitur por-
rō vnumquodq; secundum genus, vel speciem,
non modō calidum esse, aut frigidum, sed aliis
etiam qualitatibus præditum, cum supra medio-
cre atq; mediū fuerit. Verbi grana, animal dicitur
calidum, cum supra mediū tempore sit ani-
mal. Equus calidus, cum supra medium tempe-
rie equus fuerit. At uerō in quoque genere spe-
cieve sunt media, quæ à summis in eo genere, spe-
cieve, finibus æqualiter distant. Ac genus qui-
dem est animal, species equus & canis. Medium
temperie in toto animalium genere, est homo.
Medium uerō ut in hominum specie, quem Gra-
eci enlarcon, hoc est, quadratum appellant, ab om-
ni excessu, defectuue remotus. Quisquis igitur
supra hunc fuerit, is aut prius calidior, aut
frigidior, aut humidior, aut siccior erit: idque
partim absolute sermone, quia minimē vni alii-
cui priuam collatus dicitur talis: partim non
absolute, quod symmetrō & medio potius spec-
ies comparatur. Ergo vnumquodq; horū quæ
talita sunt, aut calidum, aut frigidum, aut hu-
midum, aut siccum tripliciter dicimus. Nempe ut
comparantes id culibet particulari individuū:
aut cum vniuersaliq; tum generis, tum speciei
medio id conferentes: vel deniq; summū atq; im-
peritū ipsum esse iudicantes, id quod sanē
ad sola pertinet elementa. Quare ad tractationē
de temperamentis illi duo primi modi nobis tan-
tū sunt necessarij. Quoniam autem multa gene-
ra sunt, quemadmodū & diuina, ad quæ cō-
parare possumus, poterit idem corpus multis
modis, calidum, frigidum, humidū, atq; siccum
existere, similisq; suscipere varias appellationes.
Verū ubi stirpem animantū vel villum, eucatō, si-
ue optime temperatū dicimus, nequaquā in ea di-
ctione, simpliciter cōtraria inter se cōparamus:
sed ad naturam vel animalis, vel stirpis referi-
mus, cum eorum quodque pro sua natura optime
sefe habeat, optimisq; suis obiectis functiones. Sic
enim dicimus animalia ipsa & stirpes optimā &
mediam habere seu in genere temperaturā, non
utiq; absolute sermone, ac si paritas exquisita cō-
trariorum in his reperitur, sed quod ea medio-
critas, quæ ad potestatem refertur, eis adsit. Ac tale
quid etiam dicimus esse & iustitiam, nō quæ men-
sura & pondere, sed quæ eo quod pro dignitate
conuenit, æqualitate tem explorat. Est ergo tem-
peratura æqualitas, in omnibus animalibus tem-
perans, stirpibusq; non ea quæ ex pari elemento
rum commistionum mole spectatur, sed quæ tum
animalis, tum stirpis nature conuenit. Conueni-
tū autem aliis, ut humidum sicco, & frigidum
calido præponderet. Itaq; ad interrogantem, cu-
ius temperamenti sit homo: si quidē ut in anima-
libus interrogatio sit, ad id qd medio est inter

*Medus in quo-
que genere, vel
specie, quod di-
cuntur.
Homo est me-
dus in toto ani-
malium genere.*

*Temperatura
corporum quo-
tripliciter affi-
mantur.*

*Temperatura
ad iustitiam
iustitia quid.*

animalia omnia temperamento respicientes, respondere oportet. Si verò facta collatione cum individuo aliquo, utiq; ad illud solum confectio, tunc respondendum est. Si absolute, atque ut ad omnem substantiam, sic iam contraria quæ sunt in eo comparare oportet, atque æstimare, haudquã ad æthiopem referentes temperiem, sed potius ad elementorum portiones, hoc est, ad substantiam quandam, quæ panter ab extremis distet, quæ prima omnium fuerit elementa. Si quidem quæ supra citavimus hanc substantiam temperies fuerit, eam simpliciter calidam, frigidam, humidam, siccamve asseremus. Vbi verò cum medio temperamento conferimus, nõ simpliciter, sed quod ad mediocre eiusdem generis sit se habet. Porro generum omnium supremum substantia est, sub qua quidem tam aumata, quàm inanimata continentur. Vnum autem genera, supernæ descendens nobis, sunt, homo, cornus & ficus, eorû species dicuntur. Infernæ verò ascendentes, scilicet ab individuis substantiis, eadem sunt prima genera: indicandisq; alio opere est, meritis omnia quæ media sunt, inter individua & genera prima, tum genera, tum species à veteribus nominari. Iam verò, quemadmodum nomen albi, tum de colore albo, tum de corpore, quod ipsum colorem suscipit, enunciat: sic etiam calidi nomen, non solum de substantia calore prædita, sed de ipsa etiam caliditate dicitur. Dicitur itaq; ipsa caliditas calidum: sicut & corpus ipsum, quod tamen nunquam caliditas appellabitur: in ceterisq; similiter qualitatibus eadem ratio est habenda. Quæ corpora igitur has qualitates quatuor, caliditatem inquam, frigiditatem, humiditatem & siccitatem, puras & impermixtas fortiuntur, aliosq; dicuntur talia, elementisq; genitorum & pereduntur existunt. Reliqua verò universa corpora, in illorum medio sunt collocata, cum non sint finis qualitatibus prædita, sed proliis aut in medio contrarium consistant, aut ad alterum extremorum sint propinqua & propensa. Idcirco novem in universum temperamentorum differentiæ exoriuntur. Quarum una quidē temperata est & media, octo verò nõ temperatæ. Harum rursus, quatuor simplices sunt, calida, frigida, humida & sicca: quatuor verò compositæ, calida & humida, calida & sicca, frigida & humida, frigida & sicca. Temperatam autem, in qua illæ quatuor qualitates ad æquilibrium miscentur. Non temperatam autem, in qua una aut duæ qualitates præpollent. At calidam temperatam pronuncio, in qua calor vincit ipsam frigiditatem alterius oppositionis, quæ in humido & sicco est; interm paritate servata. Similiterq; in frigida, humida, & sicca temperie simplici iudicandum. Ceterum calidam & humidam eam temperatam censemus, in qua frigiditatem caliditas, siccitatem humiditas superat. Nec fecus calida & sicca, frigida & humida, frigida & sicca temperies sunt æstimandæ. In qualibet autem dictarum temperatarum permagnus est excessus, defectusq; modus. Idcirco, si cui agnoscendū illarum est cura, incipiat exacerationem ab us naturis in quolibet genere oportet, quæ temperatæ mediæq;

sunt: quandoquidem si cum his alias compararet, facile quod in quasvis superet, deficitve, inveniret. Cum igitur temperies calida, alia quidem æctu, alia potestate dicatur, quod videlicet non dum sit, sed possit fieri quod dicitur: differamus primum de his, quæ calida, frigida, humida, atque sicca esse æctu dicuntur, idq; aspiciat ab invier sa substantia, mox descendi ad animalia & stirpes. Cum autem quod in omni genere, maximeq; in universa substantia est mediū, id ex mitione extremorum conficitur, certè si à calidissimo igni, aut aqua ferventi, ad frigidissimam glaciem transierimus, in ipso exquisitissimo medio, id quod symmetron est, intellectū deprehendemus. Quinetiam id nobis preparare licebit, miscensibus aquæ ferventi pariem modum glaciæ. Quod enim ex amilobus est mitum, pari intervallo ab utroq; extremorum abest. Quare non erit difficile, ei qui tale mitum tetigert, habere medium universæ substantiæ, in calidi & frigidi oppositione: atque alia omnia, illi veluti formæ adaptata, discernere. Quod si terram etiam pari aquæ modo imbueris, medium in sicca humidisq; oppositione feceris. Quamquam hæc non mitio nes verg, sed tantum particularum appositiones sunt. Si quidē miscere corpora tota per tota, non hominis, sed Dei & naturæ est opus. Iam verò corpus de quo iudicandum est, mediocriter calens esto: nam interdum nimio calore liquatur adeo, ut humoris falsam imaginem præ se ferat. Sicuti interdum etiam adeo cogitur frigore, ut siccus quàm sit mediocre, nobis esse videatur. Porro ipsa hominis temperatissimi cutis, ac præcipue quæ in manu est, omnium extremorum est media: fuitq; sic temperata à natura, quod sensibulum omnium esset veluti norma quædam, rationisq; instrumentū futura. Ex dictis igitur constat, inter omnia quidem corpora, hominē esse temperatissimū: inter omnes autem humanas particularas, cutim etiam, quæ intra manū habetur, si modò nullū callum cōtraxerit. Quæ quidē quæ sunt deniores particularæ, in his omnibus siccum prævalere: quæcunq; verò molliores, in his humidius esse quàm sicca. Ceterū homo temperatissimus, qui tum hominū, tum reliquorū animalium futurus est regula, cum universa substantia collatus, medius apparere in ea debet: magisq; cum hominibus atque bestis. Dein verò sapientissimus sit oportet, habetisq; actiones corporeas consentientes animi moribus: ac non solum mediam temperaturam, sed optimam etiam formationem sortitur. Quod verò ad manus pertinet, quum ex gemini usus gratia sint factæ, nempe tangendi atque comprehendendi: vique illæ quæ molles sunt, ad exquisitum tangendum, ut duræ ad aliqd vi maiori capiendum, magis idoneæ existunt. Quinetiam cutis, quæ universæ, quæ generationi corruptionisq; subiicitur, substantiæ est media, nec dura lapideæve est, sed ab omni exuberantia remota, atque omnino secundum naturam se habet. Quo scilicet cutis genere maxime perfectum esse tatum censemus. Etenim nervus omnis est exanguis & frigidus. Caro multi sanguinis, atq; calida. Media inter utrunq; est cutis: nec planè exanguis

Temperiem calidam deo vel ætæ, vel potestate.

Medium in universa substantia.

Missionem exquisitissimam, solum Dei est, natura ipsi operari.

Cutim veluti normam in homine temperatam esse extremorum medium. Cutim esse instrumentum rationis.

Hominem esse omnium corporum temperatissimum.

Hominem qui futurus sit animalium universarum regula, qualis nam esse oportet.

Manum tangendi atque apprehendendi gratia esse factas. Manum molliorem, Manum duram. Cutim media qualis nam esse debeat.

Nervus omnino esse exanguem, & frigidum. Carni esse multum sanguinis, calidamq;.

Substantia esse generis omnium supremam. Genera videri duo species.

Elementa quæ sunt.

Temperamentorum differentiæ novem.

Temperata temperies.

Temperies non temperata quæ.

exanguis ut neruus, nec sanguine abundans ut caro, sed veluti neruus sanguine pradiuus. Si igitur hanc omnium animalium partem, veluti normam iudicemus proponens, reliqua illi cōferas, otio in vniuersum diuersas intemperies reperies: de quibus membranam differat. Humidissimum frigidissimamque in corpore pruita est. Calidissimū, sanguis: non tamen perinde in humidus est ut pituita. Frigidissimū est ac siccissimū, pilus. Minus eo & frigidum & siccum, os. Hoc vero minus siccum est cartilago. Proximē hanc sequitur chondrosynefimos. Post hunc tendit Deinceps membra, & arteria, & vena. Succedunt denique nerui duri: molles quippe in humiditate & siccitate mediam naturam, sicuti cutis, obtinent. Nam in altera oppositissime tantum caloris desiderant, quantum sanguinis. Ita verō & reliqua prout dicta, ita sunt frigidiora cute, quāto minus habent sanguinis. Enim vasorum tunc non solum exangues sunt, sed etiam nature frigidæ: contactu tamen sanguinis caluunt, atque ad mediū temperamētum statim deveniunt. Sanguis verō ipse à corde suū calorem accipit. Id viscus siquidem tum omnium animalium particularum maximē sanguinem, tum verō calidissimum est. Proximū illi est iecur. Verum cor, paulo minus quam cutis est durum: iecur multo. At caro humidior cute est: eadem tamen calidior. Spinalis autē medulla cute est humidior, atque frigidior. Sicuti hac rursus humidior est cerebrum. Cerebro autē ipso adeps: cui concretio cōtingit, propterea quod oleosa cum sit, membranis frigidior adacet, ob quā viciniam cogitur. At nec circa iecur coire adeps potest, nec circa arterias, venas, aut cordis: nec circa villam aliam præcalidam partem. Quoniam autē cogitur ab eo quod valde est frigidum, idcirco calidiora sunt, ceterorum coagulatorum more. At cerebrum calidissimum liquari minimē: eōque adipe minus est humidum. Minus humida quam adeps est ipsa etiam pulmonum caro, quæ ne calidiora quidem liquatur. Iam longē etiam quam hæc adipe minus humidior est tum lenis, tum renum caro. Omnia tamē hæc cute sunt humidiora. Quarum rerū demonstrationes proximo commentatio ita demus.

GAL. DE TEMPERAMENTIS LIB. II.

Ergo quæ sunt in vniuersum temperamēta, quorūque modis vnumquodque illorū dictatur, in proximo definitū est libro. Vbi autem bis etiam est traditū, animal ipsum minimē quidem absolute sermone calidum & humidū dici, quod in eo saluēt lunari dicitur aut calor exuperet (sic enim liceret invenire animalia sicca, frigidiora cōplura, veluti culices, muscæ, asper, formicæ) sed tantū ad demortu collatum. Monstratūque similiter est, cutem vobis maius, in homine quæ optima temperatūra sit prædicta, esse temperatissimam, rōniūque medium substantiæ. Est autem plurima in hominibus discretio. Verūm maximē temperatus is est, qui corporis habitus medius horum extremorū videtur, graciliter natus, crassitudine, mollior, durior, itēque calor & frigus (nam interdū in animalia sanguis

nē prædico & humido, frigiditate quādam polentem reperies) quicquid etiam liber cum sit ab immodicis animi affectibus, omnes tam naturales quā animales actiones & facultates habet inculpatissimas. Idem medium oportet sit inter formolentum aut pervigilem, inter glabrum & luctum, inter nigrum & candidissimum: pilosus habeat cōm puer est, magis rufus, quā nigros: cum in flore consistit, conerit. Ceterū quando quidem se nobis occasio iam obtulit, de ætate non nil dicendum est. Prima cōfirmatio animalis reccens formam in vtero, ex semine & sanguine est: qui humores calidi vtero & humidi. His autē magis semper siccescētibz, pnmū quidem formantur membra, tunica, nerui, viscera, & sanguinis vasa, nempe illorum substantia testis. Viximō verō perfringunt ossa, ungues, & cartilagine, scilicet subitanea ipsorum cōcreta. Quibus perfectus in vtero, ita deinde paritur infans, adeo tamen mollior & humidior omnibus partibus suis, ut omnia ipsius membra nutrites, perinde ac si cerea sint, pro arbitrio forment & fruant. Idcirco nuper nati animalis corpus maxime si suil lino, ouillimū id sit, propter redvandantem in eo humorem, libens non comedas. Nam caprillum, quod siccissimum est, & melius est, est, & iucundius. Contrā verō quā in nouellis porcellis, quæcumque iam consenuerunt, hæc omnes partes præcæcis rigidissimæ, & sine succo possident. Quæ medio statū horum, ac nuper natorū sunt, ea quantum à senio absunt, tannum & ab extrema sunt siccitate remota. Quæ minora sunt, atque adhuc augescunt, tantum ea quæ absunt ab iu more factus delitescens vtero, quantum processerit ætate. Florescens verō ætas omnium animalium, maxime in medio extremorū est. Porro senes naturali particulari temperamēto sunt sicci, licet copia excrementorū humidū esse dicantur. Si quidem cum particulæ senilium corporū per caloris imbecillitatem similiter nutriti non possunt (quæ ratione dicuntur sicce) fors illis copia humidū excrementū redvnt, & superfluit. His itaque sicce est senex, quibus scilicet puer est humidus: ipsi numerum solidi corporis partibus. Quod igitur siccissima ætatem senilis sit, ex iam dictis constat. Quod autem & frigidissimum, ex tactu ipso, ex liuore qui videtur in senibus, ex frigidis morbis, quibus facile corripuntur, ac denique ex imbecillitate naturalium functionū, facile etiam quis iudicauerit. Et quid quæso aliud est senium, quā via ad interitum? Si enim mors, naturalis calor extinctio est, vique senium veluti tabes quædam eius fuerit. At verō de puerorū & floreum ætate, vtra nam sit calidior, maxima inter medicos gladiatur est. Qui quidem omnes perperim mihi videtur facere, dum sensibilibz rerum cognitionem, laborioso edsequi nocivo molitur. Nam cum eorū quæ actu calida sunt, alius esse iudex quā tactus nullus possit, siue si multos viros, tum senes, tum adolescentes, tum pueros, tum infantes tetigerint, inuenient facili, qui magis, minusve calidi sint. Ego siquidem, quod actu calidum est, tactu iudico: sicuti & quod potestate calidum iudicatur, nil ratione conor investigare.

Intemperies calida ac cutem ossa.

Pituita.

Sanguis.

Pilus.

Os.

Cartilago.

Chondrosynefimos.

Deinceps.

Tunda.

Membrana.

Arteria.

Vena.

Nerui.

Sanguinem à corde suū calorem accipit.

Cor omnium particularum tum maxime sanguinem, tum calidissimum est.

Proximū illi est iecur.

Verum cor, paulo minus quam cutis est durum: iecur multo.

At caro humidior cute est: eadem tamen calidior.

Spinalis autē medulla cute est humidior, atque frigidior.

Sicuti hac rursus humidior est cerebrum.

Cerebro autē ipso adeps: cui concretio cōtingit, propterea quod oleosa cum sit, membranis frigidior adacet, ob quā viciniam cogitur.

At nec circa iecur coire adeps potest, nec circa arterias, venas, aut cordis: nec circa villam aliam præcalidam partem.

Quoniam autē cogitur ab eo quod valde est frigidum, idcirco calidiora sunt, ceterorum coagulatorum more.

At cerebrum calidissimum liquari minimē: eōque adipe minus est humidum.

Minus humida quam adeps est ipsa etiam pulmonum caro, quæ ne calidiora quidem liquatur.

Iam longē etiam quam hæc adipe minus humidior est tum lenis, tum renum caro.

Omnia tamē hæc cute sunt humidiora.

Quarum rerū demonstrationes proximo commentatio ita demus.

Quarum rerū demonstrationes proximo commentatio ita demus.

Formationem primū animalis ex coactis reccens, ex sanguine mīstris. Partes quæ cōtinuæ quæ postea formantur vtero.

Rovas edita animalis corpora eius in parte existunt. Caprolentum carni laudantur.

Actum florentem esse in modo dixerunt. Senem esse naturalem videri, humidum excrementum copia.

Senem esse ad interitum videri. Mortuum esse interitum naturalem calorem.

Tactum solum esse iudicem aeris quæ actu calida sunt. Potestate calidum videri quæ ratione.

Animalia frigida quæ. Animalia duo calida et humida, non simpliciter, sed ad demortu collata.

Cutem vobis esse medium iecur substantiæ.

Homini temperatissimo natura.

Calidum itaq; quod in ætatibus cognoscere cupimus, primum & maxime tactu diiudicemus. Fiet autē optimū iudiciū in alicuius infans corpore. Potest enim aug. & qualis calor illiusque biennium fuerit, in memoria reponi: & qualis iuuen sit, post duos fortē vel tres interpositos annos. Nam si murano omnino vlla ad calidū frigidūq; infans facta videbitur, nulli præterea negotium erit, qui vñ ad florentem ætatem ex celsius futurus sit, colligere. Quod si plures puellōs pluribus cōferre ætate florentibus velis, similes per omnia, & naturæ, & educatione, suis similibus cōferes, ita vt reliqua omnia, quātum fieri potest, sint paria, vna tantū ætate excepta. Si quidem in cōtrariis naturis disquirere differentiam ætatis, citra maximā impossibilitatem nō licet. Quare te huius iam iustitiam, seu rectē iudicaturū, ad ipsam experientiam remitto. Quippe si reliquis omnibus quæ extrinsecus adveniunt alterantibus circumcissis, eas quæ ex sola ætate proveniunt differentias perpendis, nec puer iuvene, scivti nec iuvenis puero, absolute videbitur esse tibi calidior, cum iuniorum eorum calores differant qualitate quadam, quæ ex imparate diffinitus gignitur. Est enim puerorū calor magis halitusosus atq; copiosus, tangentiq; blandior. Florentium verō calor subacere quiddā habet, atq; insuavis. Quæ differentia occurrit adducit plures vt credant, florentiū corpus esse longē calidius. Res verō secus se habet. Nam quemadmodum

caro appellatur, quā scilicet nuscumque in corpore per se solam invenies, fed est perpetuū musculi pars. Dein cuiusq; viscerum propria substantia est, cui iporum tota actio tribuitur. Porro ceteri pulmonisq; corpus, proximum ad adipē est, humiditatis ratione. Propterquam habet naturam huiusmodi medulla: nō est tamen eiusdem generis cum ipso cerebro, neq; etiam cum spinali medulla. Hæc cerebrum calidius est, & humidius, eōq; mollius. Cuius anteriores partes tantō humidiores sunt, quāto molliores. Omnia tamen hæc cute humidiora & frigidiora existunt ac breviter, omne exangue, frigidius est sanguine prædito. Proxima cum est mollium nervorum natura. Duriore autē in humido & sicco, secundum cutis naturam se habent. At calore ab eius natura tantum abest, quāto consentiens est exangue corpus & sanguine prædito abesse. Lienis autem, renum, & icterici carni, tantū cutis est humidior, quāto est mollior: calidior verō, quāto magis abundat sanguine. Iam cordis caro us omnibus tantū est siccor, quāto durior: calidior autem nō modō huius, sed etiā omnibus absolute corporis partibus. At icterici, lienis, renum, pulmonisq; caro, simplicis cuiusdam nature est, circa cuiusq; viscera venas, arterias, & nervos crescent. Cordis simplex carnis natura non est, sed fuit in eo fibra, quales in musculis cernimus, quibus caro circumlaxaret. Atq; hæc quidem carnes cute sunt calidiores: fibra verō quæ eandem partem paulo magis, partem paulo minus, tum frigida sunt, tum sicca, partem similes omnino cutis substantiæ. Porro omnes membranas cute sunt sicciore: ligamenta ipsa, quāto cute duriora sunt, tantō etiā sicciore. Tendones quoq; longe duriores sunt cute. Cartilago verō post ligamentum est ac deinceps mediū quoddam inter ea corpus, quod

anatomice appellatur, ac si dixeris ligamentum cartilagineū. Os verō omnī quæ cutis operit, durissimum est. At eorum quæ cute exant, siccissimus est pilus: deinde cornu, mox ungues, ungula, calcanea, & rostra. Succorum optimus ac maxime familiaris est sanguis. Huius veluti sedimentum est fæx, atra bilis. Quæ idcirco tum frigidior, tum crassior sanguine est, sic uti atra bilis longē calidior. Frigidissimū verō ac humidissimū omnī quæ in animali habetur, putat est. Instrumentū autem quo id cognoscitur, ipse est tactus. Ac particular quidem, & succi corporis, ad hunc modū se habent. Iam verō crassitudo & gracilitas habitus, corporum temperamenta sequuntur, non ea modō quæ naturalia sunt, sed etiam si quæ ex longa cōsuetudine sunt cōtracta. Multos siquidem, qui natura graciles fuerant, pingues reddidos vidi: contrāq; qui pingues fuerant, graciles: illis quidem ex opiofa & delicata vita, toto temperamento ad humidum mutato. his verō, multa tolerantia, & curis & tenui victu perlicant. Ceterū quibuscunq; latiores sunt venæ, hi calidiores natura sunt. Quibus angustiores, cōtrā, magis frigidi. Caloris namq; opus est, hæc latitudo. Quare merito in idem recidunt, venarū quidem angustia, cum habitu pingui & crassiori: habitus autē gracilis, cū laxitate

venarum,

Ætatem calorem que merito de dignoscide.

Puerorum iuniorumque calorem differre inter se qualitate istam. Puerorū calor mollior. Florentium calor acris.

Tactus quorū sit iudex. Sicca autem est si dura. Dura quæ non accrescit esse sicca.

Molle cum medicis calore esse humidius.

Carni plures sunt species.

Carni quicquid per se respondet.

Exanguia autem frigidiore sunt sanguine prædita.

Cordis caro calidior nervorum si corporis partibus.

Fibra.

Membrana.

Tendone. Cartilago.

Chondrosidest.

Os.

Pilus.

Sanguis succorum optimus.

Atra bilis fæx sanguinis.

Puriora frigidissima & humidissima sunt quæ in corpore habentur.

Tactus est instrumentum quodammodo differentiarum.

Pinguendo vnde crassiores. Gracilitas vnde crassiores. Venæ latiores prædita, calidiores, sic uti angustiores, frigidiore.

venarum. Quod si quis simul pinguis crassifusq;
et ac venas latus habet, et consuetudinis alius
occasione, nō natura, pinguis est redditus. Si
viti ē diuerso, qui angustas habet venas, & gracilis
est, ne hūc quidem talem esse naturā, est necesse.
Quinetiam cum fames virget, ex laxitate & an-
gustia venarum, nō ex cetero corporis habitu,
spectanda ē esse mediocritatem, monet diuus Hip-
pocrates. Quippe qui angustas possidet venas,
& exiguū sunt sanguinis, nec longam in eam se
runt. Quibus sunt late, his copia sanguinis in-
est, & citra uocem cibo abstinent. Etenim qui-
quid pingue est in sanguine, leuēq; id in corpo-
ribus calidioribus alimenū quoddam calido
fit. In frigidioribus verō asseruat. Vbi igitur id ā
venis transmissum, incident in particulis frigi-
das, in ipsis quidem concreuit. In calidioribus
verō natura partibus, cuiusmodi sunt carnosae,
ā calore absumitur, & digerunt: nisi fortē frigi-
diti temperamenti vita indulgentior accedens,
ipsis carnosus particulis allinat aliquid pinguius
durus. Atq; hac ratione facinus viris pinguius
sunt, quod nimirum sint eis frigidores, pluri-
mūq; domi versentur. At qui habitus natura
sunt temperati, mediocriq; exercitio vītur, hos
necesse est eufarcos esse, hoc est, mediocri ha-
bitudine corporis. Quibus verō abundat humi-
dum, & calor ā mediocritate summa non longē
abest, si corpulentū sunt. Corpulentū etiam sunt,
qui natura viti temperati, ceterū ociosi & desi-
des viuunt: cum videlicet consuetudo sit veluti
acquisita natura. Adeps etenim, ex habitus fri-
giditate gignitur. Corpulenta, ex sanguinis co-
pia. Mediocritas, temperate naturae est nota. Et
corpulentū quidem, omnino plus adipis habet,
quam mediocri habitudine praedit. Nec tamen
pro carnis semper portione, adeps simul auge-
tur: sed alios habere plus carnis, alios plus ad-
ipis videas: alius ambo pari modo sunt aucti,
cum videlicet tantū illis, supra temperatam na-
turam, humoris est, quātur & frigoris. Quibus
autē plus est adipis, in his frigidi plus est, quam
humidi: acq; ut quibus caro est plenior, his hu-
moris plus iusto est, nō tamē frigoris. Porro vbi
nullū adhuc morbosum symptoma crassato cor-
pori inuadit, ipsa abvndantia humoris intra fa-
nitatis est fines. Cū autem mediā tempera-
tūq; naturā, reliquariū veluti canoniem semper
stauimus, quae verō ex huius vtriusq; parte,
iudicemus intemperatas, manifestum vniq; est,
in sanitatis statu & latitudine, & maiori mino-
risq; inueniri rationem. Est enim alia sanitatis,
alia morbi intemperies. Morbi quidem, ea quae
ā media temperie quā longissime abest. Sanita-
tis, quae paulum. Denique autē modum, nec men-
sura, nec poedere licet. Ceterū intemperies quae
intra sanitatem cōsistit, sufficiens nota est, quod
nulla functio animalis manifeste adhuc sit obla-
sa. Quātur igitur intervallum est inter id quod
perfectissimae suae obit functionem, & id quod
actionē aliquā habet manifeste vitiatam, tan-
ta est profectō & sanitas, & intemperies, quae
intra sanitatem cōsistit, latitudo. Ab hac proxima
est intemperies morbo sa, cum scilicet animal vi-
tio intemperiei iam aegrotat. Rursus, quemad-

modum naturali calore optimū seruante tempe-
riem, humidum, quod intra sanitatis terminos
est, auctū, nō adipem modū in homine, sed et iā
corpulentū gignit: & adipem quidem parcius
aducit, liberalius autem carnē adauget: sic et iā,
si humidum & siccum mediocritatē ad vnguem
inter se seruent, calor autē sit in homine minor,
necesse est huius corpus adipe quā carnis co-
pia magis abundare. At verō si calor augeat, ser-
uentq; mediocritatem altera contrarietas, minus
erit et animalis adipis, quā carnis. Si viti ē di-
uerso, si quando praepolleat siccum, altera con-
trarietas medium modum seruare, & gracilius
& durius corpus evadet. Ex quibus liquet, non
solum ratione monstrari esse, quod simplices in
animalium corporibus intemperies habeantur,
sed etiam, quod singulari manifeste sint nota,
idq; in vniuersi habitum corporis differunt.

Porro calida & sicca temperies, hirsuta est: verū
ea in summo. Mediocriter autē, quae calida qui-
dem est, sed in altera contrarietas mediocritatē
habet. Similiter & quae frigida quidem est, sed in
calido & frigido mediā temperiem obinet, modice
est hirsuta. Nuda pilis sunt frigida omnia tem-
peramenta, siue ea modice se habeant in humidi-
tate, siue etiam immodice. Ceterū ad summum
glabra est frigida temperies & humida. Minus
hac, quae frigida est, sed in altera oppositōne,
temperata. Adhuc minus, quae frigida est & sic-
ca. Siquidem siccitas cutis, in his qui molli sunt
cute, maximē omniū idonea est ad pilorū gene-
rationem: & quod siccior calidiorq; fuerit, eo ma-
gis pilos gignere potest. Hanc enim siccam & ca-
lidam cutim, velim tētere itariū asiniles, quae
abundante sit vere, vel ineunte aetate. Etenim per
omnē cutim digeritur semper ā calido aliquid,
quod secum etiam nūdū interni humoris eve-
hit. In quibus igitur humida est cutis, & mollis,
qualis modō cōcretescentes caseus, in his, eorū quae
excidunt, vix per cutem dilatate nō manent:

nēpe paribus eius, quae prius dissidebāt, rursus
inter se cōiungunt. At in quibus dura est, nec ab-
similis caseo cōcreto, perforatur quidem, eorum
quae exeunt transilluxu. Cū autem vniū rursus
per siccitatem nequeat, seruat immutatos me-
tus, qui etiam perpetuo transilluentium iētū, in-
dies magisq; siccantur. Per eos igitur, hāc mi-
nimē impeditus est transitus. Sin autē fuliginosus,
terreusq; vapor sit, id quod permeat, imbi-
des contingit, ut in angustis spirantis impac-
tus, nec facile rursus intro redeat, nec item pos-
sit vacuari, sed impellatur ab alio secundo vapo-
re, atq; ille rursus ab alio, & sic consequenter, si-
mulq; multi vapores fuliginosq; iuvicem complati
& coniuncti, in vnum corpus degenerent,
quale est fuligo ea, quae foris cernitur. Fit autem
niger pilus, cum deuito vi caloris vapore, excre-
mentum in exactam fuliginē penuratur. Flauus
verō, cum vapor minus torretur. Nā quod tunc
est impactum, flauae bilis excrementū existit. At
albus pilus ex pituita nascitur. Rufus, si viti co-
loris albi, flauisq; est medius, sic generario eius
ex pituitosa biliofere feces, media quadam na-
tura provenit. Crispi pilis sunt, vel propter siccita-
tem temperamenti, quae interquet illos (qua

Hirsuta est
quae calida est
& sicca.

Glabra exis-
te, quae frigida
est & humi-
da.

Cutis finitiss
aducit esse pi-
lorum genera-
tioni.

Venas angus-
tas habentes,
aegri ferunt ius
dram.

Venas latus ha-
bentes, facili es-
se abstinent.

Feminae cur-
sue viri pin-
guiores.

Esarceni.

Corpulentū qui.

Consuetudo vel-
uti acquisita
natura.
Adipi quae g-
gnatur.

Temperatū na-
turam esse a-
liarum aliarū
seconem.

Sanitatis statu
habemus si le-
ritudinem.
Intemperies sa-
nitatis et mor-
bi, quibus nota
deprehendun-
tur.

Pilum gene-
ratio,
Pili niger ge-
natio ex pitui-
ta,
Pili rufi ge-
natio ex flaua
bile.

Pili albi ge-
natio ex pitui-
ta,
Pili rufi ge-
natio ex flaua
bile,
Pili crassi qui
sunt.

Aethiopes omnes sunt crispi.

ratione Aethiopes omnes sunt crispi) vel propter imbecillitatem exhalationis, quæ rectam vii sibi moliri non potest: vel denique ob duriorē cutis naturam, quæ ipsam exhalationē, etiam si valens sit, prohibet rectāferm regione, cogitque vt ad latera se inflectat, ac fimo obliquum transcurram pariet. Est quidam ambobus coſtutibus, & exhalationis, quæ magis finit, imbecillitate, & cutis ſiccitate, pilorum radicibus obliquitas ipſa contingit. Quales autem in radice ſinguntur, ita

Pilorum varietas ſecundum naturas aetatis, regionum, corporum, tempore naturae.

quidem pilorum eſt generatio. Sequens eſt, vt cauſas omnium quæ temperamenti in pilorum pro xate, regione, & corporis natura, diſcreuit contingunt, dicamus. Ergo Aegypti, Arabes, Indi, quicq; calidam & ſiccā regionem incolunt, nigros, exigui incrementi, ſiccōs, craſſos, & fragiles pilos habent. Contrā, qui humidam, frigidaq; regionem habitant, Illiri, Germani, Sarmatæ, & omnis Scythica plaga, modicē autē, graciles, rectos, & ruſos obtinent. Qui vērō inter hos temperam colunt tractum, hi pilos plurimi incrementi, robuſtiſſimos, & modicē nigros, mediocriterq; craſſos, tum nec proſus craſſos, nec omnino rectos, emittunt. In xatibus ad eundem modū. Infanum quidem pilis, Germani: florentiū ætate, Aethiopi: Ephiborū atq; puerorū, iſi qui temperam locum incolunt, in robore, craſſitudine, magnitudine, colorēq; ad portionem ſe habent. In corporum quoq; natura, ad ætatem & regionē portionē ſimilitur ſe habere pilis videntur. At pueri admodum parui, nudi proſus ſunt pilis, quōd nec meatu adluce villus illis in cute ſit, nec excrementum fuliginofum. Incipientes autem pubeſcere, paruos & imbecilles exiguū. Qui vērō iam florent, hi valentiores, multos, magnos, & nigros habent: quōd & frequentes meatuſ iam illis ſunt facti, & excrementiſ fuliginofi, præ ſiccitate & calore, abvident. Cæterum pilis qui in capite, ciliis & ſuperciliis habentur, etiam pueris nobis innaiſcuntur. Siquidem generatio iſi eſt, non qualis herbis, ſed qualis ſtupribus prima ratione à natura conditiſ, nō temperamentiſ neceſſariō ſequentibus. Verum hi quoq;, quōd quidē ſint, id naturæ arti acceptum ſerunt. Quōd nigri, ruſive, aut alio q; ovio ſint colore, id xans temperamito omnino debent. Subnigri enim ſerē ſunt, quoniam quod in meatibus eſt impactum, nondum totū eſt nigrum: quippe cūm humiditas multa ſit, & tranſitus facilis, & deſtitio imbecilla. Boni vērō incrementi & modicē craſſi ſunt, propter excrementorū, quibus aluntur, copiiā.

Infantes cur glabri,

Pilorum capiti, ciliis, ciliis & ſuperciliis generatio qualis eſt.

Siquidem ipſa pars corporis, in qua ſunt, ſicca eſt. Tota namq; calua offea eſt. Cuiſ vērō quē ille eſt circumdata, tota reliqua totius corporis cute eſt ſiccior, quanto durior. Aſcendunt tamē tum ab iſi quæ circa cerebrum ſunt, tum vērō ex toto corpore, fuliginofi excrementiſ non parua vis. Quo ſit, vt quæ ætate florentibus totū corpus, tuſmodi iam infantibus ſit capitis cutis. Eōq; rationabilis nōnulli procedente tempore calui redduntur, quibus ſcilicet à primo ortu cutis durior erat. Siquidē in ea cute, quæ fuerit ſiccata impenſius, nihil uacui poteſt. Itaq; etiam

interna manuum, & interna pedum, ſemper ſunt pilorū experta, quōd ſicciffimū, denſiſſimūq; in tendo ſit, qui ſub cute habentur. Quibus autē ad ſummam ariditatem cuius capitiſ non pervenit, imbecilliſ iſi omnino, albiq; pilis ſunt: quos vulgō canos appellat. Imbecilliſ quidem, congruentis alimentiſ penuria: albi vērō, propterea quōd alimentū quō aluntur, veluti marcor pinuit eſt, quæ ſpacio computruit. Vbi enim meatuſ etiamnum manet, excrementū vērō exiguiſ eſt & lentū, languidēq; à calore propellitur, non diſſimilitur putredini afficitur. Iam calui ſunt homines, cum ſenectute, à ſyncipite magia. Caneſcit magis à temporibus, quoniam regio illa eſt omnī alarum ſiſſima. Hæret enim cutis illic oſiſ nudo. Tempora vērō, humidiora ſunt, quōd in iſi muſculi magni ſub ipſa cute habentur. Omnis namq; muſculus carnoſus eſt. At caro tum oſſe, tum cute humidior. Verū enim vērō, quandoquidem humanum corpus nōnullis quidem æquabiliſ per totum temperamto eſſe poteſt, nonnullis autem, neq; iſi paucis, in xqua liter eſſe affectū, cūm eorū alix particulæ temperatæ, alix intēperatæ eſſe poſſint, certē ex vniat particula corporis, ſimpliciter de toto ſemper coniectandum nō eſt. Neq; enim hi, qui docere mores ex ingenio corporis proſiſtunt, de omnibus pronunciant ſimpliciter. Verū ſi quis impenſe luſto eſt peſſiore, hunc andacem iudicant. Sin cruribus luſtis, ſalacem. Quare hominū temperamto conſiderandus, ſinguleſ partes per ſe examinandæ ſunt. Nec ſi cui thorax hirtutus eſt, huic totū corpus calidius, ſiccioſiq; ex neceſſitate purandum: ſed plurimū in corde caloris eſſe, eōq; andacem illum, cui talis fuerit, exiſtere. Poſſe vērō aliquādo etiam huius ipſius rei occaſione accidere, quō minus totū ſiſ corpus ſimilitur calidum ſiccioſiq; ſit, quōd ſcilicet plurimū caloris ſurſum ſpirauerit, atque in ambienſe abierit. Nam ſi tota corporis temperies æqualis ſit, erit iſi ſtatim thorax ipſe vniuerſis latiffimus, venæ amplæ, arteriæ magnæ, ex dēſq; maximē vehemētiffimēq; pulſantes: tum plurimū per totum corpus pilis, atq; iſi quidem in capite plurimiſ incrementiſ, uigni, & criſpi: vniq; in prima xate. Procedente vērō tempore, caluities excipiet. Hiſ etiam & robuſtiſ, & exatē delinariū, & muſculoſum totum erit corpus: tum cutis nigrior, durior, hirtutidēq;. Ad eundē modum ſi cōtraria omnia in thorace ſint, atq; xquilia in toto corpore vigeat temperies, hoc eſt, ſi humidiores & frigidiores vniuerſeſ corporis partes fuerint, thorax quidem anguſtiſ, & glabriſ erit: ſicvti enim totū corpus pilis nudum. Cutis vērō mollis & alba, capilli ſubſtrū, porriſſimum in iuvenute. Hi in ſenectute nō caleſcūt, nimidiq; ſtāim, & ignaui, & ſegnes: addē etiam, paruiſ venis, ac minimis conſpicuiſ, & adipoſi ſunt. Idem neruiſ miſculiq; imbecilliſ, & artubus parū exatē delinariū, & bleſiſ. At vbi varia partiū temperies eſt, ex vna earū, de toto pronūciare nō licet: ſed addēdæ ſinguleſ ſunt, earūq; temperatūſ ex functionibus ſigillatim inſtigandæ. Cuiſ ſiquidē in noſtra regione (quæ temperata eſt) ſubiectæ partiū naturā prodit. nō ta

Vale manus cur glabra. Planta pedis cur glabra. Cuiſ qui ſit.

Caluities cur in ſyncipite magis. Canities cur in temporibus potius.

Pronunciant ſimpliciter de corpore vniuerſo ſi nō oſſe, ex vniat cuius particula.
Hic peſſiore, andacem.
Hic cruribus ſalacem.

Caluiſ ex ſiſ temperamento nuda.

Frigida humidior temperamto nota.

Temperies partiūſ ex carnis ſuſtinentibus perſiſtenda. Cuiſ in regione temperata, ſubſtantiſſimum partium naturam prodere.

men omnino, sed earum tantum, quæ similem habent ipsi cum temperie. At in regionibus his quæ recesserunt à temperamento, nõ potest ex eo affectu, qui in cute cernitur, internarum partium temperes clare discerni, cum internæ externarum partes non ad eundem modum habeant. Gallis enim, Germanis, & omni Thraciæ ac Scythico generi, frigida, humidique cutis est: idedem etiam molis, alba, & pilis nudata. Omnis verò natura his calor in viscera confugit, una cum sanguine: ubi dū agitur & premitur, feruē, iracundi, audaces, & præcipiti consiliu redduntur. Aethiopibus verò & Arabibus, omnibusque breviter his, qui ad meridiem incolūt, natura cuius ex ambietis æstu & naturali calore foras acta, vita, sicca, dura, & iugra reddita: toto nimirum corpore, naturalis quidem calor exiguus obnente portione, sed alieno, atque adiciunt incalescente. Quare attendendum in singulis corporibus est, siuone ac proprio, an adficiunt calore incalēant. Quæ enim putrefcit omnia, adfinitio calorem suum calida, frigitur proprio. Qui meridiani plagam incolūt, adficiunt calore sunt calidi, proprio frigida. Apud nos quoque naturalis calor hyeme est vberior, adficiunt minor. Aestate contrā, adficiunt maior, & naturalis minor. Omnia namque hæc definit oportet, quæ respectu temperamentum est cogniturus. Nec enim si cuius nigrior appareat, totus homo omnino calidior est. Nam si alter in sole versatus diutius fuerit, alter in umbra, ille nigror, huic albidior cuius erit. Verum hoc ad totum temperamentum alterationem nihil facit: quare singule partes particularem examinandæ sunt, iudicandæque ex functionibus propriis. Verbi gratia, venterculus, si bene cōcoquit, temperatus si non bene, imtemperatus cognoscitur. Si nidorosus, vel fumosus ructus edat, quod igneus calor in eo sit: si acidus quod imbecillus, & deprehendens. Simili modo, si qui bubulam, & omnia quæ cōcoctu difficilia sunt, concoquant, quod immidicus eorum calor sit: si qui autem hæc cōcoquere nequeant, efficiant autem saxatiles pisces, alique similia, quod infirmus, pronunciare ne dubites. Videndū autē his rursum, num succi alacrius vel unde confluentis culpa, eiusmodi symptomata venterculo accidit.

Cutis frigida et humiditate quæ hinc.

Tracanda natura quæ.

Putrefactio omnia, adficiunt calorem esse calida, natura h. frigida. Aestate adficiunt calorem esse maiorem, proprio minus rem, contrāque hyeme.

Venterculus imtemperatus, imtemperatus nota.

Romanum regnum esse admodum humidum.

Bilis in venterculo quæ conficitur.

duntur. Quibus autem vnicus est omnino meatus, iis tota bilis in iecunū confuit. Hic igitur debet nobis dignoscere, primū quidē, ex totius corporis temperamento. Deinde ex his quæ infra cernuntur. Tertiū notæ genus, in his quæ vomitu reicuntur, consistit. Si quidē multā colligit bilem, cuius nihil per superiorem partem excernit, h. biliosa mera deiciunt. Qui autem & pituitosus sunt corporis habini, & bilem evomunt, ab his minus deiciuntur biliosa, quidē & minimū fluxu bilis gignant, & eius maxima portio in superiorem ventrem perveniat. Iam verò, quibus in ventre biliosum excernentū gignitur, id porri virore præfert: debet omnino vis cibis fusile cū iusto calidior, tum cacochymus. Quibus autem ex iecunore in ventrem defluxit, his fluxa est, pallidave evomitur, etiā si boni in primis succi fuerit id quod sumpserit, ad summūque fuerit concoctum. Imò verò magis iis qui ad vnguē coheret vomitur fluxa: atque etiā magis his, qui diutius iis bo abstinuerūt. Quæ verò bilis porri refert, iis solis gignitur in ventre, qui vtiq; concoxere malē. Quinetiā sollicitudo, ira, dolor, labor, exercitatio, vigilia, & inedia, plus fucci fluxu bilis coheret, propterea quod plus eius in iecunore gignit. Sunt igitur hæc certa indicia: tum præterea, quod ubi sicū & igneū venterculi calorem cōversio ad biliosum sequitur, panis, & iuilla, & bubula caro, cōmodius quam saxatiles pisces coquantur. Quod si ex iecunore bilis affluat, ex coheretiorū mutatione nulla secutura est cōcoctio: his diversitas. Ad eundem modum, si defluxit in capite in ventrem pituita, acidi ructus in causa est, aut si caput etiā dolore tentetur, discernere semper oportet illa quæ propria sunt, ab iis quæ per cōsensum accidunt. Iam cerebrū ipsum cuius sit temperamentum, per se estimare est satius: nempe ex canine, carathis, rursi, destillatione, & saluæ copia (quæ illud frigidius, humidiusque esse docent) quidē ex corporis totius affectu. At calities ex siccitate provenit. Nigriorū autem, & frequentium pilorum proventus, æqualis in cerebro temperamentum est nota. Qui igitur refimos, humidus, ad vicos autē absolute siccus dixerūt, dupli nomine hallucinari videntur. Primò, quod vnius particulari occasione, de toto corpore pronunciare sunt ausi. Secūdo, quod formatricis in natura virtutis, aut reflex facultatis est, & particularis secundū animæ mores effingit, parum me minerit. De hac enim Aristoteles dubitavit, nūquid diuinius originis esset, atque miscella elementorū diuersa. Rationi autē est consonū, qualitates quidē esse organa: aut formatore, album. Nec verò propterea quod pueri nati sunt magis sunt refimos, florescentes ætate magis ad vicos, idcirco rationabile est, refimos omnes censere humidus, ad vicos siccus: cum fieri possit, ut formatricis potentie id opus sit, potius quam temperamentum. Quod si temperamētū est nota, atque certē quod in naso tantum habetur, non eius quod in toto corpore, nota fuerit: nisi forte totius corporis temperies, cum eandē temperamētū per ratione se habeat. Ad eundem modum est iudicandum de cute, de cæteris quoque corporis partibus. Nec enim si cutis sit dura, necessario sic-

Bilis vniuersa quibus in iecunore confuit.

Nota quibus discernitur h. quibus bilis in venterculo atque in iecunore confuit.

Bilis præfata quibus in venterculo gignatur.

Bilis gignatur.

Bilis orta ab igne calore venterculi, quæ confuit in iecunore, indicia.

Cerebri temperamentum quibus ad similitudinem sit nota.

Calities ex siccitate oritur.

Formatricis natura effingit particulari scilicet de anima moris.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

Qualitates esse organa apostolica.

cum est animans. Quippe ostrearum corpus hu-
midissimum est, cutis ipsa siccissima. Verum si per
totum æqualiter sit corpus attemperatum, ratio-
ne est, ut qualis sit cutis, talis sit & reliquarum par-
tium vnaquæque. Speculandum præterea in vul-
nerisum est, ex quibus in quæ mutationes ipse
sunt factæ. Fit enim nec raro, ut præsens nota,
prioris temperamenti sit, non eius quod in corpore
nunc habetur. Veluti si quis sexaginta annos
natus, denso pilo sit, non quod calidus &
sicus nunc sit, sed quod talis antea fuerit. Iam
verò neque ex ipsa excrementorum natura, in-
definitæ de temperamentis est pronuntiandum.
Fieri siquidem potest, ut colligantur pituitosa
excrementa, nec tamen humida sit particula, sed
simil frigida & sicca: cum nimirum ex obis, neu-
triquam ex nostro corpore, ipsa pituita oriatur.
Corpus enim ubi ingestos cibos non vincit, si-
milis ipsum quoque excrementum gignit. Cæ-
terum quod non omnia quæ calfaciunt, necessa-
riò etià exsiccant, ut perperam nonnulli putant,
nemini obscurum existimo. Aqua siquidè calida,
& quæcumque natura sunt calida & humida, si in-
flammati, ex ipsi gratia, admoveantur, tamen ipsa
quidè superflua cæcæ, quæ media similitudinem
spatiæ occupant, evocet, corpora tamè ipsa tan-
tum abest ut siccat, ut etià illis humorè adducat.
Atque iam hæc scdum cōmentariū claudamus.

GAL. DE TEMPERAMENTIS LIB. III.

*Alto calidum,
frigidum, humi-
dum atq; siccum,
quævisque dicantur.*

*Potestate quæ
dicantur.*

*Alia, perfectio
atq; præsentis
quæ.
Potestas, imper-
fectum atq; fu-
turum.
Potestas pro-
prium quæ
dicantur.*

*Oliva in flam-
mā veniens.
Terra in pru-
nā degenerans.*

Cum igitur antea tradidit sit, vnumquodque
actū calidiorū, frigidiorū, humidiorū, atq;
siccorū, vel ex eo tale dicat, quod summa ha-
beat huiusmodi qualitatē. vel quod vincat in
eo id genus qualitarum aliqua: vel quod ad co-
gnatū generis mediocre aliquid, vel ad vnum-
quodlibet, à nobis sit collatum: monstratumq;
præterea sit, quem admodum ea quis cognoscere ex-
actè possit: reliquum est, ut de eis, quæ talia po-
testate sunt, differamus. Etenim quod quæ dicitur,
tale nōdam est, sed potest tale esse, id hoc esse
potestate dicimus: verbi gratia, hominē qui
nuper natus fuit, rationale, & aënem volentem,
scilicet quod eorū vnumquodque futurū est, hoc
cui iam id sit, appellamus. Est autem perfectum
quid, ac præsens, ipse actus: sicuti imperfectum,
ac futurū, potestas. Ac maximè quidem propriè
sola ea potestate esse dicimus, in quibus natura
ipsa suo pte impetu ad abolitionē venit. Proxi-
mus hinc modus, eorū sit, quæ sunt propinqua
materia, ut dum sanguinem potestate carnē ap-
pellas, quod inuicem mutationē ad carnis ge-
nerationē requirit. Dicitur potestate etià esse,
quod ei quod ex accidenti dicitur, est ex adver-
so positum: ut si quis dicit, frigidam lauanonē
ex accidenti, non ex propria potestate calfacere
corpus carnosū iuuenis. Porro quæcumque medi-
camenta calfacere nostrū corpus sunt nata, ea,
licet talia nō appareat tangenti, calida tamen po-
testate vocamus, quod facile possint calida esse,
quodque promptè in ignem venturam: hoc inter
secto discernimus, quod oleosa & ætrea, in flam-
mam, in prunā autē terrea degeneret. At quem-
admodum neque ignis ipse augetur prius quam

victa ab eo ligna mutata sint, ita nec animantium
calor à medicamentis, nisi illa prius & cōmutata
aliqua intersperet, & nostro corpus nūctā, ab ipso
etiā mutetur. Quæ quidem si perfrigerato cor-
pori quātumvis tenuia inspergantur, non califica-
cent illud. Proinde quæ refrigerant sunt præterea,
eiusmodi medicamentis plurimè perfrige-
mus, rarefacimusq;, quod scilicet in interiorum phar-
macum penetrant, naturalia animalia calori in-
tūctum, mutant, & calfat: quippe cuius si parti-
cula quæpiam vel minima, calorem actū concipi-
at, hunc deinde in totum, propter connuitatem,
porrigat. Ac quicquid potestate quidem ca-
lidum est, huc nondum in natura sua frigidum ca-
lidum præpollat, sed in propinquo est ut præ-
pollat, adeo ut breuē opem quod vincat, requi-
rat extrinsecus. Hanc illi modò frictio abvnde
præstare potest, modò vel ignis, vel corporis na-
tura calidi contactus. Alia tamen citius, alia tar-
dius corpus nostrum calfaciunt. Cum autem
quatuor sint corporis facultates, attractrix, re-
tentrix, alteratrix, expulatrix, quæ effectus sunt to-
tus in quovis corpore substantiæ, quam consti-
re ex calido, frigido, humido & sicco, inter se mi-
stis, dicimus, sanè ubi corpus nostrū vnaquali-
bet earum qualitatū corpus sibi ad mortū demu-
tar, nec ipsum hoc casu tota substantia existens-
dum est agere, nec quod ab ipso mutant, posse
ei assimilari. Quare nec vnuquodque nutrit quod ita
mutari est, id quod ipsum mutant. At si exactè
illud mutet, id est, si tota operetur substantia, ut
quæ tūc sibi assimilabit id quod mutabitur, tum
etiā ab eo nutritur. Neque enim aliud nutritio
est, q̃ assimilatio perfecta. Omne autem animal
cōgruenti, sibiq; simili alimento nutritur, qua-
le est, quicquid corpori, quod nutritur, assimilari
potest. Cæterū pro ratione similitudinis, alia
citius, alia tardius assimilantur. Aut siquidem
caro, haud magno negotio: nulla, maiori: bubu-
la etiā læta natio: vnum verò, omnī mini-
mo, assimilari poterit, ubi prius in instrumentis
coctionis manserit aliquandiu. In quibus ante-
quam demutari sit, fieri non potest, ut animalis
corpori sit nutrimentum. At quæ quidem assimi-
lantur, omnia quidem nutrimenta vocantur: reli-
qua omnia, medicamenta: quorū duplex natura
est. Quippe vel cuiusmodi sunt assumpta, cuius-
modi erant permanenza, vincunt, corpusq; mu-
tant, ad eundem modum, quod id cibos: atq; hæc
prorsus tum venenosa, tum naturæ animalis cor-
ruptoria medicamenta sunt. Ut mutationis in-
itium ab animalis corpore consecuta, deinceps
iam putrescunt, & corrumpunt, ac deinceps cor-
pus vni corruptum, & putrefaciunt. Sunt hæc
quoque noxia venena. Est præterea & tertia medi-
camentorum species, eorum nimirū, quæ corpus
quidem recalcant, mali tamen nihil afferunt:
sicuti & quarta alia eorū quæ & agunt, & patiun-
tur aliquid, sed spacio vincunt, planèq; assimi-
lantur: quibus accidit, ut tam medicamenta sint, q̃
nutrimenta. Nihil autē miri est, si exigua conse-
cuta momentū aliqua, maximam à priori natu-
ra mutationē habent: cum cōstat olim in Myria-
domū integrā cōlagragie ex solo stercore colli-
bino, quod ab ardenti sole inflammari, fenestris

*Medicamenta
augere calorem
nostrū non pos-
se, prorsus ab
ipso mutantur.*

*Facultates no-
stro corpori
quatuor, attra-
ctrix, retentrix,
alteratrix, ex-
pulatrix.*

*Nutritio est as-
similatio perfe-
cta.*

*Animalia om-
nia sibi simili
alimento nutri-
tur.*

*Vni quæ ei-
usmodi assimi-
lari possit.*

*Nutrimenta
quæ dicantur.*

*Medicamenta
tum naturæ de-
plici perueni-
unt.*

*Medicamenta-
rum familia-
ritas naturæ de-
pici.*

*Stercoris colum-
binum inflama-
bile.*

p proxime

Archimedes in-
dignus.
Spirita vici-
na.
Lapides autem
olunt flammam

Medea medica-
mentum

Calida pote-
stas.

h. a. b. c.

Vinum muta-
tur aliter.
Nutrimentum
dicitur tripliciter.

Vinum immu-
tatur aliter, si
gula afflicta
inducere.

Erdentiam cu-
tam nonnulla,
cur intra tunc
sumantur.

Nihil intra fi-
rile, parum a-
grois famula-
tum ferre.
Lachrym Cy-
renaticam tunc
per se non sumi.

proximè suum communicavit incendiū. Quia rati-
one etiam aiunt Archimedes hostiū trementis
virentibus speculis incendisse. Succenditur his
promptè lana, stupa, ellydinium, ferula, & quie-
quid similiter his succum & tarum facit. Flamma
edunt & lapides artem, atq; eò magis, si quis
sulfure illos alleuerit. Quare lucernā exnugnens
quidam, ac rursus lapidi, vel muro admouens;
quē antea sulfure alleuerat, eū prodigiū quid il-
lam accensum ostendit. Eiusmodi erat medica-
mentum Medec, ex sulfure & humido bitumi-
ne constans: quod quidem quibus illatum erat,
omnia, ubi in id incidebat calor, accendebat, &
inflammabat. Vniuersa igitur hæc, potestate di-
cuntur calida. Iam verò quicquid corporum na-
tura calidorum proprium est nutrimentum, id
ea semper non corroborat tantum, sed etiam insi-
tum eorum calorem augere: id quod omni nu-
trimento est commune. At vno prater cetera pro-
prium ac suum est, mutationis celeritas, ita utiq;
veredæ, ellychium, stupæ, & picæ. Porro cū
fratram nutrimentum dicatur, secundū Hippo-
cratem, nempe & quod nutrit, & quod vel nu-
trimentum est, & quod futurum est nutrimen-
tum id utiq; quod iam nutrit, propriè nutrimen-
tum vocatur, cū corpus nutrit & calefaciat:
quod reliquorum neutrum facit. Quemadmo-
dum igitur si exigue & imbecille flammæ,
consertim multo olei infundatur, illam prius ex-
tingueret, sic etiam vinum, ubi plus bibitur quā
ut vini possit, tantum abest ut animal calefaciat,
ut etiam apoplexiam, stuporem, comam, caros,
neruorum resolutiones, epilepsias, convulsio-
nes, & tetanos, qui affectus sunt frigidi, indu-
cat. Quoniam enim, quæcumque assumpta in
corpus ut nutrimentum calefaciunt, licet interim
frigerare deprehendas, si in modicū aut intem-
peratū sumantur. Nec verò mirari debemus, si
nonnulla que cum impossita, hanc erodunt, exvi-
cerantur, ut sinapi, muria, alia, & cepe quamui-
tissime comedantur: cū nimirum neq; intus in
vno semper loco permaneant, sed vndeque
ferantur, ac tum cibis, tum variis succis permi-
sita cōmunita, innumeras subeant alterationes:
ita ut quod conveniens in eis est, assimiletur:
quod supervacuū & acre, per alium, vrinæ;
sudoremq; excernatur. Quod autem si acrimo-
niam suam seruent, etiam exulcerant interi-
na, ex his quæ ob cacochymiam spontè accidunt
viceribus, cū in internis partibus, tum vel ma-
ximè in ipsa, cure, facit intelligere potes. Neq;
enī est dicitur, cur medicamento, nonnulla,
cū nihil non offendit extrinsecus, intro assum-
pta magnū afferant malum: aliqua rursus intro
assumpta, nonnunquam iedant, nonnunquam
conferant: aliqua non solum intro assumpta, sed
etiam extrinsecus applicata offendant. Quippe
nihil intus forisq; parum agendi facultatem
sortitur. Mirum enim esse non debet, si lachrymam
Cyrenaticam ipsam quidem per se non licet
ita in modum fumere: quæ tamen si omnino
exigua, vel cum aliis opportinè sit sumpta, ma-
gis opere conducit. Atque ad hunc quidem mo-
dum, quæcumque corpus excalefaciunt, ubi mu-
tationis principium in ipso accipere, recalcifacere

re illud sunt apta. Quæ verò refrigerant, veluti
papaveris succus, licet & nostro corpore, ne vel
paululum quidem demutetur, sed ipsum statim
vincunt, ac mutant, etiam si calfacta prius dede-
ris. Est enim eorum natura frigida, ut aqua: quæ
per se quidem frigida est, ex accidenti verò ali-
quando calida. Verum acquisitio eius calor
breui perit, naturalis frigida manet. Quemad-
modum igitur aqua calida flammæ iniecta
eam extinguit, sic in eorum, vel si id quantum-
vis calfactum dedens, & calorem animalis per-
frigerabit, & necis periculum afferet. Quan-
quam id genus medicamenta, si parçè exhibita
sint, & vna cum his quæ ipsorum frigiditatem re-
nuntiant, nonnunquam vsum aliquem hostis cor-
poribus præstent. Iam verò medicamen id quod
cantharidas recipit, lydenicis auxiliatur, tam-
enī cantharidis ipsa vnicum exulceret. Discerne-
re autem in omnibus quāmaximè oportet, quæ
per se sunt, ab his quæ per accidens. Nonnulla
quippe cum siccam sint forma substantiam, ubi
largo calore liquata fuerint, humiditatis specie
exalubent: vires, & ferrum. Quædam per se hu-
mida, ubi in sincero frigore sunt morata, appa-
rent sicca: vti glacies. Quocirca de illis absolute
pronunciandum non est: quæ qualiter in calore
frigoreq; se habeant, considerandum: ac sic tan-
dem non ad id quod secundum accendens est, sed
ad id quod per se, respiciendū nobis iudican-
dum. Porro cōmunis in omnibus, vniq; iudi-
candi ratio, est alterationis celeritas. At cum ca-
lidum, frigidum, humidum, atq; siccum, *humidum*
dicantur, nempe hæc quidem, per id quod ex-
perat: illa verò secundum qualitercumque quam ha-
bent summam, à qua nimirum denominantur:
in vtriusque horum promptè veniunt, de quo
agitur iudicium, tale potestatis fuerit. Oleum nan-
que, binum, resina, & pix, calida potestate sunt,
quod in flammam vertantur facile. Vinum au-
tem, quod facile fiat sanguis. Puri modum mel, ca-
ro, & lac. Atque licet quidem, totis ipsorum, al-
terans substantias, nutrimenta se alterantia sunt.
Quæ verò vnaqualebit qualitate alterantur, ac
mutantur, ea medicamenta tantum sunt. Medi-
camenta iidem sunt, & quæ nulla substantia
sue mutata parte, sed tota seruata integra, cor-
pus ipsum afficiunt. Ceterum totum eorum ge-
nus naturæ ipsi contrarium, graue, ac maxime
deleterium existit: quāvis ubi planè exhiben-
tur minimè, nullum exhibent sensibile nocu-
mentum. Porro iudicandum contraria: ipsorum,
ex ea, quæ media intercedit, mutatione.
In elementis, verbi gratia, neque aqua mutari
potest in ignem, neque ignis in aquam, sed ambo
in aërem, ipse verò in vtraque. Ergo continens
& sine medio est aquæ matatio in aërem: itēq;
ignis: non continens ignis & aquæ in altervtrū.
Hæc igitur inter se contraria, pugnantiaq; sunt.
Non dissimili ratione papaveris succus huma-
no corpori prius contrarius est, ut quod in
eum quicumq; agere, ne vix quidem qualitate
possit, ac multo minus tota sua substantia. Atq;
vnum quidem deleteriorū genus cuiusmodi est.
Alterum est eorum, quæ ex nostro calore mo-
mentum aliquod mutationis accipiunt, ac delin-

Papaveris suc-
cus non immu-
tatur à nostro
corpore.
Aqua per se est
frigida.

Cantharis ve-
licem exulce-
rat.
Diluvium quida
esse, quæ per se
atq; ex accidenti
si dicuntur.

Potestate tale
qua ratione di-
catur aliquid.
Potestatis calida
quæ dicuntur.

Nutrimenta
quæ.
Medicamenta
quæ.

Deleterium quæ
dicuntur.

Contraria
qualiter audi-
canda.

Elementis in
se vici trāsi-
tu.

Papaveris suc-
cus humano
corpore omnis
no contrarius.
Deleteriorū pri-
mum genus.
Deleteriorū si-
cundum genus.

de in multitudine alterationes vertuntur, quibus corrumpi naturam nostram accedit. Quæ igitur corpus rodit, putrefaciunt, & liquant, merito potestate calida nominantur. Cõtrâ, quæ refrigerant, & sensum auferunt, notabilemque inducunt torporem, frigida. Verum in applicandis usque natura quidem sunt frigida, sed per accedens calida, cõtingit eorum calorem acquisitum necesse perire: propriam autem temperiem frigidam, à nostra usul immutarem per

lucrare. Atque nam admodum solum mandata ad cer-
tum usque terminum ab igne nihil paritur, virtus
autem hic longiori spacio sic igni admota: sic &
mandragora, & cicuta, & plumbum, breui spacio
igni applicata, proprium adhuc temperamentū
seruant: largius autem exalfecta, illico corruptū
pūtur, nec quicquam efficere, eorum que prius
poterant, valeat. Et italium quidem omniū na-
tura, hominibus maxime existit contraria: eorū
verō que celerissime nutriunt, cōvalescentissimā. so
Reliqua omnia, media inter hæc sunt, quorum
alia magis, alia minus agere ac panā in nostro cor-
pore possunt. Si quidem calidiorum & piper, agere
magis in corpus nostrū, quam pari ab eo va-
lent: vinum, & mel, & pīnia, pari magis quā
agere. Cæterum vii duo corpora inter hæc, quā-
vis multa repugnant tempore, certantq; de alte-
ratione, vniūq; eorū tum agere, tum pati est ne-
cesse. Semper quippe agit id quod vivit, in id
quod vincit: adeo tamen exiguū vi sentimū
effusit. Hoc enim in eis que nutriunt, etiam so

comptum est. Lactica liquidum, quando ab
gestu aut venterico coquitur, manifeste quidem
refrigerat, sitim compellit, atque adeo quod frigi-
da & humida sit, somnum conciliat. Vbi vero
ex ea nutritio liouio iam fuerit, insini caloris vi
stanniam augebit. Ventericulum autem ea laci-
da refrigerant. Quare vbi id genus vtriusque præ-
statur, & quod veluti medicamenta corpus no-
strum afficiant, & tanquam nutrimenta natura-

lem calorem augeant: cum hoc exploratum iam
fit, interdum qualiterque caloris intendi, inter-
dum substantiam eius augeri: si ergo noui con-
coquitur lactuca, aut si maior, succus ipsius,
quando is, si liberalius sumatur, similem cum pa-
uere succo in homine effectum sortitur, erit
vix tantum medicamentum: at si absolute co-
quatur, quis ambigit, quin corpori etiam sit nu-

trimentum et effluca inquit, tum cibis, quam frigidi
dum medicamentis exaritur. Erna autē, & ex lili-
bus anethum, ruta, origanū, pulegium, calamim-
ditha, rhymba, atq; rityumum, tum cibi, tum rhy-
mamenta calida sunt, dum scilicet adhuc coquan-
tur, medicamenta: mutata verō in sanguinē, na-
tūmēta: secundū unumrum nutrimenti signifi-
catione, quā id significatur, quod nondū ē ali-
mentum, sed velut alimentū. Si igitur frigidior
iusto fuerit ventriculus, quāduo in eo delin-
teant, donec coquantur omnes id genus herbe,
calfaciunt ipsum, atq; ad temperamenti aequali-
tatem revocant, profuturū vī medicamentis. Si ve-
rō calidior impediō sit, inflammabūt illum, ac
magis opere ledent: atq; hās quidem alteratio-
nes, quālibet via inducitur. Nam omnino perco-
ctē, atq; in sanguinē bonū convertit substatiam

caloris naturalis augebunt, non qualitate intendunt. In vniuersum autem, siue frigidus, siue calidus potest esse sitibus, postea quod in sanguine est cõuersus, naturalem similitur calorem augebit. Quod verò ad sanguinis formam ipsestat, nec dum plane sanguis est redditus, refrigerat, calfacit animal, medicamentum rritu. Etenim cuiuslibet corpori proprietas quædam temperamentalis est, quæ huius quidem nature cõsistentis, hac vero diffinitio videtur. Quod si id quod sibi cõsistentis est, in suam naturam transmutet, caloris proprii substantiam augebit. Sin verò ipsum temperamentum mutatum sit, vitio vel calorem quendam conquirit, si id à quo est mutatum, siue

calidum: vel etiam proprium astringit, id est mi-
nimus caliditas. Quare omnia eiusmodi ex eorum
sunt numero, quæ ad aliquod relata dicuntur:
cum ad proprietatē mutantis nature, quæque
affumunt, vel nutrimentum, vel medicamentum,
vel utriusque nomen fortatur. Verbi gratia, cicuta
stirno nutrimentū exurit, homini medicamen-
tum. Rursum, contrarius verumum est nutrimentum,
homini medicamentum. Ergo manifestum
iam arbitror factum, iudicium eius quod respec-
tus nostri calidum, frigidum, humidum, arque
siccum dicitur, non ex illis quæ posita extrinsecus
sunt, sed ex illis quibus ipsi afficiunt, certū ex-
actumque fieri posse: arque id tanquam primum ac
maximum spectandum esse deinde, firmes ex-
igit, etiam quod ab externis petitur: idem quo-
que modo, sed secundum quædam, vel secundum

Vrignus abfoluuntur iudicemus, cibis vel medi-
caminis quod amocetur corpori, expers effe
dicimus acquirit calorem & frigoris, planis effe
tepidum. Nam hoc poteftate frigidum, cum id
applicas, manifefta caliditas, frigus calidum refri-
geres, corpus primo occurfu qualitate acqui-
rit, non eius que propria eſt rei admore, ſenſus
afficitur. Applicatur autem ipſum medicamen-
tum, quum eius vim exploras, non cuilibet cor-
poris affectui, ſed ſimpliſſimo, & ſummo.

Quod si fummi quidem caloris affectionis ad-
modum, fingens sensum excuter, erit profectio fr-
igidum. Pari modo, si frigidus affectus applica-
tur, calidum illam apparet, ad quodque erit ca-
lidum. Si uel calidus affectus calidum, uel frigi-
dum frigidum percipitur, non est quod hoc ca-
lidum, illud frigidum omnino pronuncies. Iudi-
cabitur autem quod ex accidenti aliquid facit,
num ex affectu ipso, ium tempore. Ex affectu, li-
vius est, et simplex; ex tempore, ad hunc modum.

Calor enim in
sanguinem ver-
sus, naturalis
calorem dicitur.

Ad aliquid
quod dicitur.

Cicuta florum
mastrumand non
evoluta,
Veratrum of
mastrumand non
colitrapobum,

Medicamenta
anatomica ex-
ploranda esse
admonenda te-
pe, & corpora
simplicissima
affilia.

Accidit ut
aliter quali
ter audenda

Aqua perfusa
frigida, calfa
ut ex acciden-

Calore acci-
denti refrige-
rat.
Polymenacis
veritas & ca-
ratio.

C18

tis refrigeratio. Ergo cū duplex, in his quæ phlegmone laborant particulis, affectus cōstitat, vñus quidem in quantitate, alter in qualitate, sequitur prioris curationem, etiam posterioris cura ratio fiuntque ex accidenti etia medicamenta, quæ materiam calcentem evacuant, inflammationis etiam particularū refrigerantia. Sed pro modo simplicis affectus etiam vñus medicamen inveniatur modus. Nepe calidum in summo affectu, frigidum in summo medicamen paratur. Paululum recedenti a summo, medicamen etiam pro ratione ad habeto, quod declinet parū a summo frigore. Quippe si auspicatus a tali comestura exanimis exploratus, facilius propriam vim eorum inveniatis. In vniuersum autē, in omni simplici affectu calido, quodcumq; adhibuit medicamen primo ūtami occurſu, frigoris sensum auuluit, id frigidum potestate est: ac multo profecto magis, si post primam exhibitionem tale perpetuo manet. Quod si prorsus calidū ipsum affectum sanet, frigidum id ex necessitate fuerit. Adhibendum verō est, quum exploratur quidem, omnino tepidum. Vbi autem iam cognitum est, & grata curatione sentitur, rectius frigidum sumitur: nūi medicamen quidem ipsum, summi sit frigoris, morbus autē in summo calore non sit. Porro cū frigidum calidūve aliquod per se, vel primò, vel nullo intercedēte medio, esse ductum, omnib. eiusmodi verbis idem potestate significamus. Quæmadmodum igitur actū calidum corpus dicitur, vel vt summam caliditatem habens, vel vt præpollentem duntaxat, vel vt collatum ad mediocriter sui generis, vel ad quodvis aliud, quicquid fors ipsaulerit, sic etiam quod potest esse calidum est, intelligi, probariq; multis modis oportet. Quo vñq; minus recte, si quid non itatim inflammatur, id aliqui, vt ad nos quidem, calidum nō esse potestate existimant. Nam siue facile concoquitur & citò nutriti, siue admodum, veluti medicamentum, calfacta, citid vt ad hominem potestate calidum. Est enim ex his quæ aliquid referuntur, quicquid potestate aliquid dicitur. Quare et probatio quæ propria est, melior vñque est, quàm quæ ab exteriori petatur. Propria vero est vna in singulis, vñque si celeriter tale fieri appareat, quale id esse potestate diximus. Est enim potestate ignis, quicquid eeleriter in ignem vertitur. Potestate verò calidum, vt ad hominem, quicquid homini applicitur, naturalis eius caloris vel qualitate, vel substantiam adauget. Idem etiam & de aliis censendum est, quæcumq; potestate frigida, humida, & sicca dicuntur. In omnibus autē, ita illis iple, qui iudicaturus est, omnis acquisititij caloris frigorisq; oportet sit experia.

Frigidum potestate.

Medicamen tale applicidum fit.

Actū & potestate calidum quæcumq; simpliciter dicitur.

Quæ potestate dicitur, etiam referuntur ad aliquod. Probatio propria.

Tactū indicaturum expectantia, debere esse experia a liuoratum calidum.

GALENI PERGAMENI de inæquali in temperie, liber

vnus.



Næqualis in temperie aliis in toto animalis corpore fit, veluti in ea lydropis specie, quæ austeria vocant, acere in omnibus febribus, exceptis quas appellamus hæticæ: inter dum in singulis partibus, idq; tum ob fluxio-

nem, vt dum ex tumore aliquo præter naturam affecte sunt: tum ob solā qualitatis alterationē, quæ multatari solet accidere, atq; in octo in temperaturas, quatuor quidē simplices, quatuor vero cōpositas, vt diximus antea, digeruntur. Quod autem eiusmodi in temperies eō ab æqualibus distent, quōd in omnibus in temperanter affecti corporis partibus, non insint æqualiter, id clare liquet: Ergo quæ sunt in æqualis in temperaturæ generandæ modus, in proposito libello exequi est animus. Memuisse tamē oportet,

In æquali in temperie, æqualis quæ distentia.

Corporis in æquali in temperie.

Spacia partibus in æquali.

corpus quidē ipsum diuisum in maximas partes: hæc cursus, in alias minores: atq; illas deniq; in similes & primas, quas diuisile in aliam speciem nō est: quin etiam cōplura esse spacia inter ipsas similes particulas, atq; us etiam plura & maiora, inter ipsas instrumentarias, cōpositasq;: ali qua verò, & in vnaquolibet similari particula, veluti offe, cutiq;.

At quæ mobilia quidē sunt corpora, ea, quomā hibi inuicem incumbūt, interposita spacia latere cōspicūt nostrū faciunt. Quæ dura si cæciq; sunt, in his cernere spacia licet: sicuti ossium cauerulas, quæ plurimo humore tum crasso, tum albo replete sunt, ad alenda ossa. Quandoquidem igitur omnium particularū in æqualiter affecti corporis, non eadem est temperies, certē differentiæ ipsius in temperamēt in æqualis, naturam corporū affectorū sequentur: cū alter simplex caro, alter vniuersus musculi,

In æquali in temperie, naturæ corporum affectorum signa sunt.

impari temperamēto afficiuntur. Quippe calida spacia, vbi præcubant in musculum, primū maiores arteriæ, venæq; opplentur, ac distenduntur. Ab his, minores: atq; ita res procedit ad minimas. In his, vbi valenter impacta fluxio est, neque adhuc sistitur, pars quidem eius per ipsarū ora, pars per tancas transcolatur ad exteriora. Tum verò spacia ipsa vacua, quæ inter prima sunt corpora, fluxione implentur. Sic omnia ab humore, omni ex parte caleſcunt, & perfunduntur. Ea sunt nervi, ligamenta, membrane,

Phlegmonis generatio exquirat.

caro ipsa, anteq; hæc, arteriæ, & venæ, quæ scilicet & primæ, & præter cætera, vario dolore afficiuntur. Intendunt namq; a fluxione tum excalescunt, tum distenduntur, & diuelluntur: exterioris nō modo calſunt, sed etiā premuntur, ac degreduantur: appellaturq; morbus ipse phlegmone, q̄ musculi in æqualis est in temperies. Feruet enim iam qui in eo est sanguis: ac secum excalcatur primum quidem, ac maxime, arteriarum atq; venarum tunica: mox omnia quæ extra has sunt, quibus scilicet circūfunduntur. Ita dñorum alterum necesse est sequi, vt si fluxio vicerit, corruptio sequatur victorum corporum: sin fluxio sit victa, vt musculi ad naturalem statum redeant. Erit igitur prius victa fluxio: duplex hic incidit curationis genus: nempe aut discusso omni eo quod in partem confluit, aut cōcocto. Verum discusso, siue digesto, optidā maxime curatione est. Concoctionem hæc duo necessariò sequuntur, purus generatio, & eius in aliquod spaciū abſcessio. Abſcedit aliquando in capacitatem quæ proximè sunt, tum maximam, tum minimam: momentaneam: qd sanè abſcessionis genus optimū est. Aliis in nō momentaneam quidem, non tamen maximam. Interior in maximam, non tamen

Phlegmonis est morbus in æquali in temperie factus.

Phlegmonis curatione.

Discussionem phlegmonis, et si illius curationem optandam. Phlegmonis curationem optandam.

In æquali in temperie, prius naturæ corporum dupliciter accedat passus.

non momentaneam. Ac quæ in ventriculum incidunt abscessu non opina est, quæ in sinum eius internū abut, in quem etiam plerumq; se aperunt: mala verò, quæ sub peritonæum. Pari modo in iis quæ circa cerebrum existunt, bona est, quæ in pores ventriculos eius abscedūt: mala quæ sub involucri ipsius, & quæ etiam in posticum eius ventri se recipit. Qui verò circa costas colliguntur abscessus, hi in epacitatis erumpunt pectoris. At musculorum abscessus, sub co-

*Abcessum non
da dunt.*

*Inflammat per
tu dolor quon-
da solatur.
Dolor fori-
dum alteratur,
corrupturq;
naturæ.*

*Qualitates effe-
cissima quæ
emulant.*

ille ad summum calorem pervenit, cum tenuissimum ac maxime spirituosum sanguinem habeat, & moveatur perpetuo. Cæterum in febris id genus omnibus, calefit quidem sanguis aliquando vniuersus,* recipit calorem illum præter naturam, qui ex humorum putredine est ortus. Non tamen aut arteriarum, aut ipsarū venarum tunice, aut aliud vllum circumaccientium corpū-

rum, suū prorsus mutavit temperem, sed adhuc calicē mutat: quod si id patiatur diutius, enī aliquando vincetur, prorsusq; mutabitur. Terminus mutationis cuiusq; particulæ, est functio illius læsio. Ad quem vis terminū omnis alterationis laetudo, via est in id, quod præter naturam est. Ergo toto hoc tempore corpus incallescens, pro modo alterationis, ad portonē fenit dolo rem. Quum verò omnes solide particulæ corporis exalfacite ad absolutionē iam sunt, eiusmodi febrim Hecticam Greci nominat, ce-

*Possit hinc la-
sionem esse ter-
minum muta-
tionis cuiusq;
particulæ.*

non amplius in humoribus & spiritibus, sed in corporebus iis, quæ habitus rationem habent, comprehendam. Hæc doloris est experti: puritatis quæ febrili, omnino se non febrile. Neg enim eius calorem percipiunt, nimirum omnibus corporibus & quæ peralfacit: quum neque etiam citra alterationem sit sensus, neque in iis quæ iam ad perfectionem sunt alterata, dolor. Porro, quod alibi Hippocrates ait, omnē morbum esse vlcus, id quidem non vique deo alienū viden debet. Vlcus namq; vnitatis solan o est. Immodicus autē calor, segregando substantiæ con-

nitutem: summum verò frigus, stipando, exprimentō, & quassando, proximè accedunt vt vnitatem soluant: id quod certè immodici caloris & frigoris terminus cōmodè statui poterit. Cæterum omnis immoderatus excessus, in habitudine consistit ad aliquid. Non enim pari ratio ne a calidis frigidisq; afficitur omne corpus. Vnde sit, vt aliqua animalium cōuenientes inter se succos habeant: aliqua non solum non conveni-

tes, sed enī qui se mutuo corruptant: velui homo, atq; vipera, quorū vtriusq; salua alteri pernices existit. Ita vtriq; & scorpion necauerit, si illi ieiunus inspūs. At non homo hominē, nec vipera viperam, nec asps aspidem, mortui intermit. Siquidem quod simile est, id cōgruum, amicisq; est: quod contrarium est, inimicum & noxium. Augetur enim quidq;, ac nutritur simili- bus: perimitur & corrumpitur à dissimilib. Quo-

circa sanitatis tutela, per similia perficitur. Morborū sublatio, per cōtraria. Hecticā itaq; febrim minime sentit, qui ea laborat. Reliquarū febrilū nulla est, quæ non à laborante sentiat: sed alie magis, alie minus sunt granes. Sunt enim ex iis, & qui negorem ingerant: quod symptoma fit in inæquali in temperie. Iam verò accendi febre, & citra phlegmonem, ex solis humoribus putre-

*Saluum ieiuni
hominis necae-
re scriptum.*

*Similicommū,
sibi esse mutuo
nocuū G. 40
mū.*

*Dissimilia, esse
inimica G. 40
nū in vocem.*

*Sanitatem iu-
tam per similia
perfit.*

*Morbus per cau-
terici collū,
febris putrida.*

*Febris epheme-
ra generatur.*

*Spiritus alter-
atur fortis.*

*Flaua bilis est
calidissima.*

*Præputia est
frigidiſſima.*

*Sanguis quæ-
lu.*

*Aera bilis quæ-
lu.*

*Tenuum per-
mū omnia
pripit altera-
tionem cū
trā agit.*

*Peripneumonia
causatur celeriter
putrefcere.*

scenibus, licet: si ven & aliud genus inæqualis in temperie in toto corpore orit, modō fuliginoso vapore detento, modō excitationibus & plausculis laboribus calore adactō, modō ab ira, modō à deuotione quavis externa, sanguine incaleſcente. Quod igitur in temperie ipsa non nunq; spirituosam duntaxat invadat partē, non nunq; etiam ipsos humores, quodq; omnibus

huinf-

*R. refrigeratio
vehementi.*

*Doloris causam
esse inaequalem
intemperan-
tiam.*

Epiælis febres.

Eypiræ febres.

*Rigor absq. fe-
bre, quibus acci-
det.*

*Veteres fuisse
temperantio-
res.*

*Rigorem lap-
sari circa ætate
febris.*

*Epiælis febres
quæ dicuntur.*

*Febres sine o-
mnino præter he-
cticam, consistere
ex duplici inae-
quali intempe-
rie
Tumorem autem
cum inaequali
intemperie.*

huiusmodi febribus, si diu perdurauerint, he-
ctica superveniat febris, nemini obscurum exi-
stimo. Quænammodum ergo ex devisione accen-
ditur febris, ita nonnulli saepe ex frigore refrige-
rati vehementer toto corpore sunt: aliqui vero
enim perierint. Sed quod omnes enī doleant,
ne id quidem latet. Dolent enim, maximè circa
vngulium radices, & quæ ex rigore ingenti vehemē-
tè refrigerati, celeriter sese calfacere propere-
rant. Quam quidem in æqualem intemperan-
tiam, quā videat aperte quis esse causam dolo-
ris, non est quod de ceteris dubitet: nec si simul
riget & febricitet ægrotantū aliqui, sentiantq.
lunumorem prætorisum, qui frigidus est, multum
amare buli, quæ est calida, moueri per sensibilia
membra: ut in epiælis febribus, in quibus simul
ambas qualitates contrarias intra corpus æger
sentire videtur, cum nimirum calidum ipsum &
frigidum, per id genus febres, tenuissimis por-
tionculis alpergantur, adeoq. misceantur invi-
cem, ut ne minimam quidem vnius sumere pos-
sit particulam, in qua alterum non sit compre-
hensum. In ipsa tamē accessionis in valione, non-
nulli & rigent & sentiunt atq. intus quidem, & in
ipsis visceribus, magnū incendium in externis au-
tem partibus, frigus maximum sentiūt. Ac tales
febres sunt, quæ græcè eypiræ vocantur, atq. ar-
dentium febrium quoddam perniciosissimū ge-
nus. Quinetiam iis qui rigent, nec tamē febricitant,
inæquale temperamentum adeit. Rarum tamen
est id symptoma, licet tum mulieribus, tum vi-
ris quibusdam accidat, ubi aut defies vira, aut cō-
tinua ciborum copia præcessit. Porro antiquis
nemo, ut videtur, ita est affectus, cum neque
adeo ocioſi, nec in victus saturitate tunc viue-
rent. Vnde factum est ut scripserint veteres me-
dici, rigori febrem necessarīo supervenire: tam-
en si sepe numero rigorem viderimus, quem null-
la sequuta sit febris. Compositum autem ex hac
intemperie, & ea quæ febrientium est, epiælis.
Appello ita febrē illam, cui ambo semper simul
accident. Nam in qua rigor quidem præcedit, fe-
bris sequitur, veluti in tertiana & quartana,
hanc epiælam non voco. Ita ex duplici inæquali
intemperie epiælis componitur, atq. etiam alie
ferè omnes febres, præter hecticas. Pariter & qui
particulæ alicuius cum tumore sunt morbi, hi
quoque omnes cum temperamento inæquali cō-
sistunt: ut cancer, erysipelas, carbunculus, her-
pes, ædema, phagedæna, gangrena: differunt ta-
men, pro ipsa fluxionis diversitate. Siquidem
qualis fluxio fuerit, talem præter naturā tumo-
rem gignet.

GAL. DE OPTIMA CORP. CONSTITUTIONE, liber unus.



*Similariū par-
tium sanatio qua-
si sit.*

Vando quidem temperamentū ex
calido, frigido, humido & sicco, de-
fuitur congruam mensurā, simili-
ariū membrorum existit sanitas: no-
tri autem ex omnibus his constru-
cto, positione, magnitudine, figura, & parum
numero cōstituitur: concedendū iure est, corpus
aliquod, licet ex plurimis optimè tēperatis parti-

culis compositū sit, secundum tamen ipsarū ma-
gnitudinem, aut numerū, aut figuram, aut mu-
tuum inter se cōnexum, nonnulli posse vitari con-
trahere. Porro, ut à cōmuni nonone exordiamur,
saluberrimum corpus omnes vno ore lan-
dant: necnō id quod Græci *συνεχόμενον* vocāt,
hoc est, optimo habitu præditum: idq. ad vnam,
eandemq. rem respicientes. Quippe omnium ti-
pissimæ corporis particulariū functiones esse robu-
stas autē, nec à morbiferis causis facile vinci pos-
se. Ceterum cum ipse pars particulæ functiones se-
cundum naturam promptè obeunt, sanitas est.
Vbi verò id cum quodam enī robore præstant,
bonus habitus dicitur. Cōmune autem vniq.
est, nō facile morbis succumbere. Quare bonus
habitus, omnium illa saluberrima cōstructio exi-
sit, quam vniuersi percipiunt: cuius accidens
& mensura est, in obeundis functionibus stre-
nuitas, atq. constantia. Quia ratione merito bo-
nus habitus appellatur. Meminisse autem opor-
tet, nostra corpora ex miscella quantorū elemen-
torum consistere, variisq. esse partium tempera-
turas: ad hæc, singulis organicis membris vni-
cam inesse particulam, cui tota actionis causa tri-
buitur: cuius grana reliqua omnia creata sunt,
quæ totum cōplect instrumentum enī. Quibus præ-
missis, erit optima corporis constructio ea, in
qua similes se partes propriam temperiem possi-
dent, necnon cuiusq. instrumentariarū composi-
tio ex illis, secundum ipsarum magnitudinem,
numerum, figuram, mutuūq. inter se cōnexum,
certa quadam & exacta mensura constructa
fuerit. Quocirca id tale corpus optimè suis
fungetur actionibus, ac proinde aliorū omnīū
& firmissimū erit, & minimè prolabeatur in mor-
bos. Siquidem vniuersis causis morbificis tam
extrinsecis quā intrinsicis facile resistebitur,
quod omnino ab vniq. extremis recedat, adeoq.
optimis succis abvndet, ut tristitia, iras, vigilas,
curas, inebres, squalores, & pestilentiam, aliis o-
mnibus ferat multo facilius. Nam quæ maxime
vinosis facies redvndat, facile ab huiusmodi cau-
sis tentatur, utpote quæ per se iam morbis proxi-
ma sunt. Quoniam autē sanitas extendi in sans am-
plam latitudinem potest, non solum in hoc com-
mentario corpus illud absolvissemus, quod ta-
rō in venit, & tanquā Polyelen regulæ exem-
plum est, debet effingere, sed corū etiam memi-
nisse, quibus cum quotidie versamur, quæq. ab
eo breue aliquid deficiunt, nō tamen adhuc in-
signem admodum lapsum sunt patia. Quod igitur
exquisitis bona temperie præditi est, mediū
sanē locum obtinet inter molle & durum, & in-
ter lursiū & glabrum: pariter neq. amplius, neq.
angustius est venis, nec pulsibus magnis aut par-
vis recedere à mediocritate videtur. Quod verò
vnde cūq. exacta in instrumentariis particulis
mensura constat, id tanquam Polyelen est regu-
la. At ea corpora quæ iam calidiora sunt, plus
quā par sit, non tamen admodū multo, pariter
enim quæ frigidiora, humidiora, & sicciora
modice, et si parē vnam nō rectè efformatā in-
beant, corpori tamen symmetrico nōnunq. præsta-
re videntur. Quippe ubi id genus corpus mode-
rato durius evaserit, aduersus omnes externas

*Notia cōmuni-
tis.
Saluberrimum
corpus.*

*Sanitas quan-
do dicatur.
Habitus bonus
quando dica-
tur.*

*Corpora nostra
constituta
quantorū elemē-
torū miscella.
Instrumentariā
singula inesse
particulam vo-
cantur, cui tota
actio tribuitur.
Constructio o-
ptima quæ.*

*Viniſis facies
redvndans
corpora, facili-
tè a causis morbi-
ficis afficit.
Sanitas est
latitudo am-
plam.*

*Temperatiſ-
simi corpora ut-
ta.
Polyelen regu-
la.
Durum mode-
rate corpus ad-
uersus exte-
ria causæ fir-
mum totū:
mollium ad ver-
sus interna.*

Raritas corporis quibus sola brevis et infirma brevis.

Densus corpus magis esse ab extinctione causis iustum.

Medium exoptimum corpus, ex eo et densius modum moderatum, secundum aliquod esse deterius.

Magnus corpus, unde sita sit.

Paruum corpus unde sita sit.

Augmentum sit, quoque esse confirmatur. Optima corporis constitutio in quibus causis sita.

Habitus de quibus dicatur.

Habitus simpliciter bonus.

Habitus non simpliciter bonus.

Sanitas latitudinem habet.

Habitus bonus et sanitas in seipso.

Athletarum habitus periculosus.

Habitus simpliciter bonus, vel si ad summum perveniat, a magis affectu totum.

Habitus simpliciter bonus, et si simpliciter bonus, corruptio, disceptatio, disceptatio.

causas, firmius ac tutius redditur. Vbi verò mollius, ad verius internas. Atque eadem ratione vbi densius fuerit, externis magis resistit. Vbi verò rarius, ab internis minus offenditur. Raritas siquidem corporis, quibus plus recrementi per distillationem educitur, salubrior existit: quibus verò minus, insalubrior. Nam ab omnibus externis causis facilius corpus rarum oblectitur. Corpus autem quod ex quovis infima consistat mensura, nec rari, nec densum dici potest, sed in medio profus consistit. Cui quidem utrumque excedentium corpori prestat secundum aliquod. Quod enim densius est, magis ab exterioribus causis est tutum: quod verò rarius, ab interioribus. Vtriusque autem quod exacte resistit, planè non invenitur. Sed mediocriter id resistit, quod inter omnes excessus est medium, quodque omnium etiam corporum saluberrimum esse censimus. Quare id singulis excedentibus medium, secundum aliquod id deterius: collectum verò omnium optimum, & maximum eligendum videtur. Quod autem corpus ipsum, quod tum similibus, tum instrumentariis particulis optime constitutum est, vel parvum, vel magnū, vel mediocre necessarium esse non debeat, hinc difficas licet, quod magnū quidem, ob humorem, vel materiam multitudinem: parvū autem, ob siccitatem, aut ob materiam penuriam efficitur tale. Potest itaque aliquod corpus & pulcherrimum, & optime temperatum effici, quantumcumque magnitudinis sortitum id fuerit. Augmentum enim sit, quoque ossa confirmantur: confirmantur autem, in exigua magnitudine, ob materiam defectum, vel ob siccitatem: ita ut simpliciter neque magnitudo, humiditatis indicium sit, neque parvitas siccitatis, nisi aut magnū molle, aut parvum etiam sit durum. Quamobrem optimam constitutionem in his duobus merito collocabimus, moderata scilicet consimilium particularum temperie, nec non exactissima iustorum entium mensura.

GALENI PERGAMENI

de optimo corporis habitu, liber unus.



Habitus nomen de omni fixo & vix solubili pronuntiare consuevimus: nihil aliud magis laudantes, vel improbant. At cum bonum habitum aut malum dixerimus, iam tunc qualem nam habitum dicamus, distinguimus. Quippe bonus simpliciter habitus, optimam corporis constitutionem sequitur: cum verò qui non simpliciter bonus sit, in quacunque corporis natura reperire licebit, aut simpliciter, aut ad aliquod relatum. Igitur quem sanitas latitudinem habeat, intensiorem quidem ipsius medici bonum habitum vocant: lapsum verò non dum nomine proprio appellatur, sed perinde ac genus ipsum, sanitatem nuncupaverit. Itaque bonus habitus optima quædam sanitas est. Ceterum habitus Athletarum, non est simpliciter bonus habitus, ac proinde periculosus existit, si ad summum pervenerit, quem admodum dixit Hippocrates. Nam bonus simpliciter habitus ad summum bonitatis pervenit, omnium erit corporis affectuum tutissimus. Porro tam bono sim-

pliciter, quam ipsorum Athletarum habitus, bona omnia particularum temperies communis est: ut etiam functionum robur, atque succorum bonitas. Interest autem, quod in habitu simpliciter bono, sanguinis cōmodo dano, ac totius solidorum partium mollis, habeatur: in Athletico autem, horum ipsorum, potissimumque carnosigenens, excellens sit copia, ratione cuius periculum necessarium sequetur, si in summo consistit, ne aut extingatur, & suffocetur calor innatus, ob plenitudinem illam exuberantem distillatione prohibita, aut aliquod ex præcipuis vasibus ruptum, quæ in pulmone, & in iecore, & in thorace sunt sita. Siquidem sanguis ipse, tum ob naturam caliditatis copiam, tum ob actionis perpetuitatem, necnon ob incrementum aliquidum quasi esseterecens, ipsorum vasorum tunicas, ut multum doli, dirumpit. Hæc igitur omnia, nec non repetitæ omnium functionum resolutiones (ut paucis docuit Hippocrates) necessarium immoderatas repletiones sequuntur.

GALENI PERGAMENI de animæ morum & corporis temperamenti mutua consequuntione, liber unus.



Vemadmodum ex cibo & potu, necnon ex quotidianis exercitationibus, bonam corpori conciliamus temperiem, sic etiam ex hac, ad virtutem animæ comparandam, nonnullum emolumentum attulerimus: id quod certe in actionibus atque universis affectibus, qui secundum tres animæ species, ob temperamentorum diversitatem maxime in puellis differunt, liquod constat. Alij enim timidissimi sunt, alij audaces, alij inexplebiles, alij sobrii, alij verecundi, alij denique admodum impudentes. Ex quo quidem in illis morum discrimine, ratione concludere aliquis poterit, non eandem omnibus animarum naturam, siue substantiam, inesse. Nam si substantia animæ esset illis per omnia similis, easdem vires actiones agerent: eisdemque, ob causas similes, affectibus affecterentur. Quare haud dubie pueri tantum inter se animorum essentia differunt, quantum propriis actionibus atque affectibus discrepant. Quod quidem cum sic habeat, facultatibus quoque differunt. Porro singulorum quæ sunt, effectrix quædam causa est, quæ ad aliquod referri intelligitur, cuius nomen per se est inditum. In quadam autem se ipsa ad genitum relatione, genitum facultas consistit. Quocirca tot facultatibus substantiam, quæ etiam actionibus, esse prædictam dicimus. Siquidem quia alio (exempli gratia) vires habet purgandi, os vetriculi roborandi, cruenta vulnera glunandi, plena vlcera solidandi, & humidas palpebras excidendi, tot facultates, quot etiam opera, proficemur ipsam fortiri. In vniuersum autem, animæ species sunt tres: rationalis scilicet, irascibilis, & appetitiva. Quæ rationem quidem illa prima (quam etiam in telestiratem vocamus) veritatis, scientiæ, disciplinarum, atque, ut summatim dicam, honestorum omnium desiderata est, secundum desiderij commune

Repletiones immoderatas quæ sequuntur.

Temperamentum optimum vnde concilietur, Temperamentum pro bono efficiere ad virtutem animæ.

Potenti morum diversitas.

Animæ substantia non eadem omnibus singulis.

Effectrix causa.

Substantiam effectrix facultas habet quæ actionibus prædicantur. Aliæ facultates.

Animæ species tres. Rationalis animæ quæ ad appetitum.

Frigiditatem
adversari a-
nimam animam
obstantibus.
Anima tota
corpore susci-
pitur Galenus.

id non ob siccitatem, sed ob frigiditatem acci-
dere: quæ omnibus animæ actionibus officit.
Ex hoc igitur ingens mihi iam oboritur suspicio,
ut rotam animæ substantiam esse corporeā
credam, quod interdum non modò pereant in-
genitæ animæ facultates, sed etiam aliæ contri-
tæ illis introducantur: ut dum cernere quæ non
cernuntur, audire quæ non audiuntur, sese quis
arbitratur. Quo pacto enim ex ea quæ ipsi cum
corpore intercedit necessitudine, in naturâ pla-

Malum esse na-
turæ videri Pla-
to asserit.

ne cōtrariam transire posset, nisi aut qualitas ali-
qua, aut forma, aut affectus, aut facultas corpo-
ris esset? Porro ex vino corpore habitu lan-
guere animæ, ac neminè spontè esse malum, sed
ob pravam habitudinē corporis, & rudem edu-
cationem: ac proinde nec debere turpia vinupe-
rari, professus quidem est Plato in Timæo. Ari-
stoteles autē, secundo de partib. animalū, ipsius
animæ vires, materni sanguinis sequi temperiē
exultat. Qui rursus, primo de historia animā-
lium innuit, instrumentarum partū figuratio-
nem, animæ moribus accommodari: ac proinde
ex illa recōditos hos cognosci. Hippocrates enī
in libro de aquis, aëre, & regionibus, ait, eos qui
plagam Septentrionalem incolunt, aut enā mō-
tana loca, agrestissimis esse moribus præditos:

Anima vires
sequi temperiē
mensuras. An-
stoteles ait.
Mores agrestis
ex figura par-
tium Aristote-
lis ait.
Septentriona-
lium moris esse
agrestissimos.
Asia, Asia tē-
ramq. mores,
magisq. cum
mensurantur.

Asiam autem regionibus cæteris longè clemen-
tiores exsistere, in eadē omnia multo meliora &
graviora nasci: necnon mores hominū tum mi-
tiores, tum & agendū prōptiores esse, ob opti-
mam Asiaticā celi temperiē: liberi tamen illic
magis imbelles homines, quā in Europa. In
summa verò, species & mores hominū aut ple-
runq. naturam regionis sequi: calido autē, frigi-
do, humido, & sicco, vnam regionē differre ab
alia. Alibi etiam tradit Hippocrates, quibus cu-
biti vena: veteres enim arterias etiam vocabant
venas) vellementē ederet pulsationem, eos ho-
mines furentes exsistere: & meritò quidem. Nam
præ nimia in corde abvndantia caloris, ita ve-
hementer mouetur artetis: furentes autem atq.
iracundos, caloris abvndantia efficit. Stupidos
verò, graues, & pigros, temperaturæ frigiditas,
Hippocrates itaq. voluit, non solum irascibilis
appetitorūq. partis animæ, sed etiam cogitatri-
cis vires & facultates, corporis temperaturæ ad-
hærere, atq. illam omnino sequi. Neq. secus Pla-
to, ex terre diuersis libatibus moribus, ex vano spi-
ritu, ex insolationibus, ac deniq. ex varietate nu-
merentorū, non solum ipsorū corporū, sed ani-
morum etiam profuturū nasci diuersitatis tem-
peramento scilicet ipso (quod subintelligere o-
portet) interuenire. Quare pueri quidem ci-
tra duodecimū annū prius vix interdicunt, se-
cundo de legibus: idq. ne in furem agantur.
Profectus autē, ut ipso vrantur, permittit: quip-
pe quod aduersus acerbitatē inefficax remede-
sit, animiq. mæiores discurrat, ac deniq. durio-
res mores emolliat. Etenim iuuenilis ætas cali-
da est, ac multo referta sanguine. Contrā senilis,
& frigida, & sanguinis inops. Propterea sembus
vini potus vitis citius autem qui crescit, aduer-
satur q. maximè. Iam verò neq. in exercitiū per-
mirebat Plato ut vinum gustarent milites, neq.
in ciuitate ipsa seruauit: ut neq. principes, neque

administrantes rempublicam, neq. iudices, neq.
hi breuitur, qui de re aliqua essent consulari:
quod numerum veluti quidam tyrannus animæ
facultatibus impeteret. Sed neq. interdu, nisi aut
exercendi corporis, aut tollendi morbi gratia,
permisit vniq. vini ponere: neq. item noctū,
dum libris nauanda esset opera. Pro virili autē
esse entendum singulis, ut alimentis, studiis, &
disciplinis simul & vinum fugerent, & virtutem
ipsam caperent, idem professus est. Cæterum
qui cunctos homines virtuti comparandæ ido-
neos, & qui nullum iustitiz amantem esse arbi-
trantur (quod est nulli naturalē finem statue-
re) vniq. hominū namram ex dimidio tantū co-
gnouerunt. Neque enim omnes iustitiz hoīes,
neq. omnes amatores nascūt, ob corporis te-
peraturam vniq. tales genit. Ac sane qui talia
astruit, subinde perunt, quo videlicet iure quis-
piam debeat laudari, vinuperari, odio libari,
aut amari, cū bonus ut improbus non fuisset
ingenio, sed & temperatura sit factus, quā ab
aliis causis quisq. accepisse deprehenditur. Quia
(scilicet respondebimus nos) omnibus hoc no-
bis inest, ut amplectamur bonā, ambiamus, a-
memus: malum abominemur, atq. procul arcea-
mus, ignorantes adhuc, genitūne sit tale, an mi-
nus. Scorpions enim, phalangia, viperasq. neca-
mus, cūm tamen à natura, non sua sponte, talia
creata sint. Primū enim, maximumq. Deum
genitum Plato asserens, bonū tamen illū esse
pronūciat, nosq. ipsū talem ab æternitate, nō
ex seipso boni effectum, natura duce colimus,
& amamus. Prius enim nullo vniq. quam tem-
pere genitus est, omnibus seculis increatus, semper-
tenuisq. existens. Meritò itaq. malos odimus,
causam cur mali existant, necdum præmeditati.
Bonos vicissim, siue natura, siue institutione &
doctrina, siue honesto vitæ exercitio probitatē
sint affecuti, recipimus, atque amore prosequi-
mur. Quocirca Stoicos admittit, qui homines
vniuersos ad virtutē adipiscendam libiles esse
opinantur, sed ab aliis quibus cum viuunt, à re-
cto itinere detorquent. Haud siquidē dicere po-
terunt, qui omnū hominū primi genitū sunt,
a quibus nam deprauati fuerint, anteq. nullum a-
lium habentes. Videmus enim pueros complu-
res, iisdem parentibus ortos, ab eisdem præce-
ptoribus educatos, iisdemq. alimentis vix, na-
tura tamen q. longissimè inter se differre. Quo-
quidem quis per deos flagitia edocuit? Repentes
enim paucos admodū pueros naturā ad virtutē
propensos, sed à parentib. & prædāgogis ad eam
minis increpationib. conuerti. Porro illi ex-
trema dementia tenentur, qui nos volutate ad
virtutē derorqueri aiunt. Quos quidem erudi-
tissimos Posidonius refutat, ait in nobis ipsis
instinctus quædam vitiorum semina, & tanquam
igniculos delitescere: nec tant nobis à vitiosis
cauere, quā vitiorum incrementū resistere
& coercere esse opus. Non enim (ut fert Stoico-
rum opinio) totū extrinsecus ingruit in nostros
a nimis vitium, sed plurimū in seipsis vitiosis ho-
mines causæ habet. Quod extrinsecus aduenit,
longè minus est. Promde sanè consuetudine pra-
ua accedente, secundum partem auium ratione
carentem,

Vini imperat
animo facultas
libus, veluti
quidam tyran-
nus.

Incarnatio ho-
minum adtem
modanda ho-
milia, utopia
vinuperanda.

Deus non ge-
tus, ab æternis,
non ex se, ho-
minis exilis.

Stoici sunt
libales Galenus.

Homines ge-
nus non fuisse
ab æternis, vi-
dentur mouere
Galen.

Puerum pau-
cos esse naturā
ad virtutē pro-
pensum.

Posidonius egro-
gia, instinctus.

Cōstruendo quā-
tum potest ad
bonitatem mo-
rum, vel prauā
faciem.

Mores sequi ple-
runq. naturam
regionis.
Turbantes esse
si quibus inbi-
tis arteria vena
manet pulsio.

Iracundiam ca-
loris abvndan-
tia excitat.
Stupidos frigi-
ditas efficit.

Vino citra duo
decimū annū
non potui Pla-
to interdicit.
Vini locus ac-
bitari inuoluit.

Vinum febribus
cur vitis.
Vinum aduer-
satur crescenti-
bus.
Vino quibus in-
terdicat Plato.

Malum esse na-
turæ videri Pla-
to asserit.

carentem, pravi reddimur: falsis autem opinionibus, secundum intellectum pariemus imbuimur. Sic uti dum à bonis, syncerisq; viris instrui-
mur, opiniones quidem veræ sunt, mores autem humani. At uti cogitantes animæ parte, intellectu, nullinamq; ratione maioris minorisq; eva-
riantes, corporis temperaturas sequuntur. Ipse autem temperatura, primam in vtero generationem & cibis probos succos parantem, habet autorem: atq; hæc murus sese & adaugent, & fouent. Calida namq; exempli gratia, temperies, iracundia fa-
cit: inde rursus iracundia in genitum calorem accendit, & ignem reddit. Contrarij mediocri tempera-
tura constant, mediocriterq; commoti ani-
mo, ad probos succos gignendos proficiunt.

GALENI PERGAMENI
de naturalibus facultatibus, li-
ber primus.



Vaudo quidem sentire & moueri secundum electionem, propria animalium sunt: augeri verò, & nutririj, plantis etiam communia: erunt v-
no priora quidam, animæ, posterio-
ra verò, naturæ ipsius opera: quare animalia tri-
pla, simul & ab anima & à natura gubernari dici-
mus, stirpes à sola natura. Quamquam his etiam ani-
mæ vegetatricem aliquam tribuere haud im-
merito potest, distinguens illa à sentiente, quæ
animalibus inest. Porro cum corpus aliquod ab
his sub quibus ante fuit in nullo est immutatum,
quiescere id dicimus. Quod si in aliquo ab his re-
cessit, extenuis id moueri. Vbi igitur corpus ipsi
ab vna in altera qualitate maturatur, vt ab albo
in nigrum, aut à frigido in calidum, motum ipsum
alterationem vocamus: estq; vnus motus genus.
Alterum genus in corporibus inest, quæ situm
mutant: cui generatio nomen est. Atq; in qui-
dem duo motus simplices & primi sunt: auctio
verò & diminutio, ex his compositi. Illa, cum ex
minori maius fit: hæc, cum ex maiori minus: pro-
pria solæ, et vtroq; seruata forma. Alij autem
duo ab his motus sunt, generatio & corruptio:
illa quidem ad substantiæ productionem, hæc illi co-
traria. Omnis in motibus communis est pri-
oris status immutatio: si citri è diuerso quientibus,
prioris status conseruatio. His premisis, in qui-
rendum iam nobis est, quor & quæ naturæ sint
facultates: tum, quod opus edere singulis earum
sint iuxta. Porro opus appello, quod iam factum
atq; completum per actionem est: velut sanguinem,
carnem, neruum. Actionem autem, ipsum actum motum.
Causam verò, à qua hæc procedit, facultatem.
Etenim vbi cibus sit sanguis, passius quidem ci-
bi, actus verò ipsius venæ fit motus: quæ actio-
nem licebit tibi appellare naturæ opus, non tamē
opus ipsum, actionem. At mihi quidem tam venæ,
quam reliquarū particularū singulæ, ob cer-
tam quandam temperiem, quæ ex quatuor sunt
qualitatibus nascitur, hoc vel illo modo videntur
agere. Quoniam Aristoteles, atq; ipsius Stoici secu-
ti, calido & frigido omnem actionem tribuunt:
siccum & humidum pro partemibus in subiectis:
cum tamen sanus fuisset omnium particularium

causas ad ipsas quatuor qualitates reducere. Nā
tamen in animalibus & stirpibus calidum & fri-
gidum magis agere, siccum verò & humidum pa-
ri videntur, non ob id tamē sicres haberi in omni-
bus. Ceterum omnis potentia siue facultas, in re-
latione ad aliquid intelligitur. Primū siquidem,
actionis ipsius potentia est causa, dein etiam o-
peris, ex accidenti quoddam: quare si causa ad ali-
quid est, potentia quoq; in relatione dicitur ad
aliquid, nimirum causā cum sit. Cuius quidem
agentis causæ substantiam quando ignoramus,
facultatem eam, siue potentiam, appellamus: in
venis quidem potentiam quandam sanguificā,
in ventriculo concoctricem, in corde pulsato-
riam dicentes. Incipiendum itaq; nobis ab ipsis
operibus est, si certa ratione & via, quor & quæ
facultates sunt, inuenturi sumus. Singula namq;
opera, ab aliqua procedunt actione. Hanc verò
omnino aliqua præcedit causa. Ergo naturæ o-
pera dum ad lucem in vtero gestatur, ac fingitur a-
nimal, omnes corporis sunt particule: edito ve-
rò in lucem, cōmune in omnibus naturæ opus
est, earū ad magnitudinem perfectam perducit.
Postea verò, etiam vromnes perdurent, in moli-
tione. Actiones quæ tribus his operibus respon-
dent, nec cessant tres sunt, vna scilicet cuiusq; ge-
neratio, auctio, & nutritio. Verum generatio, sim-
plex actio naturæ non est, sed ex alteratione & for-
matione cōposita. Si quidem alterari oportet, et
fingij materiam ipsam, vt ex ægignatur animal.
Auctio verò, solidarū ac iam formatarū affima-
lis particularū augmentum, ampliatioq; in lon-
gum, latum, & profundū est. At nutritio, in idem
partibus appositio quædam est, sed siue ampli-
tatione. Ergo primò omnium agamus de ipsa ge-
neratione. Profecto in vterum, aut etiam in terram
semine, ita in quibusdam temporibus, multæ cō-
stantur partes eius quæ gignitur substantiæ, hu-
miditate, siccitate, calore, & frigore, ceterisq; o-
mnibus, quæ hæc sequuntur, qualitatibus (hoc est
tactilibus, atq; in etia quæ gustu, odoratu & vi-
su diiudicantur) inter se differentes. Quocirca si
primas & elementares alterationis facultates re-
quiris, hæc sunt, humiditas, siccitas, caliditas, &
frigidity. Si verò eas quæ ex his inter se mistis
nascuntur, tot sanè omni in animalibus erunt, quor
fuerint in eo sensibilis elementa, hoc est, similes
particulæ: quas nimirum in prima animalis
generatione, natura creat, vna generatrice, alte-
ratriceq; potentia. Propriū autem vniuscuiusq; vi-
sceris corpus, si ab eo venas, nervos, & arterias
executias, fingam, simplicisq; atq; cōpositiouis
est experte. Ceterum si qua organa ex geminis
cōstant tunice, sed simplicibus & dissimilibus,
horum ipsæ tunice elementa sunt. Atq; in vtraq;
tunica sua quædam alteratrix vis est, quæ ex men-
struo sanguine eam particulam generatur. Itaq;
alteratrices facultates in omni animalis genere
torembrantur erunt, quor habet in se elemen-
tares particulas. Sed & actiones proprias cuiusq;
membrani particulæ necesse est esse, quemad-
modum & visus. At alteratrices naturæ facultates,
quæ particulares sunt, omnes tuniculari & venri-
culi, & intestinorij, & vteri substantiæ, qualis est,
effecerunt: cōpagem verò, formamq; formatrix

Facultas omnis
in relatione ad
aliquid.

Veni inest fa-
cultas sangui-
fica.

Cardi inesse
visus palatio-
riam.

Partes corporis
venerunt in
natura operis.

Alimentum natu-
ræ, generat-
rix, auctio, nu-
tritio.

Generatio
esse actionem
cōpositam.

Auctio quid
sit.

Nutritio quid.

Generatio
progenies.

Facultates ele-
mentares pri-
mæ, quæ,
facultates ex
primis cōstituta,
quæ.

Elementa sen-
sibilis sunt si-
miles parti-
culæ.

Alteratrices fa-
cultates ut in-
finitas sunt
malibus quot
differunt par-
ticulas.

Formatrix fa-
cultas.

Temperies quæ
fouentur.
Temperies ca-
lida iracundia
facit.
Iracundia ignem
reddidit calorem
infinitum.

Animalis pro-
pria.
Planta communis
ita cum ani-
malibus.
Anima opera.
Natura opera.
Anima gub-
ernari ab ani-
ma & a natu-
ra.
Stirpes diffin-
sari à sola na-
tura.
Sentirebus inest
anima vegeta-
trix.
Alteratio.

Latit.

Auctio.
Diminutio.

Generatio.
Corruptio.

Opus quid di-
citur.
Auctio quid.
Causa quid.

Partes omnes
agere temper-
mentis rationem,
quæ prædicta
sunt.

quædam virtus effluxit, quæ ars optima existens, tam cōsulō & archioscōe compingit singula, ut nō possint aliter se habere melius. Sed neq; ipsa facultas autrix, deest usq; quæ gestantur in vtero, sicut nec vis utrix. Sicut tamē eo tempore alteratricis & formatricis potentia, veluti ministræ quædam, nec fulsunt ipsæ primas partes. Vbi verō perfectā magnitudinē animal est adeptū, toto postquā editū est tempore, visq; ætatis vigorem, autrix virtus domiatur. Auxiliari-
ces & veluti ministræ eius sunt, alteratrix & nutri-
trix. Autrix autem facultatis est proprium, in omnem partem profertē solidas corporis par-
tes, quas elementares & similes, simplicesq; ap-
pellauimus: id quod solius naturæ proprium est munus. Nam quæ a nobis extensa sunt, sicut vi-
na dimensio id patitur, ita minuiuntur reli-
quis. Quare us quoque augentur, necessaria muta-
tio est: de qua iam nonnihil dicamus. Quum id
quod in nutrimenti affluit specie, corporis eius
quod nutritur, omni parti affligitur, actio quidē
ipsa nutritio est: causa verō huius ipsa facultas.
Et alteratio quidē hic quoque ipsius actionis ge-
nus est, nō tamen qualis erat in generatione. Ibi
namq; quod os non erat, postea factum est os: in
nutritione verō, et quod iam factū est, id quod
affluit efficiunt simile. Ita nō immerito alteratio
em illam nominamus generationē, hanc assimi-
lationē. Ergo generatio, actio, & nutritio, prima
naturæ operum, ac veluti capita sunt: quare
etiam effectrices horum facultates primæ prin-
cipalesq; tres fuerint. Desiderant tamen tum ipsa-
rum inter se, tum aliorū ministeriū. Ac quæ quidē
generatrix, autrixq; desiderent, dictū iam
est. Quæ autē nutritrix facultas requirit, nunc
dicetur. Ergo cū actio huius facultatis assimila-
tio sit, nec fieri possit, ut assimilentur muturq;
inter se vlla, nisi focietatem aliquam, cognatio-
nemq; in qualitatibus habeant, idcirco primum
quidem nec quodq; animal quocunq; cibo
nutriti potest: deinde nec quibus nutriti potest, ut
vitiq; protinus. Atq; huius necessitatis causa plu-
ribus alterationis nutrimenti instrumentis vitiq;
animali est opus. Nam ut ex pane, aut lactuca,
aut beta fiat sanguis, permulta sanē alteratio
requiritur. Quæ quidem vna est causa, cur multa
sint ad alterationem nutrimenti insituta orga-
na. Altera causa est excrementorū natura: quibus
excipiēdis & evacuandis, secundum quod-
dam in corpore particulārū genus est destinātū.
Est & aliud tertium genus instrumentorū, pro
bonis succis vitiq; per totū corpus deferendis,
tributū. Alia namq; organa idoneū cuiq; particu-
læ nutrimenti alteratio preparant, alia sepa-
rant excrementa, alia transmittūt, alia suscipiūt,
alia expellunt, alia salubrium succorum in om-
nem partem serendorū sunt via. Quæ omnia
vitiq; nutritionis gratia, sunt a natura condita.
Porro nutritio ipsa, ad id qd nutritur, eius quod
nutrit assimilatio est: quam necessariō præcedit
semper agglutinatio: sicut & hanc appositio.
Postquā enim succus sit qui omne animalis par-
ticulam nutriturus est, a vasis excidit, in totam
eam primum dispergitur: mox adaugitur: dein
agglutinatur, ac demū assimilatur. Differte autē

appositionem ab agglutinatione, sicut & agglu-
tinanem ipsam ab assimilatione, hinc cōbitur,
quod in hydropē quidem humoris fiat apposi-
tio, nō tamen agglutinatio: in lenice autem, ad-
herentia quidem cernatur, at assimilatio non
item. Porro nutrimentum dicitur propriē quod
assimilatur & nutrit: nam qd agglutinatur, vel
quod apponitur, id nō propriē nutrimentū est,
sed æqui vocē, ut veluti nutrimentū: multoq; mi-
nus, quod in ventriculo cōtinetur. quanquā id
enam nutrimentū vocamus, quod si probē con-
coquatur, aliquando fit nutrimentū. Ceterū nul-
lam esse assimilationem in veram, sed apparentem
tamen, dicunt hi qui nec archioscōam naturam
exsistunt, nec animalis habere providentiam,
nec denique villas proprias obtinere facultates,
quibus scilicet alia trahat, alia teneat, alia demu-
ter, alia expellat. Asclepiades porro nō solum ne
gavit intellē renibus vim secretendi lorum & san-
guine, verum etiam vrinam ipsam minime qd
per meatus viteras demitti in vesicā, sed
per alias quasdam obscuras vias, ac nullo sen-
su perceptas, profectus est, contrā quam licet pla-
nē cognoscere, vel ex ipsa viorū anatomē. Sed
nec admittit, ætate plus bilis usdem medicamē-
tis vacuati, hyeme pituitæ: neq; rursus plus bilis,
in iuvene: in senē, plus pituitæ. Quippe me-
dicamenta ipsa minime familiares sibi succos ac
trahere, imō verō nihil profus ac villo trahi, im-
pudenter pronuntiat. Opinio cuius qd sit absur-
ditatis plena, in calce lapidis magnes: ex quo quidē
vidimus ferreos stylos quinq; continentem
appentios, quorum primus partem lapidis tēti-
git, per illum scilicet diffusa in reliquos, ipsius la-
pidis vi. Hippocrates verō, qui naturæ mysteria
nouit, hanc semper tum admiratur, tum prædi-
cat. Huc facultates adesse affirmat: vniq; quæ sibi
cōueniens attrahat: alteram, quæ alienū a se re-
pellat. Ipsam præterea tum nutrit animalia,
tum augere. Iam morbos quoque finire, indica-
re, qd isdem facultatibus putat. Porro non modo
medicamēta purganna proprias sibi qualitates
trahunt, sed etiam quæ fursculos, & telorū cu-
spides, quæ præterea nō nunquā in carne sunt in-
fixæ, euellunt. Iam verō quæ cunq; vel serpentiū
venena, vel quæ telis sunt illata educunt, hæc
quoq; eandem quam magnes lapis facultatem
ostendunt. Ceterum eorum quæ venena extra-
hiant, alia venenum viperæ, alia pastinacæ mari-
næ alia alterius cuiuspiam eliciunt: liquidōq; vi-
dere licet super ipsas medicaments venena ia-
centia. Est itaq; rebus quibusq; facultas quædā,
quæ nimirum congruentem sibi qualitatē attrahit:
id quod certē vel in tritico videre licet manifestis-
simē. Nam si fistula vasa quæ plena,
in tritici acervo recondas, id lum orem in se per
fistula evocans, tum molem sibi, tum pondus
aducit: cum videbēt tritici ipsum trahendi ad
se viciniolum minus maiore vim habeat, quam vel
vehemens calor solis. Atq; ad hunc modū reni-
bus intellē propria quædam vis lotū trahendi. Si
quidē venæ cuiq; pars altera, sursum ad cor ascē-
dit: reliqua super ipsā incedit, per totam eam
ad crura vsq; porrecta: cui renes & larenibus vi-
trinq; per venas quasdā emulgetes adixerēt. Per
quas

Nutrimentum
propriē dictū.

Nutrimentum
aquæ voci do-
ctum.

Asclepiades
error.

Magnes.

Hippocrati
calor & adu-
rator naturæ.

Purgantibus me-
dicamētis ma-
gis vim propriam
sibi, quam aliæ
trahendo.

Medicamenta
eliciunt ven-
ena.

Attrahitrem
vim congruen-
tiam cuiq; sin-
gulis rebus.

Tritici habe-
re maximam
vim trahendi
sibi humorem
viticum.
Renibus inesse
vim lotij tra-
hendi.

Autrix facul-
tas quando vi-
get, & quæ se
insolentior illa.
Autrix facul-
tas propriam.
Augere, scilicet
dam trinom di-
uisionem, scilicet
naturæ est opus.

Agglutinatio
nutritionis ef-
fectrix per se
per se est.
Nutritio quam
da facit.

Assimilatio.

Nutritrix facul-
tas opus esse
assimilationis.
Assimilatio
quæ respiratio-
nis.

Organum natu-
ræ corrupti-
bita plurima.

Instrumentū
nutritionis in-
strumentum co-
mune vitiq;.

Nutritio quid.
Agglutinatio
semper assimi-
lationis præce-
dit.
Appositio præ-
cedit aggluti-
nationem.

quas quidem cum eniam feratur sanguis, quod-
terolum eius, & tenue est, id per renes, seu per co-
latoria quædam transibit, non quidem consecra-
tione ad id quod vacuatur, qualiter Erasistratus
existimauit, sed ob renum facultatem tractatæ,
alioqui nulli extensa vrina perirent, quod ve-
ro sanguinem & crassum, id coëctetur, ac per
vniuersum corpus regeretur. Non est autem di-
uerſa ratio, qua vrina per renes in vesicam fe-
runtur, & qua sanguis in omnes animalis par-
tes: neque enim qua ita feceruntur bilis.

GALENI PERGAMENI de naturalibus facultatibus, liber

secundus.

QVOD necesse quidem sit fieri vim quandam
in renibus esse, quæ huiusmodi qualitatē,
qualis in vrina percipitur, ad se trahere sit
habilis, superiori monstrauius libro. Quæ nu-
morum facultate cor etiam, vnicui ex his quæ post
iecur habentur, in dexterum proculdubio simi-
sum alimentum trahit, deinde per arterialem ve-
nam ad pulmonem transmittit. Reliquorum qui
pe nullum, nec Erasistrato quidem ipsi, nutriri
ex corde placet, propter eam, quæ super vasis cre-
scunt, membranas. Iam vero, qui pro tenuitate,
aut crassitie humorum, latitudine autem, aut an-
gustia meatuum, fieri aut ipsam humorū segre-
gationem, huius nobis rationem reddant oportet,
cur vrina, quam bile esse tenuiorē constat, in bi-
lis vas non infusa. At certe nullam aliam redde-
re poterūt, præter facultatem illam à natura vni-
cuique instrumentū itam ab initio tributam, sine
qua durare animalia non poterūt. Siquid nec vi-
uere, nec durare vili animalium, vel breuissimo
tempore fas erit, si tot in se particulas, tamque dissi-
dentes cum habear, nulla facultate vratur, nec
conueniens trahat, nec quæ alienū fecerant, nec
quæ id quod nutrit, alterabit. Quibus quidem
facultatibus vnus natura illa, quæ particulas ef-
fingit, easque sensim adauget, atque omnino est per
eas totas extensa: vt quæ sanè totas per totas, sin-
gar, nutriat, atque augeat, veteri semper ipsius ma-
terix forma mutata: quo vel maxime nomine
differt natura ab ita natura, quæ foris quidē ma-
teriam ipsam adornat, intus autem illaboratam
atque neglectam relinquit. Phidias siquidē ex ce-
ra efficere ebur, aurumve non potuit, sed neque
auro ceram: quippe horum quodque manens id
quod à principio erat, foris tantū speciem ar-
te aditū, perfectā sit ita natura. At natura, nullis ma-
terix veterem formā seruat: alioqui sanguis om-
nino esset cum ceteris animalis particulis, in scili-
cet qui à matre cōcipiente conduxit ad maris se-
men, inſtar cere cuiuspiam, atque vnus & vniformis
materie, artificio subiectæ. Nulla autem ani-
malis particula ex ea ipsa materia sit ita rubea,
humidave, sicut est ipse sanguis. Nam os, cartilago,
arteria, vena, nervus, adeps, glandula, mem-
brana, medulla, ex sanguine quidē sunt omnia, li-
cet cōcreta ex sanguine, videlicet materiali prin-
cipio. Semen vero cum sit efficiens animalis prin-
cipium, trahendi sanguinis possidet et facultatē,
nō secus quæ magnes ferrū. Quare primū quidem
competentem sibi sanguinem attrahet, quem &

facile vincere, & celeriter assimilare, & sibi nutri-
mentum facere possit. Mox arbitror scicōdo at-
trahet, & tertio, quod scilicet sibi molem magni-
tudinemque iustā ex nutritione adiciat. Vnde ita
alteratrix inventa vis est. Tertia verō formatrix
apparebit: cuius ope semen primū veluti cōcre-
tum quiddam tenue, membranam illam sibi in-
duat, quam Hippocrates sexta die cum foris, Mu-
sice eadem mulieri quorū tunica similem ex-
disse ait. Post hoc verō reliqua etiam quæcunq;
ab eo, in libello de infantis natura, sunt scripta,
fingit. Cæterum cum augeri illa post formatio-
nem cōueniat, id profecto assequitur, tum in om-
nē extensa partem, tum verō nutriri. Cor igitur
ab initio ita mihi parum esse, vt nihil à ma-
tri semine, aut si maius à faba distet, intellige. Au-
gentur porro ea tantū, quæ viuunt, quorum ni-
mirum forme perfectæ iam sunt. At eaus quod
sit, processus ille qui est ad formā, non vtiq; au-
ctio, sed generatio nominatur. Siquid augeri
id quod est: gignitur quod nō est. In vniuersum
autē didenda Erasistrati citō opinio, dicens at-
tractionē fieri successione conuui ad id quod
vacuatur. Quæ ratio, tantū succedere conuui ue-
cessariū facit, quantum effluit. Hoc verō iis qui
cōmodo sunt corporis habere, satis ad nutritio-
nem est: viropore quibus ea quæ apponuntur, iis
quæ effluunt, paria esse oportet. At in iis qui ad
vinum sunt graciles, ac liberaliter rescipi po-
sunt, nisi multo plus sit quod apponitur, quam
id quod vacuatur, pristinū restitui habebit nun-
quam poterit. Liqueat igitur, quod tanto plus
sunt huius attrahit, quanto etiam pluribus egent.
Trahitur itaque nutrimentū, nō successione con-
uui, ad id quod vacuatur, sed pinde ac à magne-
te lapide ferrum, qui scilicet talis qualitatē tra-
he de vim habet. At verō distributionis prin-
cipium expressio ventriculi præstat: reliquū autē
eius progreſſum omnem, tum venæ ipse cōtra-
ctæ ac propellentes, tum singula quæ nutriti-
ad se trahentia. Quare improbē Erasistratus ha-
lucinatur, dum horum omnium causam successio-
nem illam ad id quod vacuatur, ita iur: sicut
enā vbi ex icterici scitro gigni semper hydro-
pem ait: id quod certe hominis planē est secor-
dis. Siquid ex diuturnis hæmorrhoidibus, vel
suppressionibus, vel immodica profusione, hominem
ad extremā frigidaſcit ducuntibus, nō semel au-
bis, sed sæpe iam aquam intercutem collectā vi-
di. Sicvn mulieribus quoque tum menſtrux pur-
gatione omnimoda cessaria, tum immodica va-
cuatio, sæpe hydroper accedunt. Nonnulli
verō eorum, & qui mulieribus vocatur fluxus,
in hunc terminatus est morbus: vt interim qui ab
illis incipiunt, aliōve quopiam opportunorum
ad id membrorum, hydroper imprecſentiarum
prætereant. Est tamen ea prima generādi hydro-
pis causa, quæ ex sanguificationis defectu pro-
cedit: simili genere, atque ex oborū cōcoctionis de-
fectu diarrhœa. Atqui in tali hydropi genere,
nec alud vicius vllū, nec iure vitio est asseclū.
Sed illud etiā, quod innuere videtur, præ se fert
extremā absurditatem: nepe fieri posse vt bilis ci-
bus itam multa, forissecus nobis adveniat, non
gignatur in corpore. Mel siquidē, non eō quæ plu-

Formatio fa-
ciat.

Auctio qui
fat.
Corde magni-
tudo in prima
erit.
Augeri tantum
quæ viuunt.

Generatio quid
dicatur.

Nutritum
trahi, non suc-
cessionē ad id
quod vacua-
tur, sed pinde
vt à magne-
te trahitur fer-
rum. Distributio ab
intercutem quo-
do fiat.

Hydrope qui-
bus ex vacua-
tione generat
fit.

Hydrope gene-
randa prima
causa, ex san-
guificationis de-
fectu.
Diarrhœa ex cō-
coctionis defectu.

Leti expurgan-
do ratio.

Pulmonem su-
perius omnia
viscera, nutrit
ex corde.

Facultatem na-
turalem esse ne-
cessariam ad vi-
tam.

Natura esse per
totam corporis
partem exten-
sam.

Natura ab ita
natura qui des-
erit
Phidias.

Sanguis est ma-
teriale prin-
cipium, ex quo cō-
creſcunt nulli
corpori patri.
Semen est effi-
ciens animalis
principium.

rimam in se bilem continet, sed quod intra corpus est mutatur, in hanc alteratur & vertitur: Quippe amarum gustantibus esset, si bilem in se extra corpus conneret: omnibusq; similiter hominibus equalis ex eo gigneretur bilis copia. Verum id fecus habet. Si quidem quoniam sunt in flore, potissimum si calidiore natura sint, ac vitam laboriosam transigant, in istum bilem vertitur in suam bilem. Senibus verd admodum est accommodum, vapore quibus non in bilem, sed in sanguinem convertatur. Gignitur autem in lecinore, atq; etiam in venis, ipsa bilis vna cum sanguine. Est enim exacte iam demonstratum veteribus, dum in ventis alimentis ab initio calore alteratur, sanguinem quidem ex mediocri calore fieri: reliquos vero succos, ex eodem immo dico. Atq; haec sententia, quae evidenter sensibus apparent, omnia consentiunt: quando & ex cibis, hi qui natura sunt calidiore, magis sunt biliosi: qui frigidiore, magis pituitosi. Simili modo ex aeribus, quae calidiore natura sunt, haec biliosiora esse collitur: qui frigidiore, pituitae magis obnoxias. Iam vix rationis, & regionis, & anni temporum, multoq; proinde his, ipsarum quoque naturarum, quae frigidiore sunt, ex magis cernitur pituitosa: quae calidiores, magis biliosae. Praeterea ex morbis quoque, qui frigidi sunt, hi a pituita oriuntur: qui calidi, hi a bile ortum habent. Cum enim ob certam illarum quatuor qualitatium temperiem, particula quaeque certam habeat functionem, necesse omnino est, propter eandem temperiem vitium, aut proinde corrumpi functionem, aut impediri: ac proinde vel tori, vel in parte exortari animal. Ac primi quidem, maximeque generales morbi sunt quatuor: qui calore, frigore, siccitate, humiditateq; inter se disident. Porro in febribus, admodum vitiatur ipsa coactio ventriculi, ob calorem illum praeter naturam, qui cum substantia sua functionem ipsam, merito inter primos morbos annumeratur: quare actio ipsa necessaria ex commoda nascetur temperie. Neque enim aliunde causa potest intertemperies primorum esse causa morborum, nisi quod commoda sit temperies corrupta. Cum enim ab hac mantentatione, necesse est prima etiam vitia, ex hac manare corrupta. Est autem commoda caloris temperies, ipsius actionis causa. Quare in omni actione, id quod melius est, commo de temperamento ferre acceptum convenit: quae deteriora sunt, vitiosa. Sanguinem itaq; a mediocri, bilem ad immo dico calore nasci, putandum. Vnde ita qui sani circa vitium sunt, vbi aliqua coactio occasione contra consuetudinem cibo abstinentiur, ubi quidem amarum, lotium verd biliosum redditur, atq; etiam mordetur venter, quod videlicet ea quae coquantur immo dico, primam quidem salisora, postea verd amariora reddantur. Nam si mel ipsum, quod omnium dulcissimum est, plurimum percoquere velis, id quoque reddideris amarissimum. Quod namq; ad dulcedinem generandam caloris ei debeat accedere, id totum profus intra se obinet. Quare si calidum cum sit, calido adhuc iungatur, statim fit bilis, non sanguis. Postulat itaq; ut vertatur in sanguinem, naturam hominis frigidam, statimq; frigidam.

Non ab re igitur tensit Hippocrates, mel biliosum naturam non esse ex vitiis inimici autem esse morbis, quos amara excruiat bilis: At senili natura, maxime co veniens existeret. In vniuersum autem, corporibus validis, quocumq; ex occasione sint calidi, mel atq; dulcia omnia, generanda bilis causam praebent: his autem quae coctam sunt habent, sanguini. Atqui non potest idem abus alius vitiis in bilem, aliis in sanguinem, nisi intra corpus eorum generatio peragatur. Etenim si bilis quicquid a se & in se habens, accin animalis corpore mutatur, bilem gignit, vix in omnibus eam corporibus pari modo generat. Sunt igitur semper nobis causae ipsae inquirende. Qui enim intemperamentorum causas cognovit, si facili ad naturam suam ea reducit. Porro affectus qui minime ex accidentibus, sed primum & per se labefactat functionem, vix morbus est. Iam vero Hippocrates temperari colorem, & qui modice est humidus, sanguinis generandi causam affirmat: quia ratione sanguinem potestate calidum & humidum esse ait, neque ut flammam bilem calidam atq; siccam, quantumvis sit aspectu humidam. Quippe disident quod secundum appareniam humidum est, ab eo quod viribus tale existit. Calm enim vbi phurims in ventriculo flammabilis coactetur, perpetua sit vtegamur, signum est, potestate ipsam calidam esse, & siccam: neque, ut pinet illi frigidam, humidumq; cum quae etiam albicant ille succos, quem bilis, id est, mucum, appellat Prodicus, frigidus atque humidus est. Est & alius humor frigidus simul & siccus, qui & in autumno, & in aetate illa quae succedit vigori, crescit, quam atram vocamus bilem, flammam autem acriorem, & maligniorem. Dysenteriam siquidem ex ea ab atra incipit bile, mortifera prosumat Hippocrates. Non tamen quia a flaua oriatur, proflus mortifera est, sed plerumq; ex ea feruitur. Est autem atra bilis receptaculum lile: qui vbi minus quam iustu sit, illam ad sese trahit, vtpote quando est male affectus, neq; valenter trahit, ut sanguis impurior est, sic tori corpus magis redditur decolor. Tum regni morbi, qui si bene agrotante ortu habent, nigiores sunt: itemq; vlcera cicatrices nigrae. Ceterum quibus corpus floret, his lile, Hippocratis testimonio, minuitur. Quibus vero id viscus magnu & rursus angustius, corpus minuit, et cacochymum reddit. Quemadmodum igitur in feruente multo duo proventre excrementa cernimus, alteru leuius, magis grauius, quod nimirum florem vocamus: alterum grauius & magis terreum, quod appellamus faecem: sic etiam in sanguine generando, excrementa gignuntur duo, quae illis proportionem respondent: alteru tenue, humidumq;, & fluidu, quod flaua dicitur bilis, & in vesicis felis excipitur: alterum faculentu & terreu, quem veteres atrum succum appellant, quemq; ad se lilem ipse trahit. Ceterum non eandem habent hi succi speciem, cum respondent naturae modo, quam vbi praeter naturam se habent. Quippe quae flaua dicitur bilis, ad vitam perassatur, crassa, ignea, & vitellina redditur. Atra etiam bilis, per se faidem, longe malignior quam naturalis, evadit. Si quidem tum acris, in more aceti, sitrum corpus

Mel biliosu non
tenu non esse
ex vitiis, confon
re autem iuuat

Infusio primi
labialis sua
flam, et mor
bus.

Sanguis calidus
et humidus.
Bilis calida et
sicca.

Pituita frigida
et humida.

Atra bilis acris
et malignior quam
flaua.

Lile receptaculum
lile atrae bilis.

Lile imbecille
et quae acci
dant.

Regni morbi d
lilem acris, ni
griores.

Multu ex san
guine ciperat
to.

Flammam biliosam
dum per assatur,
crassam, igneam,
et vitellinam reddi.

Atra bilis per
assatur, quae
reddatur.

Mel siccum
in bilem convertitur.
Mel siccum
conferunt
Bile generatio

Sanguis si ex
mediocri calori
rit.

Frigidi morbi a
pituita oriuntur.
Calidi morbi a
bile.

Morbi primi
quatuor.

Consuetudinem
ventriculi viti
tiori maxime
in febribus.
Ad hunc ex eo
moda omni tem
peria.

Temperamentum
praeter consuetu
dinem, quoniam
accidant.
Qua coquantur
immo dico, primi
salisora
postea amariora
reddi.
Mel reddi ex it
ga caliditate a
marum.

corpus rodit, necnon terram ipsam fermentat, ubi scilicet aëstiritia putredo nigro illa succo naturaliter se habent accessit. Multiq; videtur veterum medicorum plerumq; id quod est illi succo naturaliter se habet, quodq; infra dicitur, & sic pe supra fluitat, atrum vocare succum, non atram bilem: quod verò ex vitæ quæpiâ ac putrefactia, in acidâ migravit qualitatē, id atram nuncupare bilem: quod excrementū iam præter naturā est, quum nimirū ab vitæ non natura-

Atra succus.

Atra bilis.

Sex vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

Vitæ vitiæ atq; corruptæ carum.

ante assimilationem agglutinatorio sit: hanc verò ab appositione præcedi, quæ sit est actionis quæ ab attractrice perficitur. Porro ad nutritio-

Nutritio quæ sit necessaria.

nem ipsam amplius opus est tempore, quam ad perficiendâ aliarum facultatū actiones: requi-

riturq; ut appositus in particula succus, si illam sitn utiturus, munime transferatur ad alias, sed in ea quiescat: quare necessitatem etiam videtur na-

turæ ipsi facultas quædam retentrix, quæ id quod appositum est retineat. Talis autem vis, in maxi-

Retentrix facultas in quibus conficitur.

mus, maximeq; causi intrinsecus conspicua ad-

modum cernitur: in parvis aut obsecutus. At in-

Partes maxime causæ.

ter animalis partes maxime causæ, ampliusq; sunt, ventriculus, vterus, & quæ secundæ vo-

cantur. Retinet autē vteror cibum, quoad eum con-

coctat: nec minus ferti vterus, quoad hunc con-

summant. Ceterum longe amplius perficien-

di factus tempus, quam cibi concoquendi. Ac

proinde retentrix vteri à nobis multo clarius co-

gnoscitur. Quippe nouem mensibus plerisque

mulieribus perficitur in vtero fetus, qui tota

quidem ætate conuiuet: complectitur autem

totum vndiq; vni cum secundis. Estq; tum oris

conuiuentie, tum moræ fetus in vtero finis,

ipsa actionis vitæ. Nam ubi id completum

est, cuius grana retentrix facultate est vis vter-

us, vniq; hanc inhiat, ac cessare facit, propul-

trice, quæ hætenus quiescebat, loco eius assu-

pta. Sane erat licet quies huius facultatis finis,

ipse visus: ita enī actionis eiusdē finis, simili-

ter ipse visus, vtpote quo exortante agar, nō exi-

stant quiescat. Succedebis igitur retentrix omni-

bus quæ in vtero sunt, expultrice quiescit omni-

no facultas: improprie autem cedentibus, non

amplius expectat vterus nouem mensiū tempo-

ris moram: imò retentrix facultas statim desistit

ab opere, & expultrice vi moneatur permitti:

æteum sibi in vtero succedit. Itaq; verò prægnan-

tes ipse primis diebus, postsumūq; eo ipso quo

semen est conceptū, moueri atq; in seipsum con-

curre vterum sentiunt: quod si præter hæc, ci-

tra affectum aliquem, etiam conuiuet os vteri,

Expultrice et retentrix vteri sibi mutuo succedere.

Conceptionis ratio.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

Vteri in clauis re. & in clauis re. & in clauis re.

GAL. DE NATURAL. FACVL. LIB. III. de naturalibus facultatibus, liber tertius.

Nutritio quæ sit.

Facultas nutritiva quæ sit.

Nutritioem quidem fieri, quum id quod nutrit, ei quod nutritur, assimilatur: es-

60

scq; in singulis animalis particulis facul-

tatem quandam attractricē, quam membratim

assimilatricem & nutritoriā vocauimus: aliāq;

præterea attractricem, quæ materia cōueni-

ti nutrimenti suppeditat, in proximo demon-

ventre verò, ad hunc modum. Quum is pro sua natura fe habeat, ac constrictoria virtute vitur, quamlibet exigui sit quod in se continet, totū id vndiq; complexus nullum vacuum relinquat locum. Quum imbecillus est, quacumq; parte completū exactē assumpta non valet, ac proinde laxum quoddam spānū efficit, permittitq; ea quæ in se continent humida, ex alio in alium locum transire, ac fluctuationum sonitus edere. Talis autē ventriculus, quū imbecillus sit, haud quidem probē concoquit: sed in eo diutius videbitur quædam manere grauitas, tum cibi, tum potus, vt qui etiam tardius cōcoquit. Eius autem diutina ciborum moræ, non est causa angustia infimi orificij ventriculi, quā videamus indies multo habere crassissima, quæ per imprudenti vorantur, facili excerni: sicuti & alia liquida retineri: vnde neq; etiam eiusdem in ventriculo moræ finis aut terminus erit ciborum in cremorem conuersio (alioqui sorbitiones, & lac, & pituitæ cremor, in omnibus illicō transirent) sed concoctio, quæ à conuersione in cremorem res est diuersa, sicuti nutritio à sanguificatione. Est autē concoctio ipsa in ventriculo, nutrimenti in propriam eius quod nutritur qualitatem mutatio. Vbi igitur ad perfectionem concoxit cibos ventriculus, tum aperit inferius os, exciditque per ipsum facile cibi, etiam si lapides, ossa, acinos, aliaque quæ vtri in cremorem non possunt, plurima secum habeant. At interim dum coquit ventriculus, cibos totus (pennde vt vterus factum) ambit, & amplexatur, claudensq; ad vnguē infimum illius orificiū, quod pylorum nominant. Itaq; neq; in vtero, neq; in ventre, neque in vesica vtriusq; licet reperire locum aliquē vacuū, scilicet instrumentorū tunicas, ea quæ continent, semper arctē amplectentibus, quandiu naturaliter se habet animal. Quare illis omnibus in genere sunt aliquę facultates, quibus retinere quæ expediunt, expellere aliena, possint. Siquidem quod bilem ad se trahit ea quæ iecinori subest vesica, supra est monstratū: quod autē & in ventrē quori de eiciat, id quoq; eidenter cernitur. Atqui si tractricis operā statim expultricis actio exciperet, nec media semper inter eas intercederet vis retentrix, par semper in vesica bilis inuenerit modus: at non sic in ventrē, sicuti nec vrinæ in altera, quæ lotio est addicta. Porro vbi ventriculus circa imas partes multitudine ac acrimonia humoris afficitur, si firmæ sint quæ circa stomachum habentur partes, diarrhææ citantur. Quū verò sic eius os infestatur, si cæteræ partes valentes sint, vomitiones sequuntur. Quippe ventriculus, non secus quā partes reliquæ, vt conuenienti sibi qualitatē experit, sic prorsus alienā respuit. Quare si expetit, trahet vtriq; et expellet, si etiam fastidiat aliquid. Ad hæc autē, si trahat, necessariū etiam frui: id quod non licebit illi, nisi retineat. Sed ipsius fruionis aliquis erit finis, nempe benignioris ciborum substantiæ succus, & repositio intra venas. Post quem finem iam expultricis facultatis agendi succedet tempus. Nam vbi ab vnde saturatus est venter, quicquid reliquū nutrimentū est, veluti onerosum aliquid reiciit, quanquā ex eo, quod cū ventriculo

Ventriculus quod non rellit et coquat.

Ciculus of ut nutrimentis in pro priis eius quod nutritur, quod tati, nutritio.

Hyloru.

Vesica folia tra hit bilem.

Diarrhæa quod de excretion. Vomitiones quando.

habuit, commercio, ipsum quoq; consecutus est salutare aliquid. Quippe vbi conuenit duo corpora, quæ ad agendū ac panendi sunt nata, si pares in vires sint, ex quo tū agent, tum patiētur. Sin longē superet, vincatque alterum, magnum quiddam, in id quod patitur, efficiet: ipsum verò vel exiguum aliquid, vel omnino nihil patiētur: quod nomine diutius nutrimentū à medicamento venenoso: hoc namq; vim corporis vincit, aliud ab hac vincitur. Mimimē igitur potest conueniē animalis nutrimentum esse, quod ab iis quæ in animalis sunt qualitatibus non vincitur. At vinctū aliud nō est, quā alterari. Non tamen æqualē omnes modo vincunt nutrimentū particule. Siquidem alteratio quæ fit in ventrē, maior est quā quæ in ore plicatur: minor verò quæ in iecoure & venis. Horum namq; alteratio, nutrimentum in sanguinē substantiam mutat. Quæ in ore agitur, mutat quidem id in alteram speciem manifestē, non tamen ad perfectionem transformat. Cæterum quā magna sit ciborum in ore alteratio, hinc discas licet, q; mansum tritū crudos fusciculos ocysime & mutat & coquit: quum tamen si aquæ admiscetur, nequeat tale quicquam prestare. Nec est quod id mactere. Nam piruita quæ in ore habetur, & lichenum remedium est, & scorpius statim necat: præterea multas ex venenatis bestias, partim prorsus perimit, partim spatio: omnes certē insigniter lædit. Verū quanto hī qui mansi sunt cibis, iis qui in hærescunt in vacuis dentium intervallis, magis sunt alterati, tanto etiā his magis hī qui devorati sunt. Siquidem incomparabilis est horum alterationis excessus, si & quæ in ventrē est piruita, & bilis, & spiritus, & calor, & tota venter substantia, æstimetur. Quod si vīcera quoq; illi adiacētia, tāquam magnō leben plures ignis foci, pariter æstimata sint, à dextris quidem reor, à sinistris lien, supērne cor, & transversum septum, & eleuati, & asidū mōtum, ingentem quandam ciborum, qui in ventriculi sunt devorati, alterationem fieri credideris. Quo autem pacto mutari facili in sanguinem possent, nisi talis essent mutatio preparati? Monstratū namq; est, nihil in contrariam qualitatem totum simul migrare. Porro venter duas habet tunicas, vīq; ad ipsum os pertinentes. Quarū interior quæque, qualis in ipso est ventrē, talis persistit, in directūq; portectas fibras fortitur, trahendi nimirū grana. Altera ad carnosiorē speciem in gula conuenitur, habetq; transversas fibras, ad cōtrahendum vndiq;. Quippe singulorū quæ mouetur instrumentorum corpora, pro fibrarum positura morus habent. Iam in singulis intestinis circulares in vtraq; tunica fibræ sunt, quod contrahantur duntaxat, nec quicquam trahant. At venter alias fibrarum rectas habet, quibus scilicet trahant alias transversas, quibus cōstringat. Verū vbi transversæ fibræ tenduntur, latitudinē ventris minorem reddunt. Rectæ autem dum contrahuntur, necessariū longitudinem minuunt. At verò deglutenibus nobis, liquidū cernitur larynx sursum in tantum currens, quanti gula deorsum trahitur: quib; cōpleta iam deglutendi functione laxauerit sese gula, lūculēter descendere

Nutrimentum à deterio me dicamento quo modo differat.

Vini nō esse aliud quā alio rari. Alterationum vbi differat.

Alteratio quæ fit in ore.

Trinitum man sium crudos fusciculos in u quer. Tritum vno nare corpore.

Alterationis quæ in ventriculo fit, dignitas.

Ventriculo duas in se tunicas vīq; ad os pertē nentes.

Fibra recta, trahit grana. Fibra transver sa ad contrahē chum.

Intestina non trahunt, sed cōtrahunt tantum.

Larynx sursum tantum trahitur, quantum gula descendit.

Ventriculi in-
stentis tunica
et vasis.

Gulam esse ci-
borum ad ven-
triculum viti.
Deglutire cor-
facilis quon-
vomer.

Gula externa
tunica inter-
re vomitus, atq-
deglutit.

Venter quon-
in ore in vomit-
tor.

Gula inter de-
glutandum im-
pieri fibras.
Gula siem obli-
qua.
Ventriculi qua-
tor facultates
naturales, quæ
nutritivæ et
fermentæ.

Infractura su-
gula sursum at-
tractrix et ex-
pulsiva pot-
entiam.

Fibra obliqua
opulenter re-
tentiva pot-
entia.

dere cernit illa summus asperæ arteriæ. Siquidem
interna & ventriculi tunica, quæ rectas habet fi-
bras, quæq; tum gulâ intermixta venit, tum os
ipsum, ea inquam super internis partibus ipsius
laryngis extenditur. Itaque fieri nequit, quom i-
psa à ventriculo deorsum trahatur, quin simul-
taneam secum detrahat laryngem. Sed quod su-
perius partibus contractæ, inferius dilatentur,
commune quidem id est, tum viuis, tum demor-
tuis corporibus. Gula igitur, vt monuiturimus, 10
trahitur: alio qui laryngem non traheret. Trahit
autem per gulam ipse ventriculus cibos, quos eniã
per eandem evomit. Atq; idcirco facilis est de-
glutire quàm vomere, quodd scilicet deglutitur
ambabus ventris tunicis operantibus, interna
quidem trahente, externa se contrahente, ac tru-
dente: vomitur autem altera tantum, quæ foris
est, ac trudit, agente, nec vlla in os trahente. Nō
enim sicuti ventris appetentia deglutientes ci-
bos præcedit, sic in vomitionibus appetit oris 20
pars vlla, exorta affectus quippiã, sed sunt am-
bo ventris affectus inter se contrarij quorum vi-
trique inferius gulæ tunica externa, cui transver-
sa sunt fibræ. Etenim deglutio in his qui immo-
dicè appetunt, ocysimè fit: ventre nempe cibos
deorsum vellente, prius quàm sint mansi, vt in
Hiemalis, & Synodontibus accidit, quorum præ-
gulositate (vt Aristoteles inquit) venter aliquan-
do in ore invenitur. At vero vitæ gulæ tuni-
cam prædictæ fungi actionibus posse, hinc de-
prehendimus: quod si in vno animali externâ quid-
em in tunica, cui transverse adsunt fibræ, in al-
io autem internam, cui rectæ, transversâ incisione
secutus, vitæque planè animal deglutire vide-
bitur. Ex quo manifestè patet, q; altera earū de-
glutire licet, ceterum deterius quàm ambabus.
Sed hoc interm perpendendū est, spiritui qui v-
nâ cum cibis deglutitur, gulâ inter deglutendū
impleri, esseq; sicut huius obliquū. Inducamus
igitur quatuor in ventre virtutes sitas: nempe in
deglutendo attracticē, in coquendo retentri-
cem, in vomitione, & concoctōrū ciborū in te-
nue intestinū descensū, expultricem: ipsam verò
concoctionem quandam existere alterationem.
Quas quidem facultates ministras esse nutritio-
nis, similiter exposuim. Sed enim vt iterum hu-
manum canibus existit suavisimū, ita iecinus
excrecentiorū, aliud huius, aliud bilis vesicæ, al-
iud renibus est acceptum. Ergo vniuersa instru-
menta geminas facultates olinnet, & quæ cōve-
nienter trahitur, & quæ alienū repellit. Proinde si
quod vel ex vna tunica instrumentū cōstitit, vel
vni ambæ vesicæ, vterus, & vena, vitæque fibrarū
genus obinet, rectarū & transversarū. Quin ter-
tum quoque fibrarū genus obliquarū est minus
omnino, quom duo prædicta genera, numero-
sum. Invenitur id in his instrumentis, quæ ex dua-
bus tunicis constant, in altera sola, rectis scilicet
ipsis fibris immixtum. In his autem quæ ex singu-
lari constituntur tunica, vna cum duobus aliis 60
generibus. Sane hic maxime opulenter reten-
trices facultates actioni. Postulat etiam in hoc co-
pere particula quæ super ea quæ continet, itrin-
gi ac circum ea tendi: vnde venter quidem, to-
to concoquendi cibi, vterus toto gestandi fer-

tus tempore. Venæ porro tunica, ex multifa-
bris fibris est condita. Externa arteriæ tunica, ex
circularibus: interna ex rectis planis, paucis
autem cum his obliquis, constat. Sola instru-
mentorum omnium ex dualis tunicis, atq; laryn-
gem vitæque ex transversis consistente fibris, facta
sunt intestina. At vter & vitæque vesicæ, & vteri,
vbi vel multitudine eorū quæ continentur degra-
uantur, vel qualitate mordenur, quod offendit
abucere properant. Quorum vitæque aliquando
violenter incidit, quo casu provocatur abortus:
fit autem is plerumq; ex naturæ commodo, quod
genus non abortus, sed partus nominatur. Atq;
abortus quidem sequuntur vel medicamenta
quæ ipsos provocat, vel etiam tensionem vteri:
partus autem, ipsius factus motiones vehementis-
simas. Cōmunis autem omnibus his affectibus
ipsa est offensio. Cuius triplex est causa: aut mo-
les nimia, aut pondus aliquod, aut morbus. Mo-
les, vbi amplius distendi vterus nō tolerat. Pon-
dus, quod supra vires eius sit, quod cōtinet. Mor-
bus, vbi vel humores qui prius in mēbris tam
nucubantur, his ruptis, in ipsum vterū sunt effusi:
vel etiam totus partus corruptus & putris, ac in
noxiam saniem dissolutus, vteri tunicæ eius oc-
casionē irritat, atq; mordet. Ad hæc, incrementa
singula, si mori in corpore diutius trahant, pu-
trescant: quare mordacia & acris, atq; his quæ i-
psa continent, infecta redduntur. Muius tamen
id in ea vesicæ quæ iecini subest, similiter se ha-
bet, vt quæ nervorū planè sit experta. Quāquam
certè cūm hæc ipsa trahat quiddō, externatque,
necesse est eam vel succa multitudine pressam,
vel qualitate illius offensam, expulsionem desi-
derare. Iam nec illud difficile cōperit, & tractū
& expulsionem duersis in temporibus per
eundem eius meatum fieri. Vteri præterea iū-
mulus, pari modo sicut intro seminis, ita foras
partus via est. Verum hic tractrix facultas, æque
atq; expulsiva, non licet vulgo. Quam igitur
attractionem & expulsionem, per viam ean-
demq; fieri viam certamus, non debemus mira-
ri, etiam si per venas in ventem natura nonnū-
quam excrementa propulset, dū purgantia phar-
maca propinamus: at multo minus, si per quas
venas à ventre in iecur facta est digestio, rursus
ex iecore in ipsum trahit aliquod alimentum
in longiori inedia potest. Venæ siquidem illæ,
quæ medium spatium inter iecur & partes cir-
ca ventrem occupant, duplex ministerium præ-
stant, nempe vt quum in his abundantia fuerit
alimen-
tum, per eas sursum feratur in iecur: quum
autem vacua sunt, nutritio autem, per easdem
ipsas ex hepate rursus trahatur. Siquidem totum
ex toto trahere, ac toti impartire, vniq; omnium
confluxio ac cōspiratio esse videtur. Quare mul-
tis eorum qui valentem exercitationem subdit
ac prorsus intermisissent, aut artuum aliquem
præceditur, sanguinem per intestina certis pe-
nodis simul plurimū cernimus evacuari, sicuti
illæ, eniã alios humores à natura in morbis ex-
pellit. Ac trahit quidem id quod est valentius: va-
cuatur autē id quod est imbecillius. Porro valē-
tius, imbecilliorq; altera quàm altera particula
est, vel à absoluto sermone, naturæq; etc. cōmuniter

Vena confusa
tra.

Arteria consti-
tuta.

Intestina sola
cibum ex dua-
bus tunicis,
quarum singu-
la ex transver-
sis fibris constan-

Abortus.

Partus.

Vteri offensio
eo triplex cau-
sa.

Excrementa singu-
la vbi mori-
cantur diutius
in corpore, cum
putrescunt.

Vteri iuma-
lus est vagus
tum & femus.

Ventrum quo
inter ventris
lun & hep-
tis, duplex
ministerium.

Trahere totum
ex toto.

Sanguis quibus
evacuatur per
intestina, certis
periodis plu-
rimū.

omnibus: vel priuatim huic cuiuspiam talis efficitur. Et natura quidem, omnibusque communiter animalibus, cor quod iecur, & iecur quod intestina & venter, item arterie quod venter, tum quod vtile est ad se se trahere, tum quod diuersum ab hoc est, ad se repellere, magis valent. At priuatim in vnoquoque nostrum alio tempore iecur valentius trahere potest, alio ventriculus. Quippe vbi in ventriculo copia alimentis est, ac iecur vlementer appetit, omnino id valentius trahit. In vicemque, iecore referto & distento, venter vero appetente, ac vacuo, valentius habendi vis in hunc transfertur. Estque nonnunquam quod minus animi & iecur causam, nutritum abundans in iecore. Nam venter, si melius, paratiusque nutrimentum habet, exterius non potest. Sin aliquando potest, neque eius copia datur, excrementis biliosis, pinutosis, atque ferosis implentur: quae vni trahenti iecur illi remittit. Siquidem vtrique particulae altera altera nutrimentum trahit, sic altera in alteram, quod superuacuum est, ad se pellit. Estque hoc vocatarum fluxionum causa. Confluunt autem ac fugantur superflua a formoribus semper ad imbecilliores particulas, donec ad omnium imbecillissimas deueniant: fitque quibus postea in alias transfluere nequeunt. Constat itaque non esse vnicum motus modum, quo in corpore materia moueantur, quod contrarias potestas, & necessitas contrarium motus sequantur. Eodem venter, quod excrementorum in eo fluat, per vomitionem expurgat: quod subsidet, alius deiectione: etiam in morbo ileo, in quo transitus omnino est praclusus, ob ipsius intestini phlegmonem, iterum etiam vomitur. Vnde mirum non est, si a corporis superficie, insolito frigore subit & stupata, & imbecilliori reddita, ad ipsa vasa intestina, & venter, aliquid translatum pervenit. Ac tales quidem motus celeriter cessant. Qui autem ab internis partibus irritant, quod vlementeriores sunt, & diuturniores. At vero quum particulae quaeque similiter ventri appetant, vni quod nutritur, & nutrimentum amplectitur ad eundem, quod venter, modum. Ceterum venter ipse non idcirco circa cibos se contrahit, quod reliquis partibus eos reddat accommodos, sed quod totum eius corpus, & attrahere propriis sibi qualitatibus, & eadem fruendi, ac ut ante monita tum est, vim obtineat. Accidit vero interim, ut eos aleret. Humore quorum vbi impletus saturaque est, pro onere eos de cetero habet, & denscit, ipse scilicet ad aliud opus, nempe ut agglutinet, converteret. At ab eo nutrimentum descendens, quum per tota intestina tunc permeet, per vasa quae ad ea pertinet, rapitur: plurimum quidem in venas, exigua quaedam portio in artenas. Quo tempore tunicae etiam intestinorum apponitur. At in his omnem iam naturae circa nutrimentum operam in tres temporum vices cogitatione partitur: In prima quidem simul & manere id in ventriculo, & concoqui, intelligitur tum ventri ipsi ad saturitatem apponi, aliquid vero eius etiam ad iecur ascendere. In secunda, transire ad intestina, ipsi ipsi & iecur ad saturitatem apponi: tum portuiculae eius exiguum in omnem corporis partem ferri. Porro hoc tempore, quod in primo est appositum, id ventriculo assequi intellige. In

tertia vero temporis portione, ventriculus quidem iam nutriti, is quae affixerat plane assimilatis: affigi vero tam iecur, quod intestinus, quae us fuerant appositae praeterea in omnes corporis partes digestionem appositionemque fieri. Quod si rursus animal nutrimentum accipiat, quod tempore id venter coquit, eodem fruitur, quicquid vtile ex ipso est, tunicaeque apponens: eodem intestina quidem eum quem sibi affixerat succum, proprias assimilabunt. Pari modo iecur. In toto vero corpore, partes nutrimenti quae fuerant appositae, assingentur. Sin autem venter marere sine cibo cogatur, hoc tempore a venis quae in lactibus ac iecur sunt, nutrimentum trahet, non ex ipso iecur corpore. Siquidem qui in quaque particula iam contentus, agglutatus, ac assimilatus est succus, hunc alteram particulam revellere non est credibile. Iam vero lienem, quod in iecur ore crassius est, ad se trahere, consuevit, & ad vtilius mutare, id lienem etiam aliquod trahi in vicinas partes, comperit est. Sic vni & ventriculo alio tempore lienem excrementum remittit: alio rursus ex ventre aliquid proprium illius nutrimentum ad se attrahere. Ergo, ut summum dicam, quodque ex quoque trahere, ac in vnumquodque mutere, diuersis in temporibus potest: ut in arteriis, corde, thorace, & pulmone videre licet: quibus dilatas viciis, contractis, necesse est id quibus aliquid prius est attractum, in ea mox emitti. Quare vasorum, quae in corde sunt, osculis, membranas applicuit natura, quae retroferri materiam prohibent. Quamquam non possunt ita ad vnguem claudi illorum vasorum ora, ut ex eis nihil recurrat retrò, praecipue in arteriam venosam. Est autem singulis arteriis vis quaedam ad cor de profecta, quae tum dilatatur, tum contrahuntur. Ceterum quae arteriae ad eum finem iecur, externum aërem, quum dilatantur, attrahunt. Quae vero parte aliqua ad venas se aperiant, quod tenuissimum, maximamque halituum in eis sanguinis est, ad se allicunt. Sic vni & corde, quod illi vicine sunt. Quippe in successione ad id quod vacuatur, quod tenuissimum & tenuissimum est, prius ei quod vacuatur succedit, quod id quod grauius & crassius existit. Est autem omnium quae in corpore sunt, leuissimum, tenuissimumque, spiritus. Secundum loco halitus. Terno gradu, qui plane absolutus, attenuatusque est, sanguis. Haec igitur, arteriae ex omni parte ad se trahunt. At ex intestinis & ventre, quae adeo crassum grauius in se nutritum habent, nihil, de quo rano vlla sit habenda, in se possunt transire arteriae, quae prius impleantur leuioribus. Sunt itaque duo tractionum genera: vnum, quod successione ad id quod vacuatur coningit: alterum, quod qualitate fit convenientia. Aliter namque aër in folles, aliter ferrum a magnetem attrahunt: ac secundum prius quod genus, etiam eminus trahi aliquid potest: ad secundum post eum, cominus duntaxat. Praeterea siue cessione ad id quod vacuatur, prius id trahitur quod leuius est: convenientia qualitate, nonnunquam quod grauius. Transfertur autem sanguis in arterias a venis ob reclusa ora, quae inter se habent, altera vas in alterum. Necesse ex dextro cordis specu in sinistram, quod tenuissimum sanguinis est,

Venter, in o-
fert, per me-
tracis venas
ad alimentum
trahere.
Sicuti simul ap-
positum alius
partis, ad renou-
ad aliam.
Iam aliquando
mittit in ven-
triculum multum
chylum fecit.

Quod regna-
que trahere, et
in quodque me-
tracis.

Membrana va-
sorum quae
sum fallit.

Arteriae omni-
bus in quan-
dam inesse a cor-
de, quae dilatantur,
et contra-
hantur.

Arteriae quum
dilatantur, aë-
rem externum ad
trahere.

Arteriae ex ve-
nis attrahere
subtiliorem por-
tionem sangui-
nis.

Spiritus esse
sumum tenuis-
simum quid.
Halitusque est spi-
ritus est ten-
uissimus.
Transitum duo
genera.

Successio ad id
quod vacuatur
quod fit.

Successio sub-
tilissimi a dex-
tro cordis sinu
transfluere in
sinistram, per
medium septum
est.

Infusum
Pam toleran-
da causa.

Ventriculus per
nutrimentum in-
opiam, impleri
excrementis va-
riis.

Fluxionum
causa.

Fortiores par-
tes semper ad
imbecilliores
excrementa pro-
pellere.

Iles morbo in-
fistans iterum
erui.

Venter cur cir-
ca cibos contra-
hatur.

Tempera tria
circa nutrimentum
in concoctione,
distributione
que.

vero quæ in humanam veniunt cognitionem, omnia tum sensu, tum ratione deprehenduntur. Vnde quemadmodum ex sensibilibus multa sunt, quæ plurimis de causis sensus effugiunt, ita etiam & rationem. Dubitant autem Erasistratus scitatorum, quomodo, si sanguine repleta sint ipsæ arteriæ, possint spiritus à corde in vniuersum corpus deferri. Ad quos dicimus, non matri spiritum, sed atrahit nec ex solo corde, sed vndique. Demò stratur quippe à nobis est, in libro de visu respiratoris, aut nihil penitus, aut admodum parum substat spiritus, in cor trahunt. Vniuersus siquidem expirari potest, ut diligentioribus tum philosophis, tum medicis visum est, qui nò eius substantiam, sed qualitatem potius cordi esse ex visu autumant, utpote quod refrigerari appetat: atque hunc esse respiratoris finem. At vero arteriæ ipsæ non eò dilatantur, quia implentur, sed ideo potius implentur, quia dilatantur. Cum enim in suis tunicis vires quasdam habent, quibus se dilatant, ex vnaquaque sua parte, per extrema foramina, quicquid illis continetur, eff. vnde possunt, atrahunt. Poteris facilius intelligere exemplis, quæ sit differentia, quòd aliquid repletum dilateretur, vel quòd dilatatum repleatur. Vires quippe sacculi, dum implentur, dilatantur: fabrorum verò folles, dum dilatantur, implentur. At facultatis illius quæ arterias dilatat, cor veluti fontem esse, alibi à nobis est dictum. Et est hoc sane magis nature congruens, ut sic opinemur, quam ut spiritum per eas, veluti per inaniam quasdam corpora, ferri arbitremur. Differt siquidem viuens, à non viuente, non tam substantiæ complexu, quam quòd sit facultatis participes. Quòd autem à corde ipso tunicis arteriarum facultas quædam qua dilatantur, non autem materia per illarum causitatem, mittitur, ex hoc cognoscere manifestissimè, quòd si aliquam conspicuas arteriæ cute nudaveris, illique per longitudinem feceris, fistulæ aliquam impolueris, ita ut totum vultus obstruatur, videbis illa pulsantem. Vbi verò circumducto laqueo, ipsius arteriæ tunicis circa calami astrigens accuratè, non amplius vltra laqueo (quantumlibet tam sanguinis quam spiritus declino per cautatam fistulæ fieri possit) pulsantem videbis. Porro mouetur arteria vniuersa vno eodemque tempore, nec altera eius partium prius, altera vero posterius, sed quemadmodum simulacrum mouere pedis digiti propositum, quamvis nulla in ea parte ratiocinanda vis sit, ita, confectum tamen facultate illius, ita ut temporis momento distributa, mouetur, ita etiam idipsum fit in corde & arteriis. Motus enim celestis, ut facultatibus attestatur, ita materis potius aduersatur.

GALENI PERGAMENI de motu musculorum, liber I.

Natura motus voluntarij musculi sunt, quorū adeo magnitudo est, ut ne numerari quidem facile possint. Nam & natura ita quidem coalescunt inter sese, ut videantur vnus esse. Et cum vnus aliquis in multos edendos definat, non vnus amplius solus esse videtur, sed quot tendones. Idcirco, & quia multi-

plici sunt figura, & in dissimiles inferuntur partes, modum motus difficulter comprehensibilem habent. Ceterum omnis musculus tendove transversum atque insigniter sectus, aut phlegmone, aut scirrho, aut putrefactione, aut obstructione, aut duritie cicatricis affectus, nocet quidem omnino quibuscumque morbus particule in quam inferitur. Tendoni porro natura, mista mediocritate, inter ligamentū & neruum. Etenim ligamentum ipsum, corpus neruosum est, ex osse omnino oertum habens, inferum autem in os, aut in musculum. Nerus autem & ex cerebro aut spinali medulla oriuntur: quorum substantia est veluti duriusculum factum cerebri, qualem esse spinalem medullam constat. Sed ipsius etiam cerebri pars posterior, duntaxat anterior: & quicunque neruorum molliores sunt, hi nihil à spinali medulla tibi videbuntur differre. At aliorum ossium medulla, humida & fluxilis est, pinguedinisque permissilis: quare ex ea oriri nullum neruū videbis: neque est ipsi involuacrum villum, nec arteria, aut venæ complexus, nec vlla prorsus communicatio cum musculo. Porro à cerebro aut spinali medulla musculi omnes necesse est vterumque accipiant, qui visu quidem parui, sed virtute magnus existit. Cognoscis autem id ex passionibus. Nam incusus, oppressus, contusus, laqueo interceptus, scissus affectus, & putrefactus, aufert musculo omnem motum & sensum. Quis & neruo inflammato, non pauci spasmus correpi sunt, & mēte alienati: quorum quidam sic affecti, cum sapientiorum medicum nacti essent, qui neruum illis abscideret, statim spasmi, & mentis alienationis sunt liberati: sed postea musculum, in quem neruus inferretur erat, insensibilem atque in vitium ad motum habuerunt: tanta vis neruis à supremo principio affluit. Non enim ex seipsis eam, neque connata habent. Id autem line facili cognoscere poteris. Nam si aliquem neruū, aut ipsam spinalem medullam incidens, quantum superius est incisio, ne, continuum cerebro, id quidem adhuc conseruabit principij vires. Omne autem quod inferius est, neque sensum neque motum vlli prebere poterit. Nerui itaque, inuoluntarij: scilicet cerebro, seu à quodam fonte, deducunt musculis suas facultates. Quos quum primum attingerint, scinduntur multipliciter in aliam subinde atque aliam sectionem: tandemque in tenues toni & membranas fibras solui, totum sic musculi corpus texunt. Ligamenta verò, per quæ ossibus musculi colliguntur, coalescuntque, membranas circa ipsos gignunt, & quasdam intro propagines in ipsam carnem musculorum demittunt: quam veluti quendam locum intellige multis riuus irrigui, vno quidem prædicto neruo, duobus verò alijs, altero sanguinis calidi & tenuis & vaporosi, altero frigidiore atque crassioris. Vocatur autem ipsorum alter, arteria: alter vena. Isti igitur principium à corde & hepate habentes, corpus musculorum irrigant. Quorū gratia fit ipse musculus, veluti quædam planta. At propter sensum & voluntarium motum, quibus animal à nō animali differt, & quos musculi ab ipso suscipiut, neruo, factus est animale instrumentum, sicuti propter arte-

Tendoni natura media inter ligamentum et neruum.

Ligamentum quid. Neruus.

vis. Spinale medulla.

Medulla ossium.

Nerui omnes aut à cerebro, aut à spinali medulla oriuntur. Nerui affectus magnis dolores vitare, cura remouenda.

Nerui inflare vim à supremo principio.

Nerui aut spinale medulla in se ipsos in se ipsos, quæ infra sectionem sunt partes destituti motu simul et sensu.

Nerui à cerebro deferre in fine suas facultates.

Ligamenta quæ sunt membranas circa musculi. Musculi quoque riuus qualem.

Arteria. Vena. Musculus veluti quædam planta. Musculus, animale instrumentum, sicuti propter arte-

Spiritus non mitti in corpus à corde, sed vndique attrahi à corpore.

Spiritus non substantiam, sed qualitatem ex visu esse corde, cum refrigerari appetat. Refrigeratio est finis respiratoris.

Arteria non eò dilatatur quia implentur, sed ideo potius implentur, quia dilatantur.

Viuens quoque differt à non viuentem.

Arteria vniuersa per totam longitudinem simul.

Motus celestis facultatibus attestatur, materis aduersatur.

Musculi sunt instrumentum voluntarij motus. Musculi non rati non possunt.

*Motus natura-
les qui.
Motus anima-
les qui.*

*Sensus inest
in partem
virescentem
tendo ita
dicitur nervi
quod loquuntur
motus.
Loquuntur o-
mnibus
Nervi in
sensu partem.*

*Tendens mu-
nus.*

*Nervi est via
finita aut in-
finita a cerebri
descendunt.*

*Tudo omni
si infertur.*

*Lingua muscu-
li carens ten-
dendone.
Lingua mu-
nus.*

*Cer mouetur
perpetuo circa
voluntate im-
petum.*

*Laborum, oc-
lariis que mu-
nus.*

*Musculi motus
momenti et.*

arteriam & venam, naturale. Etenim motus qui ex arteria & vena procedunt, sunt naturales, & voluntatis expertes: qui autem a musculis, & animalibus, & voluntarij. Est autem musculus, instrumentum non sensus, sed motus, etiam si vtriusque sit particeps: quia nullus motus voluntarij potest sine musculis fieri: at sensus inest vniuersis particulis, quacunque nervi particeps sunt. Iam tendens, tanto durior est nervus, quanto ligamentum mollior: quoniam & mole corporis talis, ut qui ex ambobus maximè factus sit. Et ligamentum quidem omne insensibile: nervus autem omnis sensu præditus: tendo vero, oculus insensibilis, quia est nec uti particeps: neque ita sensus ut nervus: oculus enim est nervus tantum. Quare igitur ligamenti naturæ est particeps, eatenus habetur ut eo actionem sensus. Cui namque ex fine musculi oritur, multo maior nervo qui descendit in musculum, liquet vix non ex nervo tantum ipsum consistum esse, verum etiam aliquid momentaneum ex natura ligamentorum simplicis. Multis quippe locis sexcupla, multis etiam decupla crassitudine nervum superat. Et merito sanè tantus & talis est factus, ut qui & nervi, & ligamenti vsum exhibiturus erat. Alligat enim musculum subiectis ossibus, in quorum capra monita cartilagine inseritur: & hac quidem ratione nihil differt a ligamento. Sentit autem, atque mouetur, quia ratione nervi est particeps. At nervus ipse via quædam existens facultatis motricis, a cerebro descendens, ut ei commonem faciat, extensus est, atque ligamento commixtus. Tendo itaque sic ex vtriusque constat. Omnis igitur tendo, in os omnino inseritur: non o tamè omnis musculus definit in tendonem. In oculo enim musculus mouentis linguam: constat enim ex variis musculis: ten dendo natus. Nullum siquidem os erat lingua motura, sed editura vocis articulata, & saporis iudicata, & in articulationi atque degluttoni adiumento futura. Iam cor plurimum a musculo differt, & crassitudine, & formatione, & contextu, & duriæ, & vni & ena operibus. Perpetuo quippe mouetur cor, tum systole, tum diastole, idque circa voluntatis imperium. At musculus nec similes motus sunt, nec fine voluntate fieri vniquam possunt. At labra oris, ex cute musculorum concreta, absque osse mouentur. Similiter oculi, motum habent voluntarij a musculis: nullum autem os cum eis mouetur. Præterea & cuncta que in fronte & superciliis est, tum plurimæ partes faciei, ossibus quiescentibus, motu voluntario mouentur. Quod si stomachus ipse, vel œsophagus, musculis etiam est, erit vix musculis neque in tendonem definit, utque os secum mouetur. At qui in ceruice vellicæ suspensio vrinam, & qui in sede etiam est, habent testes & penem descendit musculi, nullum profecto secum os mouent: quare & prædicti musculi nullus prorsus nascitur tendo. Ceteri omnes musculi, quicunque ossa mouent, in tendones omnino definiunt. Qui vero aliud quippiam in ouent, quidam os, ut musculi oculorum, lingua, testium, penis, plaryngis, atque laryngis, liorum quibusdam sunt tendones, quibusdam minimè. Musculi igitur oculorum, membranis quibusdam, & validis aponeurosis, in duram &

nervosam tunicam adiacentem ragoidi, perveniunt. Penis autem & testium, nulla aponeurosi facta, eadem ipsorum particulari innascitur. Musculorum qui in plarynge & larynge sunt, quibusdam obscurè quædam aponeuroses, quibusdam omnino non sunt. Motiones autem motus alibi alius existit. In lingua quædam motus omnem videre possis: sursum enim atque deorsum, ante & retrò, sinistrorsum & dextrorsum circumferri videtur: partim enim quasi reflexa & propensa, nonnunquam circulariter vndique circumducta. Sed in oculis quatuor quidem sunt recti motus: sursum, deorsum, dextrorsum, & sinistrorsum: duo autem alij circulares. Duo enim musculorum circa tempora: firmantibus enim dentes, invicem tenduntur, atque curvantur: hianibus vero, laxantur & porriguntur. Ad hanc, in magna illa brachij motione, dum musculus flectit cubitum, curvantur planè & in se ipsum coit: dum extendit illud, laxatur & exporrigit. Eisdem motus & musculi magnus interna parte cubiti apparere habet: contrahitur quidem in flectendis digitis, laxatur & exporrigitur, dum illi extenduntur. Sic etiam & alij musculi penè omnes qui in artubus sunt, duplices motus videntur habere, si eos denudaveris cute. Sedis musculus proprii moti, quoniam & figura diversam, possidet, contractus crumenam similem. Ceterum septu transuersum simile est tali cuiuspiam rei, nisi quod non perforatum est. Accidit autem abdominis musculus, diuersum ab his qui in artubus & facie locantur: hi enim cum tenduntur & ad principium retrahuntur, curvantur illi autem dum tenduntur, exporriguntur: curvantur vero dum laxantur. Porro musculorum qui in cruribus, manibus, atque temporibus sunt, nullus habet tertium alium motum diuersum ab extensione & contractione. Quare illi omnes hallucinantur, qui vniuscuiusque musculi multos esse motus affirmant, ignorantes alia ab alio musculo gigni mononem. Vterque enim oculus, quatuor rectos obnuit motus, quia & rectos musculos quatuor. Habet etiam duas circulares motiones, quia duos circumvertentes musculos. Ergo vtriusque vna, sic illorum musculorum singulis, natura vnicuique motus inest, alius vero per accidens. Siquidè operat quicquid, trahens ad se ipsum particulam que mouetur: non operatur autem, cum in contrarium locum ab alio musculo simul cum mota particula abducitur. Ideo omnis pars que mouetur, non vna, sed variis vtriusque musculis, a quibus, vel vni alius in contrarium distracta habens, vicissim habet alterum ipsorum, nempe qui trahit, intensum, alterum qui trahitur, laxatum. Iam vero si totos musculos atque tendones per transversum abscindas, penitus dissolues motum subiectarum particularum. Sin autem iucideris folium, vix tantum laceres, quantum incidis. Quod si vniuscuius musculorum contrarium preter, monio simul peribit. Necessariè igitur est, motum qui sibi invicem succedunt, alio percutere, & reliqui simul perire. Nam si is motus crearet, qui particulam est natus extendere, flecteretur quidem primum, manebit autem in hoc statu semper, quod non amplius extendi possit, motu extensorio priuata. Quia enim extendi non amplius po-

In lingua motus.

Oculorum motus.

Temporum motus.

Brachij musculi.

Cubiti musculi.

Sedis musculi.

Septum transversum.

Abdominis musculi.

Crurum musculi.

Oculus vtriusque habere quatuor motus rectos, quatuor recti musculi.

Brachij musculi.

Brachij musculi.

Brachij musculi.

Brachij musculi.

Brachij musculi.

Brachij musculi.

Brachij musculi.

Brachij musculi.

test, idcirco nec flecti quidem. Similiter si motus, qui natus est particulam flectere, ex olui accidat, extenditur quidem primū, sed immobilis in posterum fiet, quā nō amplius ad flexionem venire possit, qua præcedere extensio sequitur. Itaq; abscisso eo qui intus est musculo, extensa pars ut hac figura perseveraret: eo autem qui foris, flexa non extenditur amplius. Quid si nris illam extendas manibus, statim in pristinū statum redibit.

Flexio ab interno, extensio ab externo sit tum musculus, tum tendoneus.

Musculus transversum flectit, in quo non reolletur pars.

Quippe flexio ab internis, extensio ab externis editur, tum musculus, tum tendoneus. Ad hæc, si principium supernum musculi transversum abscideris, totus ad caudam feretur. Si finem inferiorem, retrahetur ad caput. Si vterq; abscideris, eum concurrentem ad medium inter ipsos fluens videbis: adeo omnis particula musculi cognatum habet motū in se, ipsam salaciter coitione. At verò, scirrho genito in interno, aut tendone aut musculo, pars flexa non amplius extenditur: in externo verò, extensa non amplius flectitur: contrario modo quā in vulneribus se habebat. Quæ autē in scirrho, eadem in phlegmone, & in cicatricum duritie fieri cernuntur. Ergo tendi quidem sursum, & demitti manum, articuli qui in humero est, & musculorum ipsum mouentium: extendi autem & flecti, brachij ad vnam: aut volui ad pronum, & ad supinum, brachij ad radium est actio. Quæ verò manus tangit spinā, ea actio à quatuor articulis simul motus fit. In vnuersum autem, vnusquisq; dum tenditur musculus, trahit ad seipsum partem in qua infertur. Qui enim in caput brachij inferuntur, sursum tendunt ipsum. Cubiti verò os extendit qui in cubito sunt, foris in ipsum humero finientes. Radium ad pronū qui intus in cubito sunt, in ipsum extensus terminantes. Porro quisq; dignus ab internis tendoneus flectitur. Ceterum neq; omnis motus manū, actione sit musculorum: neq; omnis immobilitas quiesce. Nam cum duo motus sunt sibi invicem proximi, sed qui dissimiliter fiunt, reclinatio scilicet ac decidentia, reclinatio quidem actione musculorū, atq; ob id voluntariē, perficitur decidentia præter voluntatem accidit, nec in musculo agente, sed potius quiescente indiget. Hæc enim tanque, de cadere & declinare differunt: eadēq; & deorsum ferri manum, atq; demitti. Deorsum enim fertur cessantibus omnibus musculis qui in ea sunt, & corporibus ab innata grauitate deorsum tractis. Demittitur autem, musculus qui sub ala sunt, ad scipos trahentibus brachium. Tertius itaq; hic decidentis motus in ventus est musculorū, præter duos illos tam dictos: quo quidem etiam si nec excutatur, nec contrahatur: aliusque musculus, ad totum tamen membri motū mouetur, perinde vt ossa, aut aliquod inanime corpus. Ex ipsi autem veris musculi monbus, contractio quidem est tanquā instrumenti animæ actio: extensio autem tanquā instrumenti quidem, nō tamen actio, sed simpliciter motus. Est & quartum genus motionis, quo quidem agit valenter musculi, quamvis hæud motui videantur: vt si manum sursum tenfam esse fingamus, & in ea diu figura seruari: quia nanq; tunc muscula agunt, ideo eos moueri dicimus. Quatuor

Reclinatio quæ fiat. Decidentia sit præter voluntatem. Dilatio manū, atq; deorsum, quæ modo differant.

Contractio, Extensio.

Motus quæ sunt generis.

igitur omnino differentie motuum reperiuntur in musculus. Nam aut contrahuntur, aut extenduntur, aut transferuntur, aut tensi manent. Est autē eiusdem generis quarta discretio cum prima: ambæ enim actiones musculi sunt. Porro qui musculorū corpus sic constitutum aliud, vt suapte natura contrahi & flecti possint, sine adminiculo animalis potentie, huiusmodi minima probabilia pronuntiauit. Nam si vterq; musculus, quod secundum illos iuratus est facere, id semper ageret, nihil certe prohiberet, perpetuū corpus obnoxium esse tetano affectus, qui tum sanē sit, dū inuitæ partes in cōtraria retrahuntur ab oppositis musculis. In eadē itaq; & perfectam flexionem nunq; corpus musculi ex seipso pervenire poterit, nisi à facultate animalis adiutus: licet magis propriū sit corpori ipsius musculi cōtrahi, q̄ extendi. Iam verò cum ossa invicē cōstant, vt aliquis articulus flecti, alterū quidem ipsum est quod mouetur, alterum veluti sedes quædam ei quod mouetur est subfirmatum, quomodo certis cardines omnium se habere. Quare necessario manent quidem, cavitatis ei verò quod mouetur, convexitas adest. Vocatur autem cavitatis glene & coryle: sicuti convexitas, caput, condylusq;. Verū tantū coryle quā glene est profundior, quantū caput cōdylū est longius. Cū verò hoc modo bene se habere ut quæ mouenda erant, multo adhuc aptius artificiosiusq; natura cōiunxit eis, quæ motura erant. Nam in musculos quidem, instrumenta motuū produxit ex superiacentibus ossibus, in quibus sunt coryle. Inferuit autē in capita subiacentia, quæ erāt mouenda: & per hæc extensa, capibus sursum tractis, simul cum eis totum membrū sursum trahitur. Cū autem alter ipsorum maius, alter verò minus os esset moturus, magnitudinem musculorum qui moturi erant, creavit proportionē parē moli mouendū ossium. Quare aliquid quidem iure ex ipsis capitibus aut condylis superiacentibus ossium sunt exorn: aliquid verò paulō his inferius iuxta corylem aut glenam, sed non multū. Pars siquidem hoc pacto penitus fuisset, nec potuissent moueri subiectū os. Ergo nullus musculus dīctorū, extremam flexionē, aut summā extensionem partis efficere poterit, absq; animali imperio: quo quisq; id si priuētur muscula, mediū videbis figurā inter se mutuo fieri. Quod si extremū incideris musculum, flectis membrum vltra mediā figurā videbis. Pari modo si musculum internū incidās, extēdi particulam plus medio videbis. Itaq; prævalente musculo externo, extensionem: interno autem, flexionem fieri contingit. Quare æquipollens ipsius corporis musculorum sit motus, quando neuter totum animale habet auxiliare: non æquipollens verò, cū alter solus dominatur: ac proinde necessum est vincat cōtrahē illius musculi, qui ab animali facultate adiuvetur. Porro musculi, quātum ad structuram quidem ipsorū pertinet, perfectē contrahi possunt: ob ligamentum autem in caput ossis inferuntur, prohibent quo minus extremē contrahantur, cogunt itq; mediā seruare figurā, nisi fortē ab animali facultate moueantur. Ex dictis igitur constat, abscisso

Motus quatuor differentie in musculo.

Totaque quando fiat.

Musculi absq; facultate animalis non possunt exquirere contrahi, Cūque motus ratio.

Glene, coryle, Condylus.

Musculorum in sectione ratio.

Medio figura in motu arduum quando feratur. Extensio quo musculus fiat. Flexio interno hæmiflexio.

60

musculo

musculo externo, vltra quidem mediā figuram subiecto membrum, non tamen ad extremam: quandoquidem externus musculus non potest penitus extendere ipsum, absque animali impetu. His subiacent quæ ab Hippocrate de figuris sunt tradita. Primum quidem, quod flectentes penitus aut extendentes quācumque partem, dolemus. Secundum, quod media istarum figura, minime dolorem affert. Tertium, quod mutatione celerem in extremis figuris appetimus.

Extremam artuum figuram dolentissimam esse. Media figura dolore caret.

Media figuram feruorem diuturnum.

Figura omni morbo summa inbecillitas est.

Figurarum extremarum celestem mutationem optamus, media tardam.

Musculi omnes in extremis contractionem faciunt.

Quartū, quod diutissime media figuram feruamus, nulla mutatione cupientes. Quintū, quod hanc quoque mutare aliquando desideramus. Sextum, quod omnis figura molesta, est summe inbecilla. Nam figurarum excessus, merito dolore affertur: nempe quum alter musculorum agit, alter extendatur propter naturam. Media vero istorum figura & ab actione & a nimia tensione vtroque inlubens, merito iucundissima est. Quare & mutationem figurarum quidem quæ dolorificæ sunt, celerem optamus: eius verò quæ dolore caret, tardam: quippe & ipsam mutare aliquando desideramus, quia in ea etiam tensionem quandā musculi sustinet, minorē tamen quā in omnibus aliis. Eam autem dolore carere dicimus, non quod nullus penitus dolor sit particeps, sed quod minime, & eius ferme insensibilis, propter paucitatem. Atque ipsam mutari tum cupimus, quum cōgregatur paulatim, sensibilibus redditur. Dum enim summe inbecilli fuerimus, ut in stomachicis & cardiacis syncopis, tunc nec breuem quidē tensionem ferimus, nec mediā tolerant figuram: quo fit, ut quāvis impotētes simus ad motus, tamen aliā aliō iactemus membra, aliā quidē cōsequi figurā dolore carentē optantes, sed talia tunc prius in venire potentes. Igitur omnes musculi, ex se quidem in extremā contractionem festinant, sed non possunt hanc consequi, quod oppositi in contraria trahentes labent, & cum illis grauitatem ossium annexam.

GALENI PERGAMENI

de motu musculorum, liber secundus.

Media figura artuum quæ requiritur.

Porro in media figura, quæ in partibus cernitur, necesse est duplicem constitutionem inesse musculis: alteram, quæ neuter oppositorum musculorum agit, sed ambo quiescunt: alteram, in qua similiter vtrique agunt: quæ actio tonica nominatur. Sic autē etiam prope mediā figuram vtrinque constituitur membrum, & quæ vtrinque musculus agere poterit. Quum autem ad aliquā superantur figurarum duxerit ipsum, alteri musculi satis esse possunt rationi eiusmodi. Quare media figura cum tali actione, & neutra superantiū inferior est: vnde nec ipsam simpliciter careere dolore dicamus, sed eam quæ in quiete sit. Media namque figura cum intentione vtrorū musculorū, & quæ ac extremā, dolorem affert. Quā verō in ipsa quiete media figura partem simpliciter agit, partem non simpliciter: simpliciter quidem media omniū membri superantiū figurarū: non simpliciter autē, quæ alterius oppositionis solus est: quæ quidem simpliciter media est, et sine fatigatione diutius fuerit de nulla tamē altari

exacte id dici possit. Huius autem sermonis in manu constituamus exemplum. Etenim quum in ipsa extremæ figure sint quatuor, pronā, supinā, summa extensio, & flexio summa: atque figura quidem supina manus sit, quum eius concava pars, sursum est, cōvexa autem deorsum: pronā vero huic contraria: sicut media ambarū, quum intrinsicus quidam, extrinsecus autem convexum: ac subiectus quidem est parvus digitus cæteris: os vero cubiti, ossis radii: quæ figura media, potest quidem extensa perfectē manū, potest etiam flexa consistere: quemadmodum & alterius oppositionis media figura consistere potest, quum supina est manus, & quum etiam est pronā: certē quæ quidem simpliciter media figura est, omnium istarum est media. Quæ autem non simpliciter media, vnus est media vtriusvis oppositionis. Alia enim extensionis atque flexionis extrema, alia supinā & pronā, media figura existit. Media itaque simpliciter ex concursu ambarum dictarum mediarū figurarum consistat. Alia verō mediarū quatuor quidem erunt vniuersæ, sed nulla ipsarum simpliciter media tonus membri erit, sed vnus tantū oppositionis. Alia enim extensionis & contractionis solim erit media, aut supinā & pronā. At quum vtraque ipsarū sit duplex, iuncta vicissim excessibus reliquæ oppositionis, sic necesse est quatuor omnino fiant. In singulis autem ipsarum, aliud quidem commune est omnium, aliud verō proprium cuiusque. Commune quidem, quod omnino vnū aliquod genus musculorum agit: reliqua verō tria tenduntur quidē per accidens, non autem agunt. Propriū verō cuiusque angularis quidem & pronā est, ut agant ipsæ quidē musculi, qui intus convertant os radii, alii autē omnes quiescentes tenduntur. Cæterum angularis quidē, sed supinā, est propriū, ut qui extra circumducunt, agant, reliqui verō quiescentes tendantur. Eodem autē modo & in media inter pronā & supinā, ut cum summa quidem extensione soli extendentes agant, est propriū: cum flexione verō soli flectentes, quum cæteri omnes oculos quidem sint, sed tendantur. Rem autem accuratius examinemus in hunc modum. Brachium est pars totius manus maxime: cuius termini sunt articuli duo, quorū alter in flexura brachii, alter in humero cernitur: estque illi vniū os rotundum & magnum. Altera pars totius manus, quā vnā dicimus, brachio quidē iungitur per cubiti articulum: carpo autem, per ipsum. Constititque vna ipsa duobus ossibus: vno quidē, vna, quod etiam dicitur vna: altero verō, quod radius. In articulantur autem ambo ad brachii inferiorem oram: vna quidem vbi medius locus condylorum brachii est: radius verō externum brachii ipsius cōdylum amplectitur, in glenem dehinc, atque circum ipsum veluti axem quendam, manus & versiones regit: quare intro quidem dum circumagitur, pronā figura manus: extrā verō, supinā sequitur. Extendere autem & flectere manū, dearticulationis cubiti ad brachium est actio. Brachii enim ora inferior distat, a nodis circumscribitur. Vna verō, processus duos flexos faciens sibi invicem oppositos, me-

Figura manus quatuor extremitates.

Figura manus simpliciter media, quæ sit.

Figura non simpliciter media existit quatuorplex.

Angularis figura proprium.

Brachii definitio.

Vna, quod etiam dicitur vna.

diāmg ipsorum cavitatem figura x literæ similes efficiens, hac cavitare amplectitur medium locum condylorum brachij. Quum igitur concavitas vlnæ circumferatur circa concavitatē brachij, extendi atq; flexū accidit toti membro. Ut autem in neutra partem inclinet, supercilia mediz cavitatis, cause sunt, coarctantes vlnæ apophyses. Quum igitur anterior apophysis, notus dux est, flexitur membrum: extenditur autem, quum posterior. Terminus vero, flexionis quidem, vt anteriorem apophysin affirmet ad os brachij: extensionis verò, vt posteriorem. Duo autem musculi in partibus anterioribus brachij, ac tondē in posterioribus orti sunt, validis ligamentis vlnæ inserti. Incipiunt enim maiores eorum à capite brachij: minores multò inferius: ferunturq; omnes quatuor rectā ad vlnam: & in feruntur in hunc maximè locum, vnde oriri incipiunt coronæ. Ab his igitur musculis vlnam attrahentibus, extensio, & flexio fit. Quatuor autem alij, principia quidem habent ab vlna, ex vtraque parte flexuræ, que in gibbero est: duo quidem extrinfecus, duo verò iuntesecus. Omnes tamen quum sint obliqui, osi radij inferuntur: ad finem quidem ipsius inferiorem, magnū in medio verò, parū: qui etiam ipsi dum tenduntur, ad principia simul attrahūt radiū, & per hunc totam manū, pronam quidem internī, supinam externī efficiunt. Ex prædictis igitur facile demonstrare licebit, in quatuor differentis figurarum non simpliciter medianarum, vnum quidem genus muscularum semper agere: omne autem aliud quiescere quidē ab actione, verūm extendi: vt in angulari simul & pronā figura, in qua musculi quidem interiores moventes radiū, operantur, exteriores autem otiosi extenduntur. Similiter & vlnæ musculi, & alij omnes in figura ex inuertuntur, quantū tota manus discedit à figura secundū naturā. Nec secus in figuris aliis non simpliciter mediis existimandum. Ergo media simpliciter figura, præter quāquid quod nullum musculum habet, nec audentem, nec qui violenter moueatur, ne aliquid quidem eorū que in membris sunt distorquet: quare sola prorsus caret dolore. Cæteræ verò omnes, aliz magis, aliz minus inversos habent musculos omnes, & tendones, & nervos, & præterea etiam arterias & venas, ac proinde dolorifice sunt. In singulis autem ipsarum, quantum discedens ab extrema constitutione ducit membrum ad mediā, tanto minus dolorificam efficit figuram. Sola itaq; figura simpliciter mediā, musculos omnes perfectē quiescentes exhibet. Iam verò ex dormientibus n̄ tantum musculos omnes perfectē quiescentes habent, qui ob ebrietatem, aut defatigationem, aut virium infirmitatem, omnes corporis partes omnino exolutas habentes, in mediā eas figuram reducere, ipsi musculi permittunt. Non tamen in extremis figuris vllam particulam quivis potest habere, dum dormit. Quicquid autē in medio sunt inter extremas & mediā figuram, in his vt plurimum, somnum capimus. In quacunque enim talium constitutus membrum, musculi circa ipsum tonicē agentibus * commi-

seris ipsius figuræ conseruationem, adeo illam tuerentur, vt sedites quidā dormiunt, & deambulantes nonnulli. Id quod milui olim contigit, qui semē stadium integrum dormiendo peregr. Sunt qui paruum aliquod corpus flexis digitus enām dormientes seruant, nec citra tonicam actionem vehementem. Ad hanc, inferior maxilla, nō discedit à superiori, nisi aut ebrius, aut valde ignauus, aut desilius sitis qui dormiat. Et ipse quoque stertor, propter hanc fieri assolet, relaxata quidem inferiore maxilla, supino autem iacente homine. Itaq; & supinum iacere, & hanc * cum stertore, aut exolunonis, aut ebrietatis, aut ignauæ signū figura. Ob idque Hippocrates vtique quædam dicit: decubitus autem in alterum latus commendat: si citi & mediocrem luatum. Extremæ igitur inferioris maxillæ figuræ sunt, tum quæ maximè hiantibus, tum quæ dentes inuicem firmantibus sit: quarum illa quidem à musculis qui in mento & collo sunt, deorsum trahentibus: hæc autem ab us qui intra maxillam ex palato oriuntur, & eis qui temporales vocantur, perficitur. Verūm mediocriter hiantes, media figura fit, omnibus dictis musculis quiescentibus: ad quam morientibus maxilla inferior sponte sua meritò accedit: omnes enim tunc musculi sua actione prauant. Porro meatum excretionis finibus, ceteri portus quibusdam, custodes præfunt præualidi musculi, qui ne in dormientibus quidem permittit quicquam excerni, priusquam ratio iusserit. Contingit autem inuicem nobis aliquod excrementum excerni, aut resolutis his musculis, aut ratione deprauata, vt in phreneticis: aut etiam ratione & musculis grauatis, vt in ebrietantibus. Temera ita igitur sententia est, quæ afferit dormientium animam quiescere: quandoquidem cessatio illa non quies perfecta, sed intermissio vigoris existit. Non enim sensus expertes penitus sunt dormientes, sed difficulter sentientes: ac proinde actiones quæ in illis sunt, non omnes sunt naturales, sed ex eis multæ animales existunt, quum nimirum variè transferant membra, neciō dormientes loquantur. Ac respiratio ipsa, actio existens phrenon & muscularum thoracis, motus etiam sit voluntarius, citq; animæ, non naturæ opus, nempe iudicio subdita: quippe mouere musculos, animæ officium est. Etenim si quæ sunt, sedare potes quā vis, & quæ nō sunt, facere, idq; citius aut tardius, crebrius & rarius, hic motus est voluntarius. At motus arteriæ & cordis, quidquidem non subicitur nostræ voluntatis imperio, non animæ, sed esse opus naturæ dicitur. Respirationi itaq; etiam inter dormiendum donatur voluntas, etiam si id non assequamur mente. Siquidem neq; palpebrarum motui, neq; aliis multis actionibus animalibus animū adhibemus semper dum vigilamus. Quare quam causam in vigilantiis diximus, quod sipe non animaduertant particulares actiones: hanc etiā & ad dormientes & grauius oppressos transferre licet. Multos enim homines interdum actiones quasdam egisse constat, quā paulō post penitus sunt obliui, quod intell. suonibus tota mente non fuerint. Pars quippe animæ imaginatrix, quæ

Dormiens Gal. integrū stadium absistat.

Stercor quomodo accidat.

Decubitus supini non damnatur.

Decubitus in alterum latus cum mōdā ab illis periclit.

Maxilla inferior inuicem trahit rē tota. à quib. musculis hanc.

Maxillæ figura media morientibus accedit.

Musculi excrementum radii tunc dicunt.

Dormientes nō est animæ seu sui expertes.

Respiratio est voluntaria motus, estq; animæ.

Motus voluntarius quæ sit.

Motus arteriæ & cordis sit voluntarius.

Imaginatrix non recordatur.

Extensio, flexioque brachij, à quibus musculis hanc.

Figura cognoscitur media, sola prorsus caret dolore.

Somnus in quibus capatur si guri.

Memoria tenet
re, quod
oblitus
quod.

Respirationes
libere, seruum
quendam sibi
mortem conscia
vultuaria o-
pera duplici.

Tactusse natus
les animam nate
gram.
Respirationis
necessitas.

Naturam con-
suetudinis
obliuisci, in-
veniet medi-
figram dolore
carentem.

Doloris ex-
pressionem.

Spina figura
media non est
recta.

quæ etiâ & recordari videtur, si insignes impres-
siones rerum imaginatione cõceperit, cõseruat
perpetuò eas: itaq; id quidem est memoria tene-
re. Sin verò oblitus & penitus superficialis,
non cõseruat: & hoc est oblitus. Ob idq; in ve-
hementibus animi affectibus, nullius eorũ quæ
egerint, in posterum meminerunt. Quid igitur
min est, in homines oblitus agente anima, obliu-
ras etiâ imaginationes fieri, id est negat stabiles,
quid id etiâ in vigiliis contingat. Quod autem
totum opus respirationis voluntariæ & sponte
ab ipsa anima fiat, declarauit quid id barbarus
ille seruus, qui colubita respiratione mortem sibi
consciuit. Ceterum voluntariorum opem,
alia quid libera esse, alia verò affectibus corpo-
ris inferuire videntur. Priora itaq; ut ire ad ali-
quem, & alloqui (verbi gratia) perpetuò a nobis
& absque obstituto sunt: quare absolute sunt li-
bera. Posteriora verò, vt egeret, mingeretq;,
non perpetuò, sed in tempore quodâ & cum mensu-
ra: suntq; corporis affectuũ remedia. Atqui nõ
nulli ra: videntur quidem vitrò annum integrum.
egressionem verò vel vrinam retinere non mo-
dò annis, sed nec diebus quid paucis nemo po-
tuit. Simile igitur et huius est spirationis opus: imò
multo magis virget, ac celerrimè necessitatem
habet. Etenim periculum est, ne quis moriatur,
nisi respirauerit. Quare non est quod quispiam
existimet, naturale esse opus respirationis, quod
visque quæ retinere ipsam citra discrimen vir-
gineat. Sed iam quod deest sermone de medus fi-
guris, deinceps absoluamus. Vt enim in mani-
bus angularis figura, omnis prorsus doloris est
expers: sic in cruribus illa dolore caret, quæ cõ-
stitit inter mediâ figuram, & extensionem extremâ.
Causa aut cõseruetur est. Plurimũ enim exten-
sionis cruribus vniu- multoq; magis laboramus in
extremis flexionibus, q̃ extensionibus. Tantum
igitur mediâ figurâ ad extensionem progres-
sum est, quod perfecte caret dolore, quantum à
diuturna cõseruetudine membrorũ est coactum.
Hæc igitur duo cõsiderâs in articulis vniuersis,
naturam videlicet & consuetudinem, inuenies
medium & dolore carens. Videtur aut in idem
conspirare vbiq; consuetudo cum natura: figu-
ra verò dolore caris cum medio. Etenim in cru-
ribus idem est quod dolore caret, & medium. In
vniuersum igitur in omnibus articulis extre-
mos motus cõsiderans, inuenies medium, & fi-
guram doloris expertem. Vt enim in articulo ad
gibberum, quod vocatur angulare: in articulo
verò ad genu, quod propius est extensioni: sic in
spina quod propius est flexioni, in articulo verò
ad carpum, quod exquisitè rectum est, doloris
expers existit. Etenim non vt carpi, sic etiâ spi-
næ rectum ipsum est medium, sed aliquantum
curuũ. Quapropter recti magis laboramus par-
ticulis spinæ, quàm sedentes, aut iacentes. Opus
enim est stantibus quid, tensum esse: iacentibus
verò & sedentibus, nihil prohibet esse curuam
spinam. Porro quicunq; & musculi sine articulis
sunt, etiâ in huius media constituto sine dolore
est: sicut in ano fe habet, vesica, & lingua. Nam
& summe cõstringere, & maxime dilatare a-
nnum, dolorem inducit: ac sic de ceteris. Atque

omnes homines quo tempore cessant ab actio-
nibus necessariis, mediam figuram & dolore ca-
rentem in omnibus partibus habent. Verum in
lingua quidem per coniugationem omnes mus-
culi orti sunt superne, inferne, & à dextris, & à
sinistris: quare nihil miri si in contrariis motus
particula deducatur, à musculis oppositis. In
musculo aut ani et vesicæ, necnò diaphragmatis,
alter habet negonũ. Nam quum singulis harũ
partũ vnicus tantum sit rotundus, sine vilo op-
posito, musculus, in contrariis deduci motus hæ
particulæ non xque facili possunt. At musculi
qui est ad vesicam & anum, officii est, nõ exerce-
re superflua alimẽti, sed retinere: nisi forte per
accidens, quum defierit agere. Ceterum instru-
menta excretois, duplici genere sunt. Eorum
quippe alia animæ, alia naturæ sunt. Atq; animæ
quidem instrumenta semper motu voluntario
agunt: instrumenta verò naturæ, citra ipsum. Ar-
phrenes quidem, & omnes musculi epigastrii,
instrumenta animæ sunt. Intestinorum autem
structura, vni cum vetriculo, ipsius naturæ. Mus-
culi itaq; epigastrii omnes, quum agentes ten-
duntur, premunt intrò naturæ instrumenta: hæc
autem, si phrenes ipsis cedant, in illarum locum
abreunt, musculo cum violentiam exoluunt. Sin
autem resistit, tunc ceit à duabus manibus pres-
sa, extrinsecus à musculis, intrinsecus à phreni-
bus, anteriore quidem parte cartilagini pectõ-
ris, posteriore spinæ colliæ cernitur, ea quæ con-
tinentur in causantibus illorum, fortiter propel-
luntur: quo tempore musculus ani est ociosus.
Ceterum in egerendo quidem, superiores: in
meiando autem, inferiores magis tenduntur mus-
culi. Simul autem cum ambobus extenduntur
musculi seruientes respirationi: vt videlicet oc-
currant vetriculo & intestinis, ab epigastrio ip-
so propulsatis ad regionem thoracis. Iam expira-
tionis nullus musculus omnino est opifex: sed
videtur hoc ipsum opus, aut potius affectus tho-
racis, omnino esse similis decidentis illi à no-
bis exposito. Efflatio autem est spiritus confer-
tum emissus ab intercostalibus musculis: quod
etiâ thoracis opus, distat reclinationi, quadi
proportione respõdet. Verum quid expirationis
contraria sit inspiratio, efflationi verò vehemẽs
inspiratio, priorem quidem oppositorem solu-
te phrenes efficiunt: alteram verò intercostales,
cum musculis qui ad thoracem ex collo, scapu-
lisq; proveniunt. Quum autem maxima quidẽ
inspiratio per externos, maxima verò expira-
tio per internos intercostales fiat, iustius vniq;
quispiam musculos thoracis externos, iis qui
thoracis parte interna sunt, quàm pleribus,
oppositos esse dixerit. Porro diaphragma ip-
sum, vbi agere defierit, laxiusq; fuerit, nunc qui
dem ipsius cõuexitas versus spinam vergit, nunc
verò ad ventrũ multo tamen promptius versus
spinam fertur. Estq; in omnibus figuris hominis
(vna excepta prona) superius quidem diaphra-
gma, inferior verò spina: quare merito ad eam
vergit, nunc quæ granatur quidẽ ab his quæ an-
teriori parte superantur, tum quia retrò molissi-
mum & tenuissimum omnium viscerũ habet pul-
monem. Duplex igitur quid sit tensio omni-
mu-

Musculi ani &
vesicæ muni
est non exerce-
re sed cõseruare
res.

Excretionis in-
strumenta da-
plia.

Phrenes.
Intestina sunt
naturalia in-
strumenta.
Epigastrii mu-
sculorum opus.

Expirationis
nullum muscu-
lum esse opifex.

Efflatio quid.

Inspiratio ex-
pirationis con-
traria.

Inspiratio con-
maximam ferri
per externos
intercostales
musculos, vt ex-
pirationem per
internos.

Tensio duplex
musculi omni-
bus ingit.

sculis, vna quidem, quum agentes in seipfos coeunt: altera verò, quum à musculis oppositis extenduntur: prior enim quidem phrenes, in inspirationibus non violentis habent: altera verò sit, aliis musculis venter agnens, aliis intercostalibus, & his etiam folis. Verum musculi costarum & venteris, quando quiescunt, convexi perpetuo sunt: quum autem agunt, intro cedunt, minusque curvi fiunt, contra quum ceteri omnes scilicet partium musculi.

GALENI PERGAMENI de vteri dissectione, Liber unus.

Vterum inter vesicam & intestinum rectum.

Collum vesicae femore. Rectum intestini.



Vteri moderata magnitudo.

Pudendi muliebri designatio.

Cornua, sive appendices vteri.

Vteri dissectiones.

Terus sub peritonæo, inter incumbentem vesicam, & rectum intestinum, suam sedem sortitur. At verò femininarum vesica circa pubem sita est, collum brevius & laxius habens, quàm vesica virilis, quod inter ossa pubis ad tæmuncum pudendum extenditur. Rectum vero intestinum osui sacro, & quibusdam spinæ vertebrae innititur: ac proinde spina circa id incurvatur. Magnitudo vteri non equalis omnibus.

Est. Ceterum magnitudine moderatus, superna quædam extremitate est prope quibus umbilico, inferna aut muliebri pudendo committitur. Estque spatium ab illa extremitate suprema, usque ad oram anteriorem pudendi, vi plurimum, quod moderatum est, vnde decem digitorum. Secundum latitudinem verò, ad utrumque latus per suos apices, siue cornua, extenditur. Ipsum autem muliebri pudendum circa externas partes pellicem emittentia adnata habet, insit præputij virilis. Corpus vteri, vesicæ simile est: latibus tamen habet papillares exortus, versus lumbos nutitantes, qui apices & cornua appellantur. In mulieribus tamen minime reperiuntur: foras intra ipsa cornua, quædammodum in cæteris animalibus, numerosum partu gestantibus (multo enim minora sunt, quàm pro magnitudine ferunt) sed in reliqua tota vteri cavitare. Connigunt autem moderatæ magnitudinis vterus ipsa tenuia intestina: qui verò excellenter est parvus, ea solum cum quibus coaluit. Rursus maximus vterus, nêpe qui iam factum gestat, latera implet, ac imum ventris, & multa intestina contingit. Appendet autem per si brosas quasdam & tenues distantes intestino recto & vesicæ. Appendet item osui sacro per quasdam ligamenta robusta, ac per similia etiam, ipsius spinæ vertebrae: cuius musculis magnis (qui memorabiles utrinque faciunt exortus, & in utrumque vteri partem, & in vesicæ collum, & in sedem distribuuntur) connexus est. Laxa sunt autem hæc omnia ligamenta, & ob id vterus plurimum moueri, & labi suo transmutari potest. Sunt ligamenta alia & appendices quæ in ipsum vterum inferuntur, partim quidem eius corpus textentia: quorum pars non exigua sunt nerui ab spinali medulla orni: partim verò incrementum nutumque ipsius vteri, itemque factus grana, constructa: ut sunt arteriæ: atque venæ. Vesicæ autem & podici scilicet collum coalescit vterus, separari vi per excoriationem facile ab ipsis potest. Coalescunt etiam ei testes & feminalia vasa: quemadmo-

dum cum pudendo ipse circa extremitatem sui colli. Iam verò à vena caua, & arteria magna illi incumbente, exoriantur duæ venæ, & duæ arteriæ, utrinque sanè vna, vena quidem à vena caua, arteria verò ab arteria. Deinde altera quidem à dextris ad dextram, altera verò à sinistris ad sinistram vteri partem delata, antequam in ipsum vterum inferantur, ramulos ad testes extendunt, posteaque in vteri corpus se infinuant, atque intertextunt ipsum. Hæc itaque quatuor vasa, paulo inferius sunt ista, quàm quæ deferuntur sub renes: venæ tamen multo sunt arteriis maiores. Aliæ præterea venæ & arteriæ, ab utraque vteri parte, circa collum ipsius inferuntur, ab ea quæ ad pudendum & sedem pervenit, manifestè distinctæ. Ipsum autem vteri corpus duæ constituunt tunice observari possunt, sed se distantia & contractionem apertissime: quarum externa quidem, nervosior, simplex, & vna est: interna autem venosior & duplex: cuius partes committuntur quidem inter sese, non coalescunt tamen, nec prorsus vniuntur, sed se distantia contingunt, & à circumscissa tunica continentur. Si igitur per excoriationem eas separare cõtendamus, duo videbuntur tibi vteri esse, sub vna eademque tunica siti.

Hanc enim tunicam velut vterum in duas partes separare amplius non potes. Habet autem multas aspredines illa venosa tunica, maxime circa fundum. At nervosa quæ ipsam ambit, multo crassior quàm vesicæ tunica est, & ipsa multum venis arteriisque intermixta. Ceterum collum vteri musculosum existens, ex carne natum est dura cartilaginosaque: ac progressu temporis adeo cartilaginofum evadit, ut quæ sæpius pepererunt, aut iam ancilicæ sint, his multum durum & cartilaginofum existat. Habet autem in se foramen, per quod excurrunt menses, ac rum viri semen excipitur, nam egreditur partus. Finit autem collum ipsum in muliebrem finem non rectum, neque rectum in omnibus: sed declinat in sinistram, & dextram, sursumque & deorsum. Quod autem ad anteriorem & posteriorem partem attinet, similiter se habet in omnibus. Consistentiam etiam vteri, pro ætate atque affectuum ratione, connigui variari. Quin secundum naturam, crassius quidem & magnus, ac tumidus apparet vterus, lunari purgatione prodeunt. Sic autem & tenuis est, qui longissime ab eo tempore abest. Crassior item prægnantis: crassissimus, eius quæ sæpe peperit. Rursus, eius quæ iam concepit, crassus est: eius verò quæ parvi est vicina, magnus simul & tenuis. At verò testes scemini ei à lateribus vteri sui sunt, singuli ab utraque fundi parte, prope cornua: magnitudine multo minores quàm in maribus: figura item & corporis miscella omnino multum differentes. Latius enim sunt femininis, rotundi verò & oblongi maribus: & glandulosi quidem illis, tenera verò carne masculis. Complectitur autem vtrumvis eorum propria pellicula tenuis. At scrotum femininæ testes non habent: eis tamen & arteriæ & venæ inferuntur, ex eis quæ ad vterum tendunt, in singulos singulis progredientes. Verum cõmixta inter se hæc vasa prorsus inferantur testibus, insitque carfarici intorquætur, non secus quàm

Vteri vasa.

Vterus constitutus duæ tunice.

Vteri collum cartilaginofum.

Vterus prægnantium crassior.

Testium femininum sinu.

Testium femininum masculinum differens.

Testiculorum pellicula.

Tubus femininarum cæteri foras.

Testiculorum sinu.

*Seminaria va-
sa sunt femina.*

quæ in ipsis maribus. Cæterum seminaria vasa, quæ & ipsa continent semen, prope testes quidē sunt ampla, sensibilibus possident cauitatem: angustiora verò ac veluti nō causa redduntur, paulo longius inde progressa. Deinde rursus iuxta cornua dilatantur, ubi sanē in vterum inferuntur. Porro prægantem muliere, primò quidem intra vterum secunda producit: dein tunica factum ambsentes, ac demum factus. Secunda ipsa, vasa multa sunt, tum venæ, tum arteriæ, ex propinquo inter se sitæ: quarum spacia intermedia, membranis quibusdam expleantur. Ex tunicis autem ipsas, altera totum factum amplectitur, altera incumbit duplicata circa caput, clunes, ac pedes eius. Ac vocatur quidem illa agnina, hæc autem farciminalis. Ambæ autem candidæ sunt, ac tenues, serè aranei telæ consimiles. Adnascitur secunda vtero in hunc modum. Vasorum vteri oscula, per quæ mulieri menses purgantur, aperiuntur quando mulier est concepta. Con-

*Agnina est bre-
uia.*

Farciminalis.
*Secunda circum-
voluta circa vtero.*

*Conceptionem
fieri aut in-
cipiuntibus san-
guine misso, aut
desinentibus.*

*Conceptio cur-
at ut quædam san-
guine misso, in-
cipiunt, fieri ne-
queat.*

*Asperum quædam
lævis, apertum ad
necitatem.*
*Secundam in-
tra vasa vteri
oscula tantum
ipsi vtero accre-
scere.*

*Coryledones, si-
ne articulo.*
*Vasorum secun-
da progressus.*

*Vmbilicu-
m quædam.*

Vræti.

tingit autem hoc tempus, incipientibus fieri mensibus, aut desinentibus. Aperiuntur & reliquo omni purgationis tempore hæc vasa, sed tunc non cōcipit mulier: neque enim in vtero potest semē manere, quod multitudo sanguinis influens elauat. Quando verò cessant menses, & quum incipiūt, repleta sunt vasa, & purgatio ipsa nec multa, nec coaceruatim effunditur, sed modica et paulatim, cum sanguine humore exdante. Quare ob asperitatem quidem, semen vtero adhaerere sufficiens aut alimentū habet, pau-
citatem sanguinis in ipsum confluens. Priusquam enim diuerse experiant menses, mulier non concipit, propterea quod nutrimento priuatum sit semen, & vadeat, ut non habeat: læuis enim tunc vterus est, ob conclusionem vasorum: quare defluit semen, & cum tunica ipsius non vnitur. Apertis enim ad concretionem asperam est, quam læue. Ex quibus liquet, secundam iuxta vasorum oscula tantum ipsi vtero accrescere, et iuxta aliud nihil. Vas etenim quod in secunda nascitur, principium habet extremitatem eius quod se in vtero ingerit, adeo ut quis duo hæc possit esse vnum dicere: vnita enim sunt iuxta oscula, alterumque transiunt ad altero, vena quidem sanguine a vena, arteria verò spiritum ab arteria. Iuxta hæc vasa etiam coryledones (quos acerbula vocant) habentur, vinculum firmum secundæ ad vterum existentes. Itaque ipsius secundæ vasa, vnde ductum est, inde initium summentia, intertextunt secundam, mutuoque miscentur, & perinde ac variae radices arborum, quæ in vnum coeunt supitem, sic ipsa multo inter se cōcreta, in duos eum truncos degenerant, venosa quidem in venas, arteriosa verò in arterias. Qui supitem vtriq; ex vtriusque parte dextra & sinistra, ad ipsum facti circa vmbilicū confluunt. Neque enim aliud quæquam vmbilicus est, quam quatuor hæc vasa, mediū quendam & communem vragon, hoc est vræti ductorē, vel aquæ ductum, habentia. Hic verò existit principium membranae farciminalis, perforatæ quæ est ad suadum velicæ ipsius factus amplo meatus, adeo ut visceri vno sit ad tunicā farciminalē, per ipsum vragon in medio vtriusque situm. Hu-

mor autem non modicus in vtraque continetur membrana: stauus quidem in farciminali, albidior verò in agnina, & corporior: quandoquidem hæc altera maior est, utpote vniuersum totum contegens.

*Agnina mem-
brana cantegens
totum factum.*

GAL. DE SEMINE LIB. de Semine, Liber primus.



N semen sit tum materiale, tum efficiens generationis principium, ut Hippocrates quidem professus est, an efficiens tantum, ut Aristoteles autumat, nobis venit considerandum. Quod igitur ex animalibus brutis, quæ quidem retinent semen, omnia etiam concipiunt, minime autē quæ excernunt aliud post coitum, ipse dicit experimento: id quod etiam in mulieribus postea explorari, quas quum lix de re-

*Bruta excernunt
semen post
coitum, non cō-
cipiunt.*

*Vteri proinde
filum efficit,
ut vtero animalia
quædam.*

*Semen quoque
tempore
concupiscitur.*
*Aristoteles in-
terpretem Gal-
leum.*

*Aristoteles opi-
ni improba-
tur.*

percontatus essem, responderunt mihi, se quendam, circa vterum, motum percipere, ut qui velut vellatur, & paulatim in seipsum contrahatur, ubi semen concipiant. Quibus etiam & sempra medicorum subscribunt, & quæ ipse etiam expertus sum, per relectiones animalium prægnantium, quorum omnium vteri apparebant factibus obvoluit. Videntur enim viri (ut Plauto ait) veluti animal quoddam, proli desiderio affici, & ob id attrahere in seipsum semen, & circumcirca in rugas cōplicari continere, quemadmodum & hoc ipsum vni aliquando euidenti sensu est perceptum, nimirum ad cucubitalæ medicinalis similitudinem attrahente vtero ipsorum pudendum. Maxime autem contingit hoc, cessantibus iam ipsis mensibus, quo præcipue tempore vteri semen concipiunt. Porro qui putant Aristoteli quidē voluisse, semen masculi coniectū in vterum, principii motus mensuræ recremento imponere, ac mox excerni: quiguid partem fieri factus ex Aristotelis sententia existimant, vtriusque entē illius viri ignorarūt. Is quippe, velvix ex liguo & fabro fit mensia, sic ex mensuræ sanguine, & motu principio viri, factum constituit ait. Quapropter a nonnulla animalia, nec excernere geniturū affirmat, sed distribuere tantum in factum animalē caliditatem, effert talia ex insectis quædam: in viri factum quidem articulum in mare deminat, commorariq; in complexu per multum tempus, corpus quidem accipiat nullum, sed solam facultatem formantem, & formam ipsam specificantem. Tam verò, quod ipsemet Aristoteles ait, inlari & dissolui geniturum in vtero, alienum a ratione videtur: quum iuniorum conceptionis tempore, minores & minus inlari cernantur vteri. Cæterum, etiam si id concedamus, pericratabimur postea, vtrum in ipsa amplitudine vteri, mensuram quidem & recrementum consistat, semen autem aceruatim allabens, ipsum percutiat, atq; exhibito motus principio excernatur rursus, per ipsius vteri collum: an potius eo tempore quo factum masculo tot, semini obuiam mensuræ sanguis feratur, ut incipiat eam, quam illo assequitur, facultatem. Vtriusque tamen absurdum. Nam si in ventre vteri aceruat, ac longo

tempore continetur menstruum, non amplius
vtriusque sanguis hoc fuerit, sed grumus. Quando-
cumque enim exciderit sanguis ex valis in quodque
organum cauum in animali, frangit grumus.
Nec reperio quo pacto etiam semen sine sangui-
ne excerni possit, cui quoque conuenit & conspirat
in idem iuxta amplitudinem vteri. Si vero ob-
uiam venit femini sanguis, oportet sanè ipso-
rum congressum in vasculis oculis fieri. Verum
si hoc ita habet, vnum in tot partes semen di-
cimus diuidi, quod sunt ipsa vasculorum oscula, vtriusque
singula sua pars deueniat. (Id quod seminis vi-
scositatem aduersatur, & altera moderatè substan-
tia opus habet, quæ diuidat) aut coherens sibi
maneret, quod longe conuenientius est ipsi sub-
stantiæ seminis: & tertia alia substantia nõ indi-
get, præterquam attractiue vteri, & seminis e-
iectione. Quemadmodum enim venter ubi ci-
bos appetit, cum fundo suo ad gulam recurrit,
qua nimirum veluti manu vtriusque eodem modo
vterius qualitatè seminis concupiscens, it ob-
uiam, ac totus quidem ad pendendum accurrens,
collo ipso, veluti ius macho, ad similitudinè man-
us, vtriusque, intrudendi conferunt semen. Itaque si
quando hinc stomachus debilitetur, semen attra-
here nõ potest. Quod si etiam allabatur vasculorum
osculis semen, & rursus discedat, discunaturque
in aërem, quod per Deos erit principium factus.
Primum etenim invenire causam oportet ipsius
elapsus sanguinis, semini appropinquantis, ex
singulis osculis vasculorum vteriusque alteram,
quæ totum in idem coarctat: postea autem &
causam membranae totum hunc sanguinem for-
nissecus cooperientis: quæ quidè non ex ratione
tantum, sed ex eo quod apparet, necessitatè
habet. Apparet enim uobis orbicularim ipsum
conceptum continens statim post concep-
tionem primam. Nam & trium & quatuor à prin-
cipio diuerim siquæ exciderit mulieribus genitura
tenui contenta involucri quod ex refectione
animalium licet deprehendere. Videbis enim
manifestè vterum quidem totum circum semen
contractum, membranam vero huic obvolutè
qualem quidè excreuit illa nequissima mulier,
quam Hippocrates (vtriusque semet fatetur libro de
fortis natura) prudens ac volens cõgèit facere ab-
orsum. Cohærens namque sibi ipsi semen, quo
tempore ab vtero attachatur, extenditur qui-
dem & dilatat, nempe omnibus vteri partibus
æqualiter appetentibus ipsum. Propterea
verò quidè viscosum & crassum est, calidis cor-
poribus conversatur, faciliè in membranam coa-
lescit, quæ iuxta vasculorum ora ex ipso vtero pen-
det, de cætero in tota illi substantia. Porro vena,
arteria, & nervus, prima & cõmuniissima anima
hum organa, à quibus omnes partes reguntur,
nõ ex sanguine, vt Aristot. ait, sed ex semine ge-
neratur: nimirum alba & exiguè quæ sunt. Quod
si sanguinem transfundat natura, ex rubro facer-
et album, ex liquido crassum, viscosum ex li-
ui, vt ex eo rectè illa vasa cõpugnè possent, labo-
raret vtriusque fructus, studens huiusmodi parare san-
guinem, qualem à principio habet semen. Arqui
natura ipsa nihil frustra molitur: cui quidem
nulli maius opere precium accidere potest, quam

principium optimè ceptum, vt quod nõ solum
medium totus, sed potètia etiam totum esse di-
catur, vel testimonio Aristotelis. Absurdum itaque
fuerit dicere, statim in ipsi auspiciis frustra ope-
rari naturam: habentemque album & crassum &
viscosum humorem, ad neruorum, venarum,
& artèriarum generationem, eicere quidem
hunc, vt Aristoteles putat, ex sanguine verò al-
ium similem gignere. Si namque exauguem esse ho-
rum trium organorum substantiã natura vult,
siue crassam, siue extendi, & in fistulæ modum
cauari, ac quàm longissimè progredi citra diuul-
sionem, ad hæc omnia certè nihil substantia se-
minis reperiri possit aut cõmodius, aut aptius.
Est autem semen virali spiritu plenum. Quare
maximè contrarius hic sermo naturæ operibus
est, si ex cerni quidè in aërem dissolutum, ipsum
dicamus, retineri autem sanguinem menstruum,
cui benignissimum, quem vt alienum natura
excernit lingulis mensibus. Non enim est fami-
liaris vtero sanguis menstruus, sed ipsum semen:
& propterea susceptorum huius organum natu-
ra constituit vterum. Quantum igitur ex se-
mine vterum ipsum cõtingit, hoc fit statim me-
brana. Reliquum verò totum, habuit quidem
& ipsum lingulas facultates: attracticem quidè
familiarium, & per quam retenturum, & altera-
turum, alimentumque sibi facit erant: expulsi-
cem denique alienorum & superfluum. Habuit
præterea & familiares materias quas attrahe-
rum erat ab vtero, sanguinem videlicet & spiri-
tum, per oscula quibus connexa est. Et sanè hæc
statim à principio per ambientem membranã nõ-
dum duram facta, attraxit. Ad finem verò, ran-
tium per foramina illius, ob attracticem perpe-
tuam, obque intervètum humoris, minimè coale-
scentia, sed ad aperta magis, per quæ scilicet sece-
bantur materies. Soli autem alimentum non
semper pari copia, sed iuxta proportionem au-
gmenti illius quod alitur, aut exiguum, aut co-
piosum affluere sanguis quidem ex venis, spiri-
tus verò cum sanguine tenui, modico & calido,
per artèrias, vtriusque ad propriam suam cauita-
tem. Quin & temporis progressu necessariū est
hanc viam in fistulæ modum cauari, ac vas fieri.
Cæterum quandoquidem impossibile erat, se-
men ad vterum vteri illapsim, ipsum totum
illanire, vt pote qui exortus vtriusque veluti cor-
nua quædam haberet, hæc sanè femineo semi-
ni non illent natura. In hæc siquidem cornua, sin-
gula ab vtriusque parte existentia, vas femininè se
ingerit, ex fecundæ profectum testibus. Quam-
vis igitur simul sub idem tempus, cum nire
semen femina emiserit, ipsum muliebri semen
per vtriusque eiectionem cornu, delatū in me-
dium vteri spari, simul quidem oblinet vias,
simulque ad masculi semen perveniens, vni cum
illo miscetur. Sic ita per membranas ambo mu-
tuo innectuntur, quæ tunc in suæ profecti-
onem ipsum muliebri semen produxit, vt totam ge-
nituram amplectens, hanc fecit vilitatem præ-
staret, & vt veluti alimentum quoddam, masculo
semini fieret: tenuius enim est illo, & frigidi-
us, familiarius verò omni alio ad ipsius nutrimenta-
nem. At verò fines illi vasculorum, per quos in lingulis

Principium di-
citur potètia
esse ipsum.

Seminis substan-
tia quibus re-
bus opus sum.

Semini virali spi-
ritu est plenum.

Sanguis men-
struus non est
seminis substantia.

Membrana ex
qua seminis
participatur.

Semini virali
quatuor facul-
tates natura-
les.

Semini mater-
ies ab vtero, ex
per quam via.

Grumus quan-
do fit.

Vtrum ad po-
tètia procedat
vteri, vt est ob-
uiam iuxta.

Membrana ab-
orsus seminis in
vtero.
Hippoc. cogit
quandam facie
re aborsum, cu-
tra quæ in
fuo ipso iuri-
tando cõpugnè-
tum.

Semini præter
generantiem ve-
ni, arteria, &
nervus, primi
organæ.

Natura muli-
prostra molitur.

Seminis virali
seminis pro-
fecta arguitur,
inferior in cor-
no à matre.

Semini muliebri
mysterium
in vtero.
Seminis femi-
næ vni,

Semini femi-
næ vni
frigidi-
us, ma-
femina,

men-

*Acetabula quæ
Coryledones.
Secunda quæ
dicatur.*

*Færciminales
membranas
fistulas
fistulas
fistulas*

*Cordis & lo-
pau generati*

*Cor moueri per
pau.*

*Venerum, arte
narumque ge-
nerati.*

*Cerebrum ex
solo summe pri-
m.*

*Craniij produ-
ctio.*

*Cerebrum in
altum locum
fide.*

*Spinalis me-
dullam erit &
cerebrum.*

*Venerum casu
erit ab hepa-
te.*

*Thorax primi-
us principis
fistule respo-
ndens organo.*

*Temporis ge-
nerationis
quatuor.*

Generata quæ

mensibus superfluum sanguinis ex toto corpo-
re in vterum demittitur, existunt vera acetaba-
la, siue coryledones. Appellatur autem secun-
da, externa illa membrana, quam pertranscunt
tum arteriæ, tum venæ, materias ipsas ad fœ-
tum ex vtero deferentes. Altera autem mem-
brana, quæ sursum ad cornua pertingit, færcimi-
nalis vocatur, quæ augefcentibus liquidis excre-
mentis in fœtu, ex ipsis suscipit alterum. Porro
ex spiritu & tenuissimo sanguine, qui vni cū il-
lo per arterias ad fœtum confluunt, calidissimū ex
visceribus ipsa natura constituit. Alter verò san-
guis crassus, speciem hepatis originale produ-
cit, atque hinc ens plerique vter per secundam la-
te pertranscunt. At arteriæ ad aliud calidissimū vi-
scus feruntur, quod ob excellentem caliditatem,
moueri veluti flammam quædam non cessat, sed sem-
per vicissim distenditur & contrahitur. Ex venæ
quidem arteriarum, materias in hęc viscera dedu-
centes, veluti radices ipsorum existunt. Quæ verò
protenduntur in totū fœtum, tunici similes
sunt, in multos ramos distractis. Generant autē
his est, ex substantia feminis in fistulæ modum
cauata. Terrum verò principium, à quo omnes
producti sunt nervi, generationē ex solo semine ha-
bet. In permissione quippe ipsius ad semē mu-
liæbre, multæ bullæ spiritus ruptæ, ex quibus intro
& ad profundū spiritus seipsum seruare cupiēs,
concessit. Neq̃ enim veluti vapor erat, sed per
semobile animalis principij, quemadmodum
& cauitatem spiritus plenam, ex circumstante hu-
more produxit semini. Quō autem neq̃ etiam
inde promptē euacuaretur, firmam sibi domum
fecit ex liquida feminis substantia, quæ ipsum
ambit: id quod in ea crassius & durius erat, ad
externum lineam intē extrudens: quod vniq̃ i-
psum progressu temporis calefactum & resicca-
tum, erat futurum os. Hoc in principio quidem
facultas opifex, ac fingēs animal operatur: non-
dum tamen apparet, præ paruitate. Quando ve-
rò primū apparere incipit, maxima sunt tria
hęc: ex vicino inter se sita, & se invicem contin-
gentia. Principium quidem nervorum futurum,
quod cerebrum appellamus, in aliori sede lo-
catum: cor autem & hepatis quæ sese mutuo con-
tingunt ei subdita. Quæ principia tria, longius
progressu temporis disparantur, & in totum,
quod eis efformatur, animalis corpus transmutant
geemina. Spinalis namq̃ medullam cere-
brum veluti truncum quandam producit: cor
verò arteriam maximam, quam aortam Aristote-
les vocat: hepatis derisq̃ venam cauam. Et sanē
apparet statim à principio circa medullam spinā
ipsa fiturata: circa cerebrum verò, calina obdu-
cta: sic vti & iuxta cor thorax, qui nō solū do-
mus futurus erat in partu, sed primū & princi-
palissimum respiratoris organum. Hęc igitur
aliquanto posterius fiunt. Ipsius autem fœtuum
generationis, quatuor in vniuersum sunt tem-
pora. Primum, in quo seminis species vincit, &
dominantur: quæ quidem constituitur, non fœtus,
sed genitura vocatur. Vbi verò expletus
quidem sanguine fuerit fœtus, cor autem, cere-
brūq̃ & hepatis articulatæ sunt & informi-
a, similitudines tamē & magnitudinem mo-

mentaneam iam habent, hoc tempus secundum
erit. Tertū deinde est tempus, quando illa princi-
pia tria manifestē videre licet, reliquarum ve-
ro partium designationem per linamenta, &
quasi obscuriorem quandam adimbrationem.
Quartum deniq̃ & postremum tempus hoc est,
quū fœtus omnibus artibus suis est integrē con-
summatas & absolutus: quo tempore non fœtus
solum, sed iam puer ab Hippocrate nominatur.
Fætus itaq̃ veluti planta, omnem genera-
tionem & formationem à semine accipit, du-
plexq̃ principium motus & formationis statim
ab ipso principio. Qualis enim est radicatio in
plantis deorsum, talis est fœtus insertio arte-
riarum & venarum in vterum. Qualis verò sur-
sum vergens truncus in plantas, tales sunt in fœ-
tibus à tribus principijs exortus. Etenim natu-
ra feminis non alius viribus producit plantam,
aliis animal: sed quemadmodum plantæ semen
terra indiget, vt nutriatur ex ipsa & augeat: sic
nostrum indiget vtero semē, ob causas easdem.
Ad hęc, radices sibi generat planta, quibus tra-
hat alimentum ex terra: ita chorion, hoc est, se-
cunda, gignit vasa, fœtū radices. Prodnit quide-
m truncum à seipso semen plantæ, & ab illo
alios & alios ramos, vtiq̃ ad extremas propaga-
ries: at non secus in fœtu videre licet iuxta illa
tria principia tres truncos natos, arteriam nempe
aortam, venam cauam, & spinalem medul-
lam: qui in variis ramos diuancantur, vtiq̃ ad vi-
timā germina. Quæ triplex planta animal futura
est, non reiecta illa, quam à principio habuit fa-
cultate vegetatrice, sed altera insuper acquisita.
Ex loco autem in locum ipsam transire oportet,
vbi perfectum fuerit, ex vterog solutum: quod
facere minimē posset, si frigidum vt arboreus fieret,
& si originis ad ambulandum aptis careret.
Quare duo principia acquisiuit, alterum organo-
rum, quæ custodia sunt ipsi naturalem caliditate:
alterū eorum quæ subseruitura sunt omni-
bus ad quas concitatur actionibus. Sed his
quidem posterius vtetur. Principio autem plan-
tatio primū est vtiq̃, quod vtiq̃ nō ex sanguine,
sed ex semine, arteriam, venam, neruum, os
& membranam produxit: & secundam quidem
primū ei forinsecus circūcedit, ac simul cum
ipsa færciminales membranas condidit, tenuem
quidem, angustāq̃ & infirmam, futuram tamen
adiumento secundæ, in materiem attractione,
inscrupturāq̃ formati animalis vrinam. Nam
vbi vterum fœtum ambiendum, excipien-
dūq̃ vaporem desluentem ab illo, generata est
tunica agnina, satis ampla & robusta. Reliquarum
autem membrandarum, quibus varię partes
teguntur, nulla in primis diebus necessaria ha-
bet generationē: nō enim sufficere ad ipso-
rum omnium opificium, substantia feminis: sed
procedere tempore, dum quod antea erat semē,
iam grandis factum est fœtus. Ad quartum ge-
nerationēq̃ futura vritur genitura viscositate:
ex qua quidem quicquid crassius magisque ter-
reum, ac minus tractile est, ad osium regionem
delegat: quæ sanē arida & terrea, pinguitudi-
nisq̃ experta, sed obducta membranulis tenui-
bus, carnēq̃ operata perfecti, ad id maximē vti-

*Fœtus ad plā-
tas comparat
quidē verum.*

*Animal doctus
triplex plantæ*

*Principij plan-
tationis, quæ est
semine gignat.*

Secunda.

Færciminales.

Agnina tunica

*Genitura visco-
sa, quibus sit
generando ido-
nea
Osium gene-
ratum.*

caloris vi: qua nimirū omnem glutinosam substantiam ab ossibus exvget, ligamentis quibus invicem copulatur, impofuit. Ceterū ubi iplis ossibus carne supereruit, prius quam membranis integeret, ibi minus aridum totum os factum est. Extendit autem & membranas circumofalibus, etiam carnisbus ipsis gratia opercula. Quia & neruum in vnamquamq; ipsarum disperit, ubi eos prius in fibras araneorum telis tenuiores diffoluit. Sed alias etiam fibras & simaliter tenues ex ligamentis productas & carnisbus implicatas inuexit, atq; ita rursus in vnum & idem ambo coegit fibrarum genera, totum quidem organum in quo hæc fabricatur, musculum efficiendo: id vero ubi fibræ congrederuntur, tendinem. Ligamentorum etiam uon modicam partem in ipsos musculos indidit: ut neruorum, nou in hos ioldis, sed & in viscera omnia. Est & aliud fibrarum genus in ventre, intestinis, & vtriusq; vesicæ, adeoq; in vtero & corde, generatio-

Musculi constituti.

Tende.

Ligamentum.

Vasculum vni

versis esse ner-

uosi indicat.

Carnosa om-

nia esse re-

feruntur.

Membrana

omnia à semi-

ne orti.

Genita ex san-

guine reuera

in posse.

Genita ex fini-

ne posse,

non posse.

Nutritio, vas-

culis ex fami-

liaribus perti-

ne sanguinis.

Sanguinis in fi-

nis generatio-

nis.

Vasli femina-

re vultu non

quarantem

feminis.

Serua ex san-

guine genit.

Venas amputa-

tas, superuac-

uas: vultu Gal-

ienum.

id quod affollet fieri conspirante in vnum robu-
ssima facultate cum materia feminaria copio-
sa. Arteriam verò aut neruum nemo vnquam vi-
dit regeneratum, ob penuriam materię, quam
& copiosam & validę facultati iunctam, adeo
crassiorum vasorum requirit generatio. Verum
iuxta primam generationem ex feminę, coacer-
uatus adhuc est humor, ex quo vasa ipsa for-
mantur: opifex autem ipius duplex est, tum fa-
cultas, quę in ipso femine habetur, tum quę in
vteri vasis, quibus allapsum est. Quare nihil mi-
rum, prima naturę organa velociter formari in-
suetibus. Sed nec tribuere vasis illis flexuosis to-
tam feminis generationē est æquum, ut Aristote-
les faciat, prius testes facultate semen gignendi.
Arteria itaq; & vena, à vasis quę circa ipsā sunt
progreddientes, per illa deorsum feruntur, do-
nec perveniunt ad venam testicularem ductam,
quę iuxta caput testiculi incumbit, quod epididy-
mus appellatur, ex qua subtilis multū in teitem
perveniunt, feminatio humore referta. Huic tes-
ticulari venę: & arteria & vena adnascuntur, cie-
ca paulo ante relata obvoluonem: cui & pæ-
uam quadam à seipsis distribuentem largiun-
tur, priusquam inferantur testis. Inde feminialis
meatus genituræ lauiens, ad pudendū exor-
tū eam subvelit. Quovisq; enim intra illa sunt
arteria ipsa & vena, peritonæo integuntur. Hinc
verò peritonę, vtriusq; momentaneo foramine
perforatū est, & meatus ab ipso maximus ad tes-
tes descendit. In quo & obvolvono vasorum gi-
gnitur, & vas feminale ex vena testiculari ena-
scens, ad illa ascendit: contingens quidem circa
exortū ipsum testiculum, non tamen ex ipso ge-
nerationē habens. Iam verò iuxta vtriusq; meatus
arteriam & venam descendenter reperias,
ascendens aut vas feminarium. Inde verò rursus
non amplius extra pubis ossa, sed per profundū
& supra ipsa in declue ferunt, donec ad vesicę
perveniunt collam, cui pudendum continenter
coheret. Quia enim vas feminarium longissi-
mum factum est, ob id tantam viam circumcur-
rit. Contingit enim ira sanguinē in vasis mor-
tem concoqui, & in grumos cogi, & vas femina-
le longissimum & varicosum iuxta vesicę col-
lam existens, genituram quamlongissimē iacu-
lari. Ceterū in quibus testes erecti sunt, epididy-
mide iuncta, nihil patitur vas feminariū. Depe-
rit autem animalibus nō solum emissio feminis
(hoc enim is felicitate cederet, quo abstinere à ve-
neris percipiunt) sed & virilitas & omnis ma-
sculina inclusio. Sic etiā si animalis formę ex-
andans testiculos, neq; libidine concubitorum, ne-
que marem admittet, sed amittet feminieam na-
turam. Quō nomine & croce castrantur, sicutque
sic castrati masculis similes, atq; vbi erius ali-
mentum accipiunt, pinguioremq; & suaviorē car-
nem, quam relique croce, habent, quemadmodum
& mares maribus. Non tamen similiter pe-
riculo vacans ablato testis ipsiis feminis est. A
lateribus enim ab vtriusq; parte singuli adscendit,
arteriam quidem & venam, velut qui in mascu-
lis sunt, pampino formiter sibi insertas habentes:
vas verò feminale ad vtriusq; cornu finiens. Ne
cessarium itaque est vtriusq; laris diffundere, si
quis

*Arteriam, ner-
vumve ampu-
tatum, cur re-
generari non lo-
cat.*

*Testes prius
Artem. facul-
tate gignendi
semen.*

*Testicularis
vena.
Epididymis.*

*Seminaria mea-
tus.*

*Peritonæo per-
forato.*

*Seminarij va-
si ceteris in-
pudendum.*

*Spedantur, et
mores veritas
tam perire.*

*Scrofa castra-
ta.*

*Castratorum car-
nes suavioris
essent.*

Testum abla-

to in feminis

periculosius, et

quare.

*Castrati quæ
accidant.*

*Castrati sunt
alii quæpiam
magis, quædam
minori.*
*Testes quoque
namque præter
castrati.*

*Testes alterant
virescentem cor
poris.*
*Carnium non ca
stratorum redolens
quæpiam graue & viro
sum.*
*Testes quid præ
stent.*
*Cor viuendi
principium est.*
*Testes bene viuendi
principium.*

*Testium situs
diuersi.*

*Essentiam co
sistit particulæ
dis secundum
corporum solu
tionem sui stan
tiam.*

*Testium corpus
mutari ab hu
more seroso, quod
continetur.*
*Testes coactare
semine.*

*Testes eorum cele
ritate totum corpo
ris similitudinem
quædam com
municant.*
*Facilitate ferri
corpus in se
am naturæ mu
tari.*

quis excindere velit: atque hoc sane maius periculum est, quam in maribus. Porro quibus excisi sunt testes, à virili robore destitutiuntur, perfrigeranturque, ceu vinum fomite: alteroq; in fin caloris principio priuati, neq; ampla illis est vena, neq; flondus sanguis, neq; valide pulsant arteriæ, suntq; glabri vniuersum corpus, neq; vere appetunt, aliud quippiam magis existentes, quam animal. Quare hac parte testes etiam ipsi corde sunt præstantiores, nempe qui præter hoc, quod caliditatem ac robur animalibus exhibent, amplius etiam generi conferuando præfunt. Quam eorum facultatem insignem, haud scio quomodo neglexerint veteres, conseruantne, an non conferant semini, disceptantes. Alteratur enim totum corpus per ipsos testes. Nec solum infusior est caro vicinarum non castrarum, sed & qualitas ipsa carniū simile quiddam testiculorum qualitatem habet, graue nempe, & virosū. Testes itaque præsentia sua, tum calorem, tum robur, atque adeo coctū appetentiam ipsi animalis conciliant. Cæterum tertium hoc, neque cor ipsum exhibere potest: quare illud quidem viuendi tantum, testes verò bene viuendi principium fuerunt. Quanto autem melius est bene viuere, quam simpliciter & solum viuere: tanto in animalibus testes corde sunt præstantiores. At in senescentibus & debilibus, testes ipsi sunt laxi, contra quam in iuuenibus, fortissime. Nonnullis ex quadrupedibus substrictū quidem sunt testes, vt subus: volucris autem omnibus intra pentonem prope spinam firmantur. Iam verò vnaqueque animalis pars humore ad se loco alimenti influentem, in sui ipsius naturam permutat. Est autem propria vnicuique particulæ essentia haud quidem secundum humorum, qui in ipsis sunt, naturam, sed secundum corporum solidiorum substantiam, à quibus contentorum humorum fit alteratio. Quod quidem si sic se habet, continetur autem serosus humor in testibus, ab huiusmodi vnaque ipsorum corpus nutritur. Vnaqueque autem pars familiarissimum sibi alimentum conficit: quare testes semen etiam conficiunt. Sed operantur ipsum tum arteriæ, tum venæ, quamvis paucum longo tempore: at testes non solum multum, atque id breui tempore, sed exactissime elaboratum: sincerissima enim exacte est ipsi seminis qualitas: ac proinde omnibus animalis partibus quamcelerrime illa communicat. Fortes si quidem facultates in naturam suam alterant totum corpus. Pauxillum quippe deletum humoris corpori animalis illapsū, totum ipsum transmutat quam breuissimo tempore. Similiter auxiliaria medicamenta corpus vniuersum alterant, alteratione venenosis coneraria, non substantia ipsorum totum corpus persoluente (quod visque impossibile esset tam breui tempore) sed qualitatis facta distributione. Quid igitur mirum est, ex testibus in totum corpus facultatem quādam distribui, qualis neruis quidem sensus & motus ex cerebro, arteriis verò pulsandi facultas ex corde? Atque ea quidem facultas in maribus, & roboris & virilitatis, in feminis verò effeminatōnis existit causa. Ob idq; furineum

animal excisis testibus, castrato masculo assimilatur: relique verò omnes partes easdem facultates in vtriusq; habent. Trahunt itaque serosum humorem testes, quem ipsis autē præparant vasorum inuolutiones. Deinde vbi quālitatis ex ipso fructum ceperunt, cūq; ceteris communicarunt partibus, id quod superfluum est, in meatu seminarios deponunt, hi verò foras in coitu excernunt. Idcirco per immoderatam quādem venetem, omnia spermatica organa, vacua & exhausta redduntur: turgentia verò, vbi adeit viræ ratio castissima. Trahunt itaque violentem semen ab ipsis venis testiculi: venæ rursus à sapropositis: atque hæc rursus ab his quæ deinceps sunt sitæ: qui tractus non cessat, donec ad omnem corporis partem transumptio ipsa perveniat: quo fit vt totius animalis partes omnes proprio alimento priuentur, donec omnium fortissima expleatur. Neq; verò solum serosam humiditatem ab omnibus animalis partibus sic auferri contingit, sed etiam viralem spiritum. Quare mirum non est, immodico videntes coitu imbecilliores reddi: videlicet à toto corpore, vtroque humore sincerissimo ablato, accedenteque ad hæc voluptate, quæ ipsa per se est sufficiens, vt firmitudinem viralem dissoluat, adeo vt iam quodam ex nimia voluptate consistat animam exhalasse. Igitur omnes solide corporis partes ex semine generantur atque nutriuntur. Quippe quæque pars, ex qua primum facta est substantia, ex eadem semper nutritur, quod nutritio completo fit substantiæ defluentis. Quapropter etiamnum generari licet, quæcūq; à principio ex sanguine sunt concreta: non generari autem præterquam alibi venam quandam, atque id raro (quibus sua ex semine generatio à principio contingit. Vt autem de vasīs seminariis rursus aliquid dicam, sciendum est, ipsa esse plena semine, vel eo tempore quo animalia venere non vniuntur: id quod fieri potest trahentibus ipsis genitaliur à testibus, & ipsis testibus etiam ad illa eam relegantibus: idque per epididymidem maximam, per quam scilicet mediam, conuectuntur ipsi grandulosi testiculi seminariis vasīs. Imò verò si licet fateri quod verum est, epididymis ipsa est principium & radix vasorum seminalium, quæ ex toto testiculo semen in seipsam haurit.

Excella femina, castrata, maioris assimilatur.
Testes trahunt humorem serosum.

Viralem spiritum etiam capi cum humore se ipso à humore argenti.
Certe immodico videntes, casti imbecilliores redduntur.
Voluptas viralem firmitudinem nec potest dissolvere.
Solidae partes ex semine generantur & nutriuntur.
Naturæ est ex parte substantia defluere.

Spermatica va sa esse semper referat semina.

Epididymis est radix seminalium vasorum.

GAL. DE SEMINE LIB. I.

Porro testes muliebres adiacent quidem vtero, vtriusque singuli, consimilem vasorum inuolutionem, veluti qui in maribus sunt, suscipientes. Non procedunt tamen in eundem locum hæc vasa, propterea quod neque foras, quemadmodum marem, sed in ipsos viros oportebat feminam emittere semen. Ideoq; veluti feminali meatui obuiam euntes vteri, à lateribus prælongos exortus extendunt, per quos semen susceperant. Maxime verò plenum est vas seminale in animalibus venetem appetentibus: sicuti vicissim vacuum à recentis coitu. Habet etiam idem aliquando non modicam co-

Feminas non emittere foras semina, sed in utero.

piam in iis quæ ex longo tēporis intervallo imprægnantur, in quâ sanè prælongis illis exoribibus, quæ cornua appellantur, videbis manifestè illumorè seminarium crassiusculum. Ad lunc enim locum facinimalis membrana pervenit, necnon genitura crassa. Admirari autem subito etiam licet eos, qui dicunt vas feminale extra vterum habere ad aperta oscula, inferique in collum vesicæ, eodem quo in maribus modo, ac prouide feminarum semen effluere. Cuius opinio-

Herophilus.

Seminali materia non feminas aperiri circa cornua, intra vterum, ubi fœtus semen effundit.

Fœtus formandi ratio.

Semen muliebri quod possit procreare.

Semen vtrum perfectum possit ex viris & muliebri consurgere.

Pollutiones contingere feminis vel absque matre.

Similitudines horarum ad parentis considerationem.

Similitudo videri oritur.

Animalia omnia gigni ex menstruo, & fœtus.

Similitudinem oriri a fœtus.

neq; in ipsum vteri collum: verùm à lateralibus vteri partibus adnati, alter hinc, alter inde, ad summum perveniunt vterq; apicem, siue cornu, à sua parte sinum: ibidem intra vterum effundentes semen, quod grauidis aceratur circa eum ipsum locum. In profundiorem autem seminis quæ per somnum sunt, primam quidem in vteri ipsum illabitur, postea verò foras vacuatur. Itaq; in feminis, tam vas seminarium plena sunt semine, tum etiâ testes. Quod si in vtero ipsum muliebri semē cum virili miscetur, cogatur quæ & crassescat, tunc formato fœtus contingit, vt pulchre Hippocrates tradidit. Potest etiam natura, ex solo muliebri semine facinimalē membranam gignere. Potest & alimentum familiare & primum, subornare masculo semini. Possit autem ex vtriusq; mixtus vnus fieri semen perfectū, Hippocrates opinatus est. * Sed quæ obsecro possibilia essent, si hæc foret impossibilia: Quod etiam femina ad venerem incitetur, vel maxime possibile est. In eis siquidem seminarj mearus pleni semine, excernunt ipsum, citrà vllum congressum cum masculino: quin & seminis effusiones per somnum similiter vt mares patiuntur. Iam verò quod opificis vnus sit, similem aut dissimilem altervtr ex purendis factum efflere, nemo igitur. Pueros autē matris similes, ob alimentum illis assimilari, sunt qui contendunt, idq; producentes omnes alterationes, quæ tam animalibus, tum plantis, ob alimentū contingunt. Non intelligit tamen, quod nullam earum alterationum, quas dicunt, possunt speciem alterantem ostendere. Nemo omnino præterea quicquam immutari forma ex specie animalis, siue plantæ: sed ex seminibus omnia tale principium habent. Quinetiam similitudo ipsa ex partium fit formatione, non secundum communem speciem, sed iuxta infusas differentias ipsarum. Generantur autem omnia animalia ex semine & sanguine menstruo. Quandoquidem igitur fœtus vtriusque parentibus assimilatur, commune habere principium, quod eos parentibus ipsi assimilant. Quippe factū similitudo ad parentes, secundum principium contingit. Quod si sic res habeat, aut ex semine, aut ex menstruo, similitudo fœtū ad parentes oritur. Sed non ex menstruo, quum substantia eius vtriusque parentis non sit communis: à semine igitur proficiscitur. Si verò ex semine oriantur fœtus similitudines, necessarium vtriusque fuerit feminam semen emittere, quod multo pueri matri simillimum appareant. Sciretur autem nos iam, an

quæ tandem sit causa, ob quam species animalis magis sit secundum matrem: iuxta altervtrum parentem ipsa similitudo: hoc tamen præmissis, quod natura quidem corpus præparat animæ moribus & facultatibus aptū, * sed quod mores & facultates habet, ex temperamento secundum substantiam infusis, vide etiam prima ipsorum est generatio. Conningit igitur ex his suppositis, tanquam conclusi, species animalium, ad substantias generationis substantias, hoc est materias, consequi: & esse ipsum animal, aut equum, aut bouem, aut hominē, iuxta substantiam ex qua factum est, & non secundum facultatem illius substantiæ motricem, formatricemq;. Cæterum nec senes ipsum facultas solū est, sed & materia quædam: nec menstruum materia solū, sed facultas. Vt enim semen ad materiale principium animalis maxime cōfert, sic menstruum ad potentiale conducit. Est autem semen sanguis accuratè percoctus, à vasis continentiis ipsum: vnde sanguis non solū materia generandi ipsius fœtus fuerit, sed & semen potentia. Quod igitur ex materia simul & facultate vnūquodque gignatur animal, omnibus in confesso est. Quod verò tum semen, tum menstruum habeat vtriusque principia, non tam æqualibus viribus prædita, sed semen quidem effectuum fortissimū, materiale verò modice molis: menstruum autem materiale quidem plurimum, potentiale verò siue effectuum, maxime debile, id etiam est confrendum. Si ergo materiale gigneat principium, iuxta quod species animalis absoluitur, in solo menstruo effectum situm, factus vtriusque exactè eiusdem speciei cum matre generaretur: quemadmodum etiam, si effectuum solū in semine esset, semper vtriusque similis foret patri. Quando verò vtriusque ambo ipsa principia habet, ac prædominatur in menstruo quidem materis copia, in semine autem facultas, aut roboris: mentro (opinor) speciem animalis à matre potius ipse suscipit factus, quam à patre, etiam si ipsius semen ad materiale principium conferat. Similitudinem verò non magis iuxta matrem, quam patrem, refert: quavis quod ad robur quidem seminis attinet, fœtus patri magis assimilari oportebat. Verū genitura muliebri etiam ad valetudinem conferens, quum facultatem ex menstruo per nouem menses prodeuntē assumpserit, tanto exuperat, quanto circa primum congressum exuperabat. Propriū enim muliebri semini est, suam ipsius substantiam ac facultatem magis quam masculini, augere, atque corroborare. Non defuit qui, si femina non solū materis, sed etiam facultatis principium sit, superuacuos esse masculos dicant. Quidam verò gallinarum hac parte mentionem faciunt, quæ sub ventana & fauonia appellata oua parunt, citrà mixturā mascululi. At Empedocles futuri fœtus partes diuisas esse contendit, easq; partim in masculo, partim in muliebri semine contineri, atque inde etiam ipsius venteris complexus appetentiam oriri animalibus, nimirum diuisis partibus inter se vniri apperentibus. Quæ opinio longè absurdissima est, facileq; redargui potest. Quæ verò sit

Natura præparare corpus animæ moribus aptum. Morum generatio prima ex his suppositis. Speciei animalium ad substantias generationis substantias, hoc est materias consequi.

Semen esse facultatem atq; materiam. menstruum autem materiam & facultatem. Semen quid. Sanguis est semen potentia. Animal omnia gigni ex materia simul & facultate.

Speciem animalis à matre potius suscipi factum.

Oua sub ventana citrà operi gallinarum oriantur.

Empedocles opinio refutatur.

ro sit causa ob quam quod ipsum femineum animal etiam semen emittat, masculum tamen sit generatum: aut cur generato masculino, etiam ad huc seruatum sit ipsum semen femineum, considerandum. Præstabilius enim erat ipsum femininum animal habere excrementum conferens ad factus generationem. Quippe semē femineum, ex quo diximus gigni facinorosum membranam, proprium ac familiare alimentum masculo semini existit, quoniam sit illud humidius, tum frigidius, necnon magis tenue. Quare perperam faciunt, qui frustra ipsum generatum esse pronunciant, impossibileque esse feminam vitæque coaceruare excrementa, contendunt. Melius siquidem eos modice castigato sermone eorum dicere, impossibile esse feminam & sanguinem habere excrementum, & etiam semen prolificum, ut cui frigidi temperamenti ratione, superfluous sanguis accumularetur: forti autem caliditate opus sit ad generationem seminis exacte elaborati & percipi. Est enim humidior atque frigidior femina: calidior autem & siccior masculus. Unde merito alteri quidem deest quiddam ad exactam seminis concoctionem: alteri vero impossibile est sanguineum excrementum habere, præ caliditate & siccitate idipsum totum siccante. Ob id igitur & animalia quæ siccior temperamento prædita sunt, omnia generare solent citra conuersationem masculi. Deest tamen his quippiam ad perfectionem, si non assumant ex illo caliditatem. Itaque possibile est animo concipere tale temperamentum corporis, quod imperfectum animal generet abloque alterius masculi. Perfectum vero in seipso id concipere, sanè difficile, & fortassis etiam impossibile est. Porro tale debet esse generatum semen, ut statim simul atque diffusum, substantia ipsius partim in membranam abeat, partim in vas distendatur, partim deinceps pulset. Quod igitur in plantis est terra, hoc est in conceptibus mater, alimentum suggerens, donec totum animal perfectè abfolutum fuerit. Et quemadmodum plantarum semini largus ex terra humor, sic animalium semini, materia in matris venis mistum alimentum existit. Dicere autem quis possit: Si iuxta prædiximus semen similitudinem particularum naturarum ad parentes fieri contingit, omnes partes, alteri parenti necessarium futurum similes, cuiuscunque tandem semen prædominabitur: id quod secus apparet. Ceterum (ut discutiamus hæitationem hanc) quoniam semen ipsum similitudinem partium existit, si femininum quidem in utero semini virili masceatur, possibile sanè est ipsa circa effingendos fortis in vicem prædominari, iuxta partes diuersas. Imò vero, enamsi diffusum partium ipsius semen existeret, posset tamen ex omni sui ipsius particula, pro circulationis modo alterata, omnes animalis partes efficeret. Prædominatur autem iuxta mixtionem in aliquibus quidem partibus semen masculinum, in aliquibus vero femineum. At vbiq; ipsum præpollat, ea pars dominanti sit similia. Etenim in omni particula materis opifex simul adest, semineq; semper mouet atque concinnat seipsum. Nihil itaque mirum est, vtrique parenti natos absum-

lari circa diuersas partes. Num igitur etiam sic de genitalibus partibus eandem assignabimus causam? quod ex ipsis hinc quidem masculina fiat, hæc autem proterius feminea? & quod masculus toto corpore a femina in vniuerso animalium genere differat? Barba namq; & crista, & calcaria, dentescip; exteri, necnon vniuersa corpora, ut in ceruis, masculorum sunt partes: secundum quos faciem maribus longe inferioribus sunt. Differunt etiam ab illis secundum alias. Arteriarum tamen omnium atque venarum numerus, formatio, & posito, eadem est, per totum masculorum & femineorum animalium corpus. Opinari autem, masculum animal, vbi prævaluerit masculum semen, & femineum iuxta feminei seminis gigni excellentiam, satis probabile est: pugnat tamen cum hoc, quod femineæ sæpenuero simillimæ patri gignantur, & ex masculis non pauci maris. Quod igitur masculus aut femina generetur, mihi sanè videtur causam ipsam tribui debere qualiterque æstuarum (quæ caliditas & frigiditas sunt) temperamento. Apparet siquidem masculus non solum calidior femina, sed siccior etiam statim a principio esse: atq; ob id, quàm illa tempore breuiori ipsum formari traditur. Est autem siccus, quod citius accipit formam, quod nimirum ea quæ præ maximo humore dissolunt, vix effingi, aut formari queant, nisi prius compagem firmi habuerint. Ad hæc amplas arterias, & venas, & thoracem, & omnes partium cauitates habet quod est iustitiam, & quandoquidem hoc spiritui exuberanti & calido effici maxime solet. Quare & arterias maiores, & fortius pulsantes habet, ac totum corpus concitarum & vegetum ad motum, aliq;que id genus, quæ omnia non solum in iam æditi, sed in his etiam quæ adhuc gestantur in utero, signa sunt caliditatis prædominantis. Idcirco in dextro utero sæpe semper masculi gestari videntur, siue in sinistro femellæ: Sic etiam testiculos dexter magis succulentos, quàm sinister existit: priusq; in pubertatis tempore inflatos, generatores masculorum effici: sinister verò macrior, & postea tumescere incipiens, facinororum genitores ostendit. Si igitur dextre partes sinistres sunt calidiores, fuerit vtiq; hoc signum, masculum calidiorem existere, quem enī esse sicciorē ostendimus. Quod verò ad calidum & siccum temperamentū consequatur actionum robur, omnibus est in confesso. Cur autem eiusmodi temperamento præditi, extrinsecus habent testiculos, & intra ipsos pudendū prælongū, atq; ex nulla parte vterum: contra verò humidior frigidiorg; fetus, testiculos intrinsecus habet reconditos, itremq; vteros, atq; adeo totum pudendum intrinsecus, impræsentiarū venit nobis considerandum. Est enim proportio maxima inter genitalia masculi & femineæ. Omnia siquidem genitalia membrarum masculus, tum femina habere eadē videntur, positione tamen ac magnitudine differre. Quin & vas testes nutritia, vtriusq; sexui ex iisdē venis & arteriis procedit. Eandem enī proportionem ostendunt principia vasorum nutritiuum vterius, cum his quæ sunt in utero vtero-

Natus posse esse si feminis uterque parentis secundum diuersas partes.

Masculi & feminarum de iocuna.

Generatio masculi & femina, ut videtur temperamento aliterque qualiterque.

Qualiterque aliterque caliditas & frigiditas.

Masculi & femineæ formæ quoniam formantur.

Siccus est, quod citius accipit formam.

Caloris prædominantia signa.

Masculi in dextro utero, femina in sinistro gestantur.

Testiculos dexter masculi, sinister potius facinororum gignit.

Robur actionum vniuersum ad calidum & siccum temperamentum.

Genitalia masculi & femina proportionem habent vniuersam.

Semen femineum masculino alimentum esse.

Feminam esse frigidiorē & humidiorē masculo.

Animalia sic uterque temperamenti, sicut etiam generare abloque conueniunt masculi.

Cito aliquod perfectum animal abloque alterius masculi, pro diffusio esse.

Semen prolificum, quod non esse debeat.

Semen, similitudinem partium esse.

rum. Nec verò neruorum principium vtriusq; diuersum est, sed ab eisdem medullis spinalis regionibus in membris femininis procedit. Omnia ergo quæ genitales partes constituunt, in vtroque sexu existere apparet, in nullis penitus femininis à masculo, aut masculum à femina, superari: sed vno solo differre, quod alteræ partes intus, alteræ foras exsistat. Quare si animo volueris, quod in formatione animalis, quod hæret vtero, genitales partes primam delineationem, & quali ad-

Genitalia masculina à feminina hoc solum differre, quod illa quæ foras promouentur, hæc autem intus consistant.

Talparum oculi hoc ob imbecillitate natæ, erumpere non possunt. - Canes præ formatione cecæ catulū edere.

ymbrationem intra peritonæum accipit, postea verò emergant, sic vtriusq; masculi animalis generationem diducens. Atq; in hunc sanè modà natura circa vnamquamq; genitaliū partem omne extrinsecus lineamentū, veluti septum munitionem effingit. Postquam verò opificis speciem delineauit, accurato spiritus impetu vitæ, simul & quod effectum est, propellit, & quod continet, & ambit, simul pertrahit. Si verò aliquando circa vltimum opus debilitetur, ipsum quod moliebatur imperfectum relinquit: quemadmodum profectò circa totum talparum genus apparet, quibus lineamentū quidem oculorum intus expressa sunt, verum foras emergere non poterunt, natura debilitati effecta, quæ vim id efficiere possit. Canes porro, cæcos catulos præter formationem, in pro verbo est. Sanius tamen isti ipsos rectè edutos catulos, imperfectos, quæ cæcos, dicere: vt potest post paucissimos dies viuos. Nihil igitur mirum est, quemadmodum talpæ oculi intus habent, quos natura extra producere non potuit, eodem modo & genitales partes femininis intus effigiatas esse, & extrinsecus emergere non potuisse, propterea quod tota natura ipsarū debilis, & imperfectior sit. Verum tanto sanè femineorum animalium natura perfectior est quàm talparum, in quantum talpæ nullo cæcitatis commodò fruuntur. Non parum verò ad generis propagationem femineum animal conseruit: nam & humidius & frigidius productum, crementata secum conuictum erant, ad alimentum factibus ipsis idonea. Quum enim primi & recentis factus compages liquidior sit & frigidior, tunc & principium formationis seruis accipit, & finem adeo tardum & debilem, vt hæc partes foras emergere non possint. Et quum circa partes quæ postremum effigiantur, naturam de lassari & debilitari contingat, absoluantur etiā alius imbecilliores. Expellitur autem semper excrementum supervacaneū à fortioribus ad imbecilliores partes. Quia verò omnium succinearum particularum debilitata sunt genitales, ob id facili in has supervacaneus sanguis pervenit, qui salubris quidem purgatio sit succinis, penulquæ concipiant: tempore verò gestationis in vtero, idonea materia in alimentum ipsis exiit fertibus. Manifestum igitur tam factum est, in calidiori & sicciori temperamento masculum generari. In frigidiori vero & humidiori, femininam. Speciem autem, siue animalis genus, hominem videlicet, leonem, atq; equum, ad naturam materie, in animalis generationem subsicere, consequitur quemadmodum sanè & forme similitudinem ad vtrumq; partem, & figuram ac formam facultatis esse,

Excrementum ex pello semper à fortioribus ad imbecilliores partes. Manifestum sanè quod idem est alimentum fertibus. Manifestum quoque in calidiori & sicciori temperamento: in frigidiori & humidiori, femininam. Speciem autem, siue naturam materiam subsicere animalis, quæ simulando formæ ad partes, vnde oritur.

quæ in semine continetur. Quare trium similitudinum, tria principia habebimus: similitudinem nempe generis animalis iuxta substantiam ex qua generatum est, fieri dicentes: formæ verò, iuxta motum ex semine: vt eam quæ est, aut masculi, aut femineæ, secundum vtrumq; principiorum temperamentum. Vtriusq; autem principia appello menstruum & semen. Ac de his hæc tenus. Deinceps aliquid & de aliusbus glandulosis quædam quæ semen & connere & generare existimant, illustrantur. Cur enim, si & hi feminis vasa sint, animalibus quibus testes excelsi sint, deperit penitus cōiunctio appetentia? Impossibile quippe est, organa feminis generandi viribus prædita habere, ipsorum verò vsum non habere. Natura etenim, quæ neq; invivem, neq; supervacaneū aliquam particulā fecit, infuit facultates omnium corporis organorum, animalibus dedit, easque nulla institutione edoctas, ad proprias actiones obeundas. Affixæ itaq; glandulosæ ex testium castratione nihil perpessi, castratum animal ad vepereum cōsortium non excitant, ceu quidvis aliud potius existens, quim organum feminale, & alterius cuiusdam vilitatis gratia geniti. Porro duplicem omnium glandularum vilitatē esse, Opimus Marinus tradidit. Aut enim fulcrum vasa sublimia, quæ findi solent, & divisionis periculum circa vehementiores motus sustinere: aut ob humorum generationem partes madefacere possunt, quæ humectatione viscosa, & ex natura dispersa indigent, ne facile resiccant, pigre ad motum reddantur. Atq; in hoc secundum glandularum genus, quod viscidiorum humorum est productum, inseri arterias & venas ait, & quasdam in vasorum mesenteria glandulas definire: Duplex namque & harum glandularum genus esse, quod & vilitatis duplex existat: densas quidem & siccas, quæ vasa quæ findi solent, fulcrum: raras verò & humectas, in quas vasa inseruntur. Siquid & oris amplitudinē, & gulæ summum, & vniuersum intestinum certe quædam glandula humectant, nihil sanè mirum est etiam collo vesicæ simile quoddam auxilium præparatum esse, ne resiccatum aliquando, ægrè mobile fiat. Ac multo magis verisimile est, huiusmodi auxilium ipsi vili pudendo à natura præparatum fuisse, propterea quod memorabilis magnitudo nis in viris hæc glandulæ existant. Periculum enim est, ne quum prorsum & nudum sit constructum pudendum, aliquando resiccatum oborquetur, & obstruatur meatui eius cōiunctat. In feminis sanè ipsum vteri collum nec prorsum nec nudum est: sed intus sitū, & ex ambien-
tibus ipsum & circumstitis multam humectationem fuscipit: imò ex ipsis membris etiam irrigatur. Poterit fortassis & natura verita mordacitate tem vtriusq; hunc humorem veluti inimentum huic pudendi meatui præparasse. Si autem in a-

Similitudinum trium, principia tria.

Affixæ glandulæ.

Naturā nihil frustra supervacaneam.

Glandularum duplex vilitas.

Glandularum duplex genus.

Pudendum virile. Affixæ glandulæ siccæ obstruunt fuisse ad locandā humorem pro penitus ariditate.

Semen non generat in affixis glandulis.

GALENI PERGAMENTI de factum formatione, lib. vnus.



Libri de natu-
ra factu sub-
tatu fuisse
Hippocrati.
Genua recti
concreta desin-
pua.

On est vnus liminitus ac certus ter-
minus factib. manifeste formano-
nis, aut motionis, aut partus. Cete-
rum qui libellā de natura factus cō-
scripti, siue i Hippocrate, siue Po-
lybus fuerit, geniturā quē vbi sex diebus in vte-
ro māsit, foras prolapsā est in quadā muliere, ait
similem fuisse ouo erudo, cui adempta sit testa
externa, & in cuius interna membrana pelluce-
scar inclusus humor. At liquor ipse in ea genitu-
ra (vt autor ille recenset) ruber atq; rotundus e-
rat: in membrana autē ipsa fibre quēdā albæ cras-
sæq; videbantur inesse, cū cruore crasso & rubro
obvoluerat, ac circa membrana foris etiā cruenta
videbatur. Iuxta quæ medium, tenue quid emine-
bat, in istar vmbilici, per quod sanē extrā & intrā
spirano primū fieri apparebat. Quin & mem-
brana quēdam geniturā ambiens cōplectēnsq;
tota ex illo protendebatur. In qua descriptione
membranā a geniturā complectē, ea erat quæ se-
cunda appellatur. Albas verō atq; crassas fibras,
quas cum cruore crasso & rubro in se videbatur
habere, generationis venarū & arteriarū linea-
menta fuisse putandū est. Cōstat enim membra-
na ea ex numerosis arteriis & venis, coniunctis
tenui & membranofo corpūculo. Principiū aut
generationis horum vasorū, ex arteriis & venis
vteri existit. Quārū extrema, in internā vteri re-
gionē oscula aperta habent, & per hæc vasa sola
fœtus ab impregnata communio existit. Ex
nulla enim alia parte secunda perforata est, im-
neq; contingit vteri, præterquam iuxta hæc sola
vasa. Reliquā verō ipsarū internā, & subdūtur
quidem vtero intrinsecus, ac circa concretionē.
Ipsa porro secundæ vasa, angustissima quidē prin-
cipia habēt, per quæ vnita sunt osculis vasorum
vteri. Secedenna aut ab ipso, in idem inter se mi-
tuō remanent, veluti plantarū varix ac tenues ra-
dices, in principiū trunci cōiuntes. Sic siquidem
totus ille partialiū vasorū cōgregiū in duas am-
plas arterias, ac rondē venas absoluitur. In qua-
rum medio, meatus quidam appellatus vragus,
hoc est, ductor vrinæ, gignitur, in fundum vesicæ
ipsius factus perforatus. Cuius pori alterum
oculum, vbi a quatuor vasīs segregatur, paulatim
dilatat, tenue enim membranā fœtum in simi-
lem guerdans: quæ forniculus alteri agnūz no-
minatæ membranæ, in qua fœtus continetur,
prætenditur. Atque hæc quidē extra factum
existunt. Partium verō quæ ipsi fœtui sunt pro-
pria, prima omnium est cūna, ad regendum cor-
pus producta. Deinde consequenter sub ipsa,
connūz his quatuor vasīs intra cutem partes,
quarum nullam prius possibile est generari,
quā omnia secundæ vasa, per quæ factus nutri-
ti cōngit, in prædicta quatuor sunt cōgregata.

Secunda.

Secunda cūsti-
tuta.

Partes per quā
vasa alligant
vteri.
Secunda quā
parte cūstiat
vteri.
Secunda vasa
in duos venas
arterias cūsti-
tuta.

Vragus.

Particularium
membranā o-
rui ab vrago.
Agnūz mētra
factum ob-
voluit.
Cūna.

Partē nullā in
fœtu gigni pos-
se circa substan-
tiā sanguinis.
Hepar vteri-
mē ex sangui-
ne generari.

riam ipsi quimilimā possider. Reliquæ partes o-
mnes sanguinem longiori tēpore indigent, vt gi-
gnatur. At venarū, arteriarū & membranarū cor-
pus omnino exanque quāsi sit, merito & sententia
primam habet generationem, nimirum prædi-
cto glutinosa substantia. Facta autē prima vasorū
radicatione in osculis eorum quæ in vterum ten-
dunt, vnde ille est ipsorum opificer, videlicet
fœtus, alimentū ipsi suppeditare, trahēdo ex v-
tero sanguinē: paulatimq; sic primū genitor dila-
tare, in longum extendere, augereq; & sensim in
idem cōagmentare tenuiora, ad ampliorū gene-
rationē. Apparet aut ex his quatuor vasīs, quæ
iuxta vmbilicum & porū qui ad vragū est, cōa-
gmentantur, statim vbi cutē factus ipsius penetra-
runt, alterū par euestigū vteri, atq; sic vnam mā-
gnā venā produci, cūmque in se in hepar. Nec ve-
rō existimandū est, quod præexistēt hepar hæc
in seratur vena, sed quod huius ipsius vena rur-
sus diuaticat & scissā, vbi in trorsum penetrat,
alteri quidē eius scissarū, iecoris substantia inna-
scatur: alteri verō, quæ mētra vteri gignit, adun-
gatur vteri, ipsi, omentū, & intestinorū volu-
mina, quæ nihil horū antea existeret, sed ad fissu-
ram venarum cōcreta & congenera sint. Non ta-
men sic ipse arteris, vbi primum permeantur cu-
tem, statim aut adnāscem sibi aliam substan-
tiā habent, aut in multas partes funduntur, sed
quādamuisimē dūcē permanent, & veticam fœ-
tus percipiunt, ibiq; firmatæ, tum aliorum, tum
ad corporis pfundū feruntur, donec in ossa factū
perueniant. Iuxta quod dūcē arterie apparent,
quarū singulæ ab vtrāq; parte deferuntur in cru-
ra, maxima nimirum quæ in spina est, & quæ fini-
stro cordis vetriculo annexa cernitur, in ipsas di-
uaticata. Cordi porro generādo materiam, ex præ-
gnante aut per arterias, atq; per medium hepar
suppeditari est necesse, idq; secundum venam,
quæ ex ipso sublimis fertur ad supernariū huius
visceris partium generationem: id quod longū
tempus desiderat. At verō in aboribz factum
supra triginia dies, propē inter se sita manifestē
apparent in hæc animalis membra, hepar, cor,
& cerebrum: atque manus quidē vtriusq; alius hep-
par. Itaq; possibīle est inuenire, quādo cor prin-
cipiū sui formationis formatur. Quum igitur li-
bros de semine scripti, cor similiter vt hepar cir-
ca primos gestationis in vtero dies, veluti fun-
damentū quoddā generationis dixi obtinere, ex
vlu ipsius, q; in perfectis animalibz, maxime in-
signis existit, ad hæc ratiocinationē pductus. Vbi
verō reliq; omnibz rē medicis, tum philosophis
complacitū esse reperi, factum vltiq; ad manifestā
eifigiationē similiter gubernari vt plantas, mihi
probabilius est visum, nullā generationis ipsius
in principio vlnatē haberi, imō penitus hepate
posterioris ipsum formari: ex duobz. His alterū
necessariū iudicans, aut ex emergente ab hepate
sanguine, vna cum hepatide vena etiā cor ip-
sum gignit: aut per magnam arteriā, quæ nō solu-
m ipsum trahit, sed etiam sanguinē habet: Quia vbi
in cōmentariis de respiracionis & pulsū vltū
me cōfessionis exercitatio fuerint, cognoscent factū
in principio generationis, quādo vbi ab vnica
anima, hoc est, a natura regitur, neq; arteriarū,

Partē a fœtu
nata.

Naturali mē-
briū vteri.

Arteriarum fi-
cūda in fœtum
pergressū.

Hepar vteri
maius alio vi-
sibilibz in prin-
cipio generatio-
nis.

Palmodia Ga-
leni.

Cor hepate pos-
teriori formatū
Corde genera-
tio.
Fœtus, dū a fo-
lanatura regit-
tur, nec arte-
riarum, nec v-
tri dū fœtus e-
git.

Vena cū par-
te ad super.

neq; pulsū, neq; cordis functione necessariō e-
gere, quemadmodū neq; plāta. Poerō quemad-
modum vbi plantæ semen in terram moderatē
calidā & humidā est coniectū, ex ipso statim du-
plex exortus videtur nasci, alter infra terrā, alter
supra terrā, qui progressu tēporis & crassescit,
& in alios atq; alios exortus scinditur, quos nu-
triri & augeri in dies cōtat, ferrety tandē fructū
in extremis partibus suis, planta iam absolūta &
perfecta sic factus primo lux formationis tēpo-
re exiguū augmentum habet: quando verō ma-
nifestē in articulo digeri incipit, vberius: que-
admodum maximū & vberius, vbi totus iue-
rit articulus. Terminus igitur primi tēporis, in
quo factus nondū corde habet opus, mihi videtur
is esse, in quo iam vniuersa fissura ventrum
circa hepar est facta. Etenim ipsius magnē venę,
quā videmus per vmbilicum ferri, vniuersę alie
corporis venę, tum partes, tū germina existit al-
tiore quidē porta (est enim duplex fortibus) gra-
ta generationis omnīū, quę circa hepar sunt, fa-
cta inferiori verō, causa productionis illarum,
quę in ventrem, splenem, omentum, intestināq;
disseminantur. Cōpleto autē hepate, ex venis qui-
dem iuxta gibbū ipsius, velut ex radicibus qui-
busdā stipēs, coaceruatur maxima totius corpo-
ris venā, quam causam ob excellentē nominat.
Cuius venę altera quidē pars infra fertur iuxta
spinam firmata, in renes ac lumborum regionē
quę dā germina emittens altera sursum per me-
diū thoracē in collum tendit, primō quidē ob-
ter in seprū transversum, postea in membranas
succingentes thoracē, inq; tunica cordis obvo-
luta, ac deinde in dextrum cordis ventriculū,
inq; ipsū thoracem variis faciens exortus. Ex
quibus pars spinę & thoracis supra seprū trans-
versum materā generationis suscipiūt: quo tem-
pore etiam cor ipsū formatur. Eodē verō tem-
pore verisimile est etiam venas ex interiori por-
ta in omnes partes circa ventrem fissas, his ipsis
fieri causam generationis. Formato corde, in
ipsum inferi potest prædictū par arteriarū, iam
coactū in vnā, quod in media spina firmatū cer-
nimus, donec prope cor perveniat. Quū autem
duo cordis ventriculi sint, in dextrum quidē san-
guis ex hepate accedit calidus moderate in fini-
strū verō multo calidior, & tenuior eo, per dictā
arteriā fertur. Quare & vtriculos, & vtriusq; ma-
terias iam habens cor, pulsabit vtrūq; & arterias
eodem suuipius motu inuehit, adeo vt nō am-
plius velut planta, sed quemadmodū aliquod
animal, factus gubernari videatur. Inest autē pul-
sus corporibus calidis. Cæterū vt nullū exan-
guis animal est manifestē calidū, sic nec manifestē
calidū, est exanguis. Cor itaq; est induratum anima
habeas, velut focus ignis: ex eo siquidē animalis
corpus maiorē caliditatē acquirit ea, quę in si-
stra est a natura venis ac hepan, & sanguini in
ipsū contento. Quemadmodū autē cor posterius
hepate generat, consentanea ratione erat, ob
idq; prægnātis vtero est propinquius ipsū he-
par locatū: sic cerebrū adhuc longius quam cor
ab vtero locari expediebat, vt pote quū etiā stru-
ctura ipsius postertus sit producēda, propterea
q; neq; indiget factus qui in vtero gestatur, cere-

bro, quū nec voluntario motu aut actione, nec
sensu vilo aut exteriori aut interno habeat o-
pus. Postertus itaq; circa tertium temporis ordi-
nem, tum cerebrū, tum omnia circa faciem sunt
eiformata, quo tempore vniuersę partes ad per-
fectionem suuipius struēture pervenerunt. Ma-
nifestum est autē, quod capitis os postertus om-
nibus aliis osibus cōgelatur, confirmatur: &
ob id iuxta finem ut adeo tenue & imbecille sit,
vt in rectis ædus puella motū cerebri nō solum
tactu, sed visu etiam deprehendamus. Et iam
quartū tempus adeit a primo conceptu, in quo
partes iuxta motū postertus formate corrobor-
rantur: quā ob rem sanē infantes actiones ani-
mę nutritivę robustissimas possident. Secundam
in illis sibi vendicāt sedem actiones protectę a
corde. Debilissimę verō sunt quę procedūt a ce-
rebro, quū nec moveri, nec stare firmiter valeat,
taturū autē vt ratio cūat. Postertum omnū os
capitis ipsius corroboratur, & enascuntur dentes,
& calua pilosa redditur. Postea verō vnā cū or-
ganis absolūte animę facultates, actiones suas
obediūt. Arterias igitur & venas, necesse est pri-
mas omnīū ex semine generatas esse. At circa fa-
cultates vitā nostrā administrātes & gubernan-
tes, ratio ipsa postrema omnium & fit, et absolūt-
tur: quę quidē feliciter dispētat res hominū, vbi
vniuersa anima iuxta naturam habet: infelicitē
verō, quū præter naturā emotā fuerit. Iam verō
vide nam corporis actiones oriātur, facile est di-
gnonomb, loquet. Prima igitur dignotio ex pre-
cisā, aut laqueo interceptis arteriis & nervis est,
in quibus partes quidē ex altera laquei parte, vi-
dentur apprias obire actiones, ex altera verō
corpius amittere: vt si medulla spinalis (exempli
gratia) circa aliquē sping locū fuerit dissecta, ner-
vi quidē, qui supra regionē spinę, ipse medullę
incumbentes, lauciatū oriuntur, tum motū, tum
sensum cōseruare videntur: q; verō infra, omnes
vtriusq; amittit. Vnde liquet, eas facultates ipsi
spinali medullę supernę ex cerebro influere. Si-
militer quū arteria hęcunq; aliquo vinculo exce-
pra, id quidē quod ex ipsa supra laqueū cōtinuū
cordi est, pulsus, veluti antea, appareat, altera
verō pars infra laqueū statim pulsū priuatur: cō-
spiciū sanē etiam hunc est, arteriis principū mo-
tus ex corde esse. Ad hęc, medullę quidē spinalis
ac nervorū, per omnia eadem, quę cerebrū, sub-
stantia existit: quemadmodum & continetur in
ipsa tegminū eadem etiā est cum involucris am-
bientibus cerebrū. Arteriarū verō substantia, ni-
hil, ne propē quidē, cordis habet: quādam
neq; venarū, hepatis. De origine autē hepatis
dis vena, dubitāt scētoris artis periti. Rationa-
bile autē est coniectare, principia venarū in vte-
ro, similia esse extremis partibus radicem planta-
rum: stipiti verō cuiuspiam, venam per vmbilicū
in hepar procedentem assimilari: atque omnes
vidende venarum extremitates, quę in animal
dimittuntur, ramulos, & non radicibus, consim-
lem proportionem habere. Semen igitur opifi-
cæ ratione habet, a quo vasa, per quę sangui-
s prægnante attrahitur ad viscērum generatio-
nem, omnīū prima generabuntur. Secunda au-
tem ab his, hepar, & cor, velut fundamentum
domus:

Caliditā post
alia omnia ofi-
cia compingit.

Infantibus in-
est robustissi-
mas naturales
actiones, ani-
malis autē ad-
modum imbe-
cillæ.

Arteria ex vi-
ta prima e-
st, necesse est feni-
re oritur.

Ratio, postre-
ma omnium ex-
istit, ex absolū-
tur.

Ratio quando
feliciter suo
fungatur mun-
dere.

Aliaque corpo-
ris vnde oria-
tur, dignotio.

Cerebrum do-
minatur vtri-
usq; facultatē
spine.

Cor offi princi-
piū motus ar-
teriarum.

Substantia ce-
rebrū, nervo-
rum, ex innu-
ta medulla, ca-
det.

Hepatis vnde ve-
na considerat.

Semen habere
rationem opifi-
cæ.

Generatio qui-
bus primā, ex
quibus poste-
riora atque de-

Vena porta do-
plex.

Vena cana vo-
de orta.

Vena cana do-
plex.

Spina supra se-
pium vnde ge-
neratur.

Cor quo forma-
tur tempore.

Vena par-
te vnde oria-
tur.

Cordis ventri-
culi duo, quod
ex vnde respo-
ndent.

Cor quando
pulsa.

Pulsus inest cor-
poribus calidis.

Exanguis nullū
esse manifestē
calidum.

Cor esse indurū
animā habens,
velut focus ignis.

Cor postertus
hepatis genera-
tur.

Cerebrum pos-
tertus generat
ipsa corde.

Factum in vte-
ro non indiget
cerebro.

domus: quo tempore & alia quædā finguntur. tum his vicina, tum inter hæc & vterum fira. Quando verò neq; iuxta quantitatem, neq; iuxta qualitatē, substantia partium permanet, nisi tum defluxu ipsarum magno quondam fiente, & qualitate item multiformiter variante, auxilio utiq; inter se murio opus habent, quo et evacua tum rursus explicatur, & quod variatum est, corrigatur. Corrigitur postquam respiratione fuerit priuatum, ipsum moueri cessat, et cum ipso ro

Substantiam partium nō permanere, sed fira realit. mutari.

Cor priuatum spiratione moueri cessat. Respiratio à quibus causis subleuetur.

Nervi mouent thoracem, à medulla spinali oriuntur.

Inspiratio expiratioque, quomodo fiant. Hepar gratia fuisse citatum re ait atq; officia dicit.

Lienus mouet. Venter hepatis alimētum praeparat.

Particulis singulis adesse fira. Nervi, similesque nata sunt animalia.

Anima constituit partem. Opificia autem quid mouet.

Offa corporis plura ducuntur.

Natura scopi circa corpus foetum.

pse crediderim citra sapientissimum, eundemq; potentissimum opificem factoa esse. Quia verò luc sit, pronuciare non audeo, præ consilij inopia obmutescens. Supremam enim video in formatione sapientiam & potestatem: neq; animam in semine plantantiam quidem ab Aristotele, appetitricem verò à Platone, ab Stoicis deuicue appellaram naturam, factum ipsum formare existimo, quum uō solūm non sit sapiens, sed & penitus bruta & rationis experte: neq; rursus discedere ab hac opinione valeo, propter naturam ad parentes similitudinem: apparere enim animam corpus formantem, ex parentibus in ipsum factum transfundi, seu contentam in semine. A rationali verò anima, quæ post partum per omnē vitā se ostendit, recedo, propterea quod ante corporis dissectionem non cognoscimus, neq; partes corporis, neq; ipsarū actiones. Itaq; dubitare me, consiliū inopem esse fateor, de opifice factus causa, non secus quā de substantia animæ, quum de his nullam opinionem scientificè demonstratū repererim. Hoc verò vti possibile pronuciare potero, videlicet vniuersum corpus, ubi iam efformatum est, per omnem vitam tribus principis motuum gubernari atq; regi: eo quod ex cerebro est, per nervos, & musculos: quod ex corde, per arterias: quod ex hepate, per venas. Ex quibus autem principis hæc fiant, licet nus nihil habeo quod pronuciare intrepide posim.

Condicio magis animæ commutatio.

Anima plantantia esse bruta, et rationis experte.

Rationalis anima non informat factum.

Galienus fatetur se dubitare de opifice factus causa, quod substantia animæ.

Principia motuum trium sunt, ut fira corpus regant.

GALENI PERGAMENI de Septimestri partu, lib. vnus.



X feminis cōceptionibus (sine quarum obseruatio o fieri minime potest, ut idoneum parienti tempus quæ ritē inueniat) pleræque mulieres grauidas in medio temporis spano, intra centum nonaginta dies, & ducentos, peperisse animadverto: paucas tempestiuus, ut rarsius: nullas planè celerius ceterisimo & octogesimo secundo die cum dimidio, & quibusdam horis, vel post exactum quartum supra ducentessimum. Iurē igitur septimestris partus ædendi, primus terminus esse censetur dimidij anni tempus: quum nimirum tempestiuus nulla partum dixerit, sed tardius omnes. Tempus autem id centesimo & octogesimo tertio die, minus quibusdam horis absoluitur. Atque ego vnam femel mulierem reperi, quæ centesimo & octogesimo quarto die completo peperit. Diem impræcensua appello, interval lum viginti quatuor horarum quinoctialium. Sic enim & anni trecentis & sexaginta quinque diebus, & quarta insuper diei parte consistere ducunt: tempus vero menstrui, circiter vigintinouem cum dimidio. Nimirum mensem appellari spatium id, quod ab vno lunæ congressu cum sole, vsque ad alium mox sequentem interest, omnibus in consensio est. Si enim triginta diebus quilibet menses consistant, nonimestres factus exactè vsque ad ducentessimum septuagesimum diem verò gestarentur, quod nō contingit. At annus dicitur tempus illud, quod

Septimestris partum ædendi primus terminus.

Diei quid.

Annus quot diebus constet.

Menstruū sexum.

Annu quod
signum dicitur.
Signum quod
Hippocrati de
septimesterio se-
in sententia.

ab vno signo solem in idem signum restituit. Si-
gnum autem ipsum impræsentiarum pro pun-
cto capitur. Porro Hippocrates, septem qui-
dem menses septimesterii futuri constituit: ex qui-
bus quinque esse integros ait, qui inter primum
& septimum mediū habentur: duos autem de-
ficientes, nempe primum & septimum: at non
ira deficientes, vt supra dimidium eis deficiat.
Mensis enim dimidium, est dierum quatuordecim
cum dimidio, & quarta adhuc diei parte:
quamobrem primi mensis & septimi tempus,
prædicto hoc erit maius spatio. Si igitur primi
mensis tempus à conceptu vicissim diem
excedat, sitq; verbi grana dierum vigintitrium,
quoniam sequentes quinque menses centum & qua-
draginta septem dies supra diei dimidium con-
tineant, tempus sanè id, quod ex vtriusq; constabi-
tatur, dierum erit 170. cum dimidio. Septimester
autem factus ab eo tempore, quindecim, ad
minimum, actus diebus, in lucem producti po-
terit. Necesse quippe est, vt si sextum mensem
partus debeat excedere, septimi plus quam di-
midium attingat. Qua ratione omnes hi in vni-
uersum dies erunt 186. cum dimidia adhuc diei
parte. At si vti citius his præscriptis diebus se-
ptimester infans ædi non potest, ita neq; omni-
no tardius ducentis. Si enim centum & septua-
ginta diebus cum dimidio vigintinovem adu-
cias, omnes simul centum & nonaginta novem
cum dimedio erunt. Fingamus rursus mulierem
prout mensis dies 28. gessisse vtero: qui sanè
dies si adiciatur quinque subsequennum men-
sium diebus 14. 7. cum dimidio, atque his insu-
per septimi mensis dies 29. accedant, vniuer-
sum hoc tempus quatuor & ducentis diebus ac
insuper dimidio constabit. Quia verò in maximis
distantis primus & septimus exierit mensis,
infans hunc non esse vitalē, Hippocrates pro-
fiteretur. Quod autem ad mensem lunarem perti-
net, in minori etiam tempore quam sit anni di-
midium, fetus septimester fidi posset: quod iam
ostendam. Qua enim ratione necesse est vt septi-
mester partus anni saltem dimidium attingat,
ea nimirum ante centesimum & octogesium
secundum diem, & 15. horas, vel circiter, vitalis
nullo pacto existeret. Quatenus autem si dies ad
menses lunares exacte computentur, prius eti-
am eo tempore liceat facundum partum existi-
mare, nunc declaro. Fingamus enim primo me-
se mulierem sexdecim dies vtero gessisse: post
quinque autem subsequentes menses, pariter sex-
decim dies: quippe hanc ratione tempus id om-
nino 179. dies cum dimidio explebit. Verum in
minori intervallo quam sit anni dimidium, se-
ptimester factus vitalis ædi negat Hippocra-
tes. Atque idcirco nim primi, tam etiam septimi
mensis plus quam dimidium partem
fœtum attingisse est necesse, pri-
usquam ædatur in
lucem.

LIBRI DE FORTVVM FORMA-
TIONE FINIS.

GALENI PERGAMENI
de instrumento olfactus,
Lib. vnum.



On modo perceptionem odorum, sed etiam facultatem, cuius est odo-
rem percipere, medici olfactum ap-
pellant. Secundum autem vtrumq;
significatum, vnum est instrumē-
tum olfactus, quod facultas ea sibi sensibilia ap-
prehendat. Porro si ipsos nasi meatus aliquo
odorato vnguento repleueris, nunquam prius
senties, quam aërem inspiraueris: & ob id non-
nullis videtur nasum viam esse olfactilium: id
verò corpus cuius est odores percipere; inter-
ius esse situm. Scire autem oportet, quod
quum nasus septem medium habeat, & duos
hos omnibus patentes meatus, vtrique nare
alterum, supra mediam nasi regionem vterque
eorum bipartitur, ita vt pars quidem altera, in
interiores oris partes declinet, altera verò re-
cedat se ad cerebrum conferat. Nam sunt ibi duo
quoque ipsius exortas oblongi, & cavi, qui ex
anterioribus cerebri ventriculis suam ducit ori-
ginem. Hi in eam caluiz partem descendunt,
vnde exoritur nasus: ibidemque ea ossa habent
sedem, quæ colatoria vocantur. Sed & crassior
membrana, qua parte hæc ossa attingit, existit
quibusdam foraminibus est perforata. Vnde per
eam primum, dein per iam dicta ossa in meatus
illos excolantur crassiora excrementa cerebri.
Nam quæ similiora vaporis sunt, per caluiz fu-
turas vacuantur. Extrema insuper est vniuersis il-
lis nasi meatibus exanguis quædam tunica, cras-
sior quam sit membrana: atq; ea quidem illi con-
tineus est, quæ ori, linguz, gutturi, faucibus, a-
speræque arteriæ, & gulæ subternitur. In hanc au-
tem tunicam à cerebro nonnulli nervi inferuntur,
parui quidem omnes, præter illos qui defe-
runtur in linguam. Satis appere crassi sunt, hi, quæ
ea particula copiosiori etiam eget sensu, vt po-
te genita vt existeret gustus sensorium. Ob hoc
ipsum natura oculis impertita est nervos, eosque
longè crassiores illis, qui ad linguam attingunt:
& secundum hos, auribus, atque ori ventricu-
li, quod & ipsum sensu egebat quamplurimo.
Oculus itaque visus est instrumentum: auris, au-
ditus: lingua, gustus: appetentis verò cibi & po-
tus, ventriculus, & præterit os eius. At verò ta-
cilem facultatem, quod ad cognitionem spe-
ctat, natura ceterarum crassissimam fecit: quam
vni definito loco, sicuti aliis omnes, minime
adscriptis, sed per corpus vniuersum dispersit: ac
proinde plures illi nervos exiliores, durioresq;
& qui magna ex parte ab spinali medulla oriun-
tur, indidit. Eis verò quæ recentissimus particu-
lis, vt pote quibus amplioris sensu erat opus, ma-
iores, & molliores, & omnes à cerebro produ-
ctes, dedit. Iam igitur instrumentum visus, ad
quod solum pertinet luminis atque splendoris
sensus; quammaximè efficit lucidum: aëreum
verò auditus, cuius erat eos percipere sonos,
qui cum aëre ferantur. Linguam præterea ex hu-
midiori corporis specie contraxit, seu instru-
mentum futurum, quo facti omnes discernere-
tur.

Olfactus dicitur
vnde dicitur.

Nasus est via
olfactilium.

Nasi meatus
vtriusque bi-
partitur.

Cerebri exor-
tas versus oas
ducat nasi.

Colatoria ossa.

Nasica tunica.

Lingua nervi.
Lingua est vni-
uersum sensorium.

Strenua cultura-
mentia.

Tactilem facul-
tatem esse cras-
sissimam omnia.
Tactilem facul-
tatem esse per cor-
pus diffusam.

Visionis instru-
mentum locum.
Auditus instru-
mentum aeris.
Lingua conductio
libra.

Mensis lunaris.

Olfactus sensibile.
Olfactus subflantia.

Talus instrumentum refrigerans.
Odoratus sensum vaporisum existerre.

Olfaciendi sensum namque esse nati pelliculam negat in os.

Inspiratio modus.

Olfaciendi sensum in antennis etiam tractacula sunt esse.
Nigella oleo immixta et infferatam commode sternutamentum mouere ut qui laborat tussit.
Cerebrum in ea locum continetur.
Odorem refrigerantem cum forte capiti exhalat.

tur. At verò sensibile id quod sibi olfactus ascuit, inter aërem humorēq; & ignem est medium. Nam id quod à singulis corporib; diffiuit, ipsa est olfactui subflantia. Quum autem pro suorum sensuum similitudine, instrumentū vnumquodque à natura paratum sit (instrumentum quippe visus, humidum ac pellucidum est, tactus verò, terreste & durum) sensorium sanè quo percipiunt odores, opus est vt vaporosum exsistat. Quare neq; os nasi, neq; item membrana illa cuius nuper mentionem fecimus, sensorium esse possit olfactus, quum & dura corpora fiat: neque tantus eis insit aut talis nervus, quantum & qualem olfaciendi facultas postulat. Nervus etenim qui visui inferuit, quamvis ad crystallinum tantum pervenit corpus, eo longè maior est, qui deferitur ad os ventriculi. Extrema & interior pars illius auditorij meatus, vbi situs auditus est, quamquam brevisima sit, crassum tamen est nervum adeptā. Nec lingua quoq; exiguorum nervorum, ex his qui à cerebro oriuntur, esse videtur particeps. Quāobrem laudat quāquam sensibile est, facultati olfaciendi tributum esse à natura tam exiguum sensorium, vt est ea nasi pellicula. Nam quod pertinet ad os nasi, tantum abest vt sit odoratus facultatis particeps, vt tactus eam careat. Sed ex hoc etiam, quòd eo tantum tempore quo spiritum introducimus nābus, ipsos odores percipimus, placet constare videri, neque ossa, neque tunicam nasi, neque eam quæ palatum, guttur, ac fauces veilit, sicut nec colatorum meatus, esse odoratus sensorium, sed aliquam aliam particulam interius sitam, atque in penitioris corporis sede delitescentem. Porro vbi pectus à musculis dilatatur, pulmones sequuntur ipsum: quos subinde externus aër per asperam arteriam, guttur, os, atque etiam nares, continuatione quadam, subsequitur. Potest autem cerebrum, quum inspiramus aërem, & ipsum sua actione, & suis etiam quibusdam quasi germinibus, pectus dilatans, aliquid in suos sinus attrahere. Fieri etiam potest, vt ipsum quod alta movet, sibi quoque leuē aliquem motum, tum in seipsum, tum verò ex se præstet. Coarctatur enim dum sese contrahit: quum verò vniquē se dilatat, funditur: atque ita externus aër, ex continui ratione, illud, qui se retrahit, subsequitur: sicut etiam dum diffunditur, elabitur. Quòd igitur olfaciendi sensus in anterioribus ventriculis cerebri situs sit, multis rationibus sum adductus vt credam. Primum, quòd illos qui capitis grauedine, ob cerebri crasis vaporib; opleti, tenentur, atq; inde obfusius olfaciunt, sternutamenta præcipue tuent: qualia ex nigella oleo immixta inspirantibus ægris, & capite resupino insillare naribus solemus, idque prius ore aqua repleto. Ad hæc quum cerebri contento spiritui repleatur, incalecatq; consentaneum rationi videtur, expirationem ad ea quæ noxia sunt excutenda, inspirationem vero ad refrigerium illi summè conducere. Tertio autem, quòd in eis quibus exurit est, aut exalfactum caput, num rosarum, tum aliorum refrigerantium odor, manifestè remedium

calori adferat. Instrumentū itaq; olfactus, minime in illa nasi pellicula, sed interius reconditum est: ita tamen, vt foraminum nonnulla eo perveniant, quæ neq; etiam perpetuò adperita sunt, sed habent opercula quædam membranosa & tenuia. His igitur * per inspirationes violenta spiritus referant, patet rei sensibili aditus ad eam particulā, cui vis illam dignoscendi indita est. Quare non quemadmodum palpebrarū motus pro nostro sit arbitratu, sic meatus illi opera nostra aperiuntur, quum nullum habeant voluntariū motum, imò nec naturalem, nec dilatarent etiam ab instrumentis quæ inspirationi deferunt, sed à solo per inspirationē insinente aëre. Nisi autem per inspirationem cerebrum dilatetur, expellatūq; ab eo antea contentus spiritus, fieri non potest, vt aër ad ipsum per dictos meatus irrumpat, quamvis sitis vehementissimè illam: licet ipsius aëris occursum, tunica in quā iñ meatus descendunt, facili sentiat. Quare si secundum nares meatus olfactorij consistere, aperirentur vniq; in maximo aëris impulsu: quibus adaperis, subinde odoris sensus subsequeretur. Non subsequitur autem, ergo nec secundum nares meatus olfactorij cōsistunt. Ad hæc, si meatus villos secundum nares ad odores percipiendos extraxisset natura, vniq; non obstruisset illos: quemadmodum neq; eos qui in auribus sunt: quum longè præstet quencunque sensum semper esse ad illa sensuilia apprehendenda promptum, quā si solum eo tempore quo sitrespiratio. Neque ob eam causam natura oculis operimenta palpebrarum apposuit, quòd melius non sit eos vique quæ operari: sed quòd molles illi sint, ac proinde expositi, facili possint à rebus extrinsecis occurrentibus lædi. Iuuant etiam palpebræ ad capeffendum sonnum. Nemo siquidem in aëre luendo reclusus oculis potest dormire. Quare & illis animantibus, quibus nullæ sunt palpebræ, foueas quasdam natura indidit, quæ totos oculos, vbi somnus vrgeret, quasi in cubiculo receptos, admitterent. Est enim id naturæ institutum, vt in suis functionibus perpetuò sensus verentur: et si rei cuiuspiam visionis oblata occasione, interque scere aliquantisper cogantur. Nequit autem animal dormiens, sensus integrè sentientes seruare. Nam quæ simul esse non possunt, ne Dū quidem omnia, enā si velint, coniungant. Quòd si eodem fuerint extracti modo ipsi olfactorij meatus, quos ait Aristoteles, erunt potius damnum non leui, tantum abest vt allaturi sint nobis villam vulnitate: nimirum nos per maius vitæ spatium sensu olfactus priuantes, quod in nullo alio factum fuisse vnquā vidimus. Porro sternutamenta, capitis grauedini auxilio sunt. Fiunt autē, quum maximæ inspirationes progressas, quæcelerimè efflato subsequitur. At efflationem voco * cōsertim factam expirationē. Vnde si per sternutamenta nihil excurrat à cerebro, non solum non leuant ipsa capitis grauitatem, sed magis etiam replenone eius accumbunt. Cæterum agrotis ad solem conuersis, proritamus sternutationem: quia vaporosus in cerebro spiritus ab eo funditur. Exsurbat porro

Olfaciendi ratio.

Palpebrarum visus.

Palpebræ iuuant ad capeffendum sonnum.

Aristoteles sententia de olfactorio meatu.

Sternutamenta auxilium grauedini.

Efflatio quod.

Sternutatio prouocat ad solem.

*Et remanentem
vires.
Odores reher-
mentis car-
pi repleri.*

*Respiratio à re-
bre quò de
causa fiat.*

*Cerebrum in-
flatur, exora-
riquit.*

crassiores & lentos de cerebro mucos sternuta-
menta, eos vna cū spiritu excussio explo dentia.
Quod autem ab odoribus vehementioribus ca-
put continuo ladanur, repleaturque, atque red-
datur grauius, ac nonnunquam excitetur deli-
rium, id rectè argumento est, portionem aliquā
substantiæ illorū ē insilire: alioqui ex sola qua-
litate cōmuniōne nunquam ab effectibus ad-
eō repentibus & validis caput amperetur. Si gi-
tur respiratio vniuersa à cerebro ea de causa ex-
ditur, vt in corde feruetur quidam caloris mo-
dius, cur sibi quoque non admittitabit id ipsum,
quum suapte naturafacillimè à rebus tam ca-
lescentibus quā refrigerantibus lēdi possit.
Aut cur naturā congenitam quandam motione
cerebro non tribueret, quā inspirando se ventila-
ret atque excitaret ad pulsū: expirando verò
pituitosa & mucosa excrementa à se abigeret.

GALENI PERGAMENI de ossibus, ad Tyrones, lib. vnus.



PX ossibus singula, qualia sunt, &
quam inuicem structuram habeat,
nota esse medico debent, si rectè ea
vel fracta, vel dimorsa sua sede, sit cu-
raturus. Quare in omnibus quæ ad
medicinam pertinent, id quod secundū natu-
ram est, tanquam scopum semper habere conue-
nit. Sunt autem ossa iuter ammantis partes du-
rissima & aridissima, necnon terrestria maxi-
mè: quæ quidem cū fundamenta quædam, totā
molem corporis sustinent, atque stabiliunt.

*Ossium nota-
ta & munus.*

*Ossium differe-
tia.*

Eorum tamen quædam grandia & ampliter cō-
caua, medullosoque sunt: quædam parua, & so-
lida, ac sine vlla medulla. Grandibus magna ex
parte in extremo, aliorum ossium appendices
adnascuntur: vtpura, humero superius, cubito
inferius, radio verò ac femori, itēque tibiæ
ac suræ, infra supràque. Maxilla inferior me-
dulloso est, adnascensque appendices expers.
Sed ex eius extremis partibus, quæ infra est, vi-
tur per symphyisin, hoc est, coalitum. Suprà in
duos processus, in cornem videlicet, quæ in
acutum tendit, ac ceruicem tantū, definit. Por-
rò compactio humani corporis ossium, scle-
tos appellatur. Cæterum alia per articulum, al-
ia per symphyisin ossa iunguntur. Articulus
enim naturalis ossium est compositio: at sym-
phyis, naturalis vno eorundem. Articuli dif-
ferentiæ duæ: diarthrosis, & synarthrosis.

*Scleto-
Articulor,
Symphyis.*

*Diarthrosis,
Synarthrosis.*

Enarthrosis.

Arthrodes.

*Coryle, aceta-
bulum.*

*Glene.
Glymus.*

Dicitur quidem diarthrosis, ossium structura,
quorum motus est evidens. Synarthrosis verò
ossium quoque compositio est, quæ obcurum
invalidūque habent motum. Diarthroses est
triplex species, Enarthrosis, Arthrodes, & Gly-
mus. Enarthrosis, quum excipiens cauum,
admodum altum est, caputque quod in id inser-
tur, oblongum. Arthrodes dia verò, quæ cauum le-
niter & in superficie, & capitulum etiā depre-
sum habet. Ex caus capitula ipsa excipientibus,
quod altius descendit, coryle, hoc est, acetabulū:
qd in caput situm est, Glene à nonnullis appel-
lantur. Ciglymus est, dum ossa sese inuicem ingre-
diunt, coniunguntur: quemadmodū vertebæ
iuter se, ac humerus cubitusque alligantur. Synar-

throses quoque triplex habetur species: Sutura,
harmonia, & gomphosis. Sutura compositio
quidam est, ad confuturam rerum similitudinē.
Harmonia vero ossium structura est per simpli-
cem lineam. Gomphosis, quā in artu clauis os ossi
infigitur. Symphyis dupliciter differt. Nam alia
inter se inuicem ossa, vt molliora: alia aliorū in-
teruenit, vt duriora, coalescunt. Huius differe-
ntiæ vltimæ, tres sunt species, Synchondrosis, Syn-
chondrosis, & Syllarcolis. Quia verò ipsa occasio
se obtrulit, nonnulli & de neruis dicamus, quorū
tres sunt species. Qui enim ex cerebro, & dorso
medulla oriūtur, voluunturque nerui: qui ex mus-
ulis, tendentes: qui ab ossibus, ligamēta appellatur.

Sutura.

*Harmonia.
Gomphosis.*

*Synchondrosis.
Synchondrosis,
Syllarcolis.
Nervorum tres
differentie.*

OS capitis caluaria dicitur, ceteris futuris dis-
tinctum: quarū numerus posituræque, pro capitis fi-
gura varatur. Naturalis capitis figura, ad obli-
quæ splatæ similitudinē structa est: habetque pro-
terem & posteriorem partem prominentiorem.
Ac tali quidem capiti tres insunt suturæ: duæ
quidem transuerse, quarum altera in occipite
est labdoeides, ad similitudinem A literæ sic ap-
pellatur: in sinopite altera, quæ coronalis voca-
tur: ac tertia, quæ à posterioris medio, per capi-
tis longitudinem, ad medium vsque anteriorem,
extenditur. Harum futurarum figura H literæ
præcipue similis est. At quæ figura insigniata est
vertice, ea quidem vituperatur. Atque vbi in ipsa
quidem posterior emissa perit, sutura labdoe-
ides aboletur. Si anterior etiam addit, coronalis etiā
futura deperditur: huiusque remanentium fu-
turarum figura T literæ similis. Harum autem
vtriusque eminentia depredata, geminæ quæ ser-
uantur future, ad rectos se inuicem angulos in-
tersecantes, X literæ similitudinē referunt. Namque
altera quidē transuersa per medium postusū
caput extenditur: altera à parte posteriori per lon-
gitudinem in priorem, vni in ceteris caluariis o-
mnibus, tendit. Hæc quippe semper seruat: re-
liquæ cum rōnis capitis figura variantes interci-
dunt. Duæ quoque ab hac æquæ distantes lineæ su-
per aures feruntur, duobus inter se ossibus, non
per futuram, sed per appositionem, squamarum
instar, cohercentibus: ob idque lepidoeides vocan-
tur. Quo fit, vt quingæ peculiares future sint capi-
tis: Labdoeides, coronalis, & quæ rectā per lon-
gitudinem ferunt, ac duæ illæ ab hac æquæ distan-
tes, quas lepidoeides appellant. Sunt & duæ al-
iæ communes superiori maxillæ, necnon ossi
sphenoidei, quod cunctis similitudinē referat, ap-
pellato. Id autem os apophyses quasdam forti-
tur, quas ab altari similitudine pterygoeides vo-
cant: ceteris vtriusque sunt concavæ. Alia autē futura
capitis, quæ ipsum à superiori maxilla diuidit, ex
caus temporis iunū sumit: in de ad oculorū fe-
des procedit, perque eos medios ten dens, iuxta
mediū superoliorū sibi ipsi iungitur. Sex itaque in
vniuersum funt rōnes capitis ossa, idque spheno-
idei: ex excepto: duo scilicet principis: duo itē petro-
sa, vniūquodque videlicet ad suam aurem: quātrū
os occipitis: sextum denique frontis. Sunt porro
incipitis ossa quadralatera: quæ verò iuxta au-
res hærent, trium laterū sunt. Os occipitis, ma-
ximum omnium quæ sunt in capite, foramen iuxta pri-

*Capitis ossium
confuturæ.
Capitis natu-
ralis figura.*

*Capitis tres fu-
ture: labdoe-
ides, coronalis,
& media.*

*Caput sustinē-
tum dicitur.*

*Sutura per ca-
pitū longitudo-
nem semper ser-
uatur.
Lepidoeides fu-
tura.*

*Septem capitis
quingæ præci-
pue.*

Sphenoidei os.

*Pterygoeides os
periphiu.*

Ossa capitis sex.

*Incipitis ossa
quadralatera.
Occipitis fora-
men maximum.*

xtra pri-

Ossium capituli
differentia.

sta primam vertebra[m] habet. Horum autē sex
quę diximus, sicut ip[s]is ossa rarissima & infirmis-
sima: occipitum densissimum, firmissimūq[ue]
medium inter laccipia, os frontis habetur. Re-
liqua vtriusq[ue] ad aures posita, multitudine[m] se ha-
bent. Namq[ue] horum pars, quia petra[m] speciem re-
fert, litulo des vocatur: id os, protensis labdon-
dis futurę sinibus terminatur. In eo styloides
(quia columnę est similis) processus inest, in eodē-
q[ue] continetur auditorius meatus. Altera
deinceps pars, iuxta eos exortus habetur, quo-
rum vnus mamillaris dicitur: alter ossis iugalis
est. Præter hæc terna quoque pars a temporibus
occupatur.

DE OSSIBVS IUGALIB. CAP. III.

Temporis musculo præpositum est os, quod
transversam in medio suturam habet: cuiusq[ue] pos-
terior pars omnis, cum capitis osse quod iuxta
aurem habetur: anterior, cum parte supercilij ex-
trema, ad paruum oculi angulum continuat[ur]. Id os
totum Zygomata, a nostris iugale ap-
pellatur.

DE OSSIBVS SUPERIORIS MAXIL- LAR. CAP. IIII.

De futuris quę in maxilla superiori continen-
tur, dicimus: quarum prima sub osse iugali exor-
tatur, cuius pars posterior tendens, sub eiusdem
ossis concavo desinit, ibiq[ue] cum communi iphe-
noedis ossis sutura committitur. Altera parim
recte, partim oblique sursum ad oculorum sedes
procedens, per medium illorum ambitum
inferiorem fertur. Mox ibi partitio funditur.
Alter enim pars, magnum prope angulum, ex-
teriore in parte ad medium superciliorum pro-
cedit. Quę deinceps huic succedit, per concavum
sub eodem angulo ad communem capitis suture[m]
pertinet, eadēq[ue] angulum ipsum comprehen-
dit, & illi quoq[ue] naturalis foramentum subie-
ctum, quod omnium quę sunt in eo loco fora-
minum maximum est. Sub dictis duabus sutu-
ris, tertia pars antedictę scissurę, inferiorem in
sede oculi ambitum inscendens, interius ad imū
tendit, ibiq[ue] communi capitis future iungitur.
Quare terna maxillæ ossa ab vtriusq[ue] parte censetur.
Quorum habetur maximum, quod iuxta iu-
gale situm est. Deinceps situ & magnitudine os
illud in oculo ipso habetur, quod nervos ad su-
periore[m] maxillam cōnnet. Minimum omnium,
iuxta magnum oculi angulum est locatum. His
tribus ab vtroq[ue] latere os vnū insigni magni-
tudine subiacet: cuius os mali, dentiumque o-
mnium, exceptis inferioris, alveoli, partes sunt.
Hæc autem ossa discernuntur futuris quatuor.
Adiacent verō & his maximis ossibus duo alia
exigua, quę scilicet nasi foramenta ad palatum
tendunt.

DE OSSIBVS NASI. CAP. IIII.

Nasi quoq[ue] ossa duo sunt, quę futuris a medio
superciliorum descendens discernuntur. His
ossibus inferiore in parte cartilaginea tenuis-
sima corpuscula (alas vocant) ab vtroq[ue] latere adna-
suntur. Omnis in maxillæ superiore extre-
mo, os vnū, in quo deinceps, quę secant, radices &
alveoli continentur, id quod nonnulli simplex,
nonnulli compositum esse tradunt: quemadmo-

dum in superiori maxilla, alij quindecim, alij ran-
num ossa octo numerant.

DE DENTIBVS. CAP. V.

Dentes in osium numero habendi sunt, qui
sexdecim in vtriusq[ue] maxilla existunt. Eorum au-
tem priores quaterni, quod fecerit, vnde appella-
ti, mutantur radicibus singulis. Deinceps illi can-
ini latere vtriusq[ue], quibus singule quoq[ue] radi-
ces insunt. Ultra hos maxillares, quini ab vtroq[ue]
latere: sed qui maxillę superiori insiguntur, ter-
nii: qui inferiori, binis radicibus maiori ex par-
te adiacescunt. Nonnulli autem non vtriusq[ue]
quini maxillares, sed quaterni senive ornantur.
Eos non maxillares modō, sed molares enī ap-
pellant, quod us tibi atterantur. Canini nomē
induntur est, quod canum dentibus quamvis mi-
ni existant. Omnes in suorum ossium concavis
insiguntur. Ex ossibus dentes tantummodo mol-
lium cerebri nervorum participes sunt, ob idq[ue]
evidentem sentiendi vim possident.

DE OSSIBVS MAXILLAS INTERIO- RIS. CAP. VI.

Ossa maxillę inferioris, quod elixum in sum-
ma menti extremitate laxatur, pars quę quasi
capitata est, duobus seu cornibus terminatur:
quorum alterum in mucronem desinens, ten-
dinem ei temporis musculo descendente[m] re-
cipit. Alterum capitis ossi sub eo exortu, quem
maxillarem vocant, annexitur: ibiq[ue] in paruu-
lum sinum rotundo quodam quasi tuberculo
sele insertit.

DE SPINA. CAP. VII.

Spina ex vertebrib[us] quatuor & viginis constat:
quę si plures paucioresve sint, præter naturam
sunt. Harum contextus omnis in ceruicem, dor-
sum, lumbos, & os sacrum diuiditur. Ceruix ca-
pitæ annexitur. Huic dein dorsum, cui par inest
quę & pectoris longitudo: quod sub est reliquij,
lumbi appellantur: cuius pars vltima sacrolatē-
ve osse finitur. Septem in collo vertebry, duode-
cim ad costas, ad lumbos quinq[ue].

DE VERTEBRIS COLLI. CAP. VIII.

Ex vertebrib[us] colli, primę quidem dux inter se
vndiq[ue] colligantur. Reliquarij verō quinq[ue] an-
terior pars coalescit nexu cōstricta firmissimo,
idq[ue] intervntu eius membrinę, quę geminas
spinales medullas tunicas ambit: qua ratione
vertebrę omnes se habent, duabus primis ex-
ceptis, quę vt capitis obsecudent mononi-
bus, paulo laxius cohererent. Prima vertebra la-
tissima & tenuissima est. Secunda angustior, va-
lidiorq[ue]: ac reliquę deinceps eodem modo se ha-
bent. Quō etiam spinę medulla in gignendis ner-
uis consumitur, attenuatq[ue] magis, ed inferiorum
vertebrarum minuantur foramina. Quum
autem capitis duplex sit motus, atq[ue] alter an-
nuendo, abnuendoque fiat, alter in latera: illum
quidem vertebra secunda: processus processum possei-
mum præstat, hunc verō ipsius summę verte-
brę, & capitis transverse partes efficiunt. Poste-
riorem processum, quem spinam vocat, omnes
habent vertebry, prima excepta, quę duntaxat
in parte anteriori exiguum quēdam processum
exigit. In ceteris cervice vertebrib[us], transversij pro-
cessus semper sunt perforati, septima eadēq[ue]

Dentes in vera
que maxilla su-
perioris.
Inferioris dentes.
Canini dentes.
Maxillam deu-
cem.

Dentes tertiū
recipere molles
nervi a cere-
bro.

Maxilla inferi-
oris osium ei
federata.

Spina cōstru-
ta ex vertebrib[us].

Colli vertebra
rem distrahita.

Vertebrarum
foramina an-
gustiori paulo-
rum.
Capiti duplex
motus.

Vertebrarum
processum.

Maxilla superi-
oris futura.

Maxille ossa
terna.

Nasi osium co-
stitutum.

ultima excepta, cui interdum etiam, sed raro, alia teribus foramina insunt. Hos ipsos processus fo-
le ceruicis vertebræ leniter quasi bipartitos ge-
runt, præter duas primas, in quibus simplices
planè habentur: in sexta verò duplices manifestè
apparent, & cæterorum omnium maximi: sicut
& ca ipsa maxima est: quorum internus, latus
admodum est. Pars cuiuslibet vertebræ anterior,
qua inter se coalescunt, earum possimum quæ
in ceruice sunt, prima excepta, oblonga est. Ner-
uus autem ab spinæ medulla orientibus, ac iux-
ta vertebrarum compages prodeuntibus, v-
traque vertebræ parem primæ quasi operam con-
ferunt. In cæteris superioribus aut magna ex parte, aut
omnino id præstat.

DE VERTEBRIS DORSÆ. CAP. IX.

Thoracis vertebræ, quæ maiori ex parte sunt
duodecim, omnes ad decimam vique processus
habent per magnos: tum eos qui sursum, deor-
sumque versum spectant, tum etiam transversos,
quibus costæ annectuntur.

DE LUMBORVM VERTEBRIS.

CAP. X.

Lumborum vertebræ quinq; & omnium tras-
sissimæ sunt: quibus sanè per angustum inest fo-
ramen, tenuisq; medulla. Earum autem proces-
sus spectat sursum: atque ab ea tantum vertebræ,
quæ præposita est, semper nervus erumpit. Ha-
bent singulæ lumborum vertebræ interiore in
parte foramina nullo disposita ordine, in quæ se
inserunt vena: & satis manifestæ & conspicuæ,
cum in cæteris vertebris, vel nullæ viquam, vel
per exigua spectentur.

DE SACRO OSSE. CAP. XI.

Id os vertebris, quæ parte cum superioribus alligatur,
proportionè respondet. Ipsius autè trans-
versi processus grandes patentissq; sunt, quibus
in exteriori parte sinus inest quidam leniter ca-
vus, in eiq; illius ossa ingrediuntur. Id ipsum
os ex tribus particulis constat, harumq; in extre-
mitatibus os aliud quartum, quod coccyx nomina-
tur, additum est. Nervus autem, qui à spinæ medul-
la per sacri ossis foramina prodeunt, iuxta sua-
rum veluti vertebrarum compages, sicuti per spi-
nam totam, profiliunt: non tamen ab utroque la-
tere, sed intrinsecus quidem, atque extrinsecus:
hiq; omnes tria constituunt pars.

DE COCCYGE. CAP. XII.

At coccyx ipsum ex tribus particulis constat,
quæ plus cartilaginis, quam larum os, habent. Iuxta
earum compages nervi posteriore ex parte
prodeunt. Gemini priores ex ea oriuntur par-
te, quæ coccyx latè os attingit. Insequens par in-
de ortum habet, ubi prima alius ossis pars cum
secunda committitur. Duo alij inde egrediuntur,
quæ secunda eiusdem pars, cum tertia con-
iungitur. Iuxta tertie huius extremitatem, quod
reliquum est ex spinæ medulla, simplex nullique
affocatum profluit.

DE THORACIS OSSIBVS. CAP. XIII.

Os pectoris, costæ, itemq; ex spina dorsi verte-
bræ, thoracis sunt ossa. Costæ ab utraque parte
duo decim, singulæ cum singulis vertebris con-
nectuntur. Ossa pectoris per synarthrosin invicem
alligantur. Sunt autem numero septè, sicuti

veræ costæ, quæ cum eo alligantur. Nam quinq; inferiores costæ, quæ northæ dicuntur, in cartilaginem parum firmam degenerant, & cum diaphragmate, non cum pectore conglutinantur. Imò pectoris ossi cartilago triangula adnascitur, quam ensiformem appellant. Costis omnibus nō par longitudo est, sed supernæ inferarq; mediæ breviores sunt.

DE SCAPVLIS. CAP. XIII.

Scapulæ post thoracem sunt fixæ, gibbæ quidem
exteriore ex parte, intrinsecus autem sinuæ: ad hæc in ima basi tenues, oblongæq; in summa
verò crassæ, paruxq; exsunt. Os scapulæ maiori ex parte cartilagine, sed in imo vberius, contegitur, à spinæque tenue inchoatur, & paulatim plenus efficitur, donec ad acromion locum pervenit, ubi iugulo annectitur. Hanc enim compactionem, nonnulli acromion appellant. In ea parte, scapularum ossis processus quidam subest, quem scapulæ ceruicem nominant: cuique in acetabulum desinens, cum humeri capite colligatur.

DE IVGVLIS. CAP. XV.

Ivgula, hoc est, clauca, ab utroque latere summae pectoralis ossis extremitatibus annectuntur: eiq; fistulosa sunt, figuræq; & crassitie inæquabili. Pars namque eorum inferior, quæ pectoris ossi alligatur, crassior cæteris, rotundiorq; est. Huic succedens, longè gracilior. Quod reliquum est, totum rotundum, inæquabileq; quoad cum scapularum osse committitur, ubi quasi latiusculum est. Mediæ iuguli rotius partes exterioris gibbæ sunt, præsertim quæ ad scapulas tendunt.

DE HUMERO. CAP. XVI.

Maximum omnium os humeri (sæmone excepto) est, idq; vtrinque supra infraq; alligatur. Summa eius pars grandiusculum habet caput, parux quidem ceruicis coagmentatum, adnatumq; in eo iuxta anteriorem partem sinus quidam est, cuius alicuius patulæ fissuræ similis, qui totum ipsum caput in duo quasi tubercula bifariam dividit. Pars autem inferior, in tubercula desinit inæqualia: quorum ei quod extrinsecus situm est, capitulum radè annectitur. Cum eo verò quod est in interiori parte, nullum os proprius committitur. In ima humeri parte sinus per similes est concavus trochlearum orbitis. Cubitus hunc circum mouetur. Vbi autem sinus hic desinit in extremis vtrinque lateribus, duo præterea sunt sinus, quorum anterior posterior est minor. Ij coronas cubiti, hoc est, acutos processus excipiunt: horumq; anteriorem, quem cubitus omnino silectur, anterior sinus: quem tenditur, posterior posteriorem recipit. Cæteræ humeri partes gibbæ quidem anteriore atq; exteriori in parte: in posteriore, atque interiore, sinuæ sunt.

DE CUBITO. CAP. XVII.

Pars omnis quæ inter humerum & carpum firmiter est, eiusdemque etiam partis os grandius, cubitus appellatur. Is alteri subest ossi, quod radius nominant. Huiusque pars extrema superior leniter caua, exterioris humeri tuberculum recipit, eiq; alligatur. Cuius quidem connexionis est

Dorsi vertebrarum consideratio.

Lumborum vertebrarum consideratio.

Sacri ossis consideratio.

Os sacri ex tribus costis par tibus.

Coccyx ossis consideratio.

Thoracis ossis consideratio. Costæ vtrinque duodecim. Pectoris ossa septem.

Costa vna simplex, munda quinque.

Cartilago ensiformis.

Scapularum consideratio.

Acromion.

Scapularum consideratio.

Humeri consideratio.

Cubiti consideratio. Cubitus radius subest.

Cubiti processus duo.

Cubiti processus
sui duo.

est manus, modò in pronũ, modò in supinum, totam manum adducere. Cubitus duos habet processus: quorum anterior maior est, alter verò grandior: ab iisq; cubiti ipsius sinus signatè terzè similis comprehenditur. In hunc sinum, lumeri orbita inseritur. Huius autem nexus, tendendi, curuandiq; totam manum officii est. Radius supra infrag; validis ligamentis cubito illigatur: media inter se omniu delinquit. Vterq; adnatus appendice iuxta carpi habet partes: sed extrinsecus gibbam, intrinsecus autem cauam: cubitus quidem iuxta minimum digitum, radius verò iuxta maximũ. In sinũ eiusmodi sese carpus insinuat, annectendiq;. Inest autem cubito ex ab vduantia quadam, processus quem columnarem appellant, isque brachiali etiam nectitur. Ad hunc quidem nexum pertinet carpus in obliquum ducere: ad alterũ verò, in rectum, cuius opera summam manum extendimus, inflectimũs.

Columnaris processus.

DE CARPO. CAP. XVII.

Carpi confideratio.
Carpus consistit ex ossibus octo.

PRIMA pars palmæ carpos dicitur, ex ossibus octo, duplici distinctis ordine, constans. Dura omnia, & parula, nec medullosa, multipliciq; figuræ sunt. Cuncta neruis cartilagineisq; nexibus inter se per synarthrosin constructa, non cognata cernuntur: exteriore quidẽ in superficie, leniter gibba, sinuata intrinsecus. Pars carpi superior ex tribus ossibus constat, quæ in rotundam quasi formam constructa, cum cubito, radiisq;, & columnari processu annectuntur: hoc ramen excepto, quod carpi os, quod minimum digitum respicit, exiguò leniq; sinu, columnarẽ cubiti processum admittit. Ex his autem mediũ, ibi ponsimũ sedem habet, vbi cubitus radiisq; inter se copulantur. Tertium, quod bipartitum est, à radio comprehenditur. Pars carpi inferior, quatuor ipsius ossibus metacarpio alligatur. At quintum, iis carpi partibus insidet, quæ iuxta cubiti processum columnarem sinu sita.

DE METACARPIO. CAP. XIX.

Metacarpũ confideratio.

INTER digitos & carpus ossa quæ palmam explent, metacarpium appellant: id quod per synarthrosin carpo, digitorum autem priori phalangi per diarthrosin alligatur. Pollicis tantummodo prius internodium, ex transverso ipsi metacarpio est annexi. Singuli autem digiti ex tribus ossibus constant, priori semper internodio in subsequenti sinu subeunte. Iurque dicendum est, pollicem ipsum ex triplici osse constructum esse: ac primum ipsius internodium, cum metacarpio minime connumerandum. Vnde restet dixerit quippiam, ex quatuor duntaxat metacarpium, ipsos alitem digitos ex quindecim ossibus constituturum esse.

Digitorum singulas ex ossibus tribus consistere.

Metacarpium consistit ex quatuor ossibus.

DE OSSIBVS QVAS CVM SACRO esse conueniunt. Cap. XX.

RECTUS ab vtroq; latere magnisq; lati ossis processibus, duo quædam ossa appolita adstrictaq; sunt: quibus interjunctis nullum nomen est inditum. Nam sacra ipsorum superne partes, ilium ossa: exteriore post femoris ingressum, inferiorisq; coxendicum: quæ inde in anteriora protensa, tenuisq; & forata, arque inter se in extremo cognata sunt, pectinis ossa appellantur. V-

trique coxendici prægrande acerbulum inest, cum femoris capite nexu validissimò copulatum, cognatimq;.

DE FEMORE. CAP. XXI.

OS femoris magnitudine cunctis animantis ossibus præstat: id suprà, coxendici: infrà, fibiæ alligatur. Superiori in parte rotundissimum caput habet, proluxa quidem ceruici ad interiora inclinare adnatum. Infrà seuerè patens, in duo tubercula desinit, adeoquidem grandia, vt capita appellari possent: quæ sanè tibiæ annectuntur, non modò membranosis ligamentis, sed tribus quoque aliis validis, rotundisq; quorum vnum ab exteriori rotius connexionis parte, ab interiori alterum, à medio posterioris interiorisq; tertium porrigitur. Totius autẽ femoris forma, anterior in parte exteriorèq; gibba: in posteriori interiorèq; lina est. Sub huius ceruice sunt duo exigui processus (trochantæras vocant) quorum exteriorem, qui est maior, appellant natem.

Femoris confideratio.
Femoris os omnium aliorum maximum.

Trochantæra.

DE TIBIA. CAP. XXII.

TOTA pars cruris, quæ inter talum genūque posita est, nūquidẽ enam partis os grãdus tibiæ, appellantur. Hæc interiore in parte lita est, quæ tantummodo femuri ipsi annectitur. Os autem quod extrinsecus locatum est, sura nominatur: quæ crassitudine tibiæ admodum cedit, nec adeo protenditur, vt genu ipsi contingat, verum suprà infrag; tibiæ per synarthrosin alligatur: media inter se penitus delinquit. Tibia, quæ femori copulatur, magna quidem adnata, coagmentatq; appendice, duplicem in se sinum habente, capita femoris fere insinuanda recipit. Tibiæ quicquid anteriori in parte tenuis & carnis est experta, Crea dicitur: imz ab vtroque latere tibiæ, suræ partes, malleoli nuncupantur. Hallucinantur autem qui eos talos appellant: nam sub his vteriq; talus consistit, ac vn dequaq; contegitur, vt ne cum tangere quidem possint. Malleoli verò extremitatib; suræq; processuum partes sunt: gibbæ quidem exteriori ex parte, intusq; caue.

Tibiæ confideratio.

Sura.

Crea.

Malleoli non recti vocantur talo.

DE PATELLA. CAP. XXIII.

QVA si mus tibiæ annectitur, os extrinsecus cartilagosum, rotundumq; appositum est: quod gibba subiectorum ossium apud sinibus comprehenditur: paulimq; intumescens, quod inter femur, nbiusq; spatium patet, complectitur. Id ipsum os patella & mola appellantur.

Patella confideratio.

Mola.

DE PEDIS OSSIBVS. CAP. XXIII.

ALIAS ab imis tibiæ suræq; processibus comprehenditur. Eius pars quam *stipes* vocant, sursum vergit. Posteriores leuigatæ omnes, modicèq; orbiculatæ sunt, & ad superiora potius spectant: anteriores rotundæquidẽ capite oblongæ ceruici adnato, cum osse connectuntur, quod scaphoides dicitur. A dextro & sinistro latere, in duo extrantia superla id desinens, sub tibiæ suræq; crui excipiuntur. Ipsius quoque pars interna lamorem fere habet. Huius subest os pedis maximum, quod calcem vocant: idque ipsum & rotundas partes ex talo recipit, & geminos quos liabet excelsus, in sinu eius percommode inserit. Pars verò quæ ingreditur, leni-

Pedis osiam confideratio.

Scaphoides os.

Calc.

ter rotunda & lanuscula est. Posterior quoq; rotunda est, cuiq; tibiae rectitudinem excedit admodum. Ex partibus eius anterioribus, quæ e regione magni digiti sita est, ipsius tali capiti subiaceret, nec cum altero copulatur osse. At eius extremitas quæ minimo responderet digito, cum cyboeide osse per synarthrosin nectitur. Cyboeides autem a parte exteriori iuxta scaphoeides positum est. Verum hoc, quia cum talo iungitur, sinuatum, cyboeides vero gibbum existit. Tria deinceps ossa paruula inferiori scaphoeidis parti per synarthrosin copulantur: cum quibus etiam exteriori ex parte cyboeides panter porrigitur.

Cyboeides os.
scaphoeides.

Post hæc quatuor ossa, prima pars pedis quam tarsion vocant, finitur.

Tarsus.


DE PLANTAE OSSIBVS.


CAP. XXV.

Planta inde inchoatur, quæ ex quinque ossibus constructa est. Post hæc deinceps pedis digiti siti sunt, qui ex ternis internodis omnes constant, pollice excepto, qui ex duplici tantum constat. Horum dearticulationes membranosis: quæ verò in talo calcæq; habentur, validioribus ligamentis coarctantur. Satis autem sint hæc tyronibus, prima de ossibus rudimèta addiscentibus.

Planta pedis ex
quinque ossibus
constat.

LIBRI DE OSSIBVS FINIS.





GALENI PERGAMENI
de dissectione venarum & arteriarum, liber vnus.

Cava vena considerata.



Cor omnium arteriarum origo.

Aorta considerata.

Mesentericarum venarum consideratio.

Pancreas, Pylorus.

Vx in ventrem intestinūq; deferuntur venæ, veluti radices arboris sunt. Ea verò quam cauam appellant, quidam ceu truncus existit, omnium quæ toto corpore sparguntur venarum. Eadem ratione arteriæ, quarum origo omnium est cor, quæ quidem pulmones petunt, imaginem radicū ostendunt. Quam autem Aristoteles aortam nominauit, ea caudicis in arbore proportionem subit. Igitur ab ea vena, quam iuxta caua iecoris, portas appellant, ceu ab vno principio prodentes, septem venæ in regionem ventris descendunt. Quarum prima, brevis quidem illa, atque interdum sola, interdum aliis associata minutulis, ad dodecadactylum intestinum descendit, carne quadam glandulosa, quam pancreon dicunt, fusculata. Secunda autem, exigua etiam, ad pylorū, imam ventris partem, allurgit, atque in eam regionem ventriculi, quæ circa & ante pylorū est, disseminatur: idq; præter alios duos insignes ramos, qui à portæ vena ori, in ventriculū & lienem se expandunt. Tertia similiter, ex magna vena

enascitur, quæ versus sinistram descendens, extremum magnorum intestinorū mesenterium, ad sedem vique complectitur. Quarta post hanc vena, à dextris partibus ex eadem magna vena, versus pylorū descendens, ad gibba ventriculi effertur. Quinta deinceps, ex eadem magna nascitur vena, in ipsius latere dextro, quæ coli mesenterium, numerosiori propagine venarum invadit. Sexta similiter orta, ad spatium pervenit, quod inter duo iam dicta mesenteria iacet. Id enim plurimas venas habet, & in ieiunū primum, deinde in omne deinceps tenue intestinum fissura multiplici diuiditur. Postrema vero eius venæ pars, tum cæcum intestinum complectitur, tum quandam exiguam coli partem, qua ipsum cæco annectitur. Ad hunc sanè modum venæ illius quæ à portis prodit, in intestina, splenē, & ventriculū, digestio perficit. Quin etiam omnes omēto intertexæ venæ, ab iisdem ipsis venis propagantur. Igitur per omnes iam dictas venas, cibis ad hepatis portas suggerit. Hinc vero per venas ad ipsius fibras pertinentes, in totū iecur permanat. Inde rursū in alias assumitur venas, per gibbā quidē partē dispersas, ceterū à maxima alia vena ortas, quā ob id causā nominat. Ab ea etiam aliq; propagant, quæ in omnes corporis partes sanguinē riuat. A iecore em vtrinq;

Omnes venæ à mesenterio oriuntur. Distributionis alimentis consideratio.

Cava vena dissecta.

prolapsa, sursum quidem per septum transversum, ad cor attollitur: deorsum vero in spinam dorsii contorquetur, atque inibi super magnam deferitur arteriam. Iam vero ab ea que sursum tendit, oriuntur primò quidem coniugatio ad septum transversum: deinde capillorum modo tenuis permixta, in membranas interceptas thoracem, mox in pericardium tunica. Post illas alia magnitudine insignis, in dextram cordis aurem fertur, atque inde ad dextrum ventriculum. Ab hoc alia duplici, ut arteriæ, tunica laevis, in pulmones progreditur. Quin etiam alia quædam exigua per exteriorem cordis superficiem, in totum visceris corpus spargitur. Quæ autem cor ipsum præterit vena caua, iam iam festinans ad iugulum, obiter quoddam sui germen diffundit in omnes thoracis partes, præter primam duo, intermedium vero etiam tria, costarum intervalla. Deinde alias quasdam prætenues venulas, ad membranas mittere thoracem intersepiantes, necnon ad thymum vocatum, quum vero prope iugulum pervenit, in duas dividitur partes: atque ita oblique in latera utraque pars inclinatur, à media paululò regione divergit. De quibus, dum ad subvicinam utraq; ascendunt claviculæ, in media latione, quæ ad thoracis anteriorem perveniunt, radices sparguntur. Præter has, magnarum venarum multiplica se fissura scindendum coniugatio, intercostalia superioris loci racis aliter sparsa, & quæ circa scapulas sunt loca, tum nonnullas etiam ex interioribus colli musculis. Ab his ipsis venis etiam illic nascuntur, quæ ubi ad fixam colli vertebam pervenerint, in ipsa se foramenta insinuantes, ad caput usque efferuntur. Quicquid autem ex eis superest, ad axillas pergitur: ac deinde fissura multiplica, per manum excurrit totam intumescens magni musculi partibus, in ipso brachio exporrecta. Ex eius autem propaginibus una, per interna hæc quoque percurrentes, circa brachium in orbem complantur, posterioremque ipsius regionem ita perrepat. Mox in exteriorem partem, tandemque anteriorem, subit ad cutem, atque illinc deorsum tendit, donec ad brachii cõmissuram perveniat. Postrema vero eius pars, aliquando exteriorem brachii nodum excedit paululum: nonnunquam multò ulterius progreditur, sub cute secusculum os cubiti deorsum tendens. At omne quod de magna vena reliquum est, ad medium pervenit cubiti articulum, visum cum viciniori nervo ramos expandens ad intimas musculorum eius loci partes, usque ad interius brachii caput, nihilò minus per profundum ad posteriores, anterioreque musculos. Sedenim præsequitur in cubiti flexum ingreditur, in venas scinditur complures, & quibus multæ in superficie extant: omnium maxima profundius demergitur. Atque magna ex parte una quidem vena, à magna propagatur, ad interiora magis oblique declinat: ac subinde altera ex inferioribus cubiti partibus, multiplica sparsa foliole, ad carpi pervenit: ac tertia deinceps, circa medium maximè cubiti. Cæterum earum fines iuxta carpum ascendent. Elanissimus aurem simul & maximus ramus, qui ab ea vena de qua modo institutus est sermo, propagatur, in medium

pervenit flexum, quæ cubitis cum brachio coit: quod etià oblique confuit alterius venæ, quæ per brachii anteriorem sub cute sita est, non exigua portio. Dux enim lætotus sunt manus venæ: tum ea quæ per axillam in manum fertur, tum ea quæ per claviculam, quam humerariam appellant. Verum non semper deinde harum venarum posterius, sic ut nec par crassitudo est. At secundum naturam maximè est, ut utriusque venæ pars in interioriorem cubiti flexum quadantenus deferatur: quæ partes posteaquam coierint, venam producunt, quæ omnium in cubito extantiam fertur amplissima. Secundum hanc præcipua magnitudine humeraria est. Ea hinc profecta, quæ cubitis cum brachio coarctatur, perque radii portectâ, ad extremi cubiti tuberculum, quod carpo adliæret, pervenit: atque inde mox infimæ, eidemque extremitati ipsius parti distribuitur. At illa, quam ex confusum duarum venarum omnium in superficie extantium maximam fieri dixi, ab interioribus cubiti partibus incipiens, primum descendit radii: deinde in extremam evadit partem, ubi in ramos fossa duos, altero ad radii extremum procedit, altero ad summum pernitit cubitum, quæ & ipse colliæret carpo: atque inibi venam contingit, quam ab humeraria propagari renissimus. Iam vero, quemadmodum quæ in interiori cubiti parte sunt venæ, scilicet iuxta carpum in multas exiles venas, & inter se commixtas scinduntur, sic etiam, multo plus magis venæ quæ per exteriorem cubiti partem feruntur. Porro quæ alius per cubitum manumque extremam venæ immerguntur, à duabus magnis oriuntur, hoc modo. Quæ parte ab utraque magna propagari quasdam ostendimus, quæ ad flexum brachii tenderent, duo rami, ab utraque singuli, in profundum procurrunt, ibique similiter mutuo complexu iunguntur. Ex quibus rursum alix duæ insignes venæ exoriuntur, quæ tandem suis germinibus multos ramos manibus penetrant. Quæ autem ad interioriorem thoracis regionem feruntur venæ, ad hunc constant modum. E medio duarum venarum in quæ causam memoravimus findi, vena oritur, quæ ad dextram osui pectoris tendit: ab sinistra autem cauz parte, altera. Hæc igitur per totum feruntur thoracem, osui pectoris subditæ, usque ad radicem cartilaginis ensiformis: & ad singula obiter intervalla costarum, ramulum ex se mittunt, quo coniunguntur extremis eius venæ, quæ spatia intercostalia perrepat. Harum venarum portio extra thoracem emergit, ad subscapulas illic rescindendos musculos. Quæ vero ad mucronatam cartilaginem pertinent, tum in mammis affurgentes, tum in reliquis pectus dispensare, deorsum procedunt, rectis subnixæ musculis, in quos partem aliquam mittunt. Quæ porro claviculæ adiacent cauz venæ partibus, in quas secari ipsam diximus, subiecta est venæ radix maxima, utrinque una. Quæ quidem confestim affurgens, bipartito scinditur, duas ædens magnas venas: quarum altera per anteriorem, avertitque colli partem, ad interiora magis recedens efferitur: altera in partem anteriorem deorsum quadantenus subsides, mox sursum sublata, claviculæ ipsam ample-

Arteria ve-
na.
Cervicalis ve-
na.

Thymus.
Cervicalis ve-
na.

Axillaris ve-
na.
Humeraria ve-
na.

Modo vena
considerata

Venerit alia
perceptantiam
cubiti an-
sideratio.

Venerit per
dentia mero-
ra thoracis, si-
sideratio.

Cubiti vena-
rum considera-
tio.

amplectitur, ad modum commemoratam venam
contendens extrinsecus. Et confluentibus, seseq;
cōmiserantibus, gignitur in summo eminentē iugu-
lari vtriq; vna. At non eodem semper aut mo-
do aut loco nascuntur. Duo autem hic humilimo
di venarum solum esse coniugia: obliquum alte-
rum, cōfuentium ipsarum, & sese invicem con-
tingentium in cavo iuguli: alterum autem mini-
mū cōfuentium. Declinant enim quasi in extimā
colli partem obliquæ. Tres autem conspicuæ ve-
næ oriuntur ab ea quæ circa claviculā cōiorque-
tur. Vna quidem quæ humeraria dicitur (quod ob-
liquè descebat ad humerum) & sæpe eadem visu
crassitudine, cum vena ad collum subeunte.

*Humeraria ve-
na.*

*Axillaris vena
humeraria est
maior.*

*Lingua vnde
vena accipiat.*

*Cava vena li-
berum, est origo
venarum quæ
ad inferna de-
scendunt.*

*Emulgenti ve-
na amplissima.*

*Seminaria ve-
narum vtriq;.*

*Typici fami-
liarum quatuor.*

ear venar, de singulis vertebra ad illa venæ mit-
tuntur, quarum postrema ad musculos qui ab-
domini præterenti sunt, attolluntur. Qui autem vi-
pra hos muscoli extra thoracem iacent, alimen-
tum accipiunt à vasibus circa claviculas exilioribus:
tum etiam ab iis quæ per pectoris os ad mam-
mas tendunt, sicut etiam ab iis quæ sunt in spa-
tiis intercostalibus. Quinetiam per singula so-
ramenta spinæ, singulæ venæ in medullâ ipsam à
cava lumbos pectore præter inferuntur. Porro in vi-
timis lumborum vertebra non amplius videre
est arteriam venæ subiectam, sed elatior quidem
arteria supra venam ceu provelitur, vena autē
per ipsas vertebra, Hæc igitur parte & sese con-
tingit vtriq; vas, & in duo membra diuiscatur,
instar lueræ a. Vtriq; autem coherentiū va-
sorum pars ad sibi subiectum crus obliquor de-
scendit: prius tamē ipsorum vasorum quibusdā
ramulis, ad alendas lumborum carnes, atq; in-
terdum etiam ad eam peritonæi partem, quæ ad
lumbos spectat, revulsis. Vtriq; autem venarū
coniugationis extrema, ad exteriore latius
partes se promittit, inq; musculos eam regionem
constituentes, distribuuntur. Deinde ad vteri
partes inferiores, alix venæ feruntur, quæ in cer-
uicem ipsam diffeminantur, & quadam sui parte
amplexantur testiculos, altera vñq; ad vteri fun-
dum pertinent: indeq; alix sub cute vesicant: alię
per pubis os ad exteriora cum eius nervo exten-
duntur, atq; per inferiores illius regionis muscu-
los diffeminantur: alix per rectos ascendunt mus-
culos, extremisq; coniunguntur venarum, quæ
per thoracem ad subcartilaginea descendunt. Ab
eadem radice venulæ vtriq; singulæ in vte-
rum perforantur, per quas mammae cum vtero
maxima necessitudine existit. Insuper aliud extra
musculos est coniugium earum, quæ ad vtriq;q;
scelus pudenda pertinent. Ab his autem statim
alia est vena vtriq;que, quæ ad internos formos
musculos tendit. Post hæc verò alix ab inguin-
ibus ortæ, videntur per illam regionem ascende-
re. Aliæ etiam obscuræ, à mammarum venis de-
ductæ, hæc quas nuper dixi, sinibus suis contin-
gunt. Iuxta magna vena in crus diuiditur, pri-
mam iuxta inguina emittens propagandam, quæ
cum parua arteria in musculos anteriores spar-
gitur: secundam vtriq; venam, quæ ex internis
partibus ad genu vñq; subter cutem diffeminat-
ur, ac alias non paucas ad profundiores formo-
rum partes. Cæterum paulo altius quàm femur
cum tibia articulo iungitur, in tres partes diuidit-
ur: quarum media, quæ maxima est, per ipsum
deorsum ad popliteum fertur, atq; inde per pro-
fundum iuxta præcedens, non modicam in mu-
sculos eius sobolem ramorum spargit. Altera
autem parte quæ in superficie eminet, per exte-
riorem partem alterius tibiae ossis porrecta, ad
pedis pertingit articulum. Tertia verò quæ iute-
rior est, ad anteriorem tibiae partem procedit, ac
inde ad malleolum pervenit, ad ipsum tibiae ex-
tremum, vñ sanguinē mittit, quam cum modifi-
ma. Enim verò maxima quæ per profundum
musculus distribuatur, duo cum arteria, extrema
sunt, quorum alterū quidem maius, à tibia fer-
tur ad interiora: alterum verò, per mediā duorū

*Abdomini ve-
na.*

*Thoracis mu-
sculis externis à
quibus vena
ascendit.*

Vteri vena.

*Procedendum
vena.*

Cruris vena.

tibz ossium regionem, ad interiora pedis perducitur, ac propagini alterius venæ immiscetur, quæ ab exterioribus tibz partibus per fibulâ dix descendere. Itrafit vt sint venæ quatuor, quæ ad pedes descendunt: vna quidæ omnî extrema, per gibbosum fibulæ extremum: altera per partes ipsius interiores: tertia per anteriorem tibz extremi regionem: & quarta, quæ ex interioribus partibus exuberâtes tibi processus com plexa est. Hoc igitur tibi dissectionis venarum 10 principium esto. Deinceps de arteriis dicendum. Harû origo est finisler cordis ventriculus. Hinc autem in pulmones, grana trahendi spiritus, de sinuatur radicis infat, vna tenuis simpliciq tunica constans: rum altera etiam hac multo crassior, quæ veluti truncus omnium arteriarum existit. Habet præterea cordis ipsius corpus circumfusa in ambitum arterias duas: alteram quidæ maiorem, quæ maximam ipsius partem implectitur, alteram ea maxime regione distributam, 10 vbi tertium ventriculum esse existimauit Aristoteles, quum tamen nunquam is reperiatur. Has igitur arterias, simulque maxima de corde se promiserit, ab ea produci videas, ipsamq mox in membra haudquaquam paria ducti. Et horum quidem, quod minus est, sursum ferri, ipsamq cœstam in partes rursus inæquales findi, ac subinde ipsarû maiorem, ad iugulum tendentem obliquam, de sinistra ad dextram thoracis partem porrigi, alteramq oppositum habere firmum. At verò arteriæ pars maior, quæ ad iugulum tendit, vbi prope thymû pervenerit, primum quidem ad sinistram iugularem emittit ramum: post illam, alterum ad dexteriorem. Dein de quicquid ipsius restat, ad scapulam axillamq sinistram tendit. Quinetiam quædam ad pectoris os, alia ad primas thoracis costas, alia ad spinales mûculos, alia denique per foramina sex primarum colli vertebrarum deducta, vna cum vena, ad spinalis medullæ membranas, descen dat: alia ad summum humerum, scapulam, axillamq dextram extenditur. Quæ quidem, sicuti & alæ omnes, diuiduntur vna cum adiacen tibus venis: quemadmodum & quæ arteriæ ca rones appellantur: ex quibus vna cum iugula ris internis, ascendit quædam arteria. At quæ in superficie traxit iugulares, ex fine arteriis con spiciuntur. Ortae autem quod ex caronibus reliquum est, sursum rectâ procedens, in caluam penetrat, inibiq plexû reniformem producit: de 10 inde in duas rursus coeunt arterias, subit ad cerebrum. Porro arteriæ quæ a corde se promit, pars maior ad spinâ descendit, quinamq tho racis vertebram ascendit: & inde per totam spi nam, vsq ad latum os, descendit, primum propa ginem quandam tenuem emittens in eas tho racis partes, quibus pulmones adiacent. Extre ma autem ipsius ad arteriam vsq ascendunt: de inde per singulas vertebrae rami tum in spina intercostalia, tum ad spinalem medullam exo riuntur. Vbi aut egressa est magna arteria tho racem, primò duas in septum transversum arterias mittit: deinde in vtrém, lienem, ac iecur in iugum vnam. Interdum ex vna radice bifariâ di ducta, ventriculo quidem, & lieni, & hepatis al

tera pars: altera intestinis distribuitur per duo meienteria, tum id quod ad dextram situm ha bens, primum est colâ partium: rum id quod est omnium intestinorum medium. Nam tertium meienterium, quod prope sedem pertingit, in sinistra situm, nullam inde assumit arteriam: sed de imis partibus in ipsum quædam inferi tur, quæ propter renes à magna arteria iniungit & ipsa nascitur. Atqui inter hanc & modò com memoratas, duæ magnitudine præcipue ad re nes tendunt. Cum venis etiam quæ ad ista & tes tes feruntur, arteriæ etiam ad eundem procur runt modum. Cæterum arteriæ magnæ pars ex trema, quum ad latera lumborum pervenerit, supra positam venam transcendit. Quod postea quàm factum fuerit, haud alter quàm vena scis sa, bipartitò arteria partem vtriusque in tibi sub iectum crus mittit: à quarum vtriusque obiter singuli propagantur ramuli, qui conceptibus per vmbilicum inferuntur: in perfectis autem animantibus, ipsi ad os larum excurrunt. At ipsa cruris vtriusque arteria ad internas distribu ta partem fertur cum magna vena. Nam vs venis quæ in cruribus, manibus, abdomine, dor so, & collo per summam superficiem visuntur, ne vna quidem subest arteria. Sed enim arterias in solo capite iuxta cutem inuenies, tum eas quæ post aures, tum eas quæ ad vtriusque tempo ra exant. Porro in conceptibus venæ arteriæq intextuntur, ab extremis venarum osculis pro deuntes, quæ ad vterum pertinent. Quibus in ter se coeuntibus, concurrentibusq us, quæ ex costu sunt factæ, arteriis & venis, contingit ex ipsis fieri coniugium illud vtriusque valorum, quod inferunt in vmbilicum. Arteriæ siquidem vesicâ factus complexæ, ad arterias illas tendû, quæ à magna per spinam porrecta mittuntur. Venæ autem, simulque ex vmbilico se proe ceunt, coeuntes, vnam magnam perficiunt quæ ad concauum iecinis tendit, haud procul ab ea vena, quæ ad portas est. Hæc igitur vena siue arteria est, ac post illam tota caua, donec ad spinam pervenerit. Sic nec septi transversî ve na, nec illa quæ alit thoracem, nec linnetaria item, nec axillaris (præterquam vbi altius coar ctantur, vt in cubiti articulo) habet villam arte riam adunctam. Omnes siquidem quæ per cu biti superficiem expansæ sunt, carent arteris, sicuti & quæ tum iugulo, tum collo in superficie sparguntur. Omnibus denique superficialis, aut quæ per dorsum, latera, totum thoracem, in ferentemq ventrem sub summa cute expandun tur, nullam inuenias arteriam subditam. Quæ autem ab his quæ profundius absconduntur, or ram habent, si quidem ex sublimi deorsum tendant, adiacentem habent arteriam: si verò ex vno subeuntes, superne descendentibus venis iungantur, sine arteriis ad glandia quædam e vadunt. Sed ne illæ quidem venæ cum arteriis coeunt, quæ in exteriores pudendi mûculos in feruntur. Arteriæ autem sine venis ex sunt, quæ vesicam sacnæ amplexantur in vtero, propa gog ea, quæ à magna arteria procedens, in conceptum venam arteriosam se infinuat, non substantia modò corporis, sed vsu etiam & 10 functione

Meenterium
triplex.

Arteria lumbi
in crura diuisa
nascitur.

Vena quibus
nulla subest ar
teria.

Arteria super
ficialis vbi ex
nascitur.

Venarum arte
riasque in
conceptibus co
sideratis.

Vena ab ip
sâ arteria
qua sunt.

Vena adiacen
sâ arteria be
nefici.

Arteria absq
venis.

Primum vna
quatuor.

Arteriarum or
igo finisler cor
dis ventriculus.

Arteria vena
sa.

Arteria.

Tertium cordis
ventriculum
nisi reperiatur.
Arteria ma
gnâ dextera.

Carotides ar
teriae.

Plexus renifor
mî productus ab
arteria caroti
dibus sub calu
aria.

Initium arte
rium mitti sin
gulis vtriusq
vtriusq.

functione existens arteria. In perfectis autem animalibus, sine venis arterie videntur, primum magnæ illæ quæ ex corde prodeunt: vna quidē, quæ ad quintam vîp̃ thoracis vertebra descendit, altera, quæ prima omnium efferatur ad iugulū. Post hæc ea enī quæ ad scapulam & axillā finitiorē se inclinat. Iam arteria sine vena est, ex carotide propagata vna, quæ ad textum reniformem ascendit, quod etiā rete sine vena est. Tum verò, quæ ad septum transversum, earum nulla cum vena iungitur priusquam in extrema inciderint venarum, quæ a caua exoriantur, quemadmodum nec primæ illæ propagines: quæ ad iecur, & ventrem, & benem, & intestina mittuntur. Nam ne illis quidem adiacent venæ, priusquam incipiant coniungi.

GAL. DE NERVORVM DISSECTIO NE LIB. Vnus.



Videtur nulla particularum animabæ nec motum arbitrarium, nec sensum sine nervo obineat: quod si incidatur nervus, immobilis consistit, insensibilis redditur particulari, inter omnes constat medicos. Quod autem origo nervorum atque spinalis medullæ sit cerebrum, quodq; alij nervi ex cerebro, alij ex medulla spinali oriuntur, iam demonstrandum aggredior. Anteriores ventriculi cerebri in priorem procedentes partem, sensum leuiterque in angustum coarctantur, donec ad principium pertingant nasi, sese contingentes perpetuo, tenui tantum membrana distincti. Horum autem finium, ad partem vtranque, vnus dextra, & alter sinistra, nervus est crassitudine insigni, & aliorum ferè omnium nervorum mollissimus, ex ipso quidem procedens cerebro in oculo extracalum, per foramē quæ patens ac latum, quantæ est ipsius nervi crassitudo. Videtur porro nervus ipsi, seu quædam oculorum radices. Vterque siquidem in sibi adversum oculum sese quamlatissimè explicat, ipsūque qui in oculo est, vitæ lumen, in orbem, sphaeræ modo, ambit, ubi etiā naturam cerebri retinens. Sed in solis his nervis, antequam in oculo inserantur, sensibilibus quidam meatus inest. Ac prima quidem hæc coniugatio est nervorum qui a cerebro oriuntur, longè aliarum omnium mollissima. Altera post hæc est coniugatio in musculos qui oculos movent dextribus, durior multo & tenuior ea quam nuper memoravimus. Huic, dum per calum præcedit, non etiam quam primum nascitur, adiacet coniugatio nervorum tertia. Sunt autē mollores istæ, tum secundæ, tum quartæ, atque aliarum deinceps coniugationū nervis, multoq; circa primā statim radicē apparent. Paululo durior, nervorum ex cerebro prodeuntium quarta coniugatio, statim post exortum, cum tertia miscetur, ac pererrat primum quidem crassum involucrem cerebri, deinde etiam ipsius capiti obductum os: tum rursus ad palatum recedit. At tertia coniugatio vbi secundam attingit, variè scinditur, atque definit. Primum igitur singulæ ipsius partes, per commune cal-

uæ foramentum, ad inferiorem capitis partem descendunt. Intelligere autem conuenit, nullum nervum aut a cerebro, aut ab spinali medulla emitti non coniugatum: sed semper alterum ad dextram, ad sinistram alterum, eadem prorsus vtrinque magnitudine, situm obtinere. Igitur pars exigua tertiæ coniugationis statim quæ maxilla iungitur, ante aures erumpit. Quod autem veluti truncus est omnium indidem prodeuntium particularum, bipartito scinditur primum, deinde membrum vtriusque in multas rursus partes: & alterum quidem tum in temporum ac superioris maxillæ musculos dispensatur, tum in gingivas, dentes, & ruten, quæ faciei præterduntur: alterum verò in radices dentium inferiori mandibulæ, gingivæq; & labra inferiora, necnon lingæ tunicam dissimulat. Quamobrem coniugationem hanc nonnulli gustatoriam appellant. At quarta coniugatio nervorum, a tertia recedens, sese in palatum insinuat. Est & quinta coniugatio, cuius nervi non prodeunt ex vna radice, sed sibi invicem sunt vicini. Sub hac enim auditorius nervus, in priori magis parte ad auditorium meum descendit, vna cum dura membrana, quæ indidem, vnde nervus, emergit: cum qua in latitudinem sese effundens, meatus leuiter obducitur. Alter verò, ex parte adversa in alterum quoddam ossis petriiformis cæcum foramen inseritur. Coit autem mox nervus huc cum quo progreditur foras, quæ maxilla iungitur. Quod autem ex ipsis duobus constat, in latum musculum scinditur, qui subiectis ruti, buccam siue maxillas movet. Ad hunc itaque modum quinta digreditur coniugatio, quam duplicem esse constat. Sexta autem nervorum ex cerebro ortorum coniugatio, foramine vsa est, quod ad suturæ labdoædes extremitatem inferiorem interpatet. Principia autem statim è cerebro prodeuntium trium nervorum obtinet: quæ vbi è calua emerferint, multifariam cum inter se commiscuntur, tum etiam cum adiacentibus aliis. Superest septima nervorum cerebri coniugatio, cuius pars maxima in lingæ musculos dispensatur. Exigua verò quæpiam particula ad musculos provenit communes carnaginis in gutture fronsim, & inferiorum laterum eius, quæ appellatur labdoædes, atque in alios quosdam non semper. Commiscuntur autem inter sese nervi ad inferiorem capitis tendentes, tum is qui a tertia coniugatione, tum is qui a duabus novissimè memoratis oritur. Ac sanè nervorum qui a spinali medulla nascuntur: prima secundæque coniugatio sæpius foecierat in init cum huius nervis. Et ubi quidem persæpe videbitur, quod de altero in alteri traicit, seu vinculum aliquod duntaxat ambo esse commune: id verò alterum auget, alteri exiliorem reddit. Porro ignorarunt vniuersi anatomici, quomodo proprius laryngis musculus nervi è sexta coniugatione distribuantur, terti vtrinque prodeuntis, vt sex numero omnes sunt. Laryngis etenim musculi, ab illo nervo quædam accipiunt germina, qui per foramen ad extremam labdoædem futuram in retpatēs exoritur: qui si laqueo quidem intercipiatur.

Nervi omnes coniugati prodeunt.

Coniugatio nervorum quinta.

Levi maxillæ.

Coniugatio mollium nervorum sexta.

Coniugatio mollium nervorum septima.

Laryngis nervi omnes sex. Vnde etiam quæ nervi intercipi redduntur.

statim mutum animal redditur. Aliorum porro duorum, alter ad vtrosq; faucium musculos, linguarum radicem, pertinet. alter ad scapulas musculum, & ad eum qui latus est, alioq; quoddam illius loci musculos.

GALENI PERGAMENI
de anatomicis administrationibus,
Liber I.

Ossium substantia rjui.



Sinua cur sit quantitas hominis.

Forma corporis esse ossibus similes.

Anatomica methodus.

Vod pili in tenoriis præstant, & in ædiliis murt, id nimirum in animalibus ossium substantia: ad cuius imitationem cætera in animæ solent effingi, foemariq;. Idcirco & simia, inter vniuersa animantium genera, rum visceribus, tum musculis, tum artibus, & nervis (quandoquidem & ossium forma) homini similissima est. Quoniam igitur corporis forma ossibus similis est, quibus etiã natura aliarum partium respondet, opere precum fuerit in primis exactam humanorum ossium indispici periti: eamq; haud quidem ex libris trãrom, sed oculata inspectione venari: id quod licebit nbi, si assidua cadaveris contemplari accuratissimè, aut etiam earum simiarum ossa, quæ homini quam simillime existunt. Quoniam præstiterit in vtroq; animali, & in simia & in homine, cognitionem ossium investigare, post quæ mox ad concisionem musculorum est properandum. Deinde licebit quidvis discere primum, siue arterias, siue venas, siue nervos. Atq; in horum confectionibus versanti, viscerum & reliquorum omnium natura innosceat. Ac sanè positura ossium, seorsum nobis exposita est, si vñ & musculorum anatome. Quare si in illis commentarius te exerceas proutquam ad hos accingaris, haud invide fuerit. Quum autem per chirurgiam musculos ipsos propter abcessus aliores, incidere interdum cogamur, actionis ipsorum cognitio maxime ex viã est, vt tum perdiscere, tum prædicere possis, omnem abigendo calumniam, functionem in magnis vulneribus, vbi musculus totus transversim dissectus fuerit, abolituram. Taceo qui musculorum actiones norit, eum chirurgum alios quidem musculos cautè, alios autem incisionum audaciã. Præstat tamen pro fibrarum ductu, ipsorum divisionem moliri. Nam incisiones transversæ, quæ vniq; ad angulos rectos sunt, actionem dissolunt. Necessè autem est interim, partes quasdam vulneribus angustis altioribusq; confectiones, adhuc amplius dividere, alias ob alias vias: quo in opere, fibrarum positura, muscularumq; actionum intelligentia, omnium maxime desideratur. Hanc qui ambit, ne piget ipsum vel propriis manibus pellè auferre cadaveris. Nam octo statim musculos ignorauerunt, qui ante me simias alios excoriandas tradiderunt. Sunt verò horum octo musculorum, duo ad buccarum motum à natura formati: alij autem duo, brachia lateribus adducentes. Porro quatuor reliquos reperi, duos quidem sub illius glabris pelliculis, quæ vestiunt interna manuum: alios autem duos, sub illis quibus plantæ pedum teguntur. Ad hæc verò, quum simia cui

pili, quæ in aqua extinxeris, detraxissem olim extrinsecam cutem, inveni in illa etiam musculum tenuem & membranosum, costis omnibus incumbentem: qui habebat inferius principium, subter vniuersam illam cutem expansum. Vt igitur exordiamur à manibus, singulis in singulis digitis ad extremum vsq; extenditur musculus fibras quasdam exiguas, & telæ aranæ persimiles, in ossa post articulorum iunctiones sita, immittentes. Similiter se habent hæc & in summo pede. Primum itaq; totam cubiti atque digitorum cutem exteriorè detrahemus, ab ea solum quæ manum intus cooperit, abstinentes. Dein, quæ in carpi articulo sunt, studiosè adimere oportet, si forte quæpiam membrana ex detracta cute reliqua sit. Verum huiusmodi a vellendis, scalpellus acutior est commodus: quem admodum musculus invicem separandus, retineatur. Iam verò membranis ad præparanda, primòq; post ipsas, medij cubiti sub cute summa, musculo, videbis ligamenta cõpagibus articularum iuncta, posita in vtraq; membrante parte, foris & intrinsecus transversa: quibus capita tendinum subiaccet, interna parte digitos ipsos flectentia, externa tendentia. At ex vtraque ligamentorum, quæ dixi, parte interna quiddam duo sunt musculi flectentes carpi, quorum lucrecto tramite versus parvum digitum, alter versus indicem est porrectus. externa verò, vnus in cubito, qui carpum extendit, duo in radio, carpum vtrique mouentes. Alter ipsorum etiam magni digiti motor est, quem duos esse potius quàm vnum, existimandum. Cæterum omnium aliorum musculorum, de quibus verba fecimus, capita, ligamina habent transversim circumdata. Iam alius quidam musculus desuper toti radio incumbit, nequaquam in tendinè alius quos recèssus similem cessans, sed inferius ipsius extremum, quo ad interiora convertitur, paulo membranosiore atque carnosius obinet. Qui musculus quanquàm mediam videtur habere sedem, externis ponus cubiti partibus, quàm internis, ascribendus venit. Extrat sub cute in superficie internæ partis manus, medius inter radium & cubitum musculus, qui in latum tendinem desinens, depolit manus parti subnascentur, medijsq; interiorum musculorum apparat. Tendo autem etiam paulo ante carpi nodum manifestè emergit: quare hunc probè ipsius dissectionem inciperis: nempe scalpello obtusiori tendinis caput in sublimè eleuans, incidensq; ipsum sursum versus ad cubiti iunctionem, ex qua origine duxit. Vbi autem transversum ipsum incidens, partem inferiorem attolles, diuersèq; ipsam non modò à subiectis particulis, sed à cute etiam cui adhaerescit. Sic enim cognoscies, quòd ex tali musculo is tendo ortus sit, quòdq; internæ omnium digitorum parti tendatur. Post hunc tendinem dilatarum, vasa & nervi inibi distributi se ostendunt: quibus etiam membrana incumbunt, quæ cum ipsis tollendæ sunt. Nam sub sunt tendines qui digitos flectunt, à binis productis capitibus, illic maxime fini, vbi & ligamenti, & tendinis super illud dilatati caput, posuimus est. Horum autem subiectorum capitum, alterum quatuor producit tendines, digitis omnibus, præterquam

Musculus costis vniuersis incubens.

Musculus digitorum.

Difficilis ordo.

Ligamenta.

Tendines.

Musculi carpi flectentes.

Vela manus majorem.

Tendines manus in digitos.

Musculorum motus. Quoniam motus. Quoniam motus. Quoniam motus.

Musculi octo. Quoniam motus. Quoniam motus. Quoniam motus.

Tendinum musculorum.

Pollicis motus vnde.

Cubiti externorum musculorum dissectio.

terquam magno, iuxta secundi internodij principium insertos, à quibus secundas eorum articulus flectitur. Alterum quod huic subiacet tendinum caput in quinque discretum particulas, in extremam vique digitorum aciem pertingens, inibi inseritur. Tendines autem vniuersos valens aliquod munimentum, singulos priuatim ambit, multo suae ipsorum tendine durius, atque membranæ crassiori simile. Porro si post caput in ramos scissum, tendines singulos vnà cum prædicto involucre attrahis, flectis per eos, qui subiecti digitorum ossibus insident, primum ipsorum tertiumque articulum cernes: hunc quidem, tanquam inibi tendine inserto: illum autem, per circumiacens ligamentum, quod ossibus adhaerescit. At pollicis nihil neque ex sublimioribus illis tendinibus, neque ex communi eorum capite accedit, sed aliunde quidam tendo in tertium ipsius articulum exporrigitur, illūque similiter: illis mouet. Nam internodium secundum, per tunicam quæ ipsam tendinem ambit, mouetur. Ceterum aliorum duorum musculorum, qui carpum flectunt, confectionem, paulo supra articulum commissuram exordiens. Quippe scernens ipsos à circumiacentibus partibus, adysque superius inferiusque extremum, tendines quidem inferioribus articuli partibus insinuari videbis: capita autem ipsorum, cubiti atque brachij nodum adire. Vnus itaque tendinum in carpo iuxta parui digiti rectitudinem, ossi cartilagineo columnarive inhaerescit. Alter tendo statim ab articuli iunctura profundius mergitur, vt in carpi ossi aliquod putes cum inferi, quum inferatur tamen iuxta principium illius ossis, quod in metacarpio consistens, digito præponitur indici. Hi ergo quinque musculi totam interiori cubiti occupant regionem, quibus ademptis, apparebunt radij motores. At externorum dissectio sic administranda est. Sub cute, va-

lo oritur. Prope magnum autem digitum, alterum hic quoque validum ligamentum caput duorum consistit tendinum, quorum vnus in os, quod ante magnum digitum in carpo collocatum est, conuoluitur: alter in ipsum magnū digitū, statim à primi articuli iunctura, ingreditur. Quos duos tendines è duobus musculis inuicem coeuntibus genitos dicere, haud inconueniens fuerit. Reliquos exteriorum cubiti musculorum, qui extendens carpum bifido tendine metacarpio se ante indicem mediūque digitum inserit, caput tendinis in radio fixum, iuxta carpi iuncturam exigit. Porro in exteriori brachij nodo, tria musculorum capita inuenies: eius sane qui digito quatuor extendit, clarissimum: qui iuxta paruum digitum, carpum reflectit, humillimum: mediū verò inter illa, quod digitos duos minores abducit à cæteris. Sub his internus in vno, duorum digitorum musculus reconditur, qui ex toto osse cubiti inuicem coeuntibus originem ducunt. qui quidem duobus digitis feruit maxima ex parte: qui verò magni digiti est, prope superioris extremum. Incumbit huic alius, carpi colles rens musculo, qui maioris digiti caput extollit. Idem verò totā profunditatē regionis, quæ inter vtrūque os radij & cubiti habetur, occupat. Cuius musculi dissectionem, quemadmodum & aliorum omnium, à carpo auspicari cōuenit. Sub eo autem, vbi ipsum à ligamine atque à collaterale musculo auulseris, occurret quidam alius obliquus, exilisq., de cubito in radium perueniens. Prius tamen adoriere musculum prædicto adnatum, qui cubitum superiori ipsius extremo artui gignit. Dein elatori hoc musculus inaccedere oportet, qui in metacarpium ante indicem & medium digitum bipartito tendine inseritur. Huius musculi finis superior, iuxta sublimem exterioris brachij nodi regionem, quādamtenus iam quoque confciscit ad superpositam nodo brachij partem. Qui verò & huic & radio supernè expansus, totam manum reddit supinā, ac simul cum alterius exortu suas enā mittit propaggines, is musculus secundū extremitatem sui in tenues membranas degenerans, flectit in musculos brachij insinuans, incisionis cōsuaudit opus, eius tamen caput ossi brachij alligari comperies, vbi huius musculos dissecueris. Exteriores itaque cubiti musculi, talia quædam habent capita. Ex interioribus autem, qui quidem carpi iuxta paruum inflectit digitū, à nodo brachij interno incipit, attingitq. cubitū: qui verò iuxta magnū, ex eodem nodo ducit originem. Ceterum inter vtrūque caput, exortus habetur musculus in manus cutem elabentis. Atq. hic rursus subsunt capita duorum musculorum, qui digitos mouent, & mediam cubiti, radiique totam regionem implent. Verum omnibus quos recensui exemptis, radij peculiaries musculi apparent, per quos supina pronaque tota manus edificatur. Quatuor autem sunt vniuersi: duo ad primas radij partes, duo ad propria carpi extrema pertinent. Ex usque ad carpum spectant, alterum ipsorum sitū esse obliquum, radiū à cubitū intercedentem: per ipsūque nempe agentem extorsum, sicut supinam manum. Alter verò qui radium intrō cir-

Musculorum in exteriori brachij nodo tria capita.

Interiori cubiti musculorum arguens.

Radij musculi peculiarij sunt quatuor.

cūducit, eam efficit pronā. Reliqui duo musculi
radium in superiori parte mouentes, & ipsi quo-
dammodo inuicem opponuntur, obliquum si-
tum habētes: vnus ab interna parte situs, ex bra-
chij nodo prodiit, capiti flexentis carpum ad
magnum digitorum musculi adhaeret: alter exte-
rius quidem est, sed hoc minor, argideo trans-
uersum magis fibrarū suū obinet. Constat autē
omnib. anteriore tenso prona manu constitui, su-
pinam exteriore. Ac dicti multi iam sunt omnes
musculi, qui cubiti radiūq. in orbem ambiūt.
Post quos tu summę manus exiguos aggredere.
Etenim reperies exiles quosdā musculos, tendi-
nibus tertium articulum digitorum mouētib. ad-
natos. Quatuor autem vt tendines ipsi, ita &
digitorū musculi, hi sunt: parui nēpe, annularis,
medi, & indicis. At magni, alij mouēt duo mu-
sculi: vnus enim illū longissimē ab omnibus di-
gitis abducit, ex primo carpi osse profectus: al-
ius, indicē versus agit. Alius præterea musculus
paruū digitū ā cæteris plurimū remouet, ex pri-
mo ossi carpi, quod secūduū illū consistit, pro-
cedēs. Hi igit septē musculi neruō anatomicos
nō lauerunt. * Aliorū autē singuli, ipsis quatuor
tendinibus meta carpi in vno sitis quū adhaere-
scāt, haud mirū si non ita facile conspiciantur. Ex
quibus binī ad priorē cutisq. digiti articuli in-
trinfecus perueniunt, ac ipsius latera iam quonq.
atingunt: reliqui omnes ex carpi ac metacarpi
ligamento iuxta ossiū ferē commissurā processe-
runt. At pollicis musculi elatiorem huius proces-
sus exiguus, & ipsi ex ligamento nati, non qui-
dem ossium dictorum, sed quod musculorū ma-
ximorum bina capita, vnde mouentur digiti, cō-
stringit. Porro ligamen hoc ex carpi ossibus v-
trinq. prodiit, nec cubiti extremum attingēs, nec
iurium ossium quæ in meta carpi habētur. Huius
ablati musculus, neq. in extrema manu, neq. in
cubito superest vilius alius secundus. Post quos
ligamēta scalpello acuto omnia sunt absconden-
da. Quorum ligamentorum triplex in corpore
est vnus: ossa quippe cōnectunt: munimēto sunt
corporibus subditi: ac deniq. indumenta his ip-
sis tendinibus extrinsecus circumdantur. Appa-
rebit autem caput musculi qui radio incumbit,
quem anteriore musculum brachij detexens.
Ceterū sectio ipsa prope venam humerariam,
quæ per totum fertur brachiū, decliuē admini-
stretur, tota quæ inibi adhaeret, cute ablata, & v-
niuersis musculorū membranis. Sectionem ve-
rō quæ in superiori humeri parte faciendā est, ad
ministrabis, fibrarum similitudinem dissimili-
tudineq. obseruans. Ex quibus etiam totam hu-
meralis musculi circumscriptiōnem, ad vnum ca-
cumen peruenientem, cognosces: cuius proces-
sus tanquam triangularis, in brachium cōiicitur.
Qui musculus peculiaris est humeri articu-
lo. Verū solus ex mouentibus ipsum, necessa-
riū nunciat aufertur, vt anteriores musculi, bra-
chij caput biceps appareat. Brachij interior mu-
sculus, duo habet suspensa capita: vnum ad sca-
pularum ceruicis supercilium, alterum ad proces-
sum anchoræ similem. Ligamen vtriūsq. capitis
abvnde trahens, est paulo minus roto rotundū.
Quæ propter hæc duo capita ipsius deorsum pro

currētia, sequēris: quippe quæ in idem cōiungit,
hunc musculū generat, qui alter, sed minori mu-
sculo, subdito (ā quo etiā cubitus flectitur) iuxta
cubiti articulum infidet, radiūq. valido tendine
adnascitur, ac rotū flectit articulum. At verō vt
duo musculi anteriores sunt qui cubiti articuli
flectunt, sic tres alij connexi inuicem, extendunt
hunc ipsum. Vbi igitur musculum internis par-
tibus brachij iniectione sustuleris, duo principia
musculorū totam manum extendentū confide-
rato: quorum alterū ab humeri costa scapularum
non tota, sed ex dimidio ferē ipsius partis supe-
rioris prodiit: alterum verō ex posteriori brachij
regione, subter caput. Hæc it. procedentia, in bra-
chio cōiunt: deinde per tendinē latum, cubiti tu-
berculū ingreditur. Iam verō si diffundēt vtrū
que musculū partem articulari, rotam extendi ma-
num ab vtroq. videbis, hoc discrimine in inclina-
tionis ad latera factō, quod prior in exteriora, se-
cundus intro oblique deflectat. Cæteri sub hoc,
alius delitescit rotas carnosus musculus, brachij
os ambiens, qui secundo advenit adeo, vt parti-
cula ipsius esse planē putetur. Quem si tendas
musculum, interim rectā & inextinguibilem circa
cubiti articulū intensio fieri videbitur: nonnun-
quam intro paululum emergere. Dicti itaq. mi-
li iam sunt, omnes rotius manus musculi.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus, Liber II.



Vidē veteres nihil scripserint de cō-
sectionibus administrandis, verten-
dum illis vitio non est: quādoqui-
dē erat eis tam frequē, tamq. in cō-
muni vñ ipsa anatome, vt domi a-
pud parentes etiā ab ipsa pueritia, in illa omnes
olim exercerēt. Postea verō tam præclaro illo
exercitio intermisso, opus certē nobis fuit cō-
mentariis, quæ anatomici disciplinā, chirurgicę
medendi rationi maximē necessariā, integrā cō-
seruaret. Quæ quidem quod ab aliis haftenus
nō vique adeo accuratē tradiderat, ob id nimirū
ad conscribendos hæc cōmmentarij me accin-
xi. Ignorātia quippe corū quæ per exquisitā ana-
tomē inveniuntur, in reb. quidē secus timidos,
in periculosisimis autem, maximē audaces quo-
tidie reddit. Totius autem anatomæ vtilissima
pars, circa musculos, nemos, arterias, & venas
extremarum partium versatur. Atq. ob id ipsum
manuum & crurium anatomicas administratio-
nes alij præposui omnibus, quod ad ea, quæ rē
vñ hominum necessariū, nūm arti maximē con-
ducant, ire primū inuenies oportere præcōi sit: de-
inde verō, quod eundem ita disciplinæ ordinem
commentarij de vñ particulariū obseruem. Quā
igitur superiori libro, quo modo musculorum
qui in manibus sunt, sectio administrari debeat,
tradiderim, hic simili modo & de cruribus ver-
ba facere est animus. Ergo priusquā exatē co-
gnoscas musculos, dissecare neruos aut vasa, ne-
que ipse poteris, nec aliū item docere. Quare &
hic cutis aufertur: est attendendūq. diligētē,
ne in primo planq. exortu iuxta calcis initiū vñ
cum cute tendinē subiectū eo loco avellās: cuius
explicatū

Musculorum ta-
tem manū ex-
tenditū præ-
cipia doc.

Anatomen ve-
teribus fuisse
miliarisimā.

Anatomen pars
præcipua circa
que versatur.

Manus extre-
ma musculi.

Digitorum mu-
sculi.

Ligamentorum
triplex ad cor-
poris vñ.

Humeralis mu-
sculus.

*Myofibræ in
magnum tro-
chantera inje-
ri.*

In magnū trochantera ingreditur. Ab his aliq̃ duo cōditi planē, intorius lēmoris caput detor-
quent, p̃ validos tendines in grandioris trochi-
teris sinū inserti: quorū vterq̃ ex osse pubis pro-
cedit. Numerosus autē muscūlorū exortus à fora-
mine quod in pectūis osse est, ad vicina loca ex-
porrigitur. Porro exteriorē muscūlū faciliē ab os-
se ipsius dissoluēs. At interiorē, si totum voles
cōtemplari exquisitē, ossium pectūis cōmissu-
ram, quæ cartilaginea est, valenti prius scalpel-
lo dirimes. Nam ossibus à se invicem dissolutis,
muscūlus innotescet. Ceterum ambo hi muscu-
li lēmoris caput interioris circumagūt: vnus per
totius articuli anteriora, alter per posteriora. Ac
talīs quidem est muscūlorū coxæ articulum mo-
uentium cōfectio. Iam verō ademptis iis, qui ex
femore in tibiā descendūt, musculus, duo muscu-
lorum capita in tibiā cōspiciuntur manifestissi-
mē, quæ ex posteriorē lēmoris regione, illa postē-
rius, quā nodorum radix habetur, ducūt ori-
ginem. Dein autē popliteum prætergressa, eo in lo-
co qui sura dicitur, miscētur invicē, vnum gignē-
tes muscūlū: in quem etiam haud exigua capitis
exterioris portio propagatur, quæ musculus per
se efficitur, in tendinē larum paulatim cessans,
qui sublarescit pedi. Nec minus ex vtroque mu-
sculo super in sura geniti capite producitur ten-
do, qui memorato cōtiguus incumbit, postero-
riq̃ calcis extremo inseritur, quod ad seipsum
est trahere idoneus. His recitatis musculus aliq̃ e-
tiam coharēt, qui ex lateribus tibię internis ex-
ortū, omnes ad pedem in sinū porrigitur. At vi-
bitendines primū generant, ibi ligamentū i-
p̃sis extrinsecus est iniectum, ex tibiā ad cal-
cem perminē: quo recta linea diuiso, si tendines
deinde sequantur, digitis ip̃so insertari cōperies,
ambosq̃ mouere primū, secundū, atq̃ tertiu arti-
culum, si magnū excipias digitū. Nam ad secun-
dum ac tertiu, tendo qui ipsum mouet, porrigit-
ur. Tertius vero alius tendo tibię fini adhiere-
scit: cūq̃ innixus, ligamēto iterū peculiari cōstrin-
gitur: qui & ipse pedē vniuersum, sicut qui cal-
cem ingrediuntur, retrorsum flectit. Verū ipsius
extremū imprūm tarso interius cōducitur. His
singulatim recitis, querendū est ad exteriores
tibię musculos, qui quantū sanē ad superiores
exortus attingit, tres exiunt: sin autē tendines,
mouētiq̃ differēntiā spēctēs, plures. Has itaq̃
membranas adimēs, hic etiam sub cute ligamē-
tum situ obliquo conspicies, robustius longē,
eo quod in manibus cernitur. Oportet autē &
hoc incidere iuxta longitudinem membri, mox
partes ad onguē suam erigere, capitibusq̃ ten-
dinum subiectorū detectis, hinc totorū muscu-
lorum cōfectioē suspicari. Ac primū sanē cō-
tueberis muscūlū vsq̃ ad superius caput porre-
ctum, cuius extremum ligamentū cōtinetur, &
tarso ante digitū magnū innascitur, paulū in
interiorē atq̃ inferiorē pedis regionē excedens.
Secundū dein muscūlū aliam spēctabis, huic
ad os viciniū, vt pars ipsius esse poterit. Verū
tēdo eius in caput primi maioris digiti interno
dq̃ insinuat. Huic autē coharēt alius musculus
gracilis, medio inter tibiā fibulāq̃ loco, situs,
qui totius pollicis latus ingreditur. Porro post

*Tibia exteri-
ori muscu-
li.*

muscūlos quos nominavi, tendinū caput, liga-
mentū subiectū, cōtemplator. A quo deorsum
versus incipēs, tendines quatuor, quaternos di-
gitos extendentes, in venies. Sursum verō, mu-
scūlū illū videbis fibulā ad vsq̃ superius caput
adnatū: cuius extremū, tarsum p̃pe digitos ma-
iores ingreditur. Hi igitur musculi in prioribus
magis totius tibię partibus cōsistunt: aliq̃ tres
ab vno capite in exterioribus. Habent etiā & hi
præpositum ligamentū ex fibula ad calcē ipsam
pertinens: quo soluto, tres nervosus musculorū
spēctabis exilitates, quæ cognatas in vicē propa-
gines obtinēt. Quarum prima, quæ ex sup̃erius
fibulæ partibus ad infimū pedem pertingit, ex
tenuibus ligamentis carni connexus efficitur. Se-
cunda, vbi eius quæ prius dicta est, caput definit:
& ipsa non multū post principiū in tendinem ro-
tundū degenerat, gracilis tota existēs. Tertia ve-
rō quæ totum pedem efficit simū, ex reliqua fibu-
læ parte procedit. Hæc itaq̃ pedē eleuat, simul &
extorsum declinat. At prior illa, quæ & in ma-
gnū descendit digitū, intorsum ducit. Verū
vtrq̃ simul tensē, indeclinabīlē pedis eleuati-
onem molitur. Hoc modo etiā ex musculis qui-
pedē retrorsum agunt, vterq̃ in latus sensim de-
clinat: ambo autē simul directē pedem ducunt re-
trorsum. Alius vero incognitus musculus in arti-
culo poplitis delitescit, quæ in venies ablati po-
sterioribus musculus ad surā porrectis, cuius ca-
put si tendas, tibiā flectitur. In pede quatuor mu-
scūlorū sunt genera: tria quidē infra pedem, vnū
supra, in aduersa tarsi parte, quod duos cōplecti-
tur musculos, qui obliquos motus quatuor digi-
tis subministrāt. Qui sub pede habentur, septem
& hi, cum septenis qui in manu videntur, conue-
niunt, singulos digitos in obliquum mouentes.
Quorū duo enati à tarsi osse, magnū & parū
pedis digitos plurimum ab aliis abducunt. Aliq̃
quatuor in interioribus partibus parui sunt mu-
sculi, qui ex tendimib. digitos flectentibus, prius
quā exactē scindantur, procedūt: quorū minus
est, medium vniuscuiusq̃ digiti articulum flecte-
re. Septimus musculus is est, qui pollicem indicē
adducit. Duo aliq̃ musculi subter pedem ossibus
adhiærescunt, atq̃ cuiusq̃ digiti primo præpositi
articulo, leuiter ipsos flectunt, simul quidē pari
actione functi, priuatim autē vterq̃ in latus sen-
sim declinans. Cōfectis his musculis, nullus præ-
terea ex iis restat, qui in toto crure cōsistunt. Cō-
siderare autē oportet omnīū articulorū, quos de-
texas, ligamēta. Etenim coxarū articulus vnū
in orbem ambiens possidet ligamentū, quale ar-
ticuli omnes fortiaunt. Aliud autē in imo recon-
ditum, lēmoris caput coxę sinui connectit, vel
in nervus cartilagineus existens. At genu articu-
lus vnum ligamentū habet in imo, ac præter id,
alia duo in lateribus: vnū videlicet internū, atq̃
externū alterū. Quenatē ab his alia cartilagina-
sa ligamenta in ipso genu cernuntur, vtriq̃ tibi-
ę sinui orbicularim circumdata. Ad hęc sunt liga-
menta nōnulla in pedibus, quæ nihil iuuant os-
sū articulos, sed in aliqua ossis particula prove-
niētia, tendinū capita firmat & roborat. Quæ ve-
rō ab osse in os perveniūt, vt quod à tibię extre-
mo in calcē definit, aut quod fibulæ tibiā vertit,
ea fa-

*Pedis muscu-
lorū genera qua-
tuor.*

*Coxarū artu-
lu inesse liga-
mentū duplex.*

*Genu articu-
lus tria ligamē-
ta fortiaunt.*

ex sanè vna tendens subiectos cōstringunt, atq[ue] ossa ipsa committunt. Sunt quatuor ligamenta alia, quæ veluti nervi quidam cartilaginei, talium ipsam ambientibus ossibus colligant, eandem proportionem habentia cum iis, quæ coxæ & genu articulum in imo coniungunt. Ita siquidem & in pede talo quatuor ossibus confirmato, ligament cartilagineum creatum est, extrinsecus ad fibulæ os, intus ad tibiam, inferius ad calcem: sicuti in priori enim parte ad os scaphoedes. Atq[ue] in vniuersum omnia tarsi ossa valido ligamento in imis compeliēduntur. Nunc verò superest, vt de vngulibus aliquid etiam dicamus. Vngues igit ossis, nervo, cuti, & carni adnascuntur: licet quaquam ex his ipsis eorum substantia constatur, quod nonnulli putarunt. Nam singulæ partes similes, ex materia quæ animanti subiecta est, tales à natura fiuntur, quales sunt. Neq[ue] enim ex brachio cubitus, perinde vt nervus ex cerebro, oritur. Quippe non parum distat, vt de vngulibus aliquid etiam dicamus. Nam quod ex aliquo nascitur, seu propago quedam substantia illius à quo nascitur, similis speciei esse oportet cū origine sua. Sic igitur nervi ex substantia cerebri propagantur. Vngues autem non existunt extremi intermodū digitorum fofoles, sed diuersa essentia species est. Coniungit autem natura illos extremis terminis digitorum, valido ligamento: idq[ue] ipsorum radice, extrinsecus quidem cutim apponens, intrinsecus autem carnem subdens. Cæterum in radices ipsorum, non modo nervus, sed arteria etiam & vena porrigitur, vnde sensum, vitam, & alimentū, sicuti alia partes, accipiunt: quarum nulla ex trium horum vaforum temperie aut cōitu consistat est.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus, Liber III.



Portu artuum natura cōstat ossibus, ligamentis, musculis, arteriis, venis, & nervis, communisq[ue] omnium velamento, cui nomen est cuti. Quo rum cognitio exacta desideratur, ad commodè curandos affectus. Quippe ob eorum ignorantiam, contingit inter medendum medicos quamturpissimè hallucinari. quemadmodum illis methodicis accidit, qui insensibilibus cuiusdam digitis frustra adlubeant omnē medēdi rationem, tanquā in ipsis esset affectus: quem ægrum postea ipse restitui medicamentis quæ digitis admovebantur, ad dorsi principium (nimirum ex casu collisum) iuxta radicem nervi qui in digito priuatus sensu porrigebatur, transfatis. Cæterum aduertendum est, non ex iisdem nervis sensum & motum singulis digitis dispen sari. Interdum siquidem ob insitiā chirurgi, sensus, interdum motus, sicuti aliquando vtraq[ue] actio perit. Quamobrem operæpretium fuerit, quemadmodū de musculis fecimus, sic etiam in præsentiarum nos, quo modo vasorum, nervo rumq[ue] cōfectionē administrare cōveniat, exponere, ab ipsa nimirum rota manu auspicatos, quæ ab humeri articulo incipit, nō secus quā ab ar-

niculo carpi ipsa manus extrema. In primis igitur cutim ipsam per se solam acutiore scalpello à subdita membrana, quā vix cutem nutriendas permeant, separare oportet, vbi prius eius pilos abraferis: promptius siquidem depilem, quā pilosam, incidere. Detracta cute, venas, nervosq[ue] membranae intextos expendas: nervi tamen in macilentis quā in obesis evidenter apparē sicuti et venæ in iis qui sanguine abundant. Semper autem radicem nervorum, atq[ue] lationis modum, meminisse conator, vt si quando cogaris incidere, iuxta longitudinem ipsius lationis sectionē ducas, à radicibus quamlongissimè abscedens: hoc enim pacto, vel vnum, vel nullum nervū interficiemus. Sin autem transversum scalpello admoucas, multos simul diuides. Exteriorum igitur nervorū qui in brachio sub cute summa versantur, hi quidem à nervo, qui muscū scalum, à litera Δ, quā imitatur, Deltoideum dictum, iuxta caput brachij intercurret, veluti à radice quadam oriuntur, atq[ue] ex imo procedentes, pilorumque modo prætenues, vario plexu, per summa brachij, paulo vltra cubitum disseminantur. Hi autem, qui illinc vsq[ue] ad extremū manum procedunt, à maximo nervorum omnium pertinent ad brachij, qui & posteriores musculos intertextit, & ad anteriorem membri regionem permeat, cubitiq[ue] articulo inseritur, propagantur. At verò anterior cutis, nervulos accipit, superiorior quidē parte, ex primo ortu secundi nervus, inter eos qui de spinali medulla in brachium porriguntur: inferiore verò, ante cubiti articulū ex alio quopiam spinali. Sed inteream, posterioremq[ue] brachij cutē vniuersam, ad vsq[ue] scapularū, quæ ibi sunt extrema, alius quidam nervus interterrat, ex secundo intercostali intervallo per axillam, sicuti & alij omnes, in brachium ipsum porrectus. Ac oportet eum qui clare ipsos conuerit velit, musculum parvū anatomicis prætermisum, prius incidere. * Iam verò glandibus etiā, membranis, vasib[us]q[ue] ab axilla exemptis, amplè magnitudinis per profundum exporriguntur nervi. Inunū porro sectionis facies propter venā humeralem, eūq[ue] musculū qui inter brachij lacertos anteriores, duo quidē habet capita, nervū verò propaginē in radq[ue] principij immitte. Vbi igitur duo huius musculi capita in vniū coitura sunt, primū nervū brachij os cōfendere inuenies: eodēq[ue] in loco posterior axillæ musculi magnus in brachio lato tendine inseritur: quō deniq[ue] prædit etiā tendō maximi musculi loris, qui mittitur à pectore: post hūcq[ue] rursus tendō deltoidei musculi, qui supramam humeri partem cōplectitur. Porro quum in vniū coaluerint illius iam dicti musculi capita, scinde separatim directā lineā vtriusq[ue] musculi partē: nam iuxta eam nervus quoq[ue] vnus deorsum mittitur. Dū hoc agis, alius quoq[ue] nervus multo hoc inferior, in conspectū occurrit, ascensum mollius in brachij. In horū nervorum processū, intermā ab altero, intermā in caput minoris ex brachij anterioribus musculis, propagines transmittitur. Deinde secundus nervus primo tantū de feramū impartit, quantum illic primi reliquū fuisse apparet. Vnus autē ex duobus nervus

Vnguem vno
fiderant.

Ossa ab ali
quo similia
speciei esse
oportet
cū origine sua.
Nervi ex
substantia
cerebri
propagantur.

Vnguem
radice
quasi
fida.

Artu natura
est quibus
constat.

Sensum & motum
nō ab iisdem
nervis
dispen sari
singulis
digitis.

Manu tota,

Manu
ma.

Scilicet quo
modo
admiranda
da.

Nervorum
brachij
exteriorū
origines.

constatur, ad cubitū, per mediū ipsius articuli cubiti flexi, porrigitur. Secundus nervus humilior situm habet, in sūditū ibidem brachij nodo, ubi planissimus est. Præter duos illos prædictos, tertius quidam maximūq; nervus insequitur, ferè prope secundum, profundius tamen, brachium ipsum ingrediens, vna cum grandibus vasīs, arteria nempe, ac vena, quæ per axillam ad brachium etiam perveniunt. Qui nervus cū ipsīs vasīs in magnos brachij mūsculos propagatur, à quibus extenditur articulus cubiti, atq; magnos sui ramos vtriusq; ipsīs transmittit, obliquus in externam partem emergens. Vbi verò effertur paulo supra articulum cubiti, ibi pars quædam ipsius ad curam elabatur, vt prius est dictum. Reliquum per cubiti mūsculos disseminatur. * Detectus porrò multis iam brachij partibus, reliquos duos nervos prope internā ipsius regionē, in qua etiā prædicti tres inferuntur, conspicis paulo inferiorem q̄ situs sit tertius nervus: quorum alter summa sub cute omnium primus apparet. Idem nervus in brachio ante cubiti cōmissurā in ramos propagari incipit, ferturq; per totum ipsius flexum, scilicet iam numerosiore ramorum serie. Insuper quintus alius nervus restat, ex his qui de spinali medulla brachium adeunt. Hic per intima ipsius regionem aliorum modo sectur, sed nulli brachij particulæ aliquam sui portionem communicat. Iam verò ad cubiti cōfectionē accedens, secreta cutē à membrana substantia, nervorum quidem primum principium videbis esse, qui in narratione eorum qui in brachio sunt, quartus est dictus nervus. Quod principium internam cubiti regionem ferè totā occupans, inferiori vniuersæ, & exteriorum nō paucis inferitur partibus. Quantacūq; verò cubiti pars ad radium eminet, vtriusq; tum exteriū, tum interni, aliorum nervorū processus exigit: interna ab omnium primo dicto, exterior à tertio nervo mutatur. At his magnorum nervorum, qui per nodum quo brachium cōmittitur cubito, ad cubitum ipsū feruntur, quinque numero sunt. Sed horum vnus in solam ipsius cutem spargitur. Ex aliis quatuor, primus in mediū se articulum cubiti insinuans, ramum sui postea externis cubiti partibus vsq; ad carpum ipsū transmittit. Secundus hoc humilior, super interiōrē inferioremq; nodum brachij ingreditur: ac dein aliam in eam partem dispergit, qua caput mūsculi bicorni tendine extendentis carpum, ascendit. Atq; huius quidem nervi propagatio vna, totam summæ manus exterioris partem dimidiam amplectitur, sub cutē extrema ad summos procurrens digitos: paruos sanè totos, mediū autem dimidum: reliqua verò soboles, mūsculo quatuor digitos extendenti, cūq; etiam qui duos paruos in obliquum agit, & sciti & illi qui carpum propter parium extendit digitum, inferuntur. Qui autem reliqui sunt alij duo nervi, in ternis omnibus cubiti & digitorum mūsculis distribuntur. Quos incens diligenter, asqueris nervos in ipsos disseminatos. Invenies quippe ab vtriusq; nervis processūs, mūsculis qui digitos flexunt, & carpum, communicatos. Mūsculos autē nō vnus quidem in exteriore

summæ manus regione, sicuti in interiōre, habetur. Cæterum vna arteria, dux autem vena, propagantur in totam manum. Ex vena igitur, illa quidē quæ in superficie extat, quæq; iuxta interiū latus mūsculi Deltoidis excurrēs, ad extremum ipsius proficiscitur, humeraria vocatur: quæ quidem iuxta articulum cubiti, radij mūsculū oblongum confendit, inibiq; in pares ferè tres ramos scinditur: quorum vnus in alium demittitur, alter ad ipsius articuli flexum pertendit, vnus parte alterius venæ, ex his quæ in totam manum excurrūt. Reliqua: tertius ramus, paulatim in exteriōrē cubiti regionē declinat, ibiq; in ramos diffunditur. At vena per axillam procurrens, quum humerali multo sit maior, simul cum huius loci arteria, quæ axillam perrepat, per totum brachij in ramos finditur. Ac prædicti nervi in singulos mūsculos aditi, vtrorūq; vasorum, arteriæ dico & venæ, propaginem sibi cognatam habent. Quæ quum brachij perreperant, in totum cum maiori ex anterioribus mūsculis, parte interna delatæ, arteria quidem penitius ad cubiti mūsculos tendit: vena autem bifariam scissa, paulo ante articuli cōmissuram, altera parte in profundum dilabitur, vbi arteriæ contingit, vnāq; in ramos cum ipse propagatur perpetuū: altera obliquè sub cutem producta cernitur. Huius igitur venæ soboles prima, deorsum ad cubiti os, obliquè ferri videtur: at vbi cubitum superauerit, reliquū ipsius partem oberrat. Secunda propago aliquatenus clarius defertur, mox bipartito diuiditur. Cuius pars demissio, versus ram quæ ad os cubiti porrigit dicta est, defertur. At elanor, obliquè paulatim tendit, longiusq; porrecta, interim ad eam venam pervenit, quæ cum cubito porrigitur, quæq; ad extrema vsq; ipsius pertingit cubitū. Iam verò omnium quos retuli terminorum ora cōiunt, & ex vnoquoq; duorum coitu, vas vnum confluat, ita vt quæ vnita cōiēnt, præ multitudine & parvitate nō quidem numerare queas. Cæterum quod vas ex humeraria et magna vena constatur, in altiore radij partem ascendit, ac dein per exteriōrē osis radij sedem binis ramis expanditur, vt duo hęc vasā l laterā representent. Quippe alterum vasorum confectū ad magnum extenditur digitum, alterum versus parvum declinat: in manu autem vterque ramus vario modo diuicatur. Illius ramus qui versus parvū digitum tendit, exigua quædam propago mediū digiti medi & annularis regionem ingreditur. Quam venam nonnulli in sinistra manu secantes, sinentē q̄ sanguinē ex ea fluere quovisq; vltro sistant, hienem ex tali vacuatione tuari assunt. Conspiciuntur autem facilius omnes id genus venæ, in calidiore cōstitutione aëris ambientis, ac præcipue si mēbro ipso tum demisso, tum loto, eas laqueo intercipias. Quū igitur vniuersas venas, quas in hominibus ante cōcisionem conspicis, in simia dissecta videre liceat, consulerim te prius in simia exerceri, vt si humani corporis dissecandi quandoq; copul sis nactus, promptè singulas partes et regas. Porro vbi sanguinem mittere est animus, in his sanè qui totam manifestō venam habent conficis, quæ longi-

Maximūq; nō
latus in exteri
ori manu extre
ma regione ha
bet.

Humeralis ve
na.

Arteriæ ve
nam esse longi
or humerali
materiam.

Nervorum mū
sculorum in ar
ticulum delatū
denique sine
quocūq; mu
sculo.

Vena media cū
soluta.

Vena inter an
nularē & me
dianā dextram
sitā, in sinistra
manu cōiūctā.

Vena quæ ra
tionē cōspiciat
pares ac binas.

Conspiciuntur
pares mūscu
los in simia.

Venas simian
um, quæ in
gessum tendunt
esse ab ar
teris.

gissi-

gissimè recedendum est ab arteria. In quibus autem id solum quod arterie incumbit, in tumorem attollitur, reliquum verò totum, conspectū effugit, nunquā venam ipsam loco inflato secue-
 ris, sciens arteriam subditam, quæ lata & valida est, ubi intumescit plurimum, simul secum extol-
 lere, atque adeoque circumdente incumben-
 tem venam. Accidit enim inde, venâ in gibba ar-
 teriæ parte cleuaram, adeo penes regionem qua
 circumdenditur inani, ut scalpellus mediocriter
 insectus, eam quidè subire pœtret, subiectâ ve-
 nâ arteriâ convulneret. Quare consilium est rece-
 dere ab hac, ad vicinariâ aliquam, maximè ex his,
 quæ ad cubiti os deferuntur. Sin autè ex his quoque
 nulla ceruatur, eam adhibe qui in flexu ex venarum
 coitu facta, ad radij superiora pervenit. Si
 hæc occultatur, illam fenes, quæ ab humeraria
 ad cubiti flexum porrigitur. Quod si hæc non
 appareat, eam diuides quæ ab ipsa in flexum de-
 ducitur. Si nec ipsa, illam quæ sursum ad radium
 obliquè expanditur. Si nec illa se ostendit, venâ
 ab axilla ad cubiti flexum procurrentem inci-
 des: quæ accommodatissimè est us qui partibus
 infra claviculas sitis laborant: scilicet & lumera-
 riis qui in superioribus. At cōmemorare, se-
 cundum tertiumque ordinem post ipsas obtrinet.
 Communis autem vtriq; est, quæ ad radij superio-
 ra conscendit: quare tertium quoque ordinem
 in ambabus manibus ei attribuimus. Atque hæc te-
 me de superficialibus vîs ad digitos totius cubi-
 ti venis: quibus ademptis, videre licebit nbi &
 profundiores, primò quidem muredo coeuntes,
 mox ubi cōgressæ fuerint, iterū in binos ramos
 dissolui: quorum densior quidem, per os cu-
 bitus: elatior, per radium vni cum arteriis in mus-
 culos propagatur: atque vterque radens in propa-
 gines varias diffunditur, nonnullæ quarum pau-
 cis postea germinibus exteriorum venarum mi-
 scetur. Porro arteria vna duntaxat in manum
 proficiscitur, vicina venæ quæ ad illam permeat.
 Vtraque autem thoracem elabitur: cum non o-
 pari nervorum à spinali descendentiū medulla,
 & brachium illuc ingrediuntur, quò tertius per-
 venit nervus. Inde omnibus brachij musculis
 processus notandos mittentes, declives ad flexum
 articuli, quò brachium iungitur cubito, ex-
 currūt. At venâ in brachij extremo in duas diuisa
 est: sibi obsoles, quarum altera vîs ad cutem effle-
 rit, vt antea declaratum est. Quantum verò i-
 plius per profundiora cum arteria deducitur, id
 tertiam profundioræ partem adsumens, bifariam
 scinditur, & cum vtraque parte arteriæ, quæ & i-
 psa bipartitò diuisa est, simul tum porrigitur, tū
 in vniuersos, vîs ad digitorum initia, musculos
 ramorum serie dispēditur. Itaque elatiore arte-
 riam quæ ad radij vîs os decurrit, prope com-
 missuram carpi tangimus, pulsus exploraturi.
 Sensibile etiam in macilentis motum arteria
 quoque edit, quæ mediam indicis & magni digiti
 regionē perperat, originem ab hac ducens. Hu-
 milioris verò motū, haud facile discernere pos-
 sum. Iam verò in extremis cōvexis manibus nul-
 lam reperire est arteriâ, quod ne musculum qui-
 dem vniū. At arteriæ regio, quoniâ multis septa
 est musculis, adeo multas quoque artenas singulis

ipforum potestates obtinet. Verum vniuersas ar-
 tentas internas carpi, vni cum venis coniugi-
 bus spectabis, lato amputato tendine. Arteris
 alit ipsi & venis, pro ratione magnitudinis vir-
 tus inest, non item nervis omnibus: sed alicubi
 exiguus nervus haud exiguum obtrinet potesta-
 tem, ut qui musculos motiores magni digiti &
 indicis, intercurrent: qui soli si seruerent in na-
 turali habitu, cæteris abolitis, non vîs mancus
 homo in rotam evaserit. Rursus, si quatuor ex-
 stant incolomes, musculus autem qui magnum
 flexit, vel tendit digitum, laboravit, omnia ma-
 nus officia interibit. Pariter enim musculorum
 qui sibi invicem sunt oppositi, altero resolutò,
 vtrinque semper actio vincitur. At verò iuxta
 principij formoris, separata prius cute à mēbra-
 na subdita, quatuor radices nervorum in cutem
 excurrentium apparent, pares numero prin-
 cipis grandium nervorum, qui in musculos di-
 sperguntur, unde scilicet proceliere. Proinde vna
 est, quæ ab anterioribus musculis deorsum
 versum, in totam cutem ipsi vicinam fertur. Hac
 alia interior per ungula longo angustio mus-
 culo vehitur. Tertia autè iuxta os quod coccy-
 ga Græci vocant, minus cōspicua cæteris. Quar-
 ta denique adhuc magis condita, in pectinis forami-
 ne delitescit. Cæterum ex his superficialibus
 cutis nervi intuitus quum fueris, incidito omnes
 formoris musculos, quibus invicè separatis,
 grandium nervorū distributiones planè appare-
 bunt. Sunt igitur tria nervorum initia magnitudi-
 ne sibi invicem cōequalia, quæ primū exe-
 quar. Quartū verò aliud maximū, bifidum ipsi
 succedit, quo de postenore agam. Itaque tribus
 principis vni in anteriores musculos solos di-
 funditur: alterum simul cum magnis vasis porri-
 gitur, ipsi vasis ramos telæ araneæ modo
 presens, vt musculis cōiungat, impartit. Quod
 restat tertium nervorum initium, amplum ossis
 pectinis foramen permeat, duosque paruos mus-
 culos id amplexos, vnum vtriq;e, aliorū alterū,
 intrinsecus reliquit. Hæc iam tria principia in-
 truitus, ad quartum duorum ramorum grandis,
 qui in crus deferuntur, mittuntque ad extremos
 vsque digitos propagines quasdam, descendas.
 Evadet autè & hoc conspicuum, musculus natum
 incisus, cum quibus incidantur etiam capita for-
 moris musculorum, qui numero quatuor, ex co-
 xendicis ossè exoriantur. Quippe grandes ner-
 vi illis subiecti apparet, qui foras ab inferiore la-
 ti ossis parte cum nervulis tenuibus ex eo pro-
 ductis, emergunt. Verum illi in omnes articuli
 iunguntur musculos exteriores diffeminantur:
 primū ex vniuersis in ipsum superficiatū, qui
 articulum retrorsum agit: mox in carnosum sub
 ipso magnū: deinde in paruos infra hunc laten-
 tes. Nam grādes soli per femoris regionem pos-
 tream excurrentes, apparent: qui in varios
 inde musculos disperguntur. Porro in tibia et-
 nam, duo soli grandes nervi, descendentes per
 femoris posteroiorem sedem, vni vniço lato mus-
 culo cōspicui videntur, qui ad tibie principium
 excurrunt, atque ibidem primū separantur in-
 vicem: alter qui minores, exterioribus ipsis
 musculis distribuuntur: alter, putā maior, in-

Arteria & ve-
na pro ratione
magnitudinis,
viriū peripetui
angl. nervi au-
tem nō sunt per-

Nervuli radi-
ces quatuor, in
cutem jamem
disperguntur,

Nervuli in ma-
nibus femora
disperguntur, &
vna quatuor,

Femoris muscu-
li quatuor.

Tibia nervi.

Vena quæ scilicet
da.

Axillaris vena
scilicet, necnon
modatissimè
esse in qui par-
tibus infra cla-
vici laborant.
Humeralis ve-
na scilicet cond-
it partem
supra clavicu-
las laborant-
bus.

Arteriâ vnam
duntaxat pro-
fiscis in ma-
num.

Arteriam carpi
tangit & ne-
bulosum ex-
ploratur.
Arteriam inter
indicem & pol-
licem mediam,
sensibiliter in
macilentis mo-
tore.
Manus cū vena
carpi arteria.

terioribus. Sed externus tibiæ subter fibulæ caput ingreditur: interior iuxta suræ initium profundius mergitur. Atque huius nervi pars reliqua non mediocriter in pedis inferiora porrigitur. Alterius autem tenuia extrema suprema tarsi partibus dispensantur. Porro quædam ipsius etiam ad nervum alterum pervenit, qui per suram, prope inferiores tibiæ partes defertur. Cæterum infimam pedis sedem nervus vnus subit baud exiguus, ex altero grandium, quem in posteriores

Pedis nervi.

tibiæ musculos digeri commemorauimus, propagatus. At in supernam partem pedis, exiles nervuli quatuor porrigitur, ab iis quos recensuimus, exorti. Ad hæc verò, exigua quædam venæ erunt per os pectinis adit, modicam ipsius partem nutricis. Vna autem alia maxima vena in totum crus ab interiore parte per inguina diffeminatur. Cuius ramus vnus statim in priorem, internamque fæmoris regionem perfertur, multatiam summa sub cute in ipsum distribuitur. Ab hoc, aliz tenues propagines in cutem tres quatuorve disseminantur. Dein alius primo similis ramus in fæmore prope musculum angustum cernitur, post eumque aliz duæ aut tres perussillæ. Ab his alia insignis genu interius subit: quam sequitur alia duas in partes diuancata, cui succedunt aliz complures. Atque hæc quidem subter cutem summam omnes constituit. In imo aliz quædam sic se habent. Prima enim post inguina anterioribus duobus musculis displicat. Mox alia

Vena in cutem cruris diffusio nata.

Vena cruris interius intradentes.

penitus grandis fans intra maximum omnium musculū, & ex anterioribus internū porrigitur: qua plures venarum propagines in omnes propemodum fæmoris musculos dispergitur. Post hæc alia quæpiam deinceps in grandem ex anterioribus musculum ingreditur, elatius ad externam fæmoris regionem emergens. Insuper post illa alia notatu digna profundius in maximum musculum eius vicinos inferitur. Atque post hæc, in superficialiū enumeratione prædicta, quæ ab intima genu parte ad vñq; tibiæ extremum multiplices ramorum serie cutem subit. Iam verò, præter alias quasdam propagines, quæ interdum in tibiâ videntur, etiâ ipsi fibulæ bipartita venæ soboles apponitur: quarum altera in superficie externis partibus fibulæ ad malleolū vsq; ramorum seriem spargit: altera, per ima exteriorum musculorum ducta, ramos communicans singulis, intra tibiæ fibulæ iuxta inferiorem huius finem pervadit, in imam pedis regionem diffeminatur. Ab hac autem procedunt duæ aliz venæ, prope exuberantes tibiæ fibulæ terminos, conspiciæ satis: quarum interior sanè muscetur ei, quæ iuxta genu descendens, intrinsecus supra suram tibiæque tori ad malleolos est porrecta: at exterior foeciatem init cum venis ab illa exporrectis, quæ per exteriores fibulæ partes decliuis fertur. Verum ab iis quæ ad tibiæ fibulæq; extrema invicem coeunt, exiles, quædam ad tarsum, digitorumque pedis excurrunt, maiores autem ipsi ad imas partes evadunt, ex quibus tota pedis regio inferior alimentum accipit. Nam posterior pars, quæ ad calcem habetur, à proximis intrus, forisq; ramos invicem coeuntes suscipit. Vena igitur per inguina excurrentes,

Pedis inferior regio unde alimentum accipit.

hunc in modū propagatur. Quæ verò pubis os perrepat, solis indidè partibus (qui tres musculi sunt) distribuitur, easque nutrit. Porro arteria maxima cruri per inguina inferitur, eo nimirum loco, quo vena magna. Vtrumque autem vas per interiora protendit fæmoris, archiori ipsius musculo incumbens. Ac venæ quidè arteris in musculos inferitis coherent: non tamen arteriæ perficiantur venas vnâ confcendunt, verum aliud semper musculos ingrediuntur. Id autem inde liquidò constat, quòd carnosus nusquam in crure pulsus appareat, nisi in tarso rectè ad secundum digitum post maximum. Tangimus itaque subinde arteriam inibi sitam, quum eam quæ carpo inest, percipere non poterimus. Arteria autem quæ per osis pubis foramen in fæmur pervenit, pervenit ac vena, iisdem tribus musculis distribuitur.

Arteria in crure distributa.

Arteriam tarsi tangendâ efficitur pulsus carpi oculis.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus, Liber III.



Ad ternerè in his commentariis à manibus sumpsi exordium, quòd nimirum has partes videre in solis hominibus liceat. Neque absurdum fuit statim de cruribus commentari nonnulla, quandoquidem beneficio eorū, solus homo ad amplexum rectus incedit. Nunc verò de faciei & capitis partibus, opportunitum videatur dicere. Porro duo musculi tenues simul & latissimi in buccam & labra descendunt, à colli spina orti: vnde membraneum, fibrosūq; ligamentum procedens, substantiā ipsorum constituit. Complures etiam fibræ ex scapularum sping regionibus, quemadmodum et ex vniuersa clausculi sede, in buccā terminantur. Atque oportet hosce musculos, quum vñs aliquis postulauerit, pro fibrarum natura incidere. Nam si experiantur magnam incisionem transversam, buccas ad alterā partem revellunt. At musculosa compages, quæ fronti subiecta est, & à qua supercilia attolluntur, & motus frons perficitur, suas fibras habet deorsum versus tendentes: quas transversum etiam chirurgi imperiti fecerint, in causā sunt, vñs frontis cutis tota delabatur ad oculos. Iam verò alij musculi masticatores dicti, expalpis inferioris maxillæ lateribus sunt subiecti, qui variis totam ipsam modis circumagunt. Nam temporales musculi, non circumagere, sed dum mordemus, vel edimus aliquid, aut os claudimus, adducere maxillam sunt nati. Etenim animalia omnia, præter crocodylum, inferiorē maxillā mouere, superiori immobili, natura voluit. Vniuersi autem motus ipsius tres sunt: vnus in mandendo, alter in ore claudendo, tertius in aperiundo peragitur. Atque ab his fecerunt laborum atque buccarum motus, qui sunt immota maxilla: vt quomodo sint in ore functiones, quina verò musculorum genera. In simia igitur intra aquam extincta, vbi pilos abstuleris, leuissimè cutem incidas scapello acutissimo, rectam ducentem lineā à mento vsq; ad pectus, iuxta cervicis ipsius longitudinem: statim siquidem sub cute se ostendit latus tenuissimū

Manus reperi in sola hominibus.

Homo solus ad amplexum rectus incedit. Labiorum utriusque radi.

Frontis musculi habet fibras deorsum versus tendentes.

Musculi masticatores. Temporalium musculorum vñs.

Maxillam inferiorem, superiores immota, mouere animalia omnia, præter crocodylum. Maxilla inferiora tres motus. Oris functiones musculi, quos non graui ambulant.

Latus musculi in venis d. rati.

*Lati musculus
in venendi ra-
tio.*

*Lati muscoli
fibra à quibus
motus oriuntur.*

*Animalia qua
sunt aptiora a-
natomia admi-
nistranda.*

*Maxilla homo
fertur brevius
futura.*

*Angustia duo-
bus manducatis
cruribus.
Labiorum sub-
stantia.
Labiorum motus.*

Labiorum nervi.

*Dentium & pin-
guis nervi.*

*Nervi muscoli
quales.
Lati muscu-
li in vasa Gal-
leana.*

*Masseteri mu-
sculi.*

ventusque musculus, vna cum numerosa serie ner-
uorum, talem vtrinque firum habentium, qualem
fibra quibus adnascitur. Quippe omnes ad la-
bra definent, ex variis procedentibus. Si
quidē ab vniuersis colli vertebri incipiunt quē-
dam; alię à scapulis, alię ab vtriusque clauicula.
Quę igitur à scapulis ducunt originem, oblique
omnes per buccas in oris latera porriguntur: quę
à vertebri, transverse magis: quę uero à clauic-
ula emergunt, propemodum rectę sunt. Hęc
autem omnia quam commodissime discernun-
tur in his animalibus, quę prę sentio extenuata
sunt. quare ad propositum opus talia sunt deli-
genda: post quę, recens nata præstant magnis
& pinguius. Cognoscere autem ex ortu singu-
lorum nervorum, si vbi laqueos illos exceperis
proximē ad ipsam maxillam, absterulisque om-
nes fibrās vtrinque eis adiacentes, iam nudos
ipso reducas ad propria principia. Posterius li-
taque musculus huius minimē ex spina omnino
procedit: inde ad occipitis osis basim defertur,
mox sub aurem, deinde musculus masticato-
rium ductum totum ascendit, osisque superioris
maxillę cōminuitur. His igitur omnium primis
ademptis musculus, licet vel occipino, vel fa-
ciei adhaerentes, ostendas. Iam verō ex omni-
animantium genere, homo brevissimam, pro to-
tus nimirū corporis proportionē, maxillā sor-
titus est. Mox similia: dein lynces & farys: post-
ea cynocephali. Hęc autem omnia & collum ita
prolixum, & clauiculas hominis modo possi-
dent. Ac quędam ipsorum magis insistant, quę-
dam minus. Insistant igitur recta, gradiunturq;
alia pedis, alia melius. At certē gradiuntur omnia
binis innix pedibus. Aliud autem nullū (quod
scimus) animal, duobus cruribus mcedit. Labra
itaque naturam singularem eximiamque obti-
nent, adhærescuntq; osi maxillę, tertiam quan-
dam in se, eandemque fungosam substantiam for-
mita, ita ut tota ipsorum natura, ex illa ipsa sub-
stantia, cute, & tribus lati musculi terminis, con-
stet sit. Proinde latorū musculorū beneficio,
in latera secundum transversas ipsorum fibras
mouentur. Deorsum verō, sursumq; versus, mo-
tum, tota ipsorum substantia suppedat. Atque
hos ob motus, nervos ipsi natura, tenuissimis
foraminibus perforans maxillam, transmissit.
Per quę foramina elabuntur etiam reliquę ner-
uorum, qui dentium sedibus adhaerescunt: à qui-
bus gingivę, dentes, & etiam membranę ambie-
tes, ipsū sensum accipiunt. Trahuntur porro
deorsum labra, beneficio nervorum qui ex imo-
sursum versus feruntur. Contrahuntur autem
ad extremis vtriusque musculorum, gradi-
um, & latorum, ipsis insertis. Sicuti autem his
nervi ab inferiore maxilla, sic superioribus la-
bris, à superiori subministrantur. At verō mu-
sculos qui nazium alas movent, tales natura ef-
se pronuntiare palam oportet, qualem & latorum
musculū, quem nos invenimus. Hinc paulatim
visq; ad malas descendet, eum à vicinis illarum
partibus auferens. Hoc enim confecto, binī mu-
sculi masseteres dicti, singuli proprio ex capite
in extrema inferioris maxillę profecti, clare cer-
entur: nervis ipsis intercurrentibus, qui ad buc-

cas definent, quibz hamulis ad iniunium propriū,
quod post aures oritur, sunt reducendi, prut-
quam masseteras, hoc est, masticatorias, inci-
das. Ex horum musculorū capitibus, alterum in
malis, ut vocit, alterum iuxta os ingale cōstitit. Ori muscoli.
Post hos musculos, eos qui intra maxillā in ore
habētur, adhibe: tum temporales ipsos. quę tria
musculorū paria maxillam mouēt: temporales
quidem, cum interioribz sursum cōvellentes: ma-
sticatorū, in latera circumagētes. Osē ingale ab-
lato, evidētē totus musculus temporalis cōspi-
citur, dictiorimq; simul trium musculorū socies
tas: quorū duo quidem simplices, masticatorius
autem duplex exiit. At verō inferior maxilla,
ex duobus osibus circa infimam partem cōiun-
ctibus constat: quę diducenda sunt, ut rectē oris
partes cernantur. Porro vniuersa capitis, cute ab-
lata, delineamenta quędam musculorū circa au-
res cōspicies, quę in reliquis animalibus nō de-
lineamenta solum, sed perfectos etiam musculos
spectabis. Habetur enim vnus in vtroq; spina la-
tere musculus. Nētur tamē visq; ad aures pro-
currit, sed tantum vtroq; abest, quantū ab occipiti
procedit. Iam verō scapularē magnis aguntur
monbus, nec minus ipsi caput. Ceterum muscu-
lus ille duplex, ceruicis, qui in scapulis ipsi in-
feritur, nō capitis, sed scapularum grana est: à na-
tura cōditus, ut illas ad caput cōtrahat. Siquidē
si transversum js in ceruice findatur, cōfestim
cōvelluntur, deorsum versus, scapula: sursum au-
tem nō amplius moueri queunt, idq; capitis mo-
tum minime resoluto. Sunt tamē alij musculi, qui
caput agunt in latera. In illum autem scapularē
musculum, à cerebro quidam nervus descendit,
quem ignorauit Lycus, perinde vt par illud mu-
sculorum maxillas mouentū, quod intra os est
situm. Secundum musculorū par est, quod præ-
dictis quibus subiectum est, longitudine respō-
det. Nam ex eadē occipitis osis regione proce-
dens, sublimi scapularū basim angulo innuitur.
Verūm latitudo ipsi equalis non est, sed multo
minor. Hi etiam scapularum basim ceru ad occi-
put (vnde transversim originē) retrahūt. Priores
verō musculi, non modo basim, sed totas ipsas
ferum reuellunt. Vtriq; autem, à media occipiti
regione incidenti dunt. Quibus sublimis,
alia plerazq; musculorum cōfingia competes,
quę carnosus anulus caput ad posteriora res-
tēnt, rotas colli longitudini iniecit. Sunt et alij
musculi, sic ab occipiti offe ori, ut obliqui
ipsorum fibrę ad spinā finitissime: à quibus ca-
put in obliquum conuertitur. Ab vtriq; autem
ipsis incumbētibz, de obliquis hac inclinatio-
ne, ad rectitudinem æqualem, quę naturalis est
figura, reduciuntur. Exordiens igitur tria horum
musculorum paria ab occipiti offe, cui inhere-
scunt, discicare, perges visq; ad extremum in-
ferius. Quibus ablatis, circa articulum capitis a-
lia quatuor exilium musculorum paria cernuntur,
quę retrō habētur, absq; parvis in articulo,
iuxta latera primę vertebree, reconditis. Succed-
it aliud quartum par musculorum obliquum,
tertio obversim respondens. Hi musculi primę
ceruicis vertebree secundę connectunt. Eorū
verō extrema ad laterales primę proceffus, &

Ori muscoli.

*Temporales
musculi.*

O ingale.

*Maxilla inf-
rior ex duobz
osibus cōstat.*

*Scapularē mu-
sculū & motus.*

Capitis motus.

secundæ spinam, evadunt. Porro tria hæc paria, nempe, primum ex omnibus quæ recensimus, tertium, & quartum, triangulū æque lateribus tribus constitutæ videbuntur. Itaq; in reflexione capituli, occipitis os cum ipsius primæ vertebrae sinibus innititur, atq; secundā præterea cōtingit maxillæ ipsæq; extremus in renuendo capitis reclusus, hos ipsos terminos obtinet. Annuentibus rursus, in priora caput recedit, & super anteriorem primæ vertebrae processum innititur. Verum extrema sinibus laxa insidēt, à posterioribus, partibus disiuncta: alioqui primam caput vertebrae ad anteriora transcederet, & musculus & propria gravitate deculsum, nisi in processu anteriori ipsius primæ vertebrae, sic constituto à natura, accuratè innitens confirmaretur. Verum hinc exiguam securitatē, maximam verò inde, quæ primis cum secunda committitur vertebrae, natura molita est. Nam quum particulam quandam turbini similem, rectam ex hac produxisset, inferiora anterioribus constabuluit, primam vertebrae leuiter excavaans, ubi maxime in anteriora processus exiit. Posteriorē quippe ipsius partem, secundæ vertebrae processus acciuit, extremū ingreditur, ligamentūq; validum è vertice ipsius ortū, capiti inferitur: itē aliud quoddam transversum ex ipsa prima vertebra profectum, secundæ extremum turbinatum ad amussim cōstringit. Obliqui autem musculi in latera caput convertunt. Iam verò qui torquent caput ad anteriora, ii musculi ad pectus & primas clavicularem partes protendunt, ex duplici ortu principio, altero post aurem, altero in ipsiusmet auribus sitis: quapropter quicquid extremo etiam in prius nominatas particulas inferitur. Quod autem & pectus & claviculae cum ipso thorace circumducunt, simul & sursum versus ad capitis latera, aut caput ipsum in priora circumagunt, curvis notū esse existimo: sicuti & ipsos hoc pacto non posse movere thoracem. Quare caput ab ipsis prorsum circumverti necessum est. Nam qui musculi rectam posituram obtinent (ut qui ad scapulas & cervicem porrigebantur) ii omnes simplici motui præstant: qui verò non rectam, composito. Quare musculi qui à regione antrium ad claviculas & pectus descendunt, quum obtineant situm non recto tramite, sicuti similem motum fortiantur. His musculis amputatis, ad eos qui in scapulas habentur, digredi licet. Duo sanè iuxta spinā hærent, quos solos scapulas retrorsum agere dicimus. Alius tertius, à prima vertebra oritur, & in extremo scapularū iuxta summum humerum definit. Quartus gracilis, longiusque, ab osse initio laryngis præposito, quod hyoides dicitur, originem ducens, ipsas illi connectit. Sunt & alij duo musculi vtrinque per spinam dorsi exporrecti, à quibus scapulae spinam versus tendunt. Videntur. Ab elatione siquidem leniter ad cervicem inclinat: ab altero ad inferiores dorsi partes deducit: ab utroque verò simul tensis, totas scapulas retrorsum, nullam in partem inclinantem, deflecti ad primas septem thoracis vertebrae, ad quas protensis sunt, videbis. Atque hi sex musculi peculiares scapularum existunt. Alius autem humeroi articu-

lo communis est, scapulas deorsum versus detrahens: quo de suo tempore agetur. Musculus quos retuli ademptis, apparebit is, qui maxillæ inferiorem aperit, in incipiens à capitis osse petroso, sursum autem ad summam maxillam protendens: ut veteri musculus, & qui à dextris, & qui à sinistris pergit, eodem coeant, ac medio itinere, ipsorum pars in nervosis ligamentis degeneret. Quod par solum nervuorum, tribus ori claudendo creatis natura opposuit.

Maxilla inferior à quo aperitur maxilla.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus, liber V.



Vte quæ pectus contegit à subditis liberata, musculus inibi spectabis in aliorum superficie extantem, qui ex mammarum regione incipiens, sursum versus ad humeri articulum obliquus porrigitur. Ipsum itaque à subiectis partibus dirimes, hamo quidem primū ipsius fibrarum finem elevans, dem vique ad humeri articulum totum musculus separas, post hunc ad alium co maiorem accedis, qui ad eundem nimirū articulum pervenit, ex toto pectoris osse oriens, mammarumq; subiectus. Qui musculus bipartitus quodammodo est, fibra ipsius in similitudinem X latera, mutuo sibi incumbenibus: alius ab humiiori osse pectoris sede ad articulum eminentiorem porrectus, alius ab elatione ad demissiora inclinantibus, omnibus autem sese intersecantibus invicem. Porro ipsa axillæ concavitas à duobus gignitur muscularis: vti certe quo de hic agimus, altero ad costas porrecto. Quæ igitur prædicti musculi fibræ ab elatione & pectoris osse sede incipiunt, brachium thoraci adigunt, non deorsum revequentes: nam ab humiioribus fibris, os brachij vna cum obductis ei carnis ad thoracem adductum, deorsum leuiter declinatur. Iam verò alius hic tertius succedit motus secundum primi musculi functionē, quem à regionibus propter mammæ orin diximus. Ad hæc alius quartus, quo brachium ad thoracis costas expanditur. Post confectionem illius qui sese intersecat musculi, alius tertius nobis se ostendit musculus, qui ex pectoris osse ducitur etiam originem, qua secunda, tertia, quarta, quinta, & sexta costa cum ipso coarctantur, eiusque beneficii brachij elatus thoraci admonetur. Secundum hunc sequitur, qui iuxta eminentiorem scapularum costam, evidenter iam brachium atrolat. Omnes autem isti dicti tres musculi, in tendines iatos, brachio sese inferentes definiunt. Postquam igitur tres hosce musculi ad vique articuli iuncturā secteris, scapulae à pectoris partibus separantur. Verum duo adhuc musculi ab imo sursum procurrētes, ipsas ad thoracis latera continent: quorum alter quidem in superficie tensus, ex membranis quibusdam gignitur alium cuti connexis: alter verò inter musculi, q. ab imo sursum fertur, magnæ, iniriūmq; sumens ex spina vertebrae, præcipue quibus spuriæ costæ coarctantur, cum scapularū basi haud mediocriter confortantur. His verò musculis

Humeri musculi.

Axilla cavitas à duobus formi musculari.

Brachij motus musculi.

Capituli motum ad anteriora, à quibus oritur maxilla.

Capituli motum ad anteriora, à quibus oritur maxilla.

Scapulari musculi.

Orizoides.

Musculi scapulae ad thoracem.

vig ad brachii cōfectis, & adhuc scapulae vnus: grandis musculus, ipsarum partibus cōcans sub-
nati, interuentu, costis: & offe clauiculae interce-
dente, pectoris ossi continentur. Primum igitur
ad clauicularum offe musculum, superiorem hu-
meri partem amplectantem, amputato: dein cla-
uiculam a pectoris offe tollito, membranosa cir-
ca articulum ligamina intersecans, donec mu-
sculum ab interna infernaq; ipsius parte in pri-
mam costam oblique insertum, euidenter con-
spicias. His ite peractis, scapulisq; reuulsis, va-
sa axillam perrepantia, & nervos cum membra-
nis praecido. Porro functio illius musculi qui
scapularū concaud ipsa costis cōnectit, test tho-
racē vniuersum reuellet. Sunt autē aliq; duo mu-
sculi, in vtraq; thoracis parte vnus, hic videlicet
in anteriore regione, ille in posteriori, costas etiā
revelles: adeo vt res hi musculi sint ipsio tho-
racē clauiores, prior scilicet, posterior, & medius.
Quippe medius musculus est ille de quo nuper
diximus, medio amboſq; collocatus. Ac thorax
solo hoc medioſorum musculorum coniugio mo-
tus, ab vno de istis animam subseruat. Altera prio-
rum musculorum coniugatio ex secunda ceruicis
vertebra incipit, sed ab omnibus aliis con-
sequentibus orta, in quinq; thoracis costas preva-
lida ligamenta inseritur: quemadmodum & re-
liqua coniugatio musculorum subtilium, inci-
pit quidem a sexta extremarum trium colli ver-
tebrarum, & primis simul dorſi, ac supernaſcitur
tertiæ costæ, in quartam, quintam, sextam, & se-
ptimam inserta. Quod si caput ipsius prehensum
in se attraxeris, costas sursum conuelli, di-
stendiq; thoracem, videbis. Idem & in medio
prioriq; molitur musculo, paria ipsorū magni-
tudini interualla thoracis fieri conspicias. Hæ
igitur tres sublimis thoracis musculorum cō-
iugationes, sunt respirationis officina. Quarta
deinde, quæ in primis costis consistit. Nam ad
primam sedem eius angollens musculos, prio-
rum fune costarum ossa retrahi sursum versus
deprehendes: partem verò thoracis quæ hic est,
distingui. Ceterum alia duo musculorum paria
thoracē directo: iuxta longitudinem appare-
bunt: hoc quod carnosus est, spinæ omnibūq;
illi adiacentibus costis: illud quod membranoso-
sus, pectoris ossi expansum. Huius musculi te-
do, recto ab domini musculo continuus est, om-
nibus costarū terminis, qui ad pectus pertinet,
incubens. Etenim musculus hic in omni animi-
stium genere, ad primam vig costam pertendit,
vbi & carnosus visitur, & tenui carni supernutri-
ta tendinū latitudine quandam accipit. Iam ve-
rò alius musculus huic similem habet functio-
nem, qui per spinam porrigitur, & cum thoracē
simul incipit, desinit, orbiculata circumscrip-
tione. Ceterū finis ipsius inferior, spinæ coherescit
musculo, obliquo, in posteriora vergens, vt tē-
sus costas intro contrahat, stringat. Superest
aliud vñ musculorū par extra thoracem bidū,
quod in extremis costis, thoracis inibi finem de-
orsum versus detrahit. Cuius quoq; caput, vni
inter ab domini musculos admiscetur. Muscu-
lis omnibus quos percensui ablati, situs fibra-
rum manifeste apparebit obliquus, si omnes mu-

sculos intercostales respicias. Examen autem le-
psari, a spinalibus auspicaberis muscularis & duo
cuiusque fibre extrema contuere: alius propter
spinales magis situm, demissus inde longius
remotum: tanquam singulis fibris oblique in
priora, non recto tramite, deorsum versus pro-
currētib; Spinalibus præterea exemptis, fibras
quoq; similiter obliquas ibidem ipsi subuectas
spectabis, non nunquam cum costarum conuer-
sion e situm suum variantes. Non enim vt vñ-
quodq; costæ os a spina producit, ad pectoris os
obliquum porrigitur, ab elanoribus animantis
partibus ad humiſiores inclinant: sed vbi prope
os pectoris iam cartilago vice ossis creata
cernitur, alium obinet situm, priori cōtrarium,
oblique rursus, sed circulari quodammodo,
ad pectus cui cōnectatur, protendens. Similiter
itaq; fibre ex imo sursum obliquis plate, sub-
contrariam posituram recipiunt. Hoc etenim in
costis omnibus cernatur, si spurias duntaxat ex-
ceptis, quarū exrema pectoris ossi non com-
muntur: vñ formis siquidem harum costarum
ab initio ad vñ finem latius existit. Desinit
porro ipse nodi in os pectoris, sed in cartilagine
quandam, quæ exortus sepi transferri exi-
stet. Ab externis itaq; partibus fibre musculorū
intercostalium obliquum situm formant, quatenus
dictum est. Quæ verò in partibus internis
habentur, contrario modo iuxta X. literæ figu-
ram exteriores secant. Conſpicietur autem &
& hæc facili, costis ipsi ad spinam reflexis. Vnus
igitur adhuc thoracis musculus superest mini-
me cōtenuendus, nempē septum transversum:
cuius munus existimauit Plato, distinguere dun-
taxat animosam a con cupiscibili animæ faculta-
te: quum præter illi etiam maximè sitex vñ
ad respirandi functionem. Ligamenta complura te-
nuiaq; ex ossibus procedunt, quibus simplex
circundatur caro, hoc septum habet: cuius
centrum, exiguus quidam circulus & membra-
nosus existit. Verum totam ipsius naturam mani-
festò prius contemplari nō licet, quàm octo ab-
dominis musculos dissectueris, ad quorum con-
sectionem oque dimittendum est: quoniam tū
ipsorum, tum viscerum omnium, quæ in imo ven-
tre constituent, primò omnium solitus eram con-
sectionem moliri, & videlicet diutius asseruata
computeſcerent: dein verò aliorum anatoem
persequi. Nunc autem disciplinam prædictis suc-
cedentē nō deseres, costas a pectoris offe reuul-
sas, rursus ad pectoris os reducas oportet. Dein
de quod ex ab domini cute adhuc reliquum est
detrahas: sub ea siquidem, primi & maximi duo
obi musculi occurrēt, obliqui, atq; aliis omni-
bus ab domini musculis superiſtanti, vnus quidem
a dextris partibus, alter a sinistris porrectus:
quorum musculorū suprema, maximo thoracis
musculo circa sextā costam cōmunicantur. Nec
tamen a sexta costā duntaxat, sed ab aliis etiā
a spuris, quæ in cartilagine magnam dege-
rant, hæc prima ab domini musculorum coni-
giatio oritur, obliquis fibris ad ventris antero-
ra protendens. Cuius vterq; musculus tum ad
ilium ossa, tum ad inguina cōtraria præcedit, ac
pubis ossi, per membranē, sed validū tendit,

Costas reuulsi
in musculo.

Respirationis
officina musculi

Fibra musculo-
rū thoracis ex
terna quam le-
uissimè quicq;
sua fortianur

Costarū spuria
rū extrinsece ossi
si preterea non
committit, sed
desinit in car-
tilaginem.

Fibra musculo-
rū thoracis in
terius habere
latentem clau-
nam externam
ram latens.
Sepi transferri
si consideratis.

Anatomem cap
Calcem ordi
sileat ab infer-
riori ventris.

Abdominis mu-
sculorum confi-
deratio. Obliqui ma-
sculi abdomi-
nis.

ante inguina ortum, inseritur. Hoc interdū tendine relaxato (qui & peritonæum, & ea quæ ab ipso ambiuntur permeat) aliquod intestinum, aut omentum pars, propriam sedem egreditur, ac per ipsum laxitatem elabitur. Qui morbus cele, atque raxer dicitur. Pars autem horum musculorum, quæ ab ventris anteriora porrigitur, in tendinem tenuissimum definit, rectus extrinsecus musculus superpositus. Pars modo & secundæ coniugationis musculorum abdominis (qui obliquum fibrarum situm primis contrarium possident (tendo in membranā degenerans, anterioribus musculis insidet. Vterque verò horum ex illo osse ducit carnosam originē. Hinc deinde oblique sursum protēti, musculis transversis insident: postea quatuor notuarum costarū finibus, carnosā intercedente substantiā, iunctiuntur. Tendo autem ipsorum tenuis, medius inter rectos musculos, & prædictorum tendinem, pergit: uterque ab ea regione ortus, quæ circa externā rectorū musculorum latera posita est. Porro ipsi recti musculi, qui eædem coniugationem constituunt, tota substantia carnosā, à superius deorsum versus descendūt, atque in pubis os carnis in serventur inseruntur: quæ in parte exacte iuncti coeunt. Nā elatior ipsorum portio adiacet quiddā nō aut accurate advinum. Quærit & vitima coniugatio rō ex recta illiū ovis linea, tū ex lateraliibus vertebris, q̄ in lumbis videntur processibus, ex oritur. Verū nō statim simulatq̄ uterque enascitur, efficitur musculus: sed membranōsum ligamē valens ex cōmmeratis ossibus productū, deinde in processū fibræ adauctū transierit, in musculi figurā degenerat, partibūq̄ internis cuiusq̄ spuris costæ finium subtiliter, necnon rectis miscetur musculis. Cuius tendo curiosè dēperito neco auellendus est, cui vel maximè adhaeret. At peritonæum latè araneorum telis simillimum est, simplex & tenue insignitur. De ostio igitur in abdomine musculari, iuxta primam anatomicæ ipsorum administrationis speciem, quæ longè facilius & aptior est, abvnde satis disputatum exiit. Ita verò & coniugationes ipsorum vocales licet: primam sanè maximorū obliquorū, qui à sexta thoracis costā incipiunt: secundam, his subcontrariorum obliquorum: tertiam, rectorum: & quartam, transversorum. Poteris etiam ab ipsis musculis anatomicè aspicari, ubi recta linea vniuersum abdomen in dextram & sinistram regionem distinxeris, ab eorū ipsam cutem detraxeris, à rectis musculis separare primum superficialium maximū musculi tendinem: deinde secundum ab ipso, qui à secundo nascitur. Vbi verò utriusq̄ vtriusq̄ connexum ostenderis, rectorum musculorum connectionem aggredere, ac deinde eorum, qui subditi sunt, semper fibrarum continuitatem vsq̄ ad ipsum musculi caput sequutus. Sic enim totum opus tibi clarum euadet, vt nihil confundatur. Atq̄ hæc tenus de præcordiorum musculis. Intestinis exemptis, primum septi ex spuris costis processum indicare expediet: dein quo modo do spīne inseratur, pate facere: postea particulā ipsius distinguere. Etenim medium ipsarum est musculus, qui in tendinem laterum omni ex parte à carnosus comprehē-

sum definit. Ex utraque autem ipsius parte, superiora puta & inferiore, tenuis membrana adherescit: quarum elatior, quæ duplex est, totum thoracis cauum sublimet, à dextra parte altera, à sinistra quoq̄ altera. Non enim vna quædam est intra thoracem spaciōsa laxitas sibi cōiuncta, sed à prædictis membranā interscipitur, quæ recta linea ad pectoris longitudinem murus sibi cohererent, nisi quantum ea in parte abcedunt quæ cor situm est. Hoc enim inter se medium capiētes propria inclusum membranā, quæ pericardium dicitur, ita ad micronarum vsq̄ cartilagineam porriguntur. Totam itaq̄ vtriusq̄ thoracis regionem internam, membranæ quædā succingunt, natura simplices, telæ araneorum per similes. Bases ipsarum supernis septi partibus oblecta est: quemadmodum inferioribus alia quædam membrana similis huic substrata, quæ peritonæi vertex iure optimo nuncupatur. Ceterū hęc membrana sibi continua totam inferiorem septi transversū regionem sublimet: ex ubi illud vsus necessarii gratia foratū est, ibi eis ipsi quæ permeant, circumhæret, simulq̄ expanditur. Sunt enim duo foramina septi: alterū grande, quod venteris via exhibetur, stomacho & magne arterie præparatum. Reliquum verò minus, venarum cauum supernis animalis partibus sanguinem diuertentem, excipiens: quæ vena prius cæteris partibus dissectanti occurrat, ceu & in sublimi suspensā, & nihil ante se continens, musculis sublatis. Detectis quæ infra septum habentur, nihil maius fuerit membranam lumborum carnis superstratū detrahare. Est autem hæc, peritonæum lumbis coherescens, quo avulso carnes ipsorū clare conspicies: singulos nempe vtriusq̄ musculi exactos perspicue longitudinem sibi murus connexos, de superq̄ toti lumborum longitudini expansos. Qui quidē quum prope os sacrum pervenerint, diminuntur invicem, internis illiusq̄ adnatescentes: in quibus quidē musculi duo tēdines reperitur, quos anatomici nervosam musculorum propaginem nominant. Prædictis itaq̄ duæ lumborum carnis partes tenis, deorsum flectunt tum eam partem spinæ, quæ per lumbos totos habetur, tum eam quæ dorsi continuat est. Pari modo musculi stomacho subditi superiore spinæ partem in flectunt. Verū lumborum carnes in seipsis caput obtinēt tendinis, qui ad femorū trochætera pertinet. Iam verò post prædictos omnes musculos, spinaliū totorū processūs diligenter cōsidera. Incipit etenim ex secunda cervicis vertebra, singuli duo capita inuicem disuncta obtinentes. Semper autem magis ac magis corpulentū euadunt, quā vsq̄ à tenuibus onantur capribus. Nā ex vnaquaq̄ vertebra processūs aliquis ipsis miscetur, ac inibi collum permeat, tum magni rudine, tum robore insignes sunt. Et primum in colli extremo in idem coeunt musculi, inibi vera quæ spinæ parte nati, hic dextra, ille sinistra, vt omnia amborum musculorum capita, quasor numeret. Fibræ autem ipsorum oblique sunt: quædam à spina ad priora inferiorisque decurrentes: nonnullæ contrā, ex lateraliibus orientes processibus, quæ retro, deorsumq̄ vergit. Qui-

Membrana sub
linum thoracem.

Thoracis capaci
tatem esse in
duas laxitates
divisam.

Pericardii in
volucris cor.

Peritonæi ver
tex.

Septi forami
na duo.

Vena caua.

Lumborū mu
sculū duo.

Spina partē à
quibus flectun
tur musculi.

Spinalium mu
sculorum pro
cessus.

Spinalium mu
sculorum capu
ta quatuor.
Spinalium mu
sculorum obli
qua fibræ.

Cele.
Raxer.

Recti musculi
abdo minis.

Transversi ab
dominis muscu
li.

Peritonæi ara
neorum telis si
millimum.

Abdominis mu
sculorum quorū
tuo coniugatio
nes.

Septum trans
versum nati
ab spuris co
stis.
Septi transvers
li partē.

bus diligentem adhibe curam, dom vtroq; musculo dissecto, ad lumbos deveniet. Ibi siquidē musculi ex ligamēto quoddā membraneo, quod à locis spinæ prodit, gignuntur, ex ima parte ad posteriores thoracis costas sursum paulatim oblique tendētes. Atq; hi musculi extremas costas detrahunt, ab anatomicisq; sunt prætermitti.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationibus

Lib. VI.

Similem homi-
ni similitudinem
esse.



SIMILIA igitur homini similitudine est; præcipue pedibus atque manibus. Quam si conspexeris aliquando eam remem figura erecta, statim ex longinquo eam similem homini deprehēdes. Quæadmodum ergo præstat, simiarū homini quā fieri poterit similitudinam discicare artus, quom te in exemplo exercere stude: ita statim eā in talis similitudine etiam dissimilium aliquam capere: sicut enim si in totum simia delideretur, cynocephalū, vel saryrum, vel lycenem, summam similitudinem ex animantia, quibus artū extrema in digitos quinque diffusi sunt. His animantibus succedunt, vrsus, leo, & quæ serratos dentes forniuntur. Ex actionibus autem quas obeant, & figura particularum, quam singula animantia extrinsecus habere videntur, nonnulla & de structura ipsorum tibi indicatio sumetur. Nam quæ anima

Animalia fo-
rmas apte de
simia corpore no-
datur.

Animalia que
similia de can-
ibus.

Natamque
animanti cor-
pus animi esse
liberum et
fractum.

Animalia om-
nia particula
venerunt simul
et nata sunt.

Cibi instrum-
ta triplicia.

Ventriculus ci-
bus recipiendus
conditus.
Iam maxime
alio alterate
alimēto, quod
pulvis per ve-
nas digerit.

nuper commemoravi. Ex his instrumentis, alia quod subtile & leue in ipso habetur, expurgat: vt bilis meatus, velsicq; bilis exceptrix: alia quod terreire est & graue, vt lica, & ima pars intestini recti: alia quod inter hæc duos consistit, aquosum, serosumq; vt vnamq; meatus, renes atq; vesica. Cæterum vt pro arbitrio animantis superfluo excreto fieret, musculis natura terminis valorum ea connectentiā fabricata est, quæ ter-
10 tia iam ratione inter obia instrumenta habentur. Itaq; necessarii ita hæc instrumentorum genera in omnibus animantibus ad alimenti distributionem natura condidit. Atq; hoc est commune & idem in vniuersis. Quoniam verò nonnulla animalia validis aluntur cibis, quædam imbecillibus, ed natura respiciens, particulares ventris differentias est machinata. Quare si aliquando videris animal nbi nunquā cōspēctum, quod alimētum lignēū & spinosum edat, magnum huic & asperum notis esse cōstruam ventriculum.

Vesica bile co-
cipit.
Lica.
Inestum re-
flect.

Renes. Vesica.

Ventriculus
pro diffusi-
to cibum,
esse à natura
cōstruatur.

Animalia car-
tis, in pectus di-
stribuit, habere
ventriculum
graculum.

Corrigere cor
magna ex par-
te iuperum den-
tibus caruit.

Omnium cele-
ritate ferendi gra-
tia conditus est.
Naturaque re-
nes amens per
ipsum ad hepatis
portam.
Ventriculus pro-
tendi omnibus
necesse est.

Si autē etiam superiores dentes non habent, ventriculum ei necessariū plures existeret, vt in primū statim populum ingerat: mox ex hoc ruminans, ore consistat, ac deinde in alium atq; item alium ventrem deglutiat, et iudicandū. Contra verò quibus superior dentium acies concessa est, ea animalia nec ruminare possunt, nec ventres plures habent, tam cornigeris magna ex parte supernoas dentes abesse nouimus, vt quibus terreire capitis partū trementū in cornua absumat. Itaque instrumenta quæ cibum cōsumunt, tantam magnitudinē possident, talēq; formam, qualis alimento ingerendo requiritur. Omnes igitur venas quæ per intestina, ventriculum, he-
10 nem, omentumq; (quod vel vti congenitū operculum, caloris gratia conditum est) intercurret, portigat ad hepatis portam videbis. Porro musculos vniuersos inferioris ventris mucronata cartilagine vique ad pubis ossa iudicans, in corpus quoddam tenue, & laxæ arancorum telæ simile incidit, cui ob id nomen inditum est peritongo, quod simplex & simile existens, pretendatur omnibus tum visceribus, tum intestinis, tum vas-
15 sis, cæterisq; aliis corporibus, quæ inter sepium transuersum & crura habentur. Ipsū autē separa-
te incipies in vento loco, vbi per se cōsistit, nulli musculorū incumbentiū adhærere: nempe vbi multo post regionē vmbilici, vbi primū à transuersis sedentibus musculis, atq; solum relinquitur. Etiam quom graue satis animal fuerit, li-
20 cebit facile peritonæum sibi continuum & integrum ad costas spurias vsq; seruire: vbi transuersi musculi desinentibus, alius excipit musculi, nempe sepium transuersum. Siquidē luum quoq; substantia musculi ex ætate figura, circulari existit. Quod in medio ipsius habentes, zorum nervos sunt. Quod autem in orbem hoc ambir, vniuersum carnōsum existit. Peritonæum itaq; carnifici septi particula ob oritur, à qua eodem modo detrahente ipsū conuenit, quod & à reliquis musculis auulsum fuerit. Sordiose autem incumbenibus operi, facile liberatur, quo-
25 vsq; ad caas venam peruentū sit, propter quæm gibba hepatis sepiō transuersio adiacent, & connectuntur. Ab hoc cōnecti vniuersi finitimi regio-

Adi. Transuersi
musculi.

Septi transversus
sustinet vni-
uersos musculos
sepios, ambire
non cessat.

mus. M.

Septi transversus
connectunt.

nem, peritonaeum humiliter cum ore ventriculi
coit, deinde toti capacitati crassius seipso factū,
obducitur, sic tamē ut non magno negotio pos-
sit ab illa seungi. Quanto autem imbi crassius est,
tanto tenuius iecori obducitur, omnesq; ip-
sius particulas, cum tunica quēdā peculiaris, cō-
tegit. Quod verō adharet ventriculo, germi-
bus venarum, quae in illum descendunt, involu-
crum, vallū, firmamentūq; efficitur. At quem-
admodum exiguae grandium vasorum propa-
gines in ventriculū demerguntur, ita in primum,
cum ad vmbilicū, aliae paruae, magnarū soboles,
ex alto deferuntur, duabus peritonaei partibus
comprehensae. Ex hoc corpus ex duplici perito-
nari, seu plexu (intra quem continetur vasa) con-
stitutum, dicitur tum omentum, tum epiploū.
Oportet autem venam vtrobiq; gibbum ventri-
culi intercurrentē persequi accuratissimē. Si quid-
em per dextram animantis partem deducere,
ad processū, quo tenue intestinū ex ventriculo
oritur: altera parte ad lienis concava, in sinistra
posuit. Cuius visceris gibba pars ad extrema no-
stharum costarum conuersa est, & quicquid huius
ad sinistra illa contiguum est. Concaua autem
ad dextram partem inclinat, contra iecur & par-
tes inibi sita. Mittit itaque a se vasa illa ramos
quosdam exiguos, partim in lienem, partim in
omentum. Non tamen vni in lienē absumitur, sed
quod ex eo restat, vni cum arteriā sibi iuncte re-
liquo, deorsum versus, per sinistra illa pertendit,
sistit omēto generationis principium, penes hanc
partem. Eodem modo in dextra illius omenti
porro descendit, cum illius loci vasis, quae in
ventris gibbo sese contingunt. Quapropter &
hic illud, tanquam indicem sequitur, ad am-
plius ipsius originem, praeter iam dictas, conspi-
ciunt. Porro inferior omenti porro, pancrotes ve-
nas & numero & magnitudine obnoet. Enasci-
tur autē ex ventris sinis, vnde & vasa habet, reli-
quias quosdam simul ipsi deorsum versus abdu-
cenna. Omnes autem hae particulae sibi mutuo
continuae sunt, corpūq; vnum, nempe omen-
tum, constituit, idē figura marsupij, quod orifi-
ciū quidem ex ventriculo exoritur superius & in-
ferius obinet: totū verō eius spatium, quatenus
ex dictis consistit principis, deorsum versus pro-
cedit. Adnascitur autē interdū omentū ipsum al-
icū subre iecoris, lienis, atq; etiā colo. Sed quale
nam sit omentum, & vnde oriatur, si ad prae-
dictum modum confectionem moliaris, haud ex-
gre inuenies. Quam autē male sit coniugatio-
nes ex arteria, vena & nervo, in singulis orbi-
bus intestinorū: in super multa inter eas spatis,
in quibus duplex peritonaeum habetur: ex his o-
mnibus consistit mesenterij substantiā, ipsi omē-
to persimilem, intelligit. Hoc siquid corpus,
quod mesenterium, mesarcum, & lactes dicitur,
medium inter intestina habet sitū, & omnes ve-
nas ex iecore in ipsum descendentes, vna cum
vicinis arteriis & venis, in orbem complectitur,
quemadmodum ipsa intestina singula. Vbi igitur
vasis & intestinis obducitur, simplex est: vbi
verō ipsis medium interiacet, nō amplius inda-
menti vsum, sed copulae exhibet, nimirū duplex
quod sit. Quod si obiectum ab vnde animal fue-

rit, catenus augeri mesenterij pinguitudinē acci-
dit, ut interdum vasa confendat. Quamquā in
huiusmodi animantibus etiā alias plerūq; pe-
ritonaei partes pinguedine habere conspiciamus,
praecipue in quibus non grandia vasa habentur,
& viscera longius absunt: quippe a calore lique-
scit, a frigore conseruitur: utq; ob id semper in
nervosis consistit partibus, & us qui onofam vi-
tam agunt, abvndat. Talis sanē personarū, & eo-
rum quae ex eo gignuntur, natura est. Porro me-
senterij arteriae ac venae inuicem coeunt, cum in
arboribus ipsis radices, ad principium vnum o-
mnes perveniunt. Iam verō ea quae intra perito-
narium consistunt, praestat singula per se, ex cor-
poris exempla, inspicere. Licebit etiā, post exem-
pta intestina, glandulas mesenterij vna cum vasis,
quae ad ipsas perveniunt, ab illis ortu, quae fere-
bantur ad intestina, intueri. Ventriculo igitur, at
que singulis intestinorū, duae tunicae insunt: vni
ca autē tum vesicae, tum valvae. Habet autē in-
terior ventriculi tunica, fibras rectas, exterior or-
bicularis. At intestinis, plerūq; circularis insunt
fibras, quibus pauculae rectae superpositae sunt.
Omnia igitur haec cunctis animalibus sanguine
praeclata insunt: quibus omnibus etiā & iecur in-
est. Quae verō secur habent, us & lien omentum
est, & meatus qui bilem excipiant, celi fellis vesica
nonnulla careant. Cuius situs idem ipsam for-
tis animalibus, sub maxima fibrarum iecoris
perpetuo est. Non tamen iecoris fibrarū pares nu-
mero, vel genere, vel specie, vel magnitudine, in
animalibus cunctis habentur. Cuius enim &
tundis adest magnum iecur, multissimūq; di-
versum autem, contrario modo affectus. At qui-
bus magnum est, in plures maioreq; fibras,
quam hominibus, scilicet est: quamquā in homi-
nibus vniuersis, nec magnitudinem, nec fibrarū nu-
merus similis visatur. Occupat autem interdum
paucis in hominibus partem sinistra iecur, si cu-
rit & in multis animalibus alia. Intestinorum na-
tura, quatenus intestina sunt, omnī eadem ha-
betur: magnitudinem autē & numero anfra-
ctū evanet. Primum igitur intestinū est, quod
exoritur, siue lappus vocant, pyloro continū.
Ab hoc secundum, quod a duodecim digitorum
longitudine, dodecadactylon dicitur: ieiunum
autē, quod cibo semper sit vacuum. Tertium te-
nuis intestinū, est substantia huius simile. Differt
autem, quod neq; reperitur vacuum, nec tot va-
sis scateat. Quartum est, quod cecum appellant.
Quintum, quod colon. Ab hoc in extremo re-
ctum intestinum ad sedem usque porrectum est.
Sic & lien in sinistra parte consistit, concauo ip-
sius in dextram conuerso. Atque vena quadam
ex iecore ad ipsum pertinet, cuius processus in
ventriculū derivat. Porro iecur vena ex me-
senterio ad concauū ipsius partem pertinentes,
excipit. Vocant autem hunc locum, in quem om-
nes venae meseraicae se colligūt, portas, hic enim
reperies maximā venā: ea, in quam aliquo spe-
cillo immisso, per singulas fibras leuiter ipsum
propellēs, substantiā incombentē scalpello prae-
cides, donec ad eam venam, in qua latet specul-
lum, perveneris. Haec detecta, sic ut ipsum nō dis-
secueris, carnē visceri circumdatā vasis inde pro-
cedentibus,

Omenti quid.
Epiploa.

Lienis positio.

Omenti figura

Mesenterij sub-
stantia ex qua
bus consistit.

Mesenterium.
Lien.
Meseraica.

Pinguedine
a calore lique-
scit, a frigore
conseruitur
Meseraica vi-
na.

Ventriculi sin-
gulis intesti-
norum duae tu-
nicae insunt.
Vesica & val-
vae vocantur
ca insunt.
Fibra ventri-
culi circularis.
Sanguine prae-
clata quae in-
sunt.

Vesica fellis fi-
gur.

Iecur magnam
multitudinem
fibrarū gaudet
& tenuia.

Iecur nonnullis
hominibus in si-
nistra parte lo-
catur.

Intestinū na-
tura, & ordo.
Evertitur ieco-
sum.

Dodecadacty-
lon situm.

Tenuis intes-
tinū situm.

Cecum intes-
tinū situm.

Colū intes-
tinū situm.

Lienis sinistra
parte locatur.

Vena a liene
in ventriculū.

Portae regna.

cedentibus intermediis adminit. Siquidē a potius in singulas fibras, quotquot fuerint, venā vnam grandē porrigi deprehendes, quā in exiles multas diffusā, sicuti & illis in alias, quantū vasa intrinsecus, totū visceris carne repletum est, quam tamen dignis eximere poteris, ut vasa ipsa nuda cernere liceat. Quod aut in vna tibi fibra con specū fuerit, id compertes in omnibus. Quod si exacte portariū regionem sequaris, spectabis etiam meatū ex bilis vesica, ad intestinorū produ ctionis initū pervenientē, non multo inferius, quā pylorus habetur. Qui meatus, quā huic inferi-
10^o oritur, ramulū de se paulo supra pylorū emittit. Omnia itaq; hinc accurate intantur, dein de hepatis gibbū accedes, illā ipsius fibrā incidens, cuius concana in parte venas detexeris: quippe venas similiter in gibba sine arteris propagari cernes. Constat autē vena ex vna duntaxat tunica, sicuti arteria ex duabus. Sed iam ad renes ire tempe-
15^o stūū videtur, quorū dexter in omnibus animan tibus elatior eminens, nonnunquā grandem seco- ris fibrā attingens. Porro & ipsius vasis, arteria nepe & vena, inferuntur in eos haud exiguae ma- gitudinis vasa, similes quidem singula vtrinq; aliis autē quibuscūq; animalibus, binā. Insuper cō-
20^o canum in sese renes cōversā obnūtiat: gibba verō ad autem nas latera ad versa. Evidenter autē renes si- num cernes, corpore quodā membraneo circū datū: cui quidē haud, sicut a vasorū insertione, al-
30^o terum quoddā corpus in vtroq; rene adnascitur, concavū & oblongū, ad d. deferens lotio, vtere-
40^o r, hoc est, vrinariū meatū nominat: qui vna ran- tium tunica cōstat, crassiori tamen q̄ quā inest ve- ni. Ha igitur duo poti, substantia quidē vesicē si-
50^o miles, obliquā sūmā in eam inferuntur, in cuius regione interna, tale sortiuntur operculū, quale in columbaris scyphones dictū. Est siquidē tam sapienter constructū, ut ab eis solum recludi pos- sit, quā p̄ meatū deferuntur. Mox aut deprehen-
60^o des, quā meatus vrinariū peritonēo (quo ob-
70^o voluuntur) nudatus, & arteria & venas simili- ter suspensus, ad peritonēi foramina quibuscūq; deduci has quidē vt testes nutrant, alias vt gene-
80^o rani subseruiant. Superest autē vt tertiū tibi in-
90^o strumentorū differēntiam cōmemorem, quā vi-
100^o mirum musculi sunt, alq; in abdomine, nō excep-
110^o tentis tantū egerēt, sed ad efflāiones quoq; & voces addendū, cōmodi: alq; in sede ad strin-
120^o gendū, claudendūq; meatus extremū, accōmoda-
130^o dū, quibus etiā revelatur sedes, si quando per
140^o defectiones crebras, plapla fuerit. Vbi igitur pu-
150^o bis ossa, cartilaginīs interveni cōstantia, didu-
160^o xeris, in exteriorēq; partē vtrūq; illū os deron-
170^o feris, conspicies sane ligamentū quod tum ex la-
180^o to offe, tum ex pectine optat, in vniū musculi cor-
190^o pus degenerare, magni quidē, sed methu ramosi,
200^o laniq; ad sedis vtrūq; partem produci. Eo igitur
210^o tempore, quo animal aliū exonerat, octo abdo-
220^o minis musculi pariter cum septo, pro cōmuni o-
230^o minium musculariorū functione tenduntur: orbicu-
240^o lari musculo relaxato, qui circulari sedē com-
250^o plectitur. Reli q; omni tempore circularis hic
260^o musculus contractus, sedis os claudit. Similiter
270^o dum vesicē termini musculū, vbi primum i-
280^o plius ceruix oritur, detexeris, haud dissimilē ei

esse ab illo sedis orbiculari compertes, tum fun-
ctione, tum vī: quippe & hic, sicut ille, orificiū,
cui prepositus est, constringit.

GALENI PERGAMENI de anatomicis administrationib. lib. VII.



1^o Oc libro quomodo spiritalium in-
strumentorū confectiōne admini-
strēs, explicare proposui. Pulmo igitur,
cor, & thorax, principaliora spi-
ritus instrumenta sunt. Mox atten-
dunt genus duplex: vñ a sinistrio cordis ven-
triculo in vniuersum corpus propagatū: alterum
quod earum est arteriarū, quas alperas vocant.
Quarū quidē in ceruice vna maxima exiit, quā
frequenti ramorū serie pulmones adit. Cuius
periori extremo, velvñ caput quoddā, incumbit
particula larynx dicta. Hæc itaq; vniuersa, prima
2^o rā ratione natura condidit: quæ dā necessariā ad
vitā ipsā vīus gratia: quæ dā vñlia, non tamen
animantibus necessariā. Im verō aliā quandam
cōstruxit particulā, quæ & substantiæ peritonēo
similis compos est, & eundē vīus omnibus spi-
ritus instrumentis, velvñ illud cibi, exhibet. Est
autē particula hæc, ipsa costas succingēs membra-
na, quæ omnibus intra thoracem instrumentis
obducitur, quemadmodū peritonēū vasa quæ
infra septū habentur. Ex ipsa autē, membrana tho-
racis interceptantes iacuntur. Atq; hæc sola re-
3^o structura ipsius a peritonēo evanuit, quod vide-
licet duplex omnino sit, non vna, quemadmodū
illud. Porro naturam ipsius accurate perdisces,
quæ pectōris, vbi detectū prius fuerit, secundū
longitudinem dissecueris, vīq; ad cartilaginē
enilōrem, ac dein vtrinq; pectōris partem le-
uiter in exteriora reduxeris, ita vt pericardium,
qd̄ ambū cor, minimē videretur. Quod si id sic
ri nequeat, membranā tamē thoracē interscien-
4^o tes, ab affectu immunes permancant. Sic siqui-
dem vtrāq; mēbrana, tam quæ dextras, quā quæ
sinistras succingit costas, quæq; supernis parti-
bus, ipsiq; pulmōni obducitur, sibi cōtinua appa-
rebit. At cordis tunica peculiaris, pericardios o-
mine, diuersa ab vtrāq; harum exiit, in medio
amborū sita, & vtrinq; ab ipsis cōprehensū. Non
tamen ipsi cordis corpori pericardios hæc tuni-
ca anaxa est: verū circa alias quidem omnes
ipsius partes, haud parua quædā regio interme-
dia exiit, morui cordis accōmodata: ad basim
verū eius, quæ orbiculari est, produntibus ab il-
lo vasis, a quibus trahit orū, connectitur. Porro
quemadmodū pulsans viscus, omnes appellant
cor, sic enī pulsantia vasa, arterias nuncupit. Cē-
teras igitur omnes arterias pulsantes, quotquot
5^o toto insunt corpore, sensū dignoscere, nullus
est negotiū & omnīū ipsarū cum maiore arteria
cōgnūtat, idē hoc indicat. Verū in pulmo-
ne pulsantes, sensū admodum euidēter depre-
hendere nemo potest: inde tamen, quod sinistro
ventriculo sint continuæ, coniecturam aliqui
fecerūt. Etenim quod vas ex sinistro cordis ven-
triculo in pulmones deferret, tamēsi corpora
quidem substantia, si vena, hoc est, venæ tuni-
ca cōnect, vīū tamen venosū arteria vocatur.

*Bilis ex duobus
curantur: quæ
per os defici-
lenti.*

*Hepatis gibba
habet tres ar-
terias vnas.
Vena cōstat ex
vna tunica.
Arteria ex du-
bus tunicis con-
stat.
Renes duntaxat
duos musculos
habent.
Vasa in rene
inferiora & ma-
giore vena et ar-
teria,
Renū ventri-
culi.*

*Vrinariū poti-
one vna tunica
tunica cōstat.*

*Vtriusq; vasi
vniū intra vtri-
que operculū.*

*Vasa in testis
delata.*

*Abdominis mus-
culorum vīus.
Sedus musculi
vniū vīus.*

*Ossa vīus a
iunctis p̄ iunctis
fuerit, q̄ sedis
quasi.*

*Spiritus vāstris
necesse princi-
paliora quæ
Arteriarum ge-
nus duplex.*

*Afferre ar-
terias.*

Larynx.

*Membrana cor-
poris succingit
est duplex.*

*Pericardium
ambire cor.*

*Pericardiq; si-
milia.*

*Cor pulsans
corpus
Arteria vasa
pulsantia.*

*Arteria venosa
ferret in pul-
mones a sinis-
tro cordis ven-
triculo, vena
tunica cōstat.*

Vena arterioſa
dentibus tunica
conſtant, proinde
inter ex pulmo
ni ex dextro
cordis ſpecu.

Quod verò ex dextro procedit, tamenſi duas for
natur tunicas, perinde vt arteria, quia tamen nō
pulsat, appellatur vena, fed arterioſa. Optimum
quippe fuerit, pulſu, atque eius defectu ipſa vaſa
diſcernere. Verūm quūm huius ſenſibus nō adeo
clare diſtingui queat, à communione quā cum
vetroque cordis ventriculo habent, indi nomen
debet: appendix verò, à corpore ſubſtantiā. Ce
terū iuxta corporem ſubſtantiā arteria qui
dem eſt illud vaſ, quod ex dextro cordis ventri
culo oriſtur: vena autem, quod ex ſiniſtro. Con
trā, vſus ratione, quod ex ſiniſtro prodit, arteria
eſt: quod ex dextro, vena. Totius igitur corpo
ris venæ, ex peculiaribus vna tunica conſtant: arte
rie verò, ex duabus: quarum exterior quidem,
qualis venæ tunica exiſtit: interior autem, craſſi
ſſime huius ſerē quintupla, duriōr, & trāſverſi
fibris diſtincta: qua luteria ſuperficie habet ali
am, ceu cuticulam quidam araneorū telē per
ſimilem. At exterior, quā etiam Venæ obtinet, ad
rectis fibris, & quibuſdā mediocriter obliquis,
trāſverſis nullis, contexta eſt. Ex tribus itaq; va
ſis pulmonem intextentibus, quod à ſiniſtro
cordis ventriculo proficiſcitur, niſcupetur arte
ria venoſa: quod à dextro, arterioſa vena: tenſiſ
ſima, aſpera, ex cartilaginibus quoq; imaginem
C referunt, fabrefacta. Quæ cartilagineſ circula
res, tam in grandi arteria, quæ in collo cunctis
rationem obtinet: tum in parvis, quæ ab illa
in pulmones Inſerte ſunt, in priori parte ſinum
habent: in collo quidem, vicinæ oſophago: in
pulmonem autem, venæ quā paulo ante voca
uimus arterioſam. Porro vaſorum intercapē
dines, peculiari pulmonis ſubſtantiā replentur: Li
cet autem pulmonem thoracis exemplum, ſicuti
& cor ipſum, incidere, non tamen ſiſa ſocietatem
ipſorum, quā cum membranis incuit, cognoſ
cere. Iam verò oſium thoracis naturam ſimili
ter ſpeculabere, quæ eſt videtur quidem, corde ſi
militati exemplo, in conceptu prodit: quāquā
& inſtro adhuc ipſo, palam cernatur. Præterea in
tali adminiſtratione, præter ſimilitudinē comēmōratā,
hoc conſpicies: nempe cor, inter vtrūq; tho
racis ſpacia medium, conſiſtere. Motus autem
ipſus indicat, quāſi in parte ſiniſtra ſit colloca
tum: idque duplici de cauſa. Primiū, quia ſpi
ritus conceptaculum hic conſiſtit: deinde, quia
vertex eius ad hanc magis regionē eſt inclinat.

Venaſ tunica
corpora conſta
nt ex vna tuni
ca: arteria
ex duabus.
Arteria tunica
quad.

Arteria veno
ſa.
Vena arterio
ſa.
Arteria aſpera
conſpicua.

Oſium thoraci
cis ciliatū.

Cor inter v
trūq; thoraci
ſpacia medium
conſiſtere.
Spiritus rece
ptaculum hic
conſiſtit: quia
vertex eius
ad hanc magis
regionē eſt inclinat.

Porro coſte ſingule deorſum verſus ſitū &
proſum ductæ ſeruntur, ex ſpina ducētes or
tum. Nam duplicibus imbi articulis eam vna
quaq; doſi vertebra committuntur. Vbi verò
ad ſectoris regionem pervenimus, cōſtans mo
do, fed oblique etiam ad os illius inſtillantur: v
bi cartilago vice oſis genitā, dūctū ſimilitudinē
obinet, ſicilicet acuto ſimul & valenti ſcalpello
poterit incidī. Rectam itaq; vtrūq; parte inſerit
deorſum verſus per totam thoracis regionem
ducens, eam pectoris partem attingit, quā v
trūq; ductæ lineæ diſſinunt: poſtea verò dū
eas latera, robore maximo adhibito, ad reſe
cendās eas partes coſtarum, quæ vtrūq; vici
ni exiſtunt. Sic enim omnes thoracis partes p
lūm intueri licebit, ac multo magis ſepo à co
ſtis abſciſſis: in ſuper hoc magis aduſ, ſi diabus

coſtis diſtēptis invicem, omnem carnem inter
mediam præcidas. Sic igitur & venam cauā ma
niſeſtē ad iugulum vſq; recto tramite percurrēt
te cernes, & cordis proceſſus, quoſ aures nomi
nant, peculiarem naturę forſitantes ſubſtantiā,
quæ in alia nulla particula habeatur, quemad
modū proſectō & cordis ipſius eſſentiā. Quod
autem corpore cordis ſubſtantiā, permulſum à
muſculo diſſerat, ex illius fanē conſtat actiōne:
Eſt enim cordis motus non arbitrarins, nec ceſ
ſare, quoad animal vita fruſtur, poteſt. Muſcu
lorum autem functiō ſubinde quieſcit, ac ru
tus excitatur, ananantis arbitrio ſubſerviens.
Actiōnes verò imitantur proprietatem ſubſtan
tiæ. Huius rei gratia, quæ quidem particulę ſan
dem ſpeciem ſubſtantiæ poſident, ſimiliter o
perantur, eſſi diuerſis permulſe animantibus in
ſerit: quæ verò non habent, diuerſa harum eſ
ſentiā, quāvis vnus animantis particulę eſ
ſentia. Quapropter nec muſculi eandem cū cor
de functiōnem habent, quoniam nec ſubſtan
tiā. Etenim ſi quis cor & muſculum quemlibet
pariter coſum, vtrūque giſtatur, haud medioc
riter ipſorum guſtu diſſerentiam perſentiet: id
quod ſubſtantiæ diſſerentia maxima nota ex
iſtit. Hallucinatur igitur quod muſculus eſſe
exiſtunt, aut nerui id ad ſuam functiōnem ege
re non intelligentes actiōis ipſius excellentiā,
ex ſua viſceri ſubſtantiā neceſſario inſeſe. Cor ſi
quidem thoracis exemplū, dū moueri videtur
quæſitū ſeruat ad eum motum non indiget. Qui ſi
ſimilem motum præſtare poſſent, cur extere par
tes cui nerui inſunt, non ſimiliter pulſare videntur.
Porro omnes neruōs vtrūq; facultatem ha
bere, ſenſum nempe & motum, ratio eſt.
Verūm molles ad ſenſum aptiores, duri ad mo
tum exiſtunt. Ab eadem tamen radice pluries di
ſciſſa, apparent quidam nerui in muſculos, alii
in alias particulas inſeri, quemadmodum & in
terna ipſorum coniugatione, & ſexta nihilo mi
nus, habere nonimus, à qua cor exolem quædā
neceſſum accipit: vnde etiam pulmo, iecur, ven
tricular, et meſenterium in ſuper totum, vna cum
intēſtinis, necnō vniuerſi laryngis muſculi, ſub
exoptant præpāgines. Iam verò cordi, quod a
nimatoſe virtutis inſimū eſt, ac veluti ſonitū
ſtanti natiui caloris, aures quædam annexæ ſunt,
neruoſiores ac magis cunctatiles ipſa cordis
ſubſtantiā: Quæ particula & colore nigriorē
habet, & corporculis cunctatilibus manifeſto ſi
miles, ſinus cuiuſdam ante cor efficiendū grana
ob quam rem, ipſis natura & concavas & cuncta
lites condidit. Duæ verò hæ ſunt, in vtrōq; vaſo
rum materiā inuēntum ſingula. In dextra
quidem parte, quæ vena in cordis ſinum inſer
tur: in ſiniſteriori verò, quæ arteria venoſa. Hæ
aures quæ aperiri, tum ipſum cordis corpus
in conſpectū erit, tum ex dictis oriſciis vtrūq;
deius de membrana inſeritōni ipſorum incumben
tes, tres quidem in ſinn dextro, duæ verò in ſini
ſtro: quāru ſtructure figura, ſimilis telorū cuſpi
di exiſtit. Sed hæc quidem & corde thoracis exem
pro licet accuratè inuēri, ſicuti etiā reliquæ duo
oriſciæ vaſorum, quæ materiæ ex dextro qui
dem ventriculo in pulmonem eductæ, vt venie

Cardi auro.

Cardi ſubſtan
tiam permulſe
diſſerit à mu
ſculo.
Cardi motus
eſſi non arbitra
riū.
Muſculorū ſan
dem arbitrio a
nimali ſubſer
uit.
Alioſum inſerit
ter proprietatē
ſubſtantiæ.

Cor ſi diſſerent
ſi, diſſerent
ſi, diſſerent ſi
ſi, diſſerent ſi

Cor ſi diſſerent
ſi, diſſerent
ſi, diſſerent ſi
ſi, diſſerent ſi

Nerui omni
bus, ſenſum & mo
tum, ratio eſt.
Verūm molles ad
ſenſum aptiores,
duri ad motum
exiſtunt.
Ab eadem tamen
radice pluries di
ſciſſa, apparent
quidam nerui in
muſculos, alii in
alias particulas
inſeri, quemadmo
dum & interna
ipſorum coniuga
tione, & ſexta ni
hilo minus, ha
bere nonimus, à
qua cor exolem
quædā neceſſum
accipit: vnde eti
am pulmo, iecur,
ventricular, et me
ſenterium in ſuper
totum, vna cum
intēſtinis, necnō
vniuerſi laryngis
muſculi, ſub ex
optant præpāgines.

Cor animatoſe
virtutis inſimū
eſt, ac veluti ſonitū
ſtanti natiui cal
oris, aures quæ
dam annexæ ſunt,
neruoſiores ac
magis cunctatiles
ipſa cordis ſub
ſtantiā.

Cardi auricu
laris numeroſe.

Cardi auricu
laris numeroſe
membranæ
ſi, diſſerent ſi
ſi, diſſerent ſi
ſi, diſſerent ſi

arterioſæ.

arterioſe: ex ſiniſtro autem in totum animantis corpus, ut grandis arterie. In quibus iterum tres vtriusque membranas ad C. littere ſimilitudinem factas compertes, extra cor tendentes, velvitiſculas intro. Prius verò quàm cor ex aumante auferas, cauè venarum ramos conſidera: ad hæc glandum magnum, quod Greci thymum vocant: ruſſuſque modis panniculi radicem. Insuper examina, quo modo ſi deſtro ſinu vena quædam ad ſpinam portendat, quin tã dorſi conſcendens vertebrã. Etenim quæ venæ ipſum cor nutriendum, perpetuò in omnibus animantibus, ex illo etiam ſinu prodeunt: ac vocantur eæ vafæ, cor inuoluentia: quoniam bina numero totum ipſum perreptant: quemadmodũ à læua parte dux arteriæ, maioris ſoboles, poſt primũ extra membranam proceſſum, in ipſum cordis corpus perveniunt. Reperiuntur autẽ os vñũ in corde animalũ omnium, quanquã non exactum, ſed cartilagine inſtar. Cæterum quanto animatis genus fuerit corporis mole vaſtus, tanto plus offeæ ſubſtantiæ cartilago illa fortietur. Quare in maximis, vbi plus offeæ ſubſtantia gignitur, conuenit ipſam tunc appellare cartilagineum os, minimẽ cartilagineum offeam: quale nimirũ os, ipſe laud magno negotio reperi, in illius elephanti corde, qui Rome nuper ſuſp ingulatus. Suspenduntur autem ex tali offe ipſæ membranarũ radices, vaſorũque arterialium proceſſus, ibidem ſuſpenſi corroborantur: quem ſcopum ſibi in illius generatione propoſuit artiſcioſa natura. Cæterum qui me adminiſtrantem non vidit, ſed edoctus libris ad conſectionem accedit, detectũ quidem ſiniſtro ſinu, aperto autem in longũ toto aorte proceſſu, ſi ſtudioſe radices aorte & membranzum ſequatur, ex facili os ipſum inueniet: ſiquidem huius radix, & venæ arterioſæ, membranarũque ipſarum, in offe cordis habentur. Quod verò Ariſtoteles ait, triplicem ſinum inſe cordi, merum eſſe ſomnium videtur. Toto corde nudato, videbis inſiſtenterem eius ventriculum ad ſummum pateſcere verticem: dextrum inferius multo ceſſare, & circumscriptionem ſubinde propriam habere. Omne autem animal, vel elephante grandius, vel alauda minutius, quod ætẽ inſpiret, ſimilem cordis ſtructurã obtrinet, vel potius ſpecie eandẽ. Similiter & pulmoſis: cuius fibræ in omnibus animantibus, de quibus verba fecimus, dux quidem in dextra ipſius parte habentur, dux verò in ſiniſtra: præter hæc in dextra thoracis parte alia quædam quinta fibra exigua, veluti altervtrius ſoboles, cernitur. Licet autem cor ipſum, adhuc viuente animali, citra thoracis ſinum conuoluerantione, detegere, ſi pectoris os à ſubiacentibus liberans, te conſeſtim ad involutrum ipſius cordis diſſecandum conuertas, membranis quæ thoracem interſeplunt, minimẽ vulneratis. Quæ quidẽ ſi, ut dixi, corde detecto illarũ permaneant, omnes ipſius cordis functiones incolumes in viuo animali ſervantur. Siquidẽ & reſpirare ſimiliter, & clamarẽ animal vides: ac ſi à vinculis ipſum liberetis, currere, ut prius coſuevit. Quod ſi vulnus vinculis adhuc cõprimas, etiam cibum aſſumere, ſi eſuriar, cõſpicias: atque ſi ſinias, bibere. Et quid oportet

mirari, quũ Marylli Mimographi puer curatus ſit, viuẽtque adhuc, etſi cor illi aliquãdo fuerit detectum? Vbi igitur cor citra thoracis perforationem detectũ eſt, vaſorum exortum ſuave excipere minime poſſim: cordis autem baſim poſſim, verum animal ſtatum cõmoritur. Porro altervtrius, vel vtriusque capacitatis thoracis forata, omnia quæ reſpirationi ſubſeruiunt, deſtruntur. Antè verò quàm perforata ſit vna vel altera pars thoracis, non licet ipſum pulmonem cernere, niſi forte coſta exciſa, ſuccingentem membranam conſerues integram. Si verò animus ſit, vtriusque thoracis capacitate ſcendere, duas lineas per coſtarum flexus ad animalis longitudinem ducito, quibus oſſa reflexa dirimes. Deinde aliam tranſverſum lineam tertiam per macronatam cartilagineam incidetis. Poſt hæc toto pectoris offe reflexo ſuſum, pericardiũque diuiſo, ambos cordis ſinus æquẽ palſantes videbis. Cæterum evidẽtius adhuc quàm antea cernes arterias, aut viciſim, aut eodem tempore & numero per totũ animal eleuari, ſubmitti. Hæc igitur conſeſtim ipſo detecto innotẽſcũt. Procede tẽpore, breues vtriusque ventriculi motus, longis intervallis intercipiuntur. Iam dextri ſinus eleuato, peculiari ipſius natura perficitur. Huiusmodi autem ſpectabis potius ſimul, vbi ipſi ventriculi immobili propẽt eſſent. Primum etenim, vtriusque ipſorum, quæ ad verticem coſiſtunt, moveri ceſſant: mox quæ his proxima ſunt: atque hoc ſi perpetuò, donec ſolæ baſes in motu verſantur. Quibus ceſſantibus, languidiſ breuiſſe motus ex longis intervallis in cordis aurbus cernitur. Enim verò qui pollicentur ſe oſtenſuros arteriam ſanguine vacuam, inaniam illi, & minimẽ probabilis pronunciant.

GALENI PERGAMENI de anatomicis adminiſtrationibus Liber VIII.



Horacem porro nominant, quod à coſtis cõprehenditur. Sunt autẽ læz omnibus quæ prius retuli animantibus, in duodecimum numerũ exporrectæ. Rariſſimẽ ſiquidem decima-

tertia coſta viſitur: atque hæc ita rara ſunt, ut inter mille vix vnũ tali coſtarũ numero inuenias. Elationẽ autẽ thoracis finis, ipſæ clauiculæ exiſtunt: quemadmodũ demiffior omni animantiũ generi, ſeptũ tranſverſum, quod phrenas & diaphragma nominant. Sedes omnibus coſtis duplex: prior, pectoris os: poſterior, vertebræ ſunt, quæ totidem numero planæ, quot & coſtæ habentur. Pectoris os, vnũ quidẽ apparet, ob ſtructuræ concinnitatem. Membris autẽ deraliſ, quod & plura oſſa ſint, & numero totidem, quot cum eo coſtæ cõmittuntur, palam innotẽſcit. At verò ſeptem priores thoracis coſtæ, cum pectoris offe coarctantur. Octaua verò ad radicem cartilagineis eniſiformis coſiſtit. Reliquæ quatuor in thoracis latera deſinunt, tantũ priori parte deficientes, quantum etiã aliis breuioribus ſunt. Minima inter ipſas eſt quæ poſtrema habetur. Omnes igitur retrò cũ dorſi vertebris coarctantur, id quod

Marylli puer curatus fuſſe, in deſcriptis coſiſſe ſuſſe.

Corde vtriusque ſinum poſſe.

Arteria inſe ſanguinem.

Clauiculæ.

Septimum tranſverſum. Phrenas.

Diaphragma. Coſti omnibus duplex ſed.

Pectoris oſſa tot quot coſtæ cum eo cõmittuntur.

Clauicula ſeptem priores coſti poſterior oſſe coarctantur.

Glandium thymum.

Vena cor nutrienda, vnde cõuertitur.

Arterias duas corpus cordis inuoluit.

Corde inſe vnũ cartilagineum.

Corde oſſi vnũ.

Corde oſſi inuoluit ratio.

Corde nō inſe ferro ſinu.

Corde ſtructuram inſiſtenterem aſſe omnibus eandẽ.

Pulmonis ſinum thoracem oſſe cõmittuntur. Pulmonis ſinum thoracem oſſe cõmittuntur.

*Costas omnes
vertebræ dorsii
aliqui dupli-
ci nodo.*

plurimodo. altiori quidē, ad ipsum vertebræ cor-
pus: humiliori, ad lateralem ipsarum processum
declinatus. Hinc autē in priorem, inferioremq; regio-
nem longius oblique procurunt, & quum iam
anterior fuerint, ab hac latione cessant: vbi natu-
ram cartilaginis fortiter, sursum ad pectoris os,
cōtra priore motum mouentur: quarū finis car-
tilago exquisita censetur. Ab huius autē cartilagi-
nis partibus intimis, septi transversum oritur.
Elauior, anteriorque ipsius pars, cartilagini mu-
cronatæ subiacetur: quæadmodū posterior atq;
demissior, ipsi spinæ coherescit. Verū superior
pectoris ossis finis cū prima semper costā com-
mittitur, necnō cū claviculis, in quibus hæ nimi-
rum habentur. Cæterum nō omnes muscoli, qui
thoracis quocunq; modo coherescunt, motus ip-
sius grana sunt cōditi. Nam quidā à pectore &
costarū spuriarū sedibus sursum tendentes, hu-
meri subseruiūt articulo. Quidam ad abdomen
descendentes, suos vsus habēt, & thoracē paulu-
lum detrahūt. Quæadmodū qui costarū extre-
mitas obiecti, iuxta pectoris os prorsum, &
vertebras retrorsum, iuncturas constringunt, &
thoracē leuiter cōprimūt. Totū verō ipsius motū
manifeste gubernat inferius septum ipsum trans-
uersum, dum intenditur, laxaturq; vicissim: dila-
tans, cōprimensq; indidem terminū, ac attrahēs
ab ima parte per mucronatā cartilaginem pecto-
ris os: costas autē spurias sursum leuiter & prorsum.
Iam verō respirationē (quæ naturale opus,
nō animale putatur esse) septi transversum dun-
taxat suppediat. quod nō modō substantia, sed
vsu quoq; musculus est. Vt autē ad intercostales
musculos nos cōuertamus, eorū fibras superficia-
riar ab elatiore costā ad humiliorē leniter obli-
que in anteriora pertinēt cōspicis. Paulatim
verō has dissectis in animali cōmortuo, tunc in-
ternas accedes situ his aduersas, vt ambo ad X li-
teræ similitudinē habuit inter se exigat, quem vsū
que ad cartilagines singulorū costarū particu-
las cōseruari videbis, in illis autē variari. Etenim
in his exteriores fibræ talem haud dubie sitū oc-
cupant, qualem interiorē fortiter erant: cōtra in-
teriores, quales possidebāt externæ. At in muscu-
lis costarū, quas nothas vocant, ad finem vsq; ip-
sorū, eadem fibrarū natura cōstitit: quoniam hæ
nullo flexu incuruātur. In ipsis porro intercosta-
libus musculis, proximē ad ipsos costæ os, arte-
riam, venam, & neruū, in ima cuiusq; ipsorū parte
cōpentes proprias tamē ipsū neruū. Quare di-
ligenti ad alibi eas oportet, corporibus quæ fi-
bris incidendis subiacēt: nam hæc tria murō se
videntur cōtingere, nempe arteria, vena, atq; ner-
uus. Cæterū medio inter summās alitq;que fi-
bras siu neruum cernes, si fibras ad amissim se-
quaris. Plures tamē superficiei fibræ in quæ in
alto habentur esse apparebit. Porro animal mai-
plurima voce præditū, apertissimū est ad cōfectio-
nes, in quibus vox quædam læditur. Vtriusq; igitur
fibræ dissectis, vocem simul et efflationē ani-
malis perire, ipsa res persuadet. Quare præstat
in huiusmodi administratione suam magnā adhi-
beri. Valens enim ei membrana costas succingēs
inest, quam ne perferes, sedulo curandū est. Hæc
enim scēta, dum thorax attollitur, nō parum æ-

ris ambientis, in mediam thoracis pulmonarię
regionem trahitur. Dum autē submittitur, hoc lu-
plum rursum per vulnus egreditur. Notum verō
est, ex aëre qui per inspirationē attrahitur, tan-
tum necessariō ob vulnus perire, quantum video-
licet in ipsum thoracē influit extrinsecus. Quan-
to autem per os minus quā ad necessariū sibi
vsū inspirauerit animans, tanto etiam minus
efflabit. Cæterum quanto efflatio ipsa decreue-
rit, tanto vocem sequi breuiorē necesse est. Iam
verō in quocunq; musculorum intercostalium,
si incidatur costas succingens membrana, idē li-
nea notabili, animal semispirans prorsus & se-
mivocale redditur. Sin autem in altera thoracis
parte æque scēta fuerit, spiratio & vox aboletur.
Quæadmodum si in cōtractione thoracis
vacul aëre, qui per vulnera elapsus est foras, pla-
gas obturauerit ipsas, respirabit confestim ani-
mal, vocemq; emittere. Quod autem vtriusq; fibræ
sectis in omnibus musculis intercostalibus, non
vox modō, sed efflatio quoq; intereat, nostrum
inuentum est: quæadmodum etiam, vbi folis
neruis præter dorsū medullam scētis, inoffense
quidem musculorum fibræ seruantur, aëho au-
tem deperditur. Licet verō circa spinā dorsū ner-
uos omnes, q; in musculos intercostales perue-
niant, lino excepto attollere, non tamen ynculo
astringete. Clamat enim sic percussum ani-
mal: deinde subito obmutescēs, ob neruos lino
cōstrictos, spectatores redit attonitos. Nam mi-
raculum tūc videtur, neruis exiguis in dorso la-
queo interceptis, vocem perire. Complures ta-
men in huiusmodi indicationibus tibi subser-
uiant oportet, vt quim celeritē laquei omni-
bus neruis circumponatur. At magnitudo offen-
se haud æqualis in totum omnibus intercosta-
libus obvenit: sed his qui costas spurias attingūt,
tanto minor, quanto musculi earū elationis
minutiores existunt: quāquā musculus qui ad
primam pertinet costam, obliquis, minimā etiam
offensam adfert. Porro in elanoribus costas, ner-
uus ipsis portectus alius inuenitur: recedens a
tem paululum ad imam regionem, in humilio-
ribus. Cauendum itaq; ne quum fibras diuidis,
neruum subditiū lædas: cuius offensionem im-
mobilitas musculorū intercostalium, cohibito
efflationis, atq; abolito vocis sequitur. Ad hæc,
nerui propter arterias carotidas transcurrentes,
si noxa aliqua momentanea afficiantur, animal
reddunt mutū: non autē his similes, qui interco-
stalia excurrunt. Quippe raucus quidā strepitus
in his relinquitur, qualis in somno stertētib; fieri
apparet. Hic strepitus musculus intercostalis
resoluitur obliteratur. Resoluitur autē cōfectum,
aut fibræ ipsorū cōfectis, aut costas excisis, aut
neruo ad radicē vincto, aut eora spinali medulla
propter dorsū initia incisa: qua scēctione possi-
mū raucus strepitus aboletur, similēq; omnes in-
feriores particule, quæ ad musculos intercosta-
les, atq; imū ventrē spectant, cum eisq; etiā & se-
dis musculi, pudendorū, vesicæ, & crurū, subito
resoluiuntur. Verū diaphragma, licet infra mu-
sculos intercostales habeatur, non resoluitur ta-
men, quod videlicet ipsius neruorum origo, to-
ta sit elatior thoracē. Neq; etiam illi musculus sex,

*Spinitio et vox
quidam perire.*

*Mortuum quæ ra-
tione subiacet red-
da postea ani-
mal.*

*Mortuum reddi
animal, inspi-
rante lino: nec
vbi qui excor-
runt propter ar-
terias caroti-
das.*

*Inuicostales
musculi quæ ra-
tione resolui
sunt.*

*Respirationem
(quæ naturalis
est) non solum
transversum
septi, sed et
superiores
costarū
transversum
est mus-
culus.
Musculorum
intercostalium
fibræ.*

*Costarum sin-
gularum in propiis
esse arterias,
venas, &
neruum.*

*Vulnus ventrum
quæ maiorem
intercostalium
difficili parit
vocem.
Suam magnam
esse apertissimā
ad spirituales
organos an-
tationem.*

Diaphragma-
ta aerea videri
videntur originē
esse elatorem
thoracis.

Sapienter transver-
so vti animal
silo, ad parvas
respirationes.

Musculi quia ra-
tione privati
sunt.

qui ex cervicalibus descendunt, attollentes supernam
thoracis regionem, quicquam inde offenditur:
etenim & in hos nervi deferuntur à medulla spinali
cervicis. Vnde aut animal septo transverso
solo in parvis respirationibus. Quis verò ma-
iores respirationis vias ipsi obortitur, aut ob exer-
citia, aut febrem, aut vehementem aëris calorem,
occecidit quidem est, functioni diaphragmatis
etiam intercostales musculi subveire. Sin autem
magis vias respirandi increverit, vel ipsis
latioribus musculis illi functionem obit. Com-
mune autem hoc de omnibus musculis sciendū
est, quod siue nervos ipsorum laeseris, siue amputa-
veris fibras omnes transverfas, totos istum mu-
sculos suo motu privabis. Quare necessarium nō
admodum fuerit, principia nervorum, qui in ip-
sos distribuuntur, & fibrarū situm, pernoscere.
Etenim collige cuiusq; os, iuxta inferiorem circum-
ferentiam nudare oportet. Vbi autem iam appa-
ruerit nervus, vñ cum eo venit inspicenda ve-
na, & arteria, quæ in superficie magis quam ner-
vus exant, humilidius tamen paulatim sine. Igitur
ab elatiori parte iuxta costæ circumferentiam, la-
mulo exiguo subdito, licebit tibi nervum excipe-
re, citra adiacentia vasa, præcipue citra ipsam ar-
teriam: quoniam ea, vehementiori sanguinis
profluvio, oerum obscurat. Si verò ipsam quan-
doque vulares, scalpello statim prehensio, trans-
versam totam dissecas: hæc namque communis est
omnium vasorum sanguinem mittentium pro-
hibino. At spinalem medullam totam transver-
sum incidēs, nihil integrū ex ipsa relinquens: nisi
fortē ex industria dimidium eius tantum velis
resolvere. Jam verò spinalis medulla, quum iux-
ta longitudinem deorsum versus per medium
ad rectam secatur locum, nullum ex intercostali-
bus nervis resolvit: neq; eos qui lumbis vel cru-
ribus insunt. Transversum autem quam dimidia
duptaxat pars eius divisa fuerit, siue sinistra ea
sit, siue dextra, omnes nervi, iuxta rectum inci-
se partis transire, ordine resolvuntur. Quum
itaque semivocale animal volēs reddere, in hūc
secabis modum. Vbi autem murū subitō, totam
spine medullam transversam divides. Quoniam
verò costis etiam excisis, tum elatio, tum vox
animalis offenditur, quemadmodū ob muscu-
lorum, oeruarūq; sectionem: dum animat vo-
cem edit, transversam aliquam costam dissecas:
vñ ad succingentem membranam, ita tamen vit-
illam nec coovellas, nec vulneres. Vbi verò co-
stam à subdita membrana deraferis, facillimum
erit partes eius divides, ad vtrumq; terminū, nem-
pe ad os pectoris atq; spinam, reflectere, ac sic
sionem deprehendere. At si musculi alterutra
in parte, aut dextra, aut sinistra, resolutionē ex-
perti fuerint, dimidiata efflationis ac vocis portio
aboletur. Sin autem alterutrus dimidiata, tum
ambaram functionum pars quarta viciabitur.
Nam pro muscularum qui celsiorum numero
& magnitudine, semper ooxa voci succedit. Ve-
rum fibris muscularū intercostalium sectis, vel
excisis costarū ossibus, musculi quidā relinquin-
tur ex illis, qui thoracem comprimū, tum qui co-
stas extremis porriguntur, a deorsū eorū qui in
imo ventre consistunt, primum atq; tertū conia-

gium. Quum autē thorax modicē ab his compri-
matur, modica etiā afflato gignatur, cui vox ipsa
proportionatur. Ac sane intercostales muscu-
los, per nervos qui de spinali medulla ad ipsos
pernunt, in otu desitues, in quē duxi modū: dia-
phragma verò, vbi huius nervorū principia simi-
liter vt reliqua asseceris. Descendit enim in tho-
racē hi nervi per cervicis latera inter duas gran-
des colli venas, deorsum versus obliqui, muscu-
lis collo subdatis inlaxerēs, tres quidē vtramq;
parte, qui plerūq; in subus habentur: in finis ve-
dolum duo. Tertius autē raro in his videt,
vt in subus quartus. Origo ipsorū omnū est cer-
vix spine medulla. Ex quartē siquidē & quinte
vertebræ intervallo, prima cōiugano pro credit:
ex quarte & sextæ spacio, secunda: ex regione
post sextā vertebræ, tertia, quē etiā exigua admo-
dum est: quemadmodū si quarta quandoq; acce-
dat, eius quē post septimā vertebræ habetur cōi-
gationis, propago perpusilla existit. Igitur omni-
bus ut incis, diaphragma motus fit expert. Pa-
ri modo si muscularum singulorū ex cervicē ad
thoracem descendētū, qui sex numero habentur,
nervos asseceris actionē vinas. Affectus autē
est duplex: vel dum secitue, vel dum intercipi-
tur. Hoc itaq; in vniuersum de omnibus muscu-
lis intelligo, q; dissectio ipsorum capite, nō am-
plius functionem obibunt. Quia verò in quibus-
dam musculus caput numerus ne deprelendi
quidem potest, q; ex pluribus incipit osium
proceisibus, rursus fuerit illic ipsos secare, vbi ca-
pita in idem primum conspiciat. Atq; hoc quidē
in anterioribus musculis facturæ consuevit, in
quibus profunda sectione opus est, vt qui peni-
torem sitū occupant, vbi capita ipsorū coerent.
Nam in posterioribus expeditissima diosis est,
adeo vt vel vnguibz possit administrari. At ve-
rō si in regione media tertie quartæq; vertebræ,
persecutis totam spinalem medullā, spiratione
cohibetur totum animal desistitur, nō solum tho-
race, verum etiam infra sectionem toto corpore
resoluto. Atqui perspicuum est, quod si post se-
cundam aut primam vertebram, aut in ipso spi-
nalis medullæ principio sectionem ducas, repen-
tē animal corrumperetur. Verum si post sextā ve-
tebram, medullā spine transversam totam secue-
ris, vniuersi quidem thoracis musculi statim mo-
rum amittent: solum autem diaphragmatis bene-
ficio animas respirabit. At interiores hæc bene-
bra sectiones spialis medullæ, permulsi ipsius
partibus thoracem moveri concedunt. Et quan-
to magis ad humiliores vertebras sectio ipsa in-
clinaverit, tanto plures thoracis musculi actio-
nem obeuntē habebis. Non tamen sexta ner-
uorum à cerebro coniugano, respirationis mu-
neri subministrare videtur: quia nevel particula
quæpiam ipsius in vilium thoracis musculū pro-
pagatur. Quod verò ad pulmonum situm spe-
ctat, costa excisa, atque vñ cum membrana quæ
illam ambiat, quæq; *muhi* vocatur, ablatā, suc-
cingens costas simplex solusq; reliquitur, quæ
adeo transparenter per se inspectionem effi-
cit, vt omnes facile cernat illos, pulmones dico,
in vivo animali esse thoraci coniunctos. At ma-
nifestior adhuc sit speculano per diaphragma

Diaphragma-
ta aerea videri
videntur.

Nervorum affe-
ctus duplex.
Musculi nō ob-
stant functionem,
si caput
eorum dissectum
sit.

Spinale medul-
la secta inter
tertiā & quartā
vertebræ, spiratio
cessat, diffusi
animal.

Sente nervorū
coniugationis
nullam particu-
lam in aliquo
thoracis, muscu-
losum propa-
gari.

Medulla spina-
li cario trans-
versam, quod ac-
cedat.

nudatum, ubi peritonæi vertex avellitur. Sic si-
quidem admodum conspicua diaphragmatis ner-
vosa pars redditur, ut omnes palam fateantur,
pulmonem semper thoraci appositum esse, siue
inspicer, siue etiam expire animal. Cæterum vel
si etiam id suffocaueris, pulmonem à sepro plu-
rimum seunctum videbis: nec secus à thoracis
lateribus: unde liquet colligere, spiritum in ipso
contentum, in regionem eius & thoracis mediæ
vacuari. Omnino siquidem in animalibus quo-
mo docunque extrinsecus, pulmo à thorace distare
videretur: quod fieri non posset, nisi spiritus ali-
quid per substantiam pulmonis transiret, in
eamplam thoracis capacitatem transfiret quod
certè Erasistrati opinioni adversatur.

Pulmo à thora-
ce distare vide-
tur in animalibus
quomodocumque
extrinsecus.

GALENI PERGAMENI de anatomici administrationibus, Liber IX.



Venam pacto ea quæ in cerebro &
spinali medulla per confectionem
apparet, optime quas Intueri,
tum mortuo, tum vivo adhuc ani-
mante, hoc libro indicabimus. Quis
autem anatome quæ in cadavere celebratur, cuiusque
particulæ naturæ & situm indicet, in vivo autem, in-
terim functione ostendat, interim autem ad inven-
tionem eam huius, rationum anones exhibeat, manife-
stum vtrique est, mortui animæ confectionem
præcedere eam oportere, quæ in vivo admini-
stratur. Igitur ossibus calvarie exēpnis, membra-
nam quæ cerebrum in orbem contegit, quæque du-
ra siue crassa appellatur, ad amissum inspicies,
iuxta mediæ ipsius longitudinem multo crassio-
rem seipsa apparet. Pari modo sub futura quæ
à Græcorum literæ a similitudine appellatur lab-
dowdes, crassam ipsam membranam, duplici stru-
ctam plexu, cerebrumque aliquatenus ingredien-
tem, cernes. Venæ porro per ipsam vtrinque singu-
læ iuxta futuræ labdowdes latera excurrunt. Vbi
verò hæc in idem mutuo coarctant, altissimus in
ferè est locus, eorum qui in orbem circumiacet:
quam regionem Herophilus vocat lenon, à tor-
culari similitudine. Non autem equalis ab ea-
rum prior, tum posterior cerebri pars existit, sed
anterior est multo maior. Verum ad id quod cla-
rissimum habetur, alter etiam crassæ membranæ
implexus accedit, necnon tertia quædam alia ve-
na, præter duas prædictas, ad longitudinem por-
rigitur in anteriore excurrentis. In superficie ve-
rò, alias venarum exitum, quæ leno incumbunt,
egressus est, iuxta illam partem, ubi futura labdow-
des ossibus squamatis cōnectitur. Quapropter
venas has superficiales prius secabis à dexteri vs-
que summis. Dum autem fecas, primam vacua-
bis, si grumus quispi in ipsis coaleverit: deinde
internam membranæ superficiem intueberis, quomo-
do substantiæ speciem, et si non tenuit, venis ha-
beat similitudinem. Inde tenues venas ab vtraque leno
rum parte orientes spectabis, nonnullas quidem
admodum graciles, quasdam verò ampliores. Cer-
nes autem las quidæ à parva leno, quæque in superfi-
cie est, in propinquas cerebri particulas superfi-
ciales disseminari: illas verò ab altitudine ma-

Confectio an-
imæ mortui
debet præcede-
re illa, quæ ad-
ministratur
in vivo.
Membranæ
cerebri conside-
randa.

Lenon.

gna, tum in posteriore toræ cerebri partem, quæ
à nonnullis cerebelli: siue parencephalis dicitur,
tum in priorè propagari regionem. Cerebello igitur
venæ se inserentes, & ab iis quæ per futuræ
labdowdes latera in lenum perveniunt, & ab ipso
leno exactam venæ tunicam habet. At in ipsam
cerebrum, quod nonnulli antea cerebrum vo-
cant, per crassam membranam, mediæ exacte
sitam, secantemque cerebrum in duas partes æqua-
les, sanguis deriuatur. Cæterum & hinc venæ fre-
quentes omnino per totam longitudinem, in v-
trinque cerebri partem, finistram & dextram distri-
buuntur, omnes tamen exiguæ, duabus tantum
exceptis, una quidem ad lenum, in anteriore pe-
nitius procedente, ad tonus capitis longitu-
dinem, altera verò multo maiore, neque propinqua
admodum leni regioni, neque remota, sed in me-
dio tonus cerebri sita. Hæc venæ in alio declivius
descendit, unde & multifariam propagatur. Spe-
ctabis igitur omnia hæc, priusquam cerebrum ali-
qua ex parte diuiseris, in sola membrana crassa.
Nudabis autem ipsam tribus locis, quoniam
& triplici plexu totum cerebrum secuit. Deinde
iuxta sectiones tuis met digitis attolles scorium
partem ipsius finistram, atque scorium dextræ, qui-
bus connegebatur anterior cerebrum: scoriumque
similiter reliquam, quæ nimirum posterior: omnes
que venarum processus in tres tonus cerebri par-
tes disseminari conspicias, nonnullas quidem ræ
superficiales, ut ipsarum rami in conspectum
prodeant: quasdam verò alie penetrantes: om-
nemque tenuem membranæ, quam barbari pila-
mam appellat, & quæ enumeratas venas
colligat, & cerebrum extrinsecus circumdatur, cum
venis ipsis in ventriculum illius descendente.
Hæc itaque secundam, quæ involuitur factus vte-
ro, referens, cerebrum semper, etiam in profundo,
cohaeret: crassa verò, ab illo plurimum distat.
Vbi ea fueris intutus, quæ cerebrum ambiunt,
opportunitatem iam erit cerebrum consecrare, ana-
tomen ipsius exorsus à meningē illa tenui, bi-
faliam anteriorem partem secante. Unde abse-
ctis vel vulvis venarum exortibus, à priori au-
spicaris termino, sursum tuis ipsis digitis illam
attollito, donec ad grandem venam perveneris,
ex ea procedentem, quam in penitiora declivius
ferri cernimus: atque hic rursus in altum subla-
tam alteri tenendam dabis: mox ipse iuxta lon-
gitudinem dissolues, vtrinque cerebri partem à
mutuo connexu leniter tuis secantibus digitis,
quovisque ad venam in lōgem inibi porrectam
veneris, quam prius magnitudinis esse notandæ
commemoravimus. Postquam verò declivem il-
lam venam, de qua facta est mentio, videris, atque
ipsum vsum simul inspicendo cognovis, venam
ipsam à subiectis corporibus adimēs, regionem
interim quæ dextera, diligenter inspicies, quæ
calli imaginem refert, ita ut naturalis quædam
inibi concavitas esse videatur, quæ ex circumstanti-
bus partibus portionem alimentum non integrè
elaborat recipit. Cæterum leniter avellerè per-
gens, effigies etiam mixtum tenuium, qui ad
medium vique perveniunt ventriculum cerebri,
invenies. Notitiam porro assequeris ventricu-
lorum cerebri, callosam illam portionem con-

Parencephalis.

Cerebra san-
guis qua via
insuat.

Meninges cras-
sæ sunt loci cere-
bri.

Meninges tu-
mores cum ve-
nis penetrant
cerebrum.

Meninges por-
tionem ad me-
dium vtrinque
leni cerebri.

spicatus,

spicatus, quæ manifestâ adeo differentiâ à disse-
ctis cerebri particulis obniet. Cernes autem in
his etiam plexus, secundarum modo efforma-
tos, cum quibus quidem ascendunt arteriæ,
tum venæ, atq; in varios ramos disseminantur.
Quare plexus hos inviolatos servare conaberis.
In prima igitur vtriusq; ventriculi confectio-
ne, plexuum dictorum, atque adeo callosi cor-
poris in cerebro aspectus, nbi index fuerit. Mox

Ventriculus de-
votus atque flos
per artem.

verò corpus illud, quod dextrâ ventriculû cere-
bri à sinistro dissepit, inspicito: quod eandem cum
toto cerebro substantiâ possidet. Atq; hoc iam
facile abrumpitur, si vehementer extendatur. At
si hunc quoque totum ipsum simul cum vniis
particulis auferas, & ventriculi eundem, & ve-
na declivis circa corpus quoddam turbinatum
discindi apparebit. Cuius venæ propagines, te-
nuis quædam membrana, quem admodum alias
omnes venas, connectit: quæ à membrana subti-
li, nec substantia, nec continuitate evanat. Atq;
huius membranz intervntu, corpus illud turbi-
natum, cui venæ incumbunt, absconditur: neq;
fieri potest vt prius ipsum videas, quâm mem-
branas aliquatenus divales. Quod si à basi il-
lius propter verticem lineam rectam duxeris, ac
postea vtrinq; tunicam incidam detraheris, facile
corpus ipsum detexeris. His peractis, si iam li-
cet antequam mediam turbinatâ & ventriculorû
sedem detexeris, vtriusq; venas considerare cum
plexu ipso, circa turbinatum tendentes. Siqui-
dem vbi corpus intermedium detexeris, manife-
stò illinc ipsas prodare discides. Contegitur au-
tem ab illo corpore, præter iam dictos, quidam
alius tertius ventriculus cerebri. Itaq; illis post-
sumum locum ipsum nudabis, per quæ venæ, tan-
quâ foramina quædam irruentes, priorib; ven-
triculis incidit: nam media regio simul cum an-
terioribus patitur ad ipsa foramina. Vocatur
porro illud corpus *truncus*, ob formicæ simi-
litudinem. Quod si ipsum descases, callus occur-
ret nbi, vt in ventriculis anterioribus. Ad basim
ipsius affinitas sunt venæ, quæ concavitate
formicæ permeant. Extrinsecus siquidem gibbû
habetur, intrinsecus autem cauum, quem admo-
dû fastigium formicæ. Cæterum si perpendas quo-
modo in animali viuentis omnes crassæ membra
in partes, caluariz adhaereant: cerebro autem
soli, quæ ad ipsius implexus est: credes vtiq; ver-
ticem cam eræ, siue formicæ, fuscum versus ten-
sum servari, ventriculû sub se magnum efficien-
tem. Sic autem quum priores etiam ventricu-
li grandiores existant, totum sepi caput in subli-
me simul cum continuis corporibus attolli ne-
cesse est. Ex quo igitur corpora quæ supericiem
sublimia & suspensa sunt, latam intus trium ven-
triculorum capacitare efficiunt, quam in conse-
quentibus perire necesse est, corporibus quæ su-
perstrata sunt delabentibus. Insuper meatus qui-
dam maximus tertij huius ventriculi basi subia-
cet, qui ex prioribus superfluitates recipit, nec
non ex + suprapositis partibus. Omnibus igitur
quæ hic propositæ sunt particulis probe detex-
tis, tertium videbis ventriculû, inter duos prio-
res, & quartum posteriorē, mediû. Etenim me-
tus cui pars turbinata insidet, ad mediû ventri-

Ventriculus cu
ruber intus.

Tandem ipse
corpus.

Crassa muni-
go partes om-
nes adhaere-
scunt calvariz,
in animalis ve-
niente.

Ventriculus au-
terior cerebri
esse grandior.

Ventriculi ce-
rebrum tria.

Tertium ventri-
culum cerebri
reperis inter
duos priores, et
quartum poste-
riorem, mediû.

culum pertingentē cernes, vt foramina hand e-
xigua duo videantur, vnum ad cerebellum, alter
ad medium ventriculû pertinens. At præ-
dictus meatus, qui ex medio ventriculo ad po-
steriorem pertinet, inter carunculas quasdam,
nares & testes cognominatas, quæ cerebri par-
tes sunt, consistit, peculiari velatq; tunica, qualis
nimirû est tenuis membrana cerebri. Quinetiam
alia particula cerebri tali meatui incumbit, eisq;
conregit, quæ ob similitudinem quam habet cû
verme, excrefcentia vermicularis vocatur. Cuius
duplex spectabis extremum: alterum in priori
parte corpori turbinato exportectum: alterum
retrò, ab elatiore cerebelli parte occultatû: quo
quidem ad anteriora reflexo, nudari prorsus cõ-
tingit quartum vln mûm; ventriculû cerebri.

Nates cerebri,

Vermicularis
excrefcentia
cerebri.

GALENI PERGAMENI de vsv partium corporis humani Liber I.



Orpora quæ nec vndequeque prop-
riam habent circumscriptionem,
nec vndequeque coniuncta sunt al-
lus, ea omnia particule vocantur.

Quod quidem si verû sit, multæ erunt animalû
particulæ, aliz sanè maiores, sicuti & aliz mino-
res, atq; aliæ etiâ omnino in aliâ speciei indiuisibi-
les. Viles aut hæ omnes ipsi animæ sunt, quippe
cuius organum corpus existit: & propterea mul-
tum differunt à se invicem animalû particu-
læ, quoniam & ipse animæ. Omnibus verò a-
pprui est corpus animæ moribus & facultatibus.
Equo siquidem fortibus vngulis & iuba est mu-
nium: erenim velox, superbum, ac generosum
est animal. Leoni autem, vt pote animoso & fe-
roci, dentibus & vnguib; validum. At ceruo
& lepori, animalibus timidis, velox quidem est
corpus, sed nudum omnino, & inerme. Timidis
quippe, velocitas: arma verò audacibus expe-
diebant. Neque igitur nudum aliquod arma-
uit natura, neq; audax quidpiam nudum desi-
nuit. Homini autem (sapienti enim hoc animal
est, & solum inter terrestria omnia diuinum) pro
omnibus simul defensoris armis, manus largita
est, instrumentum ad omnes quidem artes per-
necessarium: paci verò, non minus quâm bello,
idoneum. Non igitur indiguit cornu, aut vn-
gula sibi innata, quum meliora illis arma, quan-
do cunq; volet, manibus possit accipere. Sed ve-
locior est homine leo. Quod hoc rîdem est? Ho-
mo sanè equum domuit sapientia & manibus,
velocius leone animal: quo vtens, & subterfu-
git & leonem persequitur. Quin & sedens ex al-
to, humilem illum percutit. Non igitur est nu-
dus, neq; inermis, neq; facilis vulnerratu, neq; ca-
ciamentorum expertus homo, quum & thoracem
ferreum, & multiplicem cilm armorum, tum e-
tiam calcemtorum atq; operimentorû species,
inter quæ sunt domus, turris, & murus, sua sibi
parare possit industria. Si autem innatû ei esset
cornu in manibus, minimè possit eis vri ad earû
rerum omnium compositionē. Iisdem manibus
homo vestem, rete, nassam, velum, & lagenam

Particula.

Animæ organum
est corpus.
Morbis ani-
mæ est aptum
corpus, in om-
nibus.
Eque natura.

Leoni natura,

Timidis rupa-
dos velocita-
tes.
Audacibus ex-
pedire arma.
Homo sapiens
animal, & so-
lum inter ter-
restria diuinum.
Manus homi-
ni innata esse
a natura, pro
omnibus simul
defensorum ar-
ma.

Eque velocior
homo,
Hominis prout
a natura.

50

60

contextuit. Quare nō solum iis quæ in terra sunt animalibus, sed eis etiam quæ in mari & aëre, dominarur. Ac talia quidem homini ad fortitudinē arma sunt manus. Attamen pacificum & politicum animal homo, manibus & leges scriptis, & aras, & simulachra Deus erexit, & vniuersa artium instrumenta construxit, commentariōsq; etiam speculationis eorū scriptor reliquit. Vt autē sapientissimum omnium animalium est homo, sic

Manus esse organa sapientissimi animalis obuiosissima.

Manus esse artium organa.

Animam habere facultatem quædam à sua ipsius substantia distinctam posse tamē operari sine organo. Particula non impellunt animam ad agendum.

Animalia praesentire sua anima facultatem absq; vili delectore.

Animalium natura à nullo sunt delecta. Animalia cetera natura potius quam ratione nituntur exercere artes.

Homo ut corpus nudum, sic animam ante organa destitutam habet.

Manum esse organum ante organa. Rationem esse artem ante alias artes.

Apprehensio organum operari compellunt, prius caput quod manus curat.

manus sunt organa sapienti animali convenientissimum. Non enim quia manus habuit, propterea est sapientissimum: sed quia sapientissimum erat, propter hoc manus habuit. Non siquidem manus ipse hominem artes docuerunt, sed ratio. Manus quippe ipse fuit artium organa, sicut lyra musici, & forceps fabri. Vt igitur lyra non docuit musicū, nec forceps fabrum, sed est uterque ipsorum artifex, per eam, qua prædictus est, rationem: agere autem nō potest ex arte absque organis: ita & vnaquolibet anima, facultates quædam à sua ipsius substantia obtinet. Efficere autem ea quæ nata efficere, sine organis nequaquam potest. Quod autem corporis particula animam non impellant, aut timidam, aut sitientem, aut sapientem fieri, manifeste videre licet, si animalia recens genera consideres, quæ quidem prius agere conantur, quam perfectas habeant particulas. Et enim si oua ita acceptoria, vnum aquilæ, alterum anatis, reliquum serpentis, & calore modico foueris, animaliaque genita rupto putamine excludens, illa quidem aliis volare conantia, antequam quàm volare possint, hoc autem revolui videbas, & serpente affectans quamvis mollie adhuc & invalidum fuerit. Omne siquidem animal suæ ipsius anime facultates, ac in quos vsus partes suæ maxime polleant, nullo doctore præsentire. Nature quippe animalium (vt ait Hippocrates) à nullo doctæ sunt. Quapropter cetera quidem animalia mihi natura magis quam ratione artem aliquam exercere videntur, vt tum formice, tum apes. Homo autem sicut corpus armis nudum, ita & animam artibus destitutam habet. Proinde pro corporis nuditate, manus: pro artium imperitia, rationem accepit: quibus fretus, corpus quidem armat, & omnibus modis tuetur: animam autem vniuersis artibus ornat. Vt enim si innata sibi aliqua haberet arma, illa ei sola semper adesset, ita & si aliquam artem natura fortiter efflet reliquas sanè ignoraret. Pulchre igitur Aristoteles, manum veluti organum quoddam esse ante organa, dixit: quem ex nostris aliqui imitatus, rationem etiam, veluti quandam artem esse ante alias artes, haud inuentitiū asseuerauit. Homo igitur animalium omnium solus, quom artem ante artes in anima habeat, nempe rationem, optimo sanè iure organum ante organa in corpore manum possedit. Cuius quidem constructio, si alter constructa fuisset quidem est, fuisset ne felicius ad actiones futura, considerandum. Porro vnum, primamque caput organa apprehensio

10

30

50

40

50

60

Nam si diuisa mansisset, cōtingere tantummodo sibi æqualem corporis cuiusque admodum magnitudinem posset. At in multis partibus diuisa, moles seipia multo maiores facili amplectitur, & minimas quasque res exacte etiam venatur, colligit. Quum autem eadē circum corpus spheericum posuit in orbem contralu, rectum autem & causum fideliter etiam amplecti, manifeste vtrique omnem comprehendit figuram: quæ nimirum omnis ex tribus lineis conitatur, aut curua, aut caua, aut recta. Ceterum quoniam corpora non parua maiori mole sunt prædita, quàm quæ manu vna comprehendiqueat, adiutricem alteri, alteram taturæ æqualem manum adiunxit, vt ambæ ex oppositis partibus ea corpora complectentes, vna maius maxima nihil sint infiores. Nec verò ad firmiter comprehendendum sat erat manum esse diuisam, nisi etiam digitus vnus, alius quatuor oppositus fuisset, vt cum eis actionem ipsam absolueret: quum nimirum aut vnaque circulo, aut omnino ex duobus locis contrarius integra fiat comprehensio. Quinetiam digitos ipsos tum molles, tum rotundos, tum vnguibus iuxta summam manuum * esse expediebat, si ad omnem corporum magnitudinem & consistentiam firmiter comprehendendum erant futuri ex vsu. Etenim qui immodicè prolixi sunt vngues, ac propterea multo sese supergrediuntur, tametsi ad excorpiandum, aut radendum fieri viles, minuta tamen corpora ægre apprehendere possunt. Qui verò propter paruitatem ad fines vsque digitorum non extenduntur, naturam carneam firmitate priuantem, eam ad apprehendendum admodum invalidam reddunt. Qui autem summis digitum aequantur, quoniam soli, vtilitatem cuius grana sunt conditi, perfectissime complent. Pulchre igitur monet Hippocrates (sententia cuius nobis est dominum oraculum) particulas corporis vniuersas sibi inuenire consentire, hoc est, conspire in ministerium vnius operationis. Manifestum namque est, manus apprehensionis gratia constructas esse. Quod verò omnes earum particule & tales & tante sint, vt in vnam organi tonus actionem conspirent, hoc nondum omnes cognoscant. Porro ipsa particularum constructio, earum actionibus nuncta, optime habitudinis, veracem pulchritudinem discernende regulam, mensuram, iudiciumque præstat. Vera siquidem pulchritudo, aliud est nihil quàm constructio optima, quæ actionibus exploratur: non albedine, non mollitie, vel id genus aliis, per quæ nec natura, nec vera, sed fucata pulchritudo ostentatur. Deinceps itaq; omnē manus fabricam persequamur: quæ tamē corporibus insunt obiter distinguentes. Insunt autē primū & maxime temperamenta: quippe quæ propriis particularū substantiam complent. Nam singulis id esse quod sunt, ob quatuor qualitates primarum certam quandam temperiem conringit. Hæc igitur res secundum substantiæ rationem insunt. Consequitur autem necessariū odores, sapes, colores, duntius, atque mollities. Alia verò necessariū accidunt, vt posito, magnitudo, connexio, confirmatio.

Manus omnium comprehendit figuram. Tigris omnium consistit ex linea curua, antecava, aut recta.

Manus cur bina.

Pollux cur oppositus quatuor reliquis digitis. Comprehensio integra quomodo fiat.

Vngues apes ad apprehendendum debent sicut mutabiles digitorum aquarii.

Particulae vniuersæ sibi inuenire consentire.

Manus apprehendens gratia condita.

Pulchritudo vera est constructio optima, quæ actionibus exploratur.

Temperamenta complent particularū substantiam.

Essentiam singulæ à temperie quatuor qualitatū primarum accedunt.

matædy.

*Actio omni
magis ex par
te à propria et
genu substantia
procedit.*

*Manus actio
est apprehensio.*

*Motus volucri
um omni à ma
nibus sunt.*

*Vnguium ge
nus gratia eius
quod mollius
est, mollium.*
*Vngues cur me
discribit daret.*

*Vngues rotan
di facti sunt
tatu gratia.*
*Figurarum so
la rotunda par
te agri.*
*Vngues cur sic
augentur.*

*Vnguium an
guis cur in lan
guem tantum.*
*Ossium genus
in digitis, gra
tia est quod
mollius est.*

*Digitorum su
periorum cur ex
trius osibus con
sint.*

*Digitorum co
muni digiti seu
universales dis
creti à circa
osium appropin
quatione.*

matioque. Ceterum maiori ex parte omnis actio à propria organi substantia procedit, licet interdum fiat propter aliquid consequentium, ut visio propter colorem. Debet autem ipsa actio esse in propòsitâ indagatione, principii simul inquisitionis, & inventorum examen. Quoniam igitur actio quidem manus est apprehensio, apprehendere autem nihil posuit ipsa immobilis per mans, vñque precipua ipsi ædonis pars ea erit, per quam mouebitur. Quam autem omnes voluntarii motus, quales manus sunt, à musculis fiant, hi utique, primum motionis organum manus erunt: alii verò vniuersi, hæc quidem, ut melius actio fieret: alia, ut fine quibus fieri non poterat: sicuti & alia, pro custodia omnium horum condita sunt. Ac genus quidem vnguium, grana eius quod est melius, videtur factum: quibus absque illis manus apprehendere possent, at non recte felicitas. Eorum autem securitatis natura prospicietur, medio crur ipsos duos efficit, ut neque vilitati, cuius grana facti sunt, quicquam decederet, neque ipsi facile parerentur. Omnes siquidem animalium particulas prominentes & nudas, ex tali substantia creant, qualis neque quasiari facile propter mollietatem, nec rumpi propter firmitatem possent. Etiam secutans grana rotandi constructi sunt vngues. Sola quippe figurarum rotunda ad vix patendum exquisitè comparata est, ut quæ nullum expòsitum angulum frangi potentem haliat. Sed quoniam scalpendo, vel aliud quodvis vnguibuscum agendo, exteri debebant nobis eorum extremitates, solas has animalium particulas ita constructas natura, ut semper augeri possint, quamvis iam totum corpus augeri desierit. Augentur autem, pilorum instar, in longum tantum, subnatis: in his alius semper vnguibuscum nouis, & veteres propelluntibus. Ossium verò genus in digitis, quod & hoc ipsum grana eius quod est melius, factum sit, hinc discas licet, quod moueri quidem multiformiter inesset eis, vel sine ossibus, sicuti polypodibus: firmitatem autem in actionibus nunquam haberemus, carentes dura & obstante particula: & quod inesset propter morbum tremantibus, id nobis inesset semper natura. Ad hæc, si sine ossibus facti essent digiti, illas actiones solas probè perficerent, in quibus eos circulo implicari oportere, circa comprehensibile. Si autem vnicum os haberent, illas actionibus solis rectè seruirent, in quibus eis egeremus extensis. Quia vero nec sine ossibus, nec ex vno solo creati sunt, sed ex tribus inuicem per singulos conueniunt articulos vnusquisque est factus, ob id sanè ad omnem actionem promptissimi figurantur. Pleunque enim quum neque omnibus extensis, neque omnibus curuatis egeramus, aliquando quidem primum solum, vel secundum, vel tertium articulum: aliquando autem, vel primum simul & secundum, vel secundum & tertium, vel primum simul & tertium extendentes aut flectentes, hoc modo sex figurarum vniuersales differentias exprimus: particulae autem secundum magis & minus, innumeras. Est autem mollis carnis generationem natura, uò quidem suæ externa digitorum regione, quod illæ esse futura oneri,

sed sub internis partibus, ut quum eius consistencia sit mollis, & occurrantibus cedat leuiter, ossium rectitudinem corrigat, quando est aliquid circulo comprehensura. Proinde in articulis quidem per paucum, plurimum in partibus inter articulos mediis carnem produxit. Ar lares hinc digitorum, tantum carnis à dnafici fecit, quita medium inibi ipsarum repletura erat. Hæc igitur tot & ita commoda, manus à carne obtinere: præterea etiam, ut fricat, & molliat, quæcunque moderatè mollibus instrumentis egent, quælia in omnibus artibus plurima existit. Proprie igitur hæc sunt carnis manus utilitates. Communis autem vilitas, quod veluti propugnaculum quoddam & tegmen sit, aduersus omnes tam frigidas, quàm calidas iniurias extrinsecas, calidam in se quandam humiditatem possidentis, eaque utriusque temperantia resistens, ut balneum. Siquidem nihil inuenias quod valido æstu occupatos præsentius refrigerare, aut rigentes frigore, promptius calefacere queat, quàm balneum. Quum enim natura humidum sit, & moderatè calidum, humiditate quidem, naturam ex calore siccitatem irrigat: caliditate verò, ortam ex gelu frigiditatem perfrangat. Quum igitur omnium digitorum actio nes, per ossa sua compleantur, constat sanè quod nec pauciora, nec plura tribuenda fieri expediebat: quando si plura essent, minus firmam extensionem præstarent: sicuti si pauciora, tam diuersas particulares figuras digiti non haberent. Manifestum præterea est, postlocarum os minus esse debere, quàm prælocarum, à quo vneque vehitur: & quod in valde paruum atque rotundum definire digitorum summitates oportuit, ossium magnitudine decrefcente paulatim, ad optime apprehendendum. Quod autem vnusquodque os extrinsecus quidè exactè convexum sit, intus verò & in lateribus non exactè, id melioris gratia factum existimo. Internus siquidem partibus suis ipsi digiti molliunt & terunt, ac breuiter omnia accipiunt: quæ quidem deterius fierent, si ossa inibi convexa fuissent. Externis verò, quum nihil agant, reliquum fuit ut ad solam patendum difficultatem exquisitè constructi essent. Ar in lateribus, ut nullum in medio spatium vacuum, dum adducuntur, relinquere, hac parte eos minimè curuos fieri expediebat. Quare merito magnus digitorum supernam, si cum & parvus inferam circumferentia exactè convexam obtinet, quum ab hac parte neuter illorum aut ab altero custodiri, aut alteri adiungi debeat. Sed neque simpliciter, neque à casu aut temerè, ex tribus ossibus vnusquisque digitorum est factus: sed veluti inauarum cardines, ita & articulorum vnusquisque eminentiam cauitati appositè immittit, & æqualem sortitus est. Quas quidem cauitates ossium, quasi supercilia eminentiæ circulo ambiunt ad maximam firmitudinem articulo, ne aliquando excidant. Ad facilitatè autem motionis, atque ossium securitatem, auxiliu duplex excogitauit natura: vnum quidem, cartilagineo os vtriusque subvngens, obliquisque: alterum verò, ipsis cartilaginibus lumorem vntuosum & viscosum, veluti oleum quoddam, suffundens, per quem facile mobilis, & attri-

*Care cur subit
sa interna digiti
terram regionem,
manus autem
externa.*

salutem vñ.

*Digitorum mu
nium actio nes
per ossa, quæ
plura, ossa.*

*Os postlocatū
prælocatū mi
nus esse debere.*

*Digitorum ossa
cur cō vna quæ
di extrinsecus,
intus verò ne
quaquam, sicut
si vñ in lateri
bus.*

*Ossium structu
ra in digitis.*

*Supercilia a me
bentia cent
tes ossium qua
bus coherent.*

*Manuum articu
lorum suæ digiti
um articuli duo
plex.*

tu cōrmax omnis articulatio ossium est facta. Vt verò longè adhuc tutius articulus omnis in-
concessus cūstoditur, ligamenta quædam ex-
vetrog ossis produxit, ab vno videlicet in alterū
pervenientia: maxima quidem crassissimæ ad
præcipuos articulos continendos: minora ve-
rò, ad minores. Cæteri labia ossiū, extrinsecus
quidem maiora sunt, intrinsecus verò minora,
tum propter firmitudinem extēsiōnis, tum pro-
pter flexionis diversitatē. Sunt autem dura, den-
sa, medullæ experta digitorū ossa: quia nuda
sunt omnia, & propterea faciliè panibilia. Nō po-
tuit tamen rectè iuveniri vitilras partiu, antequā
eius actio noscatur. Quod igitur principii ner-
uorum omnium cerebrum sit, atq; spinalis me-
dulla: & quod ipsius rursus spinalis medullæ ce-
rebrum, arteriarū verò omnium cor, ut hepar ve-
narum: & quod nervi quidem à cerebro anima-
lem virtutem, arteriæ autem à corde pulsantem,
sicuti venæ ab hepate vegetatiuam accipiunt, de-
monstratum alibi à nobis est. Est itaq; vsus quē
præstant nervi, facultates sensus & motus à prin-
cipio in partes deducere. Arteriarum autem, cu-
stodire naturalem caliditatem, & nutrire ani-
malem spiritum. Sanguinis autem generandi, si-
mul & in omnes partes ferendi gratia, factæ sunt
venæ. Quum igitur digitorū ossa ex se moveri
motu voluntario nō possent, natura ex cubiti
musculis productos tendones, secundum recti-
tudinem digitorum defluxit, eosq; inseruit in ar-
ticulos singulos, hoc est, in caput secundi ossis,
quod nimirū mouendū erat. Quorū generatio
tendoniū, ex nervis & ligamentis in musculis di-
spertis, rursusq; invicē cōiunctibus, est. Senouit
itaq; & mouentur motu voluntario tendones,
ratione nervorum ex quibus constant: colligant
autem musculi ossibus, ob ligamenta quæ in
se recipiunt. At ligamentum ipsum album, exan-
gue, & concutiatum expertum quum sit, nervus esse
videtur. Verum non est natum ex cerebro, ne-
que ex spinali medulla, sed ex ossibus ad ossa trā-
sit, nervūq; multo durius, ac penitus insensibile
est, nec mouere quicquam potest. Ossa igitur om-
nia quæ sub locantur, circa prælocatum sibi ip-
sibus ex immotum manens, mota, extendūtur qui-
dem, quando exterior trahit tendo: si cēduntur
autē, quādo interior. Ne verò per longam viam
& nondam carne, faciliè colliderentur tendones,
membranis vestiunt illos natura, eosq; à muscu-
lis vsque ad articulos, ut paterentur ægrius, ex
quiritè rotundos creauit. Nam quā applicantur,
ibi vnusquisq; ipsorū expanditur, ut facilius mo-
ueat, trahens apprehensio nobis pluribus. Sed
quoniam quatuor motibus, vnusquisq; digito-
rum moueri debet, vno quidē, flexis, alio ve-
rò extēsis, duobus item ad latera: quadrifor-
mam illis applicantur tendones, omni partim à cu-
biti musculis, internis quidem si cēdentes, exter-
nis verò extendentes, mouentibus autem ad la-
tera, deducentes ad paruum digitum: partim à
parnis in manum musculis, qui reliquum ex obli-
quis motum, pollicem versus operantur. Atq;
is sane maximus digitorū, internum quidem ha-
bet vnum tenuē tendonē, duos verò externos,
eosq; robustos admodum: at ex lateribus, parte

quidem quæ est versis in ducem, paruum & te-
nuem habet musculū: altera verò parte, vbi ma-
nus affurgit, hoc multo maior ē. Reliqui omnes
quatuor digiti, intrinsecus quidē duos tendones ma-
gnos, foris verò vnum fortius, alteri illorū,
scilicet minori, æqualem: tenuiorem autem hoc,
eum qui ad latera exteriorū partium peruenit: re-
liquum verò omnium tenuissimū ad latera par-
uum interiorum attinentem. Ac sic quidem rectē
natura, molem ipsorum tendonum, actionis
& vilitatis excellentiæ respondentem construxit.
Quum enim quatuor digiti flexus plurimas
& velocitissimas actiones obeamus, nō ma-
gnos tantum ipsos tendones internos, sed etiam
duplices erant nobis opus habere. Contrariā ha-
berim magno digito. Ad nullū enim aliam actio-
nem nobis si cēdendo est, nisi quando alius iam
curuatus illum desuper trahere oportet. Quia ve-
rò primus eius articulus ossis est, a eum nul-
lus interna parte tendo applicatur, sed ad secun-
dum & tertium duntaxat eius articulum, vnus
exiguus peruenit. Porro duo illi tendones qui
extrinsecus apparent in magno digito, si ambo
quidē tendantur, digitū tendunt ex ætē: si verò
alter eorum, partem alteri sibi proximā ad latera
trahit. Atq; actionem quidem tendoniū ad indu-
cendum perducens, muscularis parvus suscipit, ad
hoc ibi locatus. Contrarium verò, magnus, qui
in palmæ alteri parte, quam thenar vocant, con-
sistit. Atq; vnusquisq; tendo ad suum caput tra-
here particulam natu est, quæ à seipso mouetur.
Tendo igitur qui magnum si cēdit digitum, ab ea
deneruatiōnis, quæ in carpo est, parte, ducit ori-
ginem, à qua nimirum ontur etiam qui ad me-
dium peruenit digiti. Vectus enim super hunc
multo spatio, & colligatus membranis fortibus,
tum primū decedens recedit ab eo, quum ad
manus cauitatem accessit, modo permissi iugo-
rum habentis, quæ per aliquos annulos super iu-
gum locatæ excedunt. Et quædammodū exteri-
orum tendonum illi quidem qui ad alios digitos
per tinent, in superficie locantur, subiacent verò
ipsis qui ad magnū spectant, sic & conuerso, qui
interni ad digitos quatuor perueniunt, per pro-
funditatem manus feruntur: superuehitur au-
tem qui ad magnum deferuntur digiti. Semper
enim natura, in profundo quidem id quod præ-
cipuum est, in superficie verò id quod non est
præcipuum, collocat. Porro musculari denerua-
tiones apparent duplices, quo maxime loco
ipsius carpi si cēdunt, sibi invicem superposi-
tæ: maior quidem ea, quæ est in profundo. mi-
nor autem quæ in superficie: idq; diuisa planè ea
quæ subiacet quidem, in quinq; tendones: quæ
verò superpreditur, in quatuor: & omnibus ip-
sis rectā per latus ad digitos, superuehiuntur qui-
dem minores maioribus, membranis verò for-
tibus quælibet quatuor coniugationem per to-
tam viam manit. Quando autem descende-
riunt ad primos digitorum articulos, ibi quisque
subiacentium tendonum diffusus, caput primæ
aciei si cēdit, per ambens cum membranosum li-
gament. Reliqui verò omne in vnaqueq; coniu-
gatione fertur vltimus, secundum viam à prin-
cipio capiti, rectā ad digitorū extremitates. Vbi
verò

Ligamenta ar-
ticulorum in
digito.

Labia ossium
in digito.

Digitorum ossa
quælibet, et qua-
re sint talia.

Nervus prin-
cipium est cere-
bri, et spina-
lis medulla.

Cor est origo
arteriarū prin-
cipium.

Hepar est ve-
narum omnium
principium.

Nervi deducunt
facultatem sen-
sus et motus.

Arteriæ
mouent.

Veneri vsus.
Tendones muscu-
li digiti præ-
stare ad cubiti
musculis.

Tendones gene-
rati et vsus.

Ligamentū ab
ossibus transire in
arterias, insensibile
penitus, nec posse
quicquam mouere.
Extensio arti-
culi sit ab ex-
teriori tendone.
Flexio autem arti-
culi sit ab inter-
iore tendone.

Tendones car-
pi vestiti mem-
bris argenti-
colis sunt.

Digiti quadri-
formem motum
habere, quadrifor-
mam applican-
tur tendones.

Pollicis tendo-
niū à musculis.

Digitorum vnus-
quisq; tendens.

Flexio digiti
in carpo magna
duplex est: tendo-
niū sunt data.

Pollicis tendo-
niū carpi talia.

Thimar.

Natura prou-
dentia.

Musculari dener-
uatione de
plicat.

Tendonum in
articulis digito-
rum inferius
nati talia.

verò ad secundos articulos pervenerant, ibi rur-
sus tendo superior bifariam diuisus, & vtraque
parte amplifiata circa subiectam tendonem in-
volutus, internis partibus capitis secundæ aciei
inferitur. At ille qui subditus est, solus inde ad
tertiam articulationem ascendens, ad caput ter-
tiæ & ultimi ossis digitorum, etiam ipse implan-
tatur. Flectitur quidem vniuersique qui iuxta
ipsum est articulus à dictis tendonum implanta-
tionibus: extenditur autè ab externis carpi ten-
donibus. Sed tendones interim, qui per profun-
dum feruntur, primò & tertium articulum vni-
uersique quatuor digitorum movent. Qui autem
per superficiem, hoc est, exiguè, ad vnum, nempe
mediū, implantantur duntaxat. Quia verò nulla
caro ex seipsa sensum habet, & ablutum erat ap-
prehensorium organum in sensu tegi particula,
non paruum nervorū portionem in carnes ma-
nuum natura diffeminavit. Ex quibus sic factus
musculus, produxit tendines, lateralesque vni-
uersique digiti partibus eos implantavit: dextre
quidem manus, his partibus que versus sinistram
flectitur verò, eis que versus dextram sunt sitæ.
Reliquos verò tendones, qui ad laterale vni-
uersique digiti partem perveniunt, à cubiti muscu-
lis generavit. Ceterum oriuntur ipsi tendones
ab eodè principio, quod iuxta carpi est, omnes:
feruntur autem ad digitos secundum rectas li-
neas, æquales angulos ad caput ipsum efficien-
tes. Quare principii ipsum, summities tendonum
flectit ad seipsum cogit. Nam si cessantibus
motibus iis qui sunt ad latera, potius extende-
ris, vel flexeris digitos, extendente quidè te, di-
stabant: flectente autè, in idem mutuo cobibēt.
Ad hæc, tensos eos coniungere possumus, si dextri
quidè digitorū eum, qui est in lateribus, sinistri
tendit, sinistri verò, dextrū tendamus. Rursus
plurimū à se invicè abducemus, si ipsius quidem
dextri, dextrum, sinistri verò sinistrum similiter
distenderimus. Si verò neutro lateraliū tendonum
agamus, sed à externis tantum, mediam præ-
dictarum constitutionē habebit digiti. Enim-
verò in vnoquoque articulo, vnica quidem no-
bis figura est indolens, media videlicet: alie verò
à media recedat. Omnino autè dolorificæ sunt ex-
tremæ figure, post quas nimirū nec flectere, nec
extendere licet. Merito igitur inter omnes figu-
ras ea est maximè dolorifica, quæ dux quidè mo-
tionis musculus, extrema contractione, huic autem
oppositus, perfecta extensione cruciatur. Fi-
guram verò mediam vtrinque circumstantes ope-
rantur, aut ambo musculi, aut altere omnino: po-
tèst tamen aliquando in ipsa neuter eorum ope-
rari. Ceterum parvorum tendonum motus non
poterit vnaquæ magnis à genibus apparere. Nul-
la autem ex parte offendent digitorum flexio
aut extensio, etiam si abscindantur laterales ten-
dones: quorum is quidem imbecillior est, qui
est interior: vterque autem operatur tensis digi-
tis, quiescit verò flexis. Quum autem in vtrinque
manus digiti articuli triginta habebit, quorū
vniuersique in locis quatuor implantationes ten-
donū habet, præter primū magni digiti articu-
lum, qui secundū quidè latera, extrinsecusque ap-

plicationes tendonū recipit, intus verò nullam:
erunt vniq; omnes applicationes ad digitos per-
tinentes centum & duodeviginti. Porro similes,
vtpote secundum animam animalī ridiculo, ri-
diculū quoque corporis naturā tribuit: id quod ma-
ximè licet cernere in formatione pollicis, qui &
parvus & ridiculus est, parimque ab indice distis.
Quod aut si pauciores digiti essent, multe actio-
nes imperfectius absoluerentur: pluribus autè
ad nullam rem indigemus, id adeo perspicuum
est, vt demonstrari non debeat. Quare pulcre
quidem natura quæq; in vtraque manu digitos
fabrefecit: quæ vt est ne quid deficiat sollicita, ita
nihil frustra operatur. Cur autem inæquales di-
giti omnes sunt facti, atq; medius omnium lon-
gissimus? Sanè quod eorum summities ad æ-
qualitatem venire melius erat, quum magnas a-
liquas moles in circuitu comprehendunt, & quū
in seipsis humidum vel paruum corpus continere
conantur: ad quod quidem inæqualitas digi-
torum vtilitatem præstat manifestissimam.

GALENI PERGAMENTI de vsv partium lib. II.

VNumquemque autem musculum, ex iis
qui radium & cubitum circulo compre-
hendunt, adeo adornavit natura, vt ne
construere quidem melior ulla posset excogi-
tari. Porro musculorum omnium cubiti & ma-
nus numerus, ad viginē tres pervenit. Septem
nanque parvi sunt in manu: alij tandem magni
totam anteriorem regionē cubiti, vt reliqui no-
uem totam posteriorem occupaverūt. Parvi ita-
que manus extremæ musculi, duces sunt alteri-
us obliquoꝝ morum. Eorum autem qui
sunt intra cubitum, duo quidem maximi, digi-
tos flectunt: magnitudine autem his secundi,
duo etiam numero, totum carpum: obliqui ve-
rò duo, primum quidem radium, cum eo autem
& totam manum, ad pronam figuram circum-
agunt. Reliquis eorum septemque, qui minimus
est eorum qui in longum extensi sunt, nullum di-
gitum movet, sed alterius vtilitatis grata factus
est, quam procedente sermone enarrabo. Ex iis
verò novem musculis qui in cubiti externa par-
te consistunt, vnus quidem digitos omnes, præ-
terquam magnum, extendit, duo autem alij eos-
dem quatuor digitos ad transversum abducunt.
At quartus alius musculus, solum magnum di-
gitum movet, altero motu exteriorum duorū,
scilicet obliquiori: alius item vnus reliquum ma-
gni digiti motum præstat, moderatèque carpum
totum extendit. Fortiter autem hoc circa car-
pum efficiunt alij duo musculi: reliqui verò duo
convertentes ad figuram supinam radium, cum
eo & totam manum, ad eandem ducunt figu-
ram. Ceterum in tres magnas partes tota ma-
nus diuiditur: quarum vna brachium, alia cu-
bitus siue vlna, tertia appellatur * extrema ma-
nus. Sed de brachio quidem nunc sermo non
est futurus. Cubitus dicitur totum membrum,
quod est inter articulationem carpi & anconis
mediū. Ancon autè est pars illa cui insinimur,
& quam etiā totius nomine, appellant cubitum.

*Carnem omni
est ex se insen-
sibilem.*

*Tendones digi-
torū vnde om-
nes oriuntur.*

*Figura indolē-
tis in singulis
articulis me-
dia.*

*Figura extre-
mæ sunt dolo-
rica.*

*Figura media
qui stat.*

*Tendonum late-
ralium conside-
ratio.*

*Articuli entis
digitorum ma-
nim, triginta
numero.*

*Implantationes
tendonū ad di-
gitos: prout in
duodeviginti.
Similium ridi-
culæ animæ ri-
diculæ cor-
poris tributum*

*Naturam mi-
hil frustra ope-
rari.
Digitorū ma-
gnitudo ad
quid exadus
sit.*

*Musculi cubiti
& manus ve-
liginti tres.*

*Musculorū ma-
nus vlnæ.
Musculorum
cubiti vlnæ.*

*Manus partium
divisio.
Brachium.
Cubitus.
Extrema ma-
nus.*

Ancon.

Ceterum osium cubiti, alterū quidem maius, cuius pars est ancon, speculalis vocatur cubitus, quod iuxta media manus figura, vñ alter, nempe radio, subiacet. Cubiti verò processus osium radii & cubiti, qui carpo inferuntur, vocitur quidē & id ipsum quod sunt, processus, & interdū capita, & tuberāda. Vñ cuiusq; digitorū proprius vnus parvus musculus inest: duo autē alij maxime in manu rhenara generat, per quos tum carpona pars manus alia, media verò caua efficitur: tum digitorum vterq; maximus & minimus, primum abducuntur ab aliis. Qui autē inter magnū & indicē adducit musculus, eam partē replet, posticemē obducit ad indicē. Inferuntur tamē in istum pollicē alij fortiores tendones, à musculus vñ par quatuor. Quare qui quatuor quidē sunt qui quatuor digitis insunt, duo autē circa magnum, alij verò vnus ad parūū digiti, rationabiliter omnes manus musculus septē sunt facti, à quorū singulis haud ab re vnus est tendo productus. Iam verò duo iuxta musculi, qui intra cubitū sūt, & ipsos digitos sēcutur, mediū exquirēt regionem obtinent: quoniam & capita tendonū sēcutiū digitorū, ad mediū regionē pervenire erat melius. Vtriusq; verò vnus est sēctus carpi. Alij autē duo intertrecus in vlna cōfistūt, eam ad obliquū ducentes. Reliquis extensorū secundū longū musculorū intra vlnā, tenuissimus omnium, in superficie cōfistit, à quo quidem vnus tendo productus, sub interna caua manus diffeminatur, nullū quidem articulum mouens, sed ipsam perficiens rangendi vim, quæ ad apprehensionē requiritur. Exteriorē verò cubiti musculorum, qui quidem extendit quatuor digitos, in superficie sub ipsa caua locatus est, mediū maxime notissimū membrum regionem obtinent. Alij autem post eum, oblique ad mediū descendentes regionem, tribus quidē maioribus digitis, duo: reliquis verò minoribus, reliquis explanationes mittit. Reliquorum verò trium, vnus quidē qui in vlna est, carpum tendone simplici extendit: qui autē sunt in radio, alter quidem condylum eius transcendens, obliquus, in duob; digiti, extendit simul carpum, & magnam, digitum abducit ab aliis: reliquis autem extrinsecus, ad pronum circumducit extremam manum, atq; ipsum carpum extendit. Sunt & alij duo in vlna, ipsam circumverentes: obliqui quidem, quoniam & motus quē efficiunt, obliquus est: perveniens autē ad radiū os, quoniam hic motus est actio dearticulationis huius osis, quæ ad brachium cōfistit. Apparent itaq; nouē quidē extremi, septem autē interni musculi, si adnueres duplices illos musculos, qui circumagunt obliqui vlnæ. Nam qui manus gratia sunt conditi, septem quidem extēri, quoniam interni habentur. Quom autē quatuor sunt motus carpi, extensio, flexio, & pronum circumductio, & ad supinum: duo quidem tendones & musculi sunt duces flexionis, duo autem alij extensionis. Hi verò ipsi etiam conversiones laterales cōnnectant ad pronā signifi, simul adiuvantē quippiā os musculo, qui in externa vlna locatus, definit in medium potissimū metacarpum, per tendonem duplicem, sēcutiūmus igitur carpum tendonum, alter quidem ad

em quæ supra paruum digitem, alter autem ad eam quæ supra magnum est, regionem internam pervenit. Ad eundem verò modum extenduntur vtræque, hic quidem supra parvum, ille autem supra magnum digitum, superius partem implantantur. Ac si vtræq[ue] tenes tenuis idem, & eadem quidem internæ, tendunt externæ manum: tenio vero altervtrò ipsorum, altero quidem qui ad magnum digitum, parte internâ, altero autem qui ad parvum, parte externâ est, ad proum scilicet quodammodo manus circumducitur: eo verò qui ad parvum digitem, tenio intrinsecus vel eo qui ad magnum est, extrinsecus, ad supinum. Si verò simul tenes fiant, & qui ad magnum digitum intrinsecus est, & qui ad parvum extrinsecus, non amplius sensim, sed quamplurimum sic ad proum circumagitur manus. Ita etiam & eo qui ad parvum digitem intrinsecus est, & simul eo, qui ad magnum extrinsecus, tenio, admodum manus supinâ fit. Distingueret autem oportet carpi motus, à motibus totius vlnæ. Sunt enim & huius quatuor motus, proportionè quatuor motibus respondentibus, qui ab his, quæ ad brachium sunt, & articulationibus fiunt. Etenim extensum, & itexam, & circumductum ad proum & supinum, videbis totam vlnam, quæscitè manus. Sed extensio nê quidè & flexio, vlnæ articulatæ, quæ est ad mediâ brachii, efficiuntur: circumductio verò ad latera, articulo brachii ad externum eius caput. Ad duo quidem musculi ad proum circumducunt, duo autem ad supinum convertunt radium: nam sarnus fuit duobus musculis, quum vni talem motum educeret. Eorum autem musculorum, hic quidem in superficiei partes quæ iuxta brachii sunt: ille in infernas, iuxta carpum inferitur: scitur verò vltra amplius vterq[ue], nec in ipsas folium inferius extremitates, propterea quod carnosæ partibus immittuntur, antequam in tendones definant. Ab eis siquidem nullus tendo producit, quum impossibile sit ita propinque fibris ossibus, incipientem ab vlna musculum, in nervosam tenditatem mutari, inferi radio. Nervus quippe & ligamentis in carnes musculi diffeminatis, postea paulatim in idè acceruat, generatio fit tendonibus: paulatim autem illud longior eget via, & maxime quando ex magno musculo acceruat fit. Verum autem efficit quod dicitur, ostendit quia radio incumbit superius musculus, à quo solo inter quatuor prædictos musculos, quod minimus & longissimus sit, membranosus iuxta finem explanatur tendo, enatus à partibus radio interius, prope carpum. Collocatur autè natura, eos quidem, qui ad proum figuntur membrum circumducunt, ex internis partibus, omnium primò securitatis gratia, quum plurimas & maxime necessarias, & vehementissimas, in hac figura, actiones obeamus: eorum verò quia ad supinam abducunt, alterum quidè occultatur in regione inter vlnam & radium mediâ, cum ab vlna in radium producentur: alteri verò imposuit de superius radio, longissimum faciendū hunc omnium, qui circa membrum hoc sunt musculorū. Perveniunt itaq[ue] superior quidem extremitas ad externam brachii partem: inferior autem

Vine quarter
mature.

Maſculi conſe-
rentes ratiſſimè
ad primum, ſe-
ptimumq̃.

Tandanus ge-
nialis.

Redness

Processus cubi-
ti.
Dipiterum sin-
gula propriam
adesse muscu-
lam.

34. a more successful
 35. 1000.

Tangendi vi
in manu a quo
perficiatur lau
dine.

Carpi mutis-
net quot, & à
quibus profe-
da trancheau.

perquam mouet radium, in membranofum tendonem deficiens, applicatur intrinsecus eius partibus, prope ipsam cum carpo articulationē. Porro ubi quis viderit, quando neruū aut tendonē aliquem præterferri opus est magnam ossis convexitatē, vnum horū trium fieri, aut cauari particulam, aut perforari, aut omnino circa basim eius, neruum involui, nusquam autem nudum, aut non munitum vehi per convexitatem, intelligit omnino tunc quantam artem in securitate singularum partium ostendit natura. Ac tendones quidem ipsos trini exteriorum manus musculorum carpi mouentium, radix, & vine cauata excipiunt. Mox autem & ligamenti latius, & fortius, & duris, quæ ossa suscipientia producunt, induuntur omnes eius loci tendones, vt neq; ad incidentibus extrinsecus promptè panantur, neque à duritie ossium ladanur. Iam verò imbecilliores quidē actiones, paruis cōmisce natura musculus: ad vellementiores autē, non magnos solum, sed etiam binos fecit.

Natura sollicitudo circa partium securitatem.

Carpi ex ossibus constit.

Metacarpij, ossa quatuor.

Quod pertinet ad carpi compositionem, in concavum quidem intus, convexus foris, octo ex ossibus constat, quæ vnum putabis esse, nisi prorsus membra nā abutulis e cooperentes. Habebat autē anteriorē sui finem, quatuor cauatas exiguas, quæ inarticulantur cum metacarpij ossibus, numero nimirum quaternis. Cartilago autē non has modo, sed etiā eas quæ in ipso sunt carpo commensuras omnes oblinet: easque foris cōprimunt membranas fortes, quæ sunt ligamenta simul ipsius articularis & operimentum, totis ossibus circumposite. Quatuor verò metacarpij ossa sibi invicē propinqua vsq; ad digitos protenduntur. Distant tamen à se invicem, nec sunt coniuncta, sicut ossa carpi, quia plurimum invicem distantes digiti debebant articulari. Sed & figura, convexa foris quidem leuiter, intus vero firma magis facta sunt, vt post ossa carpi locata, illorū speciem imitarentur. Tam igitur carpi, quā metacarpij ossibus robur colligationū auxilio est, vt minus laxentur in manus vehementi extensione. Extendimus autem organa quæ in carpo & metacarpio sunt, vt cavitatem quidem manus repleamus, complanemus autem convexitatem. At concavum effecturi manum, prorsus cōtraria facimus, prius tenta flectentes. Quibus motibus minimè obsequeretur carpi & metacarpij ossa, si essent omnia vnum simplex. Iam verò si inter digitos & vnam vnum simplex os esset, ubi semel cōstringeretur, mox totum præter naturā haberet, vtq; vnum exiens: ad quod minimè accedere posset carpo, nec metacarpio, vel si aliquid eorum os confringeretur. Quinetiā vt omnino nihil patiantur, melius fuit ex multis componi, & possimū ita duris. Cedentia enim occurrentibus ad suas articulationes, exoluant ipsorum violentiam. Sagitta siquidem, tensa copius facilius quā laxa penetrat. Ad hæc, multiformis figurarū varietas, ad eam, quæ cōmunis est, patendi difficultatē conducit incredibiliter. At vero prima articularum pollicis, ossa carpi propinqua inarticulat. Nam si alicui ossi metacarpij cōmisteretur, parua vtiq; esset ei distantia ab indice. Constat autē metacarpium ex quatuor

Carpi ex metacarpij ossa constit.

Figuratum varietatem conferre ad patendi difficultatem.

Metacarpium constit ex quatuor ossibus.

ossibus, quoniam quatuor tantum digiti in ipsum articulari debebāt. Ceterum quia in carpo multa fieri ossa fuit melius, componi verò fines eorum cum vna non similiter vt cum metacarpio, in duos ordines ea digeriat natura. Quam igitur necessariū sint quatuor metacarpij ossa, adiaceat autem eis in vno ordine primū magni digiti os (quod sanè nonnulli propter hoc ipsum metacarpio attribuerunt) & hic vniuersus ordo inarticuletur inferiori parti ipsius carpi, conuenienter ex quatuor quidem hæc pars, altera autem quæ vine inarticulat, ex tribus ossibus facta est. Quam itaque tres sint ordines inter vine & scissionem digitorum inedi, qui quidem est ad vineam, ex tribus ossibus quamarcuissimè iunctis: qui verò deinceps est, ex quatuor laxius compositis: tertius deniq; huic inarticulatus, ex quinq; compactis est, quorū vnum quidem est magni digiti, alia verò quatuor, metacarpij.

Videlitur itaq; sic quidē carpus septē omnino constare ossibus, præter quæ est aliud prælongum, quod vehitur per internas eius partes, in quibus & inarticulat, ad tenuem vine processum. Quoniam igitur carpum oportet inarticulari vine, ac radii sinibus, conuenienter horum os vtrumq; epiphysim habuit, gibbā quidē & rotundā extrinsecus, concavā verò intrinsecus: sed epiphysis quidem radii, vndiq; labium habet circumpositum, à quo exactè stringitur is terminus carpi, qui ad vineam spectat: vine autem epiphysis, nō amplius similiter, sed interna quidem sua pars, & quæ spectat ad radiū, est similis: alia verò extremitas, quæ secundum longitudinem & rectitudinē tonus membri extat, in rotundū caput finit, quo circumdata locatum ibi os carpi, cōcauitate leuiter profunda: vt duplex sit articulatio in carpo: altera quidem finium ipsius carpi ingredientium cōcauitatem inter epiphysim radii & vine mediā: alia autem parua, ossis circumplectentis parua apophysim vine. Atq; hæc quidem gratia versionis manus ad prouum & supinum facta est: propter aliā verò magnam extenditur & flectitur carpi articularis. Ob hæc sanè, gibbositates hæc sunt finium vine & radii. Quia tamē extrinsecus quidē magna erat altitudo ipsi extremis vine, internæ vtrōq; partes imp & demissæ, propter apophysim eius parua extrinsecus & interne locatā, posuit hic natura, veluti quoddam vallum, prælongum os, intrō nutans rectum, à quo ea quæ ibi sunt sita, muniantur. Atq; hoc est os carpi octauum de quo distettere distuleram. Cuius finis quidē inferior, sulatilis & cartilagineus est, validissq; quilibet membranis alligatur circumiacentibus ossibus, atq; in ipsum tandē inferior ille tendo, qui carpum flectit. Quinetiam aliam quandam in ossis parui cartilaginei naturā creatur, per colligationes fortes copulat, partim huic nunc dicto ossi ipsius carpi, partim ei quod est post ipsum, articulo ad primam aciem magni digiti, vt & ibi cōtingat parte altera tendonem, à quo magnus digiti atq; carpi mouentur. Nam aliquis potest hoc os numerare, sed non est numeratū ab anatomicis, sicut nec aliquid eorum quæ rursus vocantur, quæ multis manuum & pedum

Carpi ossa, nūq; vna sunt.

Epiphysis radii & vine, quæ terminantur in carpo.

Carpi articulus duplex.

Carpi finis a clavi vsq.

Tarantula.

*Tendones ex-
tendunt atq; fle-
ctunt carpa.*

*Vlna positi-
o nlla.*

*Radix dearticu-
lationis.*

*Radius cur vlna
incumbat.
Radix vlna,
quod pertinet
ad figuram et
distinctionem,
distinguitur.*

*Coram.
Vlna extremi-
tatis figura.
Brachij epiphy-
se.*

*Radix vlna
brachij.*

Brachij capita.

*Brachij osis fi-
gura.*

articulis natura velut auctariū circumposuit, se-
curitatis gratia. Iam verò ex quatuor tendoni-
bus extendentibus & flectentibus carpum, qui
quidem extorsum sunt, manifestè apparèt obli-
qui, & perveniunt, hic quidè magis ad externas
partes aciei, quæ est ante parvū digitur: ille aut
ad internas aciei, quæ est ante magnū. At inter-
ni, obliquiores quodammodo sunt, vt non solū
extendant, & flectant, sed etiam circumdu-
cant manū ad latera. Ad hæc positi ipsius radij,
obliqua merito fuit, quemadmodum vlnæ positi-
o recta: hæc siquidè extensionibus & flexioni-
bus, ille verò cōversionibus ad latera subseruit.
Ob eam causam ad brachiū vtriusq; osis dearti-
culario, dissimilis fuit. Porro superiore extre-
mitatem radij, ad caput brachij externum pro-
duxit natura: inferiorem ad magnum extendens
digitur, quod videlicet talis obliquitas multo
paratior sit, vt motibus ad prouum obediat, qui
ad plures ac magis necessarias actiones sunt va-
riles. Cur autem incumbit vlnæ radius? quia hoc
illa longior est, & plurimum articulationis ad
brachiū ipsa obtinet. Sed cur vtriusq; partes,
quæ in medio quidem sunt, tenuiores: quæ in cu-
bito autem & carpo, multo crassiores existunt?
quia illas musculi locū præbere oportebat, hæc
crassescere per epiphyyses. Cur ex ipsis finibus,
ille quidem vlnæ, qui in cubito est, crassior: ra-
dij verò, is qui ad carpum constitit? an quod v-
triusque est ad carpum dearticulatio? In ea verò
dearticulatione quæ est ad brachium, tantum su-
peret vlnæ radius necesse est, quanto vlnæ dear-
ticulatio cunctis manus sectionibus cōmodior
existit. Sunt fanè hoc loco quidam processus ip-
sius vlnæ duplices, gibberosī quidem foris, caui
autem intus: vnus ex posterioribus & infernis
ipsius parvibus, qui certè & maior est: alter ex an-
terioribus & supernis, multo minor priore. Con-
uersis autem ad se uicem eorū cōcauitatibus,
vna ex ambabus constitit magna cavitatis, si-
milis literæ græcæ Σ. quos quidem exortus vocant
aspiones: atq; hæc vlnæ extremitas talem habet
figuram. Brachij verò extremitas hoc modo
secundum laterales partes capitis epiphyse
habet: hanc quidem foris, illam autè intus: quarum
in medio cavitatis quædam est, ipsius & rotunda,
similis rotularum vocatis cavitatibus, circa
quam vlnæ coram mouentur. Vbi autem ipsa
desinit, vtriusq; *Radix vlna*, hoc est, brachij cavitates
constitunt, quæ extendentibus totam manum,
& flectentibus, vlnæ *aspionem* ingredientem, suntq;
hæc extremitas extensionis & flexionis terminus.
Quæ dearticulatio ita simul & accommodata ac-
tionibus facta est. Porro brachij caput, alteram
quidem externum & minus, ob radij ad ip-
sum dearticulationem est factum: alterum verò
maius, qd intus spectat, nullum os sibi cōiun-
ctum habet, sed nodus prominens, vas munit
quæ illac perreptat, in ipsūq; annexetur capi-
ta musculorum vlnæ interiorum, qui secundum
rectitudinē eius sunt siti. Non solū sūt radius
& vlna brachio, sed etiam radius vlnæ validis
ligamentis natura cōnnxit, vt omnia quæ firmi-
simè cohererēt. Os igitur brachij rationabili-
ter quidem extrinsecus magis est gibberosum:

internis verò partibus magis simū, vt ad se uici-
cem converterentur manus, id quod longè erat
melius. Talis etiam constructio brachia efficit
apriora, ad comprehendendū cōvexa corpora,
præparando simul locum vasīs, quæ ad totas ma-
nus feruntur. Quum autē vlna duobus prædicta
motibus esset, extensione & flexione, necessariū
erat interna quidē ipsius brachij parte flexionis
ducem musculū, externa verò extensionis, loca-
ri, vt rum ipsam motionē vlnæ, tum brachio re-
gementum præstarent. Ne autem regio illa quæ
inter ipsos musculos quædam futura erat, super-
na nempe & interna, omnino nuda relinque-
retur, aut otiosa veluta carne, fortiores simul ac
tutiores motus natura addidit, duplicata mul-
titudine musculorum. Ex vtraque siquidem parte
duos obliquos musculi in ipso membro pro-
duxit, figura simili X græcæ literæ, sese mutuū
secantes, prope dictas regiones: positione & quo-
rum rectio esse vndiq; brachio contigit. Hoc sūt
est dignū admiratione, quod binis obliquis mo-
tibus, ynū rectum cōficiunt, quemadmodū car-
pum mouentes tendones. Atq; vnus quidē mus-
culorum flectentū vlnam, ortū habet ab inter-
nis partibus loci, qui ad lumen vergit: inde au-
tem perferitur ad anteriores brachij partes: alter
autem minor, explanationem quidem ab inter-
nis brachij partibus habens, intro illinc paulu-
tim sese conuertit. Maiori porro musculi agen-
te, manus tangit internas regiones articuli, ad
humerum spectantes: minore verò, exterius
oppositas. Eodem modo & posteriores brachij
musculos reperies factos, oppositos scilicet v-
triusq; vtriusq; interiorū, idq; pari crusta similis
dine. Ambo nanq; inferuntur cubito, sed humi-
us quidem maxima pars, ad internas cubiti regio-
nes: illius autem, ad externas: & prioris quidem
dictorum supernæ explanationes, in internis
brachij magis: alterius autem, in posterioribus.
Ergo musculi duo interni, secundum rectitudi-
nem quidem exactè tendunt vlnā, si ambō ten-
dantur. Sin autem alter quidem eorū agat, alter
verò quiescat, parum a rectitudine versus alteram
partem deflectunt. Eadem ratio est habenda
in extensione quam moliantur his oppositi
musculi. Iam verò laxiora & cauenosiora, magis
concaua semper sunt ossa maiora cunctis
minoribus, ne maximo grauent onere. Sed intra
cavitates eorū medulla reposita est, familiaris osi-
sibus nutrimentum. Enimvero in cubiti & carpi
articulis, non crassa modò, sed etiam dura quæ-
dam ligamenta vndiq; contrahentis, & prohibe-
ntia, ne articulum ossa plurimum a mutuo
connexu resiliant, ac distent, sunt facta. Quapro-
pter essi sæpe violenter moueri cogantur, minus
tamen quàm in humeris, articulum luxurio
accidit. Non enim fieri potest, vt os aliquod suo
articulo oberraret, nisi plurimum a reliquis distet.
Non autem omnes articulos natura firmos con-
struxit: quoniam pugnam habebat necessariam
varietas motuum, cum securitate constructio-
nis, nec poterant in idem cōvenire ambæ. Sequit-
ur enim illa quidem laxitatem dearticulatio-
nis, hæc autem stabilitementum, & omni ex parte
constructionē. Quare cū duo sint quæ stabili-
tem

*Musculum fl-
gentem atq;
extendentem v-
nam, qui firm.*

*Musculi obli-
qui in brachio.*

*Rectam motū
ferri in musculi
obliqui in bra-
chio, dum obli-
quo finit motu
mouentur.*

*Musculi vlnam
fl-
gentem vnde
orientur.*

*Ossa maiora
intus semper ca-
uosa sunt, ut
nutrimenta
recipiant.*

*Motum vari-
etatem parare
cum costru-
tionis securitate.*

*Diminutione
quod
efficiantur
Hominum
carum
ex
causa
compositionis,
et
fuerint
legitimi
termini.*

tem articulorum efficiant, fortitudo videlicet ligamentorum, & exacta compositio, utraq; quidem est in cubito & carpo, altera vero in digito: in humero autem neutra exacte invenitur.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium, lib. III.

*Manus
solus
animalium
habuit.*

*Homo
solus
inter
pestiferum
bi
po.
et
fuerint
legitimi
termini.*

*Naturam
nam
posse
mutare
corpora
plurima
modis
differen-*

*Cum
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

*Quod
autem
non
recipit
quod
fuerint
legitimi
termini.*

MANUS solus animalium solus habuit, organa animalium sapienti convenientia. Bipes vero ipse solus inter pede
stria factus, & erectus, quia manus habuit. Cur autem non habuit quatuor crura, & prater ea etiam manus, sicut centaurus? Quoniam primo quidem impossibilis est ipsi nature, corporum adeo diversitum multo. Neque enim si coitus quidam veneretur homini cum equa fiat, perficiuntur matricis sperma. Quare quod de centauro fertur, omnino fabula est. Equi siquidem asini, & alina equi poterit sperma recipere, perficeretque ad animalis multum generationem. Ita & lupi masculi canis, canis vero ipsa non lupi solus, sed & vulpes, sicut & vulpes canis. Equi autem humana semen forte non receperit quidem in sinu matricis: longior enim pudendo opus fuerat. Quod si quando id suscipiat, corrumpit utique ipsum vel mox, vel uero multo post. Iam vero si homini quatuor adessent crura, esset inepissimus ad universas humanas actiones, & ne federe quidem posset. Etiam ut solus homo erectus stare, sic etiam solus federe posset. Ad animalia cetera, quae deitura sunt manibus, oportuit hoc quidem antea superius tibi cibum ad mouere ori: alia vero, inclinata sumere. Ceterum quae herbis vescitur, alia quidem solidas, alia vero bifidas habent vngulas: carnivora autem, habitu feroci quod sunt, non solum habent multos pedes, sed etiam curuos vngues, firmisimisque fortitudo. Porro quatuor omnino sunt timida, his neque solidas vngulas, neque cornu, vice propugnaculi, inest, sed vngula tantum tenuis bifida: atque haec quidem inclinata pascuntur. Carnivora autem anterioribus pedibus pro manu utuntur, & ad retinendum animal quod venata fuerint, & ad cibum ori afferendum. Quareque vero animalia exanguia, ea sane frigidiore temperie sunt: quapropter imbecilliora omnino, & ad motus pignora, parvis & multis utuntur tibiis. Quaedam autem etiam ob id praelonga totis corporibus facta fuerint, sicut & iulus, & colopendra, copiose tibiis productioni naturalis locum suppediunt. Omnibus sanguineis pedestribus, quae maxime hominibus asinulantur, quatuor sunt pedes tributi. Tunus siquidem erat ipsis, quatuor ambulare tibiis, qualem rectis stare super duabus. Nam sic ambulantes, ut ambulant, partes ventris, quae sunt offensae magis obnoxiae, occultantur, & custodiuntur a superciliis: expositae autem sunt, quae sunt panibiles minus. Erectis vero accideret prius contrarium. Neque enim manibus & ratione utentia, quemadmodum homo, oppositura erant ventri externum aliquod propugnaculum. E contra autem horum, hominum melius fuit esse bipedi, ut qui ea velocitate, quae ex tibiis multitudine habent animam na cetera, nequequam indigeret, & ad multa, nisi bipes fuisset, deterior futurus erat. At bipedes quidem & aues sunt: rectus tamen solus animalium est homo. Soli enim ipsi secundum rectitudinem crura spina efficit, ceu corporis quaedam carina existens: ad quae crura ipsa, in ambibus quidem, ut & quadrupedibus, angulum rectum efficiunt: solis autem hominibus, instar recte lineae extenditur. Quare corum animalium nullum vngui stare potest. Sed nec federe, quod ad sedendum oporteat crura coxis copulata, in firmioribus ad tibia dearticulatione, rectorum flecti, id quod fieri in illis non potest, quum omnia nimirum anteriorum posteriorum crurum habeant flexiones, quemadmodum priorum rectorum, contra quam in hominibus cernimus. In eis siquidem manus ad antici cubiti parte flectuntur, quod melius sit eas ad se converti: crura autem flexionem in genu rectorum obtinent, nam hoc solo modo pulchre licet federe. Vbi igitur vna rectam linea efficit spina cum cruribus, ad tres differentias figurarum agi animal potest: quod si ipsam quidem spinam lumen reclinauerit, supinum omnino fiat: si ventris, pronum: si firmetur pedibus, tum exacte fiet rectus. Si vero aliquem angulum crura ad spinam fecerint, constat nullam earum figurarum exacte esse rectam. Solus igitur omnium animalium homo & rectus stare & federe potest: etenim omnes manuum in officinis actiones, duabus eis egent figuris: haec namque erecti, haec sedentes conficiuntur manibus. Nemo autem aut pronus, aut supinus molitur quicquam. At optimi ob id recte stare hominem, ut prompte ad caelum suspiciat, hominum est, qui nunquam videntur levare caput: hic namque vel inuisus semper caelum aspicit: quod homo, nisi collum flecterit, caelum nunquam videre possit: qui reflexus etiam affinis inest. Id autem non est sursum aspicere, quum quis supinum seipsum reclinat occulis, sed quando mente naturarum rerum considerat. Postea igitur quam ut manus apprehensionis, ita crura ambulationis erat futurum organum, praestitit non rotandos & duos, sed oblongos, largos, molles, multosque subici ipsis cruribus pedes: quum videlicet talis constructio, ad omnes locorum difficultates, & sicut oporteat sublimis muros, aut arbores, aut petras scandere, maxime opportuna videatur. Etenim equis & bobus, aliisque id genus animalibus, quibus duri & vestiti sunt pedes, melius fuit quoque modo ad patendi difficultate eos coparasse, ut quae nec manus, nec artes habebant homini vero: quid idoncu sibi calcem mentu invenire potuit, sepe etiam nudis pedibus uti, opus habuit praestitit effecit sum delectos, tum molles. Porro ambulatorio fir, altero quidem crure in terra firmato, altero autem circumlato. Sed firmari quidem, pedes: circumferri autem, totius cruris efficit actio. Nec vero ambulantibus tantum, sed currentibus etiam, alter quidem pedum in terra firmus est, alter vero simul cum toto crure profertur. Ceterum mutare quidem loca, beneficium cruris quod mouetur coniungit: quod vero non cadamus, hoc pes in terram fixus efficit. Iam stare quidem possunt, duobus mutis pedibus homines, moveri autem non possunt. Vidi etenim quosdam, quorum digiti soli ad nunc mor-

*Figurari
posse
tripliciter
animal,
si rectam
lineam
efficiat
spina cum
cruribus.*

*Manus
solus
et
rectus
stare,
et
federe
potest.*

*Altera
omnes
manuum
actiones
faciunt
duabus
aut
sedentibus
vobis.*

*Obprobrium
est
piscis
proprie
affici
caelum.*

*Sursum
affici
caelum
non
potest
caelum
firmare.*

*Crura
ambulationis
organum.*

*Pedes
mutis
autem
caelum
firmare
non
possunt.*

*Stare
posse
hominem
duobus
mutis
pedibus
moveri
autem
non
possunt.*

trificati exciderant: sed hi quidem, neque stando, neque ambulando, neque item currendo, in planis saltem & laevibus, vincebantur à sanis, inviles tamen & importes, ad pervadendum aliquem præcipitem locum. Quibus autem non solum digiti, sed quoque ante digitos est, etiam planta composita, fallax lux gressus est, etiam in planis locis. Si vero tarsus etiam corruptus fuerit, non solum huic non possit ambulare tuto, sed ne stare quidem constanter. Constat igitur hunc ad firmam stationem amplos & oblongos pedes esse appositos: quibus accessit multiplex illa fissura, necnon conspicua in medio cavitatis, ad securitatem in gibbosis locis utraq; maxime congruenta. Humanus itaque pes, quam maxime fieri potest, manum imitari videtur. Quare si apprehensivum organum manus fuit, fuerit vitæ & pes ipse, a liu quodam modo, huiusmodi. Non autem habet oppositum aliis digitum magnum, sed in vno deinceps ordine constitutos omnes: nam sic ad firmitudinem ex pediebat. Iam vero quod in humano pede *capitulum* dicitur, carpi manus similitudinem refert: metacarpi autem, *metacarpus*, hoc est planta: nam digiti in pede, digiti manus sunt similes. Hæ igitur tres partes pedis sunt, quales & manus, digiti, tarsus & planta. Subiacens vero ipsi tribus pars pedis, ex tribus ossibus cõstat, talo videlicet, calcaneo, & naviformi osse. Atque iis quidem solis, nulla est in manu particula que proportionem respondeat, sed sunt simpliciter basis solus instrumenta. Aliæ vero omnes particulae, basis simul & apprehensionis. Quæcumque igitur pes, ut apprehensivum instrumentum, manui similia est fortius, ea ad firmamentum de manu habitum, remittenda sunt: quæcumque vero, ut ambulationum, hic enarrare oportet. Quod itaque ex multis ac variis ossibus constituti sunt, invicem quidem multifariam dearticulatis, per membranosa vero ligamenta cõnexis, id ut apprehensionis instrumentis, pedibus accidit. Quod vero & minores quàm manibus, digiti, similes omnes serie positi eis insunt, hoc proprium est pedibus, tanquam firmamentis organis. Tuioris autem apprehensionis ambulationisq; grana, altiores & magis caute factæ sunt pedum partes internæ, externæ: quæ quidem si fuissent æquales versus crura elevati pedis, alter semper pes iudicaret, ac sic ambulatio facili evteretur. Internæ autem partes cõcautans grana, calcanei anterior pars, tenuior est & angustior, magisq; recedere ad digitum parvum videtur. Propterea astragalus, siue talus, intro magis vergere apparet, licet eius partes postemæ, ad medium finit calcaneum firmatae. Quæ autem coniunguntur his ossa, quod calcaneo quidem coheret, cubiforme vocatum, ab externis parvibus pedis firmum in terra statuitur: quod vero astragalo, scaphoides dictum, similitur ipsi astragalo sublimis est, & subalarum à terra, interna regione pedis locatur. Pari autem modo tria tarsi ossa huic coniuncta, & ipsa sublimia apparent, & internis pedis partibus posita sunt: quibus externa parte firmum ac humile os cubiforme appositum est. Sed calcaneum quidem ad externa pedis maximum quidem est factum, quoniam ad perpendicularium subia-

cer toti membro: lreue autem partibus inferioribus, firmationis stabilis grana: rotundum, ut non facile pateretur. Porro astragalus altus, alto naviformi coniungitur, fornicis similem perficiens figuram. His deinceps adiacent ossa tarsi, tria quidem naviformi coniuncta: quartum verò calcaneo. Post hæc sunt plantæ ossa, terram post astragalum contingentia, & naviforme, & continua huic tria ossa tarsi. Deinde sunt digiti, quorum maximus est nō amplius ex trium ossium ordinibus, ut reliqui, constitutus, sed ex duobus. Ceterum ossi quod magno digito præpositum est, duo videntur subiecta esse inferiori parte, veluti sustentacula quedam, & stabilimenta. Ac planta quidem, per proportionem omnino metacarpi respondet. Verum in pede, ceu vno ordine omnibus iacentibus digitis, quantus est illorum numerus, tantus meritis est & ossium plantæ, quæ præponuntur illis. Sed nec carpi quidem ad tarsum proportio constructionis obliqua existit. Si quidem ex quatuor ossibus tarsus cõstat, est, ex duplicatis autem carpi, ceu ex duobus ordinibus cõstans. Nam ex pluribus & minoribus componi particulas apprehensionis instrumentum erat expediens: ut ex maioribus, sed paucioribus, ambulatoriis. Anteriori igitur partes pedis ad museum perfimiles comprehensionis, ex æqualibus illis numero ossibus cõstant. Posteriores vero, quæ instrumenta omnino sunt gressus, nullā habent in manu proportionem respondentem particulæ. Reliqua pars media ambarum, qualis existit tarsus, utriusq; imitatur naturam. Os itaq; quod ab externis ipsius parvibus est locatur, quod sanè & cubiforme dicitur, inarticulatur cavitati calcanei, ad finem adiacentis. Reliqua vero tria tres cubus naviformis ossis obsequantur. Hoc autem ipsum rursus circumambit caput astragali, qui iacet inter adnata tibiæ & fibulæ, superius à lateribus, & præterea à tergo ab ipsis comprehensibilis. Superiacet autem calcaneo duabus eminentiis, illi in dualibus cavitatibus eius firmatus. Atq; extendere quidem & flectere pedem, superne astragali dearticulationis est opus: ad latera vero circumferre, opus est dearticulationis quæ fit ad os naviforme. At pedem & cras firmat, sicut & sustinere vniuersum corpus, ad ipsum præcipue calcaneum pertinet: quo dos, ea de causa nō solum cetera ossa, sed ipsum etiam astragalum magnitudine superat, cum quo in ea habet articulationes firmissimas. Ut autem temus dearticularetur, in medio ipsius & tribus astragalus est locatus, coherens illi validis ligamentis cartilagineis. Dura porro calcanei natura, dura cutis subducta est, ut occurreret violentis occuribus. At cavitatis pedis, trium gratia constructa est, nempe internæ altitudinis, apprehensionis, & leuitatis gratia. Ad hæc, in femore quidem est vnicum os, quemadmodum & in brachio: duo autem in tibia us similia, quæ in vlna cernuntur: quorum vnum quidem vocatur tibia, alterum vero fibula. Maximum omnium corporis ossium femur meritis fuit. Primum namque hoc, firmatum est cavitare, primūq; omnem corporis molem superiacentem velut: curvum quidem, priore & externa parte: rectum

Astragalus cum
tarsis
fuit ossi.

Planta ossi.

Podu magnum
digitu ex duobus
tantum ar
ticulari cõstitui.

Planta propor
tione metacar
pi respondet.

Tarsus propor
tione respondet
carpi.

Cubiforme os.

Naviforme os.

Astragalus.

Podu motu à
quibus dearti
culationibus
proficiantur.

Calcaneum of
se maxime a
firmatione de
articulationis.

Calcanei cava
dorsalis.
Podu cavitatis
trium commo
dorum gratia
efformata est.

Tibia, Fibula
femur esse o
mnium ossium
maximum.

Stationis forme
amplos & ob
longos pedes of
se appositos.

Pes hominis i
mitatur ma
num.
Pes autem app
rehensivum orga
num.

Tarsus æquiva
latur carpi.
Deinde, siue pla
ta, est quod me
tacarpi simi
le.

Talus.
Calcaneum,
Naviforme os.
Basis instru
menta.

Podum cõstitu
tibus.

Podum partes
internæ, cur al
tiores, & ma
gis caute enar
rantur.

Astragalus.
Talus.

Cubiforme os.

Scaphoides.

Tarsi ossa tria.

Calcaneu sub
iacet ad pro
pensionem so
li crura.

*Blasi ad genu
qui sunt.
Famoris parti
superiorum pro
sede ipsis coty-
lem fuerit.*

*Famoris stru-
ctura idonea
ad tensiones ex
tra.
Tibia stru-
ctura.*

*Digitorum pe-
dis motus.*

*Tendones mo-
ventis digitos
pedis, duo tan-
tum genera pro-
ducuntur a ma-
jula tibiae.*

*Tendones qui
inferiores pe-
dis complica-
ntur.*

refinum verò, partibus his contrariis. Quibus
enim famur fuerit natura rectus, & conuenit,
blasi sunt omnino ad genu. Superiori ipsius sym-
moris parti, ipsis cotylem præparauit natura so-
dem. Eius autem collum, statim ex cotyle obli-
quum foras abicedit, ut reliquatur locus inter-
nis famoris valis & musculus: postea autem in-
tro rursus reuertitur, versus genu. Ad hæc, ma-
gis quidem sima retrorsum, antrofurum verò ma-
gis curua quum sit structura famoris, ad fessio-
nes idonea exiit. Quin & tibiā ipsam circa su-
pernas partes magis curuam extrinsecus natu-
ra fabricata est, firmitudinis & velocitatis ratio-
ne. Nam inferiores partes illius, quæ sunt ad
malleolos, intro sese reflectunt. Quemadmodū
igitur singuli in manu digiti, & duplicibus qui-
dem maximisq; flectuntur tendonibus: ab aliis
autem simplicibus minoribusq; extenduntur:
atq; ab aliis adhuc minoribus ad paruum digitū
abducuntur: ac deniq; ab aliis illis minoribus re-
liquis motus internus ad pollicem oblique agi-
tur ita dicamus etiā, & in vnoquoq; pedum digi-
to hos quatuor motus meriti inesse, quum à
maximis quidē tendonibus digiti pedis flectan-
tur, à minimis autem parte interna cōuertantur
oblique. Porro media inter vtroque est magni-
tudo extendentibus, & parte externa circum-
agentibus. Non tamen æque magni sunt in pedi-
bus flectentes, ac in manibus: quia nō itidem ut
manus, pedem constituere oportebat instrumen-
tum apprehensorium, sed basim firmandæ orga-
num. Quanto igitur pes manu est maior totus
rota, tanto huius digiti, illius digitis, & tendo-
nes tendonibus sunt minores. Non ergo fuit æ-
quum, quatuor genera tendonū mouentū digito-
rum pedū à musculus tibiæ produci, quædam modū
in manu à musculus vine: sed duo sola, nempe al-
terum, quod eorum extensionē efficere: alterū,
quod flexionem primi & tertij eorum, qui sunt
in quatuor digitis, articulum. Motus itaque
cuius articulo digitorū pedis mota est quatuor
natura, & quinq; principia ipsorum, ut in manu:
non tamen omnia ex locis proportionē respon-
dentibus procedunt. Tria siquidem ab ipsis pe-
dibus motus principia oriuntur, duo verò defe-
runtur ex tibia. Etenim in ipso qui ad plantam
est loco, musculus obliquus motui interno præ-
stare constituit: in reliqua verò ipsius parte rota
vix ad calcaneū eos locauit, qui secundum arti-
culum cuiusq; quatuor digitorum flectunt, ma-
gno digito excepto, qui à maioribus tendoni-
bus germinationem miserat secundum suū ipsius
& tertio articulo habet, ut is qui est in manibus.
Pariter & ex superioribus pedis partibus alios
posuit musculos, motui externo oblique infer-
uientes. Quare supernē quidem ex tibia, duo
principia motus descendunt: inferiore verò parte
procedunt ex pedibus. Tendones in pedes
inseri, modo quodam similimodo neruis à spina-
li medulla colli in rota brachia productis, impli-
cantur, cōmiserantq; inter se, ut offensionibus
multo foris resistent. Ob id ipsam nanq; vel
vbi magnitudo intervalli magna fuerit, vel lo-
cus periculosus, ibi missionē huiusmodi machi-
natur natura. Musculi autē valde parui, ab anato-

miciis nō animaduersi, primum articulū cuiusq;
digito flectūt, pariter in manibus, pedibusq;. Iam
verò fines tibiæ, fibulæq; simul inter se vniū &
coniuncti, famori exactē in genu ipso adaptan-
tur. In tibia porro tredecim capita sunt tendonū,
retrorū quidem sex, antrofurū autem
septem, mouentq; pedem secundum omnes con-
uenientes eis motus. At conueniunt toti pedi
absq; digitis, motus quatuor, ut carpo. Etenim à
musculo tibiæ superiōre antrofurū, enascitur
quidam tendo robustus, qui in duas partes diui-
sus, paribus circa magnū digitū pedis inseritur.
Ab eo verò musculo qui fibulæ circumtenditur,
prodiens tendo alius, iis inditur partibus, quæ
ante paruum digitum sunt. Qui duo si vtrique
tensi fuerint, attollunt, refinumque reddunt pe-
dem vniuersum: altero verò actionem obeunte,
motus ad obliqua fiunt. Quæmetiam ex posteri-
oribus partibus, proportionē eorum qui sunt in
manu, opposuit natura duas musculorum ger-
minationes, quæ contrarios dictos motus pedis
efficiunt. Quam minor à musculo, qui per pro-
fundum fertur, orta, in eum, qui est ante magnū
digitū, locum infernē implantatur. Altera verò
maior est, conspicuus ille tendo, qui in calcaneū,
fortissimum omnium pedis osium, & principa-
lissimum ambulacionis instrumentum, retrorū
superne inseritur: qui vel si solus aliquando
pariatur, pes necessariō claudicat. * Is tendo so-
lus, ex tribus aliis in ipsum venientibus, atque à
maximis musculus oritur, consistat: ut si vel vnus
ipsorum, aut etiā duo afficiantur, reliqui, aut
reliquis ipsam actionem obeat. Vbi enim hic
tendo calcaneum ad seipsum trahit, sic membrū
vniuersum obfirmat, ut si altero pede stare ali-
quando velis, non possis facile everti, neque la-
besctari. Meminisse autem in vniuersum con-
uenit, obliquos quidem in membris musculos,
obliquos motus præstare: rectos autē exactam flexi-
onem, aut extensionem moliri. Quum igitur
tres sint musculi ipsū calcaneum moueant, &
depilem pedis partem continuat: post illos autem,
tres alij digitos flectant, & in pede conue-
nientem monent edant, iure optimo posteri-
oris tibiæ partis sex omnino musculi fuerint, v-
nusquisq; secundum rectitudinē particulæ quam
est moturus, locatus. Quinetiam anteriores mu-
sculi tibiæ, sex aut septē censentur. Nempe vnus,
qui quatuor extendit digitos. Ex vtraq; verò ip-
sius parte, rursus alius vnus, qui in triplica
tendonū capita definit. Quibus cum ipsis, tum ip-
sorum vilitatibus, si quis intendat animum, ip-
sos sex, aut septem vniuersos statuet. Quod autem
vnguibus pedes proportionē respondeant
manibus, quodq; eis hoc ut apprehensoris orga-
nism in sit, verbis nihil est opus. Cutis ipsam, nō
laxā, aut subtilem, aut mollem, sed constrictā
& mediocriter duram, sensilem, ut nō facile pa-
teretur, subdidit pedi sapienissimus ille conditor
nostr: cui commentarios hos ceu hymnos
quosdam compono, in eo veram effe pietatē exi-
stimans, non si raurorum inuicemque plurimas
quispiam sacrificaret, & cassas, aliq; sexcenta vn-
guenta suffragaret: sed si nouerim ipse primus,
deinde exposuerim aliis, quæ nō sit ipsius sapien-

*Musculi parui
in pede ab ana-
tomis ignora-
ti.*

*Tibiæ lasso tre-
decim tendonū
capita.
Pedi cōueniunt
motus quatuor.*

*Calcaneum fir-
tissimum omnū
pedis osium, et
principalius in-
strumentum ambu-
lacionis organū.
Tendo in calcaneum inferius,
ex tribus aliis
tendonibus con-
stat.*

*Obliqui mus-
culi oblique motus
præstare.
Recti musculi,
exactam flexi-
onem aut exten-
sionem moliri
tibiæ.
Tibiæ posteri-
oris partes muscu-
los sex, aut septē
centum.
Tibiæ anteri-
ores, musculi sex,
aut septem.*

*Cutis pedi qua
subdidit.*

*Commentarios
hos Deo, ceu hy-
mnos quosdam
conscriptis Gal-
lenæ.
Præter vna
qua.*

ria, quæ virtus, quæ providentia, quæ bonitas: ignorantio quorum, summa impietas est, non si à sacrificio abstineas. Quod enim cultu cōvenienti exornatis omnia, nullig bona invenerit, id per seculisimæ bonitatis specimen esse statuo. Invenisse autē quo pacto omnia adornantur, summæ sapientiæ est: at effecisse omnia quæ voluit, virtutis esse invictæ. Ne igitur miseris, universa celestia corpora summo esse artificis disposita nēve eorum ordo vel pulchritudo adeo te atto- 10 natum reddat, vt si infenora hæc comparaveris, parva nbi esse videantur, et omni ornatu carere: siquidem sapientiā, virtutem, & providentiā, hic quoque invenies. Nam tamen ex sanguine mentis et semine, immortale animal, aut im- pambule, aut semper mobile, aut splendidum & pulchrum, quæ ac sol est, non potuerit consti- tui, in ipsa tamē vilitate materis, conditoris ars splendescit. Attonitum enim facit, idiotam quidem, materis artificem autem, pulchritudo arti- 20 ficij. Etenim sol & luna, diuina quidem & celestia sunt corpora: nos autem terreæ statuæ: opificis tamen industria in vtroq; æqualis. Parum & abiectam esse partem verò alius pedem, quis inficietur: magnum verò & pulcherrimum omni- um quæ sunt in mundo esse solem, ne hoc quidem ignoramus. Neutrum tamen corpus com- modius potuisset locari, q̃ est locatum. In mun- do enim medium esse solem inter errantia syde- ra, infimum autem in animali pedem, necesse 30 fuit. Maximum & pulcherrimū rerum omnium esse mundum quis tandem negat? Sed & animal, vel in parvū quiddam mundi esse, aunt veteres nature periti: eandem namq; in ambobus invenies sapientiā Creatoris. Quod si solem quidem ostendit in corpore animalis non liceat, licet certe oculum, organum lucidissi- mum, & quam simillimum soli. Sed neq; oculo, nec cerebro deterius est se constructus, si vtraq; pars ad actiones eius grana facta, se ha- beat optimè. Neq; cerebrum sine pede se probè haberet, neq; pes sine cerebro: eget enim, opi- 40 nor, illud quidem vehiculo, luc autem sensu. Vehiculum enim cerebri est pes, ac totum corpus reliquum: sensum autem ipis cerebrum præbet. Etenim illius tendonis triplicis qui ad calcaneū descendit, superficialis portio ad inferiorem pæ- tem pedis prætergredia, cū ad intrinsecum ve- stigium subducitur: profunditatem autem pedis, quæ est sub cute, in qua etiam duo parva muscu- 50 li sunt, distribuitur parva germina eorum nec uorum, qui à spinali medulla oriuntur. Per quæ organa pars pedis inferior facultatem sentiendi suscipit. Vt autem neq; admodum sensibilis sit, neq; promptè patiatur, excessus vtroq; vitavit natura, mediā exactè fabricata infernam pedis cutem, inter mollem & duram. Porro fibula extrinsecus tibie est artensā, renue admodū os, & multo minus quā tibia. Atq; vna quidem fi- 60 bulæ vtilitas est, dearticulationis ad astragalum, à qua extenditur pes, atq; flectitur. Altera autem, quod omnia vasa & musculos tibie custodiat ab iniuriis extrinsecis. Tertia vtilitas est in externo femoris capite, quod nbi sustinet. Ad id enim loci à diffinita, firmitudine & securitate non pa- 70

rum confert. Ceterum quum tibiā portandi femoris gratia præstaret esse maiorem, vt autem ipsa moueretur facile, minorem, esseq; necessa- rium alterum eligere, quum ambo simul coue- nire nō possent: rano quidem fuit eligere quod vilius, alterum verò non omnino negligere. Propterea igitur minorem fecit femore tibiā, non tamen vsq; eo minorem, vt non posset iam rano ipsū portare. Ad hęc, si abiq; articulus fuis- set constructum crus, nec extendi posset, nec flecti: in multas autem articulationes diuisum, lu- bricum ac fallax esset adeo, vt nunquam con- stanter vno crure stare possemus, quin conse- sum circumverteremur, & caderemus. Quare ipsa prudens natura, tantum ex vtroq; accepit, quantum neq; morus facilitatem, neq; firmitatis securitatem vinculus erat. Iam verò adnata ofi- 80 sium ipsius femoris, adeo congruentes in tibia ca- vitates foruntur, vt neq; laxus sit incessus ipso- rum, neq; motu difficilis propter loci angustia. Circumposita quoq; ligamenta continent articulationem, adeo vt flectentibus nobis aliquan- do, aut extendentibus plurimum, femur à tibia non excidat. Patella quoq; vocata, os carniagi- nosum, anteriores partes articulationis omnes cōcœt, prohibens quidem & ipsum femur pro- labi ad anteriora, atq; ne nos cadamus haud mo- dicam præbens vilitatē. Quatuor ætiam quum 90 finit regiones circa articulum genu, anterior, pos- terior, dextra, & sinistra: anteriori quidem, ceu magis fallaci, ceterisq; magis laboraturæ, appo- suit patellam: externæ, quæ periculis magis ob- noxia est, quā interna, vnum ligamentum ro- tundum, validūq; simul cum sine latiusculis musculi applicuit: internæ aliud indidit ligamen- tum. At posteriori, plus nimirum laboraturæ, quā passuræ, neq; os neq; insignē ligamentum apposuit, præter lata illa & tenuia, quibus omnis articulus copulatur. Omnes porro musculi in 100 femore, sensu numero ambiuntur. Tres qui- dem maximi, qui in anteriori sunt femoris par- te, recti ad genu feruntur: quorū vnus quidem implantatur patellæ, duo autem reliqui, vnum maximū gignunt tendonem, qui dilatarus, in- haret et tōi patellæ, constringens ipsam pro- fusus, & coniungens subiectis. Postea verò, præ- ter vestitus articulum, inseritur anterioribus par- tibus nbiq; ipsam, si sensus fuerit, attollens fur- sum, & totam extendens genu dearticulationē. Alij verò duo musculi vtrq; prædictorū trium 110 parte, hunc quidem externum, ille autem internus, ad laterales tibie inseruntur partes, oblique mo- tioni vtroq; præfectus. Qui namq; externus est, foras abducit: alter verò, crus intrā adducit. Enascitur autē hic quidem, ex cōmissura osium inter os ille, ab extrinsecis partibus coxæ. In medio inter hos spatio, alix tres sunt musculorum ex- plantationes, ordine positæ, parvis motibus la- 120 plum genu mouētes. Flectit enim genu, & ad in- teriora adducit tibiā is, qui est interiori conti- nuus. Abducit autē foras simul flectendo, is qui rangit externum. Reliquos verò, qui & medius omnium est, in femoris caput internum inser- tus, flectit quidem totum quoq; femur, cum eo autem sinuū & tibiā attrahit. Qui super est asse- 130 nouem

Tibiā esse mu- nem femoris.

Adnata femo- ru.

Ligamenta fa- mori tibiā ac tibiā. Patella vtrq;.

Genu regionis quatuor, quo- bus præfusa solentur.

Femoris muscu- li sex.

Impietas sum- ma quæ sit, bonitatis diu- nae speciem per- fectissimam. Virtutis invic- tis opus.

Conditoris ar- tis splendescere e- tiam in vili- tate materis. Idem autem reddi- tuiusculum pul- chritudinis mat- ria.

Artificem red- dit splendidi pul- chritudinis arti- ficij.

Homini esse terreæ statu- am, esse pul- cherrimum co- modius quæ sunt in mundo.

Solem esse me- dium inter erran- tia sidera. Mundum esse mo- dum, esse pul- cherrimum re- rum omnium.

Animali esse ve- hici- parva mē- dum.

Oculum esse or- ganum lucidissi- mum, & quam simillimum soli.

Pes est vehicu- lum cerebri. Cerebrum præ- bet corpus sen- sum.

Planta pedis vnde facilius suscipiuntur fa- sciculi.

Patella ambi- tum tibiā est artensā. Fibula vtilitas.

novem musculorum articulationem ipsius genu
momentum, strictus & longus ex ostium ortus
tollit sursum tibiam, in illa maxime figura ter-
totam struens, in qua emollescent & subigen-
tes sursum ferimus pedem ad inguen attenu-
cruris. Præter hos omnes, est parvus musculi
poplitæ, qui flectit genu. Porro prima actio crur-
is, cuius gratia facti est, ambulatio est: ad quam
tribus illis magnis musculis ipsum crur extend-
entibus (quibus debetur robur totius ferè mo-
tus qui fit in genu) maxime nobis est opus, qui
alvum totum cruri extensionem rectam suppe-
dient. Tribus autem his tres opposuit retroflectunt
naturæ, non æque robustos tamen, neq. in tendo-
nes, vt illi, validos definientes, quum non sit æ-
qualis dignitas extendentes genu motus, & flecten-
tis. At motus cruris ad latera, ex abundantia
est. Descendunt aut musculi femoris semper
ad caput tibiæ, præterea articulatione. Nam quæ
admodum qui per quosdam funiculos ligata si-
mulachra mouet, vltra articulos ad caput mem-
bri mouendi, eos applicat, ita & natura multo
prior quæq. articulum fabricata est. Ex dictis
igitur constat liquidò, eandem convenientiam ani-
mi moribus & potentis virtutis corporis par-
ticulas cunctis animalibus contraxisse.

GALENI PERGAMENI de vsv partium, lib. III.

Quandoquidè nutrirî necesse erat anima-
lis particulas: ingressus verò cibarius in
corpus, vnus adest per os communis sa-
nè & maxima, primusq. omnium via est, quæ ab
ore ipso fert ad ventriculum, quasi ad promptua-
rium quoddam, omnium particularum commu-
ne, in medio animalis posita. Cuius viæ, nomen
quod propriū, œsophagus, seu gula est: commu-
ne aut, stomachus: at promptuarium ipsum, ali-
mentum vniuersum excipiens, illud accuratè ela-
borat, quod in eo quidè reperitur inuile, atq. re-
crementitum, infernè pellens: quod verò beni-
gnum, vtilèq. per venas quæ tum ad ipsum ven-
triculū, tum ad intestina perveniūt, distribuens.
Porro ventæ alimentum ipsum, prius in ventricu-
lo elaboratū, & suscipiūt autē, & ad aliquem co-
coctionis locū communem totius animalis de-
ferunt, quem nominamus hepar. Ingressus autē in
locū hunc, multis angustis diuisum viis, vnus
est, quem appellamus portas. Nec verò solum
deducunt ex ventriculo nutrimentum venæ, sed
atrahunt etiam illud ad hepar, preparantq. mo-
do, quo ipsum, similimo: quippe quæ natura
sint illi similes, & primum germen ex illo du-
cant. Ipsum autem hepar, postquā id nutrimentum
acceperit, ita famulus iam preparatū, obici-
rimq. sanguinis speciem referens, inducat ei po-
stremū ornamētum ad sanguinis exacti generatio-
nem. Ac velim impressuarius intelligas, distribu-
tū vtriculo ad hepar chylum, à viscere ca-
liditate, veluti vinum in dolio multum, feruere,
coqueq. alterariq. in sanguinis boni gene-
rationem: in ebullitione autem hac, ex ipsius ex-
crementis, quod faculentum quidem ac cras-
sum est, subidere: innatare verò, quod teque

ac leue existit, & veluti spumam quandam in su-
perficie sanguinis fluitare. Quorū excremento-
rum, huc quidem quod fluidum & lre est, exci-
piendo, natura ad hepar vesicam quandam ap-
posuit: illi autē, quod crassum & immoium existit,
liem in sinistris ventris partibus subdidit, &
quandā veluti stomachū ex sima regione ipsius
splenis productum, venosum vas, ad portas ex-
tendit, vt nililo minus hepar certè purgetur, q-
si prope ipsum esset splen locatus. Postquam igitur
nihil humor, qui in cauis hepatis ad animalis nu-
trimentū paratur, prædicta duo excrementa de-
posuit, & ab innata caliditate coctionem exactè
indeptus est, ruber iam & purus sursum ad gib-
bas hepatis partes ascendit. Excidit aut ipsum il-
lic vna vena maxima, ex gibbis hepatis orta, quæ
veluti aqueductus sanguine plenus, ad vtriusq.
animalis partē fertur, superiorē simul & inferiorē.
Vnde per totū corpus, in ramos scissā varios
diffeminatur. Ar in hac quoq. vena, multo adhuc
humore tenui & aquoso, qui vehiculū nutrime-
nti existit, plenus est sanguis. Eundē, quē ille, vsum
præstat animalibus aqua. Siquid ex ea nutrirî
nulla particula potest: distribui verò ex ventre,
quod nutriturū est, non poterat, nisi deductum
fuisset à quopā ita liquido. Hæc igitur tenues hu-
miditates, postquā suo officio perfunctæ fuerint
expurgit renes, in sinistram conuocat, stomachus
aliis quidem trahentia, aliis aut eas emittentia.
Adiacet enim vtriusq. ipsi venæ caue (quæ paulo
antè diximus maximā) paulū sub hepate, vt quæ
quid in ipsam sanguinem assumatur, confestim
purgetur, solutūq. postea in purus erat per totū coe-
pus, pauca omnino ipsi aquosa humiditate permi-
ta. Inferius autē ipsius venæ superior pars,
ad cordis ventriculū dextrū, saltem in quibus is
inest. Porro ventriculo inest facultas quidā pro-
priæ, qualitatē attractrix: inest & quiddā alia re-
ceptorum retentrix: & rursus alia excretrix su-
periorum: sicuti & ante has omnes, alteratrx
quædam, propter quam illis quoq. ventriculus
eguit. Sed aliis quidem omnibus animalis parti-
culis, quanquā eisdem facultates habeant, non
indidit natura sensum eorum quæ desunt: sed in
plantarum modum nutriuntur licet, absque ex ve-
nis alimentum haurientes. Soli verò ventricu-
lo, & maxime eius partibus, his quæ ad orificiū
pertinent, sensum indigentia cōrulat, ad sumen-
dum cibum animal excrementum. Quum enim to-
tius corporis partes nutrimentum ex venis à ca-
ua prognatis trahant, ipsa rursus caua ex venis
hepatis, hæc rursus ex his quæ sursum ad portas
feruntur, illæ rursus ex ventriculo & intestinis:
certè vbi nulla iam superest amplius particula, à
qua ventriculo capere oporteat, necessum est
animalibus, extrinsecus ipsum replere: in eoq.
differunt iam animalia à plantis. Siquidem his,
est quædam autem illas quatuor facultates, paulo
antè memoratas, habere cōtingit, eis tamen
sensūs eorū, quæ sibi desunt, nō inest. Non enim
per os nutriendæ erant, promptuarium copiosū ali-
menti subiectū habentes terram, cui coherent-
bus atq. vniuersum semper alimentum adhibuit. Ipsi ve-
rò substantiam animalis, præterquam quod multum
à terra disiect, in super etiam motus volun-

Vesicā sibi san-
guini repurga-
re à bile.

Lenem in fini-
stram locatū em-
por melio-
rum succum
& sanguinem.

Vena caua de
nutritio.

Sensū esse vehi-
culū sanguinis

Aquam hand-
equamq. nu-
trire, de coctis
tamen abona-
tis per corpus.
Sensum repa-
rant vtriusq. à
sanguine.

Vena caua in
sinistram in ror-
dum ventriculū
dextrum.
Ventriculo inest
quatuor natu-
rales potesta-
tes, seu facultates.

Ventriculo soli
sensum indiget.
Hæc cōtingit
aliteram.

Animalia à
plantis quoq. dif-
ferunt.
Plantæ non in-
est sensum eo-
rum quæ sibi
desunt.

Animalibus
adest vniuersa-
rium alimentum.

tarius adest, & loci ex loco mutatio: vnde impossibile fuit ipsis, plantarum ritu, fugere humorem ex terra. Opus igitur erat vniquodq; familiaribus sibi nutrimentis nutrirī, eaq; id temporis edere, quo ventriculus indigentiam perciperet. At quum nulla animalis particula ex se sensum habeat, affluere ventriculo huiusmodi facultatē aliunde oportebat, vel vni per canales à principio sensifico. Cuius igitur erat vni par nervorum haud mediocriter supernè deferretur, & disseminatur: contextiq; maximè quidem os eius, &

partes ipsi continuas, & in reliquis vsq; ad ventriculi fundum protenditur. Positus est autem ventriculus non ita in parte os, sed quem vocamus thoracem, & quæ in ipso sunt viscera, præpositi natura, ut ille quidem in inferioribus partibus effluat habeat superius: huc autem per os attrahens, & rursus emittens aërem, vocis & respirationis hat cōditor. At verò fundum

ventriculi in dextra animalis parte cōstitit, quod iecur in regione similiter dextra superioriq; amplexatur, septum transversum connogens. Lien autem sinistris ipsis ventriculi partibus inferiorib; est protensus. Ac merito fuit rotundus simul & longus factus est ipse ventriculus: rotundus quidem, quod hæc figura minimè omnium existens lationi obnoxia, etiam capacissima fit. Omnium siquidē figurarū, æquale in ambitu mensurā habentiū, planarū quidem, circulus: solidarū autem sphaera, maxime sunt. Quod longus autem, quoniam infernè quidē explantio eius ad intestina est: superne autem ad æsophagum ipse idem progreditur: quā verò incumbit vtriusq; comprimitur: ob idq; ipsum vincta est eius conuexitas. Iam vero superius orificium ventriculi est inferiore latius, quod illud quidē moles duras, magnas, & integras aliquādo transgreditur: hoc autem nihil exire permittit, non in chylum & laeuorem conuertit. Atq; est quidem gula ipsa pars quedam prælonga ventriculi, intestini autem nequaquā.

Quare tunicarū natura, ventriculo quidem & gulæ ad similes est, intestinis autem dissimilis. Interna namq; tunica in ventriculo simul & gula, membranosa, villosa: rectos superne deorsum tendentes habet: externa verò, & carnosior, transversos, quales habent ambæ intestinorū tunice, idq; merito. Si quidem ventriculus trahit ad seipsum per stomachi cibum & potum, tanquam manibus, rectus has villos oportet, propellat autem transversis. Intestinis verò (attrahente enim facultate non indigent) soli ad propellendum idonei sunt facti villi. Quin etiam continua est interna ventriculi, stomachi, & omnium quæ in ore consistunt, tunica, quum ad attractionem contentorum in ore ciborum, tum vi lingua deorsum trahatur cum musculari qui sunt ad consiliā, à quorum omnium tensione, sublatō larynge, & currente sursum ad epiglottidā, obnratōiq; ab ea, repente ac simul humorem influere in pulmonem prohibetur. Ac duriora quidem & densiora sunt interna horum, quā intestinorū: quia intestina sanè, ad distributionē: ventriculus verò, & stomachus, & os, ad parēndi difficultatem sunt cōparata, ob magnitudinem, asperitatem, atq; duritiem eorū quæ transglutiantur. Ob id ipsum tunica quæ communis ori, stomacho, & ventriculo existit, rarior & mollior fit paulatim, vique ad fundum ventriculi. Neq; ob aliam rem quā plurimæ quidem ad singula intestina immittuntur venæ: paucae autem ad inferiora ventriculi, paucae etiam ad eius oris partes: & omnino obsecure quædā ad æsophagū: hic quidem via erat ciborū tantum: ventriculus verò, coctionis organū: vnde testinū, distributionis. Ambæ autem ventriculi hepar, amplexaturq; quibusdā locis cœu digitis, vtilis quidem ab hoc, cibaria verò ab eo calefiunt. Habet enim ventriculus vtriusq; similiter longum lienem protensum, à quo similitur illius partes calefiunt, sic retrosum spinā & spinales mufculos: illam quidem cum propugnaculum quoddam densum: hos autem veluti substericulum molle, à quibus eius calor fouetur. In reliqua vero ipsius anteriori parte, calefactiois grana, generatur natura omentum, corpus densum, simul & leue, ac præterea calidum: cuius argumentum est, quod facile in flammam vertatur. Nilū siquidem iniquū promptè comburitur. Id igitur corpus, ex duabus quidem tunicis densis atq; subtilibus, sibi ipsi incumbentibus, quā plurimū verò arteris & venis, pinguedinēq; non pauca condensat, per totum ventrem extenditur, vtilius conditū foueat. Quare quibus pars huius, ob vulnera, adempta est, omnes insulenter concoquunt, plurimiq; foemēntis egent. Est & alia membrana peritonæa dicta, quæ viscera omnia, quæ in regione ventris sub septo transverso sunt, contegit, ab eisq; mufculos incumbentes distinguit, citatq; excretionem aridorum excrementorum, ac breuiter impedimentū est, quo minus facile stantibus (quo rum tamen pars ructu, pars crepitu ventris solet sæpe vacuari, sicq; & halitusior pars concoquit, vbi viscera sunt valentia) descendunt intestina & ventriculus, singulis priuatim firmum tegumentum exilientia. Si quidem anterioribus ipsorum omnium partibus est prætenus: procedit autem illinc ad dextram & sinistram per alia, vsq; ad lumborū vertebra: quo fit ut singulis intestinis ac visceribus, præterea tam arteriis omnibus, venis, & nervis circumdantur. Quod verò ad reliquas eius extremitates pertinet, superior quidem septo transverso infernè ad iecur inferior autem oisibus pubis, & præterea ibum. Porro instrumentorū in illis duabus sitorū partibus, quæ superiori quidem parte sunt (cuiusmodi est ventriculus atq; hepar) à peritonæa portione septo transverso infernè adnata: quæ verò inferiori (vtrū tum vesica tum intestina) ab ea quæ oisibus pubis hæret, veltantur. Quod autē à septo transverso adnascitur ori ventriculi extrinsecus, vnitur usq; vtrinq; à dorso ascēdēti estq; id principii generationis tertæ tunice ventriculi, extrinsecus ipsius vndiq; ambientis: quā sanè operimentū quoddā ac propugnaculū sedantē tunice carnosæ circumposuit natura, estq; existente crassa pro ligamento vnitur, ad ventriculi rotum cum corporibus quæ in tra spinam sunt, colligandum. At verò omentum oritur ab eis peritonæi partibus, quæ à dorso vtrinq; ascendunt,

Ventrum nefe rascari diffinito inuaginat.

Ventriculi cur amplexatur hepar.

Lien. Spina.

Omenti natura.

Frigidum nihil promptè ciborū. Cœci constituti & rari.

Peritonæi constituti & rari.

Peritonæi conueniens.

Ventriculi tunica tunica.

Omenti origo.

Particula animalis ex se habet sensum.

Nervorum partem diffinitam in ventriculo.

Thoracem effinit in & thoracem.

Fundum ventriculi diffinit in dextra animalis parte iecur ab hepate. Lien sinistra subiendo ventriculo partibus. Ventriculus cur rotundus. Figura rotunda quæ quæ iecur. Figura omenti maxime. Ventriculus cur oblongus.

Ventriculi orificiū superius, cur inferius latius.

Gulæ effinit partem ventriculi.

Tunica ventriculi & gulæ quæ fibra ad similes sunt.

Intestinorū ambæ tunice habent villos atq; necesse.

Intestina non in digerē facultate attrahentes.

Tunica ventriculi & gulæ, et omnium quæ in ore consistunt, cur sua cōtinua.

Intestina effinit ad distributionem condita.

ascendū, sibi invicem occurrentes ad aliafimi
partē ventriculi. Quum enim ex illa dorſi regio-
ne produxiſſet natura venas & arterias quā-
plurimas ab utroque magno vaſe, ſimul produ-
xit cum eis vtriuſque peitonici particulas, vniuf-
cuſque prædicatorum vaſorum partem ad ſeſe at
tinentem, circumvenientes & colligantes. Me-
diam autem inter vaſa regionem contextunt pe-
itonici porciones, veluti filamenta quædam, ſi-
bi invicem incumbentes, ibique plurimum adipis
congerit, quod ſouet ſimul ventrem, inuicem
membranas, ac perinediam calore natui o ſug-
gerit alimentum. Talis itaque conſtitutio omen-
ti, ſiue epiploï exiſtit, quod quidem etiam ſpleni
inferitur, corporis *epiploia* vocato. Pari modo
exortui, qui ſit in tenue inteſtinum, & meſente-
rio, & colo, & ipſius denique ventriculi ſimæ parti
alligatur. Eſt autem illud, quod veluti hepatis caro
exiſtit, primum ſanguinis gignendi organi, at-
que venarum principium. Quare natura ipſius,
ſanguini eſſe videtur proxima. Etenim ſi hoc q-
dam agit caro hepatis, vt ſibi ſibi aſimiles: ut
habet autem contrarias, aut omnino multum diſ-
ferentes qualitates poteſt recipere, niſi per media
prius iter fecerit: medium vtriusque erit ſan-
guis, tanto à hepatis reliſtus, quanto ſuperat co-
ctum in ventriculo chylium. Caro itaque hepatis,
quæ ipſius corpus atque ſubſtantia eſt, primum
ſanguinis gignendi organum, & venarum origo
exiſtit. Quapropter & venis quæ ad ventri-
culum & vniuerſa inteſtina pertinet, in eſt facultas
quædam eſſe tribus ſanguinis, quæ ſuccum qui
ex obis diſtribuitur, in ſanguinem mutare ſunt
aptæ: prius quàm ſi ad hepar perveniat. Porro
verò qui ſunt in veſica bilem recipiente, perſpi-
cuum eſt gratia ſeparandæ bilis conſtructos eſſe.
Membrana autem exterior veluti cuius quædam
hepatis eſt. Nervus in ipſum inferitur, ne omni-
no viſcus ſit ſenſus expertum: quemadmodum cer-
tè & arteria diſtributa cum venis, vt caloris nati-
ui moderationem ipſi conferret. At verò multas
venas illas quæ à ventriculo & inteſtiniſ
omnibus ferunt ſurſum cibum ad hepar, quum ſemel
vniuiſſet natura ad portas, ruſus intra ſubſtan-
tiam hepatis in quamplurimas anguſtiſſimasque
diuiſit, vt diſtans hærens ac morans alimentum
in viſcere, in ſanguinem perfectè tranſmutaretur.
Vbi enim diſtans natura voluit immorari mate-
rias, ibi tranſitum ipſis eſt molitiſ difficilẽ. Venæ
autem illæ quæ ſunt in hepate, omnium quæ
ſparguntur in totum corpus, longè tenuiſſimæ
ſunt, cen nalli patiendi periculo expoſitæ (tutiſ-
ſimæ enim habent ſedem in viſcere) & melius ita
ſanguinem elaborantur. At porri attrahentes ad
ſe fluam bilem, poſt venas alimentariæ ex ventri-
culo ſurſum ferentes, priores locati ſunt aliis ve-
nis ad exceptum, vt videlicet ſanguinem oppor-
tunaliorem vaſorum poſſione purgatum, cômô-
dè venæ cauæ ſuſcipiat. Etenim huſ ſolæ venis
quæ ſi ſinis hepatis ſunt, ſubiecit natura arte-
rias, haud ignara gibbii illius continuum eſſe
motum ex ſepti tranſuerſi vicinia. Iurè autem &
paræ admodum fuerunt, vt quæ refrigerationem
ſolum ſinis viſceris ſuppeditaret. Minimum au-
tem nervum hepatis dedit natura, vt pote nec ad

motum, neque ad ſenſum futuro ex vſu anima-
li: quare cum aut non omnino in viſcus, aut non
in totum inferuit. Eiuſmodi ſiquidem faciliſſime
hepar principii eſt, exigæ actiones ſunt tum ipſi-
tum eius venis concrediſſet, cuiuſmodi & planis
infant. Non licet autem rectè invenire vſum
viliuſ cuiuſvis particule, totius organi actiōne
ignorata. Porro hepar facultatis nutritione pri-
cipii, copulari oportet duobus principijs alijs,
ſicvti & illa ſibi invicem. Hepar ſiquidem, pec-
cus quoddam (vt inquit Plaro) eſt aggreſſe, ip-
ſumque nutrire colligatum necesse eſt, ſi modò ho-
minum genus ſit duraturum. At ratio, quæ ho-
mo eſt, ſedem in cerebro habens, veluti famu-
lam quandam atque adiutricem irafcentiam acer-
ſit, quæ ſibi ad verſus hoc pecus auxilio ſit. Quo
ſit, vt ipſa principia tria, per proceſſus, vtputa,
nervos, venas, & arterias, coniuncta, cōditor no-
ſter ſit machinator, vt ſibi viſum obſequerentur.
Ad hæc verò hepar, ventriculo, inteſtiniſque
omnibus per venas, & colligantem ipſa tunica
iunctum, propoſe etiam tegmine inembranoſo,
quod oriſus à peritonæo, proximus corporis
colligatur. Omnia ſiquidem tunica hac obvolu-
tur. Magno præterea alio vinculo, ſepto tranſ-
verſo: atque alijs quibuiſdam membranofis &
paruis, coſtiſ noſtris contextum eſt. Copulatur
etiam & cordi hepar intercedente ſepto tranſ-
verſo, vtputa medio inter vtriuſque viſcus. Qui-
pe venæ cauæ, ſeptum tranſverſum permeans, ab
hepate ad cor accendit. Cuius venæ indumentum
crasſum, tum venam ipſam, tum totum viſcus,
ad ſeptum tranſverſum alligat. Quum autem
venæ ipſius eo in loco læſio, omnibus quæ in
toto animali ſunt venis, eſſet futura commu-
nis (vulnera enim ea, aut diuulſa, ſubito ve-
lox ſequitur mors) haud ab re natura, in antero-
ribus quidem eius venæ iuxta diſtā regionem
partibus, ad maiorem ſecuritatē, crasſiſſimum
indumentum: in poſterioribus autem tenuiſſi-
mum, appoſuit. Illæ enim hiſ faciliſſime læduntur.
Quia verò ſeptum tranſverſum non ſolum à na-
turalibus diſtinguit vitalia, ſed etiam organum
nec miniſmū reſpirationis exiſtit, vtriuſque
vicino viſcerum, ne videbatur illud comprimerent,
quantū fieri poſuit adduxit cōditor noſter. Por-
ro ille limoſos & melancholicos ſuccos in he-
pate genitos trahit per venoſum meatum: attra-
ctos autem, non protinus in ventriculum ex-
cernet, ſed ipſe prius per multum ocium conſicit
atque immutat, vtens ad hanc actionē poſſi-
ſſimum ipſis arterijs, quæ ceræ multæ & magnæ
per totum viſcus feruntur: quarum aſſiduus mo-
tione ſimul & innata caliditate, frangi & elabo-
rari craſſi illi ſucci poſſunt. Quicquid igitur
eorum in ſuccum huius viſceri maximè con-
venientem tranſlatum fuerit, alimentum ſpleni
eſſicitur. Quod autem proſus in vtile elaborari
non poteſt, hoc ad ventriculum per alium veno-
ſum ſtomachum ſplen eructat. Eſt autem ſplenis
corpus rarum admodum atque laxum, ſpongioſe in-
ſtar, ſic vt craſſos & melancholicos ſuccos facile
trahat, excipiat. Cæterum ſplenis caro, tamē
ſi laxa ſit, à pulmonis rāmen carne magno ſpa-
tio relinquitur. Laxiſſima ſiquidem ea eſt & lo-

Hepar omniſ ſa-
culuſ proceſ-
ſum.
Hepar non po-
teſt aliā ſi-
liſ igneſcere.

Hepar aggreſſe
eſt pecus.

2. ratio (qua illi
homo) in cere-
bro collocatur.

Principia ani-
maliſ ſua cor-
poris ſi ſunt
iuncta.

Hepar eſt ca-
lidiſ colligatum.

Septum tranſ-
verſum interna
ter cordi & he-
pate.
Vtriusque in-
dumentum.

Septum tranſ-
verſum ſi ſunt
iuncta.

Septum tranſ-
verſum ſi ſunt
iuncta.

Limboſiſ vſum.

Limboſiſ vſum.

Limboſiſ elabo-
rate melancholici
ſunt ſucci.
Limboſiſ vſum
ſucci nullas
elaboſas ſi ſola
horas, atque
maſ ſedem.
Limboſiſ mittere
quod elaboſa-
re non poteſt ad
vitiuſum vſum
vitiuſum.
Limboſiſ ſuſcipit
na.

Omnis pſipio
homoſ vſum.

Epiploia
Pariſipio
caſum.

Hepar cor-
poris ſanguis
caſum organum
vſum principium.

Materiæ in con-
traſta nobiſ per
vſum, atque per me-
dium.

Sanguis enim eſt
medium inter
chylium & cor-
poris hepatis.
Veniſ vſum ſan-
guinis ſanguis.

Pariſipio ſil-
li.

Hepar ſani-
caſ.
Hepar ſani-
caſ.
Hepar ſani-
caſ.

Hepar ſani-
caſ.

Materia
caſiſ dantiaſ me-
lancholiciſ natu-
ram diſſicilẽ
tranſferunt.
Veniſ quæ ſit
in hepate, alia
rè omniſ eſt
ſtrouitatem.
Porroſ bilem
expugnantem
ſunt.

Veniſ quæ ſit
ſine hepatis
ſunt ſola ſil-
liſ diſſeſ arteriaſ
materiam.
Hepar cor-
poris vſum
vſum exiguuſ de
ſum.

Pulmonum car-
ni tenuissima,
naturae ex pu-
rescentia sangui-
ne.
Lenis nutrit
omnem, quia
hepar portione
sanguinis.

Sanguis qui ad
splenem attra-
hatur, crassior
est illo qui cili-
fit in hepate.

Splenis caro va-
rior & leuior
est illa quae he-
par constitit.
Hepar benign-
ius & crassi-
us nutrit sangui-
ne.

Arteriae obta-
liae sua ex-
pulsiore excre-
ta spem.

Lenis arteriae
multas efficit,
quae magnae tri-
bunt.
Hepar cui par-
um indiget ar-
teris.

Alimentum ex
quo etiam in-
testinum.
Sanguinem co-
quo in venis.

Venis iactis si
gustula veni-

Intestini sub
stantia non mul-
tum à ventri-
culo differt.
Alio autem
vinis animalis
gusto animalis
partibus.
Intestina car-
nati involu-
ta.

Gulosa & in-
expugnabilia
officiis,
quibus vasa
intestina ali-
mentum.

ulissima, & parumque abest quin alba, & vixit ex
spuma quadam veluti coagulata. Nutritur enim
ex purissimo sanguine, & auri, & spiritibus
et, tanquam delato à corde. Splenis autem cor-
pus, quod tanto rarius hepate sit, quanto est cras-
sius pulmone, merito ex tenuiori sanguinis parte
nutritur. Consentens quippe est ex arteriis
quidem, tenuius: ex venis autem crassius nutri-
mentum transiit, quum tunica arteriarum quàm
venarum sit densior, & sanguis subtilior & va-

porosior. Atque ex tali praestint laxam carnem nu-
triri, veluti ex crassiori densam. Ceterum qui et
trahitur ad splenem sanguis, crassior est eo qui
est in hepate. Quia tamen elaboratus ab artenis
quo illic sunt, atque adeo venis, multo densio-
rem tunicam habentibus, quàm quae sunt in he-
pate, non affatim, neque crassus, carni splenis, sed
subtilis, & pusillatim mittitur, ob id caro quidem
huius visceris rarior & leuior est, quàm hepatis,
non tamen rubicundior aut flauior. Nam melan-
cholicus erat, qui purgavit humor, à quo
elaborato nutrita est. Hepar verò benigno simul
& crasso nutritur, tum propter subtilitatem tunice
venarum quae sunt in hepate, tum propter ma-
gnitudinem foraminum. In summa igitur, he-
par ex rubicundo & crasso sanguine splen ex sub-
tili, sed nigro: pulmo ex elaborato ad vnguem,
flauo, subtili, spiritali, ac puro, alimentum capit.

Praestant etiam spleni maximum vsum arteriae,
contractione sua illius expellentes excrementa
fuliginosa. Vt enim pulmo refrigeratione vhe-
mentem, quam dilatare arteris conciliant, sic splen
insignis indiget purgatione, quae contractione illis
paratur. Quare illae arteriae multae, & magnae tri-
butae sunt. Hepar verò nec tali egens purgan-
tione, nec refrigerio magno, iure optimo parvis in-
dugatur arteris. Conuertere autem sunt ad hepar
atque ventriculum, ipsius lenis sima, quae quidem
venarum & arteriarum immisiones, & quae ad o-
mentum pertinet, insertionem obtinent. Coquilur
porro alimentum, & in ipso per intestina tran-
situs: ut in venis omnibus, sanguis: quum tamen
neque intestinorum vsum coquendi alimentum, neque
venae sanguinis gignendi gratia existerint. Quae
admodum igitur venis (quod eas instrumenta dis-
tributionis ipsa natura fecisset) facultatem san-
guinis generatice indidit, ne dum per illas ferre-
tur, tempus ipsi alimentum periret frustra: ad ean-
dem opinor modum & intestinis (substantia quo-
rum haud multum à ventriculo differt) distribu-

tionis tantum in venas gratia instituit, faculas
quedam concoctrix ciborum inest: quod fieri
omnino non posset, nisi singulae animalis parti-
culae virtutem quandam haberent alteratricem.
Sunt autem conuoluta intestina plurimis cōver-
sionibus orbiculari, ne alimentum ocyus elabe-
retur, inexplabilemque vorandi semper necessita-
tem inducens, à philosophia & Musis nos revo-
caret. Nam quae animalia à ventriculo intestinis
simplex & rectum visum ad anum sortuntur, insa-
lubilia omnia & gulosa sunt, plantarumque mo-
do cibo assidue inhaerent. Quae circumvolu-
tes intestinorum quum innumerablem venarum
multitudinem ex hepate subipsis habent miferi-
tam, omnem in ventriculo coctum succum sursum

mittunt. Vnde fieri nequeat, ut humor aliquis ani-
mali nutriendo idoneus, ab animalis labatur, quae-
dò saltem naturaliter se habent corpora. Arve-
rò officina arteriarum, quae in intestina se spernit,
modicum etiam nutrimenti assumunt, quemad-
modum plurimum venae. Naturaliter quippe
continetur sanguis & in artens. Porro ut attra-
ctrices potentiae, & rectorum villorum motu, sic ex-
pultices, transuerfori actione constant. Quem-
admodum igitur ventriculo utraque villis sortito,
duabus opus fuit tunicis, contrario inter se
modo habentibus: ita & intestinum quodque vnam
speciem motus propultricem quum habeat, vnam
poriter tunicam speciem, in transuerforis & cir-
culares villis dissoluti, obtinuit. Habet autem
etiam similem, duplicem tamen tunicam, quodque
intestinum, partem ut facultas ipsorum expulsa-
valentior sit: partem ut ipsa instrumenta, ab inu-
riis omnibus sint tutiora. Nonnulli verò inte-
stinorum, praecipue in animalibus istis, quae subti-
les ipsorum tunicas possident, quidam villi re-
cti obtenduntur extrinsecus, ad transuerforium
tutelam. At quod peritonaeum ipsum (à quo tu-
nicae omnium viscerum sub sepro transuerfori su-
munt originem) hanc secundam vestit tunicam
intestinorum, colligens omnia intestina, tum quae
ad spinam sunt corporibus, tum alia, quodque ab
eo & sepro transuerfori, veluti à duabus compres-
sa manibus, superne quidem vnitis, inferne autem
distantibus, excrementa expellitur, liquido cō-
stitit. Ne autem assidue egerent, meierentiae a-
nimalia, ut humidis quidem excrementis vesica
subiacet, sic ficcus intestinum, quod crassum dici-
mus: principium culus caecum intestinum exi-
stit. Vbi enim tenue intestinum definit, illuc ad
dextra quidem illa, caecum: ad sinistra autem co-
lon emergit, per sinistra prius illa sursum ductum.

Porro caecum prorsus veluti venter quidam est
crassus, excrementis recipiendis appositus, cuius
portionem colon respondet. Atque plurimum sine
auius: propter actionis robur, caecum intes-
tinum est duplex. Nam si quid in transitu per te-
nue intestinum distributionem fecerint, id omne,
diuturna in loco mora, plane exurgitur. Vnde
que autem tam humidorum, quàm siccorum ex-
crementorum effluuiis, musculi quidam incum-
bunt insar clausi: cuiusdam, ne cōtinerent aut
intempertu excrementa. Si quidem vixit col-
lum musculosum cūst: rectum autem intestini o-
ra inferior, à musculis in orbem circumfusus con-

stringitur. Musculi namque omnes quum sint mo-
tus voluntarii instrumenta, non sinunt foras fer-
ri excrementa, antequam ratio iusserit. At verò
ad perfectam intestinorum & ventriculi nutri-
tionem, non mesenterio & omento natura plu-
res intergit venas, nutriendi illis dicatas, haud
quaquam ab eis traicientes ad hepar. Quamquam
resistantur etiam interdum ea, cremore illo què
ex cibis cōficiunt necnon in longiori media, per
quas venas prius distributio ad hepar facta est,
per easdem rursus aliquando sanguis benignus
ad eorum nutritionem retrahitur. Colligens ergo
natura ut in arboribus exiguae radices, ita
in animalibus vasa minora in maiora, & illa rur-
sus in alia maiora, idque semper agens visum ad he-

Arteria descen-
dentes in inte-
stina.

Arteriae conti-
netur natura-
ter sanguinem.

Arteriarum
fieri per villas
rebet.

Expulsiore
in villis trans-
uerfori.

Ventriculus ha-
beret duas tuni-
cas inter se dis-
ferentem.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

Intestini villi
transuerfori
valentior.

par ab intestinis, in vnam omnia venam coagis, quæ ad portas est fixa: a qua etiam, vena quæ tum ad ventriculū, tum ad intestinū fertur, emittitur, et militer et arterias emittit in vna magnam doctriā incubentē, pari modo extēdit. Ne autē vena ipse longo ductu perturperetur, a vena colligēte ac vācente intestina, similiter pertinetur a mēbris rānā, hoc est, intestinis, produxit quæ vasorum singula addit. In spinā vero inter vāsa in anibz, eandem hanc tunicā, sed rānā, et plicem, applicat, ad angulūq; vasorum, quæ in vāsa exierunt, eandem quādam naturā, quæ glandulas appellamus, apponens, quod eandem rānā repo mēbris magis obnoxia sit, validiūm mēbris sic vācent, p̄fectūm, et mēbris vācent ipis vāsis constituit, quod sanē totum mēbris rānā vocatur. mēbris p̄fectūm hanc, et rānā, et plicem, et angulūq; vasorum, quæ in vāsa exierunt, eandem quādam naturā, quæ glandulas appellamus, apponens, quod eandem rānā repo mēbris magis obnoxia sit, validiūm mēbris sic vācent, p̄fectūm, et mēbris vācent ipis vāsis constituit, quod sanē totum mēbris rānā vocatur.

GALENI PERGAMENI

de vsu partium, lib. V.

Longe autem fuit sanum, vnam vnam p̄fectūm et ab hepate ipso producta, ac deinde in vāsa mēbris rānā ductū, quæ ad modum dictū est, in omnia mēbris, diffundit, quibus si ita mēbris p̄fectūm hanc, et rānā, et plicem, et angulūq; vasorum, quæ in vāsa exierunt, eandem quādam naturā, quæ glandulas appellamus, apponens, quod eandem rānā repo mēbris magis obnoxia sit, validiūm mēbris sic vācent, p̄fectūm, et mēbris vācent ipis vāsis constituit, quod sanē totum mēbris rānā vocatur. mēbris p̄fectūm hanc, et rānā, et plicem, et angulūq; vasorum, quæ in vāsa exierunt, eandem quādam naturā, quæ glandulas appellamus, apponens, quod eandem rānā repo mēbris magis obnoxia sit, validiūm mēbris sic vācent, p̄fectūm, et mēbris vācent ipis vāsis constituit, quod sanē totum mēbris rānā vocatur.

quam vilitate sunt facta. Siquidem & quod primum sanguinem interiusorem, ipsum, ipsum chylum capiat, & quod ipsum vixit hepate sit, vasorum ipse in multorum oīum, conueniens, & quod quoniam bilis mēbris p̄fectūm hanc, et rānā, et plicem, et angulūq; vasorum, quæ in vāsa exierunt, eandem quādam naturā, quæ glandulas appellamus, apponens, quod eandem rānā repo mēbris magis obnoxia sit, validiūm mēbris sic vācent, p̄fectūm, et mēbris vācent ipis vāsis constituit, quod sanē totum mēbris rānā vocatur. mēbris p̄fectūm hanc, et rānā, et plicem, et angulūq; vasorum, quæ in vāsa exierunt, eandem quādam naturā, quæ glandulas appellamus, apponens, quod eandem rānā repo mēbris magis obnoxia sit, validiūm mēbris sic vācent, p̄fectūm, et mēbris vācent ipis vāsis constituit, quod sanē totum mēbris rānā vocatur.

Heuoribus
implantari
in
ventriculo
est
natura.

Heuoribus
implantari
in
ventriculo
est
natura.

Ventriculi
p̄fectūm
hanc, et rānā,
et plicem, et
angulūq; vasorum,
quæ in vāsa
exierunt, eandem
quādam naturā,
quæ glandulas
appellamus, apponens,
quod eandem
rānā repo mēbris
magis obnoxia sit,
validiūm mēbris
sic vācent, p̄fectūm,
et mēbris vācent
ipsis vāsis
constituit, quod
sanē totum mēbris
rānā vocatur.

Ventriculi
p̄fectūm
hanc, et rānā,
et plicem, et
angulūq; vasorum,
quæ in vāsa
exierunt, eandem
quādam naturā,
quæ glandulas
appellamus, apponens,
quod eandem
rānā repo mēbris
magis obnoxia sit,
validiūm mēbris
sic vācent, p̄fectūm,
et mēbris vācent
ipsis vāsis
constituit, quod
sanē totum mēbris
rānā vocatur.

Arterias
in
vāsa
mēbris
rānā
ductū,
quæ
ad
modum
dictū
est,
in
omnia
mēbris,
diffundit,

Glandulas
appellamus,
apponens,
quod
eandem
rānā
repo
mēbris
magis
obnoxia
sit,

Arterias
in
vāsa
mēbris
rānā
ductū,
quæ
ad
modum
dictū
est,
in
omnia
mēbris,
diffundit,

Arterias
in
vāsa
mēbris
rānā
ductū,
quæ
ad
modum
dictū
est,
in
omnia
mēbris,
diffundit,

Papillae

Intestinum
p̄fectūm
hanc, et rānā,
et plicem, et
angulūq; vasorum,
quæ in vāsa
exierunt, eandem
quādam naturā,
quæ glandulas
appellamus, apponens,
quod eandem
rānā repo mēbris
magis obnoxia sit,
validiūm mēbris
sic vācent, p̄fectūm,
et mēbris vācent
ipsis vāsis
constituit, quod
sanē totum mēbris
rānā vocatur.

Intestinum
p̄fectūm
hanc, et rānā,
et plicem, et
angulūq; vasorum,
quæ in vāsa
exierunt, eandem
quādam naturā,
quæ glandulas
appellamus, apponens,
quod eandem
rānā repo mēbris
magis obnoxia sit,
validiūm mēbris
sic vācent, p̄fectūm,
et mēbris vācent
ipsis vāsis
constituit, quod
sanē totum mēbris
rānā vocatur.

*Purget à qua-
sue instrumenta
tis purget.*

*Trahi sur-
recta non possi-
t ab argenteo ali-
qua necessitate
dine aliquam.
Nihil à fami-
liari infolari.*

*Vesica vici-
na ad materi-
fontem, pluri-
bus maioribus
non natura tra-
hit.*

*Vesica vici-
na tunicis.*

*Tunica instru-
mentalis inter-
na et externa.
Fibrarum et di-
versarum et dif-
ferentiarum.*

*Intestini nec
attrahere, nec
retinere possunt
sunt esse.*

*Vesica vici-
na tunicis simpli-
ter esse, forti-
ter omnia dif-
ferentia fibrarum.
Ventriculi tu-
nica cum gra-
tia sit duplex.*

*Meatus cum
vestis in qua
invenitur sunt
lucida.*

*Ventriculi tu-
nica cum gra-
tia sit duplex.*

*Instrumenta
alimenti prin-
cipalissima.
Instrumenta
alimenti secun-
da.*

*Instrumenta
alimenti ter-
tia.*

est, ut inquit Hippocrates: hepar verò à qua-
sue instrumentis purgatur, duobus quidem reni-
bus, tertio autem splene, atque ad quartum
ipsi inhiarere vesicæ. Quæ instrumenta quatuor;
quod à propriis excrementis nihil acceptura ef-
ferat incommuni, sensum maiorem non postula-
runt. Neque enim trahere huiusmodi excrementa
possent, nisi qualitate communis quædam
cum excrementis ipsis intercessisset. Nihil autem
ab eo quod cognatum & familiare est, dolore ali-
quo afficitur. At maiori vesicæ, quæ loci rece-
pracula est, nisi totius id, quod biliosus acrisque
est, repente excrementum, magnas sepe noxas adhe-
ret. Quare ut sensu prædicta esset maiore, plerique
& eos quidam maiores nervos, ipsi natura tributi
sive et validior quædam alius tunicæ, quod pas-
sim distendenda & evacuanda esset. Porro tuni-
cæ quæ prædictis omnibus instrumentis extrin-
secus sunt circumiectæ, nonnullæ quidem re-
muneant ipsa, omnes tamen simul figura existunt
araneæ similes: quandoquidem earum nulla in
fibras instat internarum dissolvitur, quæ ipsorum
instrumentorum sunt propria. At internæ, quæ
corpora ipsa particularum constituunt, in ventri-
culi quidem ac stomacho esse, fibræ quidem
orbiculatæ externa, expellendi videlicet
gratia, & obliquæ interna, grana attrahenda re-
tinentia, habuerunt. Intestina autem (ut quibus
nec attrahere, nec retinere necessum erat, sed edo-
ratis vndique prorsum pellere) quæ simpliciter
egeret motu, simplices quoque fibras sortita sunt.
Cæterum vesicarum tunice, rectos, & circula-
res, & obliquos possident villos. Una enim quæ
sit vtriusque vesicæ tunica, ut omnes species mo-
tus consequeretur, omne genus fibrarum ob-
tinuit. At verò in ventriculo tunice duæ con-
struæ sunt, triplicis vicius grana: variarum sci-
licet actionum, patendi difficultatis, & transien-
diæ. Quippe ad concoctionem ciborum, opor-
tuit crassum esse atque carnosum ventriculum.
Quæ causa sanè est, cur quibus corpus ventriculi
est gracile, si deterius concoquant, quàm quibus
corpulentum. Ergo vtriusque vesicæ, durities adver-
sus iniurias data est, quæ tunicarum tenuitatem
pensaret: coquendi verò instrumentis, crassities,
quæ mollitiem emendaret, ac cibos calore foue-
ret suo, obtigit. Iam ut meatus bilis, eam susci-
pienti vesicæ, sic pori vteretres, substantia corpo-
ris, maiori vesicæ sunt similes. Et quemadmodum
ille quidem in intestinum, ita hi oblique
intus in laxioris finem vesicæ inserti, veluti mem-
branam quandam ab interna parte succidunt,
quæ ab excrementorum quidem intus irruptione
impetu evertitur, ac patet: reliquo verò
tempore omni concidit, ac contrahitur, meatuum
operculum tam exquisitum efficitur, ut non solum
humoribus, sed etiam sanibus, reditus omnium
fir interclusus. Etenim prima & principalissima
nutrimenti instrumenta sunt, quæ conco-
quant, vniquemque alimentum alia transmittunt. Se-
cunda verò quæ purgant, quæ deducunt, & ex-
crementum excipiunt. Tertia, quæ excrementis
excrementis sunt destinata: quorum alia quidem
effusum in interstitionibus ipsorum cobibent,
ut musculi sedem constituentes: alia verò tem-

peritum inquant, ut musculi epigastrii omnes.
Eorum igitur quæ sunt ad anum, unus quidem
est sine part, transversus extremitas ipsius oris cir-
cumfusus, ut rectum in intestinum ad anulum ac
fortiter claudat. Cuius musculi substantia est in-
ter-creta ac musculum media. At reliqui duo
musculi obliqui, vtriusque vicius, supra ipsum ro-
tum sunt, sedem interius revolvunt, ubi in conari-
bus ipsi magnis prolaborunt. Cæterum octo ab-
dominis musculorum, recti quidem duo, subopis
similibus; per medium omnem venterem rectas di-
bras ferentes, ab omnibus pectoris ad pubem om-
nia extenduntur; ibique sese mutuò coniungunt. Alii
verò duo transversii, excepti per omnia similes,
vniuersum peritonæum: circumtegunt, rectum
cum antedictis efficiunt angulum. Reliqui qua-
tuor sunt obliqui, super hos incidentes: quorum
duo quidem, fibræ ab hypochondris ad illum
bilis extensus habentur, autem duo, hos in spe-
ciem X græce hinc intersecantes; ab illis ab
hypochondriorum partibus descendunt. Omnes
tamen in rectos ac medios musculos destinant,
suis tenuitatibus necuic, producentes semper
æquales ac similes fibras: Ergo quum fibrarum
positiones omnino sint quatuor, musculi quatuor
vtriusque condem mentis fuerunt, à quibus ope-
rantibus simul, alia excrementa; cum manibus
quibusdam cōpressis, fortiter expelluntur, conse-
rente ad id plurimum septo transversio, musculo
magno, & rotundo, qui spiritus instrumenta, à
naturalibus membris distinguit. Squidè huius su-
perior est omnibus: illis autem subiacent, existens
etiam respiratorum organum. Hic musculus, ab ip-
sius pectoris ora insertus (vnde enī capita mus-
culorum rectorum abdominis pendunt) superiori
exortus minimū ducens, atque hinc ad fines co-
stæ nonnulla vtriusque descendens, posteriori
parte ac inferiore obliquus admodum fit. Sine
hoc igitur musculo, aliorum octo, qui in abdomi-
ne sunt, cōpressio, nō magis ad inferiora, quàm
ad superiora ventris excrementa propelleret. E-
ius auctum cōtractione illorum compressioni ac-
cidente, necessum est retinenda ipsa, veluti dua-
bus cōpressa manibus, applicans quidè bibulis
ad corpus, distans verò inter se plurimū, ita
dextrum trahi, ut ne tantillum quidem ipsorum
fursum ad stomachum remeet. Ne autem vicius
existens hic musculus ab octo abdominis mus-
culis & magnis in thoracis sinum magnū evertere
tur, natura in subditiōe eius, musculos interco-
stales construxit, qui thoracem ipsum cōtende-
re, atque intus contrahere possent. Ne verò inter
comprehensio: effusiones contingeret, nimi-
um larynge aperto, musculos non paucos cir-
cumposuit laryngi, quorum alios quidem clau-
de ipsius, alios verò aperire instituit. Abviti-
ant natura ipsi abdominis musculi (quos, ut
propugnaculum subiectarum partium existeret,
excretionis instrumenta, construxit) tum ad
magis effusionis ac vocis generationem, tum
ad partem edendum, atque ad spiritus cohi-
bitionem. Porro musculus qui extrinsecus in ve-
sicæ collo consistit, priori quidem ratione, vili
constituitur, pellit quicquid in mentu con-
nectitur: posteriori autem, cum claudat: quanquam

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

*Sed musculi
sunt.*

Vesicam claudi
posse obliquum
fiscula.

Vtrorum obli-
quis inferioribus
visus.

Fibrae quae qui-
bus alioquin
feruntur.

in de

in de

in de

in de

Colla vesicae fi-
tut.

vesica ipsa claudi etiam sine musculo posset, quum
præterquam quoddam meatum habet angustum, om-
nibus etiam ei fibrarum species insit, vt venterculo
atque matrici. At vero, ne quid denuo à vesica sur-
sum ad renes remeet, facit ipsorum venterum obli-
qua in vesicam insertio: ne verò continua sit vi-
rinae excretio, praestat fibrarum ipsius vesicae va-
rietates, sed obliquarum praecipue. Quam enim
omnes intendit, vndique circum ea quae coniunctae,
vehementer astringitur, do nec supra modum re-
ferta, grauetur pondere. Quum verò excretionis
accingitur, ceteras quidem fibras laxat, solas an-
tem intendit transuersas. Quo tempore musculi
quos suppetias feruntur quidem qui ad meatum
est vrinarium, vnum ipsius principium, quo vesi-
cae adnectitur, laxata: teni verò omnes abdo-
minis musculi, vt intro propellant vesicam, &
comprimant contractasque postmodum vndique
idem qui circum collum est, premensque foras id
lotum quod in meatum subierit, atque ipsam denique
excretionem accelerant. Subest autem vesicae col-
lum, ipsius pubis osibus: subiacentque ei infernè,
rectum intestinum, os sacrum, atque in feminis
collum similiter vteri: quoloco omni, secundum
animalis longitudinem, fertur dorsum, quous-
que extra ossa emicuerit. Inde autem secundum
positionem fertur sursum, vsque ad vitgae vrinis exor-
tum: post, hinc rursus per ipsam vitgaem, insit S.
Romanae luerre, obliquum. Sed in mulieribus
vnicam habet meatus luc in collo vesicae flexio-
nem: in viris autem secunda, vel vni auctarium,
accessit. Ne quid igitur in ipso subfiteret, muscu-
lus ille multas transuersas praedixit fibris, circun-
fusis est, qui simul vrinam à vesica ad pudendum
vsque deducit.

GALENI PERGAMENI

de vsu partium, lib. VI.

Quod à colli vtriusque circumscribitur, perti-
netque anteriori quidem parte ad pectus,
ac septi transversum, decumbit verò po-
steriori ad spinam, hoc omne spatium medicus appel-
lat thoracem. In cuius amplo sinu, piscibus qui
dem cor solum continentur ob eandem causam
genus ipsorum vniuersum est mutum, quod pulmone
ad vocis generationem necessario instrumeto ca-
reat. Nam omnibus, quae aëre inspirant, animau-
tibus, ac rursus ipsum ore expirat, pulmo imple-
rit thoracis capacitate, vt qui vocis simul ac re-
spirationis instrumentum exstitit. Ceterum à thora-
ce illi motus in initium accedit. Porro visus respira-
tionis in animalibus, cordis causa est in ventus,
& quod ipsum aëre substantiam requirit, & quod
simul etiam calore effluens, vt refrigerio desi-
deret. Ac refrigerat ipsum inspiratio quidem, fri-
gidam ei qualitate affundens: expiratio verò,
quod in ipso feruet, & quasi combustum & fuli-
ginosum est, ex eo profligens. Atque attrahit qui-
dem dilatatum, inaniur verò, contractum. I-
psum autem quod cui inuile expirandum erat,
materia vocis efficitur. Trahit igitur cor aërem
externum, non prout per fauces: sed vtriusque
medium pulmonem, quasi fauces promptua-
rium quoddam statuit natura, qui ambabus si-

mul a thionibus feruire posset. Nam si cor dilata-
tum ex faucibus traheret, rursusque adiectum in
illas aërem emitteret, euadem esse concentum
respirationis, & pulsum cordis, esset necesse: id
quod certe non solum ad perfectum viuendum, sed
ad viuendum etiam incommodaret. Nam nec
verba dum continuare possemus, nec mergi in a-
quam, metu suffocationis, nec denique sine inspi-
ratione sumum, aut puluerem, aut pestiferam ali-
quam aëris qualitate percurrere. Vnde neces-
sum esset, vel aërem pestilentem intempere inspi-
rare, vel omnino nihil inspirantes, suffocari con-
fectum. Quia natura cor ipsum, non tantum
modo respirandi instrumentum fecit, sed ipsi ex-
trinsecus pulmonem ac thoracem circum dedit,
qui spiritum illi simul appareant, & vocem ani-
manti efficerent. Quum autem ex pulmone cor
spiritum ducat, eimque rursus in pulmonem red-
dat: licetum est nobis aliis voce vni, & quidem
diutissime: aliis etiam nihil omnino spirare, cor
de nihil impedito. At verò pulmonem quidem,
veluti subfultus cordis mollitudinem eius excep-
tam, thoracem autem, tanquam septum praevali-
dum iuxta grana, non cordis modo, sed pulmo-
nis circumdedit natura: Cor autem in medio o-
mnino thoracis sinu, secundum omnes dimen-
siones ad aequilibrium consistit, loco quum ad
securitatem apertissimum, tum ad aequabilem exor-
tu pulmone refrigerationem opportunissimum.
Eandem tamen id ad laetam regionem situm, ob
sinistram ventriculi pulsationem, quae circa sinis-
tram in agnamus sentitur. Venit ad eius dex-
tram, ventriculus etiam alius exiit, ad venam
causam atque hepatis conuersus. Iocus autem thora-
cis secundum mediam sui longitudinem, à va-
lido quibusdam membranis, quae anteriori qui-
dem parte, omni pectus: posteriore verò, spina
vertebris inseruntur in duos ventres distingui-
tur: vtri forte magno vulnere in alterum eius
partem accepto, respirationis munus eius par-
tis perierit, reliquus venter incolumis, dimidi-
um saltem actionis retineat. Nam si vterque venter
confossum fuerit, voce simul & respiratione pla-
ne destituerit animal. Ad hac verò, attente qui
in ipso thorace sunt, & venter, & venter, & aëropha-
ga, ac denique totus pulmo colligantur toti tho-
raci, tegunturque omnia, hinc membranis ob-
ducta. Ne autem vena causa (quam necesse erat
per medium septum transuersum sursum ad cor
ascendere, atque inde rursus ad venter patem in
gulum) à respirationis organia, quae in aëre
motu versantur, quaequam collideretur, ducte
etiam tunice praestant, quae tum illam, tum germi-
na illius, ad acutius particulas colligant, ac to-
tam in hac molem robustiorem efficiunt, ipsam
venam sursum veluti manu ducentes. Auxilium
autem eius vena: partibus singulatim paratum,
est triplex. Nam in medio quidem thoracis, cor
porrigit illi fortem productionem atque nervosam,
tanquam dextram quandam. Parte verò infer-
ta quintus pulmonis lobus (qui in dextra par-
te consistit, quip, propter eam duntaxat venam,
quae per dextrum latus ascendit, excoartatus est)
sensim illi excutatus subicitur. Superius denique
maximè & mollissimum adena, quem vocant
thymon,

Respiratio
et pulmo non
firmus esse
concedunt.

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

in de

Thymon.

Vena una
pergrina ad
superiora.Glandula ad
que vocatur na
tura.Oesophagus seu
C. rym.Arteria ma
gna pergrina.Arteria ma
gnissima arteria
sinistra cordis
ventriculo.
Arteria magna
inferiorem ca
vam esse super
iorem maiorem.Stomachi, sunt
oesophagus do
stomachum.Oesophagus im
pulsus in ven
triculum.Oris ventriculi
fuit.Cor in medio
constitit. A pul
monibus libe
re prebuit.

thymon, ipsi natura subdidit. Porro duo magni
lobi in vtraque pulmonis parte existunt: quatuor
vero ille parvus, in dextra, vena: causa grana, a
transverso septo vsq; ad cordis aurem pertingit.
Hinc autem altera quidem pars vena: causa in ip
sum cor inferitur: altera vero, eademq; maior,
recta ad iugulum fertur, deducta quadantenus
a productionibus cordis, deinceps ad eam, quem
thymon vocant, inuenta. Id vero nature est per
petui, vt quoties sublime vas aliquod diuidit,
ibi mediam glandulam, diuisione oppleturam,
interferat. Sunt autem hoc in loco venarum ger
mina maximarum, ad scapulas, & brachia, &
mammas pertinentium: quibus ad munimen
tum & firmitudinem, ex prædictis glandulis na
tura commoditate maximum conciliavit. Cau
sa autem vena, opposita ductus via, oesophagus
descendit, per quem ad ventriculum cibus ab o
re delabatur. Ipse igitur spinæ vertebrae iunctus
& colligatus, totum ita permeat thoracem, quo
dammodo oblique positus, tenuissimamq; sedem
sortitus, vt neque ipse spiritus instrumentis ali
quod negotium taceat, neq; ab illis etiam quic
quam lædatur. Per medias enim ad perpendicu
lum quatuor vertebrae dorsu exensum, vbi ad
quintam pertingit, deerrat quidem a recto cur
su, digreditur ad dexteram, vt sedem præbeat
meliori, ac cedat instrumentis magis precipuo,
maximè omnium arterie: quæ vt firmitudinem
nanciscatur, per viam omnium breuissimam, a
corde ad illum spinæ locum se recipit. Hanc en
im ex sinistro cordis ventriculo exortam, in to
tum autem animantium corpus distribuendam,
æquum fuit primis quidem in duas partes im
pares diuidi, earumq; esse multo maiorem, quæ
deorsum fertur, quod totius animalis partes,
quæ subiacunt cordi, multo plures superiores
sunt, ac maiores: deinde per optimam verte
brarum partem ferri. At in vehitur quidem ipsa
arteria mediis vertebrae: non tamen impetiose
admodum, nec superflue stomachum deprimit,
sed paululū quidem & ipsa cedens, ipsum recipit
& admittit focium vertebrae sedis. Venticu
li itaq; stomachus, quatuor quidem thoracis pri
mis spondylis præteritis, propter reliquos o
cto, ad dexteram fertur. Cum primum verò se
ptum transversum contigerit (quod est sanè ora
inferior thoracis) membranas foribus admo
dum sublimè elatus, supra magnam rursus ar
teriam transiit in alteram partem: quo loco præ
ter lapsum septum transversum, ori ventriculi in
feritur: sublimis quidem, ne in asperiorum el
borum transitu arteriam comprimat: in leuam
verò declinans, quod eo in loco latius fuit con
stituit os ventriculi. Adde huc, quod nervis, qui
a cerebro in ventriculum iuxta stomachum de
feruntur, obliqua via multo rutilior futura erat,
quàm recta. Molles enim qui sunt hi, & tenues,
si longo intervallo secundum rectitudinem ren
derentur, habentes ventriculum a seipsis suspen
sum, quæ subinde impleri cibo oportebat, vsq;
diffunditur facili. Cōstat igitur iam ex dictis,
cor in medio thorace oportuisse locari, pulmo
nibusq; ei vndiq; circumfundi, suis lobis, cui digi
tis quibusdā in orbem id cōplectentes, vtrig; ve

ro extrinsecus circumdari esse thoracem. Est autem
cor non rotundum, sed turbinatum, ex basi
cuius, & ea parte aliarum omnium principalis
ma simul atq; tenuissima, ipsa vasa exorsitur. Quæ
verò ex vtraque parte cōsequuntur ad inferiorem
finem, quasi latera quadam ventriculorum ge
nerationi sunt destinata. At ipse finis inferior,
processus quidam est fortis & densus, qui veluti
operculum ventriculorum, propugnaculumq;
totius cordis existit. Atque hæc quidem cordis
pars, si cum aliis eam conseruas, longè abiecius
ma cit. Etenim quum triplex sit partium vtili
tas: aut enim refertur ad vitæ ipsam, aut ad com
modiorem vitam, aut ad horum duorum con
seruationem: quæ sanè ad vitam ipsam particu
larē conferunt, ex principibus sunt habende: reli
quorum verò duorum generum, à primi gene
ris præstantia discedentium, ex minus aliis disce
dere sunt putande, quibus hæc principes facili
comparantur. Quum igitur cor caloris natui,
quo animal regitur, quali fons quidam ac domici
lium sit, omnes eo modo ipsius pars princeps
dicenda fuerit: at magis hæc, quarū vltus toti ani
mali vitam conferuat: id quod faciū duorū va
lorum orificia in sinistro ipsius ventriculo, quæ
medici spiritus osum appellant. Horū enim duo
rum orificiorum, per minus quidem cor us, quæ
in pulmone sunt, arteriis: per manus autem, o
mnibus quæ in toto animali habentur, continuū
est. Minus autem his præcipua partem ea quæ in
altero ipsius ventriculo, quem sanguisum vo
cant, inest. Sunt tamen quædam alia hæc quoque
præstantiora: quorum alterum quidem, sangui
nem in ipsum cor intro mittit: alterum autem, ex
ipso in pulmone deducit. Atq; ob magnitudi
nem duorum valorum, coræ parte fuit aded
magnum, & in media regione thoracis situm.
Cor autem ipsum est caro dura, & ægrè patibi
lis, multiplicibus fibris constata: quo nomine a
musculo differt. Musculus siquidem vult tantum
ineit fibrarum genus, reclusū scilicet aut trans
versarum. Vtrique autem cor, & præter illas, et
iam obliquas sortitur, darine, contentione, &
patiendi difficultate plurimū ab aliis omnibus
differentes, ob actionis continuitatem, & ve
hementiam, in qua semper cor ipsum versatur.
Porro singuli musculi, singulos habent ac simpli
ces motus, ob idq; multiplici fibrarum varietate
nō egent, quemadmodum cor, ventriculus, ma
trix, atq; vesica vtrig;. Quippe horum singula,
reclusi quidem fibris attrahunt, excernunt trans
versis, recinent autem simul omnibus cooperan
tibus. Quarum omnium actiones in corde ipso,
vel tamam ab animali avulso, ac pulsante ad
huc, vel detecto per anteriore regionem pecto
ris, contemplari licebit. Nam quò reclusi quidem
fibris contrahentibus se, reliquis autē di ductis &
laxis, contracturæ sanè fuerit facta longitudo, la
xior verò vniuersa ipsius lantudo, hoc statu cor
totū videbis dilatari. Contrā autem relaxanti
bus se us que sunt secundum longitudinē, con
tractis autem quæ sunt secundum latitudinē,
eo casu rursus contrahi ipsum pericipies, ac de
primi. Medio porro in hæc has motiones interval
lo, exigua quadam quies intercedit, corpore qui

Cordis figura.
Cordis vasa.
non ab aliis
basi aliarum
partium prin
cipalium.
Cordis partes.Vita autem per
triplex.Particula prin
cipis quæ dila
tur.Cor esse caloris
fontem.Similitudo cordis
ventriculo.
Similis cordis
ventriculo an
ti duo.Dextræ cordis
ventriculi or
ificia duo.Cordis caro
quæ.
Musculus inesse
nam tantum
fibrarum
Cor fortis e
muscia fibrarum
græta.Musculus singu
laris inesse
fibrarum
Fibrarum actio
nem vana.Cordis dilata
tio quæ dila
tur.Cordis contra
ctio quando
fuit.Cordis quies
accidit, obli
quo operanti
bus fibrarum.

Corde contrahitur quia ad inspirandum, vel tota pulmo efficitur.

Pulmo ex dextera cordis ventriculus, quod adiut.

Pulmones intereant, intereant, et dextera cordis ventriculus.

Dextrum cor de ventriculo gratia pulmonum; pulmonem gratia vocis et respirations ei datus esse.

Pulm respirare per brachias. Pulm frigilares esse, quoniam vi magna respirant cor ipsi indigeant. Pulm aerem inspirant. Cardia cum pulmone committuntur. Vasorum in pulmone committisse ad naturam.

Pulmo ex se non tam exopti, movetur ad motu thoracis. Pulmonis vasorum natura alteratur.

Intra matris sanguinem crassum et limbum.

dem circa ea quae continet, vndiq; ad vnguē attrito, fibris autem tunc agnibus omnibus, & eorum maxime obliquis. Adhuc autem, imò totam ferē contractionem efficiunt, quae in intimis ipsis cordis ventriculis nitidissima ligamenta tenduntur, definitia in illud, quod interiacet inter ipsos ventriculos, septum. Ob eam igitur causam, tum fortia ligamenta, tum omne fibrarum genus cor habuit, vt facile dilaretur, quando quod naturae suae est accommodatum, ut trahere appetit: attringatur verd vadiq; quando iis quae traxerit, frui tempus situm fuerit: contrahatur deniq; quando superfluum excedens sese accinxerit. Ius ergo quae aërem per fauces, nares, & os inspirant, pulmo, & dexter cordis ventriculus inest. Reliquus vero omnibus neq; pulmo est; neq; ad dextram cordis partem latitudo vlla. Duo enim haec necessarii vna cū pulmone intereant, animalis vox, & cordis dexter ventriculus. Nam dexter quidem ventriculus, gratia pulmonis est factus: pulmo verò, respirantis simul & vocis est instrumentum. At vtilitas vocis piscibus rectē nulla est, vt qui in aqua degant: sed nec respirare ipsis quidem licet per fauces, quomodo ne nobis quidem ipsis, si in eam mergamur: respirant tamē per brachias aëri & vaporī pervias, constructio quarum ipsis vice pulmonis est. Natura etiam frigidiores sunt pisces, quā vt ipsorū cor magna refrigeratione indiget: vtpote exiguo sanguine praedit. Ceterū quae aquantia multum sanguinem possident, vt delphinus, vitulus, balæna, haec omnia aëre inspirant quodam in credibili modo, quem aliquid expositum. Iam verd pro eo spiritu quem cor à pulmone recipit, in illum per arteriosam venam à suo corde ventriculo etiam sanguinem mittit, mutuat et gratiam referens. Commutavit autem in pulmone naturā ipsorum vasorum tunicas, vtiā quidem faciēnt arteriosam, venosam autem arteriam. Siquidem in solo pulmone arteria quidem venae, vena autem arteriae habuit tunicas. Etenim in toto animalis corpore factus fuit sanguinem quidem, vtpote crassum & grauem, tenuis ac rara: spiritum autem, nimium tenuem & leuem, densa & crassa concludi tunica: vt videlicet hic quidem facile efflueret, ille autē acq̃e distribueretur. In pulmone autem diuersa ratione constructa vasa natura. Quum enim pulmo ex se omnino motus exopti, moueatur ad ipsius motum thoracis: ac venas quidem ipsas, quod sint veluti promptuariū cibi, non conueniat eo motu moueri, sed pulmonī largiri purissimum sanguinem: arterias autem, seu receptacula spiritus, omnino necessum sit, facile quidem repleri, inspirantibus non obsecelerat verò vacuari, expirantibus, & loquentibus: ob id sanē cōmodum fuit, his quidem molle, illis verò durū corpus efficere: siquidem has promptē obsequi vtriusq; thoracis actionibus, illas verò procius nihil eis obedire, praestiterat. Quia ex contractione constringit, vt quod pulmonis corpus leue ac rarum existens, sanguine vaporoso & tenui nutrirī in digeat (non autem, quomodo iecur, limoso & crasso) fouerit exuberantissimo spiritu: per angusta quidem ora i-

plius venae arteriosae, quā tenuissimum sanguinem: per laxa vero venosae arteriae, copiosissimum recipiat spiritum. Quare nutritiō ratio pulmonī planē cōtraria est, ac ceteris omnibus partibus, quemadmodum & substantia corporis. Maximam autem venas in eo naturā constituit, vt quantū propter tunicā crassitudinē uitae nutritiōi detrahatur, id magnitudine ipsarum expleatur. Arripit autem violentem pulmo dilationē suā, vel ex densissimis instrumētis, etiā aliquid nutrimenti, quod vehemēti calore suo in minimas partes comminuit. Porro quum venae illae arteriosae, ob tunicarum diuersitatem à caua oriiri non possent, si vti ipsarum adnata: reliquum fuit, vt à dextro cordis specu orirentur, vnde sanguinem elaboratum à corde ad ipsos pulmones transuehant. Eiusmodi vt à thoracis motu non vinceretur vena arteriosa, cōfōnū fuit illius ori membranas quasdam adiunctas esse, quorū, & quales nunc sunt: sine quarum praesidio, in contractione pulmonis, ille sanguis semel ad ipsam missus, rursus reflueret ad cor, nec liceret eis arteriis & venis ex se invicem sanguinem spiritaliū transumere per anastomoses ac oscillorum adaptationes, quae lex in corpore vniuerso obseruatur. Nunc autem reditu ipsius sanguinis, per os magnum venae intercluso, dū vndiq; ipsa vena cōprimatur, destillat quipiam per exigua illa orificia in arterias. Quāto igitur thoracem contendit vehemētius, sanguinē per contractionem versus cor exprimens, tantū membranae exactius os ipsius venae claudunt. Quippe ab interiore parte extrā emergentes, totūq; orificiū in orbem ita obfidentes, vt si senserit omnes atque erectae simul fuerint, vnius magni totum orificiū obturantis speciem referant, ab iis quidem quae ab internis extrā erumpunt, euerit, & exoritur ad tunicas ipsius venae decedentes, transiunt ipsae, adaptato ac plurimum diducto orificio, facile dant. Quod si quid extrinsecus intrā feratur, hoc ipsum cogit ita membranas in vniū, vt ex eis quandam veluti portam ad amussim clausam cōstruat. In omnibus itaq; vasorū à corde proficiscētū orificiis membranae aliae alias ascendentes existūt, vt ea, si fuerint tensae, obstruentes, materias remigrare prohibeant. Proprium autem ipsarum est, educitum quidem ē corde materias, ne amplius ad ipsam remeant: inducantur verò, ne contrā ex ipso effluant. Ceterum quā sint omnino orificia quatuor, bina in vtroq; ventriculo: alterum quidem inducit, alterum verò educit. Quum igitur vasa caua simul & arteriosa, in dextrum cordis ventriculū defluant (qui pulmonis gratia fuit factus) per illam quidē trahitur sanguis, per hanc autem emittitur. At verò quae animalia pulmonae carēt, his solus ille ventriculus inest, qui motum arteriis largitur. Nam vt venae ab hepate, ita arteriae à corde originem ducunt. Porro prima agendorum causa, scopus actionis exiit. Nam quum plura causarum sint genera, primum quidem ac postissimum illud est, cuius causa aliquid sit: secundum verò, à quo sit: tertium, ex quo: quartum, per quod: & quintū, si vis, = secundum quod. Quibus quidem vtiens opifex, ad optimam

Pulmoni cor mouetur a vena infini.

Venas arteriosas oriiri à dextera cordis specu.

Vena arteriosa ori membranas quasdam adiunctas.

Vena arteriosa adhaerere membranas arteriarum, ita foras repellentes.

Vasorum amplexum proficiscuntur à corde orificiis, quae membranas effluunt.

Corde ventriculū dextrū, fuisse gratia pulmonis factum.

Pulmonem tenuis animalis, habere sanguis tantum corde ventriculū. Cetera causarum quatuor.

nam specie singula quæ sunt, effingit: arterias quidem pulmonis, raras: venas autè densas efficiens, propter eam quam diximus causam. Quorum vasorum efformationi, seu materiam quandam subiecit humidi & siccæ miscellam, vsus calido & frigido in vicè temperatis, tanquàm instrumentis efficiendis circa ipsam materiam. Quia in missione, partim quidem materis exaccat à calido constituit, partim autem frigido concretæ, atq; ex horum deniq; mixtura, spiritû optimè temperatû gignit quem postea statim in larum exten dens, diducensq; materiam, cauum vas æ prælongum efficit, copiosius quidem materiam ætundens, cui melius erat esse crassiori: partem autè, cui tenuiori. Noster siquidem conditor in efformandis particulis, hunc perpetuò scopum sequitur, nempe vt quod melius est, semper eligat. Quum igitur quatuor in corde sint officina, tres quidem singulas alia insunt membrana, quæ autem duntaxat arterie venosæ. Oriuntur sane omnes ex officinis istis: unde profectæ, alia quidem intro progrediuntur in cordis ventriculos, ad quos etiam ligamenti foribus auctecluntur: alia verò foras vergunt, quâ primùm vitruq; vas è corde emergit. Sunt itaque in vena arteriosa, quæ alit pulmonem, membranae tres istas foras spectantes, quas à figura literæ *chi*, *mus*, signum les appellat. In ea autem vena quæ sanguinem introducit, tres quoq; foris intro pertinentes insunt membranae, sed quæ multum crassiores, robore, ac magnitudine illas antecant. Præterea etiam officio illius maximæ arterie, quæ à sinistro ventriculo orta, principium est arteriarum omnium, tria quoq; membranae *chi*, *mus*q; intus foras vergentium adnata insunt. Reliquum verò arterie venosæ, quæ in pulmonem distribuitur, officium, duarum membranae foris intro pertinentes, habet adnata. Cordis igitur dilatato, omnia ipsius ligamenta pertensa, trahunt ad seipsa, & veluti resupinât membranas ad corpus cordis: membranas inquam vasorum inducentium materias. Quibus membranis reflexis, vasorum officia patefiunt, vt facillimè possit cor materias ipsas attrahere, nimium causis omnibus, à quibus celerissima fit materiarum attractio, eodè aspirantibus. Nam quod suo loco transferretur, aut trahi ipsum oportet, aut mitti ab aliquo, aut deduci. Quæ omnia simul adfunt materis, si cor dilatatur. Cor siquidem trahit: mittit præpositæ ad aures cauitates, atq; ipsa vasa deducunt. Quorum omnium vnum est motus principii, cordis ipsius dilatatio. At aures (quæ sunt adnata quidam neruosa, & caua, ante officia) laxæ quidè reliquo tempore sunt, & idcirco concauæ: quum verò cor dilatatur, eodè quo membranae modo tenduntur, & contrahuntur, ob idq; materias ex seipsis expressas præmittunt cordi, spiritum nempe ad refrigerationem, sanguinem ad nutritionè illius. Etenim quia vasa quæ materiam cordi suppeditant, si dilatato eo tracta violentius fuissent, quâ tenues ac molles habentur tunicae, facili negotio diuellerentur: ob id auriunt concauitates extrinsecus ad officia singula excogitauit natura, vt ex illis, veluti ex promptuariis quibusdam,

cor ipsum traheret, citra vllum vasorum discrimen. Vt usq; autem aures substantia tenuia facta est, & neruosa, vt & contrahantur facilius, & etiam tumores sint ab iniuriis extrinsecis. At verò membranae ipsarum, eas quæ vasis adiacentis materias introducuntibus, tantò fortiores & maiores oportuit esse eas, quæ inducentibus insunt, quanto maior in dilatando, quum in contrahendo vis est. Vt autè pauciores membranae tribus, minus exactè ac tardius officia vasorum clauderent: sic etiam si plures fuissent, imbecillitatem actionè adcrent. In solo tamen arterie venosæ officio, mentis sunt duarum tantum membranae adnata. Solius siquidem huius officii intererat, ne ad amissum clauderetur, propterea quòd solum ipsum oportebat esse transitu à corde ad pulmones, excrementis fuliginosis, quæ in illo ob copiam innati caloris necelland gignuntur: tanquàm etiam & per reliqua trium vasorū officia, aliquid retrò ferretur & effluit. Nam quæ admodum in ipsa aspera arteria fieri non potest quò minus transglutientibus nobis exiguum quiddam humidum transcoleret, sic membranae illæ non possunt adeò accurate occludere illorū officia vasorum, quin vitro citroque aliquid sanguinis & spiritus permeet. Sunt enim omnia in omnibus, atque arterie quidem tenuem & purum & vaporosum continent sanguinem: venæ autem paucum, eundemq; caliginosum ætrem.

Simili ratione per stomachum spiritus transglutientibus atq; inspirantibus nobis ad ventriculum permeat: nulliusque est syncerum in corpore, sed omnia commixtum habent cum omnibus. Etenim ipsius cordis ventriculus pulsare quidem vterq; videntur, non tamen partim mensura vitruq; sanguis & spiritus adest. Copiosior quippe est, in dextero quidem sanguinis, in sinistro autem spiritus substantia: vacuatur tamen sanguis per vulneratas arterias, quem à venis per commutationem officiorū exungunt: ad apertio quorum hic etiam efficit, vt respiratio atq; pulsus vtilitas, venis communicetur. Porro cordis sinistra pars admodum crassa est & dura, vt quæ ventriculi spirituosius tegumentū esset futura. Dextra verò tenuis & mollis, simul quidem vt materis vitrobique esset consentaneus locus, simul autem ne cor in aliter vram partem propenderet. Quare cor ipsum, in medio illius daxe tunica: (quam *epicardium* appellant) rectè firmiciter libratur. Quæ tunica ex capite ipsius amplissima exoritur, postea secundum figuram eius paulatim in mucronem contrahitur, veluti vallum quoddam ac domicilium ei circumiecta, tanquàm inter seipsam & cor ipsam circumscribens, quantum cordi dilatato suscipiendo erat satis. Est autem substantia ipsius tunicae mediocriter crassa & robusta, vt neq; collidatur, neq; etiam pulmones lædat. Cæterum quo tempore cor dilatatur, membranae radices trahens, aperit quidem officia vasorum in tromittentiū materias, claudit autem educentiū. In vniuersum autè leuiora omnia expeditius obsequuntur trahentibus. Tam verò quæ in corde apparent foramina, pertinentia potissimum ad medium ipsius septum, prædictæ communionis gratia extiterunt. Est autem an-

Vasorum generata.

Arteria vena
duas membra
nas efficit.

Triplex arteria
venosa.
Vena cana dicitur
ad cor sanguis
quasi pro mem
brana esse in
fusa formam
pertinentem.
Arteria arte
riosa membrana
mali tres sunt,
foras vergens.
Arteria vena
a densa mem
brana duas fo
ras, intro mien
mantes.

Translatio
materiae
quod requiritur
vbi.

Arteria vena
duas membra
nas efficit.

Arteria vena
duas membra
nas efficit.

Arteria vena
duas membra
nas efficit.

Omnia effi
ciuntur.

Syncerum
nihil in corpore.
Corda ventri
culi vterq; pul
sare videntur.

Veni commu
nicari possit
et respiratio
viti.
Corda sinistra
pars curba cras
sa & durior
dextra.

Epicardium.

Pertinentia sub
stantia.

Leuiora expeditius
obsequuntur
trahentibus.
Septum cordis
fugit.

Animalis spiritus est exhalatio benignissima sanguinis.

Arteria cur tunica duplex. Cordis vas quod arteria menseat.

Cor egebat crasso alimento, quam sit spiritus.

Similiter vtrumque videtur.

Cor à qua vena dilatur.

Nervus videtur in cor distribui, atque in hepate, renes, stomachum.

Cor nihil à stomacho animalis ferunt.

Hepar animæ appetentia fit.

Cor principis vasculum fasciatum.

Cordis quale est infus.

Cordis ad quid videtur. Vtrum in vtero suspensum.

malis spiritus, exhalatio quædam benignissimi sanguinis. Quare merito sanguis purus & tenuis continetur in ipsis arteriis, vtpote qui anima li spiritui sit alimento futurus. Ob cuius tenuitatem spiritus, nec non propter motum perpetuum, valida & duplici tunica fuit ipsis arteriis opus. Ad hæc, quæ vena in cor infigitur, maior ea est, quæ ab eodem in pulmonibus inseritur, quum nimirum vehat sanguinem, qui per hanc deferretur in illos, & qui in sinistram cordis speciem ad gignendos spiritus vitales transmutatur. Ad eundem autem modum arteria etiam, quæ ex pulmone ad cor perducit spiritum, multo minor est magna arteria, quod hæc quidem à dextro ventriculo aliquam sanguinis portionem assumat, omniumque artieriarum, quæ toto animali insunt, sit futurum principium. Quia verò corpus ipsius cordis crassum erat ac densum, alimentorog egebat crassiori, ob id sanguinem ducit à vena à causa, quo nutriatur, priusquam ea ad cor immigraret. Cor itaque pulmonis alimentum præparat, sibi autem nequaquam. Quum enim quale est vnumquodque, tali ipsum nutrum alimentum oporteat, iure optimo cor quidem crasso, pulmo autem vaporoso sanguine indiguit. Quæ causa est, ut cor non alatur ex seipso, sed priusquam vena causa dextro inseratur ventriculo, pars eius tanta, quita cordi nutriendo erit satis, seu iuncta circa cordis caput, extrahescens obvoluat, & in omnes ipsius partes diffusetur: cum qua etiam tanta arteriarum magnæ portio dispergitur, quanta ad prædictam venam refrigerandam, conservandamque probam temperantem caloris innati externarum cordis partium, esse videbatur sufficiens. Nullus autem videtur nervus in cor distribui, quemadmodum neque in hepate, renes, stomachum. Solum namque pericardium propagines tenuium nervorum recipit à quibus diuisis, sensibiles alias ac manifestas in cordis ipsius tunicas etiam inseri, in maioribus saltem animalibus, constat. Quemadmodum enim multulus omnibus, quod actionis animalis instrumenta cernat, magnus nervus fuit opus: ita & cordis pullam actionem animale habent, tantis nervis opus fuit, quantis prædictorum viscerum singulis: addam etiam & pulmone. Communiter enim omnia hæc, ne sensu omnino carerent, nervos etiam habuerunt: priusquam autem inter ea hepate & cor, quod illi quidem animæ appetentior, hoc autem irascibilis esset principium. Ad hæc, in magnorum quidem animalium corde, os quoddam reperitur cartilagineum: in exiguis verò admodum, corpus ex cartilagineo & nervo constitutum: quod quidem tum ad ligamentorum principia tutius colliganda, tum ad rotas cordis firmitatem, est constitutum. Hæc igitur sunt in perfectis iam animalibus cordis particule. In his autem quæ adhuc formantur in vtero, animadvertens natura pulmonem, qui neq. absolutus est, neq. motu præditus, non eandem postulare dispositionem, atque is qui perfectus quum sit, movetur etiam, vnum quidem vas validum, crassum & densum, ad arteriam magnam: alterum verò, imbecillum, & tenue, & rarum, ad venam causam anastomosi applicuit. Quum igitur arteriam magnam, ad

crassum illud ac densum pulmonis vas, ad tenue verò & rarum venam causam per anastomoses aperuisset, pulmonei quidem vtriusque materias iuncte largita est, & cor nihilominus à pulmone servitute liberavit. Quocirca non oportet mirari, si quum in illis nec sanguinem, nec spiritum mittat pulmonibus cor: nec totius corporis arteriis suppeditat, ut in perfectis: ad solam propriam vitæ quam paucissimò indigerit spiritus, quem maxime etiam, ut opinor, ex ipsa magna arteria ducere poterat. Quamvis licuit cordi per id orificium, cui soli tunicas duas foris intrinsecas pertinetes duximus adhaerescere, ex pulmone sanguinem ac spiritum sibi mista attrahere. Vas siquidem hoc in fœtibus ex causa quidem vena sanguinem per quandam memorandæ magnitudinis anastomosi recipit: quum sanguis adhuc in perfectis quidem, ex sanguine: in fœtibus verò, ex spiritibus instrumentis sumatur. Etenim si fœtus adhuc vtero matris lixente, per ipsius matricem penetrando, arterias quæ in umbilico sunt, vinculo exceperis, quæ in secundis sunt arteriæ omnes, pulsus destituerent, quum tamen quæ ipsi embryo insunt, adhuc pulsent. Quod si vena etiam quæ fuit in umbilico laqueis complexus fuerit, laudquam quæ in embryo sunt arteriæ amplius pulsauerint: quod videlicet vis illa quæ movet secundarum arterias, à corde ipsius factus proficiatur: à vena autem per anastomoses arteriarum recipiant spiritum, à quo calor natus, saltem aliquantisper, servari potest. Fieri igitur potest in corde, ut ex vase sanguinem continente, commodum aliquod calor, qui in sinistro eius ventriculo est, accedat, cuius causa animalia & respirant, & pulsibus egent. Cor itaque non modò in perfectis animalibus, sed in fœtibus etiam, vni illam arteriis suppeditat, quæ movetur: nō tamen ipsas seu vterum statim replet aut inflat. Non siquidem ob id dilatantur quod implentur arteriæ, sed quia dilatantur, implentur. Porro natura, quemadmodum venam illam quæ ab umbilico pertinet ad iecur, & arterias quæ sunt ad spinam, tandem exsiccat, & veluti funiculos quosdam tenues efficit: ad eundem modum & prædictas, quæ ad cor pertinent, vasorum anastomoses, in animalia iam nato abolet: quæ vni animalibus in lucem reditis futura non sunt, ea ne esse quidem permittens.

GALENI PERGAMENTI de vsv partium, lib. VII.

Cæterum quemadmodum hepate, sic etiam pulmone, quæ plurimè est vas contextus: quorum intervalla molli carne replentur. Vasorum porro ipsius proficiuntur, hoc quod ex sinistro cordis ventriculo, illud autem ex dextro: retinui denique ex faucibus. Deinde illinc progressa diuiduntur in quatuor lobos pulmonis. In quatuor autem lobum (quum parvus sit, ac veluti subteritulum venæ causæ, in dextra thoracis regione) propagines quædam exiguae, à vasis in lobum magnum illi propinquè distributis, diffeminantur. Ambus autem lobos omnes extrinsecus tenuis quædam membrana, portiones quasdam eorum

Cor in vtero occupare spiritus amagnum arte ma.

Secundariæ arteriæ movetur à corde factis de infusis vena, arteriæ factis per anastomoses recipere à vna quæritur.

Arteria implens cor, quia dilatantur non di latantur quæ implentur.

In vtilis animalis natura os esse quidem permittit.

Pulmonis vase vnde urantur.

Pulmonis quatuor lobos.

Pulmonis tunicæ.

eorum nervorum, qui iuxta stomachum inferre ad ventriculum tendunt, accipiunt. Porro tritium illud vas, quod à faucibus in pulmonem descendit, quodq; aspera arteria, necnon bronchus dicitur, ex corpusculis quibusdam cartilagineis circularibusq; constat, per totam longitudinem colli optimè iuncte se ordinèq; singulariter compactis. At verò, quæ parte contractura subiectum erant formæ actui huiusmodi corpora, amplius cartilaginea non sunt, sed C. Larinam

literam referunt, ut videlicet cibus qui deglutitioni cedant. Velut autem intrinsecus ipsam arteriam asperam, eiusq; partes omnes subvixit, quædam tunica penitus circularis, densa simul & solida, fibras habens secundum longitudinem rectas: ac brevit, continua illi, quæ ab ore in ventriculum ducitur. Quare per hanc membranam diæ animalia deglutiant, cartilagineos cum larynge ad ipsas fauces trahuntur. Extrinsecus eni alia circumducitur tunica, veluti tonus asperæ arteriæ non vulgare indumentum. Per hanc igitur arteriam asperam, quæ in omnes pulmonis partes est distributa cum vasibus quæ à corde proficiunt, inspiratio & exspiratio, vox & stilatio perficitur. At

quæ hoc solum in pulmone vas omnino vacuū est sanguine, quādiu animal secundum naturā se habet. Fuit autem in instrumento vocis omnino cartilagineo opus, quā molliora quā pro ipsius natura præiubeant aërem tenuissimum percussit: duriora autem, facili ipsam evertant, sic vt fluere possint, quā percutat aër ipse videtur. At cartilago est simplex quadam particula, valiazum omnium durissima, sic offe duntaxat mollior, ob idque ad elidendam vocem instrumentum aptissimum. Non est autem ex vna simplici cartilagine & sola, continua aspera arteriæ, sed membranosam quoq; assumptis substantiis, quæ circulares eius anulus colligat, vt per animalis inspirationes, expirationesq; facili possint tum dilatari, tum contrahi, atque enī longior, & brevior reddi. Siquid mutationes pulmonis in longitudinem ac brevitatē, à ligamentis cartilagineis inter se connectentibus, tenis quidem per inspirationes, per expirationes autem laxis, atq; in se concidentibus, proficiuntur: incrementum verò in latitudinem & concidentiam, ab his quæ interrupta anbulorum complectunt, gibbis quidem factis extrorsum per ipsas inspirationes, laxis autem per expirationes, procedit. Ac promide cartilagineis ipse, vocis sunt instrumenta: quæ verò eas ligamenta coniungunt, respirationis. At pars illa quæ cum vacuibus asperā arteriā connectit, & quæ sursum nobis transglutinentibus fertur, cuius vocem aspera arteria præparat, larynx vocatur: qui totus cartilagineus existit, primum & principalissimum vocis est instrumentum. Quāquam vocem ab ipso æditam, palatum, veluti retractorium quoddā, & columella, tanquam plectrum, adaugent. Porro ipsius vocis materia exspiratio est, à thoracis musculis facta. Pulmonis itaq; propria particula est hæc arteria, quæ merito pisces exaruerit, atq; etiam pulmone, quod ne voce quidem egeret, vt pote in aquis degentes. Erit igitur ipsa aspera arteria respirationis simul & vocis organum. Arrip-

cio autem naturā cartilaginofam quidem partem arteriæ, ad anteriora colli: carnosam verò, quæ stomachum contractura erat, ad posteriora convertit, ne facile afficeretur, stomachus quidem ab ipsa arteria, hæc autem rursus ab iniuriis extrinsecis. Quare quā alio quidem tempore respiratio, alio autē transglutino fiat, (iniquam enim finalem contingunt) mutis vicissim capacitibus arteria stomachusq; vtuntur: ad eò vt tempore exigas plurima, per vtrosq; meatus, serrat propria materia. Ob idq; constructum est rotundum vtutiq; organum, vt per locum minimum plurima pervadat materia, vtq; vtutiq; ab iniuriis sit tutius. Enim verò tutior illa, quā diuini obstentur interitæ parti ipsius asperæ arteriæ, vt destillationes tum cibum potus, necnon fuliginosi spiritus, atq; etiam humorū acuti (quorum omnium elapsus prohiberi inierdum non potest) excipiens, cartilagineis eius tucatur. Quarum quidem affectus aut infanabiles sunt, aut sanatu quā difficillimi. Ac ipsius tunice incommoda facile resarciuntur: nisi forte aliquando à magna putredine, ipsius portio quædam erosa, cartilagineum penitus destituerit nudam. Ceterum tenuis simul & densa facta est illa tunica, vt neque fistulæ capacitatem sua mole angustior redderet, nec facile defluentes succos imbibere, voceq; sic efficeret ranciam. Melius enim sonant sic quā madida. Quia verò si extreme sit sicca, his quæ talia sunt moderatē, vocem deteriorē elidunt, ob id tunica quæ cartilaginibus subest, natura mediocriter sicca efficit, vtutiq; excessum declinat. Verū nec aspera arteria habet sanguinis copiam quo alatur, anequam vix quædam à corde ipsi fuerint connexæ: neq; ipsam cor fructum vllum ex respiratione percipit, priusquā per alias arterias læues, quæ tenuem, puram, & vaporosam continent sanguinem, nec solius spiritus instrumenta sunt, coniunctum & colligatum huic fuerit. Quarum leuium arteriarum oscula, à natura nihil agente remittit, eò commoderationis adducta sunt, vt vapori quidem ac spiritui sint pervia: sanguini verò, & crassius similiter substantiis, invia. Quod si forte aliquo tempore parula, naturalem commoderationē amiserint, portio aliqua sanguinis ex leuibis in asperas arterias effunditur, quem casum repente rufus edsequitur, & sanguinis per os profusio. Ipsa porro caro pulmonum non solum diuisionem vasulorū longē tenuissimā reddit, sed etiam quædam modū hepatis caro ad cibi, sic ad aëris coctionē ea fuit comparata: ob idq; mollis, foraminulenta, & spirituosā existit. Non enim confertim nec repente æt quæ inspiramus, nutrimentum spiritus animalis evadit: sed paulatim eum immutari est necesse, diuturniorēq; tempore spiritui innaro familiarē qualitatē acquirere. Cuius alterationis pulmōnis caro primum est instrumentum. Spiritus igitur qui trahitur ab asperis arteriis extrinsecus, primum in pulmone carne conficitur, dein autem in corde atq; vniuersis arteriis, sed in eis præcipue, quæ in plexu retiformi consistunt: at vltimum ac perfectissimū in ventriculis cerebri, vbi vtiq; efficitur animalis. Cur autē nos ignoretrea

Aspera arteria cartilaginosa sit.

Depulsiuonem respiratiois, quæ nunquam eodem tempore fit.

Aspera arteria membranosam arteriæ vix.

Cartilagineum aspera arteria afflato sanato diffillitum est.

Aspera arteria tunica interna cor tenens, densa, & mediocriter sicca. Sic a quam madida melius sonat.

Cor esse colligatum pulmone per laui arterias.

Arteriæ cordis in pulmone oscula.

Tutus quando existit.

Pulmonis caro qualis, & quā vtiq; præparat.

Pulmonem carni asperæ arteriæ cordis.

Plexus retiformis.

Aspera arteria cistronis Branchus.

Cartilagineum aspera arteria siqua.

Aspera arteria tunica interna.

Aspera arteria tunica externa.

Aspera arteria quædam asperam sit instrumentum.

Cartilago cor ad elidendam vocem sit instrumentum aptissimum.

Aspera arteria tunica interna præparatur.

Cartilaginei sunt instrumenta vocis.

Larynx primum & principalissimum instrumentum vocis. Palatum. Columella. Voca materia exspiratio est. Ipsa caro aspera arteria & pulmone.

*Spiritus ani-
malem sem
ventriculi co-
rpori.*

*Aspera arteria
sicut inter ve-
nas & laeues
arteriam.*

*Venis arterio-
si cor tunica
dura tributa
sunt.*

*Arteria vasa
sua cor tunica
dura infusa.
Respiratio
viva.*

*Arteriae laeues
infusae esse cor
de sinistro ve-
triculo.*

*Falguem cur-
de capilli in sy-
stole per laeues
& per magnas
arteriam.*

*Pulmo ad the-
saurum motu mo-
ueret.*

*Pulmonis vasa
quae videntur pro
prim materiam
implerantur.*

*Spiritus trahi
à corde in dia-
stole, expelli in
systole.*

*Corde motu
à natura.*

*Theoriam motu
ab anima.*

*Respiratio
esse arteria-
riam.*

planè substantiam animæ, cum animalem vocemus, non est dicendi nunc locus. Fuit autè aspera arteria in medio laevis & venæ locata, quod per mediam quidem laevam, respiratiois utilitatem cordi exhibitura erat: à vena autem, necessarii debebat nutriri. Ad hęc, à dorso quidem habet aspera arteria venam: ab anteriori autem parte, arteriam: quia longius à corde producere ipsam arteriam, quæ reoue atq; imbecillâ fortitur tunica, non erat tutum. Quare illam naturâ sub-
10 bito à corde ortam, in pulmonem disseminavit. Alterum verò vas quod forius erat, abduxit longius. Facta est venarum tunica dura, tum quod eas comprimi faciliè ac dilatari in respiratio-
20 nibus non oporteret (vt videlicet ipsâ thoracis capacitas spiritus instrumentis esset perpetuo patens: & ne sanguis ad cor exen violenter recurreret) tum etiâ quod sanguine vaporoso & tenui quâm crasso, pulmonè aliè erat melius. Ar-
30 teriarum quàm tunica est rara, vt liberalius pulmones foueât suo tenuissimo sanguine, cordiq; trahenti spiritus, longè facilius cedant. Quum itaq; vltus respiratiois primus & maximus sit, vt calor symmetriam conseruet: secundus autè, nec minor, vt nutriat animales spiritus, tum ad hæc, tum ad vocis generationè, pulmonè accom-
40 modavit natura. Applicuit autem omnes arterias laeues sinistro cordis ventriculo, in quo calor natus est principis, perennè illi refrigerationem hinc comparare. At verò quod vltimo sum ac humidu in ipso corde est, in illius cõpres-
50 sionibus per has ipsas laeues arterias explodit, multroq; adhuc magis per magnam arteriam ad alias. Pulmo igitur totam impleus thoracis capacitatè, ad ipsiusmodi thoracis motus mouetur. Cõsequenter autè ad id quod vacatur, priussem per leue quâm graue, attrahentia instrumenta fe-
60 quitur: quæ p̄ ampla officia multo facilius im-
pletur. At asperâ arteriarum omnium vnû est maximum os, pertinet ad pharyngem: laeuam autem aliud vnum ad sinistram cordis ventricu-
70 lum, vt venarum etiam ad dextrum. Sed ex pharynge quidem, aer solus ad arterias asperas: ex dextro ventriculo sanguis solus ad venas: ex sini-
80 stro, mixtu quid ex ambobus pervenit. Pulmonè igitur dilatato, primò quidem externus aer aspe-
90 ras arterias implebit: secundò autem, quod ex sinistro cordis ventriculo effertur, laeues: postremo deniq; ad tertio horum omnium, sanguis im-
plet venas. Antè verò quâm asperâ arterie re-
pleantur aère, ad quod vis aliorum oihul trans-
100 mitur. Fuerunt enim asperâ arterie à natura in-
fisture, vt pulmonem in maximam distensionè agerent. Ac prouide in inspiratio nibus aer exte-
nus in has solas necessariò ingreditur. At spiri-
110 tus in cor ipsum attrahitur, dilatato eo: quemad-
modum rursus compresso, excernitur. At laeues quidem arterie, cordis monibus: asperæ verò pulmonis, inferuunt. Verùm vt cordis motus à natura, sic thoracis ab anima, p̄ficiuntur: melius
120 siquidem fuit ipsam respiratiõem voluntari in-
ferre animalis. Tam pulmo neruis minimis p̄g-
ditus, vt totus faciliè dilatetur & comprimat, in lobos dissectus est, quibus tanquam quibus-
dam digitis cor accuratè completitur. Larynx

portò ex tribus magnis cartilaginibus consistit. Mouetur autem à musculis, propria quidem sua compositione, duodecim: quatenus verò com-
10 mercium habet cum vicinis particulis, ab aliis octo. Harum igitur laryngis cartilaginum, ante-
rior est maxima, extrinsecus quidem convexa,
15 intus autem concava, prælongo scuto perifi-
mili: quare scutiformis vocatur. Secunda verò
cartilago, quanto minor est prima, tanto maior
quam tertia est: interius partibus, quæ consistit
20 stomachus, positionem habet. Ceterum quantu
maxima dicitur à perfectâ figura circuli, hoc ipsa
perficit. Etenim vbi desinit vltima cartilago
asperæ arterie, ibi primu quidem hæc secunda
25 incipit, omnibus partibus totam illam contin-
gens: hoc est, anteriore, posteriore, & obli-
qua. Paulò verò supra anteriores ipsius partes
cartilago scutiformis incipit: secunda videlicet
30 retrorsum cedente. Articulantur autem & com-
muntur inter se partibus obliquis. Atq; etiam
paulò superius ligamenta quædam membrano-
sa & nervosa, ex prima pertinent ad secundam.
Verum vbi minor quæ intus est, desinit, dux qui
dem supericiet paruas conueniat. Incipit
35 inter illuc tertia cartilago, quam arytænoideam
appellant ob formam vasis, conuenientes ad
musculum eminentius illius cavitates habens, adeo
vt commissio larum duarum cartilaginum, du-
plicem dearticulationem efficiat. Est autem tri-
40 citor, quàm in scrua basis, secunda cartilago: ob
eandem causam totius laryngis ora infusa, qua
asperam arteriam attingit, amplior est superio-
ris orificio: quod in pharynge desinit. Atque et-
iam tertia cartilago in angustum valde & ipsa
desinit. Conueria autem est huius quoq; carti-
laginis cavitatis ad meam spiritus, vt velu fi-
50 stula quedam fiat, quod ex tribus us eâ compo-
situm. Parte verò interna, in ipso meatu laryn-
gis, corpus quoddâ incumbit uembranosum,
adiposum & glandulosum, figurâq; linguæ fisti-
le referens. Quod igitur primum in larynge vox
60 efficiatur, quodq; dilatetur plurimu, & cõpri-
matur ad vnguem supernum eius orificiû, alibi
demonstrauimus: ob quas nimis motiones ne-
cessum fuit laryngem non ex simplici vna, sed ex
pluribus simul cõmisus cartilaginibus consisti,
70 motuq; ipsius non naturali, vt arteriarum,
sed voluntariu existere, ad quem perficiendâ
musculi instituti fuerunt. In animalibus igitur
magna voce præditis, in quibus homo etiâ an-
numeratur, quatuor sunt musculi, qui cum se-
80 cunda, cartilagine primam connectunt. Alij
verò quatuor in omnibus animalibus sunt, qui
secundâ tertie: & aliq; duo, qui primam tertie cõ-
munt. Deriuantur autè ex prima cartilagine
scutiformi ad secundam, hoc pacto. Secundum
90 finem inferiorem vtriusq; cartilaginum, vbi tra-
cheam arteriâ, & seuicem tangunt, ex magna
cartilagine perveniunt ad secundam, extrorsum
quidem duo musculi, introrsum autè duo, vtraq;
parte externi externis, & interni internis omni-
100 no æquales. Hi igitur exactè coarctati, angustâq;
efficiunt oram laryngis infernam, primam car-
tilagine secundæ simul applicantes. Alij ve-
rò quatuor, qui secundam cum tertia iungunt,
finem

*Larynx ex tri-
bus cartilagi-
nibus constat,
monens: à
proprio dante
cum musculis.
Scutiformis &
prima cartila-
go laryngis,
quam positionem
habet.*

*Larynx carti-
lag. scutiformis.*

*Larynx ter-
tia cartilago
arytænoidea.*

*Ligula consi-
denda.*

*Vocem primum
in larynge for-
mari.*

*Larynx curat
ex simplici car-
tilagine consistit.*

*Larynx cum
legum musculis
conectitur.*

finem laryngis superiorem aperiant. Quorum qui parte sunt posteriore, cartilagine m arytenoidem retrō sēctunt: ad obliqua verō plurimū diducunt, qui sicut ibi habent obliquū. Porro reliqui duo, ut quatuor actionem & positionem contrariam habentes, claudunt ad vnguem os superiū laryngis, ad internam capaxitatem, primam cartilaginem adducentes. Decem igitur dicti musculi, trium cartilaginum sunt cōmunes: alij verō duo sunt in basi arytenoidis. Ceterū alij sunt his multo maiores, scilicet scutiformis proprii: quorum duo quidem, ex inferioribus ossis hyoidis lateribus habent originē, ut deq̃ secundū longitudinē omnē primæ cartilaginis producantur parte anteriore. Alij verō duo, ab ipsa quidem cartilagine exorti, sed ad pectus tendentes, alijs duobus miscētur. Reliqui duo transiunt eris musculi, ex obliquis scutiformis partibus enati, deinde in orbem stomacum cōplectentes, simul inter se coeunt.

Musculi decem
cōmunes tribus
laryngis carti-
laginibus.

Laryngis carti-
laginibus mus-
culi dupli-
ci articulatione et
motu.

Laryngis mus-
culi decem.
Laryngis alij
partibus colla-
gantes muscu-
losos sunt.

Pharynx prin-
cipalissimum
instrumentum
voci.

Natura est pri-
or atq̃ impera-
tor artis.

An imitatur
nature opera.

Vox fieri nō po-
tēst, nisi transi-
tum sit angus-
tus.

tendat, paulatim rursus ex strictiori amplifietur: id quod penitus efficit ipsius laryngis ligula, quam epiglottida vocant: quæ non modō ad vocem est necessaria, sed etiam ad cohibitionem spiritus. Nam particule ipsius tum dextræ, tum sinistræ, ad eō in idem coeunt, ut sibi ipsi inodit, claudantq̃ exactē meatum. In utraque autem ipsius ligulæ parte dextra & sinistra, natura foramen vitium, vel potius rimam ac fistulam quandē efficit, cui parte interna ventriculi etiam vni minimē paruum appositum. Quare si dextris ac sinistris spiritus intro præteritū, nallam habet causam, cur aut rimam ipsam aperiat, aut enam ventriculi oppleat. At quum pulsus ab internis quidē violentes spiritus fuerit, sed si perit, quo minus rectā feratur, inhibetur, ibi re fractus, & factio velut vertigine, ad latera meatus cōvertitur, quibus magna vi incidens, membranas vniuscūq̃ fistulæ, ad subiectas vsq̃ cauitates diducit: totam autem opplet ligulam, atque inflat, quam rem subsequitur necessario exacta meatus ipsius obturatio. Porro corpus ipsius epiglottidis membranosum quidem exiit, vt ne ab spiritu impletum, aut à moribus laryngis commotum, rumpatur. Humidum autem simul & viscidum, & quo dammodo pingue est, vt propria humiditate, eiq̃ non facili dissolubili (qualis est vntuosa & viscosa) madat perpetuū: id quod maximē ad vocem desideratur. Vnde neque n̄ qui ex ardentissimis febribus sunt febribus, nec qui per magnos æstus fecerunt iter, loqui prius possunt, quam perflus larynx eis fuerit. Quum igitur musculi laryngē claudētes, qui ipsam quocūq̃ ligulam comprehendunt, quicūq̃ reit laryngis musculus vniuersus thoracem ipsū contrahentibus, ex media basi scutiformis emergant, recti verō protendantur, tantum spatij parte posteriori atque obliqua circumscribentes, vt proxime tertie cartilaginis articulationē pertineant, necessarii sunt in partes rursus inferiores aliquot uertuos inferi. Siquidē muscularis omnibus, aut in ipsum caput nervus infigitur, à cerebro, vel spinali medulla facultatem sensitiuam ac motricem ad ipsos perferens: aut omnino in partū aliquam, quæ sub caput sunt, aut certē non infra mediū corpus ad caudam verō non quālibet alioquo principium ea esset musculi, non finis. Omnibus autem commune est musculari, vt ad eam partem diuili extendantur, ad quā vergunt ipsorū fibræ. Necessarii est etiam, reliquis quocūq̃ duabus nervorum coniugationibus, à quibus laryngis au referatur, ex parte inferna nervos immitti. Non tamen æquales magnitudine, aut æquē pollentes robore nervos postulant duo musculi apertientes laryngē, & alij duo qui eundem claudunt: hi siquidem omnibus thoracis musculis, in spiri tus colubinatione obstitunt: illi autem per expirationes eisdē obsequium præstant. At verō quum satis constet nervū omnē manare vel à cerebro, vel à spinali medulla, ceteris quidem musculis omnibus, qui ad caput sunt & collum, motus est facilis. Si quidē in eos qui superius feruntur deo facili, à cerebro nervus manifeste inferuntur: in obliquos verō, à spinali medulla colla, ex septima coniugatione, quod & ipsi ex ortum habeat

Epiglottis ad
vocem & cohi-
bitionem spiritus
maxime est
essentia.

Ligula figura
& ventriculi.

Epiglottidis
corpus quale.

Voci necessariū
est madorem
funicum.

Musculi omni-
bus inferi ner-
vum aut in ip-
sum caput, aut
in partem ali-
quā quæ extra
mediū sunt.

Musculi ad eā
partem trahi-
tar diuili, ad
quam vergunt
ipsorū fibræ.

Nervus omnis
vel à cerebro
vel à spinali
medulla ori-
etur.

Larynx mus-
culus unde sunt
nerui reser-
puit.

Recurrentium
nerui laryn-
gis consideran-
do.

Natura opera
esse longi hym-
ni maiora.

Nervus quo ma-
gis diffunditur
a cerebro co-
magis densius
est.
Epiglottidis vi-
sio.

Epiglottidis
substantia, ma-
gnitudo, sitis
que.

obliquum. Videndum igitur est, unde nam sex illi prædicti musculi, qui recti, secundum laryngis longitudinem, à partibus inferioribus sursum tendunt, suos nervos sortiantur. Eum vero à cerebro posteriori nervorum est recta productio per totum collum deorsum, & vtræque arterie procedens: cui parva quædā alia se iungit. Ab hac productione reliqui laryngis musculi (præter sex illos) atque etiam eorum nonnulli qui in collo sunt recti, distributiones accipiunt. Verum quum sexta hæc nervorum coniunctio sit maxima, non parva etiam eius propagatio totum collum præterlapsa, decidit in thoracem: & primam quidem nervorum coniugationem producit ad thoracē ipsū, & radicem costarū pertinemtem. Alias autem præter has multas, parvam ad cor, partim ad pulmonem, ac stomachū, partim denique ad omnia viscera in inferiora, delegat. Dum igitur nervi hi per thoracem deferantur, propagatio quædam vtriusque enata, per eandem reuertitur viam, quæ prius descenderat, sex cursum reciprocans. Siquidem ubi uterque nervus usque ad regionem cordis profecisset, finister quidē longius progressus, arcū maximū arteriæ, veluti circa rotulam aut merā quandā fortem atque transversam obvolvitur, potissimum ex in parte, quæ primum à corde emergens, scilicet ad spina inalectur. Dexter verò, quum nullū haberet in ea thioracis parte, per quam fertur, ascensum similem, circa illam arteriæ partem, quæ obliqua à corde sursum ad dextrā axillam fertur, obducitur. Sed quia flexio hæc erat multo deterior, quā illa sinistra ad cor, utpote obliqua, partim multitudine productionum utriusque in vtriusque partem, ab eadem regione emittit, partim etiā ligamentorū vi corroboravit ipsam naturā, cuius opera non modō laudibus, sed sunt etiam hymni maiora. Nervus itaque vterque (quatenus dictū est) circumductus, sursum ad asperam arteriæ caput recurrit, idem quidem iter conficiens, ac prius: nulli verò amplius musculo, ne minimam quidem sui portionem distribuens, quod nullum alium musculum principium motionis suæ ex partibus inferioribus necesse erat accipere. Dispergitur autem eorum vterque in laryngis musculos sibi correspondentes: qui dextra quidē est parte, in tres illi ē directo positos: qui autem sinistra, in reliquos tres, ambo verò in sex, à quibus aperiri & claudī laryngis conningit. Concluserunt autem sibi prædicti nervi, robur non mediocre, ex iners longitudinem: quum in productionibus primis, nervi omnes sint molles, & cerebro ipsi adsimiles: progredientes vero, magis magnis seculis duriores evadunt. Iam inter respirandum, in meatum spiritus uō potio modō, sed cibus etiā repente incideret, nisi natura providē orificio laryngis epiglottidē, veluti operculū, admovisset: rectam quidem alio tempore omni quo animal respirat stantem. quum autem quidvis transglutitur, laryngis ipsi assidentem. Siquidē ipsū quod transglutitur, seu primum ipsius radici incidens, post autem dorso invecitum, inclinari ipsam cogit, ac collabi, ut cuius substantia cartilago sit, eaq̃ prætenus. Figura autem epiglottis rotunda est: at magnitudine, paulo maior orifi-

dio laryngis. Vergit porro ad stomachum, positionemq̃ habet tertie cartilaginis æquæspedie contrariam, utpote ex adversa illi regione exorta. Verum quemadmodum à cibarum epiglottis in laryngis meatum compellatur, ita ab eis quæ evomuntur, cartilago æquæspedie. Spectat enim & illa in laryngis capacitatem: quo sit, ut eorum impetus quæ sursum à stomacho suggeruntur, dorso ipsius incidens, totam cartilaginem facile in locum cedentem evertat. Nec tamen ita claudunt meatum laryngis huiusmodi cartilagines, ut nihil prorsus transfluere possit, sed ne multum, neve confertim. Siquidem exiguum quiddam ponens semper in aperitum arteriam delabatur, non per mediam laxatam iter suum faciens, sed in orbem secundum tunicas eius involutum, quo numerum sua deficit atque fouetur pulmō. Quin & glandulæ ipsæ quæ laryngi adiacent, laxiores & fungosiores quum sint, portionem eius humoris excipiūt, ut eo videlicet partes omnes circumstantes perfundat. Quod autem transglutientibus vobis cibos, ætophagus à larynge toto cartilaginose minime coarctetur, ob id sit, quia tunc commutatur positio eorum: quippe stomachi intumit, ad asperam descendit autem larynx, verò sursum ad fauces recurrit. Porro bona pars musculorum linguæ, necnon musculorum laryngis coniugatio anterior, aliquæ nonnulli qui ad omoplatas feruntur, præterea robustius alius geminus, qui ad os pectoris fertur, postremō alij duo musculi pernētes ad genas, sicuti & reliqui parvi, qui sunt ad radices propaginū, quos columnares appellat, hi in quā omnes musculi, ab osse hyoide ob similitudinem æliter sic appellato, oriuntur. At musculi vltimō omnium dicti, & qui ante illos sunt, genæ ipsius sunt proprii, quum movent obliquis motibus sibi oppositis. Qui autem ab osse hyoide inseruntur linguæ, illius gratia exierunt: quibus oppositis simul estis, qui duplex ad pectoris os descendit, ut deorsuoi hyoides detrahas, si forte à superioribus musculis violentius sursum tendatur: existens etiā cartilagini suntiformi propugnaculū quoddā, quemadmodū & ipsū hyoides. Iam hæc, quod et musculis tracheam arteriā simul coercet ac dirigit. Quinetiā & qui ad omoplatas feruntur musculi, tum laryngis, tum ossis hyoidis motum versus collum efficiunt. Invecitū igitur gibbis ipsius laryngis hoc os, à multis musculis oppositis sibi invicem & quipollentibus committitur, atque in medio firmatur. Verum ad maiorem securitatem, non solum duobus ipsius ossis lateribus applicuit natura ligamenta quædam robusta, sed etiam cartilaginosa quædā alia & rotunda producens, ea vtriusque lateri inseruit. Connectitur autem nihilominus per membranas quasdam, non modō ad laryngem & epiglottidem, verum etiam ad stomachum, à quibus firmiter continetur annexi capiti, his quidem osseum magis, alius cartilagineū, pro ratione musculorum qui ab eo exoriantur. Quod pertinet ad thoracem, alibi demonstravi. Multa esse illi moris principia: respiratio nemq̃ aliam omni carere vi, aliam violentiam existerē: atque vtriusque proprios melle musculos.

Porro

Artyanodes
cartilago.

Asperam in ar-
teriam illam
semper nauis-
sit potius.

Glandula alia
centum laryngis.

Laryngis recur-
rit ad fauces
transglutientibus
vobis cibos.
Musculi, ab osse
hyoide produ-
cti.

Hyoides in osse
sive propugna-
culum cartila-
ginosum suntiforme.

Hyoidis ossis la-
teribus & duplo
ita.

Respiratio du-
plex.

*Musculorum in
intercostalium fi-
bra quales un-
ter se positas
habent.*

*Septi transver-
si subilatis et
tunicis.*

*Diaphragma -
tis viti.
Costa mendosa
et ad finem
tunicis.*

*Pectoris et
Cartilago ra-
dialis.*

*Costarum, si-
per viti, et
per quing. men-
dosas.
Principia ani-
malis tris.*

*Cerebrum non
esset muscu-
lus et finem
bituram motu.
Crani immo-
bile, propaga-
tum corvis.*

*Thorax cur ex
osibus simul et
musculis consistit.*

*Lact esse reco-
mentum viti
alimenti.
Lact, quibus a-
nimalibus col-
ligi in pectore
necesse.
Mammis in se-
re plenis quine-
resum viti par-
te prolem aden-
tibus.*

*Mamma qui-
bus in pectore
dua.
Mammis regu-
mento esse cir-
di.*

*Lact gigni ex
pinguine elabo-
rato
Mammis va-
ia viti ex-
tantur.*

Potro musculorum, qui inter costas sunt, fibræ, ab una costa ad aliam perveniunt, cum parva ad obliquâ declinatione: quincientiam internæ fibræ, externis firum contrarium habent: necnon illæ quæ ad os pectoris in partibus costarum cartilaginosis consistunt, contrariæ sunt illi, quæ in osseis sunt, usque ad vertebra. Propria septi transversis substantia, musculus est: tunice vero ipsi duæ insunt: inferior quidem, peritonæi tunice summitas: superior aut, basis tunice succingentis costas. Consert aut diaphragma, non solum ad pellenda excrementa alui, sed etiam ad ipsam respirationem. Ad cartilago multa notari costarum extremis: circumsusa est, quod tiores sint ipsæ ab iniuriis extrinsecis, ac per eas subiecta corpora. Nā pulsata cartilago minimè cōmī nūtur, aut frangitur. Iā verò pectorale os (cuius vltima pars est cartilago eniformis, oris ventriculi, septi transversis, cordisq. similiter propugna-
tum) ex septem ossibus constat, quod septem in ipsum costæ veræ articulatæ sunt: nam reliquæ mendosæ sunt quinq. Quum enim tria esse principia, quæ animal ipsum dispensant, os quidem immobile sine musculus primo principio circumcinctæ natura. Solos autem musculos tertio elargita est. At medio inter vtrumq. posito, & ossa & musculos. Cerebrum namque in nullus visus indiguit musculus, ceu fons motus vulturarij & principij. Quo fit, ut etiam immo-
bile, quasi munitis, ipsi tibi circumdantur. Quod si hepan aut ventriculo sepeum eius generis ali-
quod circumfusum fuisset, vbi os & potus ex-
operetur: vbi factus moles recondetur? Quæ
deniq. excerneretur superflua, si nullus illis præ-
esset musculus: At thorax mori penitus amissi-
set, si ex folis consistaret ossibus. Sin vero contræ
ex folis musculus, incidere hi pulmoni & cor-
di, nemine eos explodente. Vt igitur simul quide-
m spatium intus esset, simul autem totum in-
strumentum moueretur, musculi alternatim fue-
runt ossibus interpositi. Quod verò ad mam-
mas spectat, quum lac vtilis alimentis superflui
sit, iure optimo quibus animantibus in cornua
& alia id genus, in partibus superioribus copia
superfluum absorbetur, in his quidem ad
thoracem non poterat acerrum aliud vtile rece-
mentum. Vnde ad ventrem eorum, ex thorace
natura mammæ deduxit: atq. illic numerosam
quidem vno partu prolem ædentibus, multas:
contrariis autem binas tantum apposuit. Poerò
quibus animalibus in partibus superius superflui
nihil absumitur, his in pectora eas collocat.
Et si vni aut duo concipiant, duas: sin vero
plura, duas quide in pectore, alias vero inferius
adhibet. At in homine merito mammæ pecto-
ri adhaerent, vbi & cordi tegumēto esse possunt,
vtpote glandulose existentes, crassiusq. indumē-
tis persimiles, & multo melius quam alibi, ex san-
guine in venis elaborato, copiam optimi lactis
conficere. Siquidem ex vena caua, vbi iam prope
claves pervenit, natura duas venarū cōmemo-
rabilium, ad duas item cum eis arteriarū propa-
gines, quatuor simul eas infra per totum pectus
deduxit: eorū modo binas demū vtriusq. mamillæ
inseruit, in tū longo itine id molita, ut plu-

rimū in vasis esset sanguis percoctus. Qui quum
fertur sursum, per cor sanctiter facit: rursusque
deorsum tendens, occurrit: exagitatq. semper
quidem il motu thoracis, & in his eiusmodi va-
gationibus incalescit, parti perpetuo motu præ-
dita diu immoratur: quæ omnia simul ad per-
fectam ipsi collisionem conferunt. Poerò quibus
animalibus mammæ in pectore sunt, servantes
& in masculis: quibus verò in ventre soli insunt,
non adhuc servantur, nisi partus similitudinem
corporis cum matre potius quàm cum patre ob-
tineat. In vniuersum autem constat, omnem fe-
minam esse masculo frigidiorē.

GAL. DE VSV PARTIUM LIB. VIII

At collum fuit constitutum vnius asperæ ar-
teris gratia, videturque ob id semper vni
cum pulmone intire. Quam ob rem pi-
sces omnes, quod pulmone non habent, collo-
care: contrā autē, quibus animalibus inest
pulmo, ea & collo. prædita sunt, & spiritū attra-
hant in pulmone per arteriā asperā, rursusque ei-
ciunt per eandē. Ad hæc efflatio, quæ vocis ma-
teria est, eiusdem arterie est actio, citra quam nec
vos efficeret. Estq. primum & principalissimum
voci instrumentum: cui larynx nomen est: sinus
superior asperæ arterie, quæ etiam pharynga
nominant, quemadmodum & ligulā, quæ laryngi
incumbit. Idcirco, si pulmone aspera arteria est
affinis, tantorū animalū vici præstat, eius finis
gratia collum formatum extitit: ob idq. priuata
collo animalia, sunt muta. Etenim quum in
thorace continetur pulmo, asperisq. arteria ex-
pilo emergens, ad os, magno intervallo femotū,
necessariō pertineat, spatium sanē quod ori &
thoraci interiacet, quum asperæ arterie sit transi-
tus, eorum etiam exitus via, quæ tum superius
deorsum, tum inferius sursum feruntur. Ac super-
ne quidem feruntur deorsum nervi, stomachus,
musculi, & spinalis medulla: inferne verò sursum
venæ, arteriæ, atq. ipsa pharynx. At spinali me-
dullæ munimento sunt circumpositæ vertebra:
vasorū verò diuisiones glandulæ replent: mem-
brana item ac ligamenta quædam, muniunt si-
mul prædicta & colligant. Quibus omnibus
cutis communem operimentum existit. Anima-
lia quæ alimentum sibi à terra ore suppeditant,
collum habent longitudine cruribus simile. At
homo, & quæ familia ei animalia sunt, quum
propter pharyngē collū, & illam vocis & respira-
tionis gratia possideat, magnitudinē etiam col-
li formam tantū, quanta pharyngi necessaria ad
prædictas actiones erat. Ad hæc etiā, quū opor-
teret partes eas quæ ad humerum, brachium, vlnam,
extremā manū, ac deniq. septem transver-
sus spectant, à spinali medulla collū nervos acci-
pere, horum nervorum gratia, in spatio inter caput
atq. thoracē medio, alij generati sunt spina-
dylæ, ex quibus collum constatur. Caput autem
plurimis visum est propter cerebrum factum
fuisse, ob eorū causam sensus omnes in se con-
tinere, tanquam seruos quosdam & magni re-
gis stipatores. At cancris & aliis molli crusta in

*Lact elabora-
tione esse con-
ferant.*

*Mamma quan-
do hanc aut ad
pocum majus-
lin.*

*Feminas om-
nes esse majus-
lin frigidiore.*

*Collum fuisse
factum gratia
asperæ arterie.
Collum asperæ
arterie, cum
pulmone.*

*Efflatio exil-
tati vocis materia.
Larynx est
principalis in-
strumētum
voci.
Pharynx.
Ligula.*

*Collum priuata
sunt muta.*

*Spinalis me-
dullæ munimen-
to vertebra.
Glandulæ re-
plere diuisionem
vasorum.
Cutis operimen-
tum commune.
Collū longitudi-
ne in variis ani-
malibus vna.*

*Collū vertebra
quibus partibus
nervos laryngis.*

*Cancris canore
capite.*

tectis, caput quidem non est: particula tamen quæ sensuum dux est, ac motus voluntarij, omnino certe eis in thorace consistit, ubi omnia ipsius sensuum instrumenta insunt. Itaq; quod in nobis est cerebrum, id in illis sanè animalibus esse pars ea, ad quam prædictorum quodq; refertur.

Cæterum existimare, caloris qui cordi inest refrigerandi gratia, cerebrum fuisse constructum (qualis fuit sententia Aristotelis) omnino absurdum videtur, nec ab simile, ac si quis dicat, calcanem cordis causâ exuisse. Nam qui obsecro fieri potest, vt cor assiduâ respiracione aëris commodissime refrigeratur (in vapore refertum arterijs & venis, quibus nulla est calidior in corpore animalis particula) à cerebro quod remotissimum est, crassissimisq; interceptum ossibus, ac semper ipso ære calidius, aliquid refrigerum desideret? Etenim ubi cranium est fractum, id curamus præcipue, vt quamcunq; ossa fracta excidamus, ne videlicet ipsum cerebrum occurru

aëris refrigeretur: id quod certe esset malorum vltimum, illi cui fractum est caput. Atqui si aër cerebro esset calidior, haudquaquam refrigeraretur ab eo. Nunc autem vel si ætas fuerit, refrigeratur facile, indiget enam tunc foveri crassissimè, tanquam non solum id non sit frigidi, sed ne citrà molestiâ quidem occursum substantiæ frigidæ toleret. Aut quomodo fans cordi refrigerandum esse potest, cor autem non multo magis cerebrum supra se positum possit excalfacere, quam calor omnis feratur sublimè? Cur enî, ad cor quidem obscura quedâ apophysis ab ipso pertinet, sensuum verò instrumenta à cerebro portionem em immensam recipiunt? Etenim in vtriusq; autem insignis nervus vnâ cum meningibus infertatur. In vtriusq; etiam nares porro cerebro pertinet, multo maior ea, quæ ad aures pervenit. Similiter in vtriusq; oculum, vnus quidè molliis nervus in radicem ipsius, vnus autem duobus, in musculos moventes infertur. Ad linguâ verò, nonne quatuor, duo quidem molles per palatum tendunt: duo autem duri, scilicet vtriusq; autem feruntur? In vniuersum autè omnia cum ipso cerebro communionem habent. Quod quidem quum longinqua quidem refrigeret, proxima autem non afficit similiter, monstrat quoddam esse milu videtur. Fieri autem non potest, vt particula alicuius vtilitatem ritè exponamus, nisi totius instrumenti actionem prius in venerimus. Cerebrum igitur principium existit nervorum, sensusq; & voluntarij motus. Cor autem, arteriarum atq; caloris insin. Porro etsi cerebrum (quod insinuat, hoc est, in capite situm, dicitur) in animalibus capitis expertibus iuxta pectus collocatum cernatur, non ob id tamen aliud quippiam cerebro proportionale, dicemus illis inesse, sed idem ipsum, licet vetus nomen ei non conveniat. Siquidè quod sensus ac motus principium est, vnum atq; idem est in omnibus animalibus, etiam in locis diversis inveniantur. Quum igitur in animalibus capite destitutis, cerebrum atq; etiam os sint ad pectus: sicut & aures & nares, manifestum vique est, propter nullam earum particularum caput conditum fuisse à natura. Cæterum eisdem animalibus capite

destitutis, vt cancris, balenis, scarabæis, oculi sublimis, vt qui duri & robusti futuri erant, reconditi prælongis ceruicibus insunt, quod illorum actio locum æditum postularet. Quæ causa etiâ fuit, ut qui hosti aut prædonum longè infectas incursums speculantur, muros aut turres altas, aut montes quosdam descendunt. Homini autem, ceterisq; animalibus ei similibus, roror oculis molles necessarii habitura, prælongis ceruicibus oculos imponere erat periculosius. Quum igitur neq; in imo constituti eos, è re ipsorum esset, natura inuenit quæ arte faceret ipsis particulam, quæ alia simul esset, & eos tueri fari possit: supra quidem supercilia constituens: infra verò quas malas appellamus, antennis inter nris præterea partibus nasum applicans: vt exterius, ossis processum, quod iugale appellamus. Iam verò sensoria omnia nervum postulat mollem: nervum quidem, quia in sensu est instrumentum: mollem autem, quia sensorium, vt sentiat, pari & affici debet: verum quod molle est, ad patendum: quod durum, ad agendum est aptius.

Proinde sensoria quæ motu voluntario aguntur, vt oculus ipse & lingua, duplex habuerunt nervorum genus, non vnum duntaxat molle, perinde ac aures & nares. Quod si quando alterum eorum laxum fuerit, ea facultas vitabitur quam laxus nervus præstabat. Videre namq; sepe est linguam, aliis quidem ad motu, aliis autè ad saporu dignotione, esse impeditam. Oriuntur autem nervi molles, ex molliibus cerebri partibus: duri aut, ex duris. Rursus illi quidè recti ad sensoria, hi verò per circuitu tendunt. Nervorū itaq; descendendum ad linguam, illi quidem ex inferioribus & anterioribus orti, statim insinuantur in ipsam: illi autè ex posterioribus, obliquisq; emergentes, circum collum prius obvolvuntur.

Cæterum molles quidem, in extremam linguæ su perficiem ad saporis diiudicandos, in musculos verò ad motum duri diffeminantur. Eadem porro ratio est & in oculorum nervis: duri quippe in ipsum musculos inferuntur. alij verò in primum & principalissimum visus instrumentum, humorem scilicet crystallinum. Quorum mollium nervorū nullus vitra sensoria progreditur: alioque facile rumpentur progressi. Ob hanc igitur causam sensoria omnia prope cerebrum esse oportebat. Quod quidem si verum est, constat vtrq; cerebrum propter oculos in capite collocatum esse: reliqua autem sensoria omnia, propter cerebrum. Similiter etiam de ore loquit, quod hoc quoque adiacere capiti erat necesse: aut potius in se continere linguâ, vt quæ ad iudicandos saporis, concinnandum sermonem, ac denique ad masticandos & transglutendos cibos, neuiquam alibi quam in ore commodius collocari potuisset. Est autem cerebrum substantia quidè nervis simillimum (quorum ipsum principium erat futurum) nisi quod illis est mollius. Nam id etiam illi expediebat, vt quod sensus quidem omnes recipit, omnesq; imaginationes, & intellectus cõplectitur. Quia verò nervorū oportebat duplicem esse materiâ, duplex enim cerebrum extitit, mollius quidè arterius, ad produciendos molles: posterius autem durius, quod variis

Animalibus capite destitutis quales oculi insunt.

Oculorū situm longè iustissimum.

Sensoria polita levi nervum mollem.

Sensoria dura sunt, partium.

Molliâ ad patendum aptiora.

Dura, ad agendum aptiora.

Sensoria, quæ voluntariè aguntur, duplex nervorum genus capiunt.

Nervorū molliâ, duriorumq; ortu atq; progressu.

Lingua nervi vnde oritur.

Oculorū nervi.

Crystallinum humorem, principalissimum visus instrumentum visus organum.

Cerebrum propter oculos in capite collocatur, propter cerebrum aut sensoria omnia sunt in capite reliqua.

Lingua vtriusq; cerebrum nervi esse simillimum, mollium tantum.

Cerebrum vtriusq; partium, mollium tantum, et intellectum et plicatur.

Cerebri pars anterior est mollior, mollior posterior durior, duri nervi saporis du.

Aristotelis opinio resistitur.

Cerebrum semper esse calidius aër.

Cranium fracto quid apud nos præcipue.

Cerebri refrigeratum in cranium fractum of si malorum vltimum.

Cerebrum facilius ab aëre refrigeratur.

Calor omnis sublimi ferretur.

Cerebrum cordis exiguâ similitudinem organum nervorum apophysis mittit.

Aurium nervi.

Naribus ducitur portiones cerebri.

Oculorū nervi.

Lingua nervi.

Cerebrum est nervorū, sensusq; & motus voluntarij principium.

Cor est arteriarum insinuat capitis organum.

50

60

parida

*Cerebri auro-
mata à pos-
teriorib. duriora,
intercalle-
ta dura meningi.
Occidentis me-
atus nervi va-
de evocantur.*

*Optis nervi si
h. cerebri ad ap-
part. duriores,
Optis nervi si
li, sensibilia
meatus forami-
tur.
Sensoria in ca-
pite quatuor.*

*Facultas sensi-
bilis quadri-
plex, productio-
ni à cerebro ad for-
saria forami-
na.*

*Nervi durior
ex foris pro-
f. minus, et
r. ad ea qua
crassius sunt
parvum, tactu
discrimenda.*

*Sensorium non
commutat à
quo v. sensibi-
li.
Simile simili
utitur ex sum-
lure.
Virus sensibile
quale.
Sensory ab or-
bitum, vi sunt
j. ex. ab ima-
ginatione, ra-
tionem, et me-
moria, debere
percept.
Virus quo mole
fiat.*

*Opticus nervi
oculum pro-
f. su.*

quales nominant, ad duriorum nervorum gene-
rationem. Quum autem mollis cum duro non
admodum conveniens futurus esset contractus,
dicte cerebri partes duplicata dura meningi,
que complexura erat totum cerebrum, dirimuntur,
& per meatum solum, qui sub capitis vertice est, &
corpora meatus ipsum amittunt, coniunguntur.
Ad hæc, ipsius anterioris cerebri, que partes
duram meningem contingunt, medius duriorum
sunt, quum ad parienti difficultate, tum ad pro-
ductionem durorum nervorum: quales sunt qui
oculos movent. nam à medio commodè molles
oriuntur. At ex ea parte cerebri posteriori, mol-
lis nervus penitus nullus producit. Igitur nervi
omnes consistentia cerebro sunt duriores, opti-
cis tantum exceptis, qui cerebello densiores quā
sunt, duriores eo non apparent, seu soli ex cere-
bri substantia veluti concreta, non tamen exicca-
ta, consistant. Qui soli enam sensibiles quosdam
poros in seipsis habere videntur. Quum igitur
in capite quatuor sint instrumenta sensoria, que
à cerebro sensus principium habent, est hæc ra-
tione similia apparet, inest tamē eis secundum
speciem dissimilitudo, nō modo in ipsis sentien-
dis facultatibus, verumetiam in corporibus, per
que facultates ipsæ feruntur. Quandoquidem
facultatum alia odorū, alia saporum, alia sonorum,
alia est colorū diiudicatrix. Viam autem,
ea quidem que fert ab utroque ventriculo ad na-
res, productio est perlonga, nihil ab ipsis ventri-
culis discrepans. Que verò ad oculos ducit, va-
riatam quodammodo & dividit, non tamen
plane certus est nervus. Que ad linguam descen-
dit, perfecte quidem est nervus, sed mollis. Que
denique ad aures, nec similiter quidem mollis,
nec tamen certē est durus. Quinta verò viam
facultatis à cerebro descendens, fortis simul ac
durus est nervus, ad motus quidē, & ad ea que
crassius sunt partium sensu tactus dignoscen-
da, optimè accommodatus: ad exquisitiorem
autem aliquam dignoscionem, cuiusmodi aliis
sensoriis inest, admodum ineptus atque im-
potens. Quandoquidem omnia lūc, ut sensus fiat,
immutentur omnino est necesse. Immutatur au-
tem non à quovis sensibili omne sensorium: sed
splendidum quidem ac luminosum, à coloribus;
aëreum, à sonis: vaporosum, ab odoribus: atque
(ut in summa dicam) simile simili est notum & fa-
miliare. Igitur nullum sensorium, præterquam
visus, à coloribus immutabitur. Solus enim vi-
sus sensorium habet lucidum, & purum, splen-
didumque, liumorem videlicet crystallinum. At nul-
lum præstaret visum ipsius sensorii alteratio, nisi
eum imaginatio, ratio, cuncta, & memoria (que
ad principium animæ pertinent facultatem) perci-
perent. Producit itaque cerebrum ad humorem
crystallinum quandam à se se portionem, ut af-
fectus eius humoris agnoscat: que productio so-
la merito meatui habuit sensibilem, ut per eum,
ad lucidum splendidiq. sensorium, maxima co-
pia spiritus à principio ipso transmitteretur. Cæ-
terum ea ipsa productio, vique ad viam quidem
que fert ad oculum, * mollis, rara, pura, & syn-
cera extenditur: ubi verò iam elapsura est cra-
nio, securitatis gratia, durior & compactior effi-

citur. Quum autem in cavitates que superciliis
subiunguntur incidit, amplificatur plurimum, prius-
namque naturam recipit, sic ut cerebrum esse vi-
deatur. Postea verò ad pupillam coalescit, eadē
ipsa propago que oculis inest: ad quam nimirū
propaginem cornea tunica (cui humor crystalli-
nus incumbit) tenuis, alba, & pura quum fit, faci-
le colorum externorum alterationem transmittit.
Quia verò etiam ad aures propaginē quan-
dam à cerebro erat necessum descendere, excep-
turam occursum sensibile (quod erat sonus
& vox, aut repercussio aëris) os durum ac den-
sum auribus oppositum, flexibus obliquis instat
labyrinthi natura ipsa pertudit, quo frigidi quidē
aëris vires integras, flexuum varietate, sensum
excoleret: aliorum autē corporum exiguorū
imperū propulsaret. Igitur propter parienti diffi-
cultatem ita constructi sunt auditorii meatus:
necnō uterque auditorio nervus, durior effectus
est, quā ut ipsi actioni cōveniat. Linguz autem
nervus, (cui quartū hoc sensorii dixerimus esse)
est mollior: & qualem esse oportebat: quia natu-
ra illi poterat oris tegumento ad maximā securi-
tate consulere. Auditorio verò, ad parienti diffi-
cultatē, potius quā ad sentiendi promptitu-
dinem, fuit comparatus. At solum sensorii olfactus
intra cranium consistit, nempe in ipsi ventri-
culi anterioribus cerebri, qui etiam vaporosum
quendam spiritū continent. Ad cuius quidē sen-
sibile transmittendum liberē, & conservandum,
oportebat repetire viam tantō rariorē atq. lano-
rem auditorio meatu, quanto sensibile huius, à
auditu, crassiorū erat partium. Ferē enim, quantū
aër partium tenuitate à luce relinquitur, tantū
vapor etiam ab aëre. Quum igitur cerebri ventri-
culi loco inferiori sint sitū, ex paribusq. sibi pro-
pinquis necessariū etiam excrementa affluentia
excipiant, ne melior quidem villa via excogita-
ri ea potuit, que ampla simul atq. declivis esset.
Ac talis quidem est narium meatus, per quem
intus foras excrementa excurrentur: foris au-
tem intro, penetrant sensibilia olfactu. Quam-
vis vitularum, altera ad vitam necessaria est,
altera ad commodiorem vitam. Sunt tamen & alii
canales duo, qui per palatum in os, totius ce-
rebri excrementa eructant: qui duo soli purgan-
do sufficiunt cerebro, quando animal omnino
recte habet. Quare propter odorum dignosco-
nem potissimum atq. hac adhuc antiquorem,
& necessariam ad vitam inspirationem in cere-
brum, facta sunt illa in nares foramina. Et ab-
vincti verò cerebri male affecti excrementa repur-
gant. Opposuit autem natura ipsi olfactu sensori-
o, os quoddam variè pertulū, veluti spon-
giarum quandam, simul ut ne aliud corpus durum
extrinsecus incidat, simul ne viribus inegregis aë-
ris frigidus inspirantibus nobis recta in cerebri ir-
rumpat ventriculos. Qua ratione etiam, que
sunt ante meningas ossa, *membræ* à cribri similitu-
dine dicta, spongiarum instar admodum durū
foraminula videntur, meatibus tortuosis distincta.
Quinetiam à dura meninx, que cerebrum con-
tegit, similiter perforata est. Cæterum non facile
per foramina illius expurgarentur pituitosa ex-
crementa cerebri, nec sine magnō negotio ipse

*Cornea tunica
quale.*

*Auditorii sensibi-
le sunt in ore.*

*Auditorii me-
atus talitas.*

*Lingua ner-
vum.*

*Olfactus sensi-
bilis solum in
ventriculo cerebri.*

*Olfactus sensi-
bilis esse cras-
siorum partium,
quoniam sensibile
auditus.*

*Narium me-
atus talitas.*

*Palati forami-
nem visus.*

*Inspiratio in
cerebrum esse ne-
cessariam ad
vitam.
Ossis calatery
visus.*

*Membræ
ram esse for-
minulatas.*

vapor ascenderet, qui est sensibile olfactus, nisi vtrunq; opus inspiratione simul & expiratione, cerebri natura proveneret. Quare illapso quidē inspirationis, quæ sit à cerebro, promouetur odororum dignotio: expirationis verd impetu, superfluorum excretio: nempe vehementia spiritus, vnā secum excrementa pertinacia trahente. At quæ in meatu nimis impacta sunt, ea efflatione expurgantur. Ipsa verd rursus odorū dignotio, non parum iuvat toram respiranone: non sinens vapores prauos, qui alioqui nos laterent, vni cum puro spiritu ingredit. Porro vnicum sæpe instrumentum multis actionibus sufficit: vt videlicet tenuis meninx, quæ secundæ perfissilis cerebrum stabilis ac tegit, vasque ipsius omnia colligat. Sed in omnes etiam cerebri partes hæc membrana se infinuat, torum ipsum contexens, extendensq; se vsq; ad ventriculorū capaciatem. Est tamen & tegumentū cerebri crassa meninx, aut ponus propugnaculum quoddam, 30 propulsandis oppressiōibus cranij oppositum. Tenuis autem meninx, naturale operimentum eius existit. Nam crassa certē ab ipso est senecta, exidentibus autem vasis coherens. Quod si tenuis illam meningem non interposuisset natura, cerebri cum crassa meningē vicinitas non vacaret dolore. Sola autem si fuisset illa, adhæsisset haud citra noxam cranio. Quā igitur id natura dicendum sit medium, quod eadem propomne ab extremis distat, neutra verō meninx ad 35 portionē à cranio & cerebro distet, mentū certē ne cerebrum aut eius operimentū quicquam afficeretur, prior quidem tenuis meninx, post ipsam autē, crassa locata est, quæ quantum offese mollior, tantō tenuis membrana est durior: quantō autem hac tenuis effe mollior, tantō tenui cerebrum mollius etiam existit. Duobus itaq; mediis & vinctulis natura ipsa tutō inter cranium & cerebrum necessitudinē conciliat. Quænam modum igitur cerebrum tenuis meninx, si illam crassa, atque hanc deniq; cranium ambit, & cōprehendit, eiꝯ per multa vincula annectitur: quæ quidem ab ipsa meningē, membranarū infar exorta, extenduntur singula versus partem cranij sibi ē directō correspondentē: inde per 40 futuras progressa, sibi mutuō occurrunt, coaptantur, & coalescunt, cōmunicansq; ex se ipsis omnibus pericranium procreant membranā, quæ cum cranio duram meningem conuectit. Iam verō duo anteriores ventriculi cerebri (qui 50 cerebrum spiritum animalem prius & cōficiunt, & præparant) inspirationem, & expirationem, ipsiq; efflationē efficiunt. Eos autem præstitit esse duos quā vnū, quod esset infernus canalis duplex, & sensorij omne, cerebrūq; ipsum sit gemitum. Primita tamen, maximēq; communis geminorum instrumentorum vtilitas est, vt si alterum eorum læsum fuerit, subseruiat reliquum. In Ionia siquidem vidimus quēdā adolefcentem vulnere in alterum anteriorū cerebri 55 ventriculorum accepit, fuisse superstitē: qui ne momentum quidem temporis perisset viuere, si vulnus vtrunq; simul violasset. Itaq; tutius est, in quibus licet, quod gemitum est, quæm quod simplex. At in vno animali duas facere spinas

non licuit, quare nec duas spinales medullas: ac proinde nec duplex esse cerebri posterior ventriculus poterat, quum ex ipso spinalis medulla oriamur. Sed quoniam nervi omnes qui sub capite in totum sparguntur corpus, aut ex posteriore cerebro, aut ex medulla spinali oriuntur, ventriculum hunc oportuit maximum esse, à ventriculisq; anterioribus per meatum insignē, animalem spiritum antea in illis elaboratum, excipere: per quem nimirum meatum, procedentem ab extremitate communi anteriorum ventriculorum, quem nonnulli quartum ventriculum vocant, cum cerebro, hoc est, anteriori cerebri parte (quæ postica maior est) parencephalis, hoc est, cerebellum cōmittitur. Pars autem cerebri quæ supra communem illam cauitatem est sita, veluti domus tectum, in spūæ superficiem cōcauam circūducta, haud ab re appellatur *capūq; & 60 saccūdendū*, quod testudinis aut formicæ instar sit fabrefacta. Quæ quidem partem omnem cerebri incumbentem, sine labore sustinet. Vndiq; enim sibi ipsi simillimum est, quod rotundum est, atq; orbiculare: ob idē omniū figurarum ad patiendum est difficillimum, omniumq; etiam est capacissimū, earum quæ æqualem dimētionem sortiuntur. Est autem commodum id minime contemnendū in organis vniuersis, quæ ad continendū substantias quasdam fuerunt comparata: id quod re ipsa constat, etiā in illo meatu, qui 65 à ventriculo, quem cameratum diximus, ducit ad parencephalidā. Omnes etenim meatus corporis, quæ admodum & vniuersi ventriculi, secundum ipsorum mediū, omnino sphaerici sunt, quod sic capaciores existant, ac difficilior etiam patiantur. Quum autem ventriculos qui materiales magis substantias recipiunt, expedit esse maiores: minores verō, qui materiis maiorum virium ac facultatis, hoc est, elaboratas magis & absolutas, continent: sicut ventriculos posterioris cerebri, minor merito fuit anterioribus. Iam cerebellum ipsum minime quidem ex magnis flexibus tenui meningē intercepit, vt cerebrum, sed ex multis quidem, & his admodum paruis, aliōq; modo strūctis, consistat. Quia verō nō in solis ventriculis, sed in toto cerebro corpore continetur multus animalis spiritus, existimandum est plurimum etiam in posteriori cerebro contineri, vt quod omniū qui in totum corpus distribuuntur neruorum principium futurū sit: mediāq; illa intervalla, quæ partes eius connectunt, spiritus esse vias. At intellectus sequitur non compositionis varietatem, sed corporis cogitantis, intelligentiæ, bonam temperiem. Negy enim bonitas ac perfectio intellectus multitudini spiritus animalis potius attribuenda videtur, quā qualitati. Ad principium autē illius meatus qui ventriculos anteriores cū cerebro cōiungit, appositū est glandulosum corpus, à figura conij *sacculūq; dictum*: quod quidem cerebri pars nō existens, diuisionē illius magnæ veng explet ac firmat, à qua omnes ferē anteriorū ventriculorum plexus *ypophyse* consistant. Extenditur præterea secundum totum meatū inter ambas eminentias cerebri, quas *yauis*, hoc est, paruas nates, appellant, epiphytis quædam vermi 70 similes,

Ventriculus cerebri posterior omnium maximus, ab anterioribus per insignem strūcturam, animalem spiritum recipit. Parencephala.

Kapūq; saccūdendū.

Figuram circuli latere offe diffinitionē ad patiendum capaxissimū.

Ventriculus cerebri posterior maior.

Animalem spiritum continet, non in ventriculo medio, sed totum in toto cerebro.

Intraditū tem periem sequitur.

Kapūq; saccūdendū.

Paruas, epiphytis vermi similes.

Odorum dignotio promouetur ab inspiratione ex rebus.

Excrementorum expulsiō à cerebro expulsiō in oia.

Odorum dignotio inuolat pluriimum totam in respirationem.

Instrumentum vnicum pluribus actionibus sufficit.

Meningis tenuis etiam vni.

Crassa meningis etiam vni.

Meningem tenuem inter cerebrum & crassam consistit: crassam, inter tenuem & crassam.

Medulla materiam quid sit.

Pericranium à crassa meningis oritur, crassa illam annectit.

Cerebri anteriores ventriculi respiratio nem, expirationem, et efflationem efficiunt, atq; efflationem efficiunt, atq; efflationem efficiunt.

Geminorum vtilitas.

Cerebri alter ventriculus vulnere, fuisse quendam formidat.

similis, ex particulis quamplurimis, cōnexis per membranas tenues, composita: quæ quidem cerebrum pars existens, altera parte sua, posteriori cerebri ventriculo annectitur. Inde autē paulatim ad aucta, ac secundū meatum porrecta, ipsum totum planē obstruit. Cæterū ubi contracta relescit, idq̃ transversis flexibus, meatum totum in tantum aperit, in quantum retroforus cessent. Etenim cum sic in seipsum cōdens rotundetur, quantum minuitur longitudo, tantum latitudo eius augetur. Quare constat ea sic paulo magis amplificata, in solas meatus partes, quæ ad basim sunt, strictissimas, nequaquam ingredi posse fines ipsius inferiores. Semper autem tantum de meatu aperitur, quantum de illius convexitate, in ipsum ingressu, minuitur. Quibus quidem motionibus hoc ipsum corpus transitu spirituum præest, dominiaturq̃. Alligatur autē eminentiis cerebri, ligamentis quibuscumq̃, à quibus vtrinq̃ conficta & coëcta, cōtinetur, ne diuagari possit: cuius quidem epiphyxis cōstructione, alia nulla melior potuit excogitari. Nullam siquidem invenias cōstructionis bonitatem ad actionis perfectionem, meliorem ea, quæ ad eō exquisita existit, ut si vel tantillum immutes, tota confestim vicietur.

GALENI PERGAMENI de vsu partium, lib. IX.

Quam autē succi eius quod ad partē cōfluit, hoc quidē, ceu vtile, assimilatur illi: hoc verō, tanquam alienū, omnino excerni conveniat: certē ad hanc excretionē natura meatus opportunos desiderat. Quos nisi nata fuerit, acervatum debet excrementum, primum quidem instar oneris grauat, deinde prohibet quo minus succi benigni illuc cōfluant, illorū vias preoccupans: quo fit ut membrū nutriti nō finat: sed quemadmodū animalia esurientia, lurrum, aut aliud quidvis simile vorant, ita partes accommodato sibi alimento carentes, cogantur aliquid vel ex ipsius prauis succis attrahere. Vnde postea in ipsīs collecta excrementa, putrescunt tandem, ac sic aciora simul & calidiora reddita, inflammationes, erysipelata, herpes, carbunculi, febres, innumerabilemq̃ aliorum morborū turbam excitant. Quare magnam semper curam natura adhibuit, ut excremeretur superflua. Quæ cum genere sint duplicia (alia enim vaporosa & fumosa, naturaliter ad sublimia feruntur: alia autem aquosa & limosa, motu suo deorsum decumbūt) vacuum dis quidem iis quæ ad superna volitant, meatus quosdam tenues in altrū duxit: declives autē & amplius eis subdidit, quæ suo pondere delabuntur ad inferiora. Cæterim declives cerebri meatus, tum per palatum in os, tum per corpus narium, sensibilis excrementa eructant. At vaporosæ excretiones, præ tenuitate sensum nostrum effugiunt. Porro in humidis quidem & mollibus corporis partibus, nulla est præscripta recta quædam tali excretioni via, quā humidum omnē ac molle corpus, cedere quidem expediet iis quæ impetu concitatore per ipsum feruntur: transmissis verō his, rursus coire

atq̃ coalescere soleat. At in duris corporibus, nisi via quædam prius parata sit, transire per eam nihil potest. Idcirco in crânio, quod cerebri cerebrale quædam existit, obspiciat ac sensiles vias natura vaporosis his fuliginosisq̃ excrementis aperuit: simul quidem ipsum tancinosum efficiens, simul & variis surtus coarticulatū. Alioqui nec potuisset caput ipsum purgari, quod quidem quæ a subiectis partibus omnia quæ sursum feruntur fuliginosa excrementa excipiat, largiori eget evacuatione. Ossium autem quæ ad præstantur ad futura generationem, vtrinq̃ eminentiam habet & cavitatem, non vna sene, sed sita alternantes, ut duarum seriarum sese invicem ingredientium instar, mutuo inter se coherescant, vitrosq̃ nimirum ossæ cavitatibus suis excipientes emittuntur aliterius. Quæ structura maximum ad securitatē & firmitudinē videtur habere momentum, præter id, quod etiam per futuras fit transpiratio. Non sunt autem foraminibus pertusa capitis ossa, sed intus cavernulas cōplures fortuitur, quod oportet vtrinq̃ eorum superficiem læuē & æqualem existere, ut vide licet aspredine sua, quam vtriq̃ forate obnubilant, colliderēt tum pericranium, tum ipsas meningis cerebri. Crassiora igitur fuliginosiorum excrementorū per sinistras solas vacuantur: nam tenuioribus, vel cranium ipsum est perviū. Nec verō ad transpiratum duntaxat, sed ad excidendo etiam vasa tenuia futuris ipsius natura est abvsa. Non est factum capitis os tenue sicut & densum, sicut neque densum & crassum, sed rarum, cauernosum, & crassum, quod hic neq̃ grauaturum esset, nec viam in cerebrum breuem, vulnerantibus se, daturum. Meatum porro qui ad palatum descendunt, alter quidē profectus ex fundo mediū ventriculi cerebri, fertur deorsum: reliquis verō emergit à meatu qui cerebrum cerebello connectit. Fertur autem obliquus deorsum, versus alterum. Quum verō primum simul in idem conuenerint, locus quidam cōmunit, constitutus à tenui meningē, vtroque excipit, cauus ac decliuus, vel uti quædam lacuna, cuius labrū superius absolutus est circulus. Inde magis ac magis arctatus descendens in subiectū adenē, manifestam cavitatem habentem, excrementa prætranscolantem, immittitur. Excipit autem hunc: os cribro simile ut palatum desinens. Quum igitur locorum omnium quæ in toto sunt corporis, re, longe tutissimum sit, qui circa adenem prædictum versatur, inter cerebrum & os palati conficiens, merito retiformis plexus, omnium quæ illic visuntur maxime admiranda particula, inibi collocatus est, complexus quidem in orbem & ipsum adenem, pertingens autem retrō longissimē. Tota siquidem cerebri basi propemodum hic plexus subicitur, ex maxima portione earum arteriarum quæ à corde sursum ad caput feruntur, contextus. Est autem non simplex rete, sed cuiusmodi vulgaria licet piscicorum reria, si plura alia cumulari superiuscitas. Reliqua porro arteriarum pars, quæ rectā ad caput ascendit, ubi cranium sunt prætergressa, medio inter hoc & cranium meningem loco, primum quidem diuiduntur in crebras, rariq̃ admodum

Vermiculare corpus trāsum
Quædam prægi.

Partes delin-
tas sensibili
alimento exple
re facit vitio-
fit.
Excrementa pu-
rescentia qua
mala inferant.

Excrementorū
duo genera.

Cerebri meatus
decliuus
vtriusq̃
Excretiones va-
porosæ sensum
effugere.
Corporum hu-
midiorum nata
via.

Cranio, large
meatus sensiles
per quos fuligi-
nosa excreman-
tor.

Sensu
qualia ossa de-
siderant.

Cerebri extra-
membra crassa-
ta, ut sinistras
expellat.

Cranium cras-
sum, rarum, &
cauernosum.

Cerebri me-
atus ad palatum
descendens.

Lacuna cere-
bri,
Aden subiectus
cerebri.

Os caloterium.
Locus omnium
tutissimus.

Retiformis plexus
vbi loca-
tus.

Retiformis plexus
ex plerumque
arteriarum con-
textus.

tenuer arterias : quarum alix in capitis anteriori, alix in posteriori, alix ad lœuam, alix ad dextram feruntur, inter semetipso cõplexæ. Postea verò ex ipsiis, veluti radicibus in truncum suum coalescentibus, coniugatio alia arteriarum enascitur, et quæ initio à corde sursum ferebatur, æqualis : eõq; modo iam per crassæ meningis foramina subit ad cerebrum. Etenim ybi natura vult ex ætate materiam conficere, diuturnâq; moram in conditionis instrumentis comparat : id quod licet

*Concoquendo
ex ætate homo-
ribus præcitat
natura moram
diuturnitatem
in vasa.
Vasculorum
testiculorum
fœtus.*

*Animalis spiri-
tus præparatur ex
vitali.
Anima ratio-
nalis habet fa-
ciem in cerebro.*

*Arterias effun-
dere animalium
spiratum in vi-
triculis cerebri.*

*Partium fœtu-
li inesse facili-
tatem propriam
materiam tra-
hendi.*

*Crassæ menin-
gæ vasa.*

*Labdoides fu-
tura.*

Torcular.

ibiq; relinquentes bonam portionē sanguinis, inde veluti ab arce quadam, omnibus subiectis partibus, quæ innumeratæ sunt, riuos numerosissi-
mos mittunt. Reliquū verò sanguinis, riuulus ex ipsius crassæ meningis confectus partibus, in regionem anteriorem dedunt, à quo quidem me-
dium accedente ventriculū, magnæ exoritur ventis, quæ in plexus tenuis meningis disseminan-
tur : cum quibus etis securitatis gratia ad den sem-
per glandulosus extenditur. Quod reliquū est,
recta secundum longitudinem, vt iunio cepe-
rat, prorsum longissime fertur, riuos produ-
cens venas, quæ in totum cerebrū dispersuntur. Atq; hinc quidem crassæ meningis portio, quæ
prædictum sanguinis riuum efficit, cerebri
in duas partes dissecit, aliam quoq; futurā na-
tura addidit, quæ à vertice ad frontem recta per
caput mediu fertur. Ipsius autem ad frontem
pertinens meningis, pars illa quæ meatui di-
surgenti antenus cerebrum à cerebello, necuā
epiphys vermiculari incumbit, cū sursum ad sep-
tā tendit propinqua corpora, impedit quo
minus ab eis productus meatus preuenatur. Pa-
ri modo & duplicatio illa quæ inest futuræ lab-
doidis, corpora posteriora in cumbentia ventri-
culo, sursum trahit. Nec minus tertia & coronalis
futura, quæ per medium anteriorum ventri-
culorum transversa fertur, ab omni compressione
subiectos ventriculos liberat, incumbentia cor-
pora in sublime reuellens. Igitur ex productio-
nibus cerebri, maxime quidē sunt quæ ad nares
pertinent : quarum parte vtraq; pon sunt oculorum,
iuxta quos sunt nervi, qui eorum musculi-
los mouent. At poris optici coeuntibus prius
quā ex crassā meninge exeat, ac separatim
rursus post eam, quæ parte quidem vniuer-
sus, quam arteriæ vtriq; tangunt. Ceterum
hugua duplex quā fit, quemadmodū & reliquæ
omnia sensiora, partemq; omnem dextrā sinistram
habeat æqualem (quæ ambæ tam molendi transi-
glutendiq; cibi, quā enā loquendi grana co-
luerunt) merito in vtrinq; eius partē, à postero-
ri basi ipsius cerebri, natus à propriū ueruum de-
duxit. Quum aut omnibus quocq; oris partibus
ab iisdē locis sensum gustatorii esset nichil tri-
buere, & ad has enā nervos illinc produxit, vicini-
tatis atq; situs ratione obseruata : quibus etiā
adiunxit comitem, ipsam tenuem meningem, vt
simul illos nutret ac tegeret. Vt verò crassā men-
inx has productiones admitteret, in modū si-
stulæ dilatauit ipsam visq; ad ossa anteriora, quæ
illuc perforauit, & cum vtriq; meninge, partem
quidem ipsorum neruorum in ipsam linguam,
partem in superiorem, partem in inferiorem ma-
xillam iniecit. Ante quorum distributionem, o-
biter quendam neruum vtriq; productum mus-
culo temporali inseruit, duriorem certē illis o-
mnibus, quod non ad gustum, sed destinatus ad
motum esset. Verum quod nervi maxillæ inferio-
ri, necnon & lingux infixi, decliues ducantur, e-
arum partū posito fecit. Qui autem in superiori
maxillam feruntur, eos natura versus anteriora
deducit, nō per oculorū foramina (sic enim of-
fendisset mollissimos opticos neruos, propter
quos totus factus est oculus, vt in quibus præ-
cipua

Sutura recta.

*Coronalis futu-
ra per medium
anteriorum ven-
triculorum tra-
hens fertur et si-
vera.*

*Cerebri ea pro-
ductio facit
maxima, quæ
ad nares perti-
nent.*

*Peluis iuxta oſ-
sificationem opti-
cum neruorum
conspiciunt.
Lingux dupli-
plex.*

*Lingua vtriq;
parti à postero-
ri basi ipsius ce-
rebrum nerui pos-
sunt.*

*Ori partes vni-
de nerui ad sa-
poris discernen-
da recipiant.*

*Temporales mu-
sculi quales mor-
tus fortissimus.*

*Maxilla supe-
rius natus,
quæ parte un-
am caritatem.
Oculus est fa-
ctus propter op-
tici nerui.*

capua

cupia pars conficitur) sed per aliud tertium prelonguin, nec vsque ad eò rotundum, quod iuxta magnum oculi canthion est, per quod nervi oculorum muscularis inferuntur, trahit. Plura namq; secusse foramina, firmitudinis osium non expediebat. Vbi igitur prædicti nervi ad oculorum cauitatem perveniunt, vterq; eorum ad nuncupatum malum fertur, perforatis rursus illic, quæ sub oculis sunt, osibus, transiitq; ei præbenibus, ne contingens musculos, aut offendar illos, aut ab eis collidatur: ac sic demum in regionem sibi è directo correspondentem dispergitur. Ergo si exortus illos, qui ad nares feruntur, non numeremus, cæci quibus nullæ nervorum productiones oriuntur, Prima coniugatio erit, mollium nervorum qui ad oculos tendunt. Secunda, eorum qui oculorū musculos movent. Tertia, de qua super differabamus, quæ illinc oritur, vbi pars cerebri anterior, cum posteriori connectitur. Quarta nervorū coniugatio, paulo posterior his est locata, magis quidem quàm priores à basi emergit. Propagines aut eius omnes sunt subipius propinquæ. Ac cōmiseretur quidem statim nervi tertie coniugationis, cum quibus fertur longissimè: postea tamen semingitibus, totiq; palam tunice inferitur. Exiguè porro admodum sunt lūi nervi, nervisq; tertie coniugationis paulo duriores: quia tunica quæ os vestit, durior est, non lingua modò, sed etiam aliis propemodum omnibus faciei partibus. Ob id etiā producuntur ex paulo duriori regione cerebri, quàm nervi tertie coniugationis. Quanto etiam magis retro progredimur, tanto seipso durius effectum cerebrū cernimus. Atq; etiam partes quæ ad basim ipsius pertinet, aliis duriores existant. Quinta ita mollium nervorū coniugatio, productiones eas connnet, quæ à lateribus capitis, versus ossa lapidea extenduntur. Earum autem vtræq; dividitur in ipso per ossa trāsita, in duas partes: quarum maior quidem in meatū auditorium inferitur: minor verò extra cranii in cæcum nuncupatum foramen, quod tamen cæcum non est, licet existimetur tale, ob suam flexuosam obliquitatem. Est & sexta alia nervorum coniugatio, à basi cerebri productorū, qui nondum etiam sunt duri: omnibus tamen prædictis tanto duriores sunt, quanto spinali medullæ propiores. Hæc enim durorum nervorum principium est, ob idq; cerebrò est multo durior: & quo magis deorsum progreditur, eo durior semper seipsa evadit. Descendunt autem hi nervi vsq; ad os lorum, quæ spinæ extremities est, in omnia fert intestine & viscera distribunt, quod nimirū ea, mollia quum sint, voluntariorūq; motu priuata, molles nervos desiderant, ne omnino sensus maneat expertia. Ventriculorū tamen præcipue tales erant ex vso, vt cui adesse exactissimum sensum deficientis cibi, & potōnis, maxum conveniebat. Quare horum nervorū pars maxima in ipsum distributa videtur, & potissimum in partes ori eius circumiacentes, quæ ob id sensu acutissimo præditæ sunt, atq; his qui vehementer esuriunt, contra hi & convelli sentiuntur. Ne autem nervi hi, molles quū sint, per longum iter deducti, periclitarentur atq; in discrimen veniret, membranis for-

tibus ipsos obduxit natura, corporibūq; propinquis connexit, quæ multa descenditibus illis occurrunt. Quæ connexo plerumq; illis etiam corporibus cōmodum adiecti non contemnendum: quemadmodū & septimæ coniugationis nervus, quos quidem comulatos illis qui à sexta coniugatione oriuntur, simulatq; capitis offe excesserūt, membranis foribus circumdedit natura, ad vnguēq; vnguēq; cōmuniunt, vtriusq; cōmune hoc cōmodum machinata. Quippe nervi coniuncti, copulatiq; quàm simplices, multo tutiores ab iniuriis exsūt. Postea verò quàm nervos septimæ coniugationis ab ipsis (vbi paululum erant vna cum illis progressi) seingere ad linguā erat necesse, rursus eos cū arteriis carotidibus iunxit, per totūq; cum illis collum traduxit, cōmuniibus colligatos membranis. Ac in thorace, quū arteriæ ad iustitum cordis ventriculū tenderent, rursus eos separavit, ac dextrū quidem in lævum, sinistrū autem in dextram ventriculi partem, vtrūq; obliquo ductu inferavit, id quod longè erat tunus, quū si recti descēdentes, postea in ventre diuisi fuissent. Porro illinc nervi septimæ coniugationis oriuntur, vbi & cerebrum desinit, & spinali medullæ est initium, progressi quadamtenus vna cum nervis sextæ coniugationis. Post autem ab ipsis feruntur, parte quadam sui, eadēq; minuta, rectos laryngis contextunt musculos: maiori verò, in totam linguam diffeminantur. * In vniuersum autem, ex vterius hi existit primi, qui exquisitè sunt duri. Nam prædictorum omnium nervorū, nullus similiter durus est, ac hi nervi. Iam verò in musculos oculorū, est prorsus minimos, magni tamen nervi inferuntur, quod consistentia q̄ hinc molliores, quàm motoris conveniat. Vtriusq; hinc musculo temporali, tres insiguntur nervi: duo quidem à terna coniugatione (de quibus loquuti sumus) tertius autem durior, de quo mox verba faciemus. Musculi quoq; genarūq; narium, ac labiorum, vt mole, sic etiam duritia, mediocres nervorum productiones recipiunt. Quum enim per ossa longius ferantur, ex viæ longitudine ipsi durities accedit. Nervus igitur qui linguam movent, neq; produci aliunde cōmodius potuissent, nec via vñ opportuniore, quàm qua nunc vtiuntur. Etenim sensifici nervi, simulatq; inferuntur, amplificati, tunica lingue externam contextunt, subiectos musculos ne attingentes quidem. * Hi autem motori, qui ad septimam coniugationē pertinent, tenues quidem, sed validi, atque in multas fibras solui, omnes lingue musculos texunt, idq; merito. Illis quippe sapores diiudicat, his autē lingua movetur: quas actiones duas nō poterat alteri genere nervorū præstare. Quum igitur quinta illa (quam memorauimus) nervorum copula, ex obliquis capitis partibus in ossa lapidea emergens, à duobus foraminibus inæqualibus duplex facta excipitur, eisdemq; grandior portio per foramen latius recta ad aures feratur: minor verò, in angustius, quod cæcum vocant, illo per foramen quoddam, quod quod iuxta aures est, penetret, vsq; omnia media inter huius nervi principium internam, arḡ finem ex terno, vixit iustit labyrinthi tot-

Septima coniugatio nervi, cum alio qui à sexta oriuntur, copulantur natura.

Arteriæ carotides.

Nervi in sexta coniugatione in ventriculo sinist. obliquo implantati.

Septima coniugatio nervi, quod extenditur, & in quas partes diffeminatur.

Septima copula nervi, iuxta primi excipit duri.

Temporali musculo vtriusq; tres nervi insigunt.

Lingua nervi sensifici.

Lingua motori nervi, qui à septima oriuntur coniugatione.

Prima copula mollium nervorum.
Secunda.
Tertia.
Quarta.

Orii tunica durior est omnib. fori lateris partibus.

Cerebri quæ partes duriores sint.
Quinta mollium nervorum copula.

Cæcum foramen.

Sexta mollium nervorum copula.

Spinali medulla si pergo duriorum nervorum.

Oculorum, spinæ extremities.
Sexta copula nervi mollium quæ partes diffeminatur.

Orii ventriculi partes, ac sensu acutissimo præditæ.

queatur, sanè per hunc labyrinthum, durum illud nervum produxit, qui maxima quidem sui parte latum buccarum apertum musculum: exigua verò, quæ reliqua est, nervus à tertia coniugatione, ad temporales musculos pertinentibus, opulatur. Ad cuius quidem generationem & deductionem, os illud lapideum fuit maximè & opportunum, & aptum. Duos porro mihi nervos concipias, vnum quidem omnium durissimum, alterum contrà mollissimū, ac deniq; tertium inter vtrumq; medium ad æquilibrium. Quis igitur inter medium hunc fuit & durissimum, omnes simul duos: reliquos verò alios, qui ab eodem medio sunt vsq; ad mollissimū, appelles molles.

Ac duos quidem ad motū esse optimè comparatos, ad sensum contrà ineptissimos, iudices. Rursum molibiles esse ad sensum aptitudinē exactiorem: sicuti imbecillitatem ad robur actionis. Nervorum igitur omnium duorum principii est spinalis medulla: durissimorum autem, eius finis inferior. Cerebrum verò est omnium nervorum mollium origo: vsq; mollissimorum, quod in medio anteriorum eius partem consistit. At substantiæ mediorum nervorum principium ea regio est, quæ cerebrū & spinalis medulla iunguntur. Cæterum mollium nervorum, alij quidem procedentes succedunt, ob idque motorem evadunt: alij verò perpetuò propulsioni naturæ tenent, ut qui ad ventriculū deferuntur, quos sensibiles semper manere oportebat. Rursum, nervorum autem tertiæ coniugationis, qui ad ossa quidem maxillæ inferioris & descendunt, magnosq; dentes * prætergrediuntur, & excicant, & duriores efficiunt, vsq; dentes caninos elapsi, in labiorū musculos disperguntur. Qui verò per oculorum cauitates ad malatum ossa pertinet, adeo etiam dum sunt redditi in transitu, ut eos musculos moveant, qui in superiori maxilla, & in narium alis consistunt. At gingivæ, dentisq; omnes, necnon tota cunctis facies, cum tunica narium interna, à tertia nervorum coniugatione recipiunt propagationes, & sed molæ quidem cōspicuas & magnas, per eam viam, quæ per genam deducitur: gingivæ autem & reliqui dentes, tenues & vix concipias. Ab his verò nervis, qui ex regione oculorum ad musculos temporales ascendunt, palpebræ, & quæ circa supercilia sunt omnia, & frons tota nervos recipit. A nervo autem qui ex cecis foraminibus excedens, temporalibus obscuram mittit distributionem, feruntur quædam propagationes ad glandulas & partes illas quæ iuxta aures sunt, atque adeo ad partes maxillarū tenues. Maxima tamē eius nervi pars maxillarū motum ad latera efficit per lorum musculum, de quo postea dicendum est. Ipsa verò cutis pilosa, sensus gratia duntaxat, propagationes paucas & tenues, instar araneæ filorum, ex omnibus subiectis recepit partibus. At cutis frontis, quod motus voluntarij sit particeps, cōiactaque cum subiecta illi musculosa natura, eodēq; cum illa motu moveatur, fibras nervorum conspicuas adeptæ est. Porro labiorū cunctis adeo coalescit cum muscularis, vñ nec musculum, nec eam vocare queas, quod ex vñq; consistat est: quæ constructio ad illorum exactam consuetudinem & deductionem

nem requirebatur. Iam verò per foramen illud quod cernitur in maiori oculi angulo, nervus haudquaquam exiguus ab oculorū cauitate emansus, in internam narium membranā, atq; in palatum etiam (cuius tunica à crassa meninge prolapsa, per foramina oris & narium orta quom sit, ori ac narium membranae est cōmunis) diffeminatur. Porro crassa meningis, tum futuris, tum forissimis ligamentis, cum superius cranij partibus atq; obliquis connectitur, ut minimè cerebrum comprimatur. Partibus verò anterioribus per exigua quædam ligamenta, atq; imbecilla coheret: vbi nullam membranam producit, quas partibus superioribus est pericranios tunica. Ad basim autem, vbi crassior est, paucas etiam illi & imbecillas ligamentis fuit opus, quum suo preputio deorsum semper feratur. Cæterum in eadem basi portionē quandam à se productam, rectissimum plexum substat, nec scilicet à subiectis ossibus comprimeretur. Consistat autē ex multis ossibus cranium, ut si quando contractum fuerit, rupturæ eius per totum non progrediantur. Verum cum caput veluti prolonga quædam sphaera sit, autē vna quidem iutura recta per medium ipsius à posterioribus ad anteriora est extensa: duæ autē transversæ hanc excipiunt: quarum posterior quidem labdoædes, anterior coronalis vocatur. Fitq; ex illis tribus futuris figura * æ litteræ similis. In acutis tamē & turbinatis capitibus, non omnes ex futuræ cernuntur. Sunt autem in vniuersum tres capitum acutorum figure. Prima est, vbi caput anteriorem simul & posteriorem eminentiam amisit. Dux verò alij figuræ sunt, quarū altera quidem in fronte, altera rursus in occipito nullam eminentiā habet. At futuræ capitis forandi & sphaerica, X græcæ litteræ sunt persimiles. Vbi caput in occipito nullum habet tumorem, perit labdoædes iutura, recta & coronalis manente, ex quibus consistat futura instar litteræ T. Similiter cum frontis eminentia perierit, dispungitur coronalis, relicta recta & labdoædes, quæ litteram I reverentiam constituunt. At verò quæ à media futura æquidistant, & ad vtrumq; aurem constitutæ, secundum capitis longitudinem deferuntur, rectæ squamosæ agglutinationes vocantur: quum non licet vñ in futuris ossa seic mutuò ingrediuntur, sed exte suata in subtiles quasdam squamas, ad maiore similitudinem earum partium, supra ossa descendit applicunt. Ossum autem in temporibus compositiones atq; structuræ, sicuti & quæ in superiori maxilla cernuntur, futuræ milu planæ esse videntur.

Capitulum plurimum recipit productionem quandam à crassa meningis. Cranium cor ex pluribus alijbus caulis. Anteriora cerebri. & 7

Capitulum acutum figuræ. Squamosæ ap- positiones.

Galeni Pergameni de vñ partium, lib. X.

Quod autem in parte corporis anteriore, in quam movemur, præstint oculos collocari, eosq; geminos esse, nemini obscurum existimo. Cæterum non insunt oculi posterioribus etiam capitis partibus, quia ab illis ori-ri nervi molles non poterant, quales in vtrumq; mittuntur oculū: ad quos quidem dum per ossa contenti dunt, densantur & compinguntur. Vbi verò

Lapidum est. Nervorum mollior et durior, ut dicitur, ad sensum esse aptissimi cum parati.

Nervos duos. ad motum mollior et durior, ut dicitur, ad sensum esse aptissimi cum parati.

Cerebrum est. Nervorum omnium medium origo.

Labium nervi. nervi.

Dentes omnes à tertia nervorum coniugatione recipiunt propagationes.

Gingivæ.

Latus musculi.

Frontis cutis.

Crassam meningem esse co- mune esse cranio.

Capitulum plurimum recipit productionem quandam à crassa meningis. Cranium cor ex pluribus alijbus caulis.

Anteriora cerebri. & 7

Capitulum acutum figuræ.

Squamosæ ap- positiones.

Opticorum nervorum propositum.

Vitreous humor
Crystalline
humor prout
videtur crys-
tallum.

Insuper quoniam
 gus inter cry-
 stallinum et
 cornu.
 Crystallinum
 humorem nu-
 trit a vasis.
 Crystallinum
 quatuor.
 Vasis quatuor.

Production of
cerebral anoxia, v/min ,

Produção ab-
randa curiosa
em aquarela.

Optimum
non crystalli-
num.

Produktionen
optici nervi, a
se variis na-
turali affectibus
crystallini ho-
moris, ad cen-
trum

Compositio
ad magnum
civilem effe
latisfiamam,
incunam, que
cum fortiss
corpora fiont.
Cryllallum
videtur in
trois, vulva
spira (simi)
ita in aqua.
Circulus cum
pau. humore
acule.

Verò ad illos pervenerint, amplificati deinde, in orbemque humoris vitreum complexi, fesein crystallinum humorem miserunt, qui existit primum videndi organum: id quod plane sufficiens ostendunt, quæ inter humorem crystallinum & corneam intercentes, impediunt visum, quoad depressantur. Humor autem crystallinus, qui albus est atque splendens (hac enim sola ratione, à coloribus immutatur) ab humore vitreo nutritur, qui quanto crassior & candidior est sanguine, tanto à crystallino humore relinquatur humiditate & albedine. Hic enim albus est planissime, medicoribus durus: vitreus verò, humidus quidem est, imitatur viui cuiusdam fusi: albus autem, albedine quadam adulterata. Quum igitur in utroque horum humorum sit vita, verissime est viuumque per transimptionem nutriti: crystallinum quidem à vitreo, vitreum autem ab amplificata illi retiformique productione, quæ ipsum ambiens, diuis vias præstat: primum, ut crystallini alterationem perentiat: secundum, ut plurimum arterius & venis (quas ducit porio tenax meningis) referta, vitreo humoris alimentum ad ferat. Ipsa autem productio choroidis tunice, non solum corporis illius renforme alit, sed quibuscumque filamentis retibus à se productis eam tenet & colligat. Cæterum vbi primum neruus in oculum ipsum inferitur, natura ab eo vitæque productiones membranas ad ducens (quod nunciam in aliis neruis molita est) eque crassas ac duras efficiens, duram quidē meningē omibus alligat, vitæ choroidem autem solum duagani permittit. Quæ quidem tunc destituta suis vasis, ac paulo post à supernis omnibus locis, quæ plurimam vasorum immisionem recipiens, reuertitur tandem, immensam quandā vasorum tenuitatem, sibi ipsi propinquior, copiam, veluti ex foro adirent: cum quibus omnibus rursus in superiorem productionem inferitur. Vbi autem productio ipsius nerui in humorem crystallinum se inferat (cuius nimirum grata descenderat) nequaquam amplius prægreditur: quandoquod illæ hæcæ, affectus illius verax crebro esse nuncius possit. Verumenimverò quum ipsa insertio medium crystallinum humorem (qui sphericus est) vndique facta sit, necessariū maximum in crystallino circulus describetur, illi in duas partes diuidens. Omnis siquidē quæ rotundis corpori bus connectatur, ad maximum in ipsi circulo conexio est tutissima. Ad hunc igitur circulum contentanentem erat humoris vitreum motu vltiore inhibere. Quocirca medium * in ipso vehitur crystallinus humor, quasi semisecta quæ piam sphaera in aqua: Ad altera est interna parte ipsius crystallini humoris, quæ illius veluti hemisphaerium existit, firmatur grana * humores ipsos circulus vnus maximus omnium coniunxit: quæ quidem vtrique terminus existens communis, ligamentum his ipsis efficitur, & præterea corpori renformi, & quarto ipsi choroidi tunice: quæ etiam vtriusque afflicterat, & crassæ meningis tunica, vt in cerebro, ita hic quoque circumvehitur. Nam quæ hæc ab ea in aliis omnibus paribus, præterquam in vasorum productionibus, distet, cum illa tamen in hoc memorato circulo

tingitur. Quæ quidē quinta coniunctio, præter illas quatuor in vno loco prædictas, subiecta pars inter, tegit, & roborat. Dura igitur membra tunc choroidi est applicita: hæc verò reformatur, et formis deniq; vitreo & crystallino humoribus: illi quidem, per totum ipsum: huic autem per solam iridem. Itaque per corpora media humor vitreus illi tunice omnium extrinsecus, durissimè est vnitus. Propt̃ ad illum eundem circulu extrinsecus alia quædam tunica accedit, quæ se in duram illam membram infundit, & itam infertioni facit, *duro de parte* (hoc est, dissonis neruæ) musculari oculos mouentium, existens. Septima autē præter hæc omnia est alia, scilicet per totu inferio, quæ totum sanè oculum cum omnibus colligat, simulq; mouentes ipsum musculos operit. Ac certitur quæ membrana hæc, candida: definit verò in circulum cum alia omnes subiecta tunice, vbi albū nigro coniungitur: qui locus tum iris, tum cornea appellatur. Quod si hæc dissecueris probe, circulos vnde bis hic sepi, sibi ipsi delineat nuntio insidentes, crassius tamen & colore discrepantes: vt ne si velis quidem, locum hunc aliter quā irem appellare queas. Ac primum quidem circulu crystallini mediū crystallini, vitreus humor facit. Secundum, relictis in membrana. Tertiū, choroides tunica. Quartus circulus est, qui illa simul comprehendit & colligat. Quintum ad irē tunica optæ ex crassa meningē. Sextū, quam diximus aponeurosim esse. Septimū deniq; circulum circumferens tunica quæ à perisio deducitur. Iā verò ipsam meningem duonem, quæ choroidem (vbi) complectitur, ad anteriorem crystallini humoris regionem ipsa natura producit, partem eius maximè mediam, longè tenuissimā ac densissimam fecit, coribus extenuatis persimilem: vnde ex ceratoeides, hoc est, corniformis vocatur, existens instrumentū visioni fortissimū propugnaculum. Tenuis igitur, dura, & densa ciliis est facta huiusmodi ceratoeides tunica, propt̃us vique erat futura splendida, ad splendoremq; transmittendū opportunitatim, perinde vt cornua ad amissum polia & derasa. Quosummo arribum nature, vt cunctis admirabilicer, se imitari nemini. Quanquam multo facilius est inuenire aliquid, quod animo aduersum non fuerit, in his quæ facta iam sunt, casualit̃, quoniam inculpat omnia à principio confluere. Quæ verò periculum erat, ne ipsa tunica cornea laboraret alimētū penuria, aut duritie sua humorē crystallini collideret: aut deniq; immixtus oculis su perne visioni facultatē (cuius substantia est splendida) suo splendore deficeret, his incommo dis omnibus natura perfidio vnico occurrunt, quod declarabimus postea. Quod autem vehementer splendore oculi nostri offendit, quod cernit iū quidē milites Xenophontis, qui per multā noctem ire facientes, vchementer legi oculi fieri. Experti sunt etiam illi miseri, qui ex obscurissimo carcere in splendidissimum domum; calcēq; illam, & leuigam, à Dionysio tyranno repente ducti subito occubantur, minime repentinum illum occursum splendore laedi ferentes. Quare merito nos pictores, quoniam

Oculi humani-
bus quæ præda
Etiæ in cunctis
hæret.

Andrépore
mufinletu mo
acutū oculū.
Periagfir mjer
diz.

Inis. *ad arim*
auli, iustitiam,
quam fratres
ordinem. C' à
qu. huc attine-
re.

Ceratoides,
Immaculata gorg
à troffa me-
diante frangit
reduta.

40% (March 1978)

100%

Natura artificem admittit
 Pl. nonnullas
 sufficiens.

—ad. int.

Oratio offendit
tut a volentes
tu sperare.
Xenophontis
miles.
Dionysius tyran-
nus melonius

*Refractio
in corneis colo-
ribus recreat
atq; refractio vi-
sionis.*

*Ophthalmia
laborantem
finitur lux &
consequitur.*

*Altra videtur
nobis per defi-
nitur filia in-
finita: quia etiam
certum est ex
profundissimo
pauca.*

*Flammula sub
ardore sole mar-
asit, extinguitur
tunc, prope in a-
erem flammula.*

*Choroidis tuni-
ca oritur & co-
loris.*

*Choroidis tuni-
ca v. s. m.*

*Palpebras cor-
claudantur, vi-
bi splendor non
ignis.*

*Ragides tu-
nica.*

*Choroidis tuni-
ca foramen.*

*Splendor o-
culi interiorum
exteriorum in-
finita.*

*Allogenis ho-
mari v. s. m.*

*Diffusum per-
gendum ra-
dio.*

*Oculi tunc clau-
si, amplius
altrius pupil-
lam.
Mortuus anima
in cor suu laza
pupilla.*

pungunt in corâ albis, à quibus visus offendi-
tur, colores fuscus ac cutuleos opponunt, in
quos subinde intrantes, recreant atq; reficiunt
oculos. Similiter ophthalmia laborantes offendi-
dit lux & redarguit: qui tamé fusca & cutulea
sine dolore intrant. Percipere enim clara nos
à longinquo cupientes, ad supercilia manus ob-
tendimus. Quare in magnis solis defectibus stel-
la nobis apparet, quas cernimus etiam ex pro-
fundissimis puteis, potissimum quando non est
sol in meridie. Quod si solem ipsum explicatis
oculis intueri velis, illos celeriter perdes: quem-
admodum contingit multas, qui post eclipsim so-
lis, fixis oculis ipsum quâ intuerentur, nosse aste-
rium eius cupientes, profusum sunt occaecati. Ete-
nim si flammulam quandam eugnam in sole lu-
culento constitutas, marcescet: imò extinguitur
etiam, si eam prope aliam maiorem flammam lo-
caueris: quum minor lux à maiori vincatur sem-
per, ac dissipetur. Ne igitur crystallini & vitrei
humoris splendor, à splendore cornex dâscute-
retur, natura ipsam choroidem tunicam, à reuul-
meninge ortam, ex inde vni cum cornea pro-
mouetur, multis partibus illam tum nigrâ, tum
fulcam, tum coruleam, extrinsecus autem den-
sam efficit, quâ videlicet res prædictas visus præ-
stat: nimirum corneam sibi vicinam alens, eam
deinque ne humori crystallino incideret, proli-
bens: ac visui deniq; affectu speculaculum meda-
camentosum exiens. Quæ causa est, ut omnes
natura duce, quum lucis splendore offendimur,
palpebras repente claudamus, properantes ad
naturale remedium. Carterum humida & mollis
insitit spongia: quum sit, qua parte humorê crys-
tallinu cõtingit, ipsa choroides tunica impedi-
mento est quo minus apertitas & reniformis mem-
branz, aliqua ex parte illi noceat. His omnibus
admirabilior est tunice huius cutuleæ (quâ ra-
goidem etiâ, hoc est, visumfere appellat, idq; acio-
no vix leuatur aut externam, & apertitat in-
ternam, haud perperam comparantes) pupillam
versus, foramen. Ea siquidem in centro suo est
perfora: & quâ hoc duntaxat foramen consistit,
nulla tunica alia est inter corneâ & crystallinum
media: sed vel ut pertineat admodum & candi-
dum cornu, splendor internus cum externo cõ-
municat, commisceturq;. Ut autem quâ foramē,
hoc est, cornea tunica nequiquam humorem crys-
tallinum coningeret, portionem ipsius natura
longius foras abduxit: simul autem hamorem
quendam sinceram & reuul (cuiusmodi inest
ouis) crystallino ipso obduxit: spiritusq; æreo &
splendido, omnem pupillæ locum oppleuit. Id
quod ex suffusorum compunctionibus discis.
Nam quum suffusiones omnes loco inter cor-
neam & crystallinu medio consistant, instrumen-
tum quod deducendum eam per externum angu-
lum oculi immittitur, in orbem & quoquoque
circumaculum, neutrum illorum corporum
tangit, tanquâ magna à se in vicem distent inter-
capedine. Porro si alteri oculorū clausurimus,
alteri aperientes, amplificat & dilatatam, ac ve-
luti inâ à pupillâ cernimus, in mortuo illuc maior
copiâ spiritus cõluit. At in mortuo animalis, vel
si humor tenuis evacuatus sit, laxa tamen

pupilla videtur, quod nimirum spiritus quidē ipse
leuior & tenuior existens, facili ante anarorem
evacuatur: humor autem adhuc remaneat, sensi-
bilem evacuationem postulare. Is præterea
qui maxime sunt ætate proventus, ob spiritus su-
perne à siliens inopiam, adeo cornea tunica
corrugatur, ut aliq; quidem prius nihil, aliq; ve-
rò malè, ac vix adhuc videant. Affectus autē qui
pupillæ appellatur, quip aliter oculorum in plu-
rimum accidit, solus est imminuta pupillæ, nihil
cornea prius afficta. Spiritus igitur ipse, lu-
cidus omnino quâ sit, ad oculorum etiam actio-
nem confert: humor verò, præter dictum à no-
bis visum, huc etiam præstat, ne crystallinus hu-
mor ac portio vix interna exocoretur. Siquidem
crystallini excussio præter morbum inducit,
à quo cecitas vel maxime oritur. Propria ipsius
crystallini humoris tunica, & quæ partem illius
anteriorē in vultu, araneis tenuibus est subtilior
& alior: in qua quidem ipsius pupillæ imago,
veluti in speculo quodam conspicitur: quan-
doquidem leuis est lux tunica & fulgens, supra
omnia specula. Quod verò naturalis huc crystal-
lini operimento est proximum, venosum, mol-
le, nigrum, atq; pertuense est. Venosum quidem,
quò comitè abvnde nutrit. Molle autē, ne con-
tactu suo humorem crystallinum affligeret. Nu-
trum, ut splendorem colligeret, atq; ad pupillam
transmiseret. Pertuense deniq; ut quem transmi-
sit splendorem, foras emittat. Quod autem omni-
um est extremum operimentum ac propaga-
culum, tenue, album, ac durum est, quasi cornu.
Tenuē quidem & album, ut splendoris prom-
ptè transmittat: durum, ut turo conferret. Porro
crystallinus humor nō fuit factus omnino spha-
ricus, ut & circulos coalescentes in inde facie
admitteret, & per violentas plagas aut moras,
minimè exturbaretur à vitreo. Cõnexiones quip-
pe ac sedes in absolutè rotunda, sunt fallacio-
res, quæ in planioribus. Quia verò cornea tu-
nica maxime exposita erat viuius extrinsecus,
ob id illam natura, quamvis ex se robustissimâ,
palpebris, cilis, circumiacentibus ossibus, atq;
etiam cute munivit. At cilis quidē, quasi vallum
quoddâ pilorum propulsandâ exigua corpori-
bus, ne facili oculis apertis incidere, primo lo-
co constituit. Palpebras verò ipsas, tanquam scu-
ta quædâ, ut simul cõrret atq; cõplicarentur, ocu-
lumq; clauderēt, si quid forte maioriū corporum
in ipsum illabere, apposuit. Porro ad versus
maiori ad hoc molu incurfus, superne quidem
supercilia locavit, inferne autē malæ: ad maio-
rem angulum, nasalis: ad minorem deniq;, pro-
ductionē osis iugalis. A quibus omnibus oculi
in medio comprehenditur, atq; illis flexu seruat-
ur, cuius motu ad panendi difficultatē non me-
diocriter conferente. Quum igitur ex dura qui-
dem omnino substantia, sed quæ moveri facile, &
cum cornea versari sine eius noxa posset, palpe-
bras fieri esset consonū, atq; etiam conuerti o-
fisi bus: membranz quam *myrius* vocant, à superio-
riori labii natura abducens, in longitudinemq;
tantam producens, in quantâ palpebræ exten-
di oportebat, rursus eam per partes palpebrarū
infernas, internasve reducit, illamque non ad
principium

Phylis oculi.

Spiritus oculi.

*Flammula,
Arachnoidea
tunica.*

*Choroidis tuni-
ca natura &
v. s. m.*

*Cornea tunica
v. s. m.*

*Crystallinus
humor cor non
sit factus omni-
ne sphaericus.*

*Conuerti-
tus in respectu
rotundi est fal-
laciore quum
in planioribus.*

Ciliorum v. s. m.

*Palpebrarum
v. s. m.*

*Superciliorum
v. s. m.*

*Nasalis.
Os iugalis.*

*Palpebrarum
confusio.*

Myrius.

principium vnde emerit, sed ad subiectos. At principio musculos, qui vique oculos mouent, applicuit: indeq; ad iridem vique prodixit, vbi ipsi in cornem tunicam inseruauit. Spiritum vero inter duas portiones periosij corporis medium, viscosa atque vinctuosa occupauit, cum membrana quibusdam a musculis ipsis extensis: quo loco quas vocant *idariolas* gigni continet. Ad portione autem huius constructionis, palpebræ inferiores constant, a malarum periosio,

Tavida

50

Tajper

Cilium pro-

ductio et ruf.

Oculi cerne-

re quæ pa-

pilla a direct-

apposita sunt.

Ab idq; talis-

les off.

Oculi quæ ge-

nerunt.

Oculorum ve-

luntarij motus

sunt quatuor:

tandem, illi

profecti, mox

in-

la.

Oculorum ma-

culi obliqui.

Oculi mas-

culi magni.

Palpebræ in-

feriores hant-

quæquam mo-

uerunt.

Palpebrarum

superioris mu-

sculi.

Palpebræ in-

feriores hant-

quæquam mo-

uerunt.

Palpebrarum

superioris mu-

sculi.

Palpebræ in-

feriores hant-

quæquam mo-

uerunt.

Palpebrarum

superioris mu-

sculi.

Palpebræ in-

feriores hant-

quæquam mo-

uerunt.

nozem extensus angulum, ad reliquam tarsi par-tem dimidiatam sibi propinquè prorumpit. Dum igitur prior musculus agit, quum caput eius ad maiorem angulum trahit, partem palpebræ sibi continuam deorsum trahit. Dum vero alter, reliquæ sursum attollit: ut cuius caput ad percer-tilium spectet. Trahunt enim musculi versus proprium principij. Quod si vterq; eodem tempo-re tendant, oculus non magis erit spertus, quam clausus: quæ eversionem palpebrarum in morbo, Hippocrates *hanc* nominat: illam dicere esse signum perniciosissimum infirmitatem affectum in v-terq; musculorum convulso: partemq; tarsi con-tinuat ad seipsum trahente. Ceterum si alter qui-dam musculus agit, altero profusus cessante, aperi-ri & claudi totam contrahit palpebram, quum pars altera tarsi, quæ mouetur, semper vna se-cum trahit & reliquam. Omnis causa est duritie quum illi deditur natura, dedit ipsam & eamtag-lic huius efficiens, in omniq; vtriusq; musculi fi-nem interest. At palpebra inferior minor & pro-prior est constructa: nam si minor fuisset, compleretur, atq; in seipsum recideret, plurimiq; ex-crementa colligeret. Non indiget autem motu, quia pusilla & exigua est. Porro ad vtrumq; for-mam, quod iuxta magnam angulum est: per quod oculorum excrementa expurgantur in nares aia-ra carunculam quandam veluti obperimentum apposuit, cuius beneficiò contingit, ut excrementa ad oculorum minimè quidem vacuentur per angulor, ad proprios autem impellantur meatus. Confluunt siquidem per foramina illa, in ipsum os atq; in nates ab oculis excrementa. Vnde me-dicamentum ocularia, non multo post inuentionem, abj quidem experiant, alij vero emunxerunt. Quam ob rem qui carunculam illam ne-cessariam, quæ iuxta vtrumq; angulum est, pharmacia scribis colligauerunt, aut exciderunt, ij chi-urgi effluxum excrementi ea parte aperuerunt quem alicuius vocamus *psidam*. Sunt in palpe-bis paulo extra maiore angulum, tenuis quæ-dam alia foramina, pertinet vna vique ad nasum: quæ quidem tenuem humorem dant vicissim accipiente, ad symmetriam naturalem seruan-dam, quæ motuum præstat agilitatem: ad quem similiter perficiendam; glandule etiam duæ in vtroq; existerunt oculo, altera inferius, altera su-perius partibus hærens: quæ meatibus non ob-scuris, humidâ in mlos effundit, perinde vt glan-duæ, quæ lingue radicem adhaerent, salivam in os deriuant. Humectant etiam eos gratia, pinguis-simo est oculis circumfusa. Im ipsi iterum sensibili (quibus solis via spiritus conspicua ac sensibili les insunt) ex duabus quæ locis cerebri pro-ficiuntur: progressi verò (esse enim in diu-nissimè quid instrumentis iniquis, impius aut in condiorum ipsius, si hæc prædictis non adde-rem) sibi mutuo cohererent: ac postea rursus a se-inuicem digrediantur, & in inter X separantur, idè minime cōmunt, aut intersecti a se in-vicem, sed coherentes primo, ac post vtrique ad regionem propriam diducti; sic; vt ob aliud ni-hil cōuenisse videtur, quàm vt meatus suos cōi-ungerent. Vt autè modis quo sic visio percipitur, intelligio circulum ab vno tantum oculorum cer-

Palpebrarum motus.

Musculi semper trahunt versus proprium prin-cipium.

Causa quæ pa-lla est.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Palpebra in-ferior minor, ma-iusque per-

Oculus expur-gantur quæ per se excremuntur in nates.

Circulus quid.

ni. Est enim circulus figura quæ à medio vndiq;
distat æqualiter. Ab eius autem puncto medio
(quod centrum dicitur) vsq; ad pupillam viden-
tem id, rectam duā lineam existima, quemad-
modum plures alias & similes duci à pupilla ad
ipsam circumferentiā. At figura quæ ab his om-
nibus rectis lineis circuli circilicribitur, eorum
nomina: cuius verticē pupillā basim esse circuli
verte. Lineam verō rectam quæ à pupilla ad cen-
trum circuli extensa est, totius figuræ axem ap-
pella. Dum autem intelligis convexum & con-
cauum, intelligis etiam amborum medium, vi-
delicet hanc æ planam, cui nihil nec cauitatis,
nec convexitatis inest: cuius superius pars, plana
superficies existit. Quemadmodum igitur si ex
axe ipsius coni, qui à pupilla ad centrum circuli
per ætrem protenditur, nihil grātū aliquid pen-
deat, conspectū centris pupillæ erit, cuius quo-
vis corpus, quod in medio visus & res, videndi
posse fuerit, plurimum est, quo minus id quod
ante oculos est, amplius ceruatur. Quandoqui-
dem vt aliquid conspicitur, opus est id cæcat
omni caligine, nullūq; inter se & pupillam ha-
beat impedimētū. Si quidem per rectas lineas sit
visio: quæ haud dubie ipsius solis radii exciden-
tibus per angustum foramen, prorsūq; semper
rectā & citra flexionē tendentibus, asinulatus.
Sciendum autem est, vnumquodq; corporū quē
videtur, nec videri solū nec nudū, sed quippe ip-
sum ipsum etiā omnino cerni: quum visio-
nes quæ corpus id complectuntur, accedant in-
terdum illi, quæ vltra corpus videntem sunt. Sci-
cundō etiam discere, corpus quod à solo dextro
oculo, cernitur, id si propius sit, in oculis magis
partibus esse putari: sin longius abest, magis
quodammodo in dextris. Quod verō à sinistro so-
lo conspicitur, in dextris sinum videtur esse, si id
est propinquius: magis autē in sinistris, si est re-
motius. Quod autem ab utroq; in medio. Ter-
tium præter hæc tibi discendum venit, alterius
oculorū pupilla compressa, sursumve aut deorsū
adducta, apparere duplicia, quæ autem sim-
plicia apparebant. Cæterum si deorsum quidem
fuerit pupilla detracta, humilior id apparebit,
quod intuebere: contrariū autē, si sursum subla-
ta fuerit. At dum pupillā ad maiore aut minore
cathentum adducimus, facimus vt quod cernitur,
sinistrum magis, aut dextrum appareat, nō tamē
duplex. Est autē necesse axes conorū visoriorum
in vno eodēque plano positionem habere, ne
quod est vnum, duplex appareat. Verum præd-
icta axiomata tamen si ratiōnibus philosophicis,
mathematicisq; facillimē comprobantur possint,
quia tamen experientia ea omnia constant, bre-
uitatis gratiā ab illorū accurata demonstratione
superfidebo. Tam verō quod pori illi optici intra
cranium quidem iungantur, atq; in vnum con-
spicunt, postea autem diuancunt, vtilitates duæ
in causis existunt: quarum prima ac maxima
necessaria est, ne quo dextra intuemur, appareat
duplex. Secunda, vt si quando alter oculorū sit
claudus, aut omnino mutus, in alterum, per il-
lum porum communem, vniuersus spiritus con-
fluat. Quippe facultate visoria duplicata eo mo-
do, longe acutior futurus est visus, quum igitur

neque videntur, secundū rectas lineas videan-
tur: ante humorem autem crystallinum, foras
men vix sit sursum, per quod cum ius obiectū
erachabaturus commercium: peripicuū certū
iam est, quod figura exacte sordida, paucioribus
sui partibus, plana autē pluribus, cum ius obie-
ctus communiabit. Quocirca diuinus ille archi-
tectus, rotundū ipsum sed paulo oblongius, cry-
stallini corpus coniecit, vt maior ab ipsis vni-
us esset, ac simul pluribus sui partibus a spēs
terum videndarum exspectaretur. *Temporales
musculi gratia
inferioris max-
illæ sunt con-
diti.*

GALENI PERGAMENI
de vsu partium, lib. XL. *Temporales
musculi gratia
inferioris max-
illæ sunt con-
diti.*

Porro musculi temporales, quum gratis in-
ferioris maxillæ à natura sint contriti, si-
cundum magnitudinem eorum, atq; in mor-
dendo robur, ius in magnitudinē atq; structurā
contrahunt: veritū in animalibus quidē vsq;
ferratis dentes formentur, maximū simul & for-
tissimi habentur: quandoquidē non solum mag-
nū, sed validum etiam maxillam obtinent. Ma-
xime autem, sed nec nervosius, in agēdo præpo-
rantes, in ætibus debiles, & subiles, ac breuiter in
iis omnibus, quibus magna quidem inferior
maxilla inserta, minime tamen robusta ad mor-
dendam. Homini verō, cæte genas plurimū habent-
iv, dentesq; ad solum erant idoneos: non enim
in morsu, hominis fortitudo consistit, nec denti-
bus dominatur: est animata cætera, sed ratiō-
ne & manibus musculi temporales, haud im-
tria, debiles simul & minimi existit: numerum
ipsa natura non modo inueniente que oportet,
sed ea etiā cuius pro dignitate tribuente: id quod
dixit, iustitiam est propriā. Lynceus etiā, sicuti &
cebus, & similes, similiter habent musculos tempo-
rales: eadem simul & imbecillius. Est autem summa
homini quæ similitudina plurimūq; vultu imitatio-
quandam ridicula: vt quæ rotundissimam habet
faciem, dentes caninos paruos, latam pectus,
clauis longiores, minimum hirsuta, quæ recta
etiā fiat bellē, vt & gradiri sine errore, & cæ-
tere celeriter possit. Iam verō quæ animalia pro-
na ore obum assumunt, ea vt collū manus, sic pro-
lixiores habent inferiorem maxillam. Verum-
enim verō quæ inter omnes musculos, si tempo-
rales potissimum laci fuerit, convulsionē, fe-
bres, sopores, deliria, symptomatūq; terribilia su-
aducant, vt pote cerebro existentes proximi (neq;
enim reperitur ipse quicquam propinquius ce-
rebro, sicuti neq; villus musculus, qui per plures
nervos ipsi cerebro hæreat) merito natura eos
propemodum totos, ne facile arderentur ab in-
iuria cæternis, in capitis ossibus addidit, ossi
quidem ea quibus ipsi incubant, ex cuius admo-
dū, exculpusque alia autē dura, ac precipue quæ
illis præposita, *supra* nominantur, rigida, &
medullæ experta, in orbē quasi septū quoddam
eis circumducens: ita vt exigua quædam eorum
pars tantum, ad finem frontis emineat. Vterque
autē musculus temporalis in vniūq; tendendum
desinens: cuius maxillæ inferioris acuminē insi-
gitur: qui si tenuis fuerit, sursum eam trahit: si
ficus ipi animalis claudunt. Deniq; tamē aliq; duo mu-
sculi

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Circulus quid.

Maxilla infe-
rior maxilla.

Columnae
procrustes.

Os quæ ratio-
ne operatur.
Maxilla infe-
rior circum-
scripta maxilla.

Maxillæ
muculi.

Temporales ma-
sculæ inferi-
ores etiam maxilla
tenuis.

Lingua con-
ferta plurimū
ad ipsam ma-
sculaturam.

Buccarum fu-
cus inferius.

Ori munda-
ria musculorū
genera desin-
ta: operantia
nisi, clauden-

sculi in inferiori maxilla, utrinque unus, ambo ve-
rō nuper dictis oppositi. Qui quidem ex poste-
rioribus oriuntur capitis partibus, quo loco sunt
quos vocant columnas procrustes. Alij autem a
tem inferiori insurguntur statim post flexionem,
ad eum vsq; perveniētes locum, qui est ad men-
tum: unus utrinque ex internis partibus adhaere-
scens. Qui certē si tenē fuerint, os recludit, quē-
admodum temporales claudūt. Alij autem qui-
dam duo musculi, ad mandibulæ in masticatori-
bus circumactionē à natura fuerūt comparati,
qui carnosam quoq; genarū partem cōstruunt.
Quorum utrinque nonnulli non simplici muscu-
lum, sed triplicē esse existimant, quod tres ipso-
rum in maxillam sinu insertiones, instar princi-
piorum quorundam. Vterq; enim triangularis
existit, habens verticem iuxta vocatam malum,
vbi nervosior est: atq; ex lateribus ipsis, hoc qui-
dem ad zygomaticæ extremitatem hinc exportē-
ctū, illud autē versus inferiorē mandibulam: ter-
tium namq; veluti basis quædam, prædicta late-
ra partibus inferioris genæ contingens, secun-
dam longitudinem ipsius extenditur. Mover
autem ac circumagūt maxillam, alijs alijs fibris
& in sectionibus, vt moribus alijs alios vicissim
exicipiētibz, multiplices fiant actiones in ma-
sticationibus. Quare hanc inceptū hī musculi ma-
sticatoris vocantur: tamen si ad musculos tēpora-
les hæc quoq; appellatio pertinet, quod dentes
inter se vehementer committant, vt si quid inter
eos fuerit, cōmīnauerit. Ceterum cūbū laugarij,
atq; in partes minimas redigij à molaribus, qua-
si à molis, à masticatorum musculorum est actio:
ad quam etiam lingua nō minimū confert, in
ore obos assidue voluens, & transferens, quō
par ipso omnis indidem conteratur. Maximo
etiam ad eam rem ei sunt auxilio fines buccarum
inferiores, qui curacati sunt, spectantq; ad labia,
ad quos perveniūt tenues ac laxi musculi; vtraq;
parte unus, tōi collo circumiecti. Moverunt e-
nim ab his buccæ, cum labiis, etiam si genæ im-
mobilis omnino fuerit. Temporales porō mu-
sculi, quibz eis infra oppositi sunt, os aperientes;
omnibus alijs musculis hæc ratione sunt dissimi-
les, quod ex ipsis quidem temporalibus medijs
tendo ille nascitur, qui in coronem sublimē in-
ferioris maxillæ inferitur: oppositorum autē il-
lis musculorum partes, carnosæ in principio ac
fine existentes, nervosæ in medio cernunt: quod
in nullis alijs reperitis musculis. Etenim quī me-
dium temporaliū musculorū, coronæ quæ mo-
te indigeat, esset directum, tendonem iam hinc
emergere fuit necesse. At quod pertinet ad os
aperientes musculos, quum ab eo loco produci
deberent, qui multis instrumentis refertus esset,
eorūm uterque tendo ex carnis circa rōnillas est
factus. Quandoquidem hī crassiores essent, pe-
tenter præ locorum angustia non possent. Vbi
verō natura eos extra angustias deduxit, tunc
iam paulatim ipsos carne circumveniens, mu-
sculos rursus efficit. Tria itaq; hæc musculorum
genera, à natura ad os movendū adhibuit: quo-
rum aliq; quidē aperit, aliq; claudūt, aliq; variē
circumagūt. Suntq; claudentes quidē, maximi om-
niū: aperientes autē, minimi: magnitudine verō

medij, qui mediam etiam positionē sortiuntur.
Alij musculi duo ex internis genæ inferioris par-
tibus, quā ipsa est maximē canis, situm habentes,
sursum extēsi versus os capitis, musculi tem-
poralibus adiutores sunt dati, vt qui etiam genam
sursum trahere queant. Ceterum nervorū prin-
cipiū omnibus faciei musculis, alij alijs propemod-
um omnibus ipsius musculis, tertijs nervorum
est coniugatio, qui à cerebro proficiuntur. Quo-
rum sanē distributio tam recta, sicuti & aliorum
omnium æquissima dispensatio, non fortune
aut casui, sed arti ac providenti debetur. Quod
verō ad dentes pertinet, os duos & triginta in vi-
neriam habemus, vno ordine, in vtraq; maxilla
sexdecim collocatos: partē quidem anteriore,
quos incisores appellat, acutos ac latos; qui mor-
su possunt incidere. Proximos autem hīs cani-
nos, inferiori quidem basi latos, partē autem in
perna acutos: ut si quid propter duriciem ab inci-
soris minus scindi potuit, ad possint ipsi confrin-
gere. Hos maxillares sequuntur (quos etiam mo-
lares appellant) aspecti & lati, duri ac magni: vt
incisa ab incisuris, ac fracta à caninis, leuigare
planē ac terere queant. Ad hæc intēiores, parvis
quidem vna, dux autem aut tres maiores,
quatuor verō maximis insunt radices. Quorum
omnium si vnumquidvis mente immutaueris,
vitiatum repente eorum cernis labefactum.
Præterea ipsorum molarium denarium, medijs
quidem maximis sunt: qui autem vtraque ipso-
rum parte locantur, minores existunt: quod mi-
nimē congruum videatur, angustis quidem oris
partibus magnos, amplius verō dentes exiguos
inferi. Quinetiam quum linguam ad radicem ef-
se oportere ampliorē, magnos illic dentes mi-
nimē locari præiiterat. Habet autem vtraq; ge-
na tenues quosdam processus, quorum singuli
cavitatibus suis, singulos dentes excipiūt, eosq;
validis ligamentis adeo confringunt & conti-
nent, præcipue circa illorum radices, quibus etiam
nervi inferuntur, vt non nō facile cōcitantur. Por-
rō quod inferni supernis dentibus omnino æ-
quabiles sint, quodq; dextri sinistris, æquitates
quidē caninaribus, quodq; numerus vtrorumq;
sit idem dextris ac sinistris vtriusq; maxillæ par-
tibus, nōnne id est etiam æquitas cuiusdam spe-
cimen, artusq; potius quā fortune opus? Ad
hęc, quod formibus animalibz, acuti multi dentes,
ac fortes sint comparati, quemadmodum etiam
vngues: nihil autē in timidis fit iuvinmodi, sed vt
fragiles dētes, irati lat, molles atq; obtusi vngues,
hoc est magis adhuc admirandū. Verū quum
leones, canes, & lupi, utrinque multos habeant
caninos dentes, homo certē vnicum parte vtra-
que caninum dentem produxit: cogitante nimirū
natura, se animal ciale atque mansuetum
effingere, cui robur ac vires essent ex sapientia,
nō ex corporis fortitudine. Quæ sit igitur ad fran-
gendū quippiam durum videatur necesse,
id ipsum duo satis erant præstituri: proinde me-
iores plures numero duplo efficit, quod ipsorū
vtriusq; lateris patebat: & his adhuc plures mola-
res, q; ipsorū vius patēret laniandū. Horum tamē
dentium numerus definitus non efficit quoniam
maiores quidem habent genas, his quinq; insunt

ad os recluden-
tem: maxilla
inferior maxilla.

Partes muscu-
larum recipi-
entibus actus à
terris maxilla
inferior.

Dentes in vne-
rariam insunt
ori truncati-
dus, in vtraq;
maxilla sexde-
cim.

Incisores dētes.

Canini dētes.

Molares dētes.

Dentium ra-
dices.

Maxillares dētes.

Maxillares dētes
maxillares dētes.

Maxillares dētes
maxillares dētes.

Maxillares dētes
maxillares dētes.

Caninarum pro-
cessus.

Dentes inferi-
ores superiores.

Os per omnia
æquabiles.

Partibus ani-
malibus insunt
dētes fortes ac
molles.

Quemadmodum etiam
vngues animalis
ad dētem.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

Caninus dētes
vtriusque
maxillæ.

*Ducterem duo
defluant non
esse. ut pluri-
mo latus ha-
beret vtriusq;
in latere quinq;
lingua dextra
superioribus, car-
tillis homini-
bus.*
*Lingua in om-
ni parte mo-
ueri debet: et
superioribus reli-
qua.*
*Lingua a dexte-
ra, vira, atq;
vires.*

vtriusq; qui verò minores, quatuor. Maxima ta-
men ex parte, sunt vtriusq; latere quinq;, inferio-
res superioribus semper magnitudine & nume-
ro æquales. Porro lingua, quum animalū non-
nullas, vtpote serpentibus, sit diuisa, in homine
partes eius coeunt, quod tum ad sermonem,
tum ad comestionē, id esset longè commodius.
Mouetur autem in omnem partē, idq; liberè
quod requiritur ad perficiendas oris actiones li-
beras. Quod si ipsa est gemina, quemadmodum
& reliqua instrumenta sensuum, non alienū fuit
vtriusq; ipsius parte numero ac magnitudine in-
sculos esse æquabiles. Pari modo enim & duas
habuit in seipsum insertas arterias, vtriusq; vide-
licet vnam: duas inidem venas, ac nervorum con-
iugationes duas: vnam quidem mollem, alteram
vero duram: atque illam sanè in extremam
ipsius pelliculam distribuit, hanc autem disper-
sam in musculos: quandoquidem illa coniuga-
tiones vapores discernere, hac motu voluntario
moueri ipsam oportebat. Porro quod sedis ac
firmitudinis gratia, magna ac fortis ad basim
fuit: ceteris verò mortuus causa, ad extremitatem
tenues: quodq; ab aliis quidē musculorū fursum,
ab aliis eorundem, ab aliis deniq; trahatur ad late-
ra, musculus vniuersū partes ipsas versus pro-
pitiū principii trahentibus, mihi certè hæc quoq;
culpam esse providentiā videretur. Sed ne ip-
sa forte aliquando excutata, ad motus tardior
efficeretur, quemadmodum ad laryngem, sic na-
tura illi glandulas spongiosas similes, vnam vtrin-
que apponit. A quibus meatus ducti per obli-
quas atq; inferiores partes, in eam humorem pi-
tuosum eructant, non ipsam modò, sed omnia
etia quæ infra illam, in eiusq; lateribus sunt, hu-
meant. Superioria siquidem a meatu descen-
dente a cerebro peribunt. Iam illius ligamenti
quod partibus eius inferius inest, quodq; ipsam
linguā, vcluti quoddā frænum, coercet & tempe-
rat, ne aut nimis cōvellatur à musculus, aut plus
quàm par sit soluta diuagetur, quis non admo-
re tur symmetriā, atq; cōmoderationē? Ad eò enim
mensurata est, & certa ipsius cōnexionis cōmo-
deratio, vt si vel tantillū adiecisset, aut ademerit,
tonus in istum actionem vitauerit. Est verò
& hoc summè in natura admirandū, quod pecca-
ta & vicia eorū qui nos procreant, ipsa sua in-
dustria reficiant. Ebrj siquidē cū ebrius cōiunt:
cū qui præ crapula, vbi terrarum sint, nesciunt,
cum mulieribus ita affectus cōiungunt. Quo
fit vt genitura principium, itam ac ratione vi-
tiosum sit: postea verò ob omnimodum intem-
perantiam illius quæ concepit mulieris, in vte-
ro longè detenus reddatur. Attamen aduersus
tot errores natura obstitit, eosq; plerūq; corri-
git, sic vt partus mentis compos reddatur. Etenim
quum vniuersū agricolæ primum quidem, cuius-
modi terræ sua committant femina, duas mul-
tūque providant: postea autem admodum etiā
caneant, ne multo humore demerita putre-
scant, aut extabescant frigore, nullus sanè ex ho-
minibus tam in ferendo diligenter adhibuit,
neq; in eo quod conceptū iam est, educando, sed
quemadmodum in omni vira alius rebus omni-
bus seipso ducit posteriores, alij quidē infusa-

bilibus voluptatibus, abdominūq; inferiutes;
alij diuitias, aut magistratus, aut denique poten-
tiam ambientes: ad eundem apud & ipsam
posthabuerunt primam generationem. Tunica
quæ omnis oris partes subiungit, a cerebro
etiam recipere nervorum mollū momentanè
portione, vt quo modò lingua ipsa sit enī sua
dugratu saporū, iam diximus. At verò vna, quā
gurgulione & columellam vocant, ad maguē-
dinem atque elegantiam vocis auxiliatur. A qua
quidē aer in grediens, inciditur prius, impetusq;
ipsius violentia, & frigiditas frangitur. Vnde
nonnulli quibus ad basim vsq; illa fuit amputa-
ta, non modò detenus loquuntur, verum etiā
frigidiorē sentiunt respirationē. Pleriq; eius-
modi, pulmone & thorace natus refrigerato, pe-
riunt. Ac proinde nunquā ita temerè absconden-
da est, vt pars quæ dā basim nō relinquatur. Scn-
psimus autem prius & de foraminibus narium,
quod pacto mirificè ea os quoddam excipit, ven-
triculus cerebri prælocatur: tum & de ipsorū in
os perforatione, quæ est in palato. Quæ quidem
existit, ne inspirationis initium sit secundum res-
pirationem tracheæ arteriæ, sed quæ dā delectu
habeatur, ac vltimè ambages, priusquam ipsarū
ad arteriā perveniat. Proinde fit, vt spiritus qui-
dem obiter per hunc flexum contemperatus, vte-
ritus tandem feratur: hærent autem corpuscula
la exigua, aut si quid fortè ad os vsq; permeant,
sistunt etiam circa palati columnam: sic namque
viam ipsam appellant. Hinc fit, vt qui in multo
pulvere colluctant fuerint, hi paulo post emun-
gunt pulverem, expuuntq;. At nisi prius quidem
nati pori rectā ad caput sursum ferrentur, postea
autem obliqui ad palatū reverterentur, vniūq;
ibi sese exoptentē haberent, quid obfaret quo-
mō in arteriā hæc omnia delaberetur? Nam
id etiam accidet, si quis per os inspirat, magna
indigne inspiratione. Ceterum vbi sani homi-
nes sunt, ore ad respirandum nihil est opus, ni-
si quis altissime multo ac vehementer virgetur.
Quare natus, primum ordine respirandi instru-
mentum est: os verò, si nullus affectus infestet
animal, nullo pacto respirandi instrumentum
existit. Quum autem nudæ ac eminentes particu-
læ, quæq; externis iniuriis expositæ sunt, ex
ea oportet esse substantia conditas, quæ neg
conuadi, neq; frangi facile possent, meritò qui-
dem aures ipsas natura cartilagineas effecit.
Nam si duræ penitus vt ossa existissent, facile
frangerentur: si molles vt carnes, contunderentur
paruo negotio. Nunc verò modico iter mol-
les quum sint, eosq; facile incidendis cedant,
vim illorum exoluunt. Ceterum prominent aures,
vt meatu auditorio operimentum ac mures
existant, simulq; & ipse aliquem sonum resun-
dant. Quippe Hadrianus Romanus consul,
quem habebat lesum auditum, manus, caua,
quæ audent facibus, à posterioribus ad ante-
riora spectantes, auribus obtendebat. Aristote-
les enī dicebat, animalia grandes aures habentia,
semper eas agitare, ac circumvertere ad so-
nos & voces, vsum partū à natura edocta. At in
hominibus, quō paruas eas esse oporteret, nihil
aut certè parū iuuare poterant si mobiles ac ver-
sátiles

*Oris tunicam
diximus supra
viri, quomodo
dam lingua di-
uiditur.*
*Viam confuso
ad vocis vocem
notant.*
*Gurgulione si-
at columella
fuit.*

*Gurgulionem
non esse aliam
diximus rati-
onem.*
*Narium for-
amine, ut obli-
qui in os ducit
quæritur.*

*Nati ad respi-
randum ore nō
esse opus.*

*Aures car-
tilagineæ.*

*Aures aut pro-
minent.*

*Hadrianus Ro-
manus consul,
qui auditu se
lesum mouit
cauas à poste-
rioribus, ad ante-
riora spectantes
obtendebat au-
ribus.*
*Aures homi-
num cur versatiles.*

*Musculi vni-
uersi trahunt
partes versus
propitiū prin-
cipium.*

*Glandularum
linguæ a dexte-
ra vna.*

*Lingua vni-
uersa infusa.*

*Naturam satis
re erroris. Et
vicia eorum, qui
nos procrea-
runt.*

*Genitura prin-
cipium vitiosi
ad geniturā in-
temperantiam.*

*Generatio non
primam vni-
uersam trahit
ab vniuersis
humoribus.*

cartilaginosa radices eorū, quasi in lapidosa qua-
dam atq; argillacea terra, defixit. Tam verò & cir-
cum pendenda pili quoq; necessarij proveniunt,
(calida enim & humida sunt hęc cloca) operimen-
tūq; ac ornamentū eius loci partibus præbent,
virescentes ano, atq; præputiū pudendo. Frontis cu-
tis cum musculo quādam & tenui substantia, quę
illi subdita est, vitur: vt partes manū internę,
& plantę pedum, quę tendone coalescunt. Terna
verò præter has differentia cutis est, quę in toto
animali videtur, substantia quidē subiecta hęc
scens, non autē coalescens cum illa. Quarta dein-
de est labiorū, cui musculi per totum miscentur.
Quod autē frons a subiectis quidem ossibus per
membranā persoftā distincta sit, solę ex dua-
bus curvis mobilibus constans, ac breuiter ro-
ta in se laxa, ob id certē motu voluntario moue-
re. Ceterum labiorū substantia, quam moueri
etiā motu voluntario oportebat, eiusmodi exi-
sit, vt ram, aut musculū pro cute, aut cūte muscu-
losam merito voces. Quatuor autē sunt musculo-
rum ad labia peruenientium principia: perspi-
cua quidē anteq; cū miscantur: obscura verò,
& quę substantia illius separari nō possunt, vbi
semel in vnum conuertunt. Quare tondem etiam
erunt musculi, vtriq; scilicet duo: vnus quidem,
qui ad leuam: alter autem, qui ad dextram, ipsa
circumagat. Capita autē sunt appensa, alius qui-
dem supernē, versus malas, vt qui motus obli-
quos vtriq; labij parti essent præbuitur. Inferio-
rum rursus obliqua quoq; positio est, quoniam &
obliqui sunt motus. Ac per hos quidē quatuor
musculos opifex octo motus instituit: quatuor
scilicet obliquos, in vtriusq; labio duos: ac tondem
etiam rectos: duos quidem omnino rectos, quō
labia plurimum a se tunc distant, cum etiam in se
conuertuntur. Nam quemadmodum in corpore &
brachio ostēdimus ex obliquis motibus rectos
fieri, sic & in labijs accidit. Quare si musculos so-
lus vtriusq; labij agat, motus fit ad obliquum.
Sin verò tensi vtriusq; fuerint, eo modo iam motū
simul labrū sursum quidem a musculis superio-
ribus trahitur: deorsum autem ab inferioribus.
Atq; etiam tensis fibris externis, labia foras de-
fletere: iutro autem cedere & complicari, ab in-
fernis accidit: vt si duos hos motus, is qui planē
sunt recti, adnumeres, octo omnino labiorū mo-
tus reperias. Vt autem maximi non solum hi, sed
cum eis etiam illi qui in genis sunt, motus effice-
rentur, masculinū latum ac tenuē natura extrin-
secus subdidit, vnum in parte vtriusq; vsp ad colli
spinam pertinentē, ex omnibusq; ferē colli par-
tibus neruorum maximā vim recipientem. Qui
musculus ad sermonem & masticationem valde
conferat. At verò quum ad inspirationes pau-
lō maiores & subitas, item ad elationes, nasi
alæ non parum conducant, oportuit certē eas
mobiles esse, idq; pro voluntariis imperio. Car-
tilaginose autē fuerunt, quod ea substantia non
facile conrundi nec rumpi possit. Verū mus-
culi in illas inserti, fibras malas oriuntur exigui,
iuxta principia musculorum qui ad labia descen-
dunt. Cum quibus quadantenus coniuncti mus-
culus, semper magis magisque obliqui digredien-
tur ad nasum, recipiuntq; ad neruū qui per maxil-

lam superiorem ferantur, exiguas quasdam pro-
pagines. Interna autē ipsius nasi tunica fuit con-
structa, tum vt illum intus succingeret, tum vt
illi sensum tribueret: quandoquidem neque os
erit, nec cartilago, sensum habere poterat. Por-
rō cōstructio ossium, an motus gratia, aut per-
spirantes, aut transiūs cuiusdam, aut partiū di-
scriminis, aut securitatis, & panem difficultatis,
extitit, vt liquet in ipsarum particularū propo-
sitis nobis exemplis. Vbi os medullam habet in
se, eius finibus vtrinque caput iustar operculi
cuiusdam, vt plurimum videmus aduasi. Nul-
lum tamen partium os habet medullam, quod
finem nullum habet cōmemorabilem, sed cæuer
nulas angustas & exiles. Nam si exigui & cauum
fuisset, caretet robore: quemadmodum si quod-
vis magnorum densum fuisset ac sine sinu, gra-
uissimum foret, ac gestatu difficile. Omnibus au-
tem imbecillioribus animantibus ossa sunt laxio-
ra & concua magis: forioribus verò densiora,
magisque compacta. Quin & leo, qui omnium est
ferocissimus, ac fortissimus, ossa omnia medul-
lae expertia habere credimus. Natura quippe, mus-
culorū imbecillitatem atq; robur intuita, ad ip-
sorū portionē, ossium pondera efficit. Quā
igitur ad propriam securitatem, duntaxat ad ani-
malis verò motum leuitas ossium requireretur,
(nec adesse simul duo hęc effect facile) id oport-
bat eligere, quod erat commodius. Commo-
dior porro animalibus motus est, vt qui fit ex
iporum substantia. Non enim quatenus est ani-
mal, omnino ab iniurijs est tutum: ac ex cōpso
monetur. In quibus tamē propriis musculorum
robore, ac tonus corporis fortitudinem, vtriusq;
comparare erat licitum, his omnibus densa ac
dura, instar lapidum quorundam, ossa compo-
git, vt in leone. Quia verò homo non est æque
fortis ac leo, iure opinio, quæ ossa in eo sunt ma-
xima, ea non caua modo, vt etiam laxa exten-
derunt, plena tamen medulla, quæ proprium ali-
mentum est ossibus. Nam quibus cauitas nul-
la inest, his ossibus tale quid in eorum cauerna-
lis continetur. At capinum processus (quos Gre-
ci vocant *zupia*) non prorsus omnia quæ me-
dullam habent foriuntur. Quandoquidem ma-
xilla inferior medullæ quippiam in seipsis conti-
net, ac processum nullum foriunt, quem fit den-
sior, quā vt processu indigeat, atque ita facile
possit medullam sibi sine vlla externa epiphyssi
claudere. Causa autē cur fit hoc os brachio & tra-
more densius, est nuditas. Vbi verò laxitas simul
& cauitas adiunt ossibus, eorum capibus ossa
densa ac dura, cartilaginosa glutinose interveni-
unt, adeo fuerunt accuratē apposita, vt cōmisio eo-
rum non facile cerni queat, nisi ossa ipsa conco-
cta, aut exiccata fuerint. At superior maxilla o-
mnino medullæ fuit experta, quod prorsus non
moueretur, ob idq; illi necessaria non esset leui-
tas, quemadmodum inferiori. Quare ad solam
panendi difficultatē, ex ossium multitudine fuit
cōpacta. Nam quā vilitates haberet diuersas,
ex diuersis quoque substantiis ossibus manifestē
cōstituit. Maxilla siquidem ossa, crassissima sunt:
nasi tenuissima: reliqua verò durissima. Quum
enim ossa nasi, si laxa fuerint, minimam animalis
adferant

Nasi tunica in-
terna, in quæ
osum facit.

Ossium fractu-
ra, cuius gra-
uia.

Ossibus mediis
infus infus v-
trinque caput.

Ossa parua ca-
uere medulla.

Leuissimum ossi-
um a medul-
la expertia.

Ossa sunt de
quibusdā
medullam
habentibus
et
robore.

Maxilla ossi ex
substantia ani-
malis.

Ossa hominis
quælibet.

Ossium inueni-
entium, me-
dulla.

Leuissimum.

Maxilla inferi-
or nullis pro-
cessibus foriunt,
tamen medul-
lam in seipsis
continet.

Maxilla superi-
or cur fit de-
densa medul-
la.

Maxilla ossi
crassissima.
Nasi ossa te-
nuissima.

Pendendum
pili eius gra-
uia.

Frontis cutis.

Cutis totius a-
nimalis.

Labiorū cutis.

Persoftum est
membrana cra-
ssius adhaerens.

Labiorum sub-
stantia.

Labia inferio-
rum musculos
principia qua-
tuor.

Labiorum motus
rectos fieri
a duobus obli-
quis.

Labiorum motus
in vtriusq;
parte sunt
vires.

Nasi alarum
motus.

Nasi alarū mo-
tus & neruū.

adferant nonnulli, multum ab aliis principalioribus, ducte & crassitie vincuntur. Reperitur autem, supra vna secundum longitudinem in vtraque maxilla, quod nimirum verum corpus fit geminum. Obstat tamē ea in densissimis ossibus, est: cuiusmodi est occipitis, frontis, palati, & summe maxillae. Quum igitur ossa quae ad verticem capitis persistent, nec plagis similiter essent obnoxia, ut ossa frontis & occipitis, nec non quae in lateribus sunt, evacuationeque indigerent copiosa, haec autem vultu etia sapienter, exceptura essent, vacuationemque non possiderent: natura recte illa quidem rara simul & cauernaosa, licet verò dura & densa cōstruit. Palati autem os durum etiam ac densum extitit, quod ad basim capitis sit: quodque ab excrementis quae per ipsum transibunt, breui extabuisse, si fuisset laxum. Osium porro alia similia producio, expulso facta est, sedem simul atque operamentum musculis oris à lateribus exhibitura. At ossa bregmatica (quae duo laxa sunt capiti desuper incumbunt, ea vndique à densis ac densis ossibus circum data) parte quidem posteriori ab ossis occipitis, anteriori verò frontis, vtriusque verò ab ossibus temporis, merito lucis fuerunt distincta. Septimum est os palati, quod nonnulli superiori maxillae, nonnulli capiti attribuant. Reliqua omnia maxilla superioris nouē sunt imperio: duo palati, cui lateris incisores dentes veniunt autem duo, quae molares ac reliquos dentes excipiunt supra quae alia duo sunt, quae ad anteriorem tygomaticam productionem, atque internā oculorum ciuitatem spectant. Reliqua duo sunt iuxta nasi in os meatus. Porro articularum inferiorum maxillae, alteri quidem, quae seorsum dicitur, zygomata circumposuit natura, maximumque musculi temporalis tendonem, à quo nimirum os claudunt alteri verò mamillares capitis productiones appositae, ne quando in violentis motibus, à subiecta ciuitate elaborata. Aperunt autem os ipsum tum posterior articulus, qui est ad mamillares eas productiones: tum musculi articulum mouentes, oppositi temporali musculi.

GALENI PERGAMENI de vsu partium, lib. XII.

Vatautem partes collo & capiti communes, per quas caput in omnē partem mouemus, id quod sunt articuli, ligamentis, ac musculis agere nobis non licet. Porro articulus, osium est compositio, propter motū voluntarium comparata. Ceterum quae componantur, pauciora duobus esse non possunt: oportetque, ut musculi ab vno osse producti, inserantur in alterū. Motus autem fieri non potest, nisi ossi articulus sit simul, ac per musculos cōnectantur. At ligamenta, quae ossa in suis articulationibus exacte continent ne excidant, ad recte etiam mouendum conferunt: adeo quidem dura existunt, ut in motibus vehemētoribus minime disrumpantur: in tantū autem mollia, ratione cuiusdam humiditatis viscoae, quae articuli iuncturas, ut traicta ossibus facile & obsecundat, cedant. Quia igitur cartilago, ligamentum, & nerui, corpo-

ris machina indigeat: ac cartilago quidem sit durior, nerui autem mollior: in edium verò sit ligamentum: mirabiliter sanē natura singulas vultur in omnibus animalis partibus, nunquam loco vniuersum constituit alterum. At verò cartilago subiungit quodammodo articulos: nerui, quantum habet mollietis, tantumdem & sensus habet. Verum imbecillior est, quia ut totos artus mouere & transferre queat. Ligamentū autem valde colligare potest, nec impedit quo minus membra moueantur: mororum tamen iustitiam esse non potuit, quum nec sensum neque motū haberet, nec ex principio animal mouente, sed ex osse exoneratur. Conuenienter igitur, vbi membrum solo vinculo indiget, ibi solum est ligamentū: vbi verò sensu solo, nerui: vbi motu voluntario est opus, vbi vniq; ibi reperias: nerui quidem, quo missum à ratione imperium perferat, morisque principium praebet: ligamentum verò, quod robur ad eaque: inerus mouentem gestandā suppediet. Prout enim quoddam instrumentum motus ex ambobus, primum quidem in tenues fibras solutus, postea vero coalescentibus, intercapedineque medias molli carne repletas habentibus, efficere oportuit, quod omnino neruo quidem durus, ligamentum autem mollius existeret, reliqua etiam contrariam affectionem quae illis insunt, medium locum teneret. Atque hoc quidem instrumentum ita tendo, quae ex iisdem illis fibris inter se commixtis conlatur. Tendo igitur primum instrumentum est motus. Musculus autem, ad constituendum ipsum fuit comparatus, carnisque coagmētat & compositis animalis contra iniurias extensilem praebet volatiles. Porro articulus capitis adeo magis est momenti animalibus, ut omnium solus, non dico luxationē magnā, sed ne deflexionē quidem, vel temporis momento serere queat. Reperit siquidem respiracione ac voce, motuque simul & sensu, totum priuatur animal, ipsa nimirum neruorum radice affecta. Est enim principium omnium neruorum cerebrum, in ipsūque, veluti in arui quoddam anima ratiocinatoris semen mittit: germen verò inde, vel vtrumque quidam in arbore exurgens, medulla spinalis exiit: à quo truncus per totam spinam extenso, deducti vniuersi complurimae, iuxta ramos quoruundam, in sexcentas propagines distribuntur. Corpus autē vniuersum, per eos sumit primum quidem & maxime motum: deus verò, sensum. Ceterum articulus capitis rursus omnium constructionem sortitur, quod in ipsis radicē neruorum omnium, partes inferiores mouentium, continet. Accedit etiam securitas à ligamentorum crassitie, musculorum multitudine, & ossium exacta compositione. Fortissima enim ligamenta ossa ipsa cōnectunt: quorum vnum maximum ac latum, in orbem totam articulationem completitur. Alia autem sunt duo medio ceteris, iuxta uerticem, torunda: quorum alterum quidem, suum productionis praelonge, vterque secunde, cum capitis osse cōnectit: alterū verò transversum, veluti angulum rectum efficiens, à partibus primi spondyli deorsum, ad leuam pertingit. Quid autem musculi

Corporis machina quae deservit.

Cartilago vna. Nerui quantum habet sensum tantumdem sensum ferunt.

Ligamentū nec sensum, nec motum possidet: rursus autem ab ossi.

Tendonis generatio, ex ligamento & neruo. Tendo primum est instrumentum motus. Musculus vultus. Articulus capitis luxatio, quae infert mala.

Cerebrum est principium neruorum principium. Spinalis medulla vniuersi truncus arbore.

Nerui largiri corpori motum & sensum. Articulus capitis constructio & securitas.

Capiti articulus est in quo habentur maxillae.

Martellum futur.

Verticis ossa cor rara simul & cauernaosa. Verticis ossa cor dura simul & densa.

Palati et cor durum & densum.

Osium alia similia vult.

Bregmatica ossa.

Maxilla superioris ossa nouem.

Respiratio. Zygomata. Mamillares productiones.

Os à quibus aperiatur organum.

Articulatio quod. Compositio ossium quae voluntaria. Motus qui requiritur. Ligamentum vniuersum & crassum. Primum.

Capitis motus
des motum
genera.

Spondyli pri-
mo duas cau-
tates inesse.

Humeri o-
mnium men-
tis articulo-
rum locutione
est obnoxius.

Capitis motus
sunt des de-
finitum, et in ob-
liquam, unde
proficiantur.
Dentiformis
processus.

Vertebrae spinae
totum esse
vaginaque-
re.

Musculi capitis
ambitus esse
et vincti.

ex ipsis diuntaxat partibus posterioribus, articulationi incumbit, ipsam regentes simul atque moventes. Quum igitur capitis totius motus duos genere esse oporteret: vñ quidē, dum deorsum inclinamus, ac sursum attollimus ipsum: alterū verō, dum ad latera circumagimus: nec ex duobus simplicibus motibus rectus vnus illic effici possit, vtriusque priuatim præstitit musculos atque articulationes efficere. Quocirca dearticulationes ipsæ, duplices, musculorum autem mo-
uentium ipsas, genera duplicia existerunt, quatuor differentiis comprehensa. Alij enim caput attollunt, alij depriment: alij ad dextrā, alij ad la-
uam circumagunt. Igitur motū in vtrāque partem grata, primo spondyli natura duas cautates indidit, alteram in sinistrā, alterā in dextris, capituli cōuectantibus, quæ ibidem sunt, prioris æquales: Nam tamen potuisset natura vnum maximum processum, atque rotundum vndique, in primi spondyli maximam cauitatem inferens (quemadmodum in lumeri articulo fecit) capiti omnes motū differentias præstare, quia tamen sine laxa articulatione & fallaci fieri id non poterat (ob quam nimirum omnium maximæ articulationum, luxationis humerus est obnoxius) maluit paucissimos capiti motus, edisq̃ tūto tribuere, quam varios simul, atque periculosos. At verō secundo spondylo vtrinque vnus deniformis processus inest, acclius atque prælongus, qui robustissimū ligamentum capiti connexus est. Atque
eius quidem beneficio caput attollitur, deprimiturq̃, quemadmodum per articulos cum primo spondylo ad obliqua mouetur. Quā autē ex partibus anterioribus secundæ vertebrae, ille dentiformis processus exortus, inuehi deberet secundum supremam sui oram partibus primæ vertebrae anterioribus atque internis, merito natura, vertebrae partem eam excavit, dentemque ipsum ibi indidit, validum ligamentum atque transversum extrinsecus ei circumdans, quod simul-
ipsum à spinali medulla abduceret (ne videlicet illam collideret) simul autem ad primæ vertebrae cauitatem alligaret. Quinetiam supernis primæ vertebrae cauitatibus, quæ capitis eminentias excipiunt, alix quædam cauitates parte inferna consimiles subiacent, quæ eiusdem primæ vertebrae complectuntur conuexitates. Quarum beneficio neq̃ vertebrae secundæ cum capite connexio (cuius actio erat caput sursum attollere, deprimeretq̃) à prima quicquam habet negotii:
neq̃ reliquos motus ad latera, propter articulationē cum prima, impeditur quicquid à secunda. Verum quia quatuor & viginis totius spinæ sunt vertebrae, quod in nulla quidē alia eiusmodi ligamenta, qualia in prima, cerantur, neq̃ in hac etiam secundum aliam partem, quā sit expediens, sint facta, nemo opinor audebit dicere id accidisse fortuito. Musculi qui caput movent sunt octo & viginis, aut plures, ipsum in orbē circumvestientes: quorum alius aliam habet actionem. Sunt autem ipsorum, octo quidem partibus anterioribus, quatuordecim autem posterioribus, ex diametro sibi ipsi oppositi. Alij verō, vtrāque parte duo, quorum hi quidem ex dextris, illi autem ex sinistris, oppositi & ipsi inter se, primum

quidem & maximè collum ad se ipsos trahunt, cum illo autem & totum caput: natura semper singulis motu prædix musculus opponente alios contrarij motus auctores. Musculorū caput attollentium & inclinantium, octo quidem, idēq̃ parui, retrō, circum articulum ipsum sunt sitū: quibus maiores alij in toto collo extensi, per primas quidē fibras, solius capitis motibus immergentes, eos obeunt, qui ad primam sunt atque secundam vertebrae: per proximas verō, movent quinq̃ reliquas colli vertebrae. Ceterū ex octo musculis, quos paruos esse diximus, quatuor sunt recti motus auctores, qui ex osse occipitis exoriantur, pauld supra articulationē inferuntur autem in secundi spondyli posteriorem processum, atque in partem primi proximā. Reliquorum verō quatuor, duo quidem, quo modo prædicti, ab osse occipitis nati, foras tamen obliqui digredientes, obliqui primi spondyli processibus inferuntur, motū totius capitis obliquum præstantes. Reliqui autem duo, primum spondylum secundo coniungentes, obliqui, positionem habent duobus prædictis contrariā, ac motum oppositi. Illi enim caput habentes obliquum, vñ cum eo secundam vertebrae ad primam adducunt: hi autem in rectum & naturalem statum, inclinātū caput reducunt. At tres musculorum magnorum coniugationes, eundem cum dorsalibus musculis habent motum, quem pauld post explicabo. Movent autem per primas quidem fibras (quæ in primū & secundum spondylum inferuntur) solum caput per reliquas verō, primum quidem reliquos colli spondylos: simul autem cum eis, caput retrorsum agunt. Obliqui tamen, sensum motus obliquos efficiunt. Anteriorum verō, qui stomachi quidem subiacent, per primas fibras (quæ in primū ac secundum spondylum defixæ sunt) caput duarum hæcunt, ac simul obliquis fibræ, ad obliqua deducunt: per quas musculorum etiam paruorum propriam habent circumscriptionē: per reliquas verō collum flectentes, simul cum eo caput cogunt nutare. At reliqui sex, non rectum, vt hi, capitis nutum, sed solum obliquū efficiunt: cum quo etiam caput in anteriora convertunt. Quatuor autem alij musculi robusti & magni, vtrāque parte duo, dextra & sinistra, locati, collum ad latera cum parua declinatione movent: atque antrotrorsum, anterior ipsorum coniugatio paululum inclinans, reliqua autem retrorsum: illa tamen ex perforata secundæ vertebrae apophysi productionem habet, hæc autem ex primæ obliqua eminentia nascitur. Fit autem omnium musculorum actio pro fibrarū positionis modo, quas vt plurimum habent secundum sui longitudinem expositas: raro autem obliquas, vt spinæ musculi, qui quidem recti secundum spinæ extensi, fibras in obliquū producant. Securitas itaque articulis capitis, ex his quæ diximus, accessit: motuum autem detrimentum, quod eam sequebatur, musculorum multitudine, magnitudine ac situ vario natura ita pensauit, vt nullus capiti desit motus. Ceterum omnium musculorum sunt minimi, posteriores, vt qui soli exacte articulationē comprehendunt.

Musculorū mo-
uentium singu-
la natura oppo-
siti esse alios
contrarij mo-
tus auctores.

Capitis muscu-
lorum articu-
latione.

Musculorum o-
mnium pro fi-
brarum posi-
tione modo.
Musculi mai-
ori ex parte in-
feri fibras secun-
dum longitudi-
nem expositas.

Acquē

Acque autem opportunam cum his positionem habet prima porcio musculorum stomacho subscitorum, quæ ad flexiendum caput est comparata. Verum quod ipsorum est reliquum, progrediarum vsq; ad quintam thoracis vertebra, flexione rectam efficiat, nõ modo vertebres subdunt, sed etiam cum eis vniuerso capiti. Postquã verò ex musculis octo exiguis & posterioribus, qui caput ad obliquam inclinant, rectam quidem erectiõnem efficiunt, quum coniunctum ac bini agunt: obliquam autem, quando alter eorum solus agit: similiterq; enã qui maiores ipsi incumbunt, vsq; ad collum extensis: ob idque necessum erat quoidam illos parte anteriori opponere musculos, obliquam flexionem ædentes: ideo musculi sex qui ad clauem & pectus perveniunt, sue runt comparati qui caput possunt flexere, atq; etiam antrorium circumagere. Pari modo, & musculorum quatuor qui collum flexunt ad latera, si vnus solus egerit, ad illum inclinatur. To-
ta verò anterior coniugatio, exiguum quiddam flexit antrorium, nusquam præterea flexiens ad latera: quemadmodum & quum posterior agit, paulatim quidem attollitur, in neutram partem se inclinans. Omnibus verò quatuor simul agentibus, in nullam omnino partem propensum perdat. Quum autem nusquã alibi tantum alterum os, alterum superet, quantum capitis os primum spondyliorum ossa, quibus iungitur, magnitudine superat (præter enim inferiorem maxillam sedecim insunt capiti ossa) certè opus fuit multis ac robustissimis musculis, qui pendentes omnino à capite, infererentur, non omnes quidẽ in primas vertebres, sed illi tantum quibus licitum esset. Erat ita autem tantum licitum us, qui motum rectum ad vnguem suppeditant capiti, aut abici eorum, qui ad obliquũ deflectunt. Merito igitur nõ omnesque caput movent, in primos spondylos insiguntur musculi, sed parte quidẽ posteriore, parui soli: anteriore verò, prima porcio musculorum stomacho subscitorum: à lateribus parui alij musculi, qui capiti vertebra primam coniungunt, ac proutde paruas vertebres nõ oportuit esse maiores. At verò spinam naturæ animalibus veluti carinam quandam corporis ad vitam necessariam, non ex vno simplici osse molita, intus eius omnes vertebres excavit: viam hanc præparans opportunam portioni cerebri, quæ per ipsam erat descensura. Non cõstruxit autem eam simplicem (quanquã ad sedem tutam, & patiendi difficultatem, talis structura erat longè cõmodior) quòd multis ac variis modibus animal esset vsurum, quibus spina ex vnicò formata osse, minimè obsecudaret. Quare natura quidem rectè vtrumq; scopum simul considerans, iudicantis, priorem quidem dignitate, actionem: post illam autem, securitatem: sicuti rursus, ad sanitatis diuturnitatem, securitatis esse quidem priore, posteriore autem actionis: vtrumq; scopi, actionis scilicet & incolu miratus, in ipse vertebres exquisitam fecit miscellam. Quòd autem necessum fuerit spinalem medullam veluti fluuium quandam ex cerebro, tanquam fonte, manantem, locis omnibus quæ preterit, necuum semper immittere, tanquam

senfus ac motus riuulũ: longèq; melius sic in vniuersas corporis partes traiecit eas faculares, quàm si nullus intervẽtu, à cerebro per tenuem aliquem neruum dispergerentur, neminem opinor latere. Ad hæc vero, spina, quod sit veluti quoddam carina, totiusq; animalis stabilitamentũ, ex duris ossibus est constata. Quòd autem medulle spinalis sit via, ob id intus est caua. Quia verò ipsi, & visceribus inart mari est, ea de causa multis propugnaculis in orbem est cõmunata. At quia motus est instrumentum, ob id est pluribus & parvis ossibus per articulos cõmisis inter se continetur. Constat enim ex quatuor & viginti ossibus, præter os latum, quod extremum ipsi subiacer. Maxime igitur partes spinæ sunt quatuor in vniuerso: collum, dorsum, lumbus, & sacrum os. Ex quibus collum quidem septem spondylis, dorsum duodecim, lumbi quinque, os deniq; sacrum aut latum, quatuor ossibus constat. Iam verò læso spondylo, motus simul & sensus omnium partium quæ illi subdite sunt, le duntur. Quare, vt rectè monuit Hippocrates, si multi quidem spondyli ordine se se consequentes, emon fuerint, malum id est. Sin verò vniūquvis ex cæterorum harmonia & compage exierit, exitiosum: quòd illa quidem prima, spinalis medulla sit circuls, hæc autem secunda, angularis perversio, quæ maxime ipsa medulla comprimitur, fulminare magnam simultaneamq; flexionem non potens. Quia igitur per magnos ac laxos articulos, multumq; distos, moveri spina sine molestia non poterat, melius fuit ex multis, paruis, singulis paulum conferentibus, totam ipsam constari, vt secundum circuli circumferenceam, circa angularem medullæ perversione, tota flexi & moveri posset. Quã itaq; necessum sit plures esse in spina spondylos, consentaneum etiam rationi fuerit, cuius ipsorum motum in esse proprium: id quod fieri non posset, si duo illi musculi à capite vsq; ad os sacrum exten si, haberent fibras secundum longitudinẽ exporectas, quæ nimirum omnes indẽ traherent. Nunc verò, quum oblique in quosq; spondylo fibre fuerint, tum ad latera circumagere, tum flexere, atque erigere, nunc hanc, nunc illam spinæ partem possumus. Sed quum movere ipsam spinam sigillatim possumus, poterimus & totam simul movere, fibrisq; musculorum omnibus simul agere. Quòd si fibras secundum spinæ longitudinem tenderemus, simul quidem totam promptè moueremus, singulos tamen spondylos non item. Melior igitur habenda est constructio, quæ vtrumq; simul probe præstare potest, necnon conversiones ad latera, quim quæ alterum tantum. Quòd autem propter instrumentorum copiam, quæ locanda ibi omnino erant, primi spondyli magni esse non poterant, nõ obsecrum existimo. Sicuti neq; etiam, quòd expediebat subiacentibus quidem semper superioribus esse minores: siquidem quòd gestatur, minus esse oportet eo quòd gerat. Quæ causa fuit, cur natura omnium spinæ ossium iniquum, fecerit maximum, ipsum veluti fundamentum quoddam, ossibus omnibus subdens. Secundũ magnitudinis locum habet spondylus illi secun-

Spina vni
cui
sistens, et
vni
triduo.

Spina cœlata
ex quatuor
vngulis
sistens.
Spina extre-
ma, et latum,
spina maxime
pariet quatuor
os: collum, dor-
sum, lumbi, &
sacrum.

Locutionem
spinæ, quæ pos-
sima.

Circulari per-
versio.
Angularis per-
versio spinæ.

Capiti ossa
sedecim, præ-
ter inferiorem
maxillam.

Spina, quæ cor-
poris veluti
quoddam cari-
na est, construc-
tio.

Spina cur ex
pluribus os-
sibus constet.

Discipulus qui-
dẽ actionem, pri-
mam esse, secon-
dam autem se-
curitatem.

Spondylii for-
ma, et
sive obliqui.

Costata ossa,
minora esse de-
bere in, à qui-
bus gestantur.
Cœlata, cur
maxima spina
ossum sit ma-
ximam.

duc coniectus. Reliqui autem, quantum situ ab infimo discedunt, tantum & magnitudine distant. Veruntamen quum spinalis medulla transiens per primas vertebrae, longè corpulentior existat, quàm vbi vterius progreditur: consonum fuit rationi, eorum spondylorum longitudinem esse omnium maximam. Quod si leues etiam debebant esse, ut omnibus aliis incumbere, perspicuum est, quod eas tenues etiam esse par erat. In hoc tamen videtur natura summè admiranda, quod tantà a cerebro produxerit spinalem medullam, quantà maximè partibus omnibus infernis suffectura esset. Siquidem quò in nervos octo & quinqueinginta spinalis medulla dividenda esset, tantam ex cerebro produxit, ut distributionem in nervos planè esset aequalis, neque in ipsa quicquam deficeret, nec redvnderet. Cæterum loca unde emergunt, adeo omni ex parte sunt tuta, ut neque laxarentur quicquid, nec in tot, ac eiusmodi spinæ monibus, affligerentur. Moles verò cuiusque est tanta, quantam pars recipiens postulat. At via omnis quæ est inter primam productionem, & insertionem ipsius, mirabiliter ad cuiusque securitatem est comparata. Quum igitur spinalis medulla veluti alterum quoddam cerebrum, partibus sub capite suis futura esset: & spina ipsa via simul indiuertibilis, necnon firmi præsidium, destinaretur: ob eam causam tum alia multa in spondylis est machinata, tum quam

Vertebrae primarum cur latitudo sit omnium maximæ.

Spinalium medullarum distributio in nervos: quia quinquaginta octo.

Causes.

Spondyli medullæ in tota spina, cur productionem posteriorem in neutra ratione possint.

Productiones spondylorum in aures.

ductionis finem, quemadmodum & acanthæ rotæ, sunt ad mediam spinam conversi. Cur autem crassæ sint productiones laterales spondylorum thoracis, tenues autem in spondylis lumbi & magni ossis, in colli verò spondylis crassæ & bifidæ? An quod in thorace quidem, quum costæ non solum eis essent inarticulatae, verum etiam per torum incumbere, consentaneum fuit, firmas atque stabiles facere productiones? Lumbi autem & ossis magni productionibus, quò vasa solum ac musculi incumbere, nihil erat robore opus? Quæ verò sunt in collo, mentissimè exiterunt bifidæ & crassæ, ut quod securitatis, propter acanthiarum breuitatem eius spondylis decrat, id ex transversis compensaretur? Porro spondyli omnes, præter duos primos, partibus quidem anterioribus tuto inter se colligant, posteriori verò articulati, firmitudinem simul sunt atque ad motum facilitatem indepti. Atque ob eam causam antrotrium quidem plurimū secti possumus, retrotrium verò non item: quemadmodum certè expediebat ad omnes humanas actiones. Siquidem facile rumpere tur multa & præstantia vasa, si extensa plurimū ac refracta, dum spinam totam retorqueremus, essent.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium, lib. XIII.

Quum autem spondylorum locus posterior, in tres diuidatur partes: primam, quæ exaltet posterior est, alii loco sunt spinæ: duas, quæ vtraque huius parte sunt, quas productionum transversarum radices terminant, merito ex vtroque harum duarum posteriori loco, inter se articulantur ipsi spondyli: quandoquidem aliunde id fieri nec licebat, nec erat expediens. Cæterum quum ipsorum spondylorum quique, parte superna & inferna, iis quò vtrumque regione sunt, committantur, merito duas quidem acclues, totidem autem decliues productiones eis extiterunt: hæ siquidem omnibus sunt communes. Ex abundanti autem, veluti cumulus, magnis spondylis alia duæ decliues insunt. Quum enim ex decliuis productionibus, accliuibus inuictis, spondyli articulerentur, ad securitatem maiorem natura alteram decliuium totam articulationi subiecit, ligamentumque validum ex ipsius sine productum, sub accliuem totam submisit. Verum si prædictis tribus productionibus (quarum una est omnium maxima, quæ spinam constituit, ac duæ transversæ) duas quidem acclues, quatuor autem decliues adiunxeris, nonnem omnino ipsas reperies, quos sanè & quales in lumbi spondylis certuntur: quemadmodum in collo vndecim, præter mediā illam quæ antrotrium constitit. Porro dorsi spondylis singulis, productiones septem extiterunt, tametsi non omnes formæ habent similes, quod spondylorum eius, nouem supernas, productionem superiorem habeant maximam, transversas verò crassissimas, tum acclues ac decliues, crassas simul ac laetas. Decimus autem qui hos sequitur, cætera quidem est similis, non tamen productionem posteriorem, ut illi, habet longam, de-

Spondyli, quæ parte interueniunt maxime.

Productiones spondylorum quæ habentur totæ.

Lumbi spondylorum productiones novem. Colla spondylorum productiones septem. Dorsi spondyli singulis septem productiones habent.

clivum & tenuem: neq; etiam ipsas quatuor, per quas cum aliis vtrinque spoodylis articulatur, habet similes: sed superius quidem dux, prælo carorum novem spoodylorum productionibus acclivibus: reliquæ verò dux declivis, reliquis sunt declivibus similes. Hunc enim soli spoodylorum omnium id est summum, quod vtrique articulatione propinquo sibi spoodylo vtrinque invellitur. Reliquis verò omnibus qui sub hoc decimo sunt locati, ad id est, quod acclivis quidæ pro ductiones sunt causæ, declives verò convexæ. Ob id convexas quidem, subiectis spoodylis invehiuntur: acclivibus autem, superiores excipiunt. Qui verò supra hunc in dorso sunt & collo, lu omnes recipiunt simul, ac declivibus productionibus ambiunt acclives, quæ sensum sunt convexæ. Postremi autem duo dorso spoodyli, productiones duas reliquas declives ex partibus inferiis ad tutandos articulos summissas, atq; ab aliis seuunctas habent: qui soli spoodylorum omnium obliquas vtrinque productiones, quas appellamus transversas, non possident: pro quibus declives illas habuerunt. Per decimum igitur illi dorso spoodylum, qui memoratus in medio manet, natura totum ipsum in partes omnino squales divisit, mole spoodylorum æstimata, nō numero. At verò spoodylis ipso medio spoodylis fecit productiones aurtas, convexas quidem acclivas, causæ verò sensum declivas: inferioribus autem contrariæ causæ quidem efficit acclivas, convexas autem declivas. Quæ structura tum ad flectendam spinam, tum ad erigendam requirebatur. Est autem vtrinque figuræ terminus, ut quæm flectimus, spoodyli, quæ possunt longissimæ, & in vicem digrediantur, permixtæ ac si spina tum longior esse deberet. Quæm verò erigimus, e contra, ut cuncti coeant, ad medium spoodylorum accedentes, ac si spinam ex pediat esse breviorē. Quod autem cavitate quæ circū osium inter se dearticulatorū convenientes vtroque vertitur, sint ad motus obliquos apertissimæ: quodq; motus ex duobus obliquis, parum à motu medio partem vtroque simul circūagentibus constitutus, necessariò vnius rectus fiat: necnon quod io spina satius fuerit, ex obliquis rectos efficere motus, ex dictis facile constat. Porro primus colli spoodylus posteriore productionem non habet, quod recti musculi & breves, qui caput torum erigunt, omnem ipsius regionem occupent. Cui soli primo spoodylo non insunt obliqua foramina, per quæ oerui à spinali medulla excidit, & quæ qualia omoibus aliis colli spoodylis natura insculpsit, quæ parte inter se coniunguntur, sic vte ambobus vnum foramen iohar semicirculi, nervo aptum, oritur: ita enim non modo foramina ipsa, sed nervi etiam, qui per ea emergunt, sub productionum acclivium ac declivium radicibus (ubi primū ipsorum spoodylorum latera desinūt) sita, ad eō coniunguntur vndiq; vtrambi mehos ea minimè collocari possunt. In lumbis autem, si alteram productionē declivium accuratius visum resperies vniem, sed multo etiam magis, primæ oerui productionis gratia comparatam. Si quidem

exporrecta post oeruum, nervus severa efficitur, & propugnaculum adversus ea quæ illi quoquo modo incidit. Hanc igitur productionem in lumbis spoodylis videmus magnam (quod ipsi summi sint) & duobus postremis thoracis similē. In aliis verò spoodylis decem, eandem utilitatem peritus præstant productiones laterales; quibus costarum ossa invehiuntur, atq; in articulatione. Reliquæ etiam, præter primū, colli spoodyli, nervorum productiones ab vtriusque spoodyli lumbis lateribus promittentes, habet æstimatæ productionibus (quæ basidas esse diximus) testas atq; diapasas. Etiam in lumbis spoodyli, aperte nervus lateribus partium inferiarum invehiuntur. In spoodylis autem dorso, invehiuntur etiam hic quidem simi superni spoodyli evidenter, sic tamen ut inferius attingere spoodylum videantur. In collo verò spoodyli, quod omnium minimū esset, vtrique spoodylus requalis portio omnis ad viam nervi coadulit. Quæm autem spoodyli singuli, primum constructionis scopum habet duplicem, sedem scilicet tutam spinæ totius, atq; etiam motum, aliorum quiddam omnium qui sunt sub collo spoodylorum, vbi in securitate est maior: superiorum verò, in motione. At quæ nec inferni spoodyli, aliq; aliis tum cumbere tutā poterant (sine lata basi, ac fortis ligamento: nec superni moveri facile, sine longior processu, aut ligamento laxiori, vtrique spinæ parti natura congruente structura consulat, prælongas quidem inferne, causas verò supernæ colli vertebra faciens, non modo ad motum faciliem, sed ad tutum etiam obeundum: alias autem omnes in planum, lævem, atq; vndiq; æqualem, solidumq; circum, terminans. Quæ vbi primus spoodylus crassissimus est, ibi ipsum prope supernas articulationes foraminibus pertudis tenuissimis; quibus omnibus rebus parat, patiendi difficultatem tum ipsi spoodylo, tum nervo producendo comparatam. Cui spoodylo crassities illa ob tutam perforationem fuit comparata, & vte parte quidem inferna, secundi spoodyli convexitates, superna verò, capitis eminentias excideret. Quæ enim ipsius spoodyli partes maxime erant laborantes, has præter ceteras, satius fuit fortes efficere. Vtrunque autem excidentium nervorum, in musculos ipsi primo spoodylo incumbētes, natura distribuit. Venit quæ prima coniugatio sit tenus, ob idq; ex ipsa portio capiti distribui nequeat, ex secunda coniugatione natura id efficit. Nam per supernos musculos nervus vterque perlabitur; qui obliquus quidem primò in partem posteriorem ac superiorem tendit: obliquus autem rursus post hęc profertim ac sursum progressus, in caput totius demum dispergitur. Quod autem ex secunda ipsa coniugatione iohi pergerat, in propinquo omnes musculos est distributum; à quibus primorum spoodylorum motus, tum inter se, tum cum capite sunt. Ceterum egreditur secunda hæc coniugatio, ab vtraque ipsius acanthæ parte, ex regione inter primū & secundum spoodyli media. Tertia verò nervorum, qui à spinali medulla oriuntur, coniugatio, ex cōmuni foramine secundi & tertii spoodyli emergit, musculisq;

Spinam totam esse divisam in partes omnes squales, per decimum spoodylum.

Vertebrae superiores decimas, habere acclivas quidem productiones, convexas acclivas eas, concavas inferiores aut decimas, ceteras.

Colli spoodyli primum posterior productionem non habet, foraminibusq; obliquis.

atq; vbi

etiam

Colli vtrunque spoodyli æqualis portio omnis ad viam nervi coadulit.

atq; vbi

Natura inferioris crassa formanda vertebra.

atq; vbi

etiam

Prima coniugatio tenus, ob idq; ex ipsa portio capiti distribui nequeat, ex secunda coniugatione natura id efficit.

Secunda.

Tertia.

genas mouentibus, & illis qui collū totum cum capite retrō erigunt, distribuitur. Pars verō ipsius quæ profram fertur, secū dē & quartæ coniugatori miscetur. Nam tertiā & quartā coniugano, nervi communibus colli & capitis musculis suppediat, ac præterea musculus genas mouentibus, quemadmodum certē & partibus omnibus quæ sunt post aurem. Quinta coniugatio productionem habet, quæ quantas spondylas cum quinta coniungitur. Distribuitur autē huius quemadmodum & prædictæ. Pars tamen ipsius quedam retrō per profundum fertur in communes colli & capitis musculos: alia verō pars anteriorum in majculos genas mouentes, & caput in claudere: sicuti alia & sexta, in mediam prædictarū partium, ipsam, versū scapularum summam, fertur, iuxta radicē autem nervorū, pars eius vtriusque vicinarum coniugationum, sextæ videlicet & quartæ, miscetur: & qui nervus à quartā ad ipsam descendit reuoluit, in manifestā certius parti eius misceri, quā maximā portionem ex eius loci spondylis, nervus diaphragmatis colligit, vtriusque vni, qui sub membranas thoracem sepientes fertur. Sextæ post hanc coniugationis, sub quinto spondylo excidentis, missio fit magna cum propinquis vtriusque, sed plurima eius pars ad finem scapularum extenditur. Anger autem quodammodo partibus anterioribus & diaphragmatis nervum, quemadmodum & alius omnibus eius loci spondylis propagines quoddam exiguas mittit. Septimæ coniugationis, quæ ex comuni sextæ & septimæ spondyli oritur foramine, magna sit permixtio cum proximis. Ea tamen pars summi mixtum extendit ad brachium: quemadmodum, certē & ab octaua coniugatione, quæ post septimū spondylum oritur, maxima pars in vnam pervenit. Sicuti nona coniugatio, quæ post octauū spondylum præcedenti miscetur, pars non exigua ad manus extremas pervenit: qui nervi circa primum intercostale spatium minimum locum occupant, quod primæ etiam costæ finitimum. Ob idque post septimum spondylum utraque cepit thoracem effingere, quod ea coniugatione: quæ est post octauum spondylum, ad vtriusque poterat, ad primum scilicet inter costas spatium & manum. Ad diaphragma etiam mirabiliter admodum nervos ex spinali medulla colli, & ad musculos intercostales ex singulis propinquis spondylis, deduxit. Ea tamen septi transversū signa rotunda, siue verō obliqua, partibusque anterioribus ac superioribus ad pectus pertingit: inde retrō semper ad dorsum fertur, donec spinam contingat, cui adhærescit ad lumbum. Caput autem eius, ad quod annexatur fibre, & in quod ipsi nervi descendunt, in medio eius consistit. Quam ob rem diaphragma solum, etiam partium quæ sunt sub clavis, nervos ab spinali medulla colli recipit, membranas thoracem dissecantibus, & ab illis: aliarum verō inferiorum nulla. Melius siquidem fuit spinalem medullam thoracis, nervorū propagationes ex propinquo omnibus quæ illis sunt, suggerere. Ob eamque causam à nervis quæ singulis infant spatium intercostalibus, portio nō exigua per mu-

sculos ad externa excidit. » Thoracis radices autem costarum, in instrumenta quæ sunt ad spinam, disperguntur. Post verō, prope convexa maximè singularum costarum, in corpora thoraci circumfusa, veluti & prope pectus, partibus quæ illis sunt, disseminantur. Homini igitur, ac similibus, collum ex septem spondylis iure est compactum: quum eiusmodi magnitudo laryngi, primo instrumento vocis, conveniat, ex eorum partibus omnibus, quas à spinali medulla colli præterit, nec nos recipere, recipiant quod satis est. Quum autem nec respirano, nec vox possit sine thorace fieri, cuius prædictis indigent cor ipsum atque pulmones, in illis certē structura hos quatuor scopos sibi natura proposuit, vocem scilicet, respiranoem, ut nam cordis, rum pulmonis magnitudinem: Sequitur quippe per arteriam asperam generatio pulmonis, sic magnitudinem huius, magnitudo thoracis. Quin & cor positionē & magnitudinem in thorace sibi congruentē obtinetur. Nec manus thoracis, qui quidem ex duodecim vertebriis constat: quæ verō has deinceps sequuntur quævis spinæ vertebre, eadem ratione sunt factæ, quæ illæ quæ sunt in collo. Nam qui nervi qui à spinali medulla proficiunt, in spinas atque hypochondrii musculos diaduntur, primas quidem productiones oportuit ad eas partes mittere: post autem, & ad crura: ac tum ossis crurum oriri, quod simul quidem veluti fundamentum quoddam spinæ futurum esset, simul autem ossa coxendicum atque ilium incumbentes sibi, excepturum: sine quibus nec pubis ossa constare poterant, transiit ad scichion dearticulatio omnino non fuisset. Horum enim primorum grana, tum autem vteri, velicæ, atque intestini recti ossa larem, siue sacrum molita est natura. Per cuius quidem foramen primum qui nervus excidit, ut qui indecurs feruntur, miscetur. Proinde coniugationes quæ sunt sub diaphragmate, nervorum à spinali medulla proficiuntum, quæ ad musculos prædictos & crura feruntur, quinque quidem spondylis eguerunt: sexta vtriusque ex excipit coniugatio, primis ossis magni foraminibus. Sunt autem & alie tres in eo coniugationes, quæ in partes superiores distribuntur. Constat itaque collum merito ex septem spondylis compingi, thoracē ex duodecim, lumbum ex quinque. Porro os sacrum cum vltimo articulatū lumbis spondylis, ad finem cartilagine habet quandam epiphysim, ut multo difficilius patiatur. At verō validum ligamentum anteriores omnium spondylorū partes valdissimè colligant, desinit posteriori quidem parte in tunicam meningis spinalis medullæ ambientem: anteriore verō, paulum progressum, vtriusque parte inservit in cartilagine, quæ spondylis iungit. Ceterum spondyli omnes ab ea connexionione, quam parte anteriore habent retrō progressū, paulatim à se diducuntur, locum omnem medium repleti habentes humiditate crassa & viscosa, quæ ad monentem facilitatem conducit. Meninges autem vellicentes spinalem medullam, cerebri involucre similitudine referunt, nisi quod crassa medulla spinalis meninx, vndeque tenacem tangit & comprehendit. Sunt enim cū communis spinali medul-

Collū ex septem spondylis constitutum.

Larynx primum instrumentum vocis.

Thoracem esse necessarium vocis atque respiratioem.

Scopi qui propius sibi natura thoracem faciunt.

Thorax ex duodecim vertebriis constat.

Collū & larynx.

Ossis sacri & larynx.

Pubis ossa.

Os sacrum.

Lumbi ex quinque spondylis constanter.

Vertebrarum ligamentum.

Humiditas per thoracem.

Quarta.

Quinta.

Sexta.

Septima.

Octava.

Nona.

Costa prima sunt maxima.

Septi transversū figura, ut sit.

Spinalis medulla que suis extremitatibus cum cerebro, & quae etiam utriusque propria.

Cerebrum pulchrum.

Spinalis medulla cum pulchra.

Spinalis medulla terrena uero.
Spondyli vertebrae, quae vna inferantur.

Spondylorum spondyli omnes, quod vna inferantur.

Scapularum spondyli.

Thoracis spondyli, quae vna inferantur.

Spinalis medulla, quae vna inferantur.

Spinalis medulla, quae vna inferantur.

Classicalium spondyli.

medullae cum cerebro, quod corporis substantia sit illi haec similis, & nervorum etiam principium exiit. Propria autem, quod quod cerebrum pulset ac moueatur, quanquam ossis immobili delitescens, ipsa tamen non moueatur, tamen a mobilibus vertebribus continetur. Non ab re igitur duae meninges ipsae similiter fuerunt datae: altera quidem ad vasa quae ipsae insunt, colliganda, totamque eorum substantiam, quae mollis est admodum, constringendam: altera vero quae tegat, & aduersus ossa circumfusa muniat. Ossis etiam ipsa extrinsecus sunt attributa, vel utri propugnaculum atque murus, contra iniurias extrinsecas. Priuatim vero utriusque, quod cerebrum quidem pulsabat, crassa meninx tantum ab eo discessit, quoad ipsi, dum dilataretur, fuscipiendo esset satis. Quod vero spinalis medulla non pulsaret, crassa meninx cum tenui vndique se coniunxit. Quod etiam capitis ossibus conspicuus nulus motus inesset, spinalis autem medullae ossibus vehemens, cerebro quidem nullum extra crassam meningem aliud operimentum fuit circumdatum: spinalis autem medullae, tertia illa fortis atque nervosa tunica: cui etiam viscidus ille humor est circumfusus, ne assiduus mori excideret. Singulis autem spinarum partibus ab adiacentibus vasculis, per foramina quae nervos ipsos deducunt, propagantes natura suppeditantur, vnam singulis spondylis coniugationem tamen magnitudinis, utrinque corpora omnia spondyli circumiacentia, diuisi plane queat. Sed quoniam coniugatio nervorum vna ex singulis spondylis enascetur, planum est, quod ipsorum numerus, venarum & arteriarum numero aequalis erat futurus. Ceterum parvis quidem spondylis praedita duo foramina satis esse possunt, per quae intro quidem venae & arteriae, foras vero nervi ferantur. Magnis autem, non haec modò, verum etiam quae vasculis nutrituris seruirent, natura decenter est machinata. At vero scapulas ipsas, primò quidem propter humeri articulationem, deinde autem ex abvntanti, propter partium thoracis, quae illic sunt, custodiam, excogitavit natura. Thorax siquidem respirationis est instrumentum, non minus quam pulmo: cor autem vitae principium. Quia igitur thoracis partibus posterionibus non aderat nobis oculi, quibus pervidere vocatur liceret: ne omnino negligenter, natura regionem illam vallo quodam spondylorum, atque productionum spinarum, munivit, quibus sursum porrectis, primum quidem scapulas utrinque applicuit, deinde carnis copiam apposuit. Ad haec leviter superiorem spinarum fluxum adaugens, rectumque illum attollens, atque ibi clavi coniungens, angulus, quod vocant, effecit, tum humeri articulationem, tum brachij, capiti, atque adeo scapulae ipsi praesidium, & firmamentum futurum. Quod si inter os pectoris & spinarum finem, quae ad scapulas est, connexa clavis non fuisset, nihil utique prohiberet, quo minus os lorum scapularum, nullquam stabilitatem, thoraci cederet, coarctaretque ibi humeri articulum, multòque motus brachij impediret. Non temere autem natura in homine quidem humeri articulum longissime a thorace ab-

duxit: in quadrupedibus vero, proximè collocavit: quod in illo quidem manus ad varios usus servientes, spatiofium locum desiderant in brutis autem nequaquam, quod in eis anteriores artus tantum ambulationi subserviant. Merito itaque homo, ne si velit quidem ambulare quatuor artibus queat, quod in ipso scapularum articuli longe sint a thorace abducti. Merito etiam simia, ut in ceteris est hominis imitatio ridicula, ita & in artibus. Ceterum quemadmodum simia, quod animam habet ridiculam, corpus ob id habuit ridiculum: ira homo, quod animam rationalem haberet, ob id etiam corpus solum later ex quae sunt super terram, habuit diuinum. Porro iuxta iugulum ipsum est clavis, convexa quidem foris, intrus vero caua: quod videlicet locum his instrumentis praebet, quae per illas partes feruntur. Vbi vero a iugulo caput discedere, tantum passatim anteriorum redit, vique ad humeri summam, quantum finis particulae ipsius clavis intumescens, retrò secesserat. Colligat autem ibi brachij spinarum, os parvum & cartilagineum scapulae. Quum autem manus tota ad multos ac varios motus comparata esset, caput quidem brachij rotandum habere ipsam oportuit, cautatem vero ei subditam, nec magno perire profundam, nec in magna supercilia finem tene. Quia quidem structura ad varias motiones apta, quum constet humeri articulus, parum abest quin assidue brachij caput laxetur, quippe quod cauitate adeo exigua velatur, ut parvis ipsius magna extra sit, in illoque innixa sublimis pendeat. Cui discrimini occurrentes natura, tria ligamenta valida, os brachij cum scapulae ceruicis iungentia, praeter commune omnium articulorum, rotandum est machinata: duos praeterea scapulae processus recurvos, qui articulum muniunt, atque ex utraque horum parte, musculi ipsam maximò constringentes. Quorum trium ligamentorum duo quidem prorsus sunt rotunda, tertium vero leviter latum. Enascitur autem, primum quidem ex fine apophyseos, quae anchoram refert, internis brachij attenditur partibus. Alterum vero, quod hoc est maius, ex ceruice scapulae, qua parte superciliis cauitatis illius est altissimum: atque hinc caput brachij sedem praebet firmissimam, sua lata fissura. Reliquum denique & tertium, ex eodem loco, quo secundum, oritur obliquum autem sub eo inferitur & ipsum in primum capitis brachij initium, quo modo latum ligamentum, quod in orbem articulum totum complectitur. Quae ligamenta duo, ad musculum brachio incumbente perveniunt, quem roborant. * Munitor humeri articulus, a scapulae etiam processibus superioribus, nempe ab illo qui est ad summam humeri (quae corniformem appellant) & ab externo, qui anchorae est similis: necnon a maximis musculis tendentibusque, qui totam mouent articulationem, constringunt vndique: quorum muscularum finis ossi brachij insinatur. Ceterum ad pectus brachium adducit, leviterque trahit deorsum, is musculus qui iuxta mammam oritur, magnitudine medio cruris. Alius autem contra, ex aduerso enatus pectoris brachij, adductionis sursum est

Humeri articulus, cui os humeri quod longissime a thorace abductum.

Simia est hominis imitatio ridicula.

Simia, quod animam habet ridiculam, corpus solum later ex quae sunt super terram, habuit diuinum.

Humeri articulus, cui os humeri quod longissime a thorace abductum.

Classicalium spondyli.

Humeri articulus, cui os humeri quod longissime a thorace abductum.

Humeri ligamenta tria.

Scapulae processus, qui recurvi.

Brachij motus, a quo os trahitur musculi.

autor. Tertius præter hos geminus, aut ex duobus coalescens, à toto pectore esse exortus, æquabiliter ad illud totum brachium adducit, si vterque tendatur. Nā altero solum agente, aut deorsum, aut sursum, modicè motus brachij inclinabit. Porro musculus ille, qui à sublimi pectoris parte iuxta clauem oritur, duo habet capita, interius quidem paribus epomis insertus, externis autem adhaerens inferius scapulae paribus. Ac solum musculus huius tensi actio, brachium extensorium extendit: alterius verò, qui ad clauem peruenit, versus interiora convertit. Tensis autem æque foriter ambobus capitibus, brachium rectam planè ac mediā extensionem assumit. Atque alij enī duo musculi, vtriusque spinæ, quæ est ad scapulam, parte, similem prædicto habent actionem. Octauus verò alius vltra prædictos est musculus, qui ortus * à maxima parte inferioris, qui in scapula est, lateris, brachium extensorium adducit, iis qui sunt ad pectus, oppositis, qui brachium sursum attollunt. Dux sunt post hanc musculorum motiones, brachium extensorium ac deorsum circumagentes: verum amplius quidem extra adducit musculus, * qui ab inferiori ora lateris, quod in scapula est, proficiscitur. Nam qui scapulae partem simam complectitur, minus quidem extra, sed deorsum magis brachium circumagat. Reliquus verò alius vnus est musculus, qui deprimit, ipsumque retrò agit: cui prædictus musculus parum succedit, qui efficit ne brachium dum deprimitur, vllam in partem incinet. Con-

Brachium attollens et circumagites non solum esse roborem animæ.

Scapularum motus à quibus proficiantur motus.

vt qui ligamento articulationem totam continens inferatur.

GALENI PERGAMENI de vsu partium, lib. XIII.

Quoniam ipsarum animalium partium, nonnullæ quidem ad viuendum sint necessariae, vt cerebrum, cor, & hepares: aliz ad viuendum commodius, vs oculi, nares, & manus: atque aliz denique ad institutionem generis, vt pudenda, testes, atque matricis: de his quidem vltimis hoc libro agendum est, quandoquidem superius res illas iam explicuimus. Ergo natura, si fieri potuisset, maximè optasset suum officium esse immortale. Quod quum per materiam minimè illi liceret, subditiū quod potuit ipsi ad immortalitatem est fabricata, sapientis cuiusdam vrbis conditoris exemplo. Quamquam nulla ciuitas comperitur adeo floruisse, vt non ipsa excedens veritatem, memoriam conditoris deleuerit. Natura verò officium iam multis annorum millibus constitit, atque stabit perpetuò. Nam mirabilem quidam rationem inuenit, qua in demortui animalis locum, nouum aliud sufficit. Omnibus siquidem animalibus natura concipiendi instrumenta congruenta tribuit: ipsi quoque instrumentis eximiam quandam vim voluptatis efficitricem: animæ verò ipsis viuræ, incredibilem vtendi cupiditatem cōiunxit: à qua animalia incitata, stimulatæque, etiam si rationis experia, etiam tenera sint, provident tamen non secus, ac si prudentissima essent, vt genus suum sit superstes. Porro in femineo sexu matricis ventri subiecit, qui locus est tum ad vsum veneriorum, tum ad recipiendam spermam, nec non ad incrementum foetus, & perfectum exitum, opportunissimus. Et tenim collum matricis, in pudendum muliebre definit: quod quum animal concepit, adeo ad vnguentum clauditur, vt ne minimum quidem aut intus foras laxet, aut foras intro recipiat. In colli autem eorūque patet ac tenditur, vt semen per latam viam progrediens, facile in matricis sinu perveniat. Plurimum etiam & in partu distenditur, sic vt totum embryonem facile ea via expellatur. Quare meritis à natura factum est nervosum simul ac medio criter durum, vt citra noxam plurimum contrahatur & dilatetur, dirigaturque ad excipiendum semen. Nam si præ molliore in seipsum concidens, plexus quosdam efficeret, ab iis semini prohiberetur, quo minus ad sinus matricis perveniret celeriter, ac sic humor spiritusque à se mutuo separarentur, quos tamen collare est necesse, hanc qui dem vt motus principium, illum autem vt materiam ad factum generationem appositam. Exterum sanguis mensuram nequitiam prima est materia, atque gignendi animalis propria: sed quum feminis humiditas à calore infuso & ducta, tunicis matricum incidit, non secus ac pinguitudo facile agglutinetur. Atque inde vno temporis momento multa fiunt, eorumque admirabilia naturæ, circa animalis generationis principium, opera. Nam matrix ipsa quidem celeritè vndique semini adhæret: collum autem totum conniuit, & eius maximè officium internum. Qui igitur humor matricis asperitatem illinit, non superficiei internæ subtenus, membrana tenuis efficitur, Interea autem spiri-

Particularum tria genera.

Natura officii perpetuū.

Concipiendi instrumenta. Generandi opportunitas vincta, si animalia huius infusa.

Matricis foras oportuū finis.

Matricis collum.

Matricis collum ut nervosum, ac medio criter durum.

Spiritus esse motus principium in ipsa generatione.

Sanguis vero est prima materia, vt nomen animalis propria.

Generandi officium.

tus undique ad vnguem referentur, non elabitur, sed motus naturales primus oritur. Ar vero quo tempore nec semen intro, nec factus extra fertur, matricis collum in flexus & contorsio-
nes concidit: quæ ne matricis regio perfrigeretur, plurimum habent mœnem. Nec enim alia ratione in mentibus purgationibus partubusq; mulieres refrigerantur, quam quod tunc matricis collum sit rectum, referanturq;. Porro in animalibus numerosos factus gestantibus, natura fecit sinus matricis plures: in homine vero, ac cuiusmodi, quemadmodum corpus totum est geminum, ita & matricis sinus est duplex, alter quidem in dextris, alter vero in sinistris locatus. Si quidem quæ ob corporis imbecillitatem, brevioris vite futura erant, aut etiã præda fortioribus, his animalibus omnibus assidui interitus remedium excogitavit natura, facundam scilicet generationem: semper receptaculorum matricis numerum, æqualem numero mammillarum præscribens. Mammis autem lac tunc accedit, quo tempore iam absolutus est factus. Nam quum tenera adhuc sint atq; imbecilla recens nata animalia, nec possint solidos cibos conficere, alimentis ob id natura eis comparavit, perinde ac si vtero adhuc gestarentur. Quibus vero animalibus propter corporis siccitatem superfluum humor subnutriti non poterat, ut volucris omnibus, ita natura precipuum quandam amorem in ea quæ procreantur, ingeneravit: quo impulsu, bellum pro pulvis cum ferocibus animalibus, quæ antea declinabant, suscipiunt intrepidè, victumq; illis convenientem suppeditant. Virginitas matricis dux mulieribus in vnum collum desinentes sunt factæ, ita & vbera duò, utrumq; sue matrici, insitit minitri boni, subseruiens. Vnde Hippocrates ait: Si mulieri geminos gerenti, mammarum altera gracilescat, si dextra quidem, masculi: sin sinistra, femine abortum faciet. Si quidè mares in dextris, femine in sinistris maiorem partem locantur. Etenim exigua, dum factus augentur, sunt mamme, quo modo etiam matricis. Quum autem perfecti fuerint, & pariendi tempus insitit, simul cum matricibus, quod satis est intumescunt. Matricis itaq; partes sumi, sperma recipere, atque factum absolvi: mammarum vero, quod iam natum est educare. Quod si animalia attentius discueris, reperiens in his quidem quæ adhuc augentur, vesicas matricibus multò maiores: in perfectis autem, matricis vesicis. Vesica namq; ad portionem omnium aliarum partium augetur, ut quæ omnibus ætatis æqualiter seruiat: matricis vero, nec dum augentur adhuc animalia, nec quum iam consenscant, ritè actionem suam potest obire. Siquidem alimento benigno abundanti fertibus opus est, cuiusmodi in solis floribz abundare potest: quum in declinantibus quidem, alimentum non ritè coquatur: in his autem quæ augentur, quamvis rectè concoctum sit, in nutritionem & auctiorem totum id absorbetur. Est autem femina mare imperfectior, vna quidem & prima ratione, quia frigidiore. Siquidem in animalibus calidum est magis actiuè frigidum. Cæterum omnes quæ viris insunt partes,

in mulieribus etiam reperias, eo discrepantes duntaxat, quod in mulieribus quidem ipse insus sunt condite, in viris autem extra pendens, iuxta nuncupatum perinæum. Quod si mulieres quidè partes evertas extrosius, vires autè intro reuertas, replicesq;, invenies omnes inter se similes: cuiusmodi & in talporum oculis si mere licet exemplum. Hæ cum vitreum & crystallinum humorem, & præterea tunicas his circumdadas, nò minus habent, quàm animalia quæ videntur oculis. At neq; eis aperti fuerunt oculi, nec foras prodierunt, sed imperfecti fuerunt relictis. Sunt enim animalia naturæ vana. Aha quippe non longè recesserunt à plantis, suntq; ea animalium omnium imperfectissima, sentia vnicotactis prædita: ut ostreorum plurima. His recesserit amplius, quibus gustus inest: his adhuc amplius, quæ odoratus instrumentum fortunantur. Quibus adhuc multò magis, quæ instrumentum ut audiendi sunt prædita. At perfecti proximis sunt, quibus præter hæc omnia, addit visus. Solis autem hominibus ratio inest, qua diuinius nihil mortali animali est concessum. Sic ut igitur homo animal est perfectissimum omnium, sic tantò est formidina imperfectior mare, quanto frigidiore. Genitalia autem eius, formata intus fuerunt, dum ipsa vtero adhuc gestaretur. Quum enim extare & foras propulsari præ caloris imbecillitate non possent, ipsum quidem animal quod cõformabatur, imperfectius eo, quod vndiq; est absolutum, reddiderunt: quam imperfectiorem tamen consequuta est vtilitas nò aspernanda, ad instaurandum humanum genus. Nam quum factus ipse materiam copiosam posuisset, tam ad primam sui constitutionem, quam ad omne incrementum, si calidissima quidem ipsa femina esset, vtiq; discuteret talem materiam, nec sinneret coaceruari eam: quemadmodum si impenpense frigida, ne humorem quidem ipsum concoqueret. Frigidiorum igitur eam cõvig fieri satius fuit, quoad alimentum quod concoxisset & cõfecisset, discutere totum non posset. Hæc itaq; est frigiditatis femine vtilitas, quam mox sequutura erat partium imperfectio, quam ipsæ præ caloris imbecillitate prorumpere foras non possent. Quod commodum ad instaurandum genus, est secundum ac maximum. Nam si extra prodierunt, scrofum vtiq; extitisset: quod quum intus iam delitescat, matricum substantia est factum instrumentum semini recipiendo, ac retinendo, factui præterea alendo, ac perficiendo, aptissimū. Statim autem & testiculos femina erat habitura minores, imperfectioresq; quæ sperma in ipsis, tum parcius, tum frigidius, lumini diuisq;. Sequuntur enim hæc quoq; necessarii caloris penarii. Non igitur semen eiusmodi, generando animali satis esse poterat, licet in eam rem fuerit & ipsum vtile. Mas vero quāto est calidior, tantò ipsius testiculi extiterunt maiores. Semen autè quod in ipsis gignitur, quum sit summe coctum, principium effectuum est animalis. Ex vno itaq; principio, ab opifice sapienter invento, iuxta quod femina mare fuit imperfectior, nata sunt omnia, quæ ad animalis generationem pertinent: tum quod muliebres par-

Muliebres par-
tes in pedibus, vi-
ribz, esse simi-
les, nisi quod
sunt inanes.
Talporum ocu-
li in infans im-
perfecti.

Natura anima-
lium varia.
Animalia vni-
cotacta imperfe-
ctissima.

Ratio inest soli
hominis, quæ de
omnibus animalibus
mortali-
bus est cõmissa.
Genitalia & femi-
næa formata
intus formata,
quia in vtero
per imbecillita-
tem caloris foras
propulsari
non possunt.

Frigiditas fe-
minæ vtilitas

Testiculi femi-
næ & testes
minores.

Testiculi ma-
sculini calidiores
respondebant
seminis masculi
esse principium
animalis.

*Totum fucus
marinum fuit.*

*Scrofum humi-
ditatem quam
matrem cau-
flant, ubi rati-
lucet, partes
excitant ad co-
gendum, volu-
ptatem maxi-
mam concitant.*

*Semen sub-
stantia.*

*Semen femi-
næ quo pelli
generatur.*

*Totum vitellum,
quod habet
lucet, car fœtus
excitant con-
coquant.*

*Partes omnes
abstrahunt fi-
bripis affimi-
lari.
Semen carnan-
dolum.
Fœtus in fi-
pium mœdum
tur fœtus.
Mentum emi-
pitum a te-
stibus fœtus, in
plantamem.*

*Et vitellus ergo
normis fœtus
interius ad fœ-
tus extrinsecus
modum.*

cum quidem fundum prætervehunt: laterali-
bus verò ipsum partibus postea invectæ, in
duo duarantur. Tum autem pars alia illinc
lateralibus ad feminæ testes secedit, qui & ipsi ma-
tricibus videntur. Altera verò in fundi progres-
su, multipliciter tota in ipsum distribuitur. Com-
mittuntur autem hic sinces vasorum, quæ in sin-
istrâ sinâ matricis divisa sunt, cum sinibus eorû,
quæ in dextrum eiusdem sinum sunt distributa.
Quo fit ut dextra etiam matrix assumat scrofam
humiditatem, quinvis exigua. Siquidem nõ
solum auger in sinistris partibus frigiditatem ea
ipsa humiditas, sed etiam cum spiritu iuncta, ubi
incalcescit, atque evacuat postulat, acrimonia &
mordacitate sua, omnium maximè potest partes
ipsas excitare ad agendum, voluptatèq; in-
credibilem interim dum agunt, præbere, acrium
humorum exemplo, qui delitescunt sub cute,
maximum etiam pruritus inferunt, ac suo mo-
tu voluptatem non exigua inducunt. Sunt au-
tem genitales particule longe, quàm cutis ipsa,
sensibiles, ac proinde maiori voluptate affi-
ciuntur. Semen igitur (cuius humiditas crassa,
viscosa, spumosa, ac vituli spiritu plena existit)
quando in proprium locum incidit, principium
fit animalis generationis. Quum autem in alicui
excitatur & constabescit mirum expirante
quidem repente spiritu, confidite autem hu-
miditate viscosa. Causa generationis feminæ
feminis, est huiusmodi. Ex his vasis quæ ad ma-
trices accedunt, pars illa quæ fertur deorsum,
volvitur, modo per similes vasis, quæ in testi-
culis masculorum perveniunt. Itaque superiacens
quidem vena, subiacens autem arteria, utraq; in-
flexas numerosos atque aequales torquetur: in
quibus plexibus sanguis & spiritus qui ad testes
descendunt, diffusimè concoquantur. Testes ve-
rò quâ sunt laxi, canerosi, excipientes humo-
rem qui in vasis capis erat concoqui, viriles
eum & ipsi percoquant: perfectus quidem ad fœ-
tus procreationem, viriles testes, maiores & cali-
diores quum sint, geniturusq; magis elaboratam
exopiant: imperfectus autem muliebris,
vipote minores, & frigidiores, excipientesq; hu-
morem non visquædeo concoctum. Quum igitur
omnes particulæ alimentum fibripis assimilant,
mirum esse non debet, si tunice vasorum albæ
existentes, sanguinem in formam fibripis simi-
lem, propter longam moram, immanent. Quum
autem matrem quidem semen ioras exaculant, fœ-
tuum verò in seipsum, oportere: ob eam cau-
sam & vasa quæ a testibus semen excipient, in
manibus locant ad pendendum exportem natu-
ra, & ad meatum per quem etiam lotium emitti-
tur, officio adaptant: in feminis autem tum in
ipsis matres inferunt, tum constituit, ut in capa-
tatem internam semen excernerent. Ad huc et-
iam, virile vas spermaticum, latum ac longum exi-
stens, quum iam prope pendendum accesserit,
contrahit veluti quosdam sinus: ac muliebre, si-
militer angustum ac breve, quod nec multum, nec
crassum semen deducitur, ut illud, esset. Ad
excernenda ea quæ continentur in vasis, ipsa par-
tum genitalium veluti convulsio quedam, quæ
in coitu venereo accidit, hand exigua habet

momentum. Nam quod in morbo comitiali, &
gonorrhæa, contrahant vasa testiculorû, ob
id etiam coguntur semen ipsum exprimere. Iam
verò muliebre semen, præterquam quod con-
fert animalis generationi, etiam ad voluptatem
in coitu exorandum conducit. Est autem virile
semen membranarum atque vasorum omnium
origo. Ipsum quippe a statum concoquitur, atq;
inino ex muliebris nutrimento, tanquid natu-
ra sit familiare magis quàm sanguis. Quicquid
enim nutritur, a similibus augeri facilius potest.
Porro qui humor in illis corporibus glandulo-
sis gignitur, quæ utraq; parte colli venter locata
sunt, is in meatum vrinarum effunditur: atq; in
masculis quidem, vni cum semine in matricem
delabatur: in feminis autem, & ioras, & in mulie-
bre pudendum erumpit. Vultates autem qui in
seu utroque sunt, quod ad venerem excitet,
in coituque delectet, ac denique meatum vrina-
rium madore suo perfundat, habilioremq; ad v-
rinæ transitum reddit. Cuius humoris virtute
etiam ipsi spandones voluptate inter motum
fruantur. Effluit autem tunc feminis, quum ve-
hementer oblectantur in coitu. Quo tempore
qui concumbunt, circa pudendum sibi eum ef-
fundens percipiunt. In masculis autem propria
& præcipua eius virtus est, qualis feminis existit in
seminis. Sunt enim inter se specie simillima, mu-
liebre semen, & humor qui glandulosi marium
corporibus inest: quum & robur & calor ma-
sculorum, detentum in his partibus humoris ita
concoquat, ut nihil ei ad feminarum semen de-
sit. Unde & meatus qui ex his corporibus pro-
ducuntur, non dubitant nonnulli vasa sperma-
tica nuncupare, & aures glandulosos: sicut &
varicosos aures, eos qui a testibus explantantur.
At in feminis ille humor, tenuis atq; crudus
existit, in epinis ad gignendum. Verumtamen ve-
rò quæ semen matricibus sit succus familiarissi-
mus (cuius recipiendi grana existunt): idip-
sum duplex habet, ad virile quidem trahendum, ma-
trici collum est destinatum: ad semen autem a
propriis trahendum testibus, comparata ipsa
cornua fuerunt: quæ propterea sursum ad illa
spectant, paulatimq; arcata desinunt in angustis-
simos fines, testiculos qui e directo sunt, coniu-
cti. Quod autem eò pertingit vas, marium sper-
maticis vasis quadam proportionem respondet.
Cui insunt etiam & muculosa corpora, quæ ad
testiculos ipsos descendunt, qualia in masculis a
masculis hypogastri oriuntur. Quæ autem testicu-
los, sic vasa spermatica, in maribus oportere
esse maiora, ac testes ipsi utrimq; pudendi radici
adhærere, longum quendam viæ circuitum ip-
sis vasibus excogitavit natura: ea primò duces sur-
sum ad illa sursum autem per interna deducens,
ad eum vig locum unde pudendum enascitur,
ubi semen erant eructatur. Quo loco multis re-
bus ea contrahens, varicosas efficiens, plu-
rimamq; amplificans atq; dilatans vndiq; pro-
ventus feminis sic præparatur quamplurima re-
ceptacula. At feminarum testiculos, quum parui
penitus existentes, vasa etiam exigua productu-
ri essent, loco, quæ nunc possident, opportunissi-
mo sunt locati, utraq; quidem matricis parte po-

*Sem virile est
membranarum
& vasorum
omnium origo,
sem virile a
muliebris ali.*

*Humor gigni-
tu glandulo-
si corporibus
vires, virile
que ad venerem
excitant, vnde
delectet.*

*Spandones inter
motum qua
ratione velle
platefruantur.*

*Aures glandu-
loso
Aures vari-
cosas.*

*Semen est, succo
familiarissimo
Cuius collum
est destinatum
ad semen autem
a propriis
trahendum
testibus.*

*Spermaticis
vasibus
& propriis
in masculis.*

*Testiculosi fa-
minarum po-
ssident.*

Meatus à peritonæo descendens in vasis.

Vesica firm.

Matricem locari inter vesicam & intestinum rectum.

Genitalia nervi, vena, arteria, quales. Vasa sunt in testibus implantata, huius.

Serpi in nervis de tribuenda tris.

Nervi paucissimi fuisse opus matricibus, & partibus. Quæ autem matricum testiculos pertinent, Virga viridis, et collum matricis, cum plures nervi inferantur. Matrix cum tunica est. Intestini cum duplex tunica sit.

Vesica verique tunica tunica est data. Matricis tunica cum vesicæ omnes generis fibrarum.

Matricis cum nervis aut vena corpora.

fiti: paulo autem supra cornua, abducti. Præterea quo maris descendente à peritonæo, veluti fistula quadam, nutriente viriles testes vasa deduxit natura, eodè est ad spermatici vas ascensum abvia, communem tribus vasorum generibus securitate, vnum hunc marium inveniunt. Illinc autem rursus deducens, coxendicū quidem ossibus, à latere: pubis verò, ex anterioribus: offe denique lato, ex posterioribus, ipsum muniunt. Cæterum vesica prima pubis ossibus subiacet. Post hanc autem, sunt matricis in feminis. Post matricis intestinum rectum, tanquam substerniculum molle. Quum autem masculorū vasa spermatica, tendi contrahiq; magis quam foeminarum in ipso coitu oporteat, ob id etiam robustior tunica consistant. Porro ad genitales particulas, nervi quidem mediores, venæ verò & arteriæ maximæ, dupliciq; feruntur. Siquidem alterum iugum eorum, ex locis propinquis rebus in testiculos & matricis fundum (ut diximus) proficiscitur: alterum autem ex vasis, quæ sunt ad os sacrum, seu iugum, inferiōs partibus inferatur, ubi primū in feminis quidem matricis collum, in maribus autem virga, exoritur. Quandoquidè ex hac copula, inferiōres illæ partes nutriuntur. Sed nervorum etiam iugum quoddam medioce, ad illa ossis magni regione, simul cum vasis ipsius natura ad partes easdè deducit. Quum enim tres sint scopi in nervis partibus singulis distribuendis: sensus quidē in instrumentis sensibilibus: motus, in motoris: dignononis doloris in reliquis omnibus: matricibus quidem totis, & partibus quæ ad manū testiculos pertinent, paucissimis opus fuit nervis, qui in ipsas distribuere, ut quæ neq; ad sensum exactiorem, neq; ad motum aliquè voluntarium inferantur, nec sint item excrementorū meatus. At virga maris, & collum matricis, cæteraq; quæ ad pudendum spectant, quod sensum absoluteiorem possunt, venereorū ratione, merito sanè sunt plures nervi indepti. Constat autem matrix vna duntaxat tunica, quod sanguine puro atq; benigno alatur, nec periculum sit, ne exviceretur ab acerbis succis, quemadmodū ventriculus & intestina, quibus tumarum ob id est tunica duplex tributa. Quinetiam vesicæ vtriq; unica tunica est data, dura tamen & robustissima, ægrèq; patibilis, vnum videlicet ea instrumenta, ad excipienda tantū excrementa sunt destinata. Verum genus omne fibrarum tunice matricis est inditū, quod rectis quidem fibris ad sese traheatur, transversis excernere, retinere autē simul omnibus possit. Quæ verò membrana intrinsecus circumdata est matrici, vtrumq; illius finē in idem iungit. Alligantur autē matricis corporib; circumiacentibus per quædam ligamenta ita soluta & laxa, ut vntioni quidem ipsarū & concidentie facili cedant & obsequantur, eas tamen minimè avelli aut deturbari permittant. Iam verò quum collum quidem matricis, deorsum in pudendum inclinet, reliquæ totam capacitatē in ventre esse sitam oportuit. Quia autem laxi admodum testes & carnosī & molles, cum spermatici vasīs, densis, duris, & fortibus, coalescere tuō non poterant, ob id natura, non in ipsos te-

stes, sed in vocatam *Buckdypida*, mediam amborum, spermaticum vas inferunt. Epididymides tamen in formatū testiculis maximè sunt obsecræ: quæ & testicularum, & etiam vasa spermatica, admodum sunt exigua: substantiæ quorum inter se nō magno discrimine differunt. Porro marium testes humidiores sunt ac molliores foeminarum testibus, & vasa seminaria duriora.

Epididymides.

Testes marium humidiores sunt ac molliores foeminarum.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium, lib. XV.

Quum igitur duo facere animalia quæ createur, esset melius, quā vnum, pulchre mea quidem sententia, ipsarum particularum alias quidem ad recipiendum, alias autem ad excremendū semen, natura fecit accommodatas: quarum nulla sunt perfectius constituta, aut melius vīquam locari possunt. Ipsius autem transmutationis tam subitæ, quæ pudendū virile in cōtrarias dispositiones mutatur, quum venæ in causa esse non possent (sanguinis enim substantia non posuisset tam celeriter aut repletre, aut vacuari, sed aut vel spiritus) nec arteriæ etiam, ob perpetuam illam dilatationis & concidentie necessitatem: nec nervi qui à cerebro aut spinali medulla oriuntur (nullam enim habent li causatam conspicuam, nec dilatare aut contrahi naturaliter possunt) nec denique ligamenta, aut tendones, aut carnes, aut ossa, aut cartilagine: necessarium vique fuit illud corpus nervosum, quod à pubis ossibus nascitur, cauum simul & omni vacuum humore (id quod cætera ligamenta nō contingit) ut vicissim tum intrumelceret, tum mole deprimeretur. Quo pacto autem id corpus talem constructionē sitactum, si vnum anxie scrutari, convinceris quidem non intelligere, neq; tuam imbecillitatem, nec rati facultatem creatoris. Oportuit autem ipsæ ex mediis superiorib; ossibus, quæ in pube sunt, partibus, exoriri. Nam sic plarium ab ano erit ipsum pudendum diffusum, ad coniungendum locum opportunius habebit. Et enim quandoque pars aliqua caret coniuge, maiori ex parte polinonē mediam requirit. Vbi verò duarum partium coniugium adest, vtraque pars æquabiliter vult à media recedere. Porro non solum ipsius coitus causa, per venereum oportet esse exacte sensum pudendū, sed etiam quod meatus diducto ad directū, semen vibretur longissime. Siquidem si consideret aut illesteretur ipse meatus, hæreret semē. Quam ob rem quibus ob vinculum quod ad virgæ glandem habetur, meatus confortus est, q; generare non possunt. Facundia autem redduntur, vinculo abscisso. Cæterum extenditur penis, atq; in tumorem attollitur, dum spiritus erosus ille causus repletur. Iam verò in partibus pudendi inferioribus, seminis maris secundū longitudinē exporrectus, medius est constitutus. Incubatur autem huic nervus cauus. Virgæ verò horum parte, masculi duo, quod meatus ceu à manibus quibuscūq; in vtranque partem distractus, quammaximè dilateretur, toto pudendo stabili permanente. At quum vesica etiam propè confluere esset, non erat opus ad ex-

Nervi nō in se conuerti possunt.

Eractio deo persensit, pondo virilis, necessitatem fuit q; generaretur illius nervosū corpus, quod a pubis ossibus nascitur.

Coniuge carum tem partem, requirere possunt mediam.

Tristi pudendi causa.

Generare qui nequeant.

Penis quando extenditur. Seminis maris postea possit. Pudendi nervi caui.

Pudendi nervi duo.

*Esti vesica
pistina.*

*Pudendi male
lru pistina.*

*Pudendi vesicae
que epiphyse
cuius graia
struella.*

Nymphæ.

*Agmina mem-
brana.*

*Ferminata
membrana.*

*Secundarum
vesicæ.*

*Vasa que in
terma matricis
sunt alioquin
guttur.*

*Vena præter-
gressa vmbili-
ca in fima in
partu nascitur.*

*Arteria præ-
tergressa vmbili-
ca in fima in
partu nascitur.*

ad excernendum lotiū alium meatum cōstruere, sed seminis vti meatu. Quare merito collū vesicæ totum peritonium occupat, vapore sursum ab ano (qui incubat primo) visq ad pudendū exor- tum se extendens. In mulieribus autem, pudendum quidem ipsū ano incumbit in finem autem eius superiorem, collum vesicæ desinit, vnde lotium profunditur. Quod verò ad cutis epiphysin, quæ sunt in finibus vtriusque pudendi, peruenit, in mulieribus quidem tum ornamentū gratia extiterunt, tum ne matricem refrigerarentur. viris autem, præterquā quod ornamentū adferunt, carere ipsi omnino vis non poterant. Cuiusmodi autem pharyngi vna est propugnaculum, tale est matricibus, quam nympham appellant. Arterii delitescunt in vtero, tenuis quædam membrana, quam agnū vocant, vndiq est circumiecta, ipsius veluti sudorem excipiens. Huc autē extrinsecus alia tenuior incumbit, fascicularis ducta, ed vesicū visq fertur peritū, quæ visq ad horam partus in seipia lotium illius colligit. His rursus in orbem chorion, hoc est, secundæ, sunt circumfusæ, matricē totam intrinsecus subvngentes, vt per eas medas fetus matrici annexus. In singulis porrō officiis vas lotium, quæ intrinsecus ad matricem pertinent, (per quæ etiam sanguis mensuris in ipsam deferrebatur) quo tempore vtero geritur, aliud vas gignitur, arteria quidem in arteria, vena verò in venæ officio. vt sint ea quæ generantur, numero æqualia iis officiis, quæ in trō in matricē desinunt. Colligat autem ea inter se tenuis quidem, sed fortis membrana, quæ extrinsecus valis omnibus circumplexet, partibus verò matricis intertus infertur. Exiguū sane est illorum vasorū quodque, quum primum à matricē exoritur, cuiusmodi sunt arboris radices extenæ, in terram defixæ. Ea tamen progressa paulatim, per coniugationem coalescunt, ex quibus vnum procreatur, rursusq illorum singula cum singulis eiusdem generis cōiunt, siquid perpetuū, donec parua omnia in duo magna coalescant, quæ veluti stipites quidam, fortis per vmbilicū intertuntur. Quatuor itaq omnino sunt iam huc vasa, duæ scilicet arteriæ, & vesicæ totidē, nullis duæ vtrius generis inter se cōiunt, sed venis semper cum venis, arteriis cum arteriis in idem cōiuntur. Quod autē venæ ipse vmbilicū prætergressæ, in partes hepatis simas, arteriæ verò in partem arteriæ magnæ, quæ ad lumbos est, inferantur, quomodo non sit dignum admiratione. Si quidem venas videre est, ita vti vt vmbilicū superant, inter se se mutuo coire, vniq effici, quæ postea membranis fortibus cōveluta, vicinissimè corporibus colligata, recti ad viscus visq progrediantur. Opporrebatur enim ipsam prius ad venarū principium in fortu accedere, postea illinc in omnes partes distribui. Arterias autem expediebat & ipsas sine in arteriarum principium, finitrum vnde efficit cordis ventriculū inferi. Verum quum huc ventriculū à locis vmbilici vsq distaret quā longissime, nō erat tutum eas veluti pendentes, tanto tunc sursum ducere. Quare grana maioris securitatis, primō quidem ad propinquā vesicam produxit illas; dein verò per totam ipsam

(cui vinculis alligantur) tutō ad magnam vscuque arteriam, quæ à corde fuit exorta, deduxit. Quatuor itaq sunt prædicta in vmbilico vasa, duæ scilicet arteriæ, & totidem venæ, in medio sui habentes *apophis*, hoc est, vrinarium meatum, qui ex fundo vesicæ exortus, lotium in fasciculari membrana deriuat. Cæterum superioribus ipsius meatus partibus, venæ inferioribus arteriæ adhærescunt. Per quæ vasa, veluti per trancos quosdā, ex matricē trahit fetus sanguinem & spiritū. Inter hæc verò omnia, & vasa illa exigua, quæ in matricem feruntur, media est quædam cœci trunci radicans, quam chorion appellant, cuius prodigio multitudine vasorum, quæ à membrana tenui quidem, sed forti & duplici, amantur, connectuntur, & colligantur. Est autem vtilitas minime cōtemnenda illius lumbi moris, qui intra amiculum, hoc est, agnū continetur membrana. Fetus siquidem in eo quasi innatus, sursum tollitur ac velutur, vt minus sit grauis iis vinculis, per quæ matricē tractaretur. Ad hæc etiam cum partus infans, eo humore perfusus, facilius collo matricis elabitur. Veruntamen si acetabula, quæ sunt ad matricem perueniunt officia vasorum, mucore repleta fuerint, nequeunt factum gestare. At verò vt matricis capacitas tota ferui cederet, ipsaq grauida pondere premeretur minus, atq in partu etiam facile rumpere, iure natura membranas omnes, quæ ad factum spectant, efficiendæ pertenues, ex mura inter se connectione & securitate eis comparauit. Quid autem fiat excreto vrinæ, dum vesica motu naturalis circum humores quos in seipia continet, vndique tota contrahitur: addit verò infansulo delitescens in vtero ad ipsū collum vesicæ vrinarium meatum, quid potest in causā esse, cur per eum nihil loti reddatur, sed totum sursum ad vrinaculū ductum ascendat. In causā certe huius, tum latitudo vrinaculi, multis numeris maior ea quæ collo infestum recitudo maxima eiusdem, quæ ad educendam vrinā, colla obliquitate est præstantior. Taceo nullum musculū esse extrinsecus vrinaculo appositum, qui effluxum excrementorum prolibeat, cuiusmodi reperitur ad collum vesicæ. At verò maiori mensura, quā pro aliarum partium portione, hepatis in primo cōformationis tempore excedit: excedit etiam non mediocriter visq ad partum. Secundum ipsū, cerebrum, & cor, excellunt magis quā pro aliarum ratione particularum. Causa autem eius rei est, quod hepatis quidem vena principium existit. Quia igitur fetus dum formatur, atq augetur in vtero, magis eo viu indiget, quem venæ præstant (vt qui diutissime plantarū mox regatur) principium harum mox à prima generatone natura robustissimum fecit. Cerebro quippe & corde, & instrumentis quæ ab illis emergunt, vigiliæ quæ à venis præficiuntur, necessaria erat, quod ea sine sanguine, nec generari, nec augeri possint. Hepati verò ac vena, arteriarum quidem vscus erat exiguus: neruorum autem nullus, antiquam absoluta essent. At cur pulmo in iis qui geruntur vtero, est ruber: nō autē in iis qui geruntur matribus, albidus? Quia ruc nutritur per vasa vni-

*Vmbilici vasa
quatuor.
Oligoph.
Vrinaculo r-
fu.*

Chorion.

*Humeri con-
tenti in agnū
membrana,
vscu.*

Acetabula.

*Vrina excreta
quæ fuit mala.*

*Vrina feruor
cur per vesicā
collum non ex-
creatur.*

5. vna.

*Hepar est ve-
næ principium.*

*Vena vni-
ca in fima in
partu nascitur.*

*Arteria præ-
tergressa vmbili-
ca in fima in
partu nascitur.*

*Pulmo est ve-
næ principium.*

*Pulmo est ve-
næ principium.*

cam tunicā, & eam tenuem habentia, ad quā quidem ex vena caua fluit sanguis: in natis vero, occurrat quidem vasorum refectione: aer autem copiosissimus tunc incidit, sanguisque parcissimus, atque idem tenuissimus. Quinetiam pulmo tunc motu perpetuo agitur, animali nimirum tunc respirante. Quo fit ut sanguis a spiritu incisus, mordeus agitur duplici, altero quem ex arteriis habet, altero quē ex roto pulmone acquirit, tenuior adhuc seipso & mollior, ac veluti spu-
mosus reddatur, pulmonisque carnē sibi similem reddat. In scrobis itaque vena caua est in arteriā venosam pertusa. Quum autē it vāz, nempe arteria venosa, vna officii pulmōni praeferat, necessum fuit vas alterum iu arteriā vāz accōmōdari: quo circa natura id quom in magnam arteriam pertudit. Verū quom hīc vasa aliquantulum inter se distarent, aliud tertiū vas exiguum, quod vtrūque conungeret, efficit. In reliquis vero duobus, quom hūc quom murus se contingere, veluti foramen quoddam vtrius commune aperuit: tum membranā quandam in eo, instae operculi, est machinata, quae ad pulmōnis vāz faciliē respiciatur, quō sanguis i vena caua impetu assuēni cederet quidem: prohiberet autē, ne sanguis rursus in venam cauam reverteretur. Quod foramen, quampriūm animans est in lucem emissum, aut certe non multo post, coalescente membranula, conglutnatur. Pari modo id vas, quod magnam arteriam vāz, quē fertur ad pulmōnem, connectit, quom alix omnes animalis particulae augeantur, non modō non augetur, verumetiam tenuis semper efficitur, adeo ut tempore procedente penitus tabescat, atque excidetur. Quod igitur hūc omnia natura assabrefaciat, declarat singularum vīas. Invenire autem facultatem quā ralia efficiat, humani ingenii nō est. Iam vero quod os matricis, quo tempore foemina in vtero gerit, adeo constructum sit, ut ne specilli quidem cuspide in matricis collum immittere queat: quom tempus autem parienti ap-
petit (nempe quom fectus iam ita perfectus est, ut possit per os nutrirī) adeo aperiatū & dilatetur, ut integrum animal reddat: quoniam pacto id accidit, mirari quidem possumus, intelligere autem non itē. Caput autē fectus in ipso par-
tu natura primā collo matricis iudidit, tum per id alius ipsius partibus viam intulit, intelligenti nimirum contrarias hūc vias paritē it formā longe periculosissimas esse. Ceterūm hoc om-
nem admirationē superat, quod natura animalia quae in lucem eduntur, actionē omnīs partium docuerit, facultatem quādam sapientiaē ipsā sese doctam iūgeneris, quā iūstructa, sub-
ito ad alimen- tum sibi sit familiare festinant. At hominē fectus ad vtro propriū alimētū est ite in matribus contentum, ad quāz suapte cohatē mouetur. Producuntur autē postea dentes in infansulo, ne semper matris molestus sit. At quā denubus mandendi reliquā accedit, quae & ipsa
ne mine docta est, reliquae deinceps actiones omnes sequuntur. Sed de musculis articulis istis mouentibus, pauca impraeferantia dicamus. Natura solis hominibus inter pedes itia omnia, duorum crura tribuit, quae essent ambulationis organa.

Similiter vero quatuor, sed ralia dedit, qualia ad-
sunt infanti, nunc primū eis vni conant. Etenim quatuor artubus, quadripedi instat, graditur: & praeterea anterioribus tanquam manibus vtitur. At ubi homo increuit, non amplius anterioribus artubus, tanquam pedibus, vtitur. Simia vero perpetuo inter vtrāq ambigit. Ad haec, quos musculos natum ridiculos ac decuratos simia formatur, eosdē homo habet siros bellissimē, tum ad decus partium necessariorum, tum ne anus contundatur sedendo. Quā igitur articulum coxae flecti quidem oporteret crure sublato, extendi vero eodem depresso, in istaq actio eius praecipua constaret, musculos cras extendentes atque flectentes, fecit natura tum maximos, tum plurimos: secundum illos, magnitudine ac numero, eos fecit qui crurē circumagunt. Prima itaque musculorum discretio est triplex, quarum singulae in alias duas diuiduntur. Nam flectentes, extendentes magnitudine & numero sunt minores: sicut adducentes intro, foras adducēntibus. Porro qui sunt in orbem circumagunt, quodammodo sunt aequales. Est autem crurū actio, ambulation, cursum, & statio. Verūm ambulationi quidem & cursum, cruribus ipsa contrario inter se modo affectis: statio vero, inde habentibus, hoc est, fixis in terrā perficitur. Flectitur autem crur ad inguen, quom ipsum attollimus: extenditur, quā id ad terram deprimimus. Summā vero extensionem & statum vltimum habet, quom statum. Proinde natura fortibus, multis, ac magnis musculis hanc actionem cōmisit. Primum quidem ei, qui totū articulum ex posterioribus partibus regit. Post autem illi, qui ipsum excipit, quāq ab osse illūm exortus, in altissimā magni trochantēris partē inseritur. Tertiū ei, qui post hunc ab externis & inferioribus ossis illūm emergēs partibus, in primas internas magni trochantēris partes inseritur. Quarto praeter hos ei, qui ab osse lato profectus, inseritur omnibus posterioribus partibus, vsq ad summā, magno trochantēri. Sed prius omnium commemoratus, in chinabile extensionē fortē efficit, dum fectur duobus finibus sursum trahit. Nam si aliter ratiūm agat, paululum deducit ad latera. Secundus extendit simit, & fectus it caput intro retrahit. Reliquorū vtriusq, sursum quidem tendit paululum, sed alter quidem sursum extē cūcunagiē, alter autem intro paulo magis tendit, quā sursum. Aliis praeter hos est quibus muscularis, omnis qui sunt in corpore, maximus, in retnis & posterioribus partibus vsque ad genū, toti ossi femoris circumhaerent. Cuius musculi li posteriores fibrae, quae a coxendice emanant, cūcū sursum stabiliunt, extendentes articulationē dēnt. Porro qui praedictis quing musculis sunt oppositi, ipsamque articulationem flectunt, illi sunt inferiores, tum numero, tum magnitudine. Quorum supremus est rectus, vnicūq tendens ex duplici exortu, coxendice, iū summā ite parai trochantēris inseritur. Sed qui cum eo in ipsum quoque trochantērem descendit, insertatur inferius. Musculus item alius, ex partibus anterioribus ossis pubis enatus, obliquus attenditur, similem actionē cum eo habens. Tum quartus, qui

Infantes quatuor artubus quadripedium instat, graditur.

Simia gressum. Natum mox las esse sine n ducit, & de curat. Iam autem belli constructio.

Musculi crum extendentes ac flectentes ita quae flectentes it natura mai 101 & mext. mox.

Crurum afflu- que qua.

Ambulatio, cursum, statio, quomodo stat.

Crurū fectus extendit, quā ad attollat.

Musculi crum extendentes.

Venam canam in scrobis in arteriam venosam pertusa, atq. hūc in magnam arteriam.

Facilitatem invenire, quā natura singulae efficiat, humani ingenii nō est.

Caput fectus in ipso parto primam collo matricis iudidit, tum per id alius ipsius partibus viam intulit, intelligenti nimirum contrarias hūc vias paritē it formā longe periculosissimas esse. Ceterūm hoc omnem admirationē superat, quod natura animalia quae in lucem eduntur, actionē omnīs partium docuerit, facultatem quādam sapientiaē ipsā sese doctam iūgeneris, quā iūstructa, subito ad alimen- tum sibi sit familiare festinant. At hominē fectus ad vtro propriū alimētū est ite in matribus contentum, ad quāz suapte cohatē mouetur. Producuntur autē postea dentes in infansulo, ne semper matris molestus sit. At quā denubus mandendi reliquā accedit, quae & ipsa ne mine docta est, reliquae deinceps actiones omnes sequuntur. Sed de musculis articulis istis mouentibus, pauca impraeferantia dicamus. Natura solis hominibus inter pedes itia omnia, duorum crura tribuit, quae essent ambulationis organa.

quæ articulationem quæ genu inest extendit per aponeurosin, quæ perallam genu supergreditur. Verum hic quid per accidens femur flectit, utpote mouendæ tibie gratia productus: alij vero tres, prima actione. Qui verò intrò femur abducit (sunt enim duo, à partibus ossis pubis anterioribus orti) nō modo cras intus trahere, sed flectere etiam in medio crure possunt. Cui etiam actioni inserit terminus alius prælongus muscularis, qui productus ex pubis ossis anterioribus partibus, in caput internū genu insertatur. Quil etiam actione præstat, primū quem diximus musculi pars interna. Extoritur autē: nemur abducat, tum pars altera huius eiusdē musculi qui primū omnium fuit numeratus: tum etiam musculi ille, qui ab ossiflato emergens, paululum circumagitur femur. Reliqui autem alij sunt duo musculi, qui femur mouent, vnus quidem ex internis, alter verò ab externis ossis pubis partibus ortus: qui ambo circa articulum coxæ obvolunt etalescant. Atque hi omnium prædictorum musculorum soli, uterq; versus seipsum trahens, femur inuenit, ac circum agit. Nam quemadmodum ex superioribus quidem partibus oportet musculi descendat, qui cras sursum trahit: eorum verò qui ad latera mouent, intrinsecus quidem extoriti est: necesse eos qui intrò cras abducunt, extrinsecus autem qui foras: sic etiam qui musculi femur torquent & circumducunt, si in orbem conuoluantur est necessarium.

GALENI PERGAMENI de Vsu partium, lib. XVI.

QUUM autem cerebrum principij nervorum, cor arteriarum, ac deniq; hepatis venarum esset futurū, atq; hæc quidem instrumenta, æquissime simul & tunisime in singula hæc corporis partes distribui oportere: si quis existimauit natura, nec tot numero producere, quot ipse existunt particule: nec profusū multa, sed vbi maximū vnum organum, ceu truncū, ab vnoquoq; produxisset principio, tum demū ab eo progrediente, veluti ramos quosdam disperire in partes propinquas, secundum dignitatē cuiusq; quemadmodum aquam potabilem, qui huius rei sunt periti, in totam urbem distribuere. Merito igitur vena cava, quæ ex gibbis partibus hepatis sursum ac deorsum procedit, truncū biddo est similis, propterea quod corporis nostri, alia quidem pars hepate est alior; alia verò humilior. Ad eundem modum arteria, quæ ex corde emittitur, cerues pronius imparibus sectionibus bifariam esse diuisam: altera maiore, quæ fertur deorsum, quod ibi corpus sit maius: altera minore; alioribus corporis partibus distributa. Simile quippiam prædictis, à cerebro etiam productur spinalis medulla, quæ partib. omnibus quæ sunt sub capite, nervos immitit. Nulles tamen nervi: neq; in ossa, neq; in cartilaginibus; neq; in ligamentis, neq; in quavis glandulari; quarū duplex natura existit, inseritur: quandoquidem superuacaneū erat illis motum voluntarium, aut sensum tribuere. Nec verò ad epe quod

quæ vlla in re nervos desiderat, quæ ex parte pinguiore sanguinis per tenues venas insula, partibus animantis in membranis, teuiibus atq; siccis, instar olei pinguis, adhaeret. Vtas videlicet per diuturnas inedia, exercitationes vehementes, atque calores improbos, occisime resiccatas, nariua sua pinguitudine humescit. Glandulæ verò, quæ sunt veluti stabilimentū diuisionis valorum, nullis sanè ad id nervus indigent, quum nec sensum, nec motum voluntarium ad id desiderant. Quæ autem ad succos animantis utiles fuerunt comparare, quemadmodum venas & arterias nonnunquam perspicuas, ita & nervos habuerūt, vnus sensus granā. Siquidem ad voluntarium motum obuiandum, natura in animalibus vni genus instrumentorū contruxit, quos musculos vocat. Proinde quāquam nervi omnes motū habeant & sensum, nulla tamen pars alia, quæ nervos recipit, motu voluntario est prædita, sed sentit diuulsa: ut quibus, membranis, tunica, arteria, vena, intestina, matris, vesica, ventriculus, ac viscera omnia, & glandularum species altera. Quod verò & sensuum organa, nervos ad sensum flagabant, quid opus est cōmōtorare? Ceterum quibus sensu excitor sit opus, iis nervos molles natura tribuit: ut illis quæ motum voluntarium possidebant, duros omnes: quibus autem vtrāq; actione erat opus, nervorum genus vtrūq; interruit: ad sensum quidem, nervū qui pateretur scilicet, accommodans: ad motum autem, qui valentius ageret. At nervus molliū semper in ipsa sensoria inseritur: durus autem, in musculos qui ea mouent. Porro inest molliū nervus ventriculo, hepatis, intestinis omnibus, ac visceribus, quemadmodum & ex ossibus omnibus, solis dentibus tūm quod huius quæ sibi occurrūt, nudū sūt expositi, tum & ipsos vnā cum lingua sentite oportere sapores atq; diuulgare, nō aliter quā ceteras oris particulas. At verò in ceteris ipsam à subiectis partibus fibræ quædam nervorū perveniunt, quæ simul ipsam cum subditis corporibus colligat, simul etiam ei sentiendi facultatē suppediant. Soli autem oculi, propter vilitatis dignitatem, maiores & molliores, quā vlla alia pars, sunt nervos fortit, & videlicet corū sensus sit aliorum omnium certissimus. Quum igitur sensus quidem in patiēdo sit: motus aut quod nervi & musculi mouent, in agendo: optimo sanè in re ipsi quidem primo videndi instrumentū in oculo nervus molliū, mouentibus verò ipsū musculis, durus insertus est. Ad eundem modum & lingue ipsi natura duo nervorum genera tribuit: alterum quidem molle, quo sapores diuulgaret: alterum verò durum, quo multiformiter moueretur. Ad autem etiam vtrāque, nervum mollem induxit, quoniam durus auribus iis immiscuit, quæ habilitat motum aliquem erant. Mollium quoque nervorum nases etiam sunt particeps, & dentes, & totum palatū: nam hæc quoque sensu exteriori indigebant. Rursum nervi optici meatus habent sensibiles, per quos ad cerebri ventriculū perfringentes, ad oculos spiritus sensibilis desinit: quæ etiā causa fuit, cur crassū extiterint. Etenim vbi vtrūq; anterior ventri-

Adip. quibus
gibbaret.

Adip. vtrūq;
nervus dicitur.

Glandula stabilis
diuisione
valorum.

Glandula
nervus
nervus.

Glandula
nervus
nervus.

Musculi
veluti
stabilimentum
diuisionis
valorum.

Musculi
veluti
stabilimentum
diuisionis
valorum.

Nervus molli
quibus tribuit
motum.

Nervus duri
quibus tribuit.

Nervus molli
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Nervus duri
semper in ipsa
sensoria inseritur.

Femur intro
abducitur mu
sculo.

Femur extor
sum agit mu
sculo.

Femur circum
agitur musculo.

musculi

musculi

Cerebrum prin
cipium esse ner
vorum.

Cor esse arte
riorum prin
cipium.

Hepar esse ve
narum origi
nem.

Venam cava
m esse truncū
biddo.

Arteria magna
diuulgare.

Venam cava
m esse truncū
biddo.

Arteria magna
diuulgare.

Arteria magna
diuulgare.

Arteria magna
diuulgare.

Arteria magna
diuulgare.

Arteria magna
diuulgare.

Optimum ner-
uorum erit.
Nervi duri
quibus tribu-
tur partibus d
spinali medul-
la.

Vox principa-
lissima est eo
maxime anima
altissimum.
Vox cogitatio-
nis mentis est
nunciatio.
Larynx ma-
nus & compo-
sitio.
Larynx im-
pulsio sive
scilicet sive
& pulsio.

culus ad latera definit, illinc optici nervi exor-
iuntur, ipsiſq; ventriculorū ceu thalamus, pro-
pter illos nervos exiit. Ob vehementiam autē
actionis, conſiſtentia duritiei, atq; ſitum remo-
tum, ceteris omnibus partibus, quæ ſub ſacie
conſiſtunt, ſuggeruntur nervi duri à ſpinali me-
dulla, præterquam inteſtinalis, viſceribus atq; in-
ſtrumentis vocis. Quorum nōnulla quidem, vt
cor atq; os ventriculi, cum cerebro colligari o-
portebat: alia verò, q; prope ipſum ſita eſſent, ſo-
lòſq; ſenſu indigerēt, nervos molles habuerunt.
Porro quòd vox principaliffima ſit omnium a-
nime actionum (nam cogitationum mentis eſt
nunciatio) oportuit eam quoq; fieri per inſtrumenta
quæ nervos à cerebro aſſumerent. Quum igitur
larynx ſit primum & principaliffimum in-
ſtrumentum vocis, ex tribus quidem conſtat
cartilaginibus, habens autem in medio ſui epi-
glottidem, ac muſculos circiter vigin-
ti, et ſed viſi ſeruiētes, quorum muſculorū nonnulli
transverſam magis quodammodo, aliſi obliquū
habent poſitionem, aliſi deniq; rectam: ſic tamē
vt eorum quidam ſuperne ori, ſinibus ſuis infer-
nas partes quiddam laryngis moueant: aliſi con-
trā, oriātur quidem infernē, ac ſuperioribus ſi-
nibus agant: æquum certē fuit, ut qui ſuperne
deorſum feruntur, nervum ſuūque immitti: eis
verò qui ſurſum ex inferioribus partibus, indi-
dem eſſe nervorū principium, quemadmodum
obliqui atq; tranſverſi, etiam ſecundum poſiti-
onis figuram. Ac ſuperne quidem deorſum fe-
runtur, tum q; qui ab oſſe hyoide ad cartilagi-
nem ſcutiformem perveniunt muſculi, tum qui
ab ambobus ad pectus proſiſcuntur. Ab infer-
nali autem partibus ſurſum fe attollunt, qui ary-
tenoidem cartilaginē mouent. Rectū itaque
ſunt proſus quatuor, duo ad obliquum incli-
nant. Quamquam leuiter etiam obliqui ſunt, qui
ſines inferiores cartilaginis *depēdēt*, ſive ſcuti-
formis, cum cartilagine, quæ nomine caret, con-
nectunt. Quin & q; muſculi qui trium cartilagi-
num maximam connectunt ſtomachio, fibras
tranſverſas, ſed in obliquum ſpectantes, fornu-
tur. Atq; his certē natura, à ſexta coniugatione
nervos immitti, quorum alter quidem ad verti-
cem cartilaginis *hypoide*, intrō in ipſum laryn-
gem pertinet, alter autem ad tranſverſos accedit
in muſculos: à quo etiam ad muſculos ad pectus
porrectos, ſines quidam pertrahunt. Dux ita-
que ſunt hæ coniugationes nervorum, ad poſiti-
onem obliquam ſpectantium. Tertia verò eſt
alia eorum, qui ad muſculos cartilaginē ſur-
ſum tollentes perveniunt, quæ quum altius prin-
cipium poſtularēt, nō potuit à ſexta coniugatio-
ne produci. Quare à cerebro per totum laryn-
gem vtraq; parte duo nervi rectū extenduntur,
vnu ad lævum, alter ad dextram. Quū verò tres
ſuperſint in larynge muſculorū coniugationes,
maximē quidem neceſſarium ad vocis genera-
tionem, rectam autem poſitionem habentū, ita
vt capita ſint infernē, ſines autem ipſorum ſuper-
ne, quibus neceſſum erat à cerebro per par-
tes inferiores nervos ipſos immitti: natura ex
ſexta coniugatione, à qua oportuit cordi & ven-
triculo & hepati nervos etiam diſtribui, nervos

quosdam carotidibus arteriis ſtabilitos, ad infer-
nam thoracis partē deduxit. Vbi verò pervene-
runt illuc, vnde germina arteriæ magnę exoritur,
quum aliqui ipſorum partem reverti ad laryn-
gem eſſet neceſſe, duo ab alijs atq; à ſe invi-
cem ſeparati & diducti, finiſter quidē paulo lon-
gius progreſſus, ad radicem maximę arteriæ ſe-
inflexit, vclvñ circa aliquam rotulam, atq; illuc
denuò ad laryngem reverſus eſt. Dextrum au-
tem dorſo illius arteriæ impoſuit, quæ in dex-
tra thoracis parte obliquam poſitionem tue-
tur, & à qua acciſus carotis oritur, circa eum an-
gulum natū inſlexit, qui ſit in ipſius carotidis
productione, ac curſus verius laryngem produ-
xit. Quia verò talis inflexio erat lubrica, natura
apophyſim quandam à ſexta coniugatione, ei
tanquam manum porrexit. Quæ quidem cum
magno nervo eum colligans, flexione ſimul &
reditum, quantum ſuſceptum illi eſſecit. Porro et-
iam nervorū quorundam à cerebro ad viſcera mit-
tuntur, exigua quidem ad partes ceteras, magna
autem ad os ventriculi, quòd natura parē hanc
fecerit inſtrumentū appetitus ciborum, ad por-
tam (vt ſic dicam) ſitum, omnium organorum
quæ ad alimenti diſpenſationem fuerunt com-
parata. Quare natura in id nervum quendam
ſyccerum, & cum nullo duro deduxit.
Ex quo portione exiguam in ipſo tranſitu de-
cidens, ſtomacho, pulmōni, & alię arteriæ il-
lam communicavit. Ex eadem etiam coniuga-
tione ſyncerum nervum cordi & hepati indidit.
Ad alia verò omnia quæ ſunt ſub diaphragmate,
iſta penſio nē, ab his quoq; nervis pars qua-
dam accedit, non amplius ſyncera, ſed ſis nervus
qui à ſpinali medulla oriuntur, permiſta. Quare
partes in quas deferuntur, robur quidem ac vi-
res, ex ſpinali medulla: ſenſum autem ceteris
exactiorem, à cerebri muſcella recipiunt. Porro
ubi natura per longum iter nervum eſt ductura,
aut motus muſculi vehementi miniſtratur, ibi
ſubſtantiam eius corpore craſſiore quidem, ce-
tera autem ſimili intercipit: beneficio cuius con-
tingit nervo ipſi craſſeſcere atq; corroborari. In
primis autem eoſdemq; lateros ſcapularum mu-
ſculos, qui ab occipio oriuntur, ac deſcunt in
dorſum oſſium ſcapularum (quod ſurſum tra-
hant) à cerebro magnus nervus inferitur, emer-
gens vñ cum alijs, quos diximus ori à ſexta
coniugatione. Maximo enim nervo erat opus
iis muſculis, nō modò propter magnitudinem,
verum etiam propter actionis vehementiam, vt
qui totam ſcapulam ſurſum trahant. Poſt
his autem nervi commemorabiles, muſculis à pri-
mo quidem ſpondylo ortis, in ſublimem autem
ſcapulæ partem inferis, à natura ſunt dati.
Primæ verò productioni muſculorum circum-
agendum caput, à nervo ad magnos muſculos
vtriuſque ſcapulæ pertinentibus, propago quan-
dam inferitur: deinceps autem à collis ſpondy-
lis, vt quoque principium ad ſeiſipm trahena
muſculum vicariū motum efficiat. Quin & mu-
ſculus duo bus qui ſunt ad tonſillas, & iis qui ad
imam partem hyoide perveniunt, nervus à ce-
rebro datur. Alia præterea nervorum tenuium
coniugatio, quæ à ſexta oritur, ad lingue radi-
cem

Ob ſpinali qd
inſtrumentum
appetitus cibu-
rum, ab lary-
ge ad cerebro
ſynceriffimum
recipit.

Latī ſcapula-
rū muſculi vnde
nervus reci-
piunt.

Excitatio
nervorum
progreſſu &
reditu.

ceque pervenit. Nullus autem alius à cætebro infra faciem descendit. At à secunda copula eorum quæ à collo oriuntur, nervi ad caput ascendunt, duo quidem ex partibus posterioribus, duo autem à lateribus in cutem faciei distributi, atque aurem vtranque. Quum autem musculus latus, qui buccas & oris latera movet, multa principia formatur, designat in buccas ipsas & labia, os apertum ad latera, idcirco fibras omnes etiam à colli spondyliis recipit, ad eas partes tendentes, & cum eis nervos transverfos, maximòque & plurimos. Fibris verò quæ in scapulas & clavam sursum feruntur, nervi minores insunt, qui etiam cum fibris procedunt. Quæ verò ipsius latissimi musculi partes ab radice auris per buccas, super musculum manforè nare, nervi videntur per foramen excidentibus circum, positionem habent fibræ, quæ et parti insunt, similem, & principium propinquum. Quemadmodum autem ad musculos colli nervi ad inferioribus partibus sursum feruntur, quod in caput auris movet: ita & duobus musculis qui retrò ad dorsum totam scapulam contrahunt, iuxta positam apophysim, quam acanthiam vocant, nervorū principium est constitutum. Pari modo & reliquos scapularū nervos, & eos qui ad costas perveniunt, reperias secundū ipsas muscularū fibras diffeminatos. Nam in musculus qui sursum feruntur, ex partibus thoracis intercostalibus nervi excidentibus distribuuntur. Qui verò à collo deorsum ad thoracem descendunt, in spinalem medullam colli nervos demittit. Quum autem musculus qui ad epomida sunt, totum brachium sursum tollentes, validum nervum desiderarent, à regione inter quartum & quintum colli spondylum sira, ex ipsa spinali medulla duplicem nervum produxit, quæ ad partem epomidis externam simul & superiorem extendit, ita profundum vtranque, ut ne appareant quidem. Soler etenim securitatis gratia non solum copulare nervos naturæ, sed etiam per internam deducere, quemadmodum arterias & venas. Sic etiam nervi qui ad extremas manus perveniunt, per internam brachii partem, imò ad vlnam veluntur, prope vlnæ articulationem prætereuntes. Deinde vterque musculus internis vlnæ occulatus ad carpum extenditur, ac sic randem in digitos distribuitur. Tertium præter hos nervum ad externam vlnæ partem deduxit natura, musculo carnosissimo, qui illi est, vna vice propugnaculi. Maiores enim nervos merito internis partibus manuum distribuit, quod manuum actiones omnes, per eas nimis mirum obeat. Differunt autem nervi manuum à nervis crurum, itineris quo feruntur ratione, eò quod nervi omnes ad manus per internū brachii accedunt: ad crura verò, omnes, præter paucissimos, per partes femoris posteriores deorsum feruntur, à sacro osse, lumborumque vertebra, propagati: in ipso autem eorum descensu ad popliteum, obiter distribuent nervum naturæ singulis musculis femoris, pro ut cuiusque ratio postulat. À poplite autem, per suram, quæ tota est carnosæ, alios quidem in externā tibiam, alios in internam duxit, alios per mediam ipsam porrexit, musculos qui illis sunt, ipsos distribuens.

Latus musculus
hum. fibras
omnes recipere à
colli spondyliis.

Musculi retrò
ad dorsum totam
scapulam
contrahunt
vnde recipiunt
nervos.

Epomida
musculi.

Nervi manuum
ex cruris, quo
differant.

Eos igitur qui per internam suram feruntur, ad talum ac tibiam occulantes, ad inferiorem pedis partem deduxit illos verò qui per externam, ad talum & fibulam abdens, ad anteriora simul & superiora pedis porrexit. Nullum itaque nervum nec ad curvaturam cubiti, nec ad genu & tibiam anteriorem reperias: sed vbiq; omnes, in profundo, inter ossium propugnacula, aut cartilaginum, aut ligamentorum, aut deniq; carniū, de litescentes. At verò per magnum ois is pubis foramen, cum aliis vasis, utriusque quædam propago penetrans, in internos eos femoris musculos, qui ab eodem osse pubis oriuntur, ad ipsorum caput inferitur, atq; ad ipsum vbiq; genu descendit. Ab illa eadem propagine, cuius rota quæ illic est, productiones recipit: quemadmodum certe & à foraminibus quæ sunt ad os latus, parvi musculi qui iuxta os ipsum consistunt: tum qui ad anum, vesicam, atq; pudendum pertinet: ad hæc etiam membrana quæ illic sunt, nec fecus matrix, & pectonxum, nervos sortiuntur. Semper quippe solet natura, nervos, venas, arterias, à partibus propinquis immittere, modò nihil aliud prohibeat. Quum autem de nervis ab vnde dixerimus, tempeituum iam est ad arteriarum atq; venarum distributionem transire. Est igitur vas quoddam maximum, quod à sinistro cordis ventriculo, veluti stipem enatum, in totum corpus distribuitur. Cæterum vbi primum à corde emergit, statim in duas partes dividitur: quarum altera quæ maior est, ad spinæ descensum, partibus omnibus inferioribus arterias dispensatura: altera verò sursum ad caput fertur, & ipsa omnibus quæ sunt supra cor, vasorū propagationes præbimur. Porro pars illa quæ fertur deorsum, ad locum productionis sine è directo oppositam, fertur: à quo nusquam declinans promitte, sed rectissima & cõpendiosissima via progrediens, quintū thoracis spondylum conscendit: altera verò pars statim post productionem primam, portionem quandā à semitit sursum, ad sinistram scapulam & axillam: quæ pulmōni invecita, & membranis fulta, sursum vbiq; ad primam costam producit, nusquam divisa. Illinc autem iam quandam à sese partem mittit ad primam intercostaliam spatia, dein ad hypochondrion ac mammam mittit alteram, quæ toto pectore est subdita: tum tertiam ad spinalem medullam colli, quæ per sex spondylosorum foramina penetrat, mittit etiam obiter musculos propinquis propagationes. Reliquum autem huius arteriæ, in totam manum sinistram, & scapulam distribuitur. Altera verò minor pars totius arteriæ, maxime mollissimæ glandulæ præfixio firmata, vbi in dextrum brachium germen emisit, sursum ad iugulum tendit, quæ & ipsa celeritè ossi medio pectoris iungitur. Per quam regionem vena cava & stomachus transeuntes, hic quidem spinæ spondyliis adhæret, illa autem pectori subditur. Ex quo etiam arteris positio cõparatur opportunissima: ut quum per collum diuise feruntur, arteriæ quidem in profundo sint, venæ autem ipsis incumbant. Quum autem arteria magna trahit per thoracis partes infernas, obiter mittit portionem maximā in eos qui illis sunt sin, mu-

Arteria magna
ortum, distribu-
tione.

sculos intercostales: non exiguum tamen in musculos thoracis externos, quæmadmodum & in septum transversum. Sed nec ventriculum, nec lienem, nec hepatis, nec intestina, nec renes, præstitit arterias aliunde recipere, quàm ab hac sola maxima, quum primum ad loca, quæ sub phrenibus sunt, pervenit. * Productio rami arteriæ, quæ in dextrum renem prorumpit, superiorem habet exortum, quàm ea quæ ad finistram tendit, quod renem posio sit inæqualis. 10
 Arteriæ autem quæ ad testiculos deferuntur, eas ordine consequuntur, quæ accedunt ad renes. Nam quæ à pertibus finistris proficiuntur, omnino aliquid perperu ex ea quæ fertur ad renem assumit: quæ verò à dextris procedit, semper quidem ab ipsa magna arteria exoritur: interdum autem assumit etiam aliquid ab ea quæ ad renem fertur. Quum autem lac & semen ex sanguine exacte cocto gignantur, quæ absoluta co- 20
 cocto fieri citra moram sanguinis in vasibus ipsi non potest: ob eam causam, non solum à longinquo natura venas & arterias ad testiculos atque utramque porrexit, sed præterea multipliciter eas, prius quam infertat, involuit: diuturnam, opinor, ex eo, cum vasile ferente, consuetudinem ipsi materis comparans. Sed venæ quidem in hoc solo loco involuuntur: arteriæ autem, etiam in reniformi plexu. Nutriunt enim lac spiritum animale cerebri, qui certè multum ab alius spiritibus distans, elaboratissimo 30
 alimento indiget. A magna item arteria, alix sunt, post prædictas apophyses, ad musculos epigastri: alix etiam minutorum vasorum propagines, in spinalem prorumpentes medullam. Quarum pars quidem non contemnenda, per commissuras spondylorum penetrat in dextros spinæ musculos, pars autem in finistros disseminatur. Quæ germina sunt nervis qui ab ipsa spinali medulla oriuntur, numero æqualia, obducunturque tenui meninge, quæ spinalem medullam ambit. Ob hæc igitur productiones crassitudo semper minoritur arteriæ. Porro ad vltimum spinæ spondylum arteriæ subiaceret vena, quæ antea supra eam ferebatur. Postea verò quæ in peritonæum prætergressæ, in crura di- 40
 dende erant, rursus venæ incubuerunt arteris, quod tumor esset ipsarum per crura delano. A qui bus vasibus transcurrentibus, vesica quidem exiguas, magnas verò duplici propagatione acceperunt matricem, ut quæ non eas solas, sed factum in 50
 ipsis matricibus concipiendum, nutritur essent. Quæ igitur à regione renum in testiculos perveniunt, visq; ad matricem fundum discriminantur. Quæ verò tum ad partes, quæ ad collum pertinent, tum ad eas quæ sunt infra, post testiculos, perveniunt, à vasibus quæ ad crura feruntur, productæ sunt, eodem loco, unde in masculis ad virgam accedunt. Ex his autem locis rursus vasa venosa sursum feruntur, quæ propter commercium, cum eis copulantur vasibus, quæ 60
 deorsum à mammis descendunt. Ab istis locis vna coniugatio exiguarum vasorum, ad eas quæ ad pudendum pertinent, accedit. Ad inguen autem natura magnas glandulas diuisionibus vasorum veluti fulcimentum, & ad versus ini-

rias externas operimentum, indidit. Vbi igitur materia magna quæ ad supernas partes perrepat, eis quæ in thorace sunt, distribuit propagines, quod ex ea reliquum est, vna scilicet vtriusque arteria, sursum ad caput fertur. Quorum productiones vasorum, omnes faciet & colli partes contineant. Ex eis autem quæ in scapulas diuiduntur, dorsales musculi suas recipiant propagines. Ab his etiam ipsis, quum primum ad collum extra thoracem iam emicuerint, feruntur germina per foramina cuiusque sex primarum vertebrarum, quæ sunt ad latera, visque ad caput. Verum quæ parte nervi qui à spinali medulla proficiuntur, exortus est, eadem certè ab arteria & vena, quædam exigua propago in spinalem medullam inferitur. Finis autem vasorum, quæ sursum ad caput visque feruntur, postquam egressus primum est spondylum, bifariis diuiditur: atque altera quidem parte ad cerebrum posteriori intro fertur: reliqua verò ad musculos articulo capitis circumfusus diffunditur, sinibus vasorum quæ in tenui meningi sunt locata, septum coniungens. Nam musculos qui sunt in superficie, & cutem, vasorum propagines quæ in scapulis sunt, contineant. Nisi quæ enim in corpore vilius reperias musculi, qui vena & arteria careat. Iam verò arterias quæ in axillis ad manus diuariantur, validis quibusdam glandulis natura (vnde non facile rumpentur) iuxta diuisiones corroborauit. Est præterea iugum arteriarum carotidum, quod fertur sursum rectum ad caput, in profundissimis colli partibus abditum. Cuius quidem vtraque arteria quæ diuiditur bifariam, & altera sinistram partem retrosum, altera verò magis antrosum vergat, rursus harum vtraque in duas alas diuiditur. Deinde altera pars eius quæ antrosum tendere diximus, ad linguam accedit, & internis maxillis inferioris musculi. Altera verò magis quidem in superficie, quàm illa, est locata: magnis tamen & ipsa glandulis repleta, sursum ad interiora anatum, visque ad temporalem musculum, fertur: ibique diuiditur, atque à posterioribus sursum visque ad verticem tollitur. Reliqua verò arteriæ carotidos pars, quæ retro magis ferri dicebatur, diuiditur & ipsa in duas partes maximas. Quarum minor, retro magis ad basim cerebelli ascendit, magno ac prælongo ipsam excipiente foramine, quod est in fine futuræ labdoideis. Reliqua verò, antèioribus partibus per foramen quod osi lapidei inest, sursum fertur & ipsa, ad plexum germinalem, qui toti basi cerebri subiaceret, & ex memoratis arteriis textitur. In cerebrum autem ipsum, arteriarum haud exiguum iugum ascendit, ex quo plexus *χρυσος*, qui est in illius ventriculis, gignitur. Ut vero summum dicam, natura in facie & toto capite, arterias quidem quamplurimas cum arteris, venas autem cum venis, tum à dextris ad sinistram, tum ex sinistris ad dextram, tum à posteriore parte ad anteriorem, & rursus ab anteriore ad posteriorem, & ab externis intro, & ab internis foras ducens, committit. Committuntur autem arteriæ venis, & venæ arteriis, & vtraque hæc nervis, & his am- 80
 bobus nervis, in toto animalis corpore. Etenim cuiusque

Renem posio non esse inæqualis.

Lac & semen ex sanguine exacte cocto gignantur. Vtrum vasorum circa testiculos & mammam, cum præterea sit scilicet.

Arteriæ plexus. Arteriæ nutriendæ animalium spiritum cerebri.

Arteriæ subiacet vena circa vltimum spinæ spondylum.

Matricem vasa.

In renem plexus. Vnde quædam productio feruntur.

Musculum autem distinctum ab arteria, nec vena. Glandulas nervi.

Cerebrum et testium diuisio. Vnde, processus.

Arteriæ plexum. Vnde, vasa carotidis sub testibus. Vnde, χρυσος.

Complicatio inter se arteriarum in firmata in corpore.

Sensu deficiente, si arteriae & venae.

quibus partis arteriae & venae sunt omnino sensus expertes, siue illas frangere velis, siue vrere, siue incidere: id quod cognoscas, nervis eiusdem partis vinculo exceptis. Inferunt autem ea vasa in partes sibi circumvicinas, tenues qualdam propagines: venae quidem numero interdum quamplurimas, & magnitudine insignes: arteriae autem, tum pauciores, tum mole inferiores: mittunt tamen & ipsae. Causa huius est, quod partes omnes alimento indigent, calidæ, frigidae, duræ, & molles. Vt autem caloris natui modus ad vnguem feruatur, non amplius similiter omnes possulant. Nam partes naturali temperamento frigidae, vel si ad vltimum aliquando frigiditatis pervenerint, sustinent tamen & viuunt, & rursum sine dolore, pristino calori restituuntur. Quare siue arterias vreas qualdam repetere licuit: sed arteriam nullam sine sua coniuge venæ. Coniugem autem intelligo, quæ propter eundem vsum existerit. Quum igitur nutriti corpora sit necesse, quod ea vacuentur, alimentum sit æquale est necesse, copie substantiæ effluens. Desunt autem plurimum à calidis, mollibusque corporibus, & usque assidue aut vehementer mouentur: minimū verò à frigidis, atque duris, & quæ moderatas obtineant actiones. Frigus enim corpora defat, cogit, costringitque, ac prolixi substantiæ desitium. Calor autem contrā, corpora rarefacit, liquat, tenuat, & digerit. Rursum, quod ad ipsam substantiam attinet, quæ durior quidem est & lapidea,

Arteriam nullā reperiri sine sua coniuge venæ.

Alimentum debet æquale esse copie materiæ effluenti.

Effluens quæ corpora maiora, & quæ motum possunt.

Frigus opera, Calorem opera.

Pulmonem omnia iussu, quæ ad celerem vacuationem pertinent.

Optimum substantiam non solui facili.

Venæ nullæ, quæ ab arteria relinquantur.

Venæ absque arteriis.

permanens est, nec facile dissipatur: quæ verò humida & mollis, celeriter quidē à calore in halitus soluitur, eoque citò exhalat, ac perit. Pulmoni igitur omnia insunt, quæ ad celerem vacuationem pertinent: nam & mollissimus, & calidissimus est, motuque agitur perpetuo. Oribus verò insunt, veluti ex diametro, cum eo pugnātia: etenim frigida sunt & dura, bonamque totius vitæ partem quiescunt: ob quas nimirum causas perdurat ipsorum substantia, neque soluitur facili. Nec igitur mireris, si ius naturæ iustissima exiguas adeo tribuit venas, ut ne clarè quidem cernantur: pulmonem verò, venā maximā sit à corde implantatā. Duas itaque partes inter se comparavi, quarum altera quidem plurimo, altera verò paucissimo alimento indiget. In medio autem harum sunt reliquæ omnes, quarum alig quidem magis, alix verò minus vacuantur, nutritique possulant. Nusquam autem venā aliā arteriā relinquitur sed ubi vas arteriosum videris, ibi necessum est venam etiā adesse: paucis tamen venis in corpora, quæ ad cutem pertinent, siue arterias diuisas. Porro quā venā causa primū fertur sursum à gabbis hepatis, iam inde propagines magnas ad septum transuersum mittit. Vbi verò ipsum cor attingit, ibi eam quæ octo costas vtringit alit, producit. Quemadmodum autem in cruribus, ita est in externis & anterioribus brachij partibus, natura siue arterias proprias disseminauit venas per superficiem. Et quemadmodum ipsum brachium & crura vna abundat, ita in superficie colli altera vna ingulgetur sine coniuge cernitur.

GAL. DE VSV PARTIUM LIB. XVII.

AT vero partis actio, ab eiusdem vni differt: quod actio quidem motus actiui sit: vltus verò nihil aliud existat, quam aptitudo ad vtendum. Porro dixi actionem esse motum actiui, quod plerique motus sicut patientibus, quos sanè passim vnuantur: quoniam tamen partibus quibusdam accidunt, quæ ab aliis mouentur. Atque is motus sanè inest ossibus, quæ in brachijs & cruribus sunt, sicut & musculis illa mouentibus. Ceterum si ad primū mouens (quod est princeps animæ facultas) ipsos musculos cōpares, rationem instrumenti habebunt: si verò ad id os quod mouent, non modò itane, sed opificis etiam rationem fortientur. Idcirco prima vilitas animalibus ab actionibus ipsis accedit, secunda à partibus. Nullam siquidem partem propter seipsam habere cupimus. Supervacanea quippe esset, si actione esset orbata, & abscondenda potius, quam opranda. In omnibus autem animalium partibus, vna cum actione ipsarum, vltus etiam conueniunt: quemadmodum, exempli gratia, videre est in elephanti proboscide, quæ parte, etiam aliquando ea mihi visa fuerit oiosa, animal tamen ipsum, cum manibus quamaproximius, vtatur: ac per eam etiam, perforatam quum sit, veluti per nares quasdam respirat. Sunt igitur in vniuersum opera naturæ admiranda, quæ præter partium omnium æqualitatem, actiones etiam exlubuit, ac præterea statim vt fuit genitum animal, ipsum earum vsum edocuit: ac breuiter, non solum proportionē omnium membrorum extrinsecus, more istarum nobis, sed in profundo etiam seruauit. Siquidē Polyclerus canonem illum suum tam celebrē affabre faciens, naturā est imitatus, in quibus potuit eam imitari. Potuit autem in solis externis partibus, in quibus artem considerauit. Sunt itaque opera naturæ digna quæ suspiciantur: cuius nimirum arte & industria, ex multis omnia ferè optime hunt: quum tamen à fortuna ipsa, ex innumeris conngat fortè fieri rectè vnum tantum, aut alterū. Quis igitur ex ortu & structura animalium non statim concipiat animo, mentem quandam esse, quæ vim hanc admirabilem, quæque terras omnes pervadens, in omnes orbis partes extenditur? Vbiq̃ certè animalia procreari vides, quæ constructionem hanc dignam admiratione. Quanquam quænam vniuersi pars ignobilior est terra? Attamen mens quædam cernitur ad ipsam à corporibus superioribus peruenisse: quæ si quis contemplatus fuerit, statim substantiæ polchritudinem admirabitur: primū ac maximè solis: post ipsum, lunæ: deinde syderum: in quibus par est, quantò corporis substantia eis est purior, tantò etiam mentē inhabitare, quā in corporibus his terrestribus, & meliorē & perfectiorem. Quum enim in limo, in colluue, in paludibus, in plantis deniq̃ ac fructibus putrescentibus, animalia gignantur, quæ misericordioris vitæ ostendunt, quid de corporibus superioribus est putandum? Licet autem & rationatricem quandam naturam, etiamnum vel in

Actio partis, actio motus actiui. Vltus partis, est aptitudo ad vtendum. Motus passim quæ.

Voluntatem primam animalium ab actione accedit, secundam à partibus.

Partem nullā propter seipsam habere cupimus.

Partium actio in seipsa conueniunt.

Elephantus vni profunde canem manib.

ac per eam respirare.

Polyclerum in canonem suo esse celebrē, fuisse imitationem naturæ.

Fortunam rationem quicquam velle operari.

Terra infusam esse vni seipsum corporum.

Mentem habitare in syderibus ita meliorē & perfectiorem, quā in corporibus his terrestribus, quæ in substantia ista stercora est pariter.

Ratiocinatri-
cem naturā sa-
cisse hūmā-
nā.

Disimulā me-
tem esse exten-
sam per aerem,
ardueretur Ga-
lenus.

Opus de vīu
partiu effe-
ctū pfectissimā ob-
soluta verū pri-
cipiū, quā lon-
ge mēdicinā gē-
nūm.

Opus de vīu
partiu philo-
sophū esse lon-
ge vtilissimū.

ipſis hominibus cernere, ſi Platonem, Ariſto-
tē, Hipparchum, Archimēdem, & complures al-
ios contemplaris accuratiſſimē. Si igitur ut tan-
ta colluſie (quo enim alio nomine quis appellet
id quod ex carned ſanguine, pituita, ac bile vtra-
que conſtitutum?) menti ſignatur adeo eximia
& excellens, quantam eiudem putandum eſt
eſſe excellentiam, in ſole, luna, aliſq; etiam fyde-
ribus? Mihi quidem dum hæc mecum voluto,
non exigua quædā mens talis, per ipſum etiam
nos aërem ambientem, eſſe extenſa videtur. Fie-
ri enim non poteſt, quā lucis ipſius Solis ſit par-
ticeps, quin vim etiam ab ipſo aſſumat. Quæ
omnia que exquiſite perpendit, tum ſapiētiā
opiſicis, tum humanæ mentis prerogatiuam in-
telligit: ac deniq; hoc opus de vīu particularum,
quod prius deſpicebat, tanquam exiguum, per-
fectiſſimæ theologiæ verum principium conſtitui-
t, quæ theologia multo eſt maior atq; præſtā-
tior tota medicina. Idcirco non ſoli medicis, o-
pus de vīu partium eſt vtile, ſed multo certē ma-
gis philoſopho, qui totius naturæ ſcientiam ſibi
cōparare ſtudeat, circa cuius indagatiōē nos
conſenſere oportet. Nec verō in ſolo homine
videre eſt ipſam ſummā artem naturę, ſed quod-
cunq; animal diſſecare velis, parē in eo indu-
ſtriam opiſicis, & ſapiētiā reperies. Et quanto
ipſum minus fuerit, tanto maiorem tibi exorta-
bit admirationem. Quod declarāt opiſices, quū
in corporibus parvis, aliquid magnum ſculpūt:
quemadmodum is, qui niſper in auiulo exiguo
Phætonem quatuor in veſtū equis ſculpūt, ſpe-
ſtaculum certē incredibile. Quanquam horum
nihil ſtructuram cruris pulcis ſuperabat. Quum
igitur tanta opiſicis ars veluti actuariū atque
par ergon quoddam in tum abiectis animalibus
eluceſcat, quantā eius vim ac ſapiētiā, in præ-
ſtationibus in eſſe putabimus? Vnum igitur ex
hoc opere ac maximū, non vt medicis, ſed vt na-

turę ſtudioſis, hoc nobis accedit cōmodum, nē-
pe facultatis (quæ in eſt conditori) cognitio. Se-
cunda autem vtilitas eſt, ad affectus partiū, quæ
intus in alto corpore deſcendunt, cognoscēdos:
quam ad rem, actiōnis cognitio magnum habet
momentum. Quandoquidem qui tam explorā-
tum habet, quod actiō crurum eſt ambulatio, ſi
quem videt qui ambulare non poſſit, itam in-
dicat partem cruris aliquam eſſe affectā. Sed
quemadmodum in actiōnibus, ita & in vilitati-
onibus res ſeſt habet. Vt enim ambulatio tollitur, ſi
nervi ac muſculi qui cruribus inſunt, affectu fue-
rint: ita tollitur, ſi ſiſi aliquod fuerit fractum, aut
ſua ſede dimoſi. Si verō neſcimus, quod per of-
ſa cruribus inſitatur, hanc quæquam ſcire poſ-
ſumus, quod ofiſibus leſis animal etiam læda-
tur. Eoq; modo ſit, vt ad cognoscendum quæſi
pars ſit affecta, non minus conferat vilitatum
quā actiōnis cognitio. Eadem eſt ratio & de
futurorum præcognitione. Nam qui affectus in-
ſunt cruribus incurabiles (vt luxationes quæ cū
vlcere incidunt, aut perverſiones coxendicū)
inſanabile in futurum tempus ſignificant am-
bulatiōnis noxam. Tertia, præter prædictas, Iu-
lius operis vilitas eſt adverſus ſophiſtas, qui no-
bis non concedunt criſes morborū à natura fie-
ri, quib; ipſam viliā animantium habere ratio-
nem pernegant. Iam verō in partibus quib; di-
ſcendendus, aut circuncidendus, aut abſci-
dendus, quemadmodum & in eximendis ſagittis, vel iaculis,
qui partium vilitates probe calluerit, præſcribet
quas nam audeat & ſecurē, quāſve tre-
pide & caute incidere oporteat. Hæc trago-
tae tanta lūus, quod ad vmbilicum iam perduximus,
operis commoda, liber ite, veluti bonus
quidam iupit, explicat.

Comēda quæ
opu hoc de vī-
u partium con-
ſtitit nobis.
Actiōnis cog-
nitio placitum
conferat ad co-
gnoscēdos af-
fectus partiū,
quæ in alto cor-
pore deſcendunt.

Vilitatum nō
minus quam
actiōnis cog-
nitio conferat ad co-
gnoscēdam ef-
fectus ſolum.
Annotatiōem
cum vilitate ef-
fectus ſolum.

Crise morbo-
rum ſunt à na-
tura.
Vilitas o-
peris animantium
conferat ad
discendendum.

GAL. LIBRORVM DE VSV PAR-
TIVM FINIS.

ILLVSTRI AC GENEROSISSIMO

VIRO, D. D. FERDINANDO, COGNOMENTO A'

Mendoza, litterarum patrono, Andreas Lacuna, Sec. Doc.

M. Miles Sancti Petri, S.



Ommentarios Galeni de placis Hippocratis & Platonis à me haud ita pridem elabo-
ratos, atq; (vt ita dixerim) ad meliorem frugem redactos, multis de causis adductis
sum, tibi vt dicarem, Ferd. generosiss. Primum, quod rationi esse consonum ducerem,
vt aliquatulus ad te rediret mearum meditationum fructus, qui soweri indeas illas atq;
pro vehere non desin. Dein, quod te conspicerē divino quodam affectu præditi, sapientiæ ardē-
tissimo amore inflammatus, du me cluā, ipsi philosophiæ incumbere, eiq; navare haud instrenuā ope-
ram: ac prinde eorum philosophorum dogmata fore tibi non minus accepta, quā tuus studii apas,
ſperarem. Quocirca vt officiū meum observantiāq; erga T. Dignariē testarar, simulq; incubra-
tionibus meis conciliari patronum optimum (qualem hac virulentissima ætate omnes ingenuæ ar-
tes & discipline desiderant) non alia fieri posse ratione apud me existimaui, quā si nominis tui
præfatione illustratum, idipsum laboris quod est, jederetur in lucem. Tuum igitur est, Vir clariss. hæ-
ſce vigilijs nostras nentiquam paritendas, vultu hilari in tuos sinus excipere, exceptasq; contra vi-
ros male feriatos defendere: vt verē sis id quod dicere, Philanthropos, iuron ōm-
niū philalethes, quāroq; D. Vale. Venetiū,

X I L Calend. April.

GALE.

GALENI PERGAMENI
de Hippocrati & Platoni pla-
cuis, liber II.

Nam primus desideratur etiam in gre-
co exemplari.

Animam desin-
tere in cor-
de, quod Chry-
sippus ratione-
bus nitatur
probare.



Porro Chrysippus his friuolis af-
sumptionibus, animam rationa-
lem delitescere in corde persua-
dere conatur, quod dum animi
sententiam exprimus, atque in-
dicantes nos ipsos, hanc vocem,

Ego, proferimus, in priori syllaba, E, os & men-
tū interius veluti ad pectora deducimus: quod
que etiam manum interdum ad mouemus pec-
tori similiter indicantes nos ipsos: ut cum dic-
mus, Milui hoc conuenit. Ceterum quod etiam
nasum similiter homines quandoque attingunt,
dicentes, milui hoc dā, tamen in eo anima non
residet, omnino esse oblitus videtur. Cur autē,
dum cōcedimus aliquid annuētes capite, in quā
partem ipsum flectimus, in illa principū animi
esse potius ostēdimus, quā in ea quā mouetur.

Etenim quæ primū in nobis mouetur particula,
dum annuimus, eam nimirū probabilis est ani-
mæ principium in se cōtinere, quā aliarū vllā,
ad quā motu perfertur: ut interim illos homines

non cōtemorem, qui capite renuēt, cū assen-
tiantur. Oportebat itaque ab ipsa rei substantia,
quā tractabat, Chrysippū orsum, tum per cōue-
nientes, tum per proprias assumptiones in vesti-
gare. Nam quæ demonstraciones ab ea rei substā-
tia recedūt, ut minimē scientificæ sunt, sic eas aut
exercitatorias probabiles, siue dialecticas, aut
rhetoricas, aut denique sophisticas nominaueris.

Ac traditum sanē à veteribus de singulari est: de
sophisticis quidem, in elenchis: de rhetoricis au-
tē, in rhetoricis artibus: in topicis, de dialecticis
sicut in libris de demonstratiōe (quæ dicuntur
secundā analytica) de scientiis: in quibus omni-
bus, qui rectē demonstraturus est, sese oportet
exerceat. Quia igitur propōsitū est nobis cōside-
rare, num animæ principar in corde consistat,
omnia quæ cordi insunt, & à quibus demonstrā-
tiones desumī possunt, dinumeremus. Cordi sanē
insunt, situs, magnitudo, plexus, cōformatio,
dispositio, & motus. Situm autem est cor, thoraci-
cis quidē ratione, quod imo de mediū magis: to-
tius verō animantis respectu, tantū superius me-
diis partibus eius, quantū ab vmbilici regionibus

(quæ ad amūsū sunt medice) distat. Versus
ipsam etiā arteriā asperam, per quā respiramus,
ita quodammodo situm est, ut per medium pul-
monē ei cōstituratur. Nā ex finistru cordis ventri-
culi arteria quædā venosa in pulmonem fibras
disseminatur, ad cuius quidē numerosas propa-
gines, fines asperæ arteriæ perueniunt, quæ & i-
psa in totū vīscus similī distribuitur modo, quo
arteria venosa. Quin etiam iuxta pulmonem ita
locatū est cor, ut extrinsecus ab eo vniūq; cōtegra-
tur. Verū neq; ex situ, neq; ex cōiunctione cor-
dis cum illis partibus, licet eius quod petimus
scientificū vllum argumentū discere: quādoqui-

dem nondū per ea colligitur, cor sensus motūq;
voluntariū principium esse: quādamodū neq;
etiam quōd cor vocis opifex sit, qualis est quorū-
dam sententia. Etenim vocis instrumentū & pri-
mū & peculiare, est summa pars gutturis, quæ
Graeci larynx vocant. Si igitur intra ipsum alpe-
ram artēnā in cōideris, non amplius animal vociferari
audies, et si respirare ipsum sine impedimē-
to, etiamnum videas. Iam verō thoracis muscu-
los, vni cum suis qui in abdomine sunt, quum ani-
mal vocem molitur edere, veliementer extendi
conspicies, corde nullā nouam insuper actionē
interim acquirēte. Non itaq; iam spiritus qui ab
imo sursum effertur, priusquam ab ipso concu-
netur larynge, vocis habet specimen, sed solius
tantum sibilī. Icta autē à supremi asperæ arteriæ
finis cartilaginibus, veluti plectris quibuscūdam,
efflatio hæc, vox efficitur. Ceterū cōposita est
summa gutturis regio, larynx dicta, ex tribus car-
tilaginibus, quas complures musculi mouent, ita
quam motus voluntarij instrumenta. At muscu-
li, ut ipsi moueantur, neruius à cerebro orientes
requirunt. Ex quibus si aliquem fune intercepte-
ris, disscuerisve, statim immobilis illū musculū
reddes, in quem insinuat neruius: immobilitas
etiā animantis membrū, quod prius à musculo
mouebatur, quum neruius esset in cūctus. Ac fit qui-
dem ab aliis instrumentis, musculisq; & neruis,
inspiratio libera, qualis sanis adest nulla forti
motu agitata: ab aliis autē violenta, quam efflati-
onē appellare solemus: ad quam perficiendam
videbis omnes scapularū particulas simul attoli.

Est tamen proprium vocis instrumentum la-
rynx, ac tum eius motores musculi, neruiq; à ce-
rebro in musculos ipsos demissi: deinde lingua,
quæ non vocis modū, sed loquelæ etiam instru-
mētum existit. At verō pulmo, à thorace motus,
distentus quidē, externum aerem, id quod est in-
spiratio, attrahit: contractus autē, eundē in aspe-
ram arteriam, atq; in os ipsum, extrudit: quod o-
pus est expiratio. Atqui, si vox ab eo, qui in cor-
de est spiritus, fieret, nō aboleretur statim, neruius
quibuscūdam vel in collo, vel in capite sectus: mul-
tūq; minus aut confuso aut vulnerato cerebro,
aut spenali medulla dissecata; sed potius oblecto
corde, id quod non accidit. Etenim si nudaue-
ris cor, contuderisq; ipsum atq; deprefferis, nec
voce, necpiratione, nec vlla prorsus voluntaria
actione impediri animal cernes. Quod si mi-
nimē perforaueris concavitatem thoracis, lice-
bit tibi etiam vniuertum ac semel cor ipsum exi-
mere, illius voluntariis actionibus id quod in
nonnullis sacrificiis contingit, in quibus animā-
tia ceruuntur, corde iam artis imposito, non re-
spirare tantum, aut clamare foriter, sed etiam su-
gere, quovisq; perfatione & sanguinis cōiunctan-
tur. Cerebrum autem obstitus si detexeris, aut
quencūque ipsius finem compresseris, nō mū-
tum duntaxat, ac protinus spiratio omnis expers
ficies, sed etiam omnino sensus, omnibuscq; arbi-
trariis actionibus animal ipsum priuabis. Porro
taxis, quibus spinalis medullæ origo iuxta pri-
mam vertebra diffecatur quotidie, simul cum
sectione ipsa, motus, respiratio, & vox exoluan-
tur, illarūq; motus, cordis & arteriarum: quod ipsa

Larynx est pri-
mū instrumentū
voci.

Thoracis mus-
culi.
Abdominis
musculi.

Vox quæ ratio-
ne efficitur.

Larynx ex tri-
bus cartilagi-
bus consistit.
Musculi motus
voluntarij in-
strumenta.

Nerui produ-
cti à cerebro,
larynx prius non
sola motum.

Inspiratio li-
bera.
Inspiratio
violenta.

Lingua, vocis
& loquelæ in-
strumentum
esset.
Inspiratio
quid.

Expiratio
quid.

Corde nudato
& confuso, nul-
la prorsus volun-
taria actio
non impeditur.

Cardiacum ar-
tis impositio, ani-
mantia respi-
rare, clamare,
& fugere.
Cerebro deta-
cto, sensus, aut
compulsus, aut
neruorum acci-
dunt.

pulsandi vis, à cerebro non descendat. Vt enim pulsatio ipsa motus alterius generis est, sic etiam principiorum alterum non indiget altero. Quare etque respirationis, neque vocis, cor existit principium. tametsi propter illud maiori ex parte contingat fieri respirationem. Argumenta autem Zenonis, Diogenis Babylonii, & Chrysippi, quibus freti, in corde rationalem animam habitare, ab eoque emitti vocem contendunt, in hoc vnum ferè conspirant omnia. Vnde vox ac sermo eliditur, illic necessum est fiat ratiocinatio, intelligentiæ, & meditatio omnis, ibidemque etiam mens delitescat. Est enim sermo velviti mens nuncius, qui ex ea procedit: nec alia existit vocis origo, alia animæ pars præcipua. Atqui vox & sermo, qui vox articulata est, à pectore proficiuntur, cum per asperam emittantur arteriam, id quod non fieret si à cerebro emitterentur. Mens igitur & omnes eius actiones, in pectore, ac præcipue circa cor, non in capite, delitescunt. Quæ quidem argumentatio facile reddargui potest. Primum quidem, dum situs observantes propinquitate, aiunt, si ex cerebro sermo oriretur, non per asperam arteriam procederet, perperam hallucinantur: cum nimirum mens ipsa, aut voluntas (sive eam in cerebro, sive in corde posueris) quælibet instrumenta, etiam longissime sita, ætenuim mouere possit, nihil ex intervallo, ad celeritatem, impediementi recipiens. Vt enim nullum sensibile tempus est, interea dum particula vulneratur, & ipsum animal sentit: ita nec interim dum homo respirare aut loqui vult, atque ipsam actionem obit. Quare nihil prohibet, quò minus voce per asperam arteriam emissâ, cerebrum motus asperæ arteriæ sit causa. Falluntur etiam secundum, sermonem procedere ex mente dicentes. Sermo quippe, aut vox significatiua, à mente (quemadmodum voluntaria omnia) non tamè ex mente, sed ex summo guttore, quod larynx dicitur, proficiunt. Prius autem nondum vox, id quod esset, extitit: sed materia quædam vocis (quam efflationem aut sibilum vocamus) ex asperis arteriis profecta, quarum nulla cor attingit: id quod certè sensui manifestum cum sit, fidem ex seipso facit. Ergo non dicemus, vt illi, vnde sermo emittitur, illic etiam ratiocinationem fieri: sed, à qua parte sermo emittitur, secundum illam quoque, & in illa fieri ipsam ratiocinationem, quæ principis animæ est actio. Licet namque pro mente, principium animæ partem dicere, sicuti & dominantem, imperantem, præsentem, ratiocinantem, atque intelligentem. Iam vero cilm tria vaforum genera, venæ scilicet, arteriæ, & nervi, cerebro cor connectant: si primum quidem ea in superiori & inferiore ceruicis regione funiculari exceptis validis, ne sanguinis perfusio magna sequatur: dein autem, vinculorum medium secueris: videbis planè, ipsi quidem nervi qui iuxta arterias constitunt incisi, statim obmutescere animal, illeceis aliis vniuersis actionibus: tertius autem solus aut scissus, aut interceptus, minime reddi animal murum, priuari tamen pulsu omnes quæ supra vulnus aut vincula sunt, eius particulas: in quæ infra constitunt, semper eodè

modo pulsantibus: venis denique aut incisis aut interceptis, nullam manifestè aboleri functionem. Vnde liquidò constat, neque cor, ad pulsus motum cerebrum egere: neque cerebrum corde, vt sennat animal, opereretur pro voluntatis imperio. Porro si intelligèdo, discendo, docèdove, nullus insignis motus in corde apparet: in omnibus autè perturbationibus si manifestè non testetur (quod etiam Chrysippus confirmat) darum vñg evadat, ratiocinatricem animæ facultatem non esse in corde: irrationalem autem, & affectibus obnoxiam, in ipso comprehendendi. Ceterum qui per cardialgiam cor dolere aiunt, vocis & iuvocationem non sentiunt, quia nimirum os ventriculi veteres cor appellabant. Quæ pars cum ab acerbis humoribus irritatur, tali sensu tristitæ afficitur: id quod maxime is contingere solet, qui impendio diutius à cibo abstinent, præcipue post exercitationes violentas. Nam exercitationes valentius, in ventriculo flaua bilis colligitur, à quo morbi, cardialgia laborant. Ad hæc autem, etiam si concesserimus, cor primum omnium particularum formari, non ob id tamè inferre oportebit, cor initium facultate existere, sed secundum generationem. Quod autem cor primum omnium particularum moueri incipiat, atque vltimum cesserit, ostendit quidem, id motus initium esse, non tamen omnis, sed solius qui in pulsibus est: qui genere à voluntario differt, quia cerebrum origo existit. Quod si nobis obiciant, in corde copiam nervorum conspici: respondebimus, non nervos, sed nervuos quædam esse corpora in corde, quæ specie solum nervis respondent, non actione & visu. Dicunt præterea, in corde consistere nutritionis animalium originem, ac proinde in eo vim ratiocinatricem esse debere. Verum in vtroque sentiuntur lemmata. Nam primum nutrimenti principium sunt os, stomachus, & ventriculus: alterum, meleracea venæ, in quibus primis fit sanguis: tertium iecur ipsum: quartum post iecur, venæ caua, in qua prima purus à recrementis sanguis relinquatur: ab hac enim, quemadmodum alix omnes animalis particulae, cor alimentum recipit. Sed nec si cor nutritionis esse principium admitteremus, consequens esset, in qua parte id genus principium est, in eadem ratiocinatricem facultatem haberi. Præterea vbi aiunt, vnde spiritus suggeritur, ibidem esse animæ principium: cogitur id cedere, si quidem de animali spiritu intelligat. Vbi verò postea subdunt, ex corde spiritum suppeditari, viralem quidem fatebimur, animale autem non item. Quod si neutrum horum spirituum intelligere se fateantur, sed naturalem, qui sicco humidog alimento proportionè responderet, audient dicentem Hippocratem: Principium alimentis spiritus, os est, nasus, aspera arteria, pulmo, ac reliqua perspirat: quibus sanè instrumentis initium motus à capite nos transmitti fatemur. An verò animæ substantia sit evaporatio siue ex alimento, siue ex spiritu, hac de re nihil ad præsens in dubium vertimus, ne per omnia Diogeni videamur infecti esse, qui sanguinem esse animam, vt Empedocles &

Critias, existimant.

Cor ad pulsus motum non eget cerebro, Cerebrum nea que corde, ve sentiat ex moueat animal.

Animæ irritatio nalem, affectibusque obnoxia, in corde capienda. Os ventriculi veteres cor nominabant. Os ventriculi quibus præcipue irritatur.

Cardialgia.

Nutrimenti principia. Meleracea venæ primis consistere sanguinem. Cauda venam suggerere alimentum vniuerso corpori.

Spiritus vitalis à corde nascitur.

Spiritus naturalis.

Principium alimentis spiritus.

Animam esse sanguinem quæ putantur.

Cor neque respirationem, neque vocem principium est.

Animæ solum in corde existit, quibus argumenta præbent rationem.

Mentem, vbi quis ea sit, quæ libet instrumenta, vel longissime sita, vbi libet mouere possit.

Sermo à mente non ex mente, sed ex summo guttore proficiunt.

Ratiocinationem esse principium animæ actionem. Mens nutrimentum.

Cor per quæ tria cerebri connectuntur.

GALENI PERGAMENI
de Placitū Hippocrati & Plato-
nis, lib. III.

Quod sanē necessariū existat, non solū medicis, sed philosophis etiam, nosse, q̄t genere sint, & quales secundum speciem singulz, quāq; potissimū animantis particulz occupent, facultates corpūs nostrū regentes, primo libro demonstratū ā nobis est. Secundo autem, de sumptionū differentia sermonem habuit quz quidem in vniuersum sunt quatuor. Nōnulz quippe ipsarum, ab iis quz particulz insunt, iuxta problematis substantiam sumuntur: aliz vero ab iis sanē quz insunt, non tamen secundū id quod propositū est, ac de quo questio habetur: aliz ab externis testibus, vt rhetorice: alię deniq; ā principis sophistici, vocularū ambiguitate & impostura obartant. De quibus cum iam differuerim (idque illorum qui eis vtrūq; exemplis propositis) operæ precium videtur nunc in tertio hoc commentario, numerū & substantias facultatum docere, numerūq; enā atq; discrimina eorum quz illis accidunt. Satis autem mirari non possum, videns Chrysippum, qui deberet ostendere, animam rationalem in corde domicilium habere (est enim hoc illius dogma) se nimis anxie torquentem, vt tum rationibus, tum innumeris poetarum exemplis (quz breuitatis gratia prætereo) irascibilem facultatem perturbantibusq; obnoxiam, in thorace habitare demonstraret: id quod iam pridem est ā veteribus demonstratum: quod quidem feruorem innati caloris aliquem in corde per iracundiam oriri dicunt: cuius ratione accidit, vt tota facies infleatur, corpus vniuersum rubefcat, incallescāque, & velicenter cor vni cum animantia arteriis subsilat: quæ omnia pulchre describit Plato in Timæo. Ad hæc verō, cū debuisset Chrysippus, quæ suam quidem fouent sententiam, & tantū testimonio poetarum eligere: quæ evertunt autem, & labefaciunt, explodere: ille sanē ex quo omnium meminit: imō verō maximē precipua, & quæ ipsi patrocinabantur, omisit. Quæ sunt illa:

*Supplex exoritur tunc ipsi ex pectore mentem. &
Consilium Neptune meum, hoc in pectore nosti.
Non mihi stat idus sententia pectore.*

Hæc igitur testimonia soia, & similia alia, quæ rationalem vim in corde sitam esse portendunt, se-
ligere conueniebat Chrysippum, si omnino testi-
bus hitem dirimere statuerat. Nam numerosa illa quæ adduxit, tametsi vera sint, ejus tamen præorū opinionem deiciunt, præsertim quæ iracundia manifestō aduersantem faciūt rationem: veluti & hæc sonant:

*Præor sed feruens, ipsum cor inceptat ire:
Suffert & hæc, cur non grauiora aliquando libelli.*

Hæc siquidem Vlysiem ad se dicentem introduxit Homerus, cū ob ea quæ ab ancillis domi agi videret, calor in corde ipsius efflueret: & animus, siue iracundia, ratione deuita, ad interpectum mulierum punctionem, ipsum iam vi præcipitem actura esset. Nam quam eques ad equum, aut venator etiam ad canem, rationem

obtinet, hæc ratio ad animū, siue iracundiam. Etenim imperare in omnibus & prævalere iustus est, id quod natura præcellit: equitem sanē equo, venatorem autem cani, necnon iracundie rationem. At non semper accidit, vt tale coniugium, lege admittitur nature. Verū quæmodum equus, nonnunquam refractarius & contumax, non pro decore status, infestorem virum imbecillitate, aut equestri scientia ignorantia victum, simul secum rapit, trahitque longius: sic iracundia estensis, & ad præcipitem vindictam erumpens, rationem interdum imbecillam, ignarāq; vni secum soler præcipitare. Si igitur robat scientiaque habeat, vincet nimium & ratio iram (quale exemplum in Vlysi proponitur) & auriga equum. Sin autem aut altertro, aut vtroque priueter, periculum ibi est, ne id quod præstantius est, ā deteriore vincatur id quod certe in Medea contigit. In qua quidem, proutquā filius occidendis admoliretur impietas manus, diu multūq; cito relucit cum iracundia est. Nouerat enim quā impium facinus perpetraret. Ceterū postea tandem ā perturbatione deuita, ipsi iracundie concessit, dicens:

*Nouit quidem cuiusmodi faciem mala,
Sed fortius iracundia consilii mei.*

Nouit itaque magnitudinem malorum, quæ eam perpetratura, ā ratione edocta. Verū iracundiam longē fortiorē esse rationē ait, ac propterea se ab illa violenter ad scelus perpetrandum abduci. Vlyses autem contrā, ratione iracundiam cōcūct. Sæpe igitur in alio irascibilem animæ partem ratio adeo superat, vt ne pugna quidem vnquam ipsi inter se oritur, sed hæc dominetur, illa obtemperet: id quod sanē is adeit, qui ad summum pluslopiuz pervenerunt. Rurū iracundia subinde ita rationem vincit, vt imperet, ac ducat perpetuū: quem admodum in multis barbaris, & pueris natura iracundis, necnon in ferarum non paucis, & hominibus belluinis videre licet. Est quum ne alterum quidem vsq; uradeo valens sit, vt statim alterum trahat: sed aduersantem invicem, pugnantque, & temporis spacio alterum vincit: vt in Vlysi quidem ratio, in Medea autem iracundia. Quis animæ aut partes aut facultates maximē inter se differentes, Chrysippus quum in vnum confundat, carminum tamen Vlysi & Medæ meminit, qui evidenter ipsius opinio-
nem subvertunt. Taceo etiam Chrysippum, qui leonibus iracundiam ademit, carmen illud Tyrtæi inter alia adducere, Leonis animū continens in pectore: quod leonibus maximam inesse iracundiam suadet. Et quum pronunciet, ideo nonnullos vocari exordes, quod vniuersi homines animæ principiarum in corde sitant: miror sanē quod nō intelligat, nullum solūdum aut imprudentē, exordem discere illos quidem omnes, vacuos cerebros: mentulosos autē, exordes: sicuti & evisceratos eos, qui nullo affectu mouentur: omnibus nimirū purantibus, in cerebro quidem rationē, in corde iracundiam consistere. At quia tertio quoq; viscus iecur extitit, in quo appetitoria animæ vis consistat, huic etiam

*Rationi præf-
ferunt, vt eo-
que præf-feri
dicitur equus.*

Medea faciem.

*Medea iracundiam, superasti
se rationem.
Vlysem con-
cuisse iracundiam ratione.*

*Rationi semper
iracundia ob-
cedat, in eo qui
ad summū plus-
lopiuz pervenit.*

*Cerebros vacuos,
Exordes,
Evisceratos.*

*Iecur, iussu
vni animæ ap-
petitoriam.*

commodationem quandam propriorum motuum inesse oportet, si homo in totum ornari animam debet. Quas quidem tres animi facultates Euripides in Medea vehementissimas esse describens (appetitive enim acerbissimus ille amor quo Iasonem ardebat irascibilem, immanis eius furor in liberos irrationale denique, si a dea qua se ipsam à tanto scelere dehortabatur, satis abunde declarat) tam magnis vicibus donatam fuisse ait. * Quamquam neq. Euripides, neque vllus alius poeta (quorum testimonia præter morem recitare, me Chrysippi garrulitas cogit) imò vero neq. ipse etiam Hippocrates, omnium medicorum calculo, præstititissimus, quemadmodum neque Plato philosophorum princeps (cuius nec opinione sectatores Chrysippi superare vniquam poterunt, nec imitari demonstrationis ornatum) de proposito placito fidem facere possit, citra demonstrationem. Chrysippus autem cum nullius demonstrationis meminerit, interim non erubescit Tyræum & Stesichorum testes nobis citare: quos si etiam viuos aliquis interrogaret, an de horum dogmatum scientia ambigerent, faterentur vique voce vna, nihil se ipsorum sensisse: ipsi ponit à Chrysippo nonnihil discere, quæ de illis demonstrare (vt arboror) mallet. Rationari igitur, & quæ dicuntur considerare, item pugnantiam, aut consequentiam rerum nouisse, rationalis facultatis (quæ cerebro inest) est opus. Ob cõvicia autem, aut minas, neque irasci, neque exandescere, animosæ (quæ cordi hæret) est proprium. Etenim dum ea quæ in homine sunt, convenienter admittuntur, cerebrum quidem imperat: cor autè patet, & obsecundat. Diximus autem, nervorū, quæ motus voluntarij, atque sensus sunt instrumenta, cerebrum originem esse: quemadmodum articularium, cor: ad hæc etiam, confusus aut vulneratus ventriculus cerebri, totum animal febribus evadere torpidum, illi quoque motus cordis & articularium: sicuti & vbi cor similiter affectum fuerit, articularium motus offendi, citra vllam noxam voluntarij motus, & sensus, quod eorum principiorum neutrum commemoratas facultates alteri subministraret. Porro patiente cerebro, promptè animal desipit, motusq. & sensus priuatur. At corde affecto, syncopæ arripitur, interitq. prædictorum nullo quicquam perpessio. Iam vero Aristoteles, plures animæ facultates genere diuersas esse concedit, et si illas in vno corde constituit: Chrysippus autem neque eas omnes differre inter se proficitur, neq. alia quadam à vniuersali irasci, alia concupiscere, alia rationari: tamen vel testimonio positarum, quos citat, asserere contraria cogatur. Etenim in iecinore delitescere appetitoriam animæ facultatem, illic planè Homerus nos docet, vbi ait, vultures apud inferos Tityo iecur exedere, quod concupisceret consurgere Laronam: * partem nimirum illam plecentes, quæ illatz conuulsi fuerat veluti origo & radix. Quod pertinet ad rationalem animæ facultatem, cum fecisset Chrysippus, fabulam de Minerva, quæ post degluntur Menidem, ex Ionis capite orra esse putatur, sua ipsius dogmata aduersari, maxime illam detorque-

re conatur, hinc figmentum illud habuisse originem dicens, * quod artes quidem vniuersæ concipiantur & consistant in corde: à ratione autem per caput, hoc est, per os (quæ capitis particula existit) emittantur sermone. Ceterum (vt figmentum secus interpreteremur) quemadmodum cordis corpus virtute sua distentum & contractum vicissim, proprias materias attrahit, expellitque: pari modo cerebrum, vbi statum spirituum animalem, in sua contentum ventriculis, particule cuiuspiam transmittere, motu ad id idoneo incitatur, distribuit ipsum. Hunc autem spiritum qui in ventriculis ipsius est, fortassis quidem paucum, etiam venit ad ipsos pertinentes generant: copiosissimum verò & principalissimum arteriæ, plexum reticularem, qui ad cerebri basim est, perperantes, suppeditant, quæ à corde sursum feruntur. Quare si quis fabulam vni velit connectere, in partibus inferioribus prædientem conceptam (hoc est, animale spiritum) in capite natura perfici * dixerit, præterea in vertice: quandoquidem in eo medius & principalissimus cerebri sinus habetur. Verum si scientificas demonstrationes sequatur, omisitset Chrysippus fabulas, etymologias, reclamationes, declinationesque capitis, manuum motiones, labiorumq. figuras, vni cum mulierculis, & aliis idiotis, vtiq. veritatem ipse inuenisset, nec nobis perisset tempus, ostendentibus ipsum nihil ex his quæ adducit, iuari.

GAL. DE PERGAMENI de placit. Hippocrati & Plato- nis, lib. IIII.

AT vero vbi Chrysippus affectum definiens, cum esse ait irrationalem, & præter naturam animi motum, hoc est, relictantem rationi: rectè sunt ipsum qui in affectu est motus, ab inanibus irrationabilibusq. distinctum. Mouetur siquidem lapsus & lignum, sic tamen vt nō reluctentur rationi. Cuius enim nequaquam interit vt obtemperet, sequaturq. rationem, hoc quomodo repugnare rationi poterit? Merito itaq. id nō vt ratione dicetur sicuti reluctan rationi, quod à natura quidem habet sequendi, obtemperandiq. sed interius præter sui naturā, alio modo fertur. Vnde liquet, nec inanimato cuiuspiam, neq. irrationali animanti, affectū innasci posse animale. Perdecenter etiam ab erroribus affectus ipsos distinguit. Quidō quidem errores, prauis sunt iudicia, & ratio veritatem mentita, implicitatq. errori. Affectus contra, nullum quidem erratū, neq. prætermisum in rationatione: sed est animi motus rationi inobediens. Nam qui vt pariam ferret, liberosq. vitz cõtemnit, vel iugulandos tradit, non est imaginatione id facit, ac ratiocinio vicius. Medea autem, quæ sciebat qualia perpetraret flagitia, non errore, vt ille, sed perturbatione ducta, irabatur. Quinto etiam, vbi celeriter currentum, qui ne si sistere quidem velint, statim id possunt, Chrysippus meminit, apertè illo exemplo aliam vim præter rationalem, nobis posuit ob oculos, à qua affectiones ipsæ absoruntur. Etenim eorum qui per actiui currunt, nulli adest ea difficultas

Cerebri motus duplex.

Spiritus animalis continetur in ventriculis cerebri.

Cerebri motus. Spiritus animalis partem à vno capite, partem ex præcipuo ab arteriis.

Reformet plerumque constitit ad basim cerebri.

Ventriculum et rebus principalem, verticemque capitis.

Ventriculum et rebus principalem, verticemque capitis.

Rationis relictum, quæ sunt decedenda.

Affectus animalis non possit nasci, maxime alieni generis animalis.

Errori sunt præter rationem, sed est animi motus rationi inobediens.

Affectus est motus animi, rationi inobediens.

Errori sunt præter rationem, sed est animi motus rationi inobediens.

Affectus est motus animi, rationi inobediens.

Errori sunt præter rationem, sed est animi motus rationi inobediens.

Affectus est motus animi, rationi inobediens.

Errori sunt præter rationem, sed est animi motus rationi inobediens.

Affectus est motus animi, rationi inobediens.

sistens.

Medeam fuisse magnam donatam vicibus, ait Euripides, quod possideret totas animæ facultates vniuersas.

Hippocrati Platoniq. animæ.

Rationalis facultatis, quæ est rebus inest operis, irascibilis facultatis, quæ cordi inest, quod proprium.

Cerebrum est originis nervorum, quæ motus voluntarij & sensus sunt instrumenta. Cor est articularium principium.

Cerebri affectus symptomatici. Cordis affectus symptomatici. Aristoteles plures animæ facultates diuersas esse concedit, et si illas in vno corde constituit.

Chrysippi de partibus animæ opinio.

Appetitoria à vniuersali inest in iecinore.

Tityo apud inferos iecur exedere, quod concupisceret consurgere Laronam.

Minervam ex Ionis capite orra esse putatur, sua ipsius dogmata aduersari.

Minervam ex Ionis capite orra esse putatur, sua ipsius dogmata aduersari.

Currenti per
actibus, deli-
cia, & plana,
considerata.

sistendi: sed iis tantum, qui per planam quandā
ad declivem feruntur viam. Quippe composita
est ipsorum feracior causa: vna, tanquam ani-
malium, quæ animæ impetu mouentur: altera,
tanquam inanimatorum corporum, quæ corpo-
re inclinant. Ceterum qui in plana regione re-
trorum corporis inclinationem inter currenti-
um molitur, sistendi potens est, & sui iuris: qui
verò in anteriorem partem, vsq; ab illa impedi-
tur. Quæ de causa hoc pacto omnes currunt, ab
ipsa rei natura edocui, corporis inclinationem
in anteriora, celeritatem motus conferre. Quem-
admodum igitur iis, qui nihil à corporis ponde-
re ad motus celeritatem iuuantur, in promptu
est vt fiant: illis verò qui ex duplici causa celerita-
tem generant, non amplius voluntas est satis:

Inclinationem
corporis in ac-
tibus, celerita-
tem motus con-
ferre.

Impetum posse
& rationem
ab iracundia
moueri.

Ratio quando
concurrit affe-
ctui.

Ratio quando
relinquitur affe-
ctui.

Coniuncti qui
ducuntur.

Incontinenti qui
vocantur.

Temperati qui.

Proterui qui.

Irrationales a
nima vi, corpo-
re potius com-
parantur.

eadem modo in animi impetu, quum ratione
sola causam habuerit, promptum est propter
ipsam cessare impetum: vbi verò aut iracun-
dia ei, aut cupiditas quædam accesserit, quæ sunt
vires irrationales, & corporis grauitati persimi-
les, itaum quidem neutquam posse consistere,
versimile est: est tēporis spatio fortē hoc quo-
que fieri, quemadmodum in currentibus. Nam
quum ratio cunctio, & iracundia, mouere ipsum
impetū possint, si quidem à sola ratione fiat, &
compelescere ipsum, & rursus excitare sola volun-
tate licebit. Sin ab iracundia quadam & cupidi-
tate, quum illæ cessauerint. Sin ab vtraque o-
perantibus fiat, ratione simul, & facultate qua-
dam irrationali: ratione quidē remittente, quod
valentius est, præcellet: simul autem concurren-
te, nunquam cessabit. Concurrat affectui ratio,
quum quæ ille facit, etiam ratio opinatur: quem-
admodum in interperantibus & proteruis ho-
minibus, qui summum bonum in voluptatibus
fruitione collocant, vitio ratio ipsam cupidita-
tem sequitur. At reniti ac repugnare affectus ra-
tionem dico, quum homo non opinatur propo-
sire voluptatis fruitionem, honestum vsum du-
citur, quum verò à ratione sola ad suum vsum du-
citur, talis vocatur temperans, hoc consilio ea
deligens, non vt fruatur, sed vt iuuetur: quem-
admodum etiam proteruis, qui à sola cupidita-
te ducitur, ratione tanquam famulo quodam
eam subsequente. Eiusmodi ergo causam, impetum
animi exccitantur, complexui, attestatur
etiam Chrysippi exemplum. Etenim aduersus
aediue currētes, sola vi rationali ducuntur. Qui
autem inuiti feruntur ad præcipitium, irratio-
nali: quam sanè corporis esse pondus diximus:
in decliue currentes, vtriusque: perinde vt qui in
plano currunt, si prorsum tendant. Nam si re-
nantur retrorsum, current quidem aliis mi-
nus, sed vbi voluerint, sistēt. Quare nihil Chry-
sippus vsq; ad definitionū expositionem veteri-
bus contrarium pronunciat. Maxime autem ab
eis recedit, ac subimit aduersatur, dum affectus
esse iudicia existimat, in summa verò, Chrysip-

pus semper veluti in vnda fluctuat: nunc quidē
sine omni ratione fieri dicens affectus, nunc ad
solā rationalē pertinere animæ facultatē: ac pro-
inde eos, iudicia quum sint, irrationabiles aut
malibus non inesse. Oblitus autem esse videtur
interim, quod à vitis oppido quā decenter af-
fectus ipsos derinxi. Ratio liquidem, etiam
ex Chrysippi sententia, siue sana & vera, siue pra-
ua & mendax exstiterit, is qui secundum ipsam
mouetur, nunquam in affectum incidit. Quan-
doquidem secundū veram, rectē & veniunt mo-
uetur: secundum falsam, prauē & vitiosā. Vbi e-
nim ratio dux est, aut virtus sequitur, aut vitii:
affectus nunquam. Itaq; putare voluptatem bo-
nam existerē, quemadmodum Epicurus existi-
mabat, peccata, vitiosa & falsa ratio est: omniūq;
actiones & particulares animi motus, qui volu-
ptatem, tāquam finem respiciunt prauā, prauos
sanè necessarios, & aberrantes facit, ac vitiosos:
non tamen iam affectus quoque. Quippe pro-
prium affectus hoc ipsum est, vt anima citra ra-
tionem moueatur: id quod pulchre enā scriptis
Chrysippus. Quum autē nihil sine causa oriatur,
ratio verò minime præsit affectibus, iustum est
iam nobis Chrysippus respondere, quidnam af-
fectus ipsos producat. Nos liquidē affirmamus,
interim quidem ab irascibili, interim ab appeti-
toria animæ facultate illos ducere originem. At
Chrysippus nulli firmiter laxens sententiā, mo-
do eos præter rationem oriri ait, modo secun-
dum rationem, modo temerē arg. à casu proce-
dere: quocirca reprehensionem vilo pacto effu-
gere nequit. Nam si dicat affectum insultus ab
ipsa ratione oriri, discernere iam vitium ab af-
fectu non potest. Si verò rationem adimat, in mo-
tum quandam causæ expertem incidit: quum li-
ceat illi ex facili ambas absurditates vitare, si cō-
sistatur irrationalis quædam facultates in ani-
ma, affectum ipsius causas existerē. Quamquā
vbi ea quæ non rectē homines faciunt, parum qui-
dem ad prauū iudiciū refert, paritū ad infirmita-
tem animi, imbecillitatemq;: quemadmodū vbi
rursus is quæ rectē administrant, rectum iudi-
cium cum bono animi robore præstet: ut illis fa-
cile diuersam à ratione natrice vim quandā esse in
animis hominum, causam talium affectuum fa-
teri, velut nolit, cōpellitur. Siquidem vt iudiciū,
facultatis rationalis est opus: ita firmitas, robur
virtutis, facultatis est diuersæ à ratiocinatione.
Porro vt scientiam habere (secundum quam, ex
Platonis sententia, nemo vlla in re potest haliu-
cinari) non est affectus: ita neque obliuio illius
affectus dicenda est, sed infirmitas potius, aut igno-
rantia. At si quis iracundia, aut voluptate deceptus,
ab his quæ initio statuerat recesserit, imbecilis
quidem huic anima & infirma est: motus autem
ipsius, est affectus dicendus: vt constat in Menelao,
qui quum Heleni occidere decreuisset, eamq;
distincto gladio inuasisset, propius accedens, ac
mammæ illius candidissimas conspicuas, aut onusq;
ob pulchritudine eius, propter infirmitatē imbecillitatemq;
animi, nō solum gladium abiect, sed mulierem etiam
ex oculatulis, & quæ ipsam mancipium obrulit,
citra iudiciū, citraq; rationem, impetu ad cōtra-

Affectus defini-
tus dicitur.

Ratione ducit,
virtutis aut vi-
tium sequi: affe-
ctum nunquam.
Voluptati non
esse in bono po-
tendum.

Affectus pro-
prium.
Nihil sine causa
ferri.

Ratio non præ-
sit affectibus.
Affectus vnde
proferantur.

Facile utri-
que quædam irra-
tionales in ani-
ma, affectuum
causas existerē.

Scientiam ha-
bere, nulla re
potest haliu-
cinari.

Menelao imbe-
cillus, motus
estq; animi.

ria ductus, eorumque initio decreuerat. Quem admodum igitur in Medea iracundia oppressit rationem, eamque ad perpetrandum scelus pertraxit: sic animam Menelao ipsa decipiens cupiditas, revocavit illam ab instituto. Quae quidem exempla ab ipso Chrysippo adducta, maxime illa adversatur, quum ex eis constet, tres facultates diversas incite hominibus: nec esse affectus ipsos iudicia, ut qui praeter iudicium oriantur. Nec verò à veteri placito illa carmina abhorrent, quae, ut suam opinionem tueatur, citat etiam de animantibus.

Vemus siquidem ad omnia locat nobis,

Si nonq. cogas, amplius intendere appetit.

Admantis autem amor, magis premit.

Quibus postea subdit, affectus ipsos amantium declinare semper rationem, tanquam intempestivum increporem. Reperies & alia innumera in libro De affectibus, ab eo prodita, pugnantia quidem iis dogmatis, quae ipse statuit: consentanea autem & manifestò apparentibus, & opinionioni Platonis. Quum autem Chrysippus dixisset, tristitiam esse opinionem recentem praesentis mali: ab eo Posidonius exigit causam, cur mali quidem opinio, si recens sit, tristitiam inferat: inveterata autem, neutiquam, aut non periti de angat animum. Quam causam, quòd eam ignoraret Chrysippus, ipsemet Posidonius redcens, ait, omne immodicum & peregrinum subitò irruens, animum permutare: vltimum verò & consuetum, in eum, ut quidam, aut minime affectus mouere, aut parum admodum. Quare domesticum & familiare sibi facere dicit, rebus non praesentibus, tanquam praesentibus vi. Ac proinde sapientes complures, etiam si existiment se in maximis bonis, aut etiam malis versari, esse tamen ab affectu omni immunissimos. Quocirca dictum Anaxagorae assumpsit, qui quidem, quòd aliquis filium mortuum et renuentialet, admodum constanter respondit, Noui me mortalem genuisse. In hunc sensum etiam Euripides Theum introduxit loquentem:

Tristitia quid.

Tristitiam vero inferat opinio recentis praesentis mali: inveterata autem, nequaquam aut non peritide.

Immodicum omne irruens subito, animum permutat: vltimum verò, aut consuetum, non mouet, aut parum afficit. Quare domesticum & familiare sibi facere dicit, rebus non praesentibus, tanquam praesentibus vi.

Anaxagora dictum herosum.

A sapiente diu prodest ego,

In curas animum & colonitatem indidi.

Atque eadem me proposui à patria mea ad mares

Immaturas, & uici males alies:

Ut si quid poteret ex eis quae puluerant

Aliquando, animum non morderent recentia.

Eòdem pertinent & illa.

Si hic primis esset malarum dies mihi,

Et non diu necaret in Leberibus,

Foras remittere, aut pulvis iugo recens

Subditi, exantibus fructum sescrum moper.

At nunc malis obdura, & occidui.

Haez interim conuollescent longo tempore,

Mulum pubescit mox.

Affectus sedari tempore, etiam opinio ipsorum permanens.

Affectus quomodo compescantur.

Tempore itaque affectus cessant, etiam si opinio eorum & iudicia permaneat. Ut enim pars animae obnoxia affectibus, peculiaria quaedam concupiscit appetibilia: ita etiam ipsi, quum accidunt, repletur & saturatur, atque in hoc ipsum motum sistit, qui animalis impetui praeratur. Nihil autem tam clarum est, quàm vires quaedam in nostris animis esse naturae conspicuentes, hanc voluptatis, illam dominij & victoriarum.

Iam verò sunt qui nolentes plorant, lachrymas colubere impotentes. Sunt contra, qui plorare cupientes, protinus cessant, ob motiones affectibus subditas, vehementer ita ihercentes, ut non evincantur à voluntate: aut ita omnino cessantes, ut ab ipsis excari nequeant. Quorum causas in vestigantes, inuenimus quo pacto ratio cum affectu pugnet, atque ab eo differat, simulque seruabimus animae facultates. Consuetudines itaque & tempus, ad affectuum morus plurimum posse videntur. Consuetudine quippe mollescit animae irrationabilitas, in quo cunque educetur. Tempore autem affectus conquiescunt, repletis irrationabilibus potentius animae, iis quae antea desiderabant. At rationales cognitiones, iudicia, & summam scientiam omnes, & artes, neque difficiles ad dissolutionem fieri apparent propter solum tempus nudum (quem admodum consuetudines secundum affectum) neque transponi & cessare, sicuti tristitia, alii affectus id genus.

Consuetudine mollescit animae irrationabilitas.

Tempore affectus conquiescunt.

GALENI PERGAMENI de Placitis Hippocratis & Platonis, lib. V.

Quum igitur sectatores Chrysippi ostenderint, quomodo modum ipsi quidem existimant, vniuersos affectus in corde consistere: ut autem veritas habet, solos eos, qui circa irascibilem facultatem versantur: ac deinde assumptis, vbi cunctis animi affectionibus sint, ibidem quoque ratiocinatrium ipsius facultatem haberi: ita demum concludunt, in corde ratiocinatrium existeret. Nos verò, quòd inde iracundia nascatur, vni cum ipsis fatemur: quòd autem in loco eodem delitescant vis irascibilis & ratiocinatrix, non item: neque quòd vnius opera facultates existant. Porro affectum animi monitionem quaedam esse praeter naturam, rationis expertem, quae civilium animis non innascatur, non veteres tantum, sed Chrysippus quoque fateretur. Est autem inter animi constitutionem, & eam quae corpori inest, quaedam similitudo & proportio. Quare Posidonium laudo, quòd prauorum animas, quum extra affectus consistunt, sanis corporibus similiter se habere praedicat: noui probo autem, quòd eiusmodi constitutionem morbum nominet. Oportebat nanque, si rectè sapientium animas vellet assimilare, dicere, eas similes esse corporibus iis, quae ab affectibus sunt immunita. At provido, bono habitu praeditis. Mediocrius verò virorum, sanis sine bona habitudine. Vulgarium & iniquorum, iis qui vel ex occasione leuissima in morbo incidunt. Irascendum denique, aut furibundorum, aut lugentium, amantiumve, aut obfessorum aliquo affectu, iis quae iam egrotant. Siquidem quocunque tempore vel dormiant, vel ad aliud mentem huius transferunt, extra affectum feruntur. Paulo post ubi ipsorum meminerint, in constitutionem perveniunt febrium insultibus similem. Quomodo autem sanitas corporis, est comoderatio simplicissimarum eius particularum, quae iam elementa vocamus:

Chrysippi placitum de affectibus.

Affectus quid.

Animi constitutio est inter corpus & naturam, quae se similes.

Animae cum corporibus similitudo est, quae se similes.

Sanitas corporis quae.

Mus:

Sanitas animi.

mus: eodem modo etiā erit animi sanitas, com-
moderatio quædam simplicium particularum i-
pſius. Quinetiam morbus animi ſimiliter immo-
deratio quædam eſt, & diſcordia ipſarum harum
particularum inter ſe, quarum cōmoderatio e-
rat animi ſanitas. Sunt autem hæ particule iux-
ta Platonis ſententiā, irſcibilis, rationalis, &
præter hæc appetitoria. Etenim concōr-
dant invicem, & in nullo diſſident hæ tres, ſa-
nitatem animi efficiunt: diſcōrdes autem & con-
tendentes, morbum. Vbi autem Chryſippus ait,
animæ partes eſſe, per quas ratio in ea conſiſtit
intelligens animam, notionum & præſumptio-
num quandam collectionem exiſtere, dupliciter
errat. Primum enim non animi, ſed rationis
hæc dicendum erat eſſe particulam. Quippe non
idem eſt anima & ratio, quum hæc in ea conti-
neatur. Quod ſi hoc etiam aliquis irreprehen-
ſum permittit, certè notionēs & præſumptio-
nes, non particulas animæ, ſed actiones animæ
dicere oportet. Nihil autem ex propriis functio-
nibus conſtat. Ad hæc etiam Chryſippus ſanita-
tem animæ & pulchritudinē in vnum atq; idem
conſundit. Porro corporis pulchritudo, in parti-
cularum commoderatione (qualis in Polycteti
regula cernitur) ſecundum omnes medicos philo-
ſophoſq; conſiſtit. Sanitas verò, elementorum,
quæcumq; illa ſint, inter ſe eſt cōmoderatio. Cæ-
terum animæ pulchritudo, ad moderatos ac de-
centes ipſius animæ motus (qualis eſt Platonis
ſententiā) reſertur: ad immodicos autem & eſſe-
ratos, turpitudinem eiſdem. Siquidem in cōmode-
ratione motuum particularium, pulchritudo
actionum eſt cognita: ſicvī turpitudinem in im-
moderatione. Quod autem animā noſtra compoſita
ex particulis diuerſi generis, & ſubſtantia &
ſede inter ſe diſſentibus ſit, quodq; innumeras
vires ſortitur, Hippocrates eſt atq; Platonis Pla-
cium. Quare neq; in vna particula animæ, neq;
in vna ipſius facultate, tum iudicia, tum etiam af-
fectus ſiunt, vt Chryſippus exiſtimavit. Iam verò
pueris multo plures & velemētioreſ quam ad-
ulnis oboriuntur affectus: quum à nullo docti
magiſtro, ſed naturali ductu illi omnes ad volu-
ptates ſeſtantur, averſentur autem labores. Vi-
demus enim ipſos & irſcētes, & calcitrautes,
& mordentes, & prævalere cupientes, vt nonnul-
la animantia, nullo præmio propoſito, præteri-
pſam victoriam. Neque verò à ratione impetus
eorum coerceri dicere poſſe, vt qui rationem
nequum habeant: neq; quod non innumeris af-
fectibus implicentur. At vbi præceſſent, quo-
niam ad honeſtum, naturalem quandam pro-
pentionem habent, & erubescunt peccantes, &
iuſtitiam, aliāq; virtutes amplectuntur, facientes
plurima ſecundū earum notionēs: eſt prius,
quum eſſent parvi, ex affectu viuerent, nullāq;
præceptorum ex ratione curam haberent. Cæ-
terum animæ conſtitutiones, ex diuerſis corpo-
ris temperamentis oriuntur: quum videamus a-
nimalium, quæ ſan pectoris & calidiora ſunt, om-
nia ſortiri naturam iracundiorē: vt timidio-
rem, quæ latius coxiſ, & frigidiore. Ac ſecundum
varietatem regionum, haud parum etiam mor-
bus homines ad timorem & audaciam, vel vo-

luptatis laborisq; ſtudio, diſſerūt. Quare, mea
ſententiā, curatio animi affectuum, in nonnul-
lis quidem prompta & facilis eſt, eò quod neque
affectuum motus ipſiſ infinitè validi, neq; ratio-
cinatrix pars, imbecillis natura & imprudens, ſed
propter inſcitiam præcipue conſuetudines, id ge-
nus hominum viuere ex affectu cogantur. Non-
nulli verò diſſiciliſ, quum motus affectuum, qui
ex corporis conſtitutione neceſſariò obve-
niunt, magni & velemētes extiterint: ratiocina-
trix autem facultas imbecillis, imprudensq;.
Hunc quippe verſicentiam indipiſci oportet, ac
affectuum motus retundere, probis inſtitutio-
nibus aſſueſcentem. Sic itaq; & ab inſano homi-
nem ad optimū conformare oportet, ante om-
nia quidem, ipſorum ſeminiū, dein victus quo
grauida vitetur, ac præterea cibi, potus, exercitio-
rum, atq; adeo quietis & ſomni ratione habita.
Oportet autē (ut inquit Plato) pueros iam ad-
doctos, ita educari & inſtitui, vt reddant partem ani-
mi affectibus oportunitatem & irrationalem, mo-
tibus commodatam, ac rationis iuſtiſ audien-
tem. In pueritiā tamen exigam & imbecillam
+ hanc ipſam rationem eſſe verſimile eſt: ma-
gnam verò & valentem evadere, circa quantum-
decimum ætatis annum: quando iſm dominari
& imperare ipſam conuenit, tanquam aurgam
quendam pari conuictorum æquorum, nempē
cupidentem, iracundiorē, dum non valentes
num ſunt, neq; imbecillæ, nec pigre, nec eſſe-
rent, nec contumaces omnino, aut in decorē, aut
contumelioſæ, ſed in omne promptæ, ſum ſequi,
tum obſecundare rationi. Huius autem inſtitu-
tionem, virtutēq; ſcientiam eiſ oportet re-
rum naturę: quemadmodum autiq; ſpeculatio-
num artis aurgam. Nam in irrationabilibus
animæ viribus, ſcientiæ non ſolent inſiſci, ſicvī
neque equis: ſed his ſanē propria virtus, ex con-
ſuetudine quadam irrationali proſicuriſ, au-
rigę autem ex diſciplina rationali. Quemad-
modum igitur irrationaliſ animæ partium neceſſe
eſt irrationales: quoq; virtutes eſſe, ita rationa-
lem, ſolus rationcinatrix. Quapropter merito
illarum virtutes, facultates dicendę ſunt: ſolius
autem rationcinatrix, ſcientia. Quum itaque in
nobis alia potior ſit animæ pars, alia deterior:
qui potiorē ſequitur, contentanciam naturę vi-
tam dicitur agere: qui deteriore, repugnan-
tem. Hic enim ex affectu, ille ſecundum ratio-
nem, viuūt. Quum igitur hæ tres propentiones
nobis natura inſint: ad volupſtatem ſanē, pro-
pter appetitoriam: ad victoriam verò, propter
irſcibilē: ad honeſtum deniq; propter ratio-
cinatricem animæ facultatem: Epicitus quidem
inſimē aurgę partem tantū proportionem con-
ſpexit: Chryſippus autem, optimæ, quum dixerit
peculiariter nos affici erga ſolum honeſtum. Ac
vniuſerſas tres proprietates perficere ſolis ve-
teribus philoſophis licuit. Porro qui ex affectu
viuūt, hic irrationalem & æroniam animæ par-
tem: qui verò ſine affectū, rationalem atq; diui-
nam ſequitur. Quare affectuum cauſa cognita,
plurimum ad remedia inuentionem conſert. Id-
circo Damon medicus quum eſſet apud tibici-
nam Phrygiū modulantem, cibus quibuſdam

Anime partes
ſanſcibilis,
rationalis, &
appetitoria.
Chryſippi error
duplex.

Anima & ra-
tio non ſunt
idem, quoniam ra-
tio in anima
contineatur.
Nihil ex pro-
pria conſtat a-
ctionibus.

Pulchritudo
corporis, in par-
ticularum com-
moderatione
conſiſtit.
Sanitas eſt ele-
mentorum com-
moderatio.
Pulchritudo a-
nimæ, ad decen-
tes eius motus
reſertur. vt tur-
pitudinem, ad im-
modicos & eſſe-
ratos reſertur.
Anima noſtra
compoſita ex par-
tibus omnibus
inter ſe diſſent
ſolus.

Pueri volupſ-
tati, plures
affectus, quum
adulni, erunt.

Anima conſti-
tutiones ex di-
uerſis corporis
temperamentis
naſci.
Irconcordia eſt
ſe animalia
quæ lato pecto-
ris, & calidiora
ſunt, omnia
ſortiri naturam
iracundiorē.
Regionum va-
rietate, diſſerunt
in timore facti.

Hominem ab
inſano, quo pa-
ſſo ſecundo vi-
tutem formam
atq; inſtitutionem
oportet.

Pueri rationē
ipſam eſſe imbecil-
liſ, valentē
autem evade-
re, circa quantum-
decimum ætatis
annum.

Scientiam non
inſiſci irrationa-
libus animæ
facultatibus.

Irrationalem
animæ partem,
irrationales
virtutes eſſe
rationalem autē,
ſolus ratio-
cinatrix.

Viuere qui ex
affectu, & qui
ſecundum ratio-
nem dicuntur.
Propentiones
quibus monemur
naturę ſunt tres.

Affectum cauſa
cognita, plurimum
ad remedia inuentionem
conſert.

adoleſcentibus, & inſana quedā peragentibus, Dorici canere uſit: illi verō ſtatim à motu inſulſo ceſſant: non quod opinionem rationis cōtritaſ facultates docerentur à canoniſ tibicinarum, ſed quod affectibus obnoxia pars animæ, quā eſſet irrationalis, excitaretur, mitigareturq; moribus irrationabilibus. Si quidem irrationali, ab irrationabilibus & cōmodum & noxa obvenit: rationali verō, à ſcientia bonæ diſciplinæ. Verū pars animæ affectibus obnoxia, tempo-

ris ſpatio parum repletur propriis cupiditatibus, partim durturus laborat moribus. Quapropter amborum uōmine ea conqueſcente, & mediocriter mota, ſuperior eſſe ratio iam poteſt: quemadmodum & equo eſſenti inſeſſorem violenter excutiente, demē & labore ſitum curſu, & præterea ſaturato iis quæ concupiuit, ruſus auriga ſuperior evadit. At Chryſippus neq; diuerſam animæ partem affectibus deditam, à rationali arbitrat: & affectus tollit à brutis animantibus, quum tamen libidine & iracundia regantur. Poſidonius autem rectius, quæ animantia ægrè moventur, & ſimpur modo adliereſcunt petris, ea cupiditate ſola gubernari pronuntiat. Reliqua verō bruta vniuerſa, vtriſq; facultatibus vti, & appetitio ria, & iraciſcibilis. Hominem autem ſolum, tribus: quippe rationale principium, hunc ſumere. Quod igitur pars animæ appetitio ria, diuerſa ſit à rationis, hinc colligere licet, quod pueri dum ſumus, inſtar brutorum animalium promptè ad repletionem ferimur, neq; an id conducat, aut obſit, conſiderantes. Aetate verō & ratione provec̃ti, ſepe ne bibimus quidem omnino, ubi perſuaſum habuerimus, ex potu noxam ſubſecuturā: ſepe minus quā appetimus, ſi & hic copia obſcure eſt. Interin aquam bibimus, vinum concupiſcentes. Rationis autem expertes homines, ſimiliter inſantibus atq; feris, neq; tempus expectant, neq; quantitatē, qualitatēve corporis inſpicere ſuſtinent. Quod ergo nec feræ, nec infantes, ratione vrantur, etiā apud Chryſippum in conſeſſo eſt. At quod vi alia præter rationē ad fruendum iis quæ concupiſcunt, nil ſciantur, modō aut, modō negat. Etenim irrationalis in nobis facultas, ad ſingula quæ deſiderantur, requiſentem alſicitaratio retrahit, & inopportuna cōmonem continet, ac pugna frequenter vtriſq; valida inter ſe oboritur, evidentem indicans duplicem eſſe in nobis naturam facultatū in vicem diſiſidentium. Si enim vna eſſet ſola, quemadmodum in pueris, nihil ſanè prohiberet intempeſtue nos frui appetibilibus. Quemadmodum etiam hi ſola eſſet ratio, nullum eſſet negotium, ſinentem non bibere, aut eluſcentem non eſſe: neq; contenta, neq; ſobrius, qui non bibit, nominaretur: ſicut nec qui non vadit, niſi velit. Si enim itaq; nolentis autem bibere, anima, vna quidem facultate, aut parte, potum concupiſcit: altera verō, fugit, & averſatur. Vni enim & eidem arripere aliquid fugeretur, non licet. At verō ratio iracundia, vt ſubſerviat & auxilietur illi, perinde ac venatori canes, contra tertiam animæ ſpeciem, à natura tributa eſt. Quare ubi vltro ſequitur ratio appetentiam, conſequitur & iracundia

rationem. Vbi autem adverſatur illi, atq; reniſtur, iracundia à ratione itat, atq; illi fert opem, præcipue cū ratio ipſa ab aliquo veſ intus, vel extrinſecus ſe affici iniuria, & vt compelli, autumat. Si quidem autumare ſe iniuria affici, rationalis eſt facultas: eam autem viſci, animoſe proprium exiſtit. Quum igitur appetitio ria facultas, immoderatè ad aliquod irruens, inuitam rationem eō ſecum attrahent, iraciſcibilis contra illam rationi ſuppentat fert. At ubi à nullo affici iniuria putatur ratio, miniſ ſanè iracundia eſſerueſcit, etſi quāmaximè tunc corpus iuſte puniatur ab aliquo, vel algere, vel fameſcere, vel ſitire coactum. Vnde liquet, iracundiam naturali ſtatu prædram, opinionem e rationis ſequi. Fieri tamen quandoq; poteſt, vt hæc quoq; præuē affecta, immorigera rationi moeuerat. Quod autē iracundia à ratione diuerſa ſit, hinc docet Plato, quod pueri, perinde vt ſeræ maximè iracundi exiſtentes, ratione careant. Eodem ſiquidem modo iraciſcuntur pueri, quo & ætate provec̃ti: hoc interneſto diſcrimine, quod hi ſane in multis, ratione continent iracundiam, quemadmodū generoſum canem, ferrocius proximis inſilientem aliquis paſtor: in pueris autem, nihil eiſmodi accidit, quemadmodum neq; in beſtiis: quod in illis quidem, nōdum, in his autem nunquam, ratio impetus animi inlubeat.

Iracundia ſe naturaliter habens opinioſi rationis ſequitur.

Pueri carere ratione.

Bruta, libidine & iracundia reguntur.

Animalia quæ à quibus animæ facultatibus diſſeſcuntur.

Animæ partem appetitio riā, diuerſam à rationis animæ partem eſſe ſunt.

Naturam facultatū nobis inſeſſe duplicem.

Iracundiam eſſe ſe à natura tributam rationis contra cupiditatem, cui vltro motus cauſatur.

GAL. DE PLAC. HIP. ET PLAT. LIB. VI.

Si autē actio, motus quidam efficiens, hoc eſt, qui ex ſe exiſtit: affectus verō, motus in altero, ab altero, vt neceſſariō ſepe in vñ ſubiectum cum affectu actio conueniat. Nam à ſecante facta diuiſio in eo quod ſecatur, vna & eadem res quum ſit, ſecantis ſecatur actio: eius autem quod ſecatur, affectus eſt. Ita ſanè & iracundia, actio quidem eſt iraciſcibilis animæ: affectus autem, reliquarum ipſius duarum partium, & præterea totius noſtri corporis, quum ab iracundia violenter ad actiones ducitur. Atque hoc vnum eſt ſignificatum vtriuſque nominis. Alterum autem, ſi actionem quidem, motum quendam naturalem intelligamus: idq; primaria ratione: affectum autem, præter naturam. Etenim primaria ratio illa fieri à natura dictus, quæ velyn ſe copos natura amplectitur: nec ex aliqua conſequentia, alia neceſſariō ſequitur. Vt autem res magis innotet exemplis, cordis motus, * qui in pulſibus quidem ſit, actio dicitur: qui verō in palpitatio nibus, affectus: pro ſecunda huius dictioſis (affectus) ſignificatione. Atque ita non omnis pulſus eſt actio, ſed is tantum, qui naturalis exiſtit. Iracundia igitur & omnes animæ affectus, actiones quædā ſunt, ſecundum primum ſignificatum. Quatenus autem eſſerent & immoderati exiſtūt, neq; ſecundum naturā, affectus eſſe dicuntur, ex ſignificatione ſecunda. Qualis enim res in arteriarum motu magnus eſt pulſus, talis in iraciſcibilis animæ motu, iracundia. Qualis rursus paruus pulſus, talis nimiditas. Poerō iracundiam ipſam frequenter alia

Actio quid. Affectus quid.

Iracundiam eſſe actionem & affectum ſecundum naturam animæ partes.

Actioſi affectus duplicem ſignificationem.

Primaria ratioſis quæ ſecundum naturam dictus.

duo sequantur: si per verò concupiscentiā, tanquā abtracta, compulsiq; ingalium equorū initar, quorum alter valentius impellens, alterū secum trahit, vñ cum auriga & curru. Tunc enim in ef-
freni quo motus, actio & affectus eius dicitur: priori quidem significato, actio (motus enim ex seipso est) secundo autem, oō actio, cū sit mo-
tus et præter naturam, sed iam affectus. Auriga-
verò motus, ne secundum alterū quidem signifi-
catum actio est, sed secundum utrumq; affectus: 10
cū neq; ex seipso, neq; secundum naturā ei ad-
fic motus. Iam verò facultates illas tres corpus nostrū regentes, rationalem, irascibilem, & appe-
titorū, tum species, tum partes animæ recte ali-
quis nominant. Quarū appetitoria quidem, bel-
lae varq; multiplices: irascibilem autem, leonū,
homini deniq; rationalem Plato interdum com-
parat. Quāvis idem in Phædro, priores quidem
illas equinam quandam formā referat ut: auri-
gam verò, tertiam. Quamobrem Plato loca eas, 20
esse distinctas, & substantias permultū variare ar-
bitratur, merito illas tum species, tum partes ap-
pellat. Aristoteles autem & Posidonius, facultates
eas esse vnius substantiæ ex corde proficiscē-
tes, affirmant. At Chrysippus, tanquā ad vñ
substantiam, ita & ad vñ facultatem ratiocina-
tricem diducit tum ita cundiam, tum ipsam con-
cupiscentiā. Porro in stirpibus solum specē appe-
titoriam habitare, professus est Plato: in diis au-
tem ratio ciatricem. Irascibile verò in homini-
bus creatam esse ait, rationales animæ auxiliari-
cem, tanquā canem quendā, cōtra multiplicē
illam & agrestem fērā, cupiditatē. Plato item nos
docuit, quōd quæcumq; fuerit species, hæc, pars
nominari etiam posuit: nō tamen quilibet pars,
statim species erit. Cū igitur ex iis quæ superius
ad nobis sunt tradita, constet iam ratiocinatricem
quidem animæ partem fontēq; voluntariarū
actionū consistere in cerebro: in corde autē tum
irascibilem, tum pulificam facultatem (etenim si 40
sunt intercipiantur, aut dissecantur nervi, particu-
larē quidem continuū cerebro, principij sui re-
tinere facultates apparent: quæ verò infra sunt
habentur, statim & sensum perdunt, & motum:
quemadmodum etiā arteriæ, quæ quidem cordi
cōtinuæ sunt, originis suæ perpetuæ functiones
obseunt: quæ verò vinculo interveniente, illius
cōmmercio priuantur, prorsus nō pulsant, ac præ-
terea affectus animi qui ex iracundia & motu ac-
cident, cor palam immutatur à sua actione viden-
tur) reliquū est vt appetitoria delitescere in hepa-
te, similiter ostendamus. Quippe hoc viscerē le-
so, et si nō subito afficiatur reliquæ partes, quæ
admodum per aliorū læSIONES, temporis tamen
processu animal nutrimenti inopi elanguescit,
atq; in pallidum colorē mutatur. Eiusmodi nāq;
facultatis initium est iecur, qualis & stirpibus in-
est. Ad cuius demonstrationē, optimū prius fue-
rit considerare, quæ modo stirpes signant. Pro-
iecto in terram semine quacūq; si iqualida il- 50
la fuerit, ac siccā, nihil amplius ad stirpis genera-
tionem in ipsum semen molietur, cū nimirū or-
nem eius madorem ad se ipsa terra aliciat. Vbi
verò mediocriter humida est, molle redditur se-
men, intumescitq; iuxta ambiens ipsum opercu-

lum: quod utiq; rumpitur quidem primū, mado-
re seminis in acrem converso: dein de protendi-
tur iuxta rupturam germen quoddam tenue, &
vtrobiq; molle: ac superior seminis portio ceu
ad aërem, inferior in terrā vergit. Atq; hæc qui-
dem continuū videntur augescere, ac semper fer-
ri in quæ ab initio inclinabant. Processu tempo-
ris, si arboris cuiusdā magnæ sit semen, pars quæ
in aërem fertur, caudex ipsius evadit: quæ in imū
terre declinat, radix: & vtraq; portio variis foli-
sura diuiscatur, si multitudine arboris ipsum se-
men existerit. Vñ itaq; principium generatio-
nis & incrementi omnibus stirpibus partibus est la-
cus ille, vnde sursum quidem caudex, initium ve-
rò radici nascitur: ac apparet velut ex loco quod-
dam, virtus dispensans arborem, illinc procedere.
Quale autē est animans, obis, tale stirpibus
extremū radicationis videtur, osculus pluribus
ex terra alimentū trahens, fabricatū. In hūc
igitur arboris modum licet magnā autem cer-
nere, quæ caudicis instar ex corde procedens di-
uiscatur, altera quidem parte minore ad caput
perpetrans, altera verò maiore per spinā sese de-
torquens: à quibus propagines omnium corporis
arteriarū oriuntur. Cōtemplare rursus alterā ar-
teriarū ex ipso cordis sinu profectam, quæ in pul-
mones, nō secus ac radices pars in terram, diuisū
dicitur. Quemadmodū enim ex terra per radices
totū alimentū trahit arbor, ita ex pulmone cor
per dictam arteriā haurit. Quare arteria quæ
velut caudex apparet, maxima est omnium quæ in
totā animalī habentur: quæ in pulmone infici-
tur, omnī maxima est, quæ inibi existunt: ipsum
verò cor, medium ambarū est, & origo facultatū
eas quæ nutriunt. Constat namq; maiora mi-
norum semper esse principia, sicuti & fontem, ni-
uorum in quos dispensatur quāvis nōnullū eō
veniunt absurditatis, vt principia ea quæ pōst
ipsum sunt, esse maiora existimant, decepti ob su-
mina, quæ exigua planē cum prope fontes ex-
istat, progressū augentur. Non vident tamē id sic
accidere, quōd in se alios decursus aquarū excep-
perint. Quippe nullū flumen ex vno procedens
fonte, minus caput obinet iis quæ subsequuntur.
Eset autē summa impudentia, aliud viscūs à cor-
de statuere arteriarū principium, cū hoc solum
viscūs animalis corpore exemptū, diuissimē na-
turalem functionē retineat, ceu initium motus
tum sibi, tum his quæ ab ipso proficiuntur, arte-
riis. Hæc autē ab eo segregatæ, aut funibus inter-
ceptæ, aut diuise sectionibus, vñ cum affectu
ipso, motum etiam amittant. Porro venæ quæ à
iecore ad ventrem pertinent, similes sunt radici-
bus. Nam vt arboribus terra, sic est animans
venter. Ceteri vena caua truncus quidam exis-
tens, atq; à gibbis partibus hepatis orta, in supe-
riorem & inferiorē corporis regionem excurret.
Cuius latissima portio est, quæ infra iecur de-
scendit: minus autem lata, quæ sursum per septū
transuersum adit: his verò duabus minor, quæ
in cor inferuntur: quāquā si esset cor venæ cauæ,
sicuti arteriæ magnæ, principij, maxima esset (o-
pinor) portio venæ ei cōtinua. Est itaq; tū vena-
rum, tum sanguinis, tum nutrimenti facultatis ini-
tiū hæc: quod viscūs in vniuersas corporis par-

Animæ partē
singulā, quib;
animelibus cō-
parat Plato.

Aristoteles ex
Posidonij senten-
tia de specie-
bus animæ.

Stirpibus insi-
pi solum appe-
titoriam vim,
ait Plato.

Species omniū
potest vocari
per species tamē
animæ per species
cōstata. Ratiocina-
tricis facultas cōsti-
tuitur in cerebro.

Nervus scilicet,
partem supra si-
cuti, vñ
sunt in cerebro, fa-
cultates in me-
mbris ex his sunt.

Irascibilem fa-
cultatem cōsti-
tuit in corde.

Iecur esse ini-
tium facultatis
nutrimenti, qualis
stirpibus inest.
Stirpes quæ ra-
tionales signan-
tur.

Arteria magna
etiam, diuiscitur
trig.

Arteria vna
est.

Cor haurit spi-
ritum à pulmō
ut per arteriā.

Maiora mino-
rū semper esse
principia.

Venter anima-
lis est, quod
arborib; terra.

Vena caua
(quæ ab hepate
nascitur) di-
uissimē procēdit
que.
Hæc est tamē
venarum, tum
sanguinis, tum
nutrimenti fa-
cultatis ini-
tiū.

Hepatis re-
mota, ex-
purgata organa.

tes benignum alimentum distribuit. Quod autem sanguis perficitur in hepate, argumēto sunt recrementorum purgatoria instrumenta, quae natura illi fabricata est, renes videlicet, lien, ac cetera perix bilis vesica. Nam quartum aliud alimentum excremētū, vel materiam qualiscumque a calore mutatur, ne cogitare quidem licet. At in corde, neque aliud quoddam purgans instrumentum natura fecit, neque alium machinatur est humorē. Similis namque sanguis est, & qui in dextro cordis sinu, & qui in omnibus venis per totum animal cōtineatur: quemadmodum & qui in arteriis habetur, ei respondet, qui in sinu sinistro existit. Maximam fidem iecur nullū humorem præparare ipsi eorū; ad partem illius nutritionē ē (quemadmodum nōnulli putabūt) sed ipsum vniuersum eius speciem abibit, ut quodcūque vna sit vena quae ex iecore in cor procedit, alia nulla fēritur ex altera ipsius cordis parte, quae elaboratum humorem in totum corpus deducat: est alia quidem arteria inferat, alia educat spiritus. Videtur quippe natura nō esse vni vasis, & ad semel elaborata maiestas, & ad omnino confectio: imo ne eisdem quidem vasis. Taceo complura animalia; dextro cordis sine care. Vnde existimari nō potest, curam venam ex hoc oriri ventriculo, cum in permixtis animalis generibus, iecur quidem existat, & caua vena: sinus autem dexter nequaquam. Etenim quae non respirant ex aere animalia, ea neque pulmonem habent, neque cordis ventriculum dextrum: qui sane simul cum pulmone pent, & generatur. Igitur quemadmodum arteria magna ex corde, sic semper vena caua ex secinoria gibbo oritur, vel si dexter corda sinus non adsit. Quae quidem vbi septum transuersum subter cor penetrauerit, in duos magnos ramos diuincatur. Quinetiam ex cauis hepatis, altera vena (quam portas, aut portae vicionem appellant) producta, in partes ventris varias demittit propagines. Quarum omnium cum nulla cordi cōnna sit, mento dictum est, venarū omnium esse radicationem hepatis, arteriarum cor: si cuti & arboris, partem illam, quam occupauit semen proieciunt. At Pelops venarum principium cerebrum esse existimans, cōfessionem ipsarum a iecore est ascripturus: affirmans hoc viscus, ad disciplinam fieri in sinu sermone: eōdem rāmē in sinu a natura cōstitutum, etiam disciplinam cogat a seipso fieri. Quare inquirendum non est aliud rei naturae principium, aliud ipsius discipline. Iam verō, cum in corde reperiantur tantum quatuor ora vasorum: duo in sinistro ventriculo, quorum vnum quidem ex pulmone spiritum introducit, alterum educit a corde in vniuersas arterias: atque in dextro similiter duo, quorum alterum sanguinem velut in pulmones, alterum in dextrū sinum cordis introducit ab hepate: haec beatus hoc orificium quantum, tres quidam in se membranas foris intro vergentes, quae ad orificium id cōnidentes, impedimento sunt, quod minus contracto corde, sanguis semel in cor ingrederetur, reuertatur rursus ad vna cauiam: nec reperitur quantum aliud ab his orificiū, quo sanguinem ex iecore ad ipsum cor perueniunt, in totū corpus transmittit: sane liquidū cōstat, cor

neque esse initium sanguinis totū corpus ostendit: tu opifex, neque instrumentū ipsius. Quam verō necessaria sit animanti vna, ipsa sanguificatio, hinc discas licet, quod cum possumus viuere, et si si cibos venter non cōterat (interdum enim saccos tantū, aut ipsam lac propinamus) ocellis moriendum sit nobis, sanguinis generatione periretur. Quod autem ipse venter non procedat a corde, vel in ipsa in vtero factum in conformacione, facile percipere est. Omnes siquidem secundarum venarū, quae vtero conceptum annexant, propagines sunt vniuersae venter maxime, prodeunt: ris ab hepate. Si quidem ostensum est, maximam vasa viciniorū esse principia. Quarum venarū extrema, vel vbi radicata in vtero, sanguinem ex corde ad iecur, tamquam rotas in ipsius principii, sursum videntur transmittere. Vena itaque procedens ex iecore, venarū omnium quae secundas percipiunt, initium existit: sicut & arteriarum, arteria quae a corde trahit ortum. Etenim huc quoque omnibus quae in secundis sunt, propriam facultatem suppediat, non illa huc. Quippe ex semine infans, namque primum facultatum eos gubernarum, nō ex vtero. Porro si sunt intercepta, aut nullum digitis vmbilici arterias compressa: omnes quae in secundis habentur, statim pulsū destitutas videbis: cuius contrarium ceteras, si motus in totū ipsas praefrater vterus. In quod igitur omnes desinant secundarum venarū, inde nec cessant procedunt. Atque (ut manifeste est cōfessionibus liquet) vniuersae in vnam cōnentes venarū ex iecore enatae: sicut & arteriae omnes, in duas magnas degenerant, quae cōnidentes venas fiant, atque in deinde pergentes, in illas terminantur arterias, quae a magna lumborum arteria oriuntur, in ora iectus feruntur. Quare multo magis hepatis venarum principium dicendum est, quam cor arteriarum. Sed neque illud te oportet latere, quod omnino pulsarent venae, si ex corde originem dicerent. Pulsat namque totum ipsarū cordis corpus, sublatum, contrae itaque ex seipso: quam quidem eandem vim a se ortis elongant arterias. Quod si cor operemini nudaueris, dextri ipsius ventriculi pulsū euidenter contuebere. Nec te hircibit enim, ei vas insertū, quod caue venae est propago, similiter arteriae pulsare: quāvis etiam pulsatio minimē communetur ceteris quae per vniuersum corpus feruntur: venae: ut motus arteriae magis: At verō non quia implentur arteriae, ob id dilatanrur: sed quia dilatanrur, implentur. Virgitudinem si quoniam repperam, si requiris eorū dōd primae generationis venarū, ad iecur est: si materis dispensationis, qua vniuersum corpus nutritur, & virtutis, aliud nullū viscus repperam, quod aptius in intro censeatur. Ad haec verō, si id quod mutatur, in similes species cum eo quod mutatur, pervenit, iecoris ipsius carne nihil ad sanguinis generationem reperiri possis accommodatius. Nam sanguis si in crassum fuerit, tum colore, tum cōsistentia, exacta iecoria caro efficietur. Ac proinde si humor qui ex ventriculo in iecur distribuitur, fieri sanguis debeat, necessum est ut ipsius a propria hepatis substantia fiat mutatio: quod quidem ipse venarum tenax, ex sua ipsarum natura generare sanguinem nequeamus.

Non

Vasum ipsi
vni materiam ad
semel elaborata
maiestas, et ad
omnino confectio
illas.

Animalia non
respirantia ex
aere, neque pul-
monē habent,
neque cordis ven-
triculū dextrū,
qui cum pulmo-
ne perit, & ge-
neratur.
Venarum di-
uincatur,
Vena porta.

Venarum radi-
cationes est hep. ar.
Cor est radica-
tio arteriarum.

Initium a na-
tura cōstitu-
tum, corū disci-
plinā a seipso
fieri.

Corde in se
quatuor tantū
ora vasorum.

Cor neque est
initium opifex
sanguinis, neque
instrumentum
ipsius.

Venter licet
nobis, etiam si
vter cibos ad
conterat: potest
autem aut fan-
gificatione,
non ita.

Secundarum
venarū, quae
vtero conceptum
annexant, pro-
pagines sunt.

Vmbilici arte-
riarū anulo in-
tercepta, omnes
quae in secundis
sunt, statim pulsū
destitutas videbis.

Veni non pre-
parat materiam
cum semel dext-
rum arteriarum.

Hepatis cor magis
principium venarū
dicendum est, quam
cor arteriarum.

Cor vni-
uersum dextrū
pulsare, non
venam illi a se
ortis elongant.

Arteriarum de
latentia quae
implentur, sed
ob id implentur,
quia dilatanrur.

Cura hepatis.
Sanguinem fieri
a propria he-
patis carnis
substantia,
venarum tui-
cas ex sua ip-
sa natura non
posse sangui-
ficare.

Venerum
necesse videri.

Ventriculus
sui
ipsum
lancem
gratia
obis
eo
quore.

Iecur
multum
parum
gratia
alimenti
permutat.
Distribuit
alimen-
tum.

Instrumenta
nae partes.

Vasorum
alio
non
necesse
commutare
ratione
corporum
quibus
sajera
sunt.

Angulus
infecti
proprium
alimen-
tum, propter
proprietatem
sustentat.
Iecur
est
veluti
sanguis
quod
excrescit.
Grana
genera-
tio.

Cor
est
ficcus
atque
calidus
hepate.

Sanguis
humidus
et ruber,
prima
in iecore
generatio
constituit.

Sanguis
flavus
spiritalis
prima
in sinu
hepatis
sive
est origo
vbi
anima
trafibi
lo habitat.

Vena.
Arteria
cubiti
dilatatur
motus
quod iudicat.

Non enim rubrum illud humorē, sed album & viscosum reddere idonez sunt, unde & generatio ipsius est, & incrementum, & nutritio. Porro ventriculus circa cibos sui tantū ipsius grana cō tractus, peculiariter sibi ex ipsis humorem fugit; quo quidem vbi fuerit expletus, superfluum totum ad iecinum intestinum propellit. In de rursum iecur trahit ipsum, atque elaborat. Sicut autem ventris reliquū iecinum sit idoneū, ita huius rursum ipsius superfluum, iis quæ post iecur habentur omnibus, cū neq; iecur ipsum, eorū causa alimēti permuat. Quemadmodū igitur iecur per venas ex ventriculo & intestinis alimentum attrahit, quod sibi ipsi, hoc est, flux carni assimilata, ita quæ post illud constitutz sunt partes, per alias ad se venas alliciunt, deinde rursus alax, donec in omnem animantis particulam alimentum sit distributū: ac præparat semper præcoquitq; vnaqueque particula ei quæ sequitur, secundum distri-
butionis continuatē. Singule autem anima-
le instrumentarie partes cum ex aliis simplicioribus cōstent, omnino peculiari quadā eiusmodi substantia sunt præditæ, quali nō aliud totius animantis corpus. Arteriz verō, nerui, atq; venæ, instrumentis inferantur cōmunis vltus grana: quorum actio neutiq; ex corporis loco immutatur, sed vbicunq; sint, semper illi vltum cōmuni-
nem præstant. Quine etiam proprium cuiusq; corporis, sine his ipsis existit: ac proinde actionem propriā, eximigēdē diuersā ab aliis, singula possident, propter proprietatem substantiæ. Nihil itaq; mirum est, iecoris proprium corpus secundum ipsius naturā esse gignēdō sanguini aptissimum, vt quod ruberrimū sit, tanq; sanguis, & solum hoc, quod coagulatum sit, ab eo differens. Grana siquidem coagulatio, ab ambiente sit, exingente quidem calore ipsius: deniq; grante autem substantiā, propter refrigerationē. At non ita etiam in hepate accidit, sed ab infra caliditate, quæ exornet id magis, quam corruptat. Alteratur enim vtroq; modo sanguis, vix graminus euaserit, siue iecoris caro. Verūm alteratio in grumum, via ad corruptionē est: in iecoris autem substantiam, actio nature. Cor etiam rubei coloris est participes, at nō quantū iecur: quippe hoc viscus, corde est humidius, atque rubrius, molliuq;: cor aut ficcus, calidiuq; iecore existit. Ita enim futurū est simul durius, & duplici motu, arteris similiter, agitabitur: vt eiusmodi agitatione, conseruetur caloris natui symmetria. Igitur sanguis humidus & ruber, prima in iecore generatio constituit. Rurū autē venæ eam in totum corpus distribuunt. At sanguinis flauī, tenuis, subtilis, spirituosī, calidissimī, & qui rapide per omnia membra fertur, vt inquit Plato, prima in sinistro cordis sinu est origo: ideoq; irascibilis anima ibidem habitat ostenditur: Sanguinem autē hunc arteriz in vniuersum corpus dispenfant: quas vetustissimi medicorum similiter appellarūt venas: et si ab aliis, quod quidem vas pulsāt, arteria: quod autē pulsus est expers, vena cōmuniter appelletur. Porro cū motus arteriæ quæ cubitum, ac præterit sinistram, excurrit, ex generatione est citatus, & magnus, validuq; robustam in corde vim irascibilem inquit: calo-

rem verō in eo vigentem, & feruidum, quem nominare furiosum iracundūq; mos est. Eam autem arteriam appellā venam Hippocrates, ait. Cui celeriter venā in cubito pulsāt, furiosus & iracundus erit: cui autem lente, torpidus. Quod autem in iecore collocarūt Plato eam aumæ partem, quæ esculenta potulentiaq; expent, illic maxime significare videtur, vbi ait. Verū eam animi partem, quæ cibum potūq;que, & reliqua omnino quibus corpus indiget concupiscit, media regione inter septum transuersum, & vmbilici terminum collocarunt: quoddā quasi præsepe ad totius corporis alimentū fabricari, ac ibidem illam animi vim, ceu feram agrestem iligerunt: quam sanē corpus suum alere necessarium est, si mortaliū genus aliquandū sit permansurum. Et paulo post: Quod, inquit, Deus perpendens, hanc ipsius iecoris speciem constituit, &c. Nihil autem recet, venarū principium dicas iecur, aut sanguinis, aut appetitoriz animæ: familiaris tamen est medico, de corporis instrumentis: philosopho, de animæ facultatibus disciplinam institueret: id quod facit Hippocrates, dicens: Venarum radicatio, iecur, arteriarum cor est. Etenim de corde Plato sic diffinit: Cor, & venarum, & sanguinis, per omnes partes vehementer circuleretur, fontem. In domicilium munus constitueretur: vt cū iracundiæ vehementia ferueret, ratione hostatē, si quid inique in eis fiat extrinsecus, vel etiam ab internis cupiditatibus, statim per omnes angustos meatus, quocunq; sensus est participes in corpore, iussa minasq; sentiens, fiat morigeri, & vndequeq; oblequatur, præstantissimūq; in ipsis omnib; principatum gerere sinat. At Hippocrates, dum prauo colori corporis, gratiarūq; in habitu perfergerato medetur, iracundiam dicit studiosē excitandam esse, tum coloris recipiendī gratia, tum effusionis humorū. Iracundiam porro esse definiūt philosophi, caloris effluuiū: centū in corde. Quod autē vlt testimonio Homeri posuimus cōfirmare appetitoriam vim in hepate delitescere, facile cognoscet hī, qui apud istum Tityi fabulā legent: cui numerum hinxit a vulturibus hepate exedū, quod laronam cōpellasset stupri. Quemadmodum nunc factitare solent, qui peccantes famulos puniūt: eorū sanē qui fugitiui sunt, crura exvrentes, sacrificantes, atq; ferientes: eorum qui sunt in furto deprehensi, manus: gulo forū, ventrem: garrimentum, linguam: summam vero eam plectentes particulas, quibus illi prauas obeunt actiones.

GALENI PERGAMENI de Hippocratis & Platonis liber VII.

Quemadmodum autem affectus ab ipsa tolluntur anima, si sit sola ratiocinatrix facultas, nulla neq; appetitoria, neq; irascibilis, præter cā, existente: sic & virtutes omnes, præter prudentiā, exterminantur. Quia verō (vt prius est demonstratū) alia vis ratiocinatrix, alia irascibilis, alia deniq; appetitoria existit, vna quedam in singulis earum existit virtus: quan-

Hippocrates.

Appetitoriam
animam
Plato
in hepate collo-
cat.

Venerum radi-
catione hepatis.
Cor radicatio
arteriarum.
Platonem de cor-
de fontem.

Irascibilis qui-
bus sit excitata
da.

Iracundia
quā.

Homerus.

Particularis
pietatis solere,
quod quæ prauas
obit actiones.

Anima faculta-
tibus singulis,
vnaque virtus
tem iudicat.

Vt igitur, quod
præstantissima
est.

Rationalis
anima ven-
tu gradatua.
Insuper anima
est virtus, ven-
litas

Appetitiva
anima virtus,
et temperata.
Insuper anima
est virtus, ven-
litas

Habitu
quæ virtutes deca-
tar.
Sicque compo-
sita est anima
rationalis et
appetitiva
anima.

Plato de vir-
tute præstantia.

Philosophia
reditur a potestate
incommensurata,
principio tria
disposita sunt
animæ
hæc animalis
principii opera

Insuper anima
est virtus, ven-
litas

Appetitiva
anima virtus,
et temperata.

Nervus non
dicitur nervus
cerebri, sed
medulla illius
exortus.

Cerebrum
animæ non
præstantia
anima, sed
virtus, ven-
litas

doquidem quod præstantissimum est in singulis, unum tantum exhibet: sicut et perfectio una, quam virtutem vocamus. Eam igitur quæ in ratio cinatrice est, sapientiam, aut prudentiam, aut scientiam appellare licebit: eam quæ in irascibilitate habetur, fortitudinem, aut virilitatem: sicut et eam quæ in appetitiva oritur, appellare poteris temperantiam. Ex quarum quidem animæ trium particularum mutua cōmōderatione, ac venustate decente, quarta virtus substantia nascitur: ac proinde merito totam animam dixeris istam. Ceterum virtutes ipsæ in partibus animæ irrationabilibus, habitus quidam sunt, & facultates solummodo. In rationali virtutem, non habetur modo, sed etiam scientia, aut virtus. Sola enim hæc animæ pars, scientiæ compos est: alix autem, facultates sanè quasdam, habitusque, aut meliores, aut peiores comparare possunt: scientia autem fieri participes, non item, quatenus neque est ratio. At Plato sciens omnes recte, ita quidem sententia, unam esse virtutem animæ, cognitionem videlicet bonorum atque malorum: hoc est, eligibilem, & eorum quæ declinari debent. Cùm autem in omnibus vitæ actionibus, deligamus id quod videtur bonum: quod autem apparet malum, vitemus: ita hæc animæ natura imperus hos ad horum utrumque: philosophia, quæ verè boni malique docet, et peccatis immunem reddit. Osten- dimus igitur dispositionem animæ in lucem rediti, a tribus administrari principibus: uno in capite collocato, cuius opera per se quidem, in imaginatione, memoria, intellectu, cogitatione: in relatione autem ad aliud, sensum partibus animæ sensibilibus impartiri, motumque arbitrarium illis quæ moventur: secundo autem in corde consistente, cuius opera per se quidem, robur est animi, firmitudoque in illis, quæ cumque ipsa ratio sus- sent: atque etiam in victus animus: secundum affectum autem, veluti sensu natui caloris, anima tunc cum qui iniuriæ inferre est visus, punire desiderante: at relatione ad aliud, iniuriæ esse particularis caloris, singulis corporis partibus: sicut uti pulchritudo motus, arteriis. Tercia vltimæque virtutis in hepate collocare opera sunt, quæ ad animæ nutritionem spectant omnia: necnon suavi- um fructio: per quam vehementius, quæ pars fit, mota, intemperantiam atque libidinem gignit. Demonstratio autem quod nervorum principia in capite delitescat, simul etiam cognoscitur nec uos ipsos non a cerebri dura meningi, quemadmodum aliquando opinari est Erasistratus, sed ab eis medulla oriri: etsi primò quidem, tenuis membrana processu, secundum autem crassioris, sint involuti. Porro ex his capitibus esse, viuet ad huc animalis, & crassioris detecta membrana, si vtroque medio rectitudinis, quæ cerebro hæc per duplici incumbit, per hamulos eleuatur, aut solam ipsam incidenda, aut rotam excideris, neque insensibile, neque immobile ipsum evadet animal: quemadmodum nec si obtegentem ipsius partem rotam posterius cerebrum, & aut solam incidere, aut excideris: a imò verò ne si cerebrum ab ipsis quomodo documque excindas, sic quoque animæ motus aut sensus expers reddetur, prius quam ad aliquem ventriculorum ipsius, talis scilicet per-

veniat. Maxime autem ventriculus posterior offendit animal: deinde medius: minorè verò anteriorum utrumque noxam adfert. Cùm igitur coniunctus Ventriculus cerebri (diuisio quorū abstraheretur mori & sensum) pauld post rursus sentiat ac moueatur animal, dicendum est in ipsius quidem cerebri corpore animam habitare: primum autem eius organum, tum ad vniuersos animantis sensus, tum ad motus voluntarios, esse animalem spiritum: qui quidem si animæ substantia esset (quod aliquis posset existimare) simul cum eo, dum evacuatur, periret anima: cuius contrarium contingit. Nam evacuatus, donec recolligatur, sensus, motusque, non vta destituit animal. Merito igitur generatur hic spiritus: & iuxta ventriculos cerebri, atque ideo illinc definit arteriarum venarumque non exigua copia, ex qua sunt plexus choroides formari. Nam ex arteriis descendentes caput, ac postea sese ad cerebri basim tor- quentibus, conficiuntur plexus reticularis, in quo elaboratur ipse animalis spiritus. Etenim arteria spiritus, vitalis & est, & dicitur: & sicut & animalis, qui consistit in cerebro: non tanquam animæ substantia sit, sed veluti primum ipsius organum, habitantis in cerebro, qualiscumque illa substantia existat. Quemadmodum autem vitalis spiritus in arteriis & corde gignitur, ex inspiratione & humorum vapore, ita animalis ex vitali accuratius elaborato duci originem: ad quæ quidem elaboratione & transformis ille plexus fuit fabricatus. Nam si exactè semen ipsum & lac natura elaborare desideras, scilicet ut diutius ea in coctionis instrumentis immorarentur: ac propterea semini quidam in fractu quendam ante tepteros præparant, lac tibi verò longitudine vasorum ad mammas tendentiū: merito etiam ad cōficiendum animalis spiritum ex vitali, veluti labrum thum vasum, prædictum illum plexum constru- xit. At verò cum nervi ipsi ex cerebro & membranis id ambiens contrahantur, per eam ipsorum partem quæ ex cerebro oritur, sensus omnibus membris atque motus suppeditatur. Quæque vniuersis membranis propago est, eundem nervi usum præbet, quem cerebro illis exhibebat. Quare vel si ambas eximeris, nihil laderet particula, in quam nervus inferebatur: quemadmodum neque si ipsi cerebro exteriores membranas abstruleris, in presenti quicquam offendes, etsi processu temporis aliquid sequi possis incommodi. Quod autem ad facultatem, quæ in cerebro descendit, spectat, non licet nobis promp- te affirmare, an quemadmodum ex solari splen- dore quædam quedam profecta, in omnem ære ambientis partem disseminat, ipsa solis substantia in loco suo permanente: sic etiam ex cerebro virtus quædam membris per nervos infusur: an prius substantia spiritus usque ad sensibiles mobilisque particulas proficiatur: aut aliqua ex parte in nervis incidens, ita ipsos immuet, ut alteratio eorum in mobilia membra distribu- tur: cuiusmodi quippiam fieri in sensu visorio cōtingit. Si quidem per opticos nervos, qui ab anterioribus ventriculis cerebri (qua parte versus medium ventriculū in obliquum & angustū est contrahuntur) oriuntur, & manserit cōcavi sunt, splen-

Cerebri ventri-
culi quatuor.
Anima habi-
tare eo ipso
vires corpore,
primum anima
illius substantia
tam est anima-
lem spiritum.
Animalis spiritus
non est sub-
stantia anima.

Choroides
plexus.
Reticularis
plexus.
Spiritus vitalis.
Spiritus animalis.

Semini ex la-
ctu elaboratio.

Sensus & mo-
tus membris
que via suppe-
ditatur.

Cerebrum an-
to a membra-
nis, animalis
substantia
facilis a cere-
bro descendit
per nervos, sit
ne suspensa, an
in corpore, Ca-
lidos ambrosia

Opticum ner-
vum exortus.

splen-

Oculo vno
clauso, dilatatur
alterius pupil-
la.

Opticorum ner-
vus ut unum
locus conflatur.

Subsistens leho-
riari, quoniam
cernere pos-
sunt.

Nervus omni-
bus non inesse
mostrat.
Spania medul-
la ex toto in-
esse potius im-
possibile.
Distributio vir-
tutis quod
visionem fieri
extra munitio.

Vitio si per pu-
pillam foramen.

Aer ambien-
tale nobis ap-
paret, quoniam
virescentia
quale existit
nervus in cor-
poris.

Vitio si per
rationem.

splendidus spiritus ad oculos fertur: id quod ipsa
structura docet: & præterea quod vno quidē o-
culo clauso, dilatatur alterius pupilla: aperto au-
tē, statim sursum in naturalem magnitudinē red-
dat. Cæterum quod inanitionis repletioque
celeritas, non luminis causā influentia, sed so-
lus spiritus substat: fit opus, haud negotio-
sum est cōtueri. Quoniam vērō in idem vitriq; me-
tus pervenit, verissime est cōmune regionē
ex vitriq; meatibus spiritū recipientem, dum al-
ter oculus claudatur, alteri totū ipsum trāsmittit-
re. Quare si is qui suffusione et laborant, dilatatur
pupillæ foramē, clauso altero oculo, in columis
vis visoria senatur: sin autē hoc eis non eveniat,
peritior omnino: ac proinde licet probe suffusio
curata sit, ipsi non cernunt. Aliis vērō quibusdā
accidit, ut non videant, vel citra suffusionem, ob
visiorū obstructionem meatuum. Verū enim
vero minime quidem arbitror nervus omnibus
inesse meatus, sed is tantū qui corpulentio-
res existunt: quemadmodū est processus ille spi-
nalis medullæ, cui porus ita sensus inest: vt visio-
nis nervus, ad vchementiorem virtutis distribu-
tionem. At verō quod ab omnibus vocatur di-
stributio virtutis, alterationis quædā est impar-
titio: qualis etiam in aëre a solari splendore acci-
dit. Sic vniq; consentaneum est, etiam spiritū qui
in oculo proficitur, primo illapsū vtrū cum
aëre ambiente, & simul ipsū in suam ipsius na-
turam inalterare, non tamen extendi plurimū. *
Corpus siquidem quod videtur, aut mittens de
se aliquid ad nos, cum illo etiam propriam indi-
cat dignationē: aut si ipsū nihil mittit, expe-
ctat aliquā a nobis ab se venire facultatem sensi-
ficam. Vtrum igitur ipsū sit nervus, hoc iudica-
bit modo. Per pupillæ foramen fit visio, quod
quidem si expectaret portionem aliquam, aut fa-
cultatem, aut imaginem, aut qualitatē corporū
extrinsecus subiectōrū, ad se proficisci, nūquam
eius quod videtur, magnitudinem cognoscere-
mus: vt montis, exempli gratia, maximi: alioqui
tanta imago eius oculis nostris incideret, * quā-
tus est ipse mons: quod omnino ratione caret:
quemadmodū & si quis dicat, eam vna tempo-
ris occasione, ad singulos videntes, etiam si fue-
rint mille, permeare posse: cum visiorum etiam
spiritus nequeat fluore suo tantū extendi, vt to-
to corpori quod videtur, circumfundatur. Re-
linquitur itaq; adhuc, aërem ambientem tale no-
bis instrumentū fieri, quo tēpore videmus, qua-
le in corpore nervus perpetuū existit. Eluimodū
autem quippiam accidere videtur ambienti non
aëri, ab excidente spiritu, cuiusmodi etiam ab
splendore solis. Ille siquidem superius aëris extre-
mum attingens, in totum virtutem cōmunicat.
Visus autem per nervos visorios exiliens, cum
substantiā habet spiritalem, vbi in ambientē in-
cidit, primo in cursu alterationem efficiens, * ac
se quamlongissimē extendens, illuminat quod
illi continuū est, nempe quod ambit corpus, sic
vt in momento temporis alterationē in totū ip-
sum tranfmittat. Apparet autē similis quiddā affe-
ctus vtrique accidere, & nervo, & ambienti aëri.
Nam quemadmodū si interponatur aliquid so-
lidum corpus in medio subiequenti aëri, statim

videmus eius splendore perire, cū qui dum im-
mutatur evadat lucidus, nō autē quod permata-
tus fuerit (sic enim lumen perpetuū feruaret, vel
si ablatū id quod illuminat esset) ita & nervo se-
lecto, quantū se habet a cōmunitate cerebri separa-
rit, tantū is in sensibilibus statim reddetur. Sed in ar-
terius etiam eadem natura, quæ in nervis, cernit-
ur. Difficet siquidē, intercepte funiculo, non
pulsant, destruitur, non vt exstirpatus putat, eo
quod a corde mittitur, sed facilitate illa quam tu-
nicæ ipsarū, corpori cordis cōtinuæ, insistentē ab
eo semper obtinent. Cōmune igitur omnium est
sensus facultatū, quæ a cerebro originem ducit,
per nervos vniq; ad propria instrumenta deferri-
item quod nervus substantia cerebro est similis,
nisi quod quantū, ne esset ad patiendū facilitior,
statim condensatur est, tantū a cerebri natura re-
ceissit. Quantū igitur singuli nervi propriē dicti
sensum, a cerebri natura recedunt, tantū etiā ab
ipsius facultate. Vocantur autē propriē sensorij
nervi, qui instrumentis immittuntur sensorijs, mol-
liores aliis, qui particulas movent: idq; merito.
Sensus quippe non fit, absq; hoc quod quoniam
modo afficiantur nervi: motus autē, in agendo
solum actionē obtinet: ac proinde nō ab re sen-
sorius mollior, durior autē motorius nervus est
factus. At motorij omnes, sunt sensus tactus par-
ticipes, quoniam huius sensibile crassiorū est par-
titiū. Porro visiorum nervus, omniū nervorū ma-
ximus, inter cerebrū & oculi totus medius cōsi-
stit: interiorē quidem sui partē, molliorē habet,
externū vērō duriorē, vt & facile per ipsū mul-
ta ex cerebro spiritus substantia in oculi regio-
nem perveniat, & etiam aggre afficiantur. Quantū
autē oculi primū sensibile exactius est, & tenuius,
quā sensuoriorū aliorū, ita etiam oculis magis
quis sub illis, cerebri naturæ est particeps. Qua-
re cum sub tunicis oculorū duo cōtineantur hu-
more orbiculares, vnus qui vitrum, alter qui re-
fert crystallum, vbi primū visificus nervus exte-
riorem oculi tunicam permeat, spiritus quidem
per eius porum illapsus, humoribus illis miscet-
tur, vt substantia eorū fiat tota sensibilibus: ipsius
autem nervi substantia soluta, dilatataq; ample-
ctitur vitreum humorem, in maximum crystal-
loides circulum desinens. At plexus quē efficiūt
fibræ ipsius nervi optici dilatati, vocatur tunica
amphibletroides, ac si dicas reticularis: quam si
velis rursus in vnu coagere, coacervat eq; cerebrū
nbi esse apparebit. Ac merito sanē si constructus
is nervus fuit, in instrumento visus aëre circum-
fluus. Tale autē instrumentū nervo fit aër, ad pro-
priam sensibilibus explorationem: quale existit
ipsi cerebro nervus. Proinde quæ cerebrum ra-
tionem habet ad nervum, talem habet ad aërem
oculus. At propriū visus sensibile (quod primum
antea appellavi) colorum est genus. Illud siquidē
primum, & perse, & solus inter alios sentit,
quædammodū gustus * sapores: quanquam & co-
loratū corpus simul cum eo cognoscit, perinde
vt gustus * id quod sapores edit. Cæterū vt gu-
stus atq; alij sensus fiant, opus est vt ad animatis
corpus ipsum perveniat sensibile. Visus autē per
mediū aërem ad coloratū extēditur, vnde ipse so-
lus vna cū calore illorū quod videtur, cognoscit

Nervus quatuor
redolens
insensibilis.

Arteria quan-
do nō patitur.

Arteria nati-
va in visum pul-
sationem vni a
corde.

Animalis fa-
cultates desin-
dant per nervos
a cerebro, vniq;
ad propria in-
strumenta.

Nervi sensorij
sunt molliores
is, qui movent
particulas.

Sensus absq;
nervis afficere
non potest.

Nervus in alio
ne constituit.

Nervi motores
omnes sensu ta-
ctus sunt pro-
diti.

Optici nervi si-
ntur et consisten-
tia, & constructio
eius.

Oculi fabrica.
Vitrum ha-
mor.

Crystallinus
humor.

Amphibletroides
tunica.

Colorum genus
esse proprium
visus sensibile.

Gustus sapores
percipit.

Visus quæ par-
ticipat.

& magnitudinem, & figuram, & situm, & intervallum, id quod sensibus aliis non licet, nisi per accides nonnunquam tactus. Si igitur visus solus percipit sensibile quod ipsum movet per medium aërem, non ceu per baculum quendam, sed particulam cōsimilem specie, & cognatā ipsi, ac soli hoc illi eximium est datum, simul quod per reflexum videt, merito opus habuit spiritui desuper influente pellucido, qui ambirens aëri incidens (qualis est Platonis, Empedoclisque sententia) & veluti con verberans ipsum, sibi illi assimularet. Visus igitur necessarius dicitur esse in instrumentū pellucidū, splendidiūque: auditus, aëreum: olfactus, vaporosum: gustus, liquidum: tactus denique terrenum. Neque enim aliter consistere possent, ut quæ ex similibus alterationē requirant. Sedenim instrumentū olfactus, minime in nariū meatibus, sed in extenuatissimis anteriorū cerebri ventriculorum consistit: in quas vitæ variū meatus perveniunt. Ceterū cōmunis quædam facultas (de qua etiā disseruit Plato) ex cerebro per nervos in singula sensoria perveniens, alterationes quæ in ipsis sunt, persensuit. Porro quemadmodum tactus sensus instrumenta per censurā, quæ gustu tori per humiditatem & iucos in sensus cognitionem perveniunt. Vnde si in areficta vehementer sit lingua, corrumpitur ipsa sapori digno.

At obitus narium meatibus, odorū sensus la befatur: non secus quam auditoris, si aures obstruere fuerint. Eiusmodi obstruētionibus respondet oculorū suffusio, in qua sic obstruuntur solari luminis meatus, qui in tunicā rhagade habet, ut propriū visus instrumentum non amplius cum aëre, qui totum extrinsecus oculū ambit, iungatur. At sensus ipse ne unquam est alteratus, sed alterationis digno. Quare dispositio in qua corpora excedens naturæ modum cōsistunt, & sensus ipsius, in vicem differunt. Quippe id genus dispositiones labores vocans Hippocrates, ait: Qui laborantes aliqua parte corporis, plerumque labores non sentiunt, ita mentē egrotat. Patiuntur porro singula exiguas mutationes ex finitimus genere. Idcirco visus instrumentū: quoniam coloribus discernens, donec ipsum esse expediebat, splendidum creatū est, quod sola huiusmodi corpora à coloribus alterant: quem admodū iudicat etiam aer ambiens, qui cum maxime purus est, tunc à coloribus alteratur. Ut enim à Solis splendore solium contractus aer, rotas ei cōferunt assimulat, sic protinus à colore mutatur. Nervus itaque cerebri pars existit, veluti germē arboris. Pars aut in quam inferitur, viuentem ipsum totū in sese excipiens, omnino redditur habilis, ut discernat ea quæ seipsum cōtingunt. Per simile quid etiam in aëre nobis circumduo accidit. Nam illum natus à sole, tale iam est nobis visus instrumentū, quale ex cerebro proficiscens spiritus. At si de animæ substantia aliquid pronunciaré oporteat, altervtrū necessarē dicemus: aut hanc esse veluti lucidū ætheridēque corpus: aut propter incorpoream substantiā, cuius primū vehiculum hoc ipsum corpus lucidum sit, per totū cerebrū meā, & contrariare quadam spiritū visūcum, eam splendorem reddens: intercessu cuius, cum reliquis corporibus commu-

nionem ipsa anima habet. Alteratur itaque sensus instrumentum: digno autem ipsius alteratio, sit ex viā facultate omnibus sensoriis cōmuni, quæ à principio influat. Ceterum initii ipsorum, siue cōmunem sensum, siue principis sensorium nuncupare vobis, nihil mtererit. Atque hoc priore disputatio iudicavit esse cerebrum, à quo omnes particule sensum & motū obveniunt, descendentes aliis nervis in sensuum instrumenta, ut sensibus dignoscantur: aliis moventibus ea quæ moveri desiderant. Etenim à cerebro ortur & ipsa spinalis medulla, à qua nervi sexaginta procedunt. Quæ sanè ut cerebrum, duas etiam formas membranas: quas si quis quod iuxta singulos nervos ademerit, nulla pars offendet, in quā nervus densillius fuerit, cū videbitur membranz ipsæ, regmina tantum finē & cerebri & spinalis medullæ: sensus autem & motus visus in medulla, quam comprehendat, existit. Quod si nervi partem medullarem secueris, statim membrum in quod nervus deferebatur, sensus motusque omnino experti reddetur. Quod autem spinalis medulla à cerebro suscipiat facultatum originē, hinc licet perpendere, quod secū ipsa quancumque in parte, quæ regio supra sectionem habetur, cōstituta in columinis: in quæ infra eam sunt, de statutu motu siam & sensu.

GALENI PERGAMENI de Hippocrati & Platoni placu, lib. VIII

Disimus igitur animæ principatum id esse, quod sensui ac voluntario præest motui. Voluntario enim dico, nam coedus & æteriarum motus, non pro arbitrio nostro perficitur: sicut nec tertium motionis genus, quod circa alimen dispensationem veritatur. Iam verò, ubi principium nervorum est, ibi animæ principatus existit. Atque principium nervorum in cerebro est: illic igitur animæ principatus est nobis statutus. Omnes porro animantium particule, nervorum compotes sunt: hæc manifestū ex cerebro descendentiū in ipsas, illæ per mediam spinæ medullam. Atque virtutis vegetatricis, quemadmodum & venarum, origo existit: nec reperitur alia in animante particula, cui omnes venæ connate sint. Si enim vena cauta ostenditur ex dextro cordis ventriculo, quod nonnulli existimant, omnino hæc, ut arteria, bifariam scissā, alterā parte sui ad iugulum, alterā ad iecur ferretur. Quod quom non appareat, clarum est, neque ex corde ipsam originem ducere. Quod autem coe tum arteriarum, tum irascibilis animæ principium existat, abunde à nobis est demonstratum. Deinceps verò de naturalibus elementis, secundum Hippocratis & Platonis doctrinā, similiter disseramus. Elementum est minima illius quod constituit portio. Quare ex his quæ ad aliquid sunt, vox hæc elementum dicitur: quemadmodum etiam pars. Ut igitur fermonis nostri quatuor & vigin sunt elementa, eodem modo omnium generū abiliū & corruptibiliū corporum, terra, aer, aqua, & ignis, minime particule existunt. At minimum dicitur, quod nequaquam sectionem

Sensum instrumentum alteratur, id est instrumentum. Sensorio vero sententia esse cōmuni sensum. Cerebrum esse principis sensorium.

Nervus sexaginta nervi à spinali medulla.

Spinalis medulla la membrana

Spinalis medulla la sella, quod accidet.

Animæ principatum quod, Cordis & arteriarum motus, voluntarium ad istum.

Animæ principatus in cerebro. Partes animæ corporis, quæ nec nervum compotes, nec esse virtutis vegetatricis, et venarum originem.

Cerebri arteria non principium, atque irascibilis animæ facultas.

Elementum est minima illius quod constituit, portio.

Elementa omnium generū huius & corruptibilium quæ, Minima quæ dicantur.

Platonis de visionis sententia, Sensorium instrumentum sententia, quædam esse dicuntur.

Olfactus in instrumentis sensibus

Tactus ex gustu, quædam instrumentum sententia sunt.

Suffusio quæ accidit.

Sensus est non alteratus, sed alterationis digno.

Hippocrates. Mentis quibus egrotat. Pati medicis singula à finitimus genere. Visus instrumentum est splendidum. Aer purus à colore mutatur.

Aër quale visus instrumentum sit nobis, Anima substantia quæ sit.

& flamma omnes infestantur: & post hæc deinceps. Quæ quæ respirat extrinsecus, omnigenas tuberculorum species feruens emittit: intus autem cohibita, igneo, plurimòq; morbos procreat. Verùm dum Hippocrates tradit, semper initium calidum, omnium naturæ operum esse quammaximè causam, Plato non calidum dicit, sed ignem: quum tamen si ab igne ciborum cōcoctio fieret, necnon distributio, sanguificatio, & nutritio, melius utiq; in agere febrientibus hæc perfici viderentur. At initus calor temperatus existens, substantia quidem in sanguine & pituita coexistit: qualitate autem, mixtus est temperatè, ex caliditate atq; frigidityte. Tutius igitur dixit Hippocrates, qui crescent, plurimum habent calidi innati. atq; illud: Vētes hyeme & vere natura calidissimi sunt: & hic enī calore infuso intelligens. Falsus etiam est Plato, dum attractionem pulmonis inter respirandum ē medio tollit, inspirationemq; ipsam successione ad id quod vacuatur, nempe succedente vno spiritu atq; subingrediente per cutis poros, in locum alterius, qui expulsiō est, necessariū fieri contendit. Quippe nervi ab spinali medulla orti, arbitrium motum musculis thoracis largiuntur: à quibus eleuatur quidem, externum aërem per fauces & asperam arteriam, in pulmonē attrahit: cōtractus autem, per eadem expellit. Pulsus autem à corde & arteriis fit: atq; in eleuatione quidem, per arteriarum ora in cutem pertinentia, externus aër intra corpus attrahitur, triplicis vñs gratia: refrigerat, euentilatio nis, & spiritus animalis generatio nis: in contractione verò, arteriæ explodunt quicquid fuliginosum fumosumve in ipsis procreatur est. Sermo itaque Platonis coarguitur: primò quidem, quòd inspirationem affectum sō peruenientem, non actionem voluntariam constituit: cūm tamen in nostro sinu fit arbitrarū, citius, tardius, minus, magis, & frequentius inspirare, quemadmodum expirare. Secundo autem, quia post arteriarum contractionem, oportet statim inspirationem fieri: si vñ & post expirationem, protinus arteriarum eleuationem. Cæterum licet nobis longiori tempore respirationem cohibere, nec ob id tamen desinunt moueri arteriæ cum corde. Quin etiam eleuantur nōnunquam hæc inspirationibus nobis: si vñ & expirantibus contrahuntur: & in vnius respirationis tempore, septies, aut octies, cor cum arteriis attollitur, deprimiturq; . At qui Platonem credunt fuisse adeò imperitum & rudem, vt cūm dixerit, spiritum potiusq; pulmones ipsos exciperet, existimari potum omnem in pulmones deferri, q̄ sanè manifestè falluntur: quandoquidem non fuit talis eius vñ sententia, sed nonnihil ex ipsa portione, per fauces, p̄que asperam arteriam in subditum pulmonem defluere, non per mediam instrumentū laxitatem delatam, sed circa tunica, cū lenimentū quoddam, aëris modo descendens: id quod verissimum est, atque rationi cōsonum. Quòd si aliquis accepta, dum sit, copiosa aqua intra os, dein supinus decumbat, eiusmodi percipiet delusū, si aperuerit modice gutturis orificium. Verū cum cuncta portio et copiosa, tantāq; vt spiritus vias intercipiat, ani-

mal ad tūsum irritat: modica autē, nec omnino seu sum fuit, cūm per arteriam delabatur, exiliber. Ad hæc, si simundo animalis coloratam aquam propines, ac deinde statim iugularū id disseces, pulmonem eius similiter coloratū inuenies. Liqueat itaq; manifestè, aliquid ex portione ipsos pulmones allabi.

GALENI PERGAMENI de placitis Hippocratis & Platonis, lib. IX.

Cum autem facultatem discernendi rerum similitudines plurimū fecerint tum Hippocrates, tum etiam Plato, atq; ad discretionem huiusmodi necessaria sit veritatis cognitio, equidem veritatem eorum que exquiri inuenturum te affirmo, si primum initium viæ que ad ea ducit, cognoueris: à qua aberrans, in pernam verborum captionem, errorinque decides. Est autem principium, diuidium, & (vt Plato ait) totius operis maximum. Si igitur nullum nobis insit naturale iudicij instrumentum, neq; artificiosum, nihil poterimus inuenire. At cū naturalia & cōmunia omnes habeamus, inuenimus etiam aliquod artificiosum. Quæ autem sunt illa naturalia iudicij instrumenta, quæ nobis cōmunia adiūnt? Oculi secundum naruram habentes, qui visibilia conspiciunt: aures naturalis modo dispositæ, quæ audibilia percipiunt: lingua saporum diuiscatrix: nares odorum: & tota cutis tactuum. Ad hæc intellectus, vel notio, vel mens, vel ratio, quæ consequentiam repugnantiamq; internoscimus: atque alia p̄terea quæ his incidunt, in quibus est diuisio, & compositio, similitudo, & dissimilitudo. Vt enim sensibile iudex est sensus, ita & intelligibile alia quædam facultas, quam vt quisque appellare voluerit, illi permittimus. Rectè itaq; dixit Hippocrates, rerum naturam inueniri, si à maximis quidem vñs, facillimis autem cognitis, inceperimus. Etenim natura ambo nobis hæc dedit, & ipsa iudicij instrumenta, & quòd ipsis à nullo docti præceptore credamus. Ea igitur quibus iudicamus, & instrumenta sensuum sunt, si pari ac illi iudicio, similitudinūq; dignotioni indefesse insistamus, idq; semper auspicantes à facillimis cogniti. Enim vero Plato, cū prius nos in ciuitate exercuisset, iudicassetq; illi populi partem dominantem, aliam propugnare, terram aliam opificem esse in ea: digestiles tandem ad animam, etiam in ea ostendit aliam partem esse quæ dominetur, cū bene habet altera quæ ipsi minuitur, quemadmodū in vrbibus militare militaris consuevit: ac reliquam deniq;

Facilitas discernendi rerum similitudines, plurimū fuerit veteris. Veritatis maximum initium.

Principium est totius operis maximum.

Iudicij naturalia instrumenta, quæ cunctis cōmunia ad sunt.

Sensibile iudex est sensus, ita & intelligibile alia quædam facultas, quam vt quisque appellare voluerit, illi permittimus.

Natura rerum quæ postea veniunt.

Iudicia fieri per instrumenta sensuum, & facultates instrumenta veniunt.

Facilities quæ ratione sunt veteribus.

Platonem tres animæ facultates, tribus reipublice partibus comparasse.

Calorem insitum consistere in pituita & in sanguine, mixtumque temperatè, ex caliditate atq; frigidityte.

Respiratio quomodo fiat.

Pulsus fieri à corde & arteriis.

Dilatationem arteriarum triplicis vñs.

Platonis opinio de inspiratione & respiratione contrahitur. Inspirationem esse voluntariam actionem.

Platonem paritè aliquid ex pulmonem semper defluere, per ipsam arteriam asperam.

Tasus vnde veniat, iussus.

tertium.

tertiâ, quam alendi corporis gratia opifices nostri apposuerunt: etsi discernentes similitudines imperiti, vnam esse omnes sentiant, nō tres commemoratas particulas. Similiter etiam Plato in Phædro nos docet, ne vnam quidem in se dubitationem habere, quæ naturalibus iudicij instrumentis manifestis subduntur: in cæteris verō ambiguitatem fieri. Laborandum autem est in vnaquoque artis exercitatione circa materias, quarum actiones, vitæ viles, experimus. Atqui vno mulierum proposito exemplo in quinto de Republica lib. nos Plato exercuit, quo modo invenire discernereque possumus, in quo similia naturis, & in quo dissimilia, quæ conferuntur, existant. Aut enim illic, mulierem omnium studiorum natura compositam esse: ac proinde non esse præter naturam, si vxores custodum musicen, gymnasticęque exercceant: in omnibus tamen facinorâ viro imbecilliorē exsistere. Mulieres porro viris similes sunt, quatenus hæ rationalia animalia existit, hoc est, scientiæ capacia. Quatenus autem virorū genus est fortius, & ad omne opus & disciplinam præstantius, mulieres autem imbecilliores, deterioręque, dissimiles in hoc fuerint. Differunt præterea à nobis mulieres, quatenus hæ quidem sunt feminæ, eorū autem concipiendum idoneæ. Mulieris siquidem certæ quædam corporis particulae insunt, quibus masculi carēt. Quare verē aliquis docerit, in aliquo mulieres viris respondere illustrata similes, in aliquo ab illis differre. Hippocrates autem faciem ægri nos inspicere iubet, virū simul sit, an dissimilis sanis: præsertim aut ipse sibi respondeat. Est quādo elapsum articulū iano Hippoc. cōparat, collatione in ipso affectio homini ac facta: nam deceptio plerumque accidit, si alienis articulis ipsam conferta. Consecuerunt autem Græci similia nonnunquam vocare quæ idem aliquid obtinent. Ad hæc, exempla secundū idem, in us quo conferuntur, Plato nos facere iussit: qui quidem in Philebo & Phædro, diuisiorum compositiorumque speculationē maximē necessariam esse ad artem constitutionem ostendit: in qua sanē duplici modo exerceri nos volumus, à primo quidem & generalissimo descendentes, ad ea quæ non amplius diuidi queunt, per differentias in medio consistentes: quibus & diffinitiones specierum constitui, in Sophista & Politico commonstrat. Contrā verō, à specialissimis, quæ multa sunt, ad primum genus, per compositionē ascendentes. Viam namque esse vtriusque vnam, sed iter duplex, aut altero primorum, ad alterum vicissim euntem. Neque autem rationalis artū constitutio fieri, nisi in diuisione & cōpositione exercitatio accesserit. Porro speculationem circa medicorum dissidia, magnam vim obtinere, nō ægris tantū ad sanitatem recuperandam, sed valentibus etiam, ad tendendam eandem, autor est nobis Hippocrates. Mirari autē licet, cur artem medicæ petrafractantes, in qua ea quæ obstruntur remedia, vsu possunt diiudicare, virū probent, an noceant, maximē cōtraria de us quæ profunt aut non occurrunt, interprete pronuntiarint. Siquid in philosophia nō sedatas esse plurimas dissensiones, nihil miri est, cum res experientia iudicari perinde nequeat, vtrā de quibus medici digladiantur,

Cæteri hinc nascitur hæc cōtroversia, quod medicis quidem illis qui experientia sola artem constituerint, illud solum visum est vtile, quod fortunata ipsi frequenter profuisse apparuit: neque enī ad contrariā victus rationē transire audent, vtilitatem quoque experiantur, nimirū vetin successum improspere. Solus autē qui naturā ægrotantis nouit, & morbi dispositionē, et vim auxilij ad adhibebitur, præterea tempus quo utendū ipso est, audere possit, vsus auxilio iam ratione explorato, spem confirmare experientia. Quare hic solus inueniet dissidij causam, et diffinitiones, quibus animū adhibens, ad id quod ægrotanti cōducit, perueniet. Aliorū verō nullus hoc ipsum cognosceret. Nam qui cognite per experientiam adiacent, immoranturque, illa sola assumunt, causantes naturam, aut artem, aut eiusmodi aliquid causam offensæ extrinsece: id quod etiam in opere de fracturis ostendit luculentur Hippocrates, qui de vino, melle, aqua, oxymlite, pistana, & balneis, diffinitiones conscripsit, accusans eos, qui in omnibus laborantibus grauiter, vel iubent, vel prohibent, singulis cōmemorans vitia. Nam interroganti an vinū febrienti sit exhibendum, respondere debet, quod hinc aliquid dandum esse idem verō hoc de voluptate Plato factitasse videtur: quidem ipsarum, nempe ab honestis rebus profectas, appetere nos precipiens: quasquā vero iugere, quales sunt quæ ad vcatē spectant, quæ autem nihil ab his secretum obtinent, illas neque fugere, neque persequi. Invenitur porro generis voluptatum diffinitio ex methodo diuisoria: quare quæ huius via inveniuntur, affinita & communia sunt iis, quæ ex similibus cognitione intelligi solent. Ex voluptatibus habent similitudinem quidem inter se invicem: communiter autem secundum genus. Elegantissimē itaque omnium Hippocrates atque Plato tractant eas duas speculationes, dico illam quæ discretionem similium & dissimilium consistit, et eam quæ via iuxta diuisionem generum vsque ad indiuidua tendit, ac rursum à particularibus ad primum genus per differentias intercedentes reditum reciprocum facit. In vniuersum autem, rei de qua disputatur in primis oportet habere substantiam cognatā. Nam qui nouit, non simplicem vnam animam in nobis speciem esse, sicuti in stirpibus appetitoriam, in diuisa rationalem, sed iam hominem ambas cōstitere, & tertiam præterea irascibilem, nouit cum hoc etiam virtutum numerū, vim, & possessionem: quemadmodum qui naturalem corporis nostri structuram habet perfectam, atque in similibus quidem, secundum elementorū commodationem: in instrumentariis autem, ex similiarum quantitate & qualitate, item vniuscuiusque conformatione & situ, didicerit naturalem habitudinem effici, is morborū curationis cuique convenientis, & præseruationis copiam habebit. Merito igitur nōnulli exactā similitudinem & dissimilitudinem cognitionē sufficere ad methodicā causis ubi artis constitutionē existimant. Siquid etiam ad iudicandum de us quæ in ambiguo sunt, dux hæc est abvnde faciēs. Speculari porro, num hic mūdus generatus sit, an ingeneratus: sicuti etiam, an geniti ipsius deus aliquis opifex fuerit: an deus nullus

Experiri tunc
qua possit
medicus.

Hippocrates.

Voluptas est
non solum
sed etiam
ab honestis
rebus profectas
appetere nos
precipiens, quæ
ad vcatē
spectant.

Voluptates habent
similitudinem
quidem inter se
invicem, communiter
autem secundum
genus.

Rei de qua
disputatur, in
primis oportet
habere substantiam
cognatā. Nam
qui nouit, non
simplicem vnam
animam in nobis
speciem esse, sicuti
in stirpibus
appetitoriam, in
diuisa rationalem,
sed iam hominem
ambas cōstitere,
& tertiam præterea
irascibilem, nouit
cum hoc etiam
virtutum numerū,
vim, & possessionem:
quemadmodum
qui naturalem
corporis nostri
structuram habet
perfectam, atque
in similibus
quidem, secundum
elementorū
commodationem:
in instrumentariis
autem, ex similiarum
quantitate & qualitate,
item vniuscuiusque
conformatione & situ,
didicerit naturalem
habitudinem effici,
is morborū
curationis cuique
convenientis, &
præseruationis
copiam habebit.

Merito igitur
nōnulli exactā
similitudinem
& dissimilitudinem
cognitionē
sufficere ad
methodicā
causis ubi
artis
constitutionē
existimant.

Mulierem omnium
studiorum natura
compositam esse.

Mulieres viris
imbecilliores
exsistere.

Mulierem viris
lignis deteriorē
exsistere.

Mulierem similes
tudo, dissimiles
tudo, ad vnam
speciem.

Mulierem viris
lignis deteriorē
exsistere.

Plato, compositiorumque
speculationem
maximē necessariam
esse ad
artem constitutionem.

Speculationem circa
medicorum
dissidia, quid
prodest.

quidem, sed causa quædam irrationalis & inartificiosa, fortuitò ipsum adeò pulchrum effecerit: an etià Deus præsit mundi structuræ, sapientissimus simul & potentissimus: huiusmodi in quæ questionibus nihil conferunt ad honestè rem familiarem administrandà, aut ciuitatis negotiis còmodè consulendum, aut deniq; ad morales virtutes ac ciuiles adpiscendas. Ceterum nò sicuti mundus genitissimè an non genitus sit, quærere inuile est, ita etià de providentià & de diis. Nam quòd sit aliquid homine præstantius, virtute & sapientià in mundo, omnibus nobis investigare præstat: nò tamen quales dij sint substantia, vtrū in corporei omnino, an corporei existant, necessarium est còsiderare. Sunt autè multa falsa, quam-
 simillima veris: imò etiam ipsa sòphismata, ex similitudine quam cum veris sermonibus habet, còstituantur. Sed internoscere ea, & invicem discernere possunt, in illa materia, circa quam as-
 versatur, exercitati, & præditi naturali industria quam oportebat potissimū in puerili ætate, à cuiusq; ciuitatis senioribus prudentissimis iudicari, ac dein vnumqueng; artem suæ naturæ congruam doceri: quandoquidem permultos vide-
 mus hodie artes rationales exercentes, qui ne ea sanè quæ ipsi dicūt, assequuntur. Cū igitur quod in omnibus rectè sit, omnes ad artem referant: quod autem in vno aut duobus, non ad artem, sed ad fortunam: meritò ex nostri structura corporis, licet admirari summam artem, æquiritatem,
 & vim naturæ, quæ nos còstruxit. Constat siquidem corpus nostrum ex ossibus pluribus q̃ ductentis. Ad singula verò ossa peruenit nutritia vena, sicuti ad musculos: cum hæc, etià arteria, & nerui: parièq; ad amussim sunt & omnino similia in dextra animantis parte sita, iis quæ in altera sunt, os ossi, musculus musculo, vena venæ, arteria arteriæ, ac neruus neruo: idèq; exceptis visceribus, atq; nònullis particulis, quæ habere propriam descriptionè videntur. Duplices itaq; nostri corporis partes, omnino inter se sunt similes, & magnitudine, & conformatione, sicuti & consistentia, quam voco iuxta molliem duritiemq; differentiam. Quemadmodum igitur de humanis affectibus iudicium facimus, ex naui summa arte còstructa cognoscentes peritiam ar-

tificis, ita etiam de diuinis facere conuenit, corporisq; nostri opificem admirari, quicung; tantum is deorum existat, etiam si cum non videamus. Vocaute ipsam naturam còmuni nomine Hippocrates, cuius ministrū medicū esse ait. Plato etiam, Deum causam quæ nos còstruxit, mundi opificem pronunciat, qui suis filiis iusserit humanum genus compingere, à se quidem accepta substantia immortalis animæ: in ea autè apposito eo quod generatur. Ceterū quæ de animi substantia & de diis à diuinissimo Platone traduntur, probabilia tantū & verisimilia cū sint, quomodo possum de ipsis audacter pronunciare, non video. Contrà autem, quòd plures animæ sint species, quòdq; sede triplici collocatæ: & quòd diuina ex ipsis sit, quæ ratiocinatur: reliquæ autè duæ affectibus obnoxie: hæc quæ irascimur, illa quæ corporis volucretes expetimus: quinetis quòd alia in cerebro, alia in corde, alia in iecinore delitescat, me scientificas habere demonstrationes affirmo. Instum tamen est admirari Platonem, qui non solam methodos còpendiosè exposuerit, sed etiam nos exercuerit in singulis. Sunt enim tria capita. Primum, quòd diuisione & compositione constat: secundum, quòd sequentium, & pugnantium cognitione: tertium deniq; rerū inter se mutatione, in maioria & minoris, æqualis & similis ratione. Itaq; scopi secundum quos singula rectè aliquis aggrediatur, omnino pauci sunt: secundum autem ipsos exercitatio, non parum temporis postular: id quòd Plato quarto de Repub. ostendit, vbi conatur animam nostram nò simplicem, nec vniformem substantiam, sed ex tribus partibus còpositam demonstrare, quæ singulæ propriam habent speciem, non vnā autem vim, sed plures. Vnum enim appellat, quòd cūq; subiectum cū sit, peculiarem obinet substantiam, aut accidenā, Porò substantia dicitur, quæ nò potest contraria circā eam eodem tempore pariter facere ac pati. At verò hæc vox diuisio dicitur propriè, cū totum aliquod còtinuum, in particulas sciunditur. Sed metaphoricè dicitur, cum in differentias, aut species diuiditur: vt tertio modo, cū vox diuiditur in significata.

Deum vnā naturam Hippocrates: illū autē ministrū, medicum, Platonis opinio de Deo.

Anima species, scilicet, & differentia.

Scopi secundum quos singula rectè quæ aggrediatur.

Vnum quid.

Substantia quid. Diuisio quid.

EPITOMES CALENI OPERVM sectionis prima, finis.

Sophismata còstitui ex similitudine quæ cū veris sermonibus habent.

Sophismata à quibus posuit deservat.

Indolem & naturam cuiusq; explorandam in puerili ætate esse còsideranda vnumqueng; artem naturæ aptè docendum.

Artes quæ tria habentur.

Fortuna quæ tribuatur.

Natura cū omni datio.

Ossa plura dactyli iussu huiusmodi corporis.

Dextra partes sinistram esse non modo parit.

Consistentia quid.

EPITOMES OMNIUM GALENI

OPERV M SECTIO SECVNDA.

SANCTISSIMO D. N. P. IUL. P. M. ANDREAS
LACVNA SECUBIENSIS, MILES

S. PETRI, S. P. D.



VI De Medicam artem exterminant, eamq, non esse ex Usu mortalibus persuadeant, summum diem ita hominibus esse à Deo præfinitum contendunt, ut non modo non produci, sed ne quidem ante illam metam illo pacto vita intercepti queat, ij, Beatis. Patet, præterquam quod falsa & inania loquuntur, omnem scire humanam providentiam è medio tollunt. Quocirca tametsi scophant à id genus, infestissimi sint, Medicina ipsius hostes, eamq, assidua sanciens vulneribus, eius tamen sunt ope & præsidio curandi, cum gravissimo laborent animi morbo, correptique phrenitide, ducta qua animi alienatione, talia insanire cogantur. Infixit autem hanc opinionem complurium mentibus, quod legitur apud prophetam Iob, Deum constituisse terminos homini, qui præteriri non possent: id quod sanè est verissimum. Dcus quippe & natura non hominibus tantum, sed etiam animantibus uniuersis (sub quibus comprehendo serpentes) constituerunt cœu quendam suæ durationis atque periodi apicem, ad quem singula pervenire possent, si omnes occasiones effugerent, quæ interitum præcoctè accersunt. Cum autem hic vita cursus in singulis animalibus, ab initio vitalis, humore proficiscatur, portionem cuius in primâ generatione non omnia fuerunt parem sortita, meruero, mea quidem sententia, illa durabiliora erunt, quibus eius copia largior obtigerit: vita verò brevioris, quibus humoris insit parcius. Quemadmodum igitur si conseruemus oleum purissimum, semper illi in ardebit flammula, quandiu oleum ipsum duraverit: extinguetur autem, ipso oleo absumpto: pari etiam ratione, si humorem nativi caloris fomitem, immunem ab omni corruptela tueamur, non desinemur vita, donec ipse propter nos deserat: quod ubi acciderit, produci amplius dies nostri non possunt: ac proinde in erit verè ultimus vitæ terminus, quem nimirum transgredi nulla homo o indubita, aut ratione potest. Quod si quispiam Dei donum ac beneficium contemnens, aut vitam exosam habens, prius quam ad finem sibi designatam adveniat, det se ipsum præcipitem, disrumpatue crapula & vino: præuidet quidem huic talem Deus exitum, non præfinit autem, cum ipsum suo in consilio atque imperio voluntatis reliquerit. Est itaq, singuli iam sua extrema dies, ad quam vitam, pervenire, si optima velius ratione, possint, à Patre ipsi præfixa: quod quidem ut præterire nemini ab illi est datum, sic etiam ut eam consequantur, soli contingit illi, qui præceptis Medicorum audientes, & temperatissime vivunt, & sœvere vaporem illum humorè, vitam autem, omnibus modis constant: ad quam rem plurimum confert cum exquisitissimo victu, exercitiisque modicis, etiam regio vel admodum temperata, vel ad frigus magis quam ad calorem declinans. Pro variis siquidem ipsius cœli constitutionibus, constat hominum temperamenta, adeoque, atates ipsas variari. Aethiopes quippe (id quod tradit ex Asclepiate Galenus libro de philosophica historia) circa tricesimum annum senescunt, quod sub ardentissimo sole, eorum calor geniuus quam cœcisimè vna cum subiecto humore tunc nascatur. Angli verò Danique, ob contrariam causam, ad vicesimum supra centesimum annum, nisi propria pereant intemperantia, solent vitam ipsam protrahere. At Hispani, ut situ sunt medij inter hos, sic vitam illi quidem longiorem, his autem longè breviorē sortiuntur. Inter omnes porro temperies atque constitutiones ambuentis, quas mihi experiri contingit, nullam hætenus adeo propitiam reperi tum hominibus, tum fructibus uniuersis, atq, est hæc qua perfruiuntur Veneti: apud quos fructus quidem ipsi quamdiutissime incorrupti & succulenti servantur: homines autem, vegeti, flor. diu, raro nisi extremo senio absumuntur. Id quod sanè est in causa, ut Venetus passim tot senes, tamq, reuerendi, cernantur. Roma verò contrà, perpauca inveniuntur veri atque genuini ciues sexagenarij. Quod si qui exteri illuc ætate moxanescentes confluunt, intemperantia tua, perniciisse malignitatē fideris: quippe qui sensibus uniuersis integris, abolutissimisq, tam venerandam canitiem indeptus atq, affectus iuveneris: ad quam quidem nobis feliciter cõservandam, producendamq, in multa annorū curricula, quæcunq, de tuenda valetudine Galenus Pergamenus conscripsit, ea omnia nuper insiguatione Excellentissimi Viri Ioan. Aquilei, tui medici longè vgilantissimi, à me et castigata, et in enchiridio coacta, dicere tua Beatitudini statui: speras fore, ut hoc erga T. S. officij meū pius omnib. quæ præstitum esset, ac præcipue illisq, et reuerendiss. D. D. Fructico à Bonadilla et Mendozze, Cardinu Camerleni, Patronoq, meo singulari: qui

Beatitudinis Tuae amantissimus, nihil tam habet in votis; quam vi eam dum *CHRISTVS* seruet superfluum. Quare Vnicè T.S. oro, Beatissime Pater, vi quemadmodum superioribus diebus periochem illam de victus & exercitij ratione à nobis oblatam, vultu hilari suscepisti, sic saluares hos commentarios, quos offerimus denuò, suscipias: exiguos quidem, sed ea imbutos eruditione & doctrina, quae possit mirè tuum oblectare animum, teq; manu placidissima ducere ad extremum illud senectutis fastigium, quòd omnes cupimus, quòdque prius quàm assequeris, tibi longum adhuc iter est conficiendum: cum non dubitem quin, si Galeni insitutus & documentis vsus, pro soluta etiam sapientia tua, constantiaq; & animi magnitudine insuperabili, fausta omnia & aduersa, breuietq; vniuersas humanarum rerum vicissitudines, eodem animo tuleris, adhuc sis victurus nobundantissime. Quod quidem Ecclesia sua largiri dignetur Deus Opt. Max. Vale. Venetiis, ex aedibus illustrissimi D.D. Ioannis Furtadi à Mendocxa, in hac Repub. Caesarei Oratoris longè dignissimi, quarto Idus Aprilis, M. D. XLVIII.

REVERENDISSIMO IN CHRISTO PATRI,

D. D. NICOLAO VINCEIO, EPISCOPO BALNEOL-
giensi, ac S. D. N. P. III. Datario vigilantissimo, sapientissimòq;
dirigitur liber De sanitate tuenda, ad Pontificem
maximum.

*I liber, & quam fers, domino impartire salutem,
Vivas vi admonitu tempora longa tuo.
Sui licet exiguus, tecum sed Nestoris annos,
Multaq; conciso corpore secla geris.
Verùm ne nimium timidus videare, vel audax
Materia pecces vilitate tua:
Scu cui magnarum Paulus molimina rerum,
Eius vi arbitrio stentq; cadantq; dedis:
Qui sacras dispensat oves, qui ne quid ab vllò
Tentetur contra iusq; piùmq; cauet:
Huic vni te crede liber: si duxerit intro,
Ex patrocinio iuuerit ille suo,
Res tunc facta tibi fuerit, nihil amplius optes.
Sed propera ad sacros oscula terre pedes.*

GALENI

PERCAMENI AD THRASY-

BVLVM. Nunc ratio tenenda sanctorum, ad medi-

cinalium operum, ad exercitacionem

spectet, liber vnu:

N omni cōtemplatione optimū

inventionis initium est, prius ex-

de quo disputetur. Qui autem ra-

tionalem cōtemplationem sanis

diligenter tractaria, in quodlibet

quicquid aequē discutere poterit: sine qua

quidem cōmentatione evolueret, nihil aliud est,

quam plecti & operam ludere. Cū igitur in con-

troverfiam veritatis, vnum ars sanitatis rēuēda

ad medicinalem artem spectet, ad exercitacionem

autem qui medicinā esse puritatem & propriā, & la-

porum cōsequatricem, definiunt, hęc medic-

inā partem salubrem esse cōfirmant. Qui ver-

o medicinā laborantē tantū curam habere

iūnt, ab ea sanitatis cōsequatricem abstrahūt.

Ita & exercitacionē si quālibet sanitatis serua-

ticiōem statuat, quātū pro comperto habue-

rit: quādammodū & quālibet boni habitus

ēū opitū, quā trahit, diuerso modo & ille ambi-

guū pro certo assumit. Nūquid igitur si me-

dicinā deſignare pręſentem, eam eſſe cuius finis

eſt ſanitas: Cōtrariā cōm verō, cuius finis eſt bo-

nus habitus, Ar ſic etiam gymnasticā ſalubrem,

tanquā nihil ſi dubium, detrāhemus: medic-

inā autem adhuc obſcurū artibū vnum, quā cū-

que eū definitiones cōſtituuntur a fine, non

ex quas ambiguitates pariunt. At qui ſalubrium

ſcientiā medicinā eſſe affirmauerit, in etiam

numē adducter ſalubrem, tanquā medicinā parti-

cipiſſe videbitur. Non deerant ſiquidem cō-

trarię ſcientiæ nōnulli, qui ægrotabiliū tan-

quā ſcientiā eſſe medicinā contendunt: hi ta-

men primū igitur, contrariorū omniū vnam

eſſe ſcientiā, & quicūq; ægrotabilia norit, hanc

& ſalubriā non latere nec eſſe. Dein verō ne-

quāt, quod & ſalubre dicimus lignum, quod æ-

grotō ad cūctas, futuram ſanitatē portendit:

necnon cauſam ſalubrem, quæ ſanitatis eſt pro-

creatrix ſicet & ſalubre corpus, quod eſt ſanitate

præditum, quorum omniū medicus ſcientiā ha-

bet. Periculū autem fuerit, ne ſi vnam tranſ-

curamus, ſeptem circa humanū corpus artes cō-

ſtituamus: primā & maioriſſimā, & penē ſo-

lam controuerſia carentem, eam ſcilicet quæ ex-

pellit morboſas duas alias, vnam a ſanitate ſecu-

dū affectuōē, & lubricā, ad eam quæ eſt in ha-

bitu, ducentem, alterā, in ea cōſervantē: duas

hęc alias: circa bonum ſimpliciter habitum, eſſe

ſtrictam vnam, alterā quæ cōſeruat: præter has

etiam duas alias, circa bonum habitum Athleta-

rum veritantes, qui non ſimpliciter bonus eſt, ſed

cum adiectione, atq; periculoſus. Ab his autē ſep-

tem, alias poſſemus etiam numerare artes, cū-

ſuſmo di eā & cōmuniā, quæ corpori pulchritu-

dinem quādam ad alterutrum cōducit, viſioſa &

adulatrix exiſtens. Huic etenim eī cōtrariā, quæ

circa legimū, verūq; pulchritudinē (quæ in ve-

geto colore, carnis moderata copia, membro-

rumq; congrua cōagmenta non cōſiſtit) verſa-

tur. Porro ſanitas & bonus habitus nō idem mo-

bis ſignificat: cū ſanitas quidem, ſalubrē quā-

dam affectuōē: bonus autem habitus, non æſ-

tetiōnem ſimpliciter, ſed fixā & permanentem

ſignificat, quā nimirum omnes deſideramus.

Cū autem omnes actiue artes proponant ſibi

quod in materia circa quā verſantur, eī valde

optimū, ac maxime duraturum: earūq; finis ſit

vnu, nempe ipſius propoſiti cōſecutio: vti quæ

manifeſtum evadit, artis circa corpus noſtrum

verſantis, ſinem etiam vnum, vt propoſiti vni,

exiſtere, ſive id quāpiam integritatem, ſive bonū

habituū, ſive ſanitatē, ſive naturalem corpo-

ris ſtructuram, ſive naturalem æctiōē, aut æſ-

tetiōnem nominare voluerit. Vt enim corpus lu-

manū vna res eſt, ſic huius quoc; vna perfectio

habetur, quā & præſentem cuſtodire, & abſen-

tem revocare, alioquiſ artis officiū eſt. Quare

nec multa corporis bona ponenda ſunt, neque

ipſius boni, quod eſt, aliam opificem, aliam cō-

ſervatricem arte ſtatueri oportet. Ita verō cum

vnum ſit corporis bonū primariū ac propriū di-

ctū, vti puta ſanitas, ad quod cetera referuntur,

vra cōtra integra, pulchritudoq; certē nō per alia

exquiliſ ſanctetur corpus, per alia robuitur atq;

pulchrum evadit: vnde vna circa corpus eſſe ar-

tis cōcluditur. Quēdammodum igitur animi, ſic

etiam corporis bona multipliciter dici ſolent:

vnu quidem ratione primariū, vt ſanitas: aliud,

tanquā ſtructuræ illius, vt æctio: tertium denique

neceſſariū cōſequens, vt videlicet pulchritudo:

nec licet alium horum prodeſſe, aut obſeſſe, quin

omnibus tribus aut proſis, aut nocere. Ars itaq;

in primis eſſicere ſanitatē videtur, quā nec eſſe

eſt æctio naturalis pulchritudōq; ſequatur. Qui

enim primū artifex cū fecerit, acq; ſciat, id e-

ius planē finis exiſſe: at naturali affectiōe per

quā agimus (hoc eſt, ſanitate) iſterituta, cōque

ſcit: finis igitur medicinæ ſanitas eſt, quā cū

induxit, nihil circa æctiōnem pulchritudinē vt

laborat, vt quæ vel inuito artifice ſanitatē ſequi-

tut. Sed neque in illa materia vna finis eſſe

debet, altera cōſervatrix habetur. Qui autem ſa-

nitatem propriā ratione tuetur, circa illa iudicio

meo, verſatur, quibus, velimus noliſmus, corpus

noſtrū vitare: quā ſunt, ipſe nos ambiens ær,

ſomnus, vigilia, quies, morbus, ac deniq; cibus &

potus. Hæc ſiquidem quæ peſce ſæden di iuvā-

diq; poteſtatem habent, ſanitas cuſtos ſpecta-

tur, id ſemper ante oculos habens, vt in corpore

exactē ſano, validōq; nihil novare audeat: cū

verō aliquantulum moderatiōē tranſierit, con-

tinuū quod deſicit, priuſq; a lenius id malum ſer-

pat, reſtarat. Sine enim plenitudine, ſive inani-

tione laboret corpus, vtrūq; vnum ars vna vno

modo emendat, quod deſicit nimirum inſtaurans.

Ceterū in quāto, nō in quali, correctiōis di-

ſferentia verſatur. Arqui ſecūdim quāntū in his

quæ ſunt differentiā, ad vnam artem pertinet:

quid ſi alterius artis eſſe debeat, oportet pro-

prie qualitate etiam diſſerat. Porro cū mulce æ-

varie ſint mediocriter rationes, quārum alie ferre-

Pulchritudo ve-

na, in quibus nō

ſiſtat.

Sanitas quid.

Bonus habitus

quid.

Artes omniū

ſuper.

Artes cuiusq; ſi-

nus, ſi cōſequen-

tis ſit.

Pulchritudo hanc

in corpore, vna

in tantum nō

ſit.

Vnum eſt ar-

tis, quæ circa

humanū cor-

pus verſatur.

Bonus autem

corpus multi-

pliciter dici

ſolent.

Sanitas aliis

naturalis, pul-

chritudoq; con-

ſequitur.

Finis artis

quid ſit.

Medicina ſua

eſt ſanitas.

Res expen-

da a medico,

Nonandum nō

hinc ſanū con-

ſiderari.

Modis ratio-

nes varia.

*Artes delin-
quendas ab ip-
si, per actiones
singulas.*

*Scopus omnium
medicinarum o-
mnium, esse sa-
lutem.*

*Artes omnes in
subiecta subie-
ta bene versan-
ti.*

*Medicina vni-
uersa, seu
cuncta, sunt
fines, omnes ad
salutem ten-
dentes.
Artes esse delin-
quendas supra.*

*Medicinarum ar-
tes lacrimas velles
sarcinam, esse si-
milium.
Fines artis quid
sit.
Artes effectus
ab actum, quo
differant.*

*Sanitas est me-
dicinae finis.
Artes non esse
materiam dicendi
candem.*

*Medicina in-
ferat materiam
salutis.*

*Artes indicant
de eis fuisse esse.*

*Artes cunctas
fines, a fine
fines indicant.*

alix igni, alix medicamentis, alix victus ratione
curantur, haliucinantur sane qui per singulas ac-
tiones, artes esse distinguendas putant. Nam
quis adeo fatuus atq; stupidus est, vt a medicina
modò propolitis actiones deducat, atq; aliam
quampiù artem pro vnaquaq; ipsarū statuat? Ete-
nim ob cōmune propolitu, quæ sanitas est, om-
nes qui quocūq; modo medentur, medici vocantur.
sed propter actiones, aut materiam, aut mem-
bra diuersitatem, luc manusarius, ille medicamentarius,
alter ocularius, & c. & dicitur: manusarius
ab actione, medicamentarius a materia, sicuti oc-
ularius a membro: & cū omnes sanitatis gra-
tia operentur (artes enim omnes in subiecta sub-
stantiæ bono versantur, atq; illi operam vnam) se-
quitur operantibus modos diuersos. Erunt igitur
medicina vnica, sed ipsius variae species ac par-
tes, omnes ad eundem scopum tendentes, ad salu-
tari videlicet. Ac proinde nō multitudine agen-
tium, sed propolitis explorans, artes sunt distin-
guendae. Siquidem singularia innumera sunt, sed
generale quoddam opus omnibus est cōmune.
Nam & corpori aliquid vt supervacuum detrah-
amus, aut aliquid quod deficit adiciens, vnum
vterq; opus pergit, corpori naturalem modum,
hoc est, sanitatē cōparans: proinde verò & cale-
faciens, & refrigerans, sicuti & madefaciens & sic-
cans. Non est autem vnus artus, opus facere: alie-
rius, vnatū corrigere: sed eiusdem. Quod si non
eiusdē, ac certe medicina nihil qd prius nō esset,
proceat, sed arti laceras ac tritas vestes sarcinē
oppido q̄ similis est: sanitatisq; conseruatio, parū
labefactata corrigit, minimē exstincta diuersum ge-
nus a curatio. Est porro id artis finis, qd quæ-
scite artifice, demonstrare valeamus, vt sanitas: qua
ratione effectusq; artes ab actum, quā finis ipsa
actio est, tantū differunt. Nam quamprimū acti-
us ab agendo desinuit, finis quoque vnū desit.
Nihil siquidem in saltatoria prater ipsam actio-
nem ostendere possumus, vt in fabrilis grabatum,
in edificatoria domū, sanitatē in medicina. Qua-
re nec sanitatem custodire, aut vnatam emenda-
re, aut prorsus amissam recuperare, finis est: sed
omnia hæc actiones sunt, finis autem est sanitas.
Sed neq; ex materia ipsas artes diuididæ sunt
quandoquidem materia vnam consistit pluribus
artibus subiecta (vt lignum, exempli gratia, nauis
artifici, carpentario, machinarumq; structori) si-
cuti & vnam eandemq; artem, permixtus vni ma-
teris. Quippe medicæ arti, vna cū sit, iuxta
materiam subijciuntur: corpus nempe sanitatem susci-
piens, cibi, ac potus, & medicamenta omnia, si-
cuti & vocata diuertimur. Hæc igitur materie
sunt causarum vim obtinentes: corpus autē, tan-
quam id ex quo finis, aut in quo. Itaq; ad finem
procedere omni ex parte, ab eoy artes indicare,
præcipit ratio. Propter hunc enim & cōmunibus
actionibus, & propriis præceptis atq; principiis
differunt: nam hæc & secundum artū fines eua-
riant: & cuiusq; artis constitutio a fine (que re-
gula omnium artis preceptorum existit) sumit
initium. Igitur vnum tantū cū sit humani cor-
poris bonum, sicuti & aliarum omnium subitan-
tiarum, atque vna similiter ars, que circa illud
versatur, huius artis iam omnes particulas spe-

culamus: cuius quidem finis cū nō in sola cō-
templatione est situs, sicuti Arithmeticæ, Astrono-
mix, ac Physicæ: nec simul cum actione ipsa desi-
nat, quod cōtingit in saltatoria: manifestum vnq;
est, neq; inter actiones, neq; cōtemplationes, sed in-
ter effectus aut acquisitiones, quales sunt quæ
ex parte vnatam conseruat, eas esse cōmune-
randas: sic vt natura quidem & corpus fabricetur,
& ipsum imbecillum consistat: eius autē mi-
nistra sit ars, quæ in præfennarij inuestigatur. Ap-
pelletur igitur correctio: quæ quidem a nō mul-
tum subitō corrigit, aut paucillum. Etenim quæ
ipsius pars multum semel corrigit, eam medicati-
uam aut curatiuam dicimus: cuius sanē, quem-
admodū quantitatis, differentia per magna ex-
istit: quæ: erit paucillum, conseruatiuum. Atque
hæc quidem insignibus differentis in partibus
singulis videtur. Aut enim ex ætate valentem ac-
cipiens, in hoc ipsum gradu conseruat, dicimusq;
correctio, hoc est, boni habitus conseruatix: aut
eos qui iam euaserit morbum, ac secundū habi-
tudinem sani existunt, reficit, appellatur analep-
tica, hoc est, institutrix: nam quæ inter vtrinq;
pars collocatur, versaturq; circa corpora in statu
non in bono labitur, sana, ea conseruatiua si-
mul & salubris nuncupatur. Tres igitur hæc par-
tes conseruatiuæ, analeptice, salubris, & euectice,
sunt quidem omnes sub ea medicatix parte, quæ
exigua tollit vna: inter se autem ratione maio-
ris minorisq; differunt. Minora enim castigat
euectice: paulo his maiora salubris: adhuc ma-
iora analeptice. Quidam verò & quartā his par-
ticulam prophylactice, hoc est, præseruatricem
addunt, facultatem habentem oppositam, quæ
a morbo reficit liberatos. Curatiua igitur, ma-
gna vna: euectice autem artus salubris, parua tol-
lit in medio verò harū interitio analeptice &
prophylactice posite sunt, si ad salubrem atque
euecticem comparantur, haud exigua vna emen-
dantes: si ad curatiuam, non magna. Quæ circa
non immeritō neque appellari possunt. Ergo vt
totum sermonem reparam, circa corpus huma-
num vnam quandā artem constituto, eiusq; duas
has esse partes, efficiunt vnam, corrigentē al-
teram: ambiq; hæc prius natura inesse, sed ip-
sam alteri, emendatrici scilicet, humanam ar-
tem opulari. quæ & ipsa bipartitō diuiditur, in
curatiuam partem, seu medicatricem, atq; in al-
teram conseruatricem, quæ & salubris vocatur.
Huius rursus tres partes sunt, analeptice, euectice,
& ac tot generi cognominis, salubris. Cū au-
tem omnis questio sub definitionem cadat, sanē
si quid tum medicina, tum gymnastica sit, didice-
rimus, nec amplius difficile fuerit venire ad vi-
tam ipsarum salubris referatur. Cū ergo vna
tantum ars circa corpus versetur, poterit quī vo-
let, medicinam eam appellare: sin hoc nō placet,
exercitatoriam. Si id quoq; displiceat, totam ar-
tem non nomine carere dicemus, vnam eius partem,
medicinam, alteram exercitatoriam appellat. Si
neq; id probas, salubrem quandam artem curati-
uæ ex diuerso distinctam, eiusq; partes dixerit-
icem, gymnasticamq; dicito. Singula enim nomi-
na si interpretabere, ita vniuersum quod quæ-
bas indeprus fueris. Quod autē vt arte corpora

*Medicinam
inter saluta-
rem conser-
uandam.*

*Medicam
inter saluta-
rem conser-
uandam.*

*Medicam
inter saluta-
rem conser-
uandam.*

*Confirmatio
medicam part-
proprietat.*

*Confirmatio
medicam part-
proprietat.*

*Confirmatio
medicam part-
proprietat.*

Salubris.

Prophylactica.

*Confirmatio
medicam part-
proprietat.*

*Confirmatio
medicam part-
proprietat.*

Artem mediā
praefidere na-
misti: meliori
en artibus.

Salubris me-
dicina pars.

Gymnastice.
Palaestra.
Gymnasia.

Panem.
Cyperum.

Palastram q̄
si muscoli gy-
mnastica.
Gymnasticam
dicimus artem
instruere dicitur
fit.

Luctatoria.

Cabalice.

Luctatariam
artem videri
prolesse
re.

Curatam ar-
tem partē primā
omnium fuisse
sophisticam,
Medicina.
Medicū.

Medicina p̄
cipue partem.

illas adornet, conficiant: eis omnibus, seu qua-
dam architectonica, ars corporis curantur, quæ
vna est, praefidet. Si quidem ad exercitiorum, ut tales
quasdam ades extruat, præcipit: calcetare, ut cal-
ceum: panifici, ut panem: culinarie, ut obsoniū
ab hisq; singulis, ut quæque apta est, imperat. Sed
huiusce artis corpus nostrum curant, salubris
appellata pars est, cuius quadripertitū diuisit,
partis vnus gymnastica particula existit. Cuius
tamē est ne praedictam, aut palaestric praefi-
sectū, cum gymnastic confundamus. Nam qui lu-
ctas omnes & fructuonū sigillatim. omnes actio-
nes ite obire valet, iste panifici et coquo propor-
tionē respondet, facere quidem panem & obso-
nia sciētibz, miuimē tamen quid in ipis opti-
mū sit, quid nō optimū, intelligētibz: quā
ve facultatē ipsorū vnuquodq; ad sanitatē ha-
beat, nō dignoscētibz. Viginti milis artis im-
peratōrē, sic padoctribz gymnasticis minister est.
Vocant tamen nō solum praedictis eos qui ex-
ercent athletas, sed etnō gymnasticas. Quare gy-
mnasticā duabus artibus maximē separatim inier-
uit: quemadmodū culinaris, quæ salutare obso-
nium medico salubrius concinnat: gustui verō iu-
cundum, ac voluptuosum, nō amplius id arti cui
piam, sed adulationi potius cuidam, finē sibi nō
sanitatem, sed voluptatem cōstituit. Similiter
& luctatoria, id quod ad sanitatem bonū est, sa-
lubribz & gymnasticis diuisis cōsultat. Quod au-
tem ad affectuonem athleticam pertinet, illi vi-
nosē partē comparat, quæ se gymnasticam vocat,
cui tamen prostrota potus, aut cabalice
appellari mereatur. Verūm omnis bene instituta
reipublica hoc genus artis odit ac detestat, ut
quæ omne vitæ robur prosternat, laud in bonā
affectuonem traducere corpora. Iam verō cum
prima totius artis pars curantia, quod sic expedi-
ret maximē, constituta sit: deinde per multū oīū
conseruatiua salubrius vocata, ei adiecta fuerit:
totam artem a præcipua magis parte medicinam
denominari cōtingit, sicuti & medicū illius pro-
fessorem. Idcirco non ab re nunc quispiam inter
rogatur, cuiusnam artis pars sit illa facultas, quæ
tuendæ sanitatis noticiam tradit, medicinæ re-
spondere poterit, latius fuso & amplificato voca-
bulo, neq; adhuc partem, sed integram humani
corporis artem significante. Cuius sanē duæ ma-
ximas partes esse curantem & salubrem, sicuti
& huius luctatibz, gymnasticam membrum exi-
stere constat.

GAL. PERG. AD THRASYBVLM LIB. de exercitatione parua sphaera libellus.



Licet mihi sanē videntur vtilissimæ
omnium exercitationum, quæ non
corpus solum exercere, verum etnō
animum oblectare possunt. Vnde
& sapientes, si naturæ humanæ illos
probe fuisse petros iudico, quicūq; venationes,
& alias animalium capturas, primi omnium ad-
venerunt, laborē qui in illis est, voluptate, ob-
lectatione, laudisq; cupiditate lenientes & tem-
perantes. Adeo cum potentes sunt, quæ in id ge-
nus exercitiis contingunt motiones animi, vt

multi morbis sepe liberari ex delectatione fue-
runt: multi rursus ex nimia cōturbatione, in mor-
bis incedunt. Nullus est autem corporis affectus
tantus, vt vehementior animæ affectuoni-
bus esse possit. Quam obrem diligentior istarū,
quim corporis passionū habenda ratio est, tam
alitis de causis, tum quia corpore longe præstan-
tior est anima. Ceterum aliis omnibus partibz
sphaeræ exercitium multis nominibus antecedit.
Primo siquidem cūm ceteræ exercitationes ma-
ximam apparatus, hominēq; otiose admo-
dum vitæ requirant, hinc certe vna tantum pila,
eāq; per exigua cōtopus, quam vel pauperissimæ
quique comparat sibi facile poterit: neq; is qui
ea se exercet, cogitur reliquæ negociorum relin-
quere. Quid igitur eo esse possit commodius, si
omni forent, omni item negotio cōuenit: tam
verō quæ ex quo exercere partes corporis vti-
uissas, seiq; non cū summam vehementiam in-
tendere, nunc in summam facilitatem remittere
possit, aliarum, præter hanc parua pilæ, nullam
quidem exercitacionem inuenies, quæ modo co-
lerrima, modo tardissima, tam vehementissima,
rursusq; leuissima, vti quæ sanē volueris, cor-
pusq; toleret, si enī asolet: hac enim membra
sua omnia, si commodum sibi videatur, ad alia
præ alius, si id magis placet, studiosius exercere
potes. Vbi enim inuicem sibi opposit, aliter alie-
ri pilā ipsam præcipiunt, in ea certe cōcertatione
caput quidē ceruicisq; collis per motuonibus ex-
ercent: latera autem, pectus, & venter, faciei suble-
uationibus, depreSSIONIBZ, obnubisq; cate-
risq; id genus prehensionibus, vehementer la-
borant: validēq; tum lumbi tenduntur, tum etia
crura firmantur. Hæc itaq; vna exercitacio om-
nes corporis partes quamvisdilesum exercet. Si-
quidem progrediētibz, alij nerui musculiq; a-
liūtem subeuntibus, plus agitantur: quemadmo-
dum etiam alij illis qui in obliquo se transferūt,
& quotquot vno modo crura ipsa commouent.
Quinetiam eorum membra qui transversū ferunt,
qui impariter currunt. Sed quemadmodum cru-
ribz, ita & brachijs exercitacio hæc, cuius æquā
portione largitur: quandoquidem pilam exci-
pere in omni figura studet. Accidit autē, vt dūm
necesse habent variis subinde modis se transmo-
uere, alijs musculis alijsq; fortius tendantur: hiq; in
vices omnes laborent, æqualiter quietē partem,
alios quiescentibus dum fatigat reliquifq;
vicissim et laborent cuncti, et quiescat, nec sint
otiosi omnes, nec laborent omnes. Quod porro
etiā visum exercet, patebit, si reputemus quā
diligenter pila sit oculis obseruanda, vt statim
quod dispartita sit, presentiat, ne in illius appre-
hensionē aberrare necesse sit. Vnde etiā animus
intentus atq; sollicitus redditur. Et licet sola soli-
tudo macerare nos extenuareq; soleat, exercita-
tioni tamen & gloriæ cupiditas cōiuncta, in vo-
luptatem abit, plurimūq; & ad corporis sanita-
tem, & ad animi prudentiam confert. Quod au-
tem & ad res maximas, adeoq; eas, quas subire
præstareq; imperatores, vrbis reginæ leges præ-
cipiunt, animum & corpus exercet, demon-
stratū nō est difficile. Quandoquidem & aggre-
di in

Animi affectus
quā corpus,
cur maior ha-
benda cura.
Parua sphaera
exercitium alio
longē cōueni-
re.

Parua sphaera
exercitium omni
partem corporis
vitiuissas, seiq;
non cū summam
vehementiam in-
tendere, nunc in
summam facilitatem
remittere possit.

Parua pileola-
dam, etiam co-
ercere oculos.

Sollicitudinem
exercitationis
et gloria cupi-
ditate cōiuncta,
in voluptatem
abit.
Parua pile
concentrat exercitium
ad res maxi-
mas corpus si-
mul et animū.

Exercitationis
vtilissima sit,
quæ exercet
corpus, oblectat
animum.

Animi affectus
ad potentes et
conuolando
morbus quā
nim habent.

di in tempore, & insidiando latere, & occasionem præbitam momento arripere, & aut vi, aut improviso astu, quæ hostium sunt occupare, occupatæque tui, bonorum imperatorum sunt opera. Enim egregie cautum, subdolumque esse ducem oportet. At quotquot in palæstris dimiculi, corporis obestatem, potius quam virtutis exercitationem, consequuntur. Unde multi ad tantam pervenere crassitatem, ut vix etiam respirare possint. Et sanè genus hoc hominū vel ad bella gerenda, vel ad regia vel civilia obeunda munera, minime valent: ac suisbus propemodū porus, quā his, rem quampiam quis possit committere. Sed cursum fortasse, & cetera exercitia, quæcumque gracile reddant corpus, laudatū me suspicaberis. At hoc nō ita se habet. Numum enim quod est, reprehendo semper: omnēque quæ exerceri velimus artem, esse moderatā volo: quæ si modum excedat, iam bona esse desinit. Quæ ratione ipse neque curius cōmendo, ut qui nimium ad extenuem corporis habitum, ac ne tantillum virilis hab eant exercitationis. Non enim celeriter fugiendo, sed fortiter stando, pugnamdōque paratur victoria. Iam si ad sanitatem respicias, quatenus per cursum inæqualiter exercent membra, eatenus valetudō laxatur. Necessariō namque sit, ut alia defangitur, alia autē sint omnino ociosa. Horum verō neutrum bonum, sed utrunque & morborū feminariū est, & vires in primis debilitat. Quæpropter eam potissimum exercitacionē probo, quæ & corpus conservare validum, & membra retinere integra, composuit, & animū præterea vegetum, alacremque reddere est potius. Quæ quidem facultas, in ea quæ parva pila fit exercitacione, reperitur. Quod autem palacidissima sit, hinc discas licet, quod pueris, senibus, atque a morbo convalescentibus, hoc etiā nomine, aliis omnibus exercitacio hæc esse præstantior videatur. Quippe facilius nullū est exercitium, si præmissa molli ex oleo vinctione, eo leniter, admodum moderatè utaris, ut ipsius qualitas minime à quantitate obscuratur. Illud siquidem omnium lenissimū est, qd laxaris requieritūque viles in primis, potentissimūque ad debilitatas vires revocandas existit, iunioribus iuxta femoribus cōducens maximè. Inter alia eius quæ recentius cōmoda, neque hoc esse prætermittendū videtur, quod maximè omnium extra pericula sit, quæ frequenter ad eōdem reliquis, cadunt exercitaciones. Celeres enim cursum, iam multos nupto vase præcipuo perdidit. Quæmadmodū & voces maxime, vehementēque & confertim emissas, maximorū nō paucis malorū causā extenuat. Exequitantones etiam concitant, sæpe rentes superant, & pectus frequenter nocuerūt: poris quoque nōnūq; spermaticis: ut ea inter præterea in eōdem, quæ ab ipsa equis existere solent, ita ut multi equites sellis excusuli subitō sint exanimati. Similes iis salus, discas, & quæcumque nimis infestant corpus exercitia sunt. Nam de illis qui ad palæstram proficiūtur, quid arriper dicere, cum eos videas aut claudos, aut distortos, aut fractos, aut aliqua omnino parte munitos reddere. Quæmodum cum præter reliqua cōmoda, parum huic pilæ exercitio adfit etiam securitas,

nimirum aliarum omnium utilissima hæc exercitacio merito censenda est.

GALENI PERGAMENI de alimentorum facultatibus, liber primus.



Acuitates alimentorū merito præstantissimorū medicorū plurimū diligenter per vestigant, quod aliis quidē præsidus minimè omnitempore utamur, sine alimento autem,

ne vivere quidem, nec secunda nec adversa valitudine luceat. Porro cū demonstratiorum duogenera sint principia (aut enim à sensu, aut à ratione evident, demonstratio omnis ac fides proficiscitur) nos de isdem facultatibus conscripturi, sanus esse duximus ab experientia auspicari, eōque maximè, quod bona pars medicorū, hac sola vires alimentorum esse pronuntiasse iuventas: inter quos præcipue Diocles, experientia sola, facultates alimentorum nobis notas esse arbitrat, non ex indicantibus, quæ tum à temperamento, tum à sapientibus desumuntur. Quod verō experientia, ut alia plerūque, ita & qui cibi facile concoquantur, aut secus, quæque stomachū ruunt, aut ostendunt, aliumque laxent, aut sistant, nos doceat, nemo sanæ mentis ignorat. Ceterū in iis ipsis plerūque falluntur, qui citra limitatōnem faciunt de rebus periculo. Etenim quibus statibus copia in ventriculo, vel ob pravi quampiam temperiem, vel ob peculiarem constructiōnem colligitur, in cibos corrupti difficiles, melius quam faciles, concoquantur: quando quæ facile concoquantur, facile item alterantur, & corrumpuntur: contrā quæ concocti sunt difficilia, nō facile quoque tum alterantur, tum corrumpuntur. Hæc itaque si in multum calorem incidant, concoquantur magis, quā si moderato occurrerint. Atque hac protecto ratione accidit, ut nōnulli bubulam facilius quā laxantem pisces cōficiant. Lens autē quibuidam alium movet magis quā mhibeat: melicratum verō magis sinit quā laxet, ob naturā ex pugnannibus compositam facultatibus. Nam solidum cuiusque corpus tardè permear, aliumque sinit: humor verō, ad excrescētiā stimulat. Quare lentius aut brasiace decoctū, aliū subducit: ipsa verō corpora, inlubet. Siquidem brasiacea bus cocta, sunt qui ad ventris colubritatiōem vtriusque. Omnibus enim quæ in humore coquantur visū venit, ut quiddam ab eius facultate in se demuant, ac de sua vicissim portione aliquam ipsi impartiantur. Quare si aut lentem, aut brasiacā, aut aliquem maioriorem piscium, quibus testa pro cute est, decoxeris, ac postea decoctum ipsum oleo, garo, pipereque conditis, propautes cuiuspiam, videbis planè potione quidem alium dilui, eū autē solidi corpora constipari: si vni cum ipsorū iure, solidū etiā corpus sumatur. Sic namque pugna quædam inter vtrūque fit, cū solidum quidem corpus heret subinde, succus autem ad excrescētiā properet. At cū nōnullis quidem venter ad egerendum sit natura propensius, aliis autem difficilis, vtriusque pro sua natura symptomaticis quæ ab humifmodi cibis sunt,

Vires oblique alimēto non licet. Demonstratio omnis aut à sensu præfinitur, aut ab evidentē ratione.

Diocles.

Experientia quæ exquisita est.

Bubulam fortiter ventriculo, cibis corruptis difficiles, quam faciles, multo melius concoquantur.

Bubulæ, quæque faciles piscium, aut nonnulli multo facilius coquantur.

Lentius et brasiacea decoctum, alium subducit, ipsa autem corpora, inlubet. Siquidem brasiacea bus cocta, sunt qui ad ventris colubritatiōem vtriusque. Omnibus enim quæ in humore coquantur visū venit, ut quiddam ab eius facultate in se demuant, ac de sua vicissim portione aliquam ipsi impartiantur. Quare si aut lentem, aut brasiacā, aut aliquem maioriorem piscium, quibus testa pro cute est, decoxeris, ac postea decoctum ipsum oleo, garo, pipereque conditis, propautes cuiuspiam, videbis planè potione quidem alium dilui, eū autē solidi corpora constipari: si vni cum ipsorū iure, solidū etiā corpus sumatur. Sic namque pugna quædam inter vtrūque fit, cū solidum quidem corpus heret subinde, succus autem ad excrescētiā properet. At cū nōnullis quidem venter ad egerendum sit natura propensius, aliis autem difficilis, vtriusque pro sua natura symptomaticis quæ ab humifmodi cibis sunt,

Terminus fieri, odiorum contrarium facultatis inter se pugnantibus.

afficiantur, quum venter alius succi, alius solidi corporis facultati optineatur. Interdum etiam pituitosum in ventre humorem, interdum biliosum accuari contingit. Atque ipsius pituitosi, alius quidem est acidus, alius salinus, alius dulcis, alius denique subtilis qualitates expers. Rursus alius est liquidus, alius crassus, alius viscidus, alius dispersu difficilis. Humores etiam biliosi, alius est flavus, alius pallidus: in quorum utroque maximum est, pro maioris minorisq; ratione, discernitur. Singuli igitur memorati humores, eodem aut ad alius excretionem, aut eiusdem cohibitionem plurimum habent momenti, postquam in tegra ciborum memoratorum corpora cum suis succis in ventrem pervenerint, in quidem qui eisdem fecum sunt facultatis, ferunt suppetas.

Alimenta ergo cum tardive transitus esse compertuntur, aliis ob naturalem non strā ab initio constitutionem, aliis ob ventris dispositionē acquirunt, nonnunquam ob peculiarem esculentorum ac potulentorum substantiam. Si quidem atriplex, blatum, malus, cucurbita, qua sunt lenta & perhumida, alius que talia non sunt, celerius subdiuit, in us potissimum, qui sumptis illis, leuiter in paucissimo olambulinc. Eodem in genere aliquis ponere possit, mora, dulcia ceratā, & ex viuis quæ dulcia simul sunt atque crassa. Pepones quoque & melopepones, quod humidum sint ac lenia, ventri sunt subducendo idonei, facultatemq; mediocriter abstergerē habēt, idcirco inter ea quæ vrinam inouent, connumerantur.

Ex numero etiam liuandorum atq; aquosorum corporum sunt & illa quæ præcocta, & Pericia vocant: & omoio quæ nullam glutinibus aut olfacientibus qualitatē repræsentant. Quæ quidem si venter sit ad deiciendum proclius, non ægre subducunt: si minus, hærent & ipsa sublimia, medium quodammodo uter alicuius sitientia, & proritantia, locum sortita. At melicratum, in quibus celeriter diatribus accipiat, nihil aliud ad excretionem consent: quoniam cibis secum commisit, ad distributionem præstat. Quod si diatribu celeriter oio antevertat, excretionem, non secus ac flaua bilis, sua acrimonia & mordacitate prorit. Atque horum cibariorum ponendum genus, duxat mordicatione sua ventris partes ad expulsiōē exsuscitat. Alia autem sunt, quæ ventrem subducunt, quod facultates in se medicamentosas habeant commisit: ac prinde horum substantia ex cibo pharmacōq; constat. Porro quæ mediū temperamētū sunt nulliq; vacanti qualitate prædita, ea solum sunt alimenta, non etiam medicamenta, quum nullam aliam dispositionem in animantis corpore ingenerent, sed quale animalis, quod nutritur, corpus assumpserit, tale protus conferunt. Ceterum si hominis quidem corpus mediū plausū temperamētū sit, per alimenta mediū temperamētū eo in statu ferabitur.

Sin autem frigidus, calidiusue, aut succius, aut humidius sit fuerit, mediū temperamētū cibum & potum perperam exhibens. Quippe huiusmodi corpus, quatenus ab exacte mediā constitutione recessit, eateus in diuersum statum traducatur oportet: idque per præfatus

intemperantia contraria, in eodem gradu adhibita. Quare ad præsentem speculationē summe necessarium esse videtur, hominum pariter ac ciborum temperamenta considerare, ut cognoscamus quoniam quibus sunt adhibenda. Etenim mel, verbi gratia, calidus & siccis naturæ est aduersissimum: frigidus verò ac liuandis vtilissimus, siue ex temperie sit eis naturalis, siue accesserit propter ætatem, siue propter regionem, aut anni tempus, aut vitæ conditionem. Neque verò satis est principalissimam cuiusque cibi temperiem nouisse, sed qualitates etiam quæ hanc sequuntur, callere oportet: quarum multæ quidem in saporibus, quædam in odoribus videntur consistere: quandoquidem cibi ipsi eandem cum us medicamentis obtinent facultatem, quibus cum sapore conueniant. Ceterum in commentariis de medicamentis causam explicauimus, quomodo autem stringentia quædam non eadem cum aliis astringentibus agant, ut aloë, res vīam, atramentum istorum, fios æris, squamæque, & chalcitis. Si quidem quod in quoque istorum, astringenti facultati alia quæpiam sit mista, evenit ut opera quæ figulant edunt, sint diuersa, perinde ac si malo cydonio scammonium iutus infuserit: quod interdum vtiq; facimus, partes mali quæ circum semen sunt, exculpentes, deinde causam scammonio replentes, ac postea luro* cum cumimentis, affantesq; atque ita malum manducando dantes. Quod naq; hunc in modum præparatum est, absq; stomachi subuersione alium subducit. Quare minime dubitandum est, quod saporum facultates, actionem suam quam a natura habent, efficiant. Porro in quo qualitas iustè astringens, ipsa quantum in tepla est, vicina corpora cogit, contrahit, refrigerat. Idem tamen corpus nonnunquam alias in partes calefacientes, alias refrigerantes habere potest. Non autem ex herba & lente cum sale & garga interdum edulium paramus, alius soluende gratia. Sin minus velis subducere, vi lentem excorutatum bis coxeris (nempe aqua priore effusa) ac dem portunculam garī atque salis induderis, tamen ac tenuisimo, quantum gustum minime offendant. Ita enim pharmacum succulentissimum vtilissimūq; reddidit, & cibum non paucis eorum qui diuturna cōstitantur deanthora. Ceterum affectuum cognitio, existit remedium materia: non autem remedia ipsa: de quorum facultatibus differere in hisce commentariis est animus: quanquam libri solent esse monumenta quædam eruditorum, non rudium & indoctorum perfectā doctrina. Neq; enim quisquam ex libro nasciturus, aut trixer alterius artis evasit. Ac prinde rectè illud vulgo dici videtur, optimam esse doctrinam, quæ viua voce traditur.

De Trinito.

PLURIMUM cuius mole habet redditq; alimentū id trinitum, quod densum est, denubisq; vix diuidi potest. Quod si liue contrarium existat, magna mole exiguum alimentum largitur. Est autem quod densum est, laxo longè grauius & pōderosius, colorisq; magis stansescens. Porro

Temperamenta hominum et ciborum esse consideranda. Mel calidum & siccis naturæ est aduersissimum, frigidum verò ac liuandis vtilissimum, siue ex temperie sit eis naturalis, siue accesserit propter ætatem, siue propter regionem, aut anni tempus, aut vitæ conditionem.

Alimentorum si coudas qualitates etiam esse explorandas. Supra commentariis quid indicet.

Cydonij mali cum scammonio præparato, ad soluendū alium.

Atstringentia qualitates quoque.

Edulium solum de aloë, quomodo ex herba & lente præparatur.

Affectuum cognitio, existit remedium materia: non autem remedia ipsa: de quorum facultatibus differere in hisce commentariis est animus: quanquam libri solent esse monumenta quædam eruditorum, non rudium & indoctorum perfectā doctrina.

Arsefex nomen est laboris vasis. Doctrina illa quæ optima, quæ viua voce traditur, trinitum differens.

Pituitosi humoris quatuorplex differentia.

Biliosi humoris differentia.

Alimentorum res res variis de personis, & quibus profectis acquiruntur potest.

Olera quæ ob lenitatem delectantur facili.

Præfatus subducenda alius idonei. Deposuit, melopeponibusq; non duffe sitientiam.

Melicratum quomodo excretionem exstat.

Alimenta medicamentosa.

Alimenta temperata.

Temperata corpora, referenda ad modum diuersitatis sunt, per alimenta quæ contrariis illis temperamētis feriantur.

Purpurei panes et *pari alio* re, *et ventrem multo exacerant* te implere, ob id; *subditi facili*.
Purpurei subditi faciliatate deorsum fortiter.
Panes qui lardisime desinantur.

Miscellanei panes.

Siliginum panis plurimum alacritatis praestat.
Semilatem panis ut natus.
Purpurei panes in omni minimum nutrit.
Panes ceteros facili.
Panes alacritatem.
Panes siccitatem.

Panes azymos esse nonnulli dicunt.
azymos panes quosdam casu reperiunt, prompti enim lardi.
Alexandriae flos, camelis non vescuntur comibus.

Somni propter durescunt plurimum in fovea ad colorem.
Astheniam etiam picram, velis rationem, ut qui non exerceant esse potius.
Panis a crude humore durescunt ratione.
Panis coquendi forma quo praestantur habet.
Panis subditi quosdam.

furfuracei panes parum quidem alunt, ventrem verò multis excrementis implent, ob eamque causam facile etiam descendunt. Ad haec, quod furfur non nihil facultatis deterioris sortitur, mentis interitus exasperat, celeris eorum sit detestatio. his autem ceteris sunt panes purissimi, plurimum ponderis exigua mole habentes: qui omnium tardissime deiciuntur: quare copiosiori fermento egent quam furfuracei, subacti nempe longioris: statim post ipsam assam postulant. Iidem assationem diuturniorem, quam furfuracei, requirunt. Est autem et alia panum species inter hos plane media, quos *azymos* & *repauros*, hoc est, miscellaneos ex farina & fursure, appellant. At verò purissimus panis apud Romanos, siliginis dicitur: quem admodum qui hunc est proximus, similaceus. Inter panes igitur siliginis plurimum alimentum praestat: post ipsum similaceus: tertio loco medius, qui & miscellaneus dicitur: post hunc, sordidiorum est quartum genus: in quo, furfuraceus potestem est, minimumque omnium nutrit, sed omnium maxime per alvum descendit. Ceteros autem sunt inter panes facillimi, qui plurimum sunt fermentati, probeque subacti, quique in cibano igne moderato fuerint assati. Iam ex panibus in arilete quidem est comodus, qui neque est bellissimè assatus, neque multum fermentum recipit: prius autem & sensu, qui in cibano probe coctus cum sit, habet etiam fermenti multum. At qui omnino caret fermento, prolixus nemini est commodus. Quid si casci etiam aliquid illi addatur (sic enim ruitur apud nos festis diebus panes quos vocant azymos conficere solent) eius visus promptè omnes laeduntur, etiam si fortissimum sunt corporis habitus: cuiusmodi sunt meliorum ac fortiorum robustissimi, qui in Alexandria, assina & camelina vescuntur carne, ob idque gravissimum crudum morbum tentant, atque ante senectam intereunt. Quod autem eorum plerique, qui se consecraverunt laboribus, minus à prunis cibis laeduntur, in causa est, quod illis somni sunt profundiores: quæ res ad coctiones multum ipsi adfert momenti. Athletæ vero alimentis utuntur crassius & viscidius, & qui per exercitiam improba, non facile ad computrescunt, aut in vapores solvantur. Quibus cibis si praestatur aliquis, aut ab exercitiis alienus uti voluerit, celeritè in plenitudinis morbum incidit, copiam crudi & crassi succi coacturans: qualis est ille humor qui in urinis subdit, puri quandoque assimilis: nisi quod pus & graueolens est, & lentum, crudus vero succus non item. Inter panes, rursus, optimi sunt cibantur: his proximi, qui assantur in furno minori. At qui super craticulam, aut cineres calidos, aut loci pavimentum, seu in cibano, assantur, pravi omnes sunt, ut qui se inaequaliter habent. Omnium autem pessimum sunt, qui sum ad modum assandi perierint, quos eo subcineritios nuncupant, quod cineribus recti assentur.

De Placenta, quam *repauros* appellant.

Quam placenta ex farina trincea laevigata suscitatur aequa portione, atque oleo intra sartaginem fritta, consistat, appellaturum *repauros* &

Athici, ea quidem cohibet ventrem, & crudorum succorum est generatior. Quapropter & quibuldam mellis quippam et admiscetur. Sunt qui & silem marinum miscant.

De litrorum compositione.

DVLTX autem est litrorum species: praestantior quidem, quam rhyematis deterior, quâ lachana appellant. Quæ sanè ex luto ac simillaginem componuntur, crassi sunt succi, & tardè subident, iteorsim obstrunt meatus: ad haec lenis imbecillitas em arguit, calculos in renibus gignunt. Quod si cocta bellè fuerint, atque murata in sanguinem, admodum nutrent. Quæ verò cum melle parantur, vitam possident facultatem. Quanquam in his qui obstructionis principium habent, aut in inflammatione, aut scirrhus sunt aliquo obfessi, nihil minus quam illa nocet: nonnumquam etiam grauius. Ut autem de pane fermonem repetam, ut saluberrimus est homini neque iuveni, neque exercitationibus dedito, qui et si sales, tum fermenti habet plurimum, maximeque fuerit, antequam assentur, subactus. Modus autem fermenti & salis sit is, qui gustui sensum tristem non inferat.

De Pane loto.

Qui panis ablucendi rationem excogitavit, minoris fuit alimentum cibum, sed qui ab obstructionis nota abstinere, quoad licet, longissime, inveniunt. Siquidem panis hic, succum crassum & lentum habet minimum, ut qui ex terrestri aëreus sit factus. Ceterum id edulum quod ex multa triticea farina lacte permixta constat, tametsi boni succi & multum alimenti sit, ex tamen est, quæ ob asiduum usum, hepatis obstructions, & calculos renium procreant: ad hoc etiam conferent renum temperamento acri simul & igneo.

De Alisca, fusc Chondro.

ALICA ex genere est tritici, & valenter nutrit, succumque lentum habet. Proinde huius usum multum vitare convenit, idque potissimum quibus secur facile obstruitur, ut renis calculi gignendi sunt prompti. Quod autem ad forbesiones alice pertinet, oportet si succum eius (qui sanè magnam coactionem desiderat) tum multæ aequæ admixtum super carbones coquere, plurimum movendo, quoad exactè percoctus fuerit: tum vero salis quippam etiam inire, oleumque in principio, si placet. Quod si quando sani obvehementem ventris mordicationem, aut biliosis humoris & multum transitum, sorbitione eguerint, ac denique plurimum cocti donec extabuerint, ac dem colatum propina.

De Tritico elato.

ELTXVM trincum ventrem, seu pondus maximum, premit, nauseam ciborum inducit, status generat, dolorem capitis, caliginemque oculorum concitat, ac denique immo dicitur huius alium: cuius facultas, vnicum in cruditaribus est remedium. Nutrit namque validè corpus: & robur insignis, eo qui ipso vis fuerit, comparat.

De Amylo, hoc est, farina citra molam extrinco facta.

AMYLVN ex tritico sit, partes exasperatas laevigandi vim obtinens: fortique panibus similem facultatem sortitus. Nam virili, minus

207 ad 172
alium sita, et
crudum ha-
mum est gno-
ratum.
lenum com-
positum, et
nec.

Panis subditi
humoris
non tantum, nec
exercitio deducit,
quod non
esse debet.

Panis lentus
non tantum
nutrit, sed
etiam
obstruit.
Panes qui
subditi
sunt,
talis ex lacte
et farina, hoc
panis obstruit
renes, et
calculos gignit.

Alica,
Chondro visus
quibus debet
esse suspectus.

Alisca, fusc
quibus sit
propinanda.

Tritici elici
incommoda.

Alis facili-
ter in crudis
virescit, quod
est medium.

quàm panes non loti, corpori alimentum præbet & non calefacit, cum ceteri panes calefaciant.

De Hordeo.

HORDEUM, quoquomodo ipso utaris, vim quandam habere refrigerandi cernitur: quia quidem ratione à tritico differt, necnon quod tritico sanè crassum & lentum humorem gignat, hordeum autem, & tenuem, & deterius non nili. Ceterum polenta quæ ex friso hordeo conficitur, ficcare conspicuè cernitur: quum tamen ipsa prisa humectet, ubi plurimum intumuerit coctione & longa, tandemq; in chylum degenerauerit. Acetum autem tunc ei admiscetur, cum planè intumuerit: cum verò cocta fuerit exactè, sub edendi tempus salem tenuem iniicere oportet. Olcum etiam, si in principio itam iniicias, ectioni nihil nocuerit. Porro hordeum ex quo conficienda est prisa, aliquandiu in aqua præmacerandum est, postea verò in mortarium coniectum, vsque eo terendum est: ut aliqua aspera, dum is qui in superficie est cortex, abiectus sit. Quod si non quicquid est paleaceum deciderit, elixa prisa magis quidem deterget, nulla autem aliam noxam accipiet. Sic præparatæ ipsius prisa: lentor, lenus, continuus, blandus, lubricus, & moderatè humidus est: sinimq; arceat, ad abluendum idoneus, nec attritionem habet, nec tormina gignit, nec deniq; in ventre exturgescat, cum intumu erit inter coquendum, quatum in tumescere poterat.

De panibus hordeaceis.

HORDEACEI panes (quorum similes sunt differentiæ illis quas de triticeis tradidimus) multo minus triticeis alunt, magisq; subducuntur per alium, & potissimum si facti ex priori hordeo fuerint. Laudatissimum autem est hordeum quod caudicum, ubi pinsum est, apparet, non nihilq; habet densitate & ponderis. Porro quod totum plenum est, & circumscriptionem externam habet tensam, melius eo est, quod gracile est & rugosum: id quod seminum omnium tibi sit indicium commune. Ceterum non debes vii seminibus itam post collectionem, sed ubi ea in locis repositis, du ab eis abstineret, quæ interea pars quidem humoris superflui exhalet, pars autem etiam coquatur. Desunt enim à plantis, fructibus, & seminibus, postquam collecta et reposita fuerint, primum quidem quicquid in ipsis aquosum est, ac tenue: post autem, & nonnihil humida naturalis. Quare quæ diuissimè fue-

rint reposita, vires habent imbecilliores. Verù lanius terminus sit, cum ab ipsis diuisis pulsus quidam tenuis excidit.

De Polenta.

Ex recenti hordeo mediocriter friso laudatissima fit polenta. Quum autem polenta omnis quæ rectè est facta, boni sit odoris, ea est suauissimissima, quæ ex optimo ac recenti hordeo, & quod aristam non admodum habet siccam, coacta est. Quæ quidem si cum vino austero fuerit epota, ventrem defecit. In vniuersum autem, prius quidem & in oculo degens, plurimum alimenti largitur: si verò qui quoquomodo exerceatur, minus quam quod fit facta.

De Maza.

At maza (quæ ex polenta frisa conficitur) tantum in alendo corpore, à panibus hordeaceis, quantum hi à mureis, relinquitur. Quispe cum hordeum intus suapte natura fursorem haberet non paucum, vel ex ad concoctionem ineptum, fruxum iam, cum ipsum habebit tum sicciorum, tum fractu & comminatu difficiliorem: sicut & cremorem illum ex quo corpus alimentum sumebat, similiter ardiorum. Quo fit ut maza panibus hordeaceis, æquius coquatur, magisq; ventriculum ita implet: in quo etiam si diutius manserit turbationem excitat. Citius autem subducitur, si commista diutius, atque subacta fuerit. Quod si mel quoq; addatur, citius etiam ob id ventrem excitabit ad excutionem. Porro prisa deteriora & incisa est: qd in cute non ita indicat, ipsius sordes eluens. Si paulo post, quam ipsam cupiam sorbendam dederis: vomere ipsum compulsi, pituitam quæ in ventriculo continebatur, deterget, & omnia vomitu simul cum ea eiiciet.

De Zea, Typha, & Olyra.

ZEa (quam vulgo speiæ vocant) nutrit quidem hordeo valentius, at impotentius tritico: ac proinde mediam inter triticum & hordeum naturam possidet. Olyra eisdem cum Zea est generis. Quæ quidem si bona sit, panes ex ea confecti, post triticeos saltem sunt præstantissimi. Secundi ab his sunt qui ex typha parantur. Ex nobilissimis autem olyra, ut decet, excorticata, sunt qui nominatim tritum conficiant: quo plerique vuntur, primum in aqua coquentes, deinde ea effusa infundentes super, aut vinu dulce, aut mustum, quibus postea superiniciunt & pineas nueces aqua præmaceratas, donec plurimè intumeant. Quod verò ad colorem nanui pertinet, in hordeo quidem & olyra est albus, in tritico & zeasubflauus. At typha flauior tritico exsistit. In vniuersum autem, quæ semina parua mole multè reddunt substantiam, rariq; crassam & viscidam, optimi succi sunt, ac multi alimenti: non tamen facile per alium fecedunt. Quæ verò lusi sunt contraria, mollem quidem ac laxam habent substantiam: partes autem ipsorum fursures, citius quidem subducuntur, sed alunt minus. In us ipsis, quæ graucolentia sunt, & gustum quandam habent inuicundum, perspicuum est quod omnia & praua sunt succi, & difficilia concoctu.

De Avena, quæ Bromus dicitur.

Avena, iumentorum, non hominum, est alimentum, nisi eos extrema fames illa nutrit compellar. Est autem admodum calida, minusq; nutrit quam typha: & panis inde confectus, insuauis existit, non tamen alium aut silit, aut prurit, sed quod ad id saltem pertinet, medium locum obinet.

De Milio & Panico.

PANIS qui ex milio fit & panico, exigui est alimentum, & frigidus: ac præter id, tum præaridus, tum frigidus, cum nihil in sese habeat nec lentoris, nec pinguitudinis. Quare alium humentem defecit. Porro milium ad omnia est panico præstantius, suauissiq; edunt: ad hæc coquuntur facile, ventrem minus silit, ac magis nutrit.

De

Panes calefaci-
ent.

Hordeum refrigerat.
Hordeum quoquomodo à tritico differt.

Prisa humectat.

Prisa conficienda natura.

Prisam deterget magis, ubi ex hordeo non plene deciderit cortex. Prisa magis facit commensuratio.

Hordeacei panes nutriunt multo minus triticeum, magisq; subducuntur per alium.
Hordeum laudatissimum quale.

Rugosa semina, deterius est.
Semina, quæ diu reposita,

Semina quæ diu fuerint reposita, curiores habent an buccas.

Polenta epota cum vino austero, ventrem defecit.
Polenta quod plurimè alitum si largiatur.

Maza æquius coquatur panibus hordeaceis, statim magis ventriculum implet.

Prisa facilius.

Spila.

Zea media inter hordeum & triticeum.
Olyra.

Typha.
Tritum quomodo præparatur.

Semina optimi succi & multi alimenti sunt, quæ parua mole multum reddunt substantiam.

Semina praua sunt quæ.

Bromus.

Avena est admodum calida.

Panicum.

Milium ad omnia est panico præstantius.

SEMINIBVS CEREALIBVS, &
quibus panis non fit: ac primum
de Oryza.

Oryza omnes
ad pinguem al-
uum trahunt.

ORYZA omnes ad fistendam aluam trahunt:
quod semen difficilissimum quidem alere concoqui
tur, ac minus alere, illa insuauior existens.

De Lentibus.

Lentis subtilis-
sima.
Lentis succum.

Lentis hic colla-
rentem flava-
tem supponit,
corroboratq.

Lentis, si quis ea
largum vti-
tar, elephanti-
simi & cancri
indicia.
Lentis vti-
scapum bo-
hetat.

Lentis prius
in melle apte-
mam edulcora-
tadit.

Lentis ad versa-
tur in qua cras-
sa melancholici-
asq. indoluit
facit.
Tiptoribus si-
gna qualis co-
bi conuulsi.
Ver, melle tem-
peramentum ac-
tillat.

Fabacum cibum
est flatulentum.
Flatum a cibis
dissipat per cal-
facientia & re-
manet.

Fabacum sub-
flauum.
Fabacea farina
lentes facit
extremi.
Legumina em-
nia prius red-
da a cibis dis-
solvunt.

SUBSTANTIALENTIS crassa, terrea, austera &
astringens existit. Succus autem qualitate astringen-
ti contrariam possidet. Quare decoctum ipsa-
rum sale, garo, aut oleo enam conditum, aluum
deicit. Ceterum lentis bis cocta supprimit alui pro-
fluuium: stomachum, intestina, & totum denique
ventrē corroborat. Lens porro decoctitica magis
nutrit quā huius cortice spoliata nō est: fac-
cum tamen crassum & prauum gignat, nec sic alui
profluuium deiecit. Iure igitur qui largus hoc
edulio vniunt, elephantiam & caneros incur-
runt: itaq. tantum qui laborant cachexia, voluerit
talibus cibis praebere. Qui quidem integrum & in-
culpatum visum hebetat, ipsum immoderate exi-
cians: ei verō qui contrario modo se habet, con-
ferit: retinetq. multetia profluuium. Cum autem
pristina, in eo saltem, contraria ipsi facultatem
possideat, ex amborum multior praestantissimū
edulium conficitur, idq. minoris portione ipsius
pristinae iuncta, necnō lacturae, aut pulegio ad-
dito. In summa verō les ad versatur us, qui cras-
sus melancholicusq. succo redundat. Ceterū in
ipsa victas ratione, temporum ratio est habenda,
sicut & regionum, & anni temporū. Etenim
autumno melancholicis ac siccantibus cibis ab-
stinere, hyeme autem vti oportet quemadmo-
dum acitate humectantibus simul & refrigeran-
tibus. At vere, quod necdū temperamenti sit, me-
dus facultatis cibi sunt dandi.

De Faba.

CIVS qui ex fabis conficitur flatulentus
est, etiā si coquantur diutissime: id quod sentien-
tes nonnulli, cepas ipsis aduicunt: cum quicquid
flatulentum cibariis inest, corrigatur per calefacien-
tia & tenuantia. Habent autem fabae subtilis-
simam non densam nec grauem, sed fungosam ac
leuem, quae vim quandam detergens possidet.
Quare fabacea farina mulieres faciem devigilat:
tolit enim lentes quae in facie apparent: ob quam
sanē facultatem, ventrem non cunctanter fabae
ipsae perineant. Porro si frux fuerint, sicut & le-
gumina omnia, statim quidem deponunt, sed
concoctū sunt difficilissimū, tardēq. praeterunt,
& crassi succi alimentū exhibent. Quae fabae si vi-
rides quidem collectae sunt, postea verō assucca-
tae, ut minus nutriūt, sic deiciuntur promptius.

De Faba Aegyptia.

FABA Aegyptia ut magnitudine, sic insita hu-
miditate, quam nostra, est lōge superior, magnūq.
etiam excrementitia.

De Pisif.

PISA tota subtilitatem cum fabis sunt consimi-
lia, eodēq. modo sumuntur: non sunt tamen
flatulenta vique adeo, nec forniuntur vim deter-
gendi, ideoq. magis in aluo morantur.

Visa aegypti deni-
ciantur quā
fabae.

De Ciceribus.

CICER edulium est non minus flatulentum
quā faba: fed valentius nutrit illa. Ad venerem
autem incitat, creditūq. enām est semen gigne-
re. Abstergit praeterea cicer magis quā faba: sic
ut nigra & exigua cicera manifestē calculos re-
num, vel haereticos, cōmuniunt. Sarius tamen est
succum ipsorum in aqua coctum ebibere.

De Lupinis.

ERVVS lupinus, ac deinde maceratus in a-
qua dulci donec omne insuauitatem exuerit, sic
demum manditur cum garo & oxygaro, vel so-
lū cum sale mediocri conditus. Lupini porro
substantia, dura & terrestis existit: quocirca im-
ple concoctū difficilis sit, succūq. crassum gi-
gnat, et necessarium. Ex quo nō probē in venis
confecto, crudus propriē appellatur succus colli-
gitor. Quare lupinus ipse tardē ac difficulter de-
scendit. In vniuersum autem, ut ea quae hamib-
ra sunt consistentia, exiguum corpori dant ali-
mentum, & quod celeriter in halitus digeratur,
sic dura & terrestia (e quorum numero lupinus
existit) perdurabile, copiosum, & quod aegre ab-
sumatur, arguuntur.

De Foenogracco, quod vniū dicunt.

INTER manifestē calefacientia hoc semen cō-
setur, eundēq. hominibus in cibo vsum prae-
stat, quem lupinus. Praefertim autem ipsum cum
garo, alui subducendū grana, Capus, si sumat
copiosius, sent. Succus elixi foenograci
sumptus ex melle, ad omnes prauos humores,
qui in intestinis habentur, subducendos est con-
modus: suo quidem lentore, leniens calore au-
tem, dolor em mitigans. Quod autem abster-
sionis qualitatē quoq. sit particeps, intestina enām
ad excretionē instigat. Sed parcius mel ei est mi-
scendum, ne mordacitas ipsa exuperet. In diutius
vis verō thoracis citra febrem affectibus, pin-
guedine cui eo quidem palmas elixare oportet:
vbi autē succum ipsum expressum copioso melli
miscueris, ac rursus super carbones ad medio-
crem crassitiem coxeris, tum demum longē ante
cibum eo vti praestat.

De Phaselis & Erniaia.

HAS & quoque semina homines, quo modo
& fenum graecū, prius in aqua, quoad radicem
produxerint, macerātes, ventris subducendū gra-
tia mandunt ante alios cibos, garo intingentes.
Succum autem, cum coctus est, atque in corpus
distribuitur, habent copiosioris alimentū, quā
fenum graecum. Inter ea tamen quae succum bo-
num ac prauum generant, inter concoctū phaselia
& difficilia, tardē & celeriter transcurrit, flau-
lenta & flarus expertia, multum ac parum nutri-
entia, medium sibi vendicant locum.

De Cicerula.

SVECVM habet phaselis & ernialis facultate
quodammodo similem, sed consistentia crasio-
rem: ob eāq. ipsam causam, plus aliquantulo,
quā illa, nutrit.

De Aracis.

SEMEN hoc & vsum & facultate seminī cicer-
culae est simile, nisi quod durius est, & grūtiū elix-
atur, ac proinde in ventre difficilissimum
concoquitur.

Cicer praenocet
venere.

Cicera agra,
calculos renum
frangunt.

Lupinus est ob-
scuro diffusus,
crassusq. in-
cum product.

Lupinus aloni-
tam copiosum,
perdurabileq.
largior.

Foenogracium
calidum, lentū,
atq. dolens mi-
tigar, facultatē
enām possidet
abstergentem.
Foenograci suc-
cum cum melle
diutius elixare
oportet.

Phasilem &
ernialis facul-
tas.

Cicerula va.

Aracum fa-
cultas.

*Dolichus sine
fistula horren
fit.*

De Dolichis, siue Smilacehortenfi.

QUAMADMODUM frumē racea semina spicis, ita memoria legumina siliquis cōtinentur, similiterq; ipsos dolichos silique continent: qui quidem minus sunt flarolenti quā pisā, necnō affluentiū nutriunt, ac celerius etiam descendunt. Ceterū integros ipsos atq; etiam virides vnā cū suis siliquis, ex oleo & garō, vt plurimum homines mandant. Nonnulli etiam vinum adiciunt. Sed eos, nisi prius reficcantur, nō reponunt, propter copiosiores humiditatem, cuius occasione solent corrumpi. In summa verō, dolichus videtur species esse illius plātē, quā hodie phascolum appellant.

De Orobo siue Eruo.

EX VVM infusauisimū est, & prauī succi: quare homines ab eo, nisi in summa fame, abstinent. Vinum autem orobis ipsis cum melle, ceu medicamentis humores crassos thoracis pulmonisq; expurgantibus. Porro inter orobos, albi minus sunt medicamentosi itis, qui ad flauitē, aut pallorem recedunt. Bis coctū, infusauitatem, ac simul detergendi inacidendiq; vim amittunt, ac sic citra insignem amorem defficandi vim possident.

De Sesamo & Erysimo.

SESAMI semen pingue est, ideōq; repositum, celerimē sit oleosum. Quamobrem eos qui ipso vescuntur, celeriter implet, stomachūq; subvertit, vt pinguis omnia, ac tardē concoquitur, pingueq; corpori alimentum p̄bet. Est autem crassi succi: ideōq; non propere pervadit. Ceterū ipso solo nō vique adeo vescuntur, sed cum melle coactū in placentulan. Panibus etiam inspergitur. Erysimum sesamo quodammodo efflamine videtur, sed eo omnino deterius. Vtrumque tamē temperie est calidum, quamobrem sitim excitant.

De Papaueris semine.

SATIVI papaueris semen, panibus vtiliter ceu condimentum inspergitur: est tamen album nigro præstantius. Refrigerandi autem possidet facultatem, ideōq; somniferum est. Quod si sumptum liberalius fuerit, soporem etiam inducit, atq; coquitur ægrē. Inhibet præterea quæ expulsiōne ac thoracis fluxu expiuntur. Confert verō itis qui catarrhis fluxu tenui ac capite defluentiūbus insistantur: corpori autem multā comē morabile alimentum præstat.

De Liu semine, quod Linospermon vocant.

STOMACHO noxiū est, & coctū difficile, exigūdq; alimentum corpori exhibet: modicum tamen mouendæ vrimæ possidet facultatē: quæ magis apparet, cū fraxum sumitur. Tūc autē magis quoq; aluum sitit.

De Ormino, vulgō Gallitricho appellato.

PARVM in seipso habet alimēti, vt quod medicum inter erysimum & cuminum nature existat.

De Cannabis semine.

HOE semen concoctū est difficile, stomachūq; & capin nocet, ac breuiter prauum succum producit. Multum autem calefacit, ideōq; sumptum paulō largius, caput ferit, vaporem suū ad ipsum mittens, calidum simul & medicamentosum.

De Vitici, siue Agni casti semine.

TD semen etiam per se fraxum manditur, crediturq; appetitus inlubere venereos. Alimētum autem corpori præbet exigū, idq; siccan refrigeransq;. Flatus autem valde dissipat: quorum omnium occasione, us qui a venere puros seferuare conantur, est accommodum.

De Aphace & Vicia.

HAC legumina non infuauia modō, sed concoctū etiā sunt difficilia, aluūq; inhibent: quare alimentum haud boni succi, sed crassum, atq; ad humorem melancholicum gignendum, idoneum exhibent.

De semibus alienigenis, quæ in quocq; genere permixta reperiuntur.

IN tritico quidem frequē lolium reperitur: in hordeis etiam, sed paucum. Quam autem ægilotem vocant, ea in hordeis frequē inuenitur: sicut in lente ararum, & securinum, & planta illa, quam aparinem dicunt, quæ ipsam lentē strigulat. Melampyrum autem nuncupatum ex tritici quoq; mutanone gignitur, sed prauitate quā plurimum a lolio relinquatur. Non igitur oportet nos in purgandis seminibus, quæ ad eum cōparantur, esse negligentes: persualos, etiam si noxam quæ quondam sit, ob exquisitam sensū non percipimus, quod tamen longo tempore ex ipsa ueretur, tandem erupturum.

GALENI PERGAMENTI de alimentorum facultate, liber secundus.

OMNIA edulia, quæ primo libro fuerant commemorata, planarum erūt semina, exiguum quiddam a fructibus discrepantia: nunc verō de fructibus a gere instructo, in quo rum visceribus reperiuntur & alia semina, quæ ab ipsis fructibus maxime discedunt: cuiusmodi sunt quæ in ficibus, vuarum acinis, piris, ac denique aliis planarum fructibus, vt cucurbis, peponibus & melopeponibus, licet cernere semina. Ceterum in fabis, lupinis, dolichis, lentis, & aliis id genus seminibus, quæ siliquis obvoluuntur, quod quidem ex siliqua semineq; est cōpositum, ipse fructus existit. Plurima tamen substantiā pars in seminibus inest. Porro aliorum propemodum omnium, quæ primo memorauimus libro, semen dumtaxat manditur: solius autem dolichi, dum adhuc viretur, fructus integredur. Vnde veterum nonnullos arbitror sub phascolorum nomine dolichos comprehendisse.

De fructibus fugacibus, quos Græci
apidos nuncupant.

HOC AMENI, Græci id tempus appellant, in cuius medio canaliculā exoriri coningit. Tempus autem id dierum est quadraginta: quo tempore omnes liorani (quos vocant) fructus, consistunt, vt cucurbite, mora, pepones, melopepones, persica, & consimilia. Vocant autem ipsos horarios, quod eos ab us qui ad reponendū idonei sunt, distinguunt. Corruptantur siquidē facile, nec probe asseruari queūt, quemadmodum cerealia

Vitex.

*Agni casti sem
statim desiccatur,
quo nomine et
est vitreum.
Aphace,
Vicia.*

*Lolium.
Ægilotis.*

*Ararum.
Securinum,
Aparine.*

*Melampyrum.
Semina quibus
viscerum, esse
distinguitur per
ganda.*

*Prostatum
seminum.*

*Dolichus est si
mal cū siliqua.*

*Mora quod it
pon emus dica
tur.*

*Horarios fru
ctus corrupti fa
cile, ægrè as
seruari possūt.*

*Sesamum sub
necit flama
chum.*

*Sesamum cras
si succi.*

*Sesamum cum
melle in placen
tulas coquitur.*

Erysimum.

*Sesamum cal
facit.*

*Papaueris sem
in modū poma
ficæ panib.*

*Papaueris se
mitates inspi
gues.*

Linospermon.

*Liu semen nō
dicit vrimē mou
ere.*

Orminum.

Gallitrichum.

*Cannabis si
men calidū est,
aspitq; surit.*

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

cerealia omnia. Nonnulli tamen è cucurbitis
semen vacuantes, dein earum velut carnē sicca-
tes, in hyemem reponunt. Porro quæ corpus ha-
bet cōspactum, ea vè permanent, sic solidam,
terream, multum nutrimenti substantiam possi-
dent. Quæ verò cōsistentia sunt humida, corrumpuntur, exiguumque habent alimentum, & quod ex-
cernatur facile, potissimum cum nitrosum quipi-
am ipsis inest, ac deterget de facultatibus. Talia sa-
ne deterioris succi esse perhibemus, quæ ne-
lam saporis qualitatē habent sensibilem, quo-
modo aqua optima nullam habet. Hæc igitur om-
nia, & his multo magis quæ ante exactam tri-
turitatem mandimus, statulenta quidem sunt, ve-
rum subducuntur celeriter: quemadmodum etiam
quæ succum habent tenuem, citius distribuitur.
Sunt autem omnia hæc pravi succi, solidius is vi-
liter ipsis vteretur, qui xtu vehementiore, & longi-
giore innere se se obfecerit: tunc enim insant, cor-
poris squalorem humectant, & si frigida sumat-
ur, moderatè refrigerantia. Etenim humectan-
di quidem semper habent facultatem: refrigeran-
di verò nequaquam, si calida, sic vè dixi affectus,
fuerint comesta.

De Cucurbita.

Cucurbita quidem insuavis est, cōcoctūq; dif-
ficillima: stomachi lædē, nisi vomitione redda-
tur. Hanc igitur & alia fugacili perag, aut post-
eixa fuerint, aut statim cernit, aut in sartagine fri-
xa, aut asia, omnes homines esse consueverunt.
Siquidem cucurbita elixa, profusa insipida est:
quod circa multos apparandi modos admittit, ut
quæ in medio omnis excessus consistat, ubi id-
quævis excessum ex æquo duci queat: ac
proinde illis quibus mista fuerit, assimilatur. In
verò cucurbita, quantum in se est, humidum fri-
gidūq; & ob id exiguum corpori alimentum
præbet: facile tamen descendit. Sed neque co-
quatur ægre, si modo prius corrupta non fuerit: id
quod interdum ei, ut aliis omnibus humidis, si-
mulac fugacibus accidit, si diutius in ventriculo
hæreat. Asia autem vel frigida in sartagine, quam-
plurimum quidem de propria humiditate dep-
nit. Cæterum ob æqueam sibi qualitatem innatam,
merito gaudet origano.

De Peponibus.

UNIVERSA Peponum natura frigidior est,
cum humiditate copiosa. Habent autē vim quan-
dam abstergerendi, cuius beneficio vrinam cernit,
& deorsum expeditur quæm cucurbita, melope-
ponēq; permeant. Semen autē potentius quæm
ipsorum veluti caro, deterget: adeo vè ad versus
renes calculo infestatos conveniunt. Succum ta-
men in corpore gignit vinosum, idy potissimum,
cūm cōcoctum præbē nō fuerit: quo casu diox-
leræ morbo obnoxios consuevit efficere. Quin-
etiam pruriguem corruptum fuerit, ad vomitum
quoque est idoneum, præcipue si largius sumat.

De Melopeponibus.

Melopeponis minus quam pepones sunt hu-
mide, nec adeo pravi sunt succi. Minus item
vrinam movent, tradidit deorsum descendunt.
Ad vomitum præterea excitandum, non tan-
tum, quamvis pepones, habent momentum, nec
adeo celeriter in ventriculo corrumpuntur, et si

in iussu eo, aurum nallibus fructibus longe sint
inferiores.

De Cucumeribus.

VRINAM quidem & ipsi, quomodo pepo-
nes, cernit, minus tamen quam illi, quia ipsorum
substantia minus, humida est, idcirco non facile,
ut illi in ventriculo corrumpuntur. Invenias au-
tem qui ipsos concoquant, ob naturam cum vis fa-
milliaritatem. Siquidem à roribus substantiæ pro-
prietate, suis cuiguanimantium generibus est
familiaris: ut coturnicibus quidem elleborus,
sturnis autem cicuta. Cæterum quibus biliosus
humor, aut omnino pravius excrementū quod-
vis, in ventriculo sepe congenerit, in his quæ na-
tura cōcoctū facilia sunt, celeriter cōtrumpun-
tur. Quod si quispiam eorum aliquid, quæ cæte-
ris cōcoctū sunt difficilia, concoxerit, succus
tamen quæ ex eo in corpus distribuetur, eandem
semper retinebit naturam. Quare omnibus pravi
succi edulsi tunc: abstinendum, etiam si ea
quibusdam esse cōcoctū facilia videantur.

De fructibus quæ ab arboribus col- liguntur.

Ex fructibus quibus vescuntur homines, hu-
midi quidem, tenues humidūq; corpori alimen-
tum præbent: quod ob id per corpus celeriter
permeant, exterminantur tum per cutem, tum per v-
rinam. Consistentia autem solida, ut alimen-
tum copiosius exhibent, sic etiam ad permeandum
tardius.

De Ficibus.

Fit v s quanquam pravitatem non potuerunt
omnino effugere, facile tamen torum cor-
pus pervadunt. Nam & abstergerendi quoque in-
signem obtinent facultatem: quo fit, ut post ip-
sorum edum, nephritici arenulas multas excernant.
Nutrient præterea vberius cæteris autum-
nalibus fructibus: stantibus tamen hæc quoque
implent. Atque sicis profusa iam maturæ sit,
propemodum nihil omnino lardum, quomodo
nec carica, quæ multiplicem quidem præstet vi-
talem: si quis tamen largius eas esitauerit, of-
fendetur ab ipsis, quandoquidem sanguine non
admodum probum gignunt. Quo fit vè ex ip-
sorum usu pediculorum multitudine proveniat. Ha-
bent etiam tenuandam facultatem, & incindi-
di, quæ ventrem quoque ad excrationem irritant,
renesque expurgant. Cæterum icteri, liechis inflam-
matione obiectis sunt noxi: quemadmodum &
sicis; cōmuni omnium dulcium roborem ac po-
tatem ratione. Obstructis tamen illis, aut scirrho
affectis, ipsæ ex se nihil cōmodant, nec officiū:
sed medicamentis incidentibus, exterminantibus,
& abstergentibus mistæ, non mediocriter iuvant,
tum carica tum ficus.

De Vitis.

Ficus & vitæ quantadmodum inter autu-
males fructus principatum obtinent, læa fuga-
cibus omnibus magis nurrunt, minimūq; pravi
succi habent: laxam tamen carnē ac præhumidam
gignunt, ob idque celeriter succedunt. Verū
vitis minus alunt quam ficus, maximūq; illi
ipsis inest cōmodum, quod descendunt veloci-
ter. Quocirca si quidō hæserint, grauius lædunt,
quam id minimè magis sicobus insit. Etenim

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Aqua optima
nullam gignit
qualitatem
sive.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

Cucurbita quæ
modo reponitur
in hyeme.

At largius sumptus mordet stomachū, caput cal facit: ob idipsum nonnunquam replet infestisq; doloribus: ventricūq; nec prouocat, nec colubet: vrinās tamen mediocriter vacuat.

De fructibus Cedri.

Cedri baccarū facilis.

FRUCTUS cedri, fructū iuniperi est similis, nisi quod eo est durior, siccior, exilior & acrior, nihil, vrille, aromaticū habens. Quare nisi quis ipsum aqua præmacerauerit, nullum corpori ali mentum præstat. Valde autem stomachum mor dicat, capitūq; dolore infert, nisi quis ipsum par cissimè sumpserit.

Strobilus. Nux pinea.

De Nuce pinea, siue Strobilo.

SVECT boni est & crassi, multūq; nutrit, nō tamen facile coquitur.

De fructu Myrti.

Myrti fructus cū astrictione est acris.

MYRTI tenuiter, astringitūq; valenter, atq; ob id alium sinit. Ceterū astrictioni habet quan dam acrimoniam admiſſam.

De Persiciis.

Persici cū non sunt post alium cibum melleis.

CORRUMPTITUR horū sum succus, cum ca ro: præcipue omnino sunt. Quare nō sunt post ali os cibos mandenda (alioquin corruptū pūtur, in superficie nantia) sed in primis mensis, vt cete ra quæ & mali sunt succi, & subdici facile queūt.

De Armeniacis & præcocibus.

Armeniac.

HÆC quoq; ex genere sunt persicorum, bon itate nōnihil ea superantia. Neg enim in ven triculo corruptū pūtur vrilla. Neg etiā acēscunt: vulgo autem suauiora apparent, vnde etiam sum macho sunt gratiora. Præcocia tamē Armenia cis præstant. Porro ventriculus, quæ deorsum quidē vergunt, ex molestantibus, ea per alium expellit. Quæ verō supernatant, per vomitū eiicit.

De Mālis.

Mālorum disse rentia atq; suau itas diuer sa.

MALA quidem quæ astringunt, succum ha bent frigidū atq; terreū. Quæ verō acida ap parent, frigidū simul atq; tenuiū partium. Medie autem temperaturæ sunt dulcia, quæ tamen ad calidius vergunt: vt ea quæ omnis sunt quali tatis expertia, & veluti aquosa, ad frigidus incli nant. Porro hæc tria saporū nomina, astringens, austerum, acerbū, qualitatē quidem v nam significant. Acerba tamen valentius auste ris astringunt. Austeris igitur potius vtrius, cūm ventriculus, vel propter calidam intemperiem, vel multam humiditatē, est imbecillus: acerbis autem, cūm duo hæc acida admodū fuerint: aci dis, quando de succum crassum, qui non magnop re frigidus sit, suspicaberis esse in ipso collectū. Quando quidem succus frigidus, non acida, sed acia postulat. Vtrūq; certē & acida & acia, suc cos crassos incident: sed hæc quidem cum cale factione, illa cum refrigeratione alui præstant. Iam verō astringentia quidem alui deiectiones per petuo cohibent, acida autem cūm succum cras sum in ventre offenderint, incident ipsum, atq; deorsum trudent, ob idly deiectiones hume ctant. Quod si purum ventrē inuenieris, ipsum magis sitūre. At succus dulcis, cūm purus & per se fuerit, distribuitur celerius: si verō acrimoniam aut crassitiem sortiatur, citius subducitur. Est & aliud succi genus, non pomis modō, sed ceteris omnibus, æqueū & qualitatē expers, quod in

medio memoratarum facultatum, quemadmo dum aqua ipsa, confrāit. Optima pomā (quæ col ligi ante maturitatem non debent) sæpe in mor bis maximū præsidium afferunt, vel caraplasma tis modo cum farina admota, vel in calidis cine ribus mediocriter assa, vel in aquæ bullientis va pore percocta. Ceterum post cibum statim dare ipsa cōueniūt, qui deiectionē vtri appetentia, tar deq; concoquant, aut vomini, diarrhœa, & dy senteria infestantur. Sed in huic vsum acerba sunt commodissima.

Qui fiat vt poma aut pira astringentia, ventrem quibuscumque laxent.

VBI post ea quæ fluida & lubrica sunt, astringe nna sumuntur, in iis possimū quī stomachū imbecillum sortiuntur, deiectionē ipsam accele rant, ventriculūq; roborantia, & ad expellendū deorsum, quæ in sese continet, incitantia. Quod si prima omniū astringentia ingerantur, ac dein quæ pinguiora & magis fluida existunt, os qui dem subuertetur vtriculi, alius autē ipsa firma bitur: quod in Prota Rhetore, vñ & experientia explorari. Quamobrem vbi pallida bilis, aut alius quipsi humor ventriculū turbat, si is qui sic est affectus, aliquod astringentū gustarit, repentē deorsum succum infestantem euectet.

De Cydoniis & Struthomelis.

HÆC pomis eximium quiddam, quod in aliis non inuenitur, inest. Nam præterquam quod a strictionē possident copiosiore, succus etiam eorū diu permanet, si quis ipsum cum melle co ctum afferuerit: cūm aliorum succus si reponatur, acēscit, qd exuberantem humiditatem. Quociens ad exolui ventriculū robur vñ succo illorum solemus, ita vt monui, confecto. Sed ex carne ip sorum & melle placeat quædam parantur pro digiosis perennitatis. Nos verō medicamini ad ex eorum succo & melle conficimus, nonnihil pip eris albi, zingib eris, atq; aceti miscemus.

De Piris & Puniceis.

QVAT de maloerū differentis diximus, si ad pira puniciq; trāstuleris, nihil erit quod nos de ipsis dicere oporteat. Pirorū igitur vñus, pomorū vñus est similis. Punica verō, ceterā quidem sunt similia: in eo tamen discrepant, quod vnu quam cum hordei farina assentur, nec in aqua aut vaporibus elixentur. Succum autem habent piris & pomis tum copiosiore, tum gñtu suauiorem, interdūq; enām vtrius: vitpura dum cardinalia, hoc est, mordacior oris vtriculi, in festat. Cūm autem minimi nutrimenti sint puni ca, nunquam ipsi cū alimento, sed tantum vt medicamēto egeant. At pira aliquanulū nut riūt. Quibus quidem in tenues orbes dissectis, & exicatis, ac postea tandem elixis, hyeme & vere, vice ciborum vtuntur.

De Mespilis & Sorbis.

AMBO enim astringunt, verū mēspila multo valentius quā sorba: proinde ventri fluenti ci bus est, cōmodissimū: sorba tamen in cibo ipsis sunt suauiora. Quamvis neutro ipsorū vt nutri mento, sed tantum vt medicamento, egeamus.

De Palmæ fructu, quem phœnicem, dacty lum, & palmulam vocant.

PALMVLARVM aliz quidē sunt siccæ, astring

Mala quidē es quibus offensa debent.

Mala acerba quibus sunt cōmodissima.

Astringentia si quidem fuerint tō post fluida, deiectionē aue lantia cū vñ laborem præstent, alium contrahunt.

Cydoniorum fructu deo rimo succum, duo cum melle assentur, formam exolui ventriculi fructu dunt, Diacritum vñus appella tur.

Pirum vñus, quale maior.

Punicorum ma leum. Succum cardinalia esse vñem.

Pira quicquidē vñem.

Mēspila. Sorba.

Punice. Dactylus. Palmula.

Vandorem co-
citur dolorem
capitis.

Comari fru-
ctus.

Coffeana.

gonij industriam proveniunt, ut fagus, quercus,
ilex, cornus, comarus, rubus, canthabus, acherus,
pirus, atq; agrico cymelus, cuius fructus ap-
pellatur in Italia vnedo, stomachoq; nocet, &
capitis dolorem concitat: estq; acerbis cum ex-
igua quadam dulcedine. Porro glandes aquæ nu-
trunt, ac frumentaceorum eduliorum pleraq;
Alimentum autem quod ex eis sumitur, tardi est
transitus, & crassius fuit: ob idq; sumit concoctus
difficiles. Cæterum Comari fructus: *peribara* 10
appellatur, glande quæna ad omnia est deter-
rior: quemadmodum hæc glande, quam vocant
castaneam.

De alimento quod à plantis ipsis agre-
stibus sumitur.

Non modò plantarum semina & fructus, sed
etiam integras ipsas sæpenumero mandimus:
idq; aut virgæ necessitate, aut etiam suavitatis
gratia. Si quidem palmæ verticem edimus, nec-
non renellas spinas, aut elixas, aut crudas, vel si
ad id fame adacti non sumus. Cæterum omnia
id genus & paucissimi nutrant, & pravi succi
sunt productura. Quædam etiam ex ipsis, noxam
ventriculo adferunt, præter spinas, quæ nunc pri-
mam è terra emergunt.

De Lactuca.

Hoc olus succi est, quàm alia omnia, lauda-
bilioris. Nam quum reliqua omnia sanguinem
gignant paucissimum, ac pravi succi, lactuca nõ
multum quidem generat: id tamen nec mali suc-
ci est, neq; omnino laudabilis. Porro dum essem
iuuenis, ventriculus mihi infestaretur bili, lac-
tuca, quò ipsum refrigerarem, utebar: quum ve-
rò ad ætatem declinante perveni, hoc ipsum
olus fuit mihi contra vigilas auxilio, quæ senis-
bus esse annexæ videntur. Habet itaque lactuca
succum quidem frigidum atq; humidum, mini-
mè tamen pravi. Quare nec concoctioni resi-
stet, nec penne de reliqua olera, ventrem cohi-
bet: sicvi neq; etiam præiorat.

De Scir, siue Intybo.

INTYBI facultatem habent lactucis similem:
suavitate tamen & cæteris quæ lactucis insunt,
ab eis relinquuntur.

De Malua.

DISSIDENT agrestis malua & fatiua, quod
hæc quidem humiditate, illa siccitate exsuperet.
Virag autem calorem habet moderatum & re-
pidum, faciliq; subducitur, non modò propter
humiditatem, verum etiam propter lentorem, præ-
sertim si cum oleo & garo, copiosa ipsa ingerat-
ur. Nutrit tamen mediocriter.

De Beta.

SVCCEVS betæ abstergendi vim adeò manife-
stam sortitur, ut ventrem ad excernendum exci-
tet, atq; stomachum mordicat, præsertim quibus
sensu exactiori est præditus. Ob idq; edulium id
est stomacho noxium, si largius sumatur. Corpo-
ri autem ab ipsa, ut ab aliis oleribus, paucum ali-
mentum accedit. Verum obstructù hepar magis 60
quàm malua aperit, præcipue si cum sinapi, aut
saltem cum aceto mandatur. Lienosis item eo dè
modo sumpta, vñle medicamentum existit.

De Brassica.

BRASSICÆ quidem succus purgatricè pos-

siderat facultatem; estq; non probus, ut lactuca,
sed pravius graueolensq;: at corpus, cõmuni sic-
cantium ratione, magis siccit quàm laxat. Quare
dum humentem alium reficere est consilium,
brassica ipsa discocta in secunda aqua donec ex-
turbescat, vitetur. Quippe nihil quod accurate co-
quatur, propriè succum seruare omnino potest:
sed necesse quidem est ut totù abiciat, si coctum
diutius fuerit. Quin & lentculi diximus eo dem-
quo brassicam modo, oportere parari, ut quæ
vtrumq; possit efficere, ventris subductione scilicet,
& colubitionem. Cæterù nihil ex his quæ bis
coquuntur, ærem frigidum, aut frigidam aquam
atingat, alioquin non exturbescit: sed oportet ca-
lidam in promptu habere, ut cum ex priori ex-
traxeris, pronitus in illam conicias. Lens itaq;
& brassica, æquali inter se mensura siccant, ob
idq; visum heletant. At lens quidem, non exi-
guum corpori alimentum præstat, idq; crassum,
& melancholicum: brassica verò paucum habet
alimentum, verum quàm lens humidius.

De Atropice & Blato.

HÆC sunt alius olentibus aquosiora, nec non
qualitatis expertia magis quàm cucurbita, aut
saltem non minus, cum cocta videlicet fuerint.
Quo fit, ut non ex solo oleo & garo ipsa man-
dant, sed acetum etiam inuiciant: alioquin sunt sto-
macho noxia. Corpori porro alimentum præstant
exiguum, nonnullaq; ad deuotionem inclinant.

De Portulaca.

NYTRIMENTVM exiguum exhibet, idq; hu-
midum, frigidum, atq; lentum. Quo sanè len-
tore suo mordicationis experti, stuporem den-
tium perisat.

De Lapatho, quod licet appellare be-
tam agrestem.

Non gustu modò, sed viribus etiam betæ hor-
tensi est persimile. Quia tamen betæ lapatho est
suavior, idcirco nemo est, qui ipsa non libentius
velcat.

De Oxylapatho, siue Rumice, siue
Lapatho acido.

MYLIERES, ruiticæ laborantes pica, nec non
pueri quidem gulosi, oxylapathum crudum in-
terdum mandunt: quod quidem olus non uir-
trit multò magis quàm lapathum.

De Solano, siue Solatro, siue Morella.

RARo ipso vnum ut alimentum: ut medica-
mento autem, assiduè. Efficax enim est in us, in
quibus astrictionis refrigerantis vius incidit. Mi-
nimè autem est nutrimentum.

De plantis spinosis.

PLERIQUE rusticorù plantis huiusmodi è
terra nuper emeris, priusquàm ipsarù folia desi-
nant in spinas, viciuntur, non crudis modò, sed
in aqua etiam elixis: crudas quidem aceto & ga-
ro intingentes, coctas verò præter hæc affundentes
oleum. Mediocriter enim iuuant ventriculù,

De Cinnara, quam Romani Caccopham,
Galli Archiao vocant.

PRAVI succi est edulium, maxime cum plu-
sculum obduerit. Tunc siquidem ex ea succus
melancholicus: ex ipsius autem succo, tenuis ac
biliosissimus gignitur. Quare longè satius fue-
rit ipsam elixam, aut fixam mandere.

R 3

Brassica dysen-
tica.

Lentculam al-
ium solvere so-
let.

Lens brassicæ
que vnum be-
tænti.

Atropice.
Blatum.

Portulacam sa-
rare stuporem
dentium.

Lapathum.

Oxylapathum.
Rumice.
Lapathum
acidum.

Solanum.
Morella.
Morella astrin-
git, refrigerat-
que.

Planta spinosa.

Cinnaram
pravi est succi.

Olera omnia
agreste pauci-
ssimum sangui-
nem, pravi-
succo, excepta
lactuca.

Lactucam re-
frigerare, & se-
miferam esse.
Vigilias esse co-
gatus facibus

Seris.
Intybum.

Malua utroq;
facultatibus.

Betæ succi in-
fignæ exteriori
facultate esse
præditum.

Brassica succo
quod purgat,
corpus enim
magis sistit,
quàm laxat.

*Apium.
Pterofelinum.
Sion.
Smyrniacum.*

*Smyrniacum habet
et magnam pro-
prietatem hanc.*

Hippofelinum.

*Cibus infanti-
bus magna ex
parte in causa
est, quo muni-
cinalis ipsum
confusum.
Conditio co-
queris plus in-
terdum infanti-
quam proficiat.*

*Eruca facilius
credunt fieri
matrici.*

Acalyph.

*Vitula alium
dicitur.*

*Gingidivum
beandix.*

*Ocyum.
Basilicon.*

*Paracelsus olim
etiam in tota
antennae repen-
ditur.*

*Asparagus com-
muniter dicitur
omnes tenues
caules, quo tem-
pore ad feminam
proprio hauriunt
augescant.*

*Asparagus dicitur
ferum elerum.*

De Aplo, Hippofelino, Sio, & Smyrni.

Hæc omnia vinas cicut: arer que apii est
vitarisimū, & iuzue, atq; homaculo gratum. Pe-
trocinum autem, & Sion, insuauora. Smyrniū
verò non est insuatum. Siquidem Roma maxi-
ma copia manditur, acruisq; multo est quina-
pium, necnō calidius: præterea stomaticū etiam
nōnnulli possidet. Proinde vinnæ valentius pio-
vocat quam apura, quāvis Hippofelinum &
Sion, mensēq; mulieribus mouet. Cæterū Hip-
pofelinum ipsum & Sion, cocta mandunt, cum
vinnis ipsorum crudum sit insuare. Nam tam-
etū nos vilitatem que ex cibus proventit inspec-
tus, non voluptatem, quia tamen est insuauis-
tas magna ex parte causa est, quo minus ipsum
nonnulli conficiant, ob id iuniorum satius fuerit
cibus con dare iuterum mediocriter: non ut co-
qui faciant, eodem entra quorum plus interdum
concoctiōni obstant, quam proficiat.

De Eruca.

Hoc olus manifestissime calfacit, semēq; gi-
gnere creditur, & coctum excitare appetitum.
Capin etiam dolore infert, præsertim si quis
ipso iolo vescatur.

De Acalyphæ, sine Vitrica.

TANVIVM est vinum & partium: vnde ne-
mo ipsa vltimēto vtitur, nisi fame extrema pre-
matur. Vtilis autem est, vrobosonium, ac medica-
mentum quod alium deicit.

De Scandice, Giugidio, quod Chæ-
resolium vocant.

GINGIDIVM non aliter q̄ scandix manditur
apud nos, stomachūq; admodum iuuat, colla-
psūq; illius appetitum, si cum aceto sumatur,
excitat, siue elixum siue crudum mandere velis.
Elixanonē tamen diuturniorem nō tolerat. Est
porro non tam alimentū, quā medicamentū,
attributionē & amarorē nō mediocrem sortitur.

De Ocyro, quod vulgō Basilicon vocant.

Hoc olus ventriculo exulit noxium, præuiq;
succū, & concoctū difficile.

De Feniculo.

ASSIVVS vtuntur antio quidem in condi-
mentis, feniculo autem etiam in obsoniis. Nam
apud nos sanē reponunt ipsum, eodem modo
quo pyrethrum & terebinthum, adeo vrin ro-
rum annum sit vtile.

De Asparagi.

OMNES propemodum Græci, teneros cau-
les, quo tempore ad fructus ac feminis produ-
ctionē augescunt, asparagos cōmuniter vocant.
Brasice igitur germen, minus q̄ brasica ipsa sic
cattamētū aliorū olerum calidū temperatura sit
vltimum q̄ folia ficiōre: vt atriplex, lactu-
ca, blin, betæ, malagē. At radicū asparagus, si-
cū & rapæ, sinapi, cardami, pyrethri, & omniū
propemodum acū & calidiorū, humidiorū exi-
rit. Bulbus autem, apium, sion, eruca, ocyum,
oxylapathum, lapathum, & omnes oleracei ge-
neris herbæ, antequam semen effundant, eiusmodi
de caulem quandam producunt, qui post semen
effusum siccatur, sitq; ad cibum hominibus vti-
lis. Hæc autē omnia aqua mcocta mandunt cum
olyo & garo, panco aceto adiecto. Alimenū ta-
men paucum dant corpori, neq; id boni succi.

De alio genere asparagorum.

QVI asparagi in oxymyrine, chamædaphnæ,
oxycaurtia, & bryonia proveniūt, ac tum is qui
regius, tum qui iunior vocatur, omnes inquam hi
stomachū iuuat, vrināq; cicut, ac parū nutrit,

De germinibus.

ARBORVM ac triticum germina, olerum a-
sparagos proportionē respondent. Quæ quidem
omnia aq̄le in coctis in aundantur, præter insua-
ua quædam ac medicamentosa. Quibus etiam
virgine fame, holmues velt toguntur. Omnia
tamen præstantissima sunt, terebinthi, viticis, vi-
tis, iunici, rubi, & canubii germina.

De discrimine quod partibus plantarū et
esculentarū inest.

NOXEST autem Mneſitheus audiendus, vbi ait,
radices omnes concoctū difficile esse, longēq;
ipsis foliis crudiores. Radicū siquidem, radi-
cem habent caule ipso, ac foliis acriorem: imi-
ter cepa, ampeloprasum, porrū, & allium. Quid
si betæ quorū, & malurū, & rapæ radicē coptare
ad folia volens, plus vitiū in ea deprehendit:
quemadmodū & in alieis, quæ egreditis quædā
esse maius videntur. Nā radix ipsius, vt & betæ, cū
tumores multos pruritoſos discit, id quod foli-
a præstare nequeūt planē facultatē suam indi-
cat. Etenim quod in radicibus, ad genus probē edite
est non fuerit, in foliis & caulem ipsa natura ex-
cruis: vt tacere videntur enā in ceruis, totus sub-
stantiæ extremēta, ad gignēda cornua, minime
necessaria transiunt. Intus itaq; est, gūstātē
prius atq; olacientem, huiusmodi plantarū partes
ipsis per se explorare: post autem experiri in an-
dentem: quādo quidem olacit & gustus, om-
ne ipsius plantæ temperamentum ostendunt.

De Rapæ sine Bulbade.

DVRÆ quidem est, minimeq; esculenta, nisi co-
quantur in aqua autē cocta non nutrit minus cō-
generibus aliis. Succū autē in corpus distribuit,
mediocriter calidiorē, coctionēq; diuturniorē de-
siderat: atq; illa vniū cōmedantur, quæ bis cocta
fuerit. Quod si crudior sumatur, coctū difficile
lior, & insulenta redditur, stomachūq; noxia.

De Aro.

MANDITVR & huius plantæ radix eodē mo-
do quo rapæ. Cæterū dum ipsam coquis, priore
aqua effusa, in aliam calidam, eam coñcere con-
venit. Quæ autē acrior & medicamentosior exi-
rit (qualis in nōnullis regionib. crescit) ad elicē-
dos rasis crassos pulmonis succos est præsertim.

De Draconio.

HVIVS quoq; radicē bis tēre elixātes, quō-
ad medicamentum omne posuerit, nōn unquā
exhibemus mandendam: quemadmodū & ari,
quando humores crassi & lenti, qui in thorace
ac pulmonibus habentur, vi maiori indigent. In
vniuersum autē, acra quidē et amara si edantur,
corpus parcius nutrit: insipida autē, & is ad-
huc magis dulcia, multū, & multo magis, si com-
pactam adhuc habeant substantiam.

De Asphodelo.

RADIX asphodeli & magnitudine, & figura,
& amarorē, scilicet radicis quodammodo est similis:
facultatēq; habet tenuandā, atq; aperiti. Si ta-
men, vt lupini, paretur, maxum huius arboris
partem

*Asparagi iunior
et vrinā, quinam fiat.*

*Arborū & fru-
tū germina.*

*Radices caule
& foliis acri-
ores, quæ sunt.*

*Radices al-
tieis, & betæ,
discit prurito-
ſos humores,
quod non do-
cet ipse carui-
dote.*

*Crassus total
substantia ex-
tremis ad ge-
nenda cornua
transiunt.*

*Plantarū tem-
peramentum
elicet ab effu-
ſa ex gūſta-
rapæ.*

Arbor.

*Draconis
viti.*

*Nutrit corpus
qua parcius, et
qua vbius
posuit.*

*Asphodeli radi-
cis figura.*

partem deponit: scilicet autem qualitas difficillime eluitur.

De Bulbis.

BULBUS quoque eiusdem cum prædictis est generis: mandatur enim ipsius radix sine foliis: veterem autem, interdum & asparagum. Facultatibus habet in se amarā & austeram, namque insignem: unde etiam stomachum exoluit, ad appetentiam quodammodo excitat. Cæterū si bulbi elixi fuerint, magis quidem nutriunt: veniunt enim a maiorem omnem iam deposuerint, adversabuntur eis, quæ spūto sunt eienda. Quidam ex ipsorum esu liberaliore, semen sibi in auctum, seque ad venerem alacriorem manifeste senserunt. Alimentum porro dant mali succi, nisi probe coquantur.

De Pastinaca, Dauco, & Caro.

Pastinaca.

HORVM quoque radices mandantur: minus tamen quàm rapæ & arum Cyrenaicū nutriunt. Calefactum autē insigniter, aromaticū quoque nonnulli ostendant: consuecendi tamen difficultas eis inest. Vrinam porro cient: & si quis eis copiosius utatur, mediocriter vitiosum succum producit. Cari tamen radix melior est succi, quàm pastinacæ. Sunt qui pastinacam agrestem appellant daucum: qui vrinam quodam mouet potentius, sed medicamentisior existit.

De Tuberibus.

Tubera.

HÆC quoque radicibus aut bulbis annumeranda sunt, vt quæ nullam qualitatem habent insignem: crassum autem alimentum largiuntur.

De Fungis.

Fungi.
Boletus.

EX Fungis quidem boletus, si bellè in aqua fuerint elixi, propè accedunt ad insipidos cibos. Alium autem ex ipsis est pituitosum, frigidum, prauis succi. Omnium tamen ij minimum noxi existunt. Secundi autem post hos, sunt amanitæ. Reliquos vero omnes tutius est ne attingere quidem: multum enim ex ipsorum esu interierunt. Cæterum quibuslibet per se, & cum hyssopo & organo, oxybus niri summa fuerit insipera, si propinetur, auxiliatur eis qui ex fungorum esu habent pessimè.

De Radicula.

RADIX eius exis est quibus assidue vescimur: estq; obsonium magis quàm alimentum: nimium quæ & ipsa cum manifesta calefactione attenuandi facultatem sortitur, nam qualitas acris in ipsa superat. Sed causalis eius elixus magis nutrit quàm cruda radiculæ: paucissimum tamē & ipse alimentum præstat. Mirari autem subit eos medicos & idiotas, qui non sine multorum incommodo, post cenam crudas eas esuandas tradunt.

De Cepis, Alliis, Porris, & Ampeloprasis.

CORPVS calefactum, & qui in ipso sunt humores crassos attenuant, lentioris incidunt. Si cocta autem his trivæ fuerint, acrimoniam quidem deponunt, tenuant tamen adhuc, & alimentum corpori dant paucissimum: quod certe priusquam elixa essent, omnino non dabant. Cæterum allium quidem mandit non vt obsonium, sed vt salubre medicamentum, quod digerendi, & obstructions aperendi habet facultatem: si elixum parum fuerit, vires quidem imbecilliores, succi autem prauitatem non amplius retinet:

quemadmodum nec porra, nec cepæ, quum elixas fuerint. Ampeloprasia verò tannum à porris discedit, quantum in aliis omnibus congeneribus agrestia à domestica. Abstinendum autem ab assiduo vīu omnium acutum est, præcipue iatura biliosus. Solis enim qui vel succum pituitosum, vel crudum & crassum ac lentū acervant, eiusmodi cibi expediunt.

GALENI PERGAMENI de alimentis, lib. III.

De alimento quod à gressilibus animalibus sumitur.



ARTS S animalium omnes non eadem facultate sunt præditæ: sed carnes quidem, cum probe elixæ fuerint, optimum gignunt sanguinem, & ponsissimum, si ex animalium boni succi fuerint, cuiusmodi est suum suū genus: nā partes nervosæ, iusto sunt pituitosiores. Omnium itaq; ciborū, suū caro potentissimè nutrit. At bubula, alimentū quidē & ipsa corpori suggerit non mediocrem, nec dissipatu facile sanguinem tamē gignit, quā cōveniat, crassiorē. Quod si quis naturalis temperamento melancholicus magis fuerit, affectu aliquo melancholico prehenderetur, si largus ea velaretur. Affectus melancholicus sunt, cancer, elephas, scabies, lepra, febris quartana, & quæ peculian nomine melancholia nominantur. Lien autem quibusdā à tali succo intumuit: quam rem calhexia & hydropes sunt consecuti. Cæterum quantū carnes bubulæ totius fere substantiæ crassiorē suillā sperant, tantō suillæ bubulæ lentior antecedit. Vt autem iis iuvenibus qui bono fuit corporis habitu, sines ætate florentes magis quàm porcelli congruunt, sic virili perfectis bobus, hædip capris, sunt præferendi, vt pote quorū carnes multo facilius atq; præstantius coquantur. Porro capra temperamento minus quàm bos est sicca: si tamen sui & homini comparetur, multū superat. Suillæ autē carnes similitudinē cum humana ex eo poteris intelligere, quod nonnulla carnes humanas pro suillis exhibitis ab hospitiis improbis, sine vlla in gustu vel olfactu suspicionē comederint. Merito igitur porcelli alimentū nobis præbent tantō magnis suisbus excrementosis, quantō ipsis sunt humidiores: ac merito etiā minus nutriunt. Nam alimentum humidius vt distribuitur, ita etiam discuntur longè celerius. At agni carnes habent humidissimā, pituitosissimā: omnium verò excrementosior est, ac deterioris succi. Caprarū quoque caro, præter succū vinosum, acrimoniam etiam sortitur. Harcorum autē, tum ad coquendum, tum ad succum bonum gignendum, est deterius. Hanc sequitur anetum, post tanrorum. Porro in us omnibus carnes castratum sunt præstantiores: quemadmodū senū pessimæ. Ad hæc caro leporum, sanguinē quidem gignit crassiorē, sed melioris succi, quàm bubulæ ouillæ. Cervina autem non minus us succum vinosum generat, & concoctu difficilem. His agrestium afinorum bene habitorum, ac iuvenū caro est propinqua. Sunt tamen qui afinorum,

Porra,
Cepæ,
Ampeloprasia.

Acres cibi quibus tantum est spiritus.

Nervosæ partes iusto pituitosiores existunt.

Suilla caro omnium potentissimè nutrit. Bubulæ præter melancholicum sanguinem, Melancholici affectus quæ sunt.

Iuvenibus ætate florentibus, suillis, vitulinis, atq; hædip capris, carnes congruunt.

Porcelli quale alimentum exhibeant.

Alimentum humidius distribuitur celerius.

Agnae carnes, Ovis, Capræ, Cervine, Antelope, Taurinae. Castratum carnes sunt præstantiores, vt fœvis, pœna, Lepore, Cervina, Afinorum.

domesticorum, ubi sensuerint, carnes mandunt, quæ pessi succa sunt, concoctiq; diffusillimæ, atq; stomachi læditi, etiã insuaves inter edendū: quemadmodū equorū & camelorū carnes, quibus & ipsis homines animo & corpore alini cameliniq; vescuntur. Sunt qui & vrsi, & his ad- huc deterioribus, leonibus ac pardis vescitur, se- mel aut bis elixantes. Vulpū aut carnis autu- mo apud nos venatores vescitur: tunc liqui- dem vuarū vsu pinguciscunt. Porro animalia om- nia quibus alimenta propria affatim suppetunt, longè seipsum in cibo præstantiora evadunt: quæ- admodum deteriora sunt, quibus ea minus ad- funt. Cæterum quæ affantes homines mandunt, aut in fartagine ingentes, ea corpori siccitas dant alimentum: quæ verò in aqua præcoquant, hu- midius: quæ in patinis cōducuntur, inter hæc me- dia sunt: quanquam & illa ipsa pro modo con- duntur: inter se multū discrepant. Siquidem quæ vinum aut garum habet copiosum, ea sunt alius

Equina carnes.
Camelina.
Vrsina.
Leonina.
Pardorum.
Vulpina.

Affricana siccitas quoniam elixant, aut car- nem.

Garum.

Aluum im.

Edimentorū genera varia.

Limac.

Limacum succo subducit alium.

Limacum caro bu coctis, alioq; fuit.

Extrema mem- bra inuicem al- ius, sed deorsum præcipit. Porcellorū pe- des conuelli so- lènt, nam, me- liorē reddunt.

Lingua caro.

inest: carnem enim habet fungosiorē, ac sangui- neam magis: eam tamen haudquaquam solam, sed cum musculis, glādiis, venis, arteriis, & ner- uis (quæ illi communis sunt) exemptam, solent coquere & mandere.

De Glandulis.

QUANTVM lingua si carnis substantia, tan- tum glandulæ & lingue substantia recesserunt. Porro glandulas quæ iuxta linguam consistunt, ad saluam generandam comparauit natura: ad conficiendum autem lac, mamillares: ob idq; post sæctum cōceptum laxescunt, atque lacte re- plentur. Omnibus autem glandulis illud cōmu- ne est, vt suas in cibo, frabilesq; appareant. Cæterum mamillares, cum imbuitur sunt lacte, de ipsius etiam dulcedine aliquid præ se ferunt. Ali- mentum autem quod ex his probè quidem in vē- triculo concoctis provenit, prope finē ad carnū alimentum accedit. Quod si minus quā par est sint confectæ, succum crudum aut pituitosum generant: humidiores quidem pituitosum, duri- ores verò crudum.

Glandularum lingua, & ma- mellarum vsus.

Glandula o- mnes esse in ca- be, iocant.

De testibus.

TESTES autem, cum ex genere sint glandula- rum, non permixte tamen sunt laudabilis succi vt mamillares: sed habent virosū quiddam, semi- nis, quod in se generant, naturam referētes, ceu renes vrinæ. Animalium gressuum testes, cōco- ctū sunt longè difficiliores. Nam testes galli- naceorū alitum & suauissimi sunt, & laudabile corpori alimentū præbent. Renes admodū pra- ui sunt succi, & concoctū difficiles, vt aduolū animalium testes. Juniorū quippe sunt præstan- tiores. Porro taurorū, hircorum & arietum, in- suaues sunt & mali succi, concoctūq; difficiles. Sues quidem apud nos exeat, quod videlicet castratorum caro suauior sit, & alimentū pleni- oris, concoctūq; facilius: boues autem, vt multo melius eis ad agriculturam vrantur, cum non fa- cile tauri domentur. Capræ autem & oues, pro- pter vtrūq; vniu. viui castrantur. Cæterum omnes memoratorum animalium testes, concoctioni resistunt, ac mali iunt succi: nutriti tamen, si bellè conficiantur. Quanto autem suum caro alius præstantior est, tanto horum quoque testes, aliorum animantium testibus sunt meliores. So- li autem gallorum gallinaceorum vndequeque sunt præstantissimi, & potissimum eorum qui sa- ginati fuerint.

Testes esse ex ge- nere glandula- rum.

Testes galli- naceorū, præstis corpori alimen- tū laudabile, non præ- iani succi.

Testes arietum non mali esse succi.

Castratorum carnis suauioris, & succulenti- oris esse.

Si Rami carni- esse latere præ- stantiorum, Gallorum tes- tis.

De Cerebro.

CEREBRVM omne cibus est pitulosior, cras- sif; succi, & tardè permeans, atq; ad cōtionem difficilis: nec minimū lqdit vētriculū. Excitat præ- terea nausæ, omnibūq; vomitionē est accōmo- datius, si cōmixtū cū uisceribus & calefacien- tibus fuerit. Si tamen rectè concoqui possit, ali- mentum corpori præstabit nō contemne- ndum.

De ossium medulla.

HÆC cerebro est dulcior, inuicior & psh- guior, nausæamq; provo cat, si liberalius sumat- ur: nutrit tamen & ipsa, si conficiatur probè.

De spinali medulla.

SPINALIS medulla (quæ perperim medulla appellatur) cerebro cōtinua, eiusdemq; cū eo na- turæ existit: nisi quod ipso multo est durius, po- tissimum

Cerebrum non suum excitat.

Cerebrum quo- le alimentum præ- stat.

Medulla vsus.

Spinalis me- dulla.

De animalium pedestrium partibus ex carnibus.

EXTREMA corporis partes, vt pinguedinis ita substantiæ carnosæ habent minimū. Neruo- sa cum, hoc est, ligamentosa, & cuti, circa natura in ipsis præpollet: non tamen tales hi nerui, cunivse sunt, quales in reliquo corpore: nam in excarnibus magis exercitiora sunt, eiq; magis lenta. Quare mentū quod corpus minus aluit: ob lentorē tamen facilius deiciuntur per aluū. Meliores autē iunc pedes suum quā rostrū: quemadmodum hoc auri- bus est præstantius. Porcel- lorum pedes præstantē elixæ mectū, illam meliorē efficiunt, ipsi etiam meliores reddunt: quare sic in ore & ventriculo melius elaborantur. Quanto autē aliorum animalium carnes alimentū bonitate suilla sunt inferiores, tanto illorum partes ex- carnes partibus suis excarnibus sunt deteriores.

De animalium pedestrium lingua.

PRÆVIARTS quædam huc parti substantia

risimū tu infernis spinis finibus. Quantū enim a cerebro abscedit, tantū magis durefcit. Pinguetudinis præterea habet minimum, quo fit, ut nauseam non provocet: ac si probè conficiatur, non exiguum corpori alimentum suggestit.

De pinguedine & adipe.

PINGUEDO, humida quæpiā res est, oleo longa veritate incrassato afimilis: adeps verò pinguedine multo est ficior, ideoq; fuitus concrefcit facili. Pauci virag; est nutriti, potiùsq; carnum nos alimentum sunt cōdimenta, q; alimenta.

De pedestrium animalium visceribus.

OMNIV quidē animalū secur crassi est succi, ac ad coquendū difficile, tardèq; permeat. Omnium autē est præstantissimū: modo ad voluntatem, sed ad alia omnia, quod ex caricari estu optimè præparatū fuerit. At lien gustu est suavissimus: in eo tamē reperitur perspicua quædā acerbitas. Merito etiā praxi succi esse creditur, ut quā sanguinē melancholicū gignat. Vtrog; verò ranti pulmo facilius coquitur, quistō est ranti. Mul-
to tamen quod ad nutritum attinet, est hepatis inferior. Pituitosius autem est alimentū quod exhibet. Cor substantia quidem caro est fibrosa ac dura, ideoq; concoctu difficile: & tardè permeat. Si tamen probè conficiatur, alimentū corpori dat ut non paucum, ita nec mali succi.

De quadrupedum animalium ventriculo, vtero, & intestinis.

DVRIORIS carnis sunt hæc partes: ob id, si intē conficiantur, succum tamen gignūt non planē sanguineum, sed frigidiorē, atq; crudiorē. Proinde multum temporis postulant, priusquam sans cōfici queant.

De agrestium ac domesticorum animalium discrecna.

DOMESTICA animalia, temperie humidiora sunt q; agrestia, tum ob aeris in quo degunt, humiditatis, tum ob viris ignavitiā. Caro eorūq; immonibus degūt, ob cōtrarias causas est durior, nullulq; prius pinguedinis, aut paucissimæ particeps. Ob idq; pluribus diebus q; domesticorum, imputras servatur: alimentūq; exhibet minus excrementitiū, eo qdā domesticis sumitur: ac probe & nutrit valentius, & succum gignit meliorem.

De lacte.

LA CBOUM crassissimū ac pinguisimū est: liquidissimū ac minimè pingue, camelorū: mox equarum: deinde alinarū: medæ autem consistentiæ est caprarū: hoc crassius, ovium. Secundū autem anni tempora, læ post partū est liquidissimum. Tempore verò progressu, magis semper ac magis crassescit. At medea æstate, ipsum etiam in lux naturæ medio consistit. Post id autē tempus, sensim iam crassescit, quoad penitus deficiat: sed Vere, ut liquidissimum, ita copiosissimū est. Porro liquidissimum lac, serum: crassissimū, caseum habet plurimum. Merito igitur liquidus quidem lac, magis: crassius autem, minus aliū subducit. Quinetiam lac quod ignitos lapillos, aut orbiculos ferreos extinxerit, & ventrem ficit, & us auxiliatur, quibus venter actum exmentorū morfu infestatur. Facile tamen sic paratum lac in ventriculo cogitur: ob idq; mel illi, & salern, a duobus: sicuti & aquam etiam, quæ feri

acrimoniam corrigit. Constat siquidem lac omnino ex cōtrariis substantiis, sero scilicet, caseo, & pinguedine, ex qua butyrum conficitur: quo in frigidis pleriq; regionibus, pro oleo vtitur.

Cuius pinguis succi alimū lac habet minimū. Quocirca rarō alicui in ventriculo cogitur, si statim ut mammis excidit, calidum fuerit epotum. Quod si sal & mel adiciantur, fieri nō potest, ut ipsum in ventriculo coaguletur. Eandem ob causam magis per aliū deicitur, ut quod serū multum habet, a quo lac omne facultatē accipit deliciendi, vti a caseosa substantia fistendi. Quare plurimo sero ad deliciendam aliūm vti sunt veteres. Cui quidem tantum mellis optimi & salis, est adiciendū, quantū suæ citrà stomachi eversionem sentietur. Porro inter omnia quæ mandamus, lac optimū, optimi succi est. Nam quod viscosum exiit, prauo succo ventium corpora replet. Quid si capre, aut alterius animalis, scamoniū nūquid aliūmve depaui, lac cibi loco quāsumperit, omnino alius ē huius. Lact igitur adseri habet plurimū, etiam si semper eo vtaris, nihil penitus periculi adfert. Quod verò huiusmodi humiditatis habet exiguum, caseosam autē crassitiem multam, eos quidem offendit, qui calculus generandis sunt prompti: necdū obstruit iis, qui hoc affectu facile prehendi possunt. Thōraces autē ac pulmonis partibus lac omne est vti le: capiti verò, nisi quis ipsum habeat admodum

firmit, non est accōmodum: ut neq; hypochondriis, quæ leui de causa insistant: plurimus siquidem in ventriculo in status vertitur. Si verū cum aliquo eorum cibariū, quæ crassi sunt succi, durius elixum fuerit, statuosam quidem naturam deponit, sed iecur magis obstruit, & promptius calculos in renibus gignit. Illud igitur lac boni succi & multi alimenti existit, quod ex cōtrariis substantiis & facultatibus constat, subdendi scilicet, ac fistendi, obstruendi ac tenuandi.

Nocet autem ipsius vias asiduus tum dentibus, tum gingiuis: has quippe humidas, dentes putrefactioni reddid obnoxios. Cæterum occurres huic malo, si aut diluto, aut mera co vino, cui nonnihil mellis permixtū sit, aut primò quidem melicrato, dein verd astringēte vino, sumpto lacte, eos ipsum aollueris.

De oxygala lacte, hoc est, acido lacte.

DENTES qui secundum naturam habent, nihil offendit: eos autē ledit, qui iusto frigidiores existit. Iam verò ventriculus quavis de causis frigidior, oxygala non bellè cōcoquit: temperatior verò, quamvis ægrè, conficit tamē id aliquando. Contrā, ventriculi calidiores, præter quod nihil ab huiusmodi edulis læduntur, aliquo etiam fruuntur cōmodo. Pro diuersa autem ventriculorum natura accidit, ut lac ipsum interdum acescat. Siquidem caloris itopia, in acorē: eiusdem excessus, in nidorem & fumum vertit. Porro oxygala est in ventriculo non coquatur, nunquam tamen in nidorem convertitur, potissimum si in feruentissimum ac biliosissimum ventriculi incidat. Est autē natura tum frigidior, tum crassi succi: quare nō facile a modicæ naturæ corpore cōcoctionē suscipit. Quinetiā cōstantum est crudi succi a cibis huiusmodi gigni.

R. un

Pinguetudo
Adipi

Iecur quale no
trimentum ex
hibeat,

Lien sanguini
mentum
2. Qual.

Pulmo

Cor

Intestina
quale alimen
tum præbent.

Agrissimum ani
malia carnes
valentius nutri
unt. Crassi
gignunt melius.

Lactis dispo
sitione.

Lact quod lapilli
equos ex
trahunt: alio
fuerit siccum.

Lact ex quibus
substantiam con
stat.

Lact asinum ra
rius alium in ven
tre coag.

Lact asinum hab
et plurimum
substantia sero
sa.

Sero repletur
veteres ad delici
endam aliū.

Lact optimū
optimi est succi.

Lact nimis sero
sum, obesse non
potest.

Lact admodum
exiguū quibus
nocet.

Lact omne effi
cacia perire
Lact quibus no
ceat.

Lact optimū
quale.

Lact nocet den
tibus gingivis
que.

Lact nocet
quæ corrigunt.

Lact nocet
quæ corrigunt.

Lact nocet
quæ corrigunt.

Oxygala quibus
conveniat, aut
minime.

*Las quibus mo
du fundatur.*

Non ab re autem edulium hoc calidissimum est ven-
triculus vtile: quemadmodum frigidioribus ad-
versissimum. At partes ipsius lactis, citra coagulum,
etiam scissio, quam vocant, discernit, cum lacti
abvnde calido oxymel frigidum instillamus. Idem
eniam multo efficimus. Interdum citra villam li-
quoris instillationem, vase frigidissimum aqua ha-
bente, in lac demisso, ipsum scindimus. Præterea
sine coagulo id lac, quod post eductum factum emul-
sum fuerit, cōcretor protinus, si super cineres ca-
lidos parumper calefiat. Nutrit autē vberius ex la-
cte id quod concretū est: parcius verò, quod se-
rosius exsistit. Ceterum quod lac à partu concre-
fiscens, nihil recipit mellis, concoctum quidē est diffi-
cilius, atque succa crassioris: præterea per alium
tardius fecedit, corpus tamen abvnde nutrit.

De Caseo.

DVM caseus cōficiat, affusum ab iniecto co-
agulo acrimoniam quandam, humiditatemque om-
nem deponit, & ponissimum si inveteraverit: tunc
enim quā prius, longē acrior evadit, ac manifeste
fit calidior, quod ardensior redditur: ob id ip-
sum, siticulosior, & difficilior concoctū, & peo-
ris succi efficitur: ac proinde calculus est genera-
ndus. Vbi enim succorum crassities cum ardenti ca-
lore iungitur, illic calculi generantur. Itaque caseus
id genus, omnium ad omnia est pessimus. Deinceps
autem malus quidem, sed prædicto minus
putandus est, qui neque est vetus, neque acris. Om-
nium autem caseorum recensium, præstantissimus
is habetur, qui à nostris incolis oxagalacticus
nunc dicitur, suavisissimus quidem in cibo, stomac-
ho autē minime noxius, aliisque omnibus caseis
cōcoctū transiitque facilius succum habens nō vi-
nosum, neque visque adeo crassum. Præstantissimus
eniam est is, quē Romani *Babui* appellant. In vni-
versum autē, mollior caseus durior est præstan-
tior: rarus verò ac laxus, densū admodum, & cō-
pactū. Item verò cum glutinosus valde, & is qui
ad asperitatem visus est inabilis, sine vino, præstan-
tior est qui inter hos duos est mediū. Quod au-
tem ad gustū pertinet, is omnium est præstantissi-
mus, qui nullū vehementer obtinet qualitatē, sed
dulcem habet supra alias parum eminentē. Ru-
ctū etiā, cuius qualitas paulatim marcescit, præ-
stantior: cūlū contrā perdurat, non bonus.

De pedestrium animalium sanguine.

SANGVIS omnium concoctus est difficilis, præ-
cipue crassus & melancholicus, qualis bobus &
apris inest. Leporinus autem, caprinusque, ut suavis-
simi celebrantur.

De alimento quod à volucribus ani- malibus sumitur.

AVIUM omnium volantium genus paucissi-
mum præstat alimentū, si ad genus gressivū con-
feratur: ponissimum si ad suillam, quā nō aliud in-
venias, quod copiosioris sit nutrimenti. Volu-
crum tamen caro concoctū facilius est, præci-
pue perdicis, atragenis, columbe, galli gallinacei
& gallinæ. Turdorum verò & merularū, minu-
tissimorum passerulorum caro, quā prædictorum,
est durior. His autē ipsis, turturæ, palumbi, anas-
tisque caro etiam durior existit. At phasianorum
caro, quod ad concoctionem & nutrimentū ari-
tetur, carni gallinarū est similis: voluptate tamen

in edendo eam superat. His durior est pavonum
caro, & fibrosior, & difficilior concoctū. In vni-
versum autem, augescendum caro multo est præ-
stantior, quā inclinantium ætate: media verò
est inter vitæ, florentium. Præva autem admodū
est novellorum, sed duerfa ratione ac sensū.
Siquidem horum caro, dura est & sicca, ac nervo-
sa, idcirco concoctū difficile, & nutrimenti exi-
gi: contra animalium nuperitæ ætatis tor-
pore, mucosa sunt ac humida, cōque excrementis
plena: facilius ramen per alium descendunt. Se-
cundum etiam præparandis modis, & locos
in quibus ipsa animalia vivunt, non mediocriter
eorum est differentia.

De anseribus & struthocamelis.

CARO horum excrementitia existit, multoque
difficilior concoctū, quā prædictorum volu-
crum. Ipsorum tamen alæ, non sunt ceterorum
alis deteriores: quandoque dem in mulis, alarū
substantia fibrosa est & dura. Quærandam autē
caro, tota est elusiva: cuiusmodi gruum: quæ
tamen & ipsas mandant, plurimum ante diebus
macerantes & mortificantes. Inter grues & anse-
res, caro tardiorum est media.

De differentia quæ est in partibus anima- lium volucrium.

NON mandantur intestina volucrium: ventri-
culi autem & vesci sunt, & nutriti. Quidam au-
tem ipsorum valde etiam sunt iucundi, eui anse-
rum: secundum quos, sunt alitium gallinarum.
Ad hæc anserum quibus lac in alimentum misce-
tur, iecur est iucundissimum, atque potenter nutri-
t: cū sit optimi succi, deicitur facilius, probeque
in ventre cōcoquitur. Ad læc alæ anserum, & his
adhuc magis gallinarum, minimo negotio co-
quuntur. Pedes autem paulo minus omnium,
cibo sunt inepti. Ceterum iuniorum & probe nu-
tritorum caro, gracilium carū atque annosorum
præstat. Gallorum testes, præcipue altitium, præ-
stantissimi sunt, si multo magis, si cibis ipsorum,
quo sunt nutriti, seroso lacte fuerint imbuti. Por-
ro volucris, exiguum quidem habent cerebrū:
ipsū tamen tantū pedestrum cerebro præstan-
tius est, quanto durius. Ac montana sanē, quā
palustria, cerebrum habent præstantius.

De Ovis.

GALLINARUM & phasianorum ova, omni-
bus sunt præstantiora: deterior autem anserum
& struthocamelorum. Porro quæ ova dicuntur
tremula, ad nutrimentum omnium sunt præstan-
tissima. Sorbilia autem, minus quidem nutriunt,
sed subducuntur facilius, & plaryngis asperita-
tes læuigant. Cocta verò, et ad coquendum sunt
difficilia, & tardi transitus, corporique crassius ali-
mentum largiuntur. His autē tardius permeant,
& crassioris sunt succi, quæ in calidis assantur ci-
neribus. Quæ verò in sartagine sunt infusata,
pessimum habent modis omnibus alimentum.
Porro quæ suffocata appellant, sunt elixis atque
assis meliora. parantur autem ad hunc modum:
Vbi enim ipsa oleo & garo, & pauco vini cōspersa
fuerint, vas quo continentur, cacabo aquam ca-
lidam habuerint in dunt. Deinde vbi ipsum torum
supernè obturavit, ighem substruunt, quoad o-
va mediocrem consistentiam fortiantur.

De

*Lactis partem
qua nō digerit, &
qua minus al-
lent.*

*Caseus in vasis
patet calculū
generat.*
*Calculus à quo-
bus à caseo ge-
neratur.*

*Oxypalacticus
caseus esse om-
nium caseorum
optimum.*

*Babui caseum.
Caseum qui
præstat.*

*Sanguis omnium
ad concoctionem
difficilis.*

*Suilla carne vi-
bi maxime co-
piosum.*
*Volucrium est
nec quæ facili-
t, & quæ o-
gravi copiosius.
t, phasianorum
caro.*

*Pavonum ca-
ro.*
*Carnis diffi-
cilia ferendo a-
tata.*

Anserum caro.

*Struthocame-
lorum caro.*

Gruum caro.

Tardiorum caro.

*Anserinum v-
triculum esse
iucundissimum.*
*Anserinum he-
par vni-
versum com-
mendatur.*
*Ala anserum,
gallinarumque.*

Testis gallinæ.

*Cerebrū anse-
rum.*

*Ovorum diffi-
cultas.*
Ova tremula.

Ova sorbilia.

Ova coctilia.

*Ova assa in ci-
neribus.*

Ova sicca.

*Ova suffocata
parando modum.*

siquidem preparatio vel egrotis ipsis est cōmōda. Quibus autem inculpata sanitas est, iis piscium in fartagine fixorum, secundo loco super crancula aliorum, preparatio est conveniens. Hæc tamē oleum garium cum pauco vino exposcit. At fixis, plus visui, garig addere expedit, munime vero olei. Quod si cui id subvertat stomachum, parum habeat acetum, modicum in se garig, pipierisq; cōtēnens. Omnium autem memoratorum piscium alimentum, hominibus o-
10 ciosis, senibus, imbecillibus, & ægrotis est accommodatissimum. Qui verò corpus exercet, cibos firmiores postulat.

De piscibus duræ carnis.

Pisces duræ carnis quales. DRACONTES quidem, libellæ, cuculi, scorpius, trachurus, mulles, cernus, glaucus, conger, pagrus, hamya, & aquila, inter duræ carnis pisces annumerantur: nonnulli autem mustellorum species. Nam celebris ille qui apud Romanos galexia dicitur, in eorum numero, qui dura carne cōtinent, ad
20 habetur. At canis ad ceterorum genus refertur, vt qui carnem duram habeat, atque excrementitiam. Quapropter ipso in partes secto & salito, vescuntur vulgares homines. Ingrati enim saporis est, ac mucosus, idēq; cum sinapi & oxæro, atque id genus acribus condimentis eum mandunt. Ex hoc item genere sunt balenæ, delphini, & phocæ: ad quos proximè magni thynni accedunt: quanquam non æque sunt vt prædicti, iucundi. Insuaves enim sunt hi, præsertim recentes: nam salsi evadūt meliores. Thynnorū autē caro, qui ætate & corporis mole sunt minores, nō perinde dura est, idēq; hi facilius etiā coquuntur: & iis adhuc magis pelamides, quæ sale cōditæ, laudatissimus salientis usū cedunt. Post hæc autē & pelamides, myli qui ex Pouto afferuntur, præcipue cōmendantur. Post ipsos sunt graculi. Porro duræ carnis pisces, ægrius quim molles cōcoquantur. Siquidem quæ molliora sunt, facilius alterantur, quod facilius panitur. Durior etiā cibis crassiorē habet substantiā, vt mollior
40 tenuiorē: ac proinde ille succū crassiorē gignit.

An dura omnia per decoctionem salios succos gignant, vt Praxagoras & Philonius existimant.

Deest omni nium, quando coquitur, seu per salum evadere. EQUITUM omnium decoctū, quandiu coquitur, salius semper evadere, pōt autem, amarum, deprehendo. Nam corpus ipsum solidum quod in aqua elixatur, qualitates quæ initio sibi inerant, in ea deponit, sic vt qualitates expertæ evadat. Clarius autem huius rei veritatem intelliges, si quando quod elixas, in aliam aquā transfusum, secūdū & tertio recoquas. Invenies quippe id quod decoquitur, propriā amissis qualitatē, siue saliam, siue crem, siue etiam acerbam: aquam autem, eam in se recepisse. Si verò succos ipsos solos concoxeris, primū quidem saliores, postea autē amari etiam fient. Siquidem vel ipsa aqua opnna diuina cocta, saliam qualitatē tantū assumit. Quamobrem, quod ad succos attinet, Praxagoram ac Philonim testē sentisse, nobis est concedendum: quod verò ad solidā corpora pertinet, non item.

De animalibus quibus testa pro cute est.

OMNIS VS id genus piscibus cōmune est, vt

salum in carne succum contineant, qui alium subducit: quod scorum culis magis manifestū est, pro qualitate & quantitate ratione. Siquidem ostrea, inter alia testacea, carnē habent molliissimā: parvæ autem hianulæ, vertebrae, vngues, purpuræ, buccinæ, omniūq; eiusmodi, duram. Non ab re igitur ostrea quidem, alium valentius subducant, corpus autem imbecillius alunt. Duriora verò, difficilius quidem coquuntur, sed firmioris sunt nutrimentū. Verū hæc quidē omnia elixantur. Ostrea verò etiā citra elixationē mīduntur. Sunt qui ea in fartagine frigrant. Quænam admodum autē ex ipsis testacea, quæ dura sunt, carnem habent concoctū difficiliorē, sic etiam quæ corruptamur ægrè. Quare ipsa bis terve cocta, eis exhibemus, quibus ob prauos succos cibi in ventriculo corrumuntur: gignitur tamen ex ipsis succus crudes plerimus, vt ex iis quæ molli sunt carne, pituita.

De Crustaceis.

ASTACI, paguri, cancri, locustæ, carides, gantari, arque id genus alia, tenui testa clauduntur, duritiæq; sunt testaceis similia: sed salis humoris minus quā illa continent, quanquam eum habent satis multum. Dura in totum carne constant: idēq; & concoctū sunt difficilia, & firmi alimenti, quum scilicet in aqua potulenta percocta fuerint. Horum quoq; caro, vt ostreorum, vbi percocta, vt dictum est, in aqua succum salis relinquit, alium sibi: ægrè etiam corrumuntur, non secus ac testacea, quæ duram carnem possident.

De mollibus.

MOLLIA vocantur, quæ nec squamas, nec asperā cutem, aut testaceam habent, sed mollem: vt polypi, sepiæ, loliginēs, & his consimilia: quæ omnia mollia rangere apparent, duræ tamen sunt carnis, & difficilia cōcoctū, exiguiq; in se succum salium continent. Ceterū si concoquantur, alimentum exhibebunt non paucum corpori: succi tamen crudi plurimum gignent.

De Cartilagineis.

HORM animalium cutis est aspera, ac notisplendicans. Inter ea autem torpedo & pastinaca carnem habent mollem argi iucundam, cetero medioeriter per ventrem subeunt, nec concoctū difficilem. Nutriunt item medioeriter. Raia autem, leuistaia, squarina, omniaque huiusmodi, duriora sunt, & concoctū difficiliora, alimentiq; copiosioris, quā torpedo & pastinaca.

De Cetaceis animalibus.

OMNIA eiusmodi duram & pravi succi, excrementitiamq; habent carnem.

De Echinis marinis.

EX multis eduntur hi & garo, alui subducendæ grana: paritūq; in panis, ovīs, pipere, melleq; insectis. Imbecilles sunt alimentis, ac medijs inter ea quæ humores extenuant & densant.

De Melle.

MEL oritur in folis plantarum, eiusdem cum rore generis. Porro in monte Libano quorundam persicæ cortex super terram extendit, ac de in arboribus excurientes, quod ab eis desiliit, excipiunt, & ollas ac fictilia melle implent: vocantq; id mel rosodum, & æreum. Proinde constat marciā

Tellacervi succum alium subducere. Ostrea.

Ostrea eduli mīduntur.

Testacea dura carnis, quibus confiant.

Crustacea.

Mollis cute intertestacea.

Cartilaginea. Torpedo. Pastinaca.

Raia.

Cetacea.

Echinus marinus.

Mel. Manna vulgo appellata oritur.

Mel rosodum, Mel æreum, Marciā

materiam ex qua mel gignitur, rori esse congene-
rem. Videtur autem & ex plantis, in quarum foliis
colligitur, boni malive quidpiam ipsi accede-
re. Ideoq; laudatissimum in locis mel gignitur, in
quibus thymus, & alix quædam herbe, & frutice-
sæ temperamento calido & sicco, asiatim proye-
niunt. Tenuior enim est partium id mel: id eoq;
in calidis corporibus promptè in bilem conver-
titur. Frigidis verò est accommodatissimum. Cum
autem tenuium sit partium, acrimoniæ quiddam
habeat etiam necesse est, qua alium ad excreto-
nem proritet. Quam quidem adimentis per inie-
ctionem aquæ, atque coctionem, ipsum redde-
mus ad distributionem atq; concoctionem accom-
modatus. At melicranum quod paulisper aut
nihil omnino concoctum fuerit, prius dicitur,
quàm concoqui, & in corpus distribui, & nutri-
re possit. Præterea mel nõ plane coctum, in ven-
triculo & intestinis statim quosdam gignit: con-
tra quod in decoctione spumam omnem abieci-
rit, flatus est expers, & vinum mouet. Quod si
quis citra aquæ admisionem mel solum delingat,
nutriet quidem infirmus, sed aliu propius de-
licet. Largius verò sumptu, ventrè superius co-
citur ad vomitum fore. Coctum autè sine aqua,
neq; vomitu similiter mouet, neq; aliu subducit:
veru distribuitur & nutrit magis: vniñ autè mi-
nus eo quod cum aqua coctum est, mouet. Seni-
bus itaq; mel cõmodissimu est: ætate autem flo-
rentibus & calidis, in bilem vertitur.

De Vino.

Si modo quicquid alit, cibus est, vinu etiam
in genere ciborum est collo candum. Ceteris vi-
norum omnium, rubra simul & crassa, sanguini
generando sunt accommodatissima, ceu quæ mi-
nima mutatione indigeant ut flant sanguis. Post
ipsa sunt nigra, crassaq; & dulcia: rum quæ colo-
res quidem rubra sunt, & nigra, cõsistentia autem
crassa, vniñ cum qualitate attingente. His autem
mipus sua natura alant, quæ alba sunt, simul &
crassa, & acerba. Omnium autem minimum nu-
triuñt, quæ colore quidem sunt alba, cõsistentia
autem tenuia, & aquis hydromalin faciendo
apposins, similia quodammodo. Dulcia verò cou-
sistunt in ventriculo, & distribuuntur facilius,
quàm auiter, ut quæ facultate sunt calidiora:
Quia autem sunt admodum crassa, tardius qui-
dem perficiuntur, atq; distribuuntur. Si tamen in
ventriculum adeo robustum incidunt, ut cõuici
rectè ab eo possint, alimentum copiosius corpõ
dabunt. Constat præterea, quod quemadmodum
hæc corpori alendo tenioribus sunt præ-
stantiora, ita ad vinum ciendam sunt deteriora.

De cibus sale conditis.

ANIMALIUM corpora, quæ carnes simul
duræ sunt & excrementitix, sunt ad salendum
accommoda. Quæ verò aut admodu mollem, aut
valde siccam, & minimè excrementosum habent
corporis habitum, sunt ad salendum inepta. Sa-
lis itaq; facultas, humores superfluos tenuat, &
digerit, corporaq; cogit atq; condensat: cum ni-
ti spuma, & laxum aplorinitru, tenere quidem
& discutere possint, cogere verò & condensare
non possint. Sunt igitur obesorum & ætate flo-
rentium carnes, ad salendum sunt cõgruentissi-
mæ, ut quæ ab vtroq; extremo absint. Quemad-
modum enim corpora sicca salata, citius evadit
similia: sic cõtra, quæ immodica humiditate dis-
solvunt, facile commercio tabescunt. Ob eam cau-
sam neque pisces molles carnes, & excrementis
vacuæ, ut siccantes & asellæ, ad salendum sunt ap-
te. Graculi verò, pelamides, mylli, sardæ, & sar-
denæ, quæq; *evchymia* vocant, & *salamenta*, ad sa-
liendum appositæ sunt. Multi verò, quod dura
eorum sit caro, & ab excrementis pura, non sunt
ad salendum accommodati. Ex his autem perpiti-
cum est, ea esse concoctu admodum difficilis,
quæ sale condita, dura & nervosa evadunt, ac
veluti coracæ. Quæ verò contra habent, re-
tenua quidem ipsa redduntur, manifesta autem hu-
mores crassos & glutinosos attenuant. At præ-
stantissima omnium quæ mihi licuit experientia
cognoscere, sunt quæ a veteribus medicis Sardi-
cia salamenta appellantur.

De medicis edulis.

IN singulis discretis, quas alimentis in esse
dicimus, quedam sunt media. Animalibus au-
tem naturalem temperiem atque inculpatam ser-
uantibus, similia suis naturis cibaria conveni-
unt: verò quæ pravam temperiem, aut ab in-
itio sunt fortia, aut post acquisiverunt, non simi-
lia sed ipsius eius, sed contrariorum est vilitas.
Itaque singule nature suum proprium medium
habebunt, idq; secundum ætatem, viræ cõditi-
onem, institutionem, & regionum, in quibus tan-
diu habitant, differentias.

GALENI PERGAMENTI
de evchymia & cacochymia, li-
ber vñus.

Nnonne caritas asidua, quæ nõ pau-
cos abluere annos multas nationes
Romano imperio subditas afflixit,
coegitque vesici alimentis pessimi nu-
trimenti, ac proinde varios, & ma-
ximè perniciosos morbos induxit, planè signifi-
cavit, quantam vitiosi succi ad gignendos mor-
bos vim habeant. Etenim ab illis alimur, quæ na-
ture nostre sunt familiaria: quæ verò aliis ad ver-
santur, nos in perniciem deducunt. Ceterum qui
laxius letalium venenorum pereunt, facile scer-
ni ab eis possunt, qui ab aliqua corporis affec-
tione extinguuntur. Neq; enim quispiam infi-
cias ibi, ob humorem quem venenata anima-
tia in eam particulam insigunt, vel illam cele-
riter viri priant, vel in putredinem labi, vel do-
loribus vehementissimis, aut phlegmone vrgere:
neque non scorpionem ieiuni hominis sputo bis
terve asperitum, protinus interire. Nam ficti na-
ture quædam cum aliis quodq; nature conveni-
ent, sic altera quoque ad veritatem alteri, eamque
corruptit. Porro quando ipse patris consilium
sequens, ab visu immodico fructuum, quos
horarios vocant, abstinet, obferuatq; ab illo
traditam optimam victus rationem, tandiu im-
muniq; ab omni temperie peristit. Quoties au-
tem eius præcepta negliges, vniñ cum coxaneis
meis ultra modu fructibus illis me implicui, sem-
per in morbo incidì, qui sanguinis missionem

Mel laudatissi-
mum vñs g-
gnatur.

Mel quibus so-
cis in bulla ver-
tatur, & quib-
us maxime ex-
tusa.
Nihil acrimo-
nia quomodo
corrigatur.
Molerationem.

Mel crudum.

Mel coctum, &
vinum mouet.

Mel largius
sumptu, vomitu
tunc potest.

Mel senibus cõ-
modatissimum,
et æta florenti-
bus in bilem ver-
titur.

Vinum diffin-
itio.
Vina rubra si-
mul & crassa,
sanguini ge-
nerando esse ac-
commodatissima.

Vina alba &
tenuia, minimè
nutriunt.
Vina dolencia.

Cidicava qua
animalia sint
apta ad quæ in-
cipit.

Sal humores so-
perfluos digerit.
Natura spuma.
Aplorinitru.

Suum carni.

Periti apli ad
salendum.

Evchymia.

Sardicia salame-
nta.

Animalibus
periti naturalis
similia natura
sua cibaria con-
gruant: contra-
ria verò quæ
pravam temperi-
em corrumpunt.

Sacros vitiosus
ad gignendos
morbos maxi-
mam vim ha-
bere.
Dietæ nos ab
illis quæ natura
nostra sunt fa-
miliaria.

Scorpionem ho-
minis sputo bis
terve aspersum
protinus confun-
gitur perire.

Galenus quæ-
dam ab omni
interceptis in-
venit persi-
tere.

Calui pater
uo omni dis-
placatum ge-
re fuit veris-
sim.

Cibi admodū
exquisiti non
agere qui pos-
sunt recitari
ante cibum.

Panis optimus
quis sit.

Alica.
Squilla caro.

Crudos humores
necessario
debent aut con-
coqui, aut com-
patrescere.

Calorem ge-
nerant.

Exercitū ante
cibū mediocri-
tragus.

Cibi crassissi-
mi in mediocri-
tate, minus co-
mendatissimi sunt.

desiderarent. Erat enim pater meus geometricus, architectus, astronomus, arithmeticus, logistici-
cūq; studius excellens, maximūq; omnibus qui-
bus erat notus, ob ipsius iustitiam, modestiam,
bonitatemq; ut quis ex philosophis aliis, admi-
rationi. Ceterū qui potest exerceri ante cibū,
is laudatē admodum exquisitos cibos deside-
rat: cui verō negotia & occupationes impedimē-
to sunt, non modō huic probato iuniorūq; vi-
ctū, sed salubribus quoq; medicamentis est opus.
In primis igitur iis qui quies ac pro animi sen-
tentia vitam traducunt, eam victus rationē de-
scribam, ex qua gigni sanguis optimus possit.
Dein intendū est, ut quædam huius etiam præce-
pta tradantur, qui turbulentē vitam, atq; nego-
ciis deditam agunt. Cibi itaq; succi probati sunt,
ex frumentaceoq; genere panes purissimi pro-
bēq; confecti, adhibita prius maceratione atq; fer-
mentatione debita, necnon sale iniecto. At co-
cti in cibano præstant: post quoque furnaceis secū-
da debentur partes. Alica verō, sicuti & squilla ca-
ro, si exactē in ventriculo concoquantur, in san-
guinemq; à iecinore cōvertitū, probatissimos
gignunt humores: aliquid tamen glutinosū in se
habent, ob idq; mī iecur obstruunt, & renes,
quibus hæc à natura astrictos meatus fortiuntur,
ac proinde distributiōnē impediunt. Horū quo-
que vīus vberior, in supradictis particulis vel
grauitatē, vel dolorem nonnunquam facit. Quin-
etiā in venis quæ per caua iecinoris, aut per me-
senteron feruntur, redundans humor periculū ad-
fert, ne vel putredinē contrahat, vel eæ ipse par-
ticulæ in quibus cōgreditur, afficiantur phlegmo-
ne. Quippe necesse est crudos crassosq; humo-
res, vel concoqui, vertigū in sanguinem, vel com-
putrescere non secus ac quæ calidis in locis diutius
manent. Quamobrem inuēnta medicamen-
ta salubria sunt, quæ tenuandi vim possidēt, quæ
obstructionibus liberant. Quancūq; horum fre-
quentior vīus, vel serosum, vel biliosum, vel me-
lancholicum procedente tempore sanguinē red-
dit. Quandoquidem id genus medicamenta, nō
solum incidunt & tenuant, sed etiam immodicē
calefaciunt: ob idq; & solida membra exsicant,
& crassum humorē reddunt, quo in renibus as-
to, gignuntur calculi. Optima itaq; corporis con-
stitutio, quæ tēperatissima est, meatus, per quos
humor fertur, patentiores habet: quam quidem
talem consuevit ante cibos exercitiū mediocri-
tragus. Quæ ex frumentacei generis alimentis, eius-
dem cum alica naturæ est: agrius tamen conco-
quitur. Propē etiam natura ouorū atq; vires ac-
cedunt. Iam verō quæ glutinosos crassosq; humo-
res gignunt, si in hepate conuertantur in san-
guinem probum, potentissimē nutriunt. Ceterū
quæ cibi in omnis excessus in mediocritate co-
sistunt, q̄ omnino cōmendatissimi sunt. Eius gene-
ris panes optimi habentur: præterea gallinarum
gallinæq; carnes, necnon phasianorum,
perdicum, arraginarū, columbarū, mularum,
rurorum, terrarūq; & omnū passerulorū.
Pisces item saxatiles, pelagici, littores, gobi,
murex, buglossi, aselli, & simplices pisces om-
nes, qui neq; infusæ, neq; mali odoris, neq; glu-
tinofum quicq; gustū repræsentant. Verūm ad fa-

nitatem tuendam, si ante cibum corpora moderatē
exerceantur, miram in modum prodeit: at
contrā, quies & otium diuturnū, iis maximo no-
cumento est. Qualiscūq; autem post cibum mo-
tus, alimentū ex ventrē crudum in diuersas cor-
poris partes distribuit. Porro panis qui nec fee-
menti, nec salis quod sit est continet, neq; probē
maceratus nec coctus est, iis glutinosum succum
producit. Caseus omnis, crassus: verus, mali succi
est: recens verō, succi prauitate caret: qui quidem
ex melle sumptus, aluum subducit. Lac autē cum
ex triplici, dissimiliq; substantia cōstet, nempe
seroso, crasso, & pingui: camelinū, asininūq; lac,
serosi humoris plus habet: plus crassi & caseosi,
ouillum: plus pinguidinis bubulum. A lac cap-
rillū, inter cetera lacūs genera moderatē se ha-
bet, ob idq; in corporibus nostris mediū etiam
præstat effectum. Etenim lac quod serosum & te-
nue est, minus nutrit, sed alū magis deiciit: con-
trā crassius, minus aluum subducit, ceterū ma-
gis nutrit. At lac caprillum, sine melle sumptum,
periculosum existit, quod nimirū in ventriculo
concretescit strangulat: quemadmodum vbi san-
guis in grumos cōcrescit, aut in vulnus aliquod,
aut in ventrem, aut in aliquod intestinorū deflue-
rit, grauissima symptomata inducit. Lac itaq;
statim vbi est emulctum, lauratur. Cui quidem
ne in ventre concreseat, mellis, aquæ, & salis ali-
qui solent nōnihil miscere. At quod ex lactis cō-
crenōne defluit serum, aluum egregiē mouet.
Quæ ex lacte & caseo placenta cōsistit, itraq;
etiam, quæ ex lacte & simagine constant, crassi
succi alimentum præstant. Cochleæ crassi succi
censentur: itēq; ouia, quæ vel elixa, vel tosta, pe-
nitius sint densata. Frixæ verō, mali succi, sumo-
sely in ventriculo cocturæ existunt, secum etiam
corruptentes admissos cibos. Mediocriter ve-
rō coctæ, quæ ideo appellātur tremula, ad coctio-
nem, digestionem, nutritionem, boniq; succi ge-
nerationem, sicuti & quæ forbilis dicuntur, ad le-
nissas gutturis asperitates, idoneæ sunt. In aqua
tilibus verō, quæ mollia dicuntur, videlicet lolli-
gines, sepia, polypi, aliq; id genus, crasso & te-
naci sunt succo: necnon ex piscibus, quæ cetacei
generis habentur, cuiusmodi sunt thynni. Sed pe-
lamides ex his magis ad medicandū tendunt.
Ostreæ item, buccinæ, purpuræ, crassi admodū
succi sunt: ac omnia breuiter, quæ dura testā inte-
gunt, necnon chamæ, patellæ, pectines, pin-
næ, & alia id genus. Quorum omnū succum scire
debes, nō lecus ac serum lactis, aluum deice-
re: at solidiores ipsarum partes, serius ac crassi-
tatem cōcoqui, crudiusq; & crassius, & frigidum
humorem gignere: quales vires in brasiaca & len-
te etiam videre licet. Quorum tamen succus, nō
glutinosus, sed nitrosus, & deiciendo aluo effi-
cax est: sicuti dracunculæ acerrimus, & amarissimus.
Vtrūq; etiam æron præstat, sed minus effi-
caciter. Bulbi autem amarog; sunt succo: ex qui-
bus lotia coctisq; sepiis, quicq; superest, crassi
succu habetur. Sed fungi inter huius generis co-
bos, frigidissimo, tenacissimo, & crasso succo re-
dundant: i bolis tantūm nemini interisse me-
moræ proditum est. Sed hi vbi concoqui neq;
uerunt, in nonnullis cholera excitantur. Alij
omnes

Exercitiū ante
prandium me-
diocri, confert
ad sanitatem
tuendam.
Materia post
cibum incimen-
da.
Panis missus.
Caseorum dispo-
sitiua.

Lactis substan-
tia triplex
Lactis differē-
tia.
Lac caprillum.

Lac streptum.

Lac crassius.
Lac caprillum
absq; melle
sumptum pericu-
losum.

Sanguis in gra-
uius modum
grauissima sym-
ptomata iada-
cit.

Lac statim vbi
est multatum,
bauriatur.
Serum lactis al-
uum subducit.
Placentariū au-
tota.
Cochleæ.
Oua.

Oua tremula.

Oua forbilis.

Pisces molles.

Cetacei pisces.

Teffacea.

Dracunculus.

Æron.

Bulbi.

Fungi.

Bolus.

Taber. omnes fungi periculo sissimi sunt. Taber, leniter crassi, non mali succi est: cuius generis amyli habetur. Item idem iuxta pinas se habet. In his quæ crassi succi censentur, iecur, renes, & testes annumerandi sunt. Verum iecur mali succi non est: renes rectius non boni, testes gallinaceorum exceptis. Lien ex ceteris animalibus, satis vitiosus est succi, melancholicusque: minus verò nocet foeculis. Cordis substantia durior ac magis fibrosa est, quàm quæ in aliis habetur visceribus: quare ipsum uero nulli inter musculos collocant. Sed musculorum verorum capita, nervosiora quoquomodo cætera carne sunt, in eaq. ex ossibus ligamenta orta dissimulantur. In fine autem musculi tendones oriuntur: eamq. ob causam extremæ utrinq. musculorum partes nervosiores: sicuti & medæ carnosæ sunt, & vberimè nutriunt. Porro totus musculus propriis quibusdam lancamentis circumscriptus, seuinctusq. ab aliis partibus cernitur, ob idq. functionē suam, quæ est ex motibus voluntaria. Extremæ animalium partes, ligamentosæ existunt, corporisq. alimentū lentum & glutinosum præbent. Partes enī quæ penes labia pedesque sunt, lentum, sed non crassum humore signatū, coquanturq. cōmodè: itēq. & volatiliū alæ, cōmuni quadā cum corporebus se exercentibus ratione. Nam hæc omnia excrementa carent: quæ verò in oio degunt, excrementosa sunt. Nulla sunt præcipua, ubi probè fuerit alæ, glutinosum, sed non tāis quidem crassum succum præstat: nec veluti extremæ partes, concoctionē admittit. nec bonū succum, sed excrementosum producit. Cerebrū quoq. pars crassi succi est, & quæ dorso medullā excipitur. Sunt glandulæ eiusdem naturæ, sed mediocriter: necnon iuueni victimarū testes. In vniuersum autem, partes seniorum, duræ, siccæ, & edoctæ difficiles sunt: sicuti & iuniorum, humidæ, mollesq. itaq. idcirco faciliores concoctū: his tamen exceptis, quæ ubi in locum edite sunt, pronus in cibo sumuntur. Sunt enim id genus omnes mæcosæ. Quæ in mammis glandulæ habentur, si lac in sese contineant, crassi sunt succi edulcis. Quod si animal ex quo sumuntur, boni habitus fuerit, abundè nutriūt, & bonū succū efficiunt. Etenim lac probatissimū succū habetur. Quare nonnulli pulmonis vicere affectos, potionē tantū lactis curari putāt, antea scilicet quim id ipsum vlcus vastius atq. callosius fiat. Sed præ ceteris in lac muliebri, tanq. naturæ eiusdem, uobisq. familiarissimum, cōmendatur cūm ab aliis medicis, tum vel maximè ab Herodoro & Euriphone, quidē vbera ab ita affectus fugenda esse pronuntiant. Lac siquidem, simulatq. est emulsum, nō nihil naturæ bonitatis amittit. Scire autē oportet, lac ex his animantibus quidem, quæ boni habitus fuerint, bonū esse succū: ex his autē quæ deprauato, nō secus ac sanguis quidē in illis habetur, ex cochymy exire. Inter crassi succi cibi annumeratur verag balanorū species, quæ a videlicet, a fructibus etiā palmarū. Ex his autē quas quæres ferunt, gratæ sunt castanæ & fœnices: quæ quidē & cōcoquantur cōmodius, & prauū succū non gignunt: etenim affixæ vel elixæ manduntur. At quæ figura oblonga sunt, & similes

palmaris, subis sunt certè nutritiōis, haud item hominibus congruæ. Aliquæ verò glandes duræ sunt & acerbæ, ægrèq. concoctionē admittunt, atq. crassum succū largiuntur: ac proinde vitandæ sunt. Est autem in austeris quidem remissa, astringendi qualitas, in acerbis autē intensā. Sed quantū illigæ glandes valentiorē astringendi potestate ceteras superant, tantū hæc in re ab aliis glandibus superantur castanæ: id quænam tamen vñ vberiori cauendum, quod & crassi sunt succi, ægrèq. coquantur, ac tum alium astringere, tum excitare inflammationes possint. Porro palmarū fructus dulcis sunt succi, crassiq. & astringentem facultatē habent: quare faciliè iecur obstruit. Si quidem dulces cibi, crassi succi, iecur ac lienis obstructions faciunt: inchoatēq. in visceribus phlegmonē augent: necnon inflammationes, scirrhosa vitia, adeoq. abfcessū generationes proritæ. Nostri autē corporibus alimentum accommodatissimū est, quod ex his rebus cōficiunt, quæ nec crassi, nec tenacis succi succi: hæc siquidem moderate consistit sanguinem gignunt. Quod verò tenue admodum est, parum nutrit. In his quoq. vitium est cibi, quæ omnino frabiles sunt, vt qui paucissimum in se habeant lentorem. Panis quippe ex panicæ, miliove confectus, dum editus, arenidum quiddam, vel quasi cinerem sapientis: si aliquid indideris pingutudinis. Quare ad bonum valetudinē q. obī cōmodissimi sunt, qui mediā quandam naturā inter ea quæ diximus obtinent. Ceterū quæ ex seminibus, aut omnino ex fructibus intumescunt, veterēq. pronus siccitatem atq. duritiem deponunt, molliorūq. & humidiora redduntur, præstantiora existunt: deteriora verò, quæ priusnam duritiem retinent, atque etiam minimè nutrent. Quod verò ad pristinam pertinet, quæ celeriter quidem turget, probatissima est: quæ autē post multū temporis intumuit parum, vitiosa. Porro quod præstantius est tritici, plus quidem: quod deterius, minus farinæ reddit. In autem fructus cōmodè iudicio meo, asseruantur, qui priusquam marcescant, siccantur. Nonnulli cucurbitas in testes ossas dissectas, arescere sinunt. At si quicū siccari nequeant, vitium in se habere maximum indicant. Paucissimos tamen fructus repetas, qui siccari nō possunt, præter pepones, melopepones, Armeniacæ, Persicæ, & quæ à Romanis præcoctis appellantur. Ficus enī siccate durant, & cucurbitas vt cucurbitæ similiter reponuntur. Qui cibi illi in tumorem crescunt, inter dum in aqua coquantur, q. & cōficiuntur aptius, & ad bonos humores gignendos sunt præstantiores. Nihil autem in cibis omnibus ad boni succi generationē tam peruenit, quā si probè in ventriculo cōcoquantur: hæc siquidem & secundam, quæ in iecore & venis fit, & tertiā, quæ in particulis quæ nutriuntur, perficitur, facilius concoctionem admittunt. Fit enim nutritio, alimentum secundum qualitatē mutato, & particulis quæ nutriuntur assimilato. Ceterū præparata præcoctis, cōmodo transmutantur, q. curata, cūm ad inuicem cōcoctiones succedant. Cunctis igitur corporis partibus iecur alimentum præparat, illi ventriculo, huic os, ori ari

aliquæ glandes.

Castanæ.

Panicum facile sece obstruit. Dulcis cibo, quæ mala inter datant.

Fribiles cibi. Panicum. Milium.

Semia præstā iora quæst.

Pristina quæ præstantior.

Triticum. Præstā ad reponendum ac priores. Cucurbita. Ficus.

Præstā qui succi non possunt.

Ficus. Cucurbita.

Concoctio tritici.

Nutritio quæ modo fit. Præstā meo iam præparata in quibus cruda.

Concoctio tritici.

Intraora aut
malum.

Cauda.

Colla volatili.

Ventriculi pul-
monum infir-
mitas.
Anserina car-
nen.
Struthocame-
lorum partes.
Anseri.
Oculi.

Sect.
Porcelli.
Saxi a caro.
Hircina.
Vulpina.
Agmina.

Pyrena.

Fraxinorum.

Faba inflato-
nis gignunt.
Pis.

Lentes.

Oculi Delicti.
Circule.
Olyra.
Tyche.
Pasciam.
Miliam.
Quer.

Lupini.

Castanea.

Hirci fœtus
si corrumpantur
in ventre fœ-
tus letaliter ve-
neno redduntur.
Ficus. Vae.
Carica quan-
do putrescit gi-
gnunt.

obfionatrix, quæ variis modis concinnat cibos:
quibus denique omnibus gubernatrix natura fru-
ctiferas plantas disponit. At ventriculi, vultus,
intestinæ animalium, quod duntaxat subtrahantur
ro constant, et etiam cœcæ difficultiora, nec ad-
deò boni succi sunt, nec tam apta ad nutriendū.
Sed cauda sunt his quosq; duntaxat: reliqua verò
in ipsi, quæ ad concoctionem & nutritionem spe-
ctant, duritiei proportionem respondent: hoc ta-
men excepto, quod morionis causa minime ex-
crementis redvndant. Cum his volatiliū colla-
ta, similitudinem quandam habent. Ventriculi
pedetibus & volatiliū, maxime inter se differunt.
Namq; ex volatilibus crassius duriusq; est, & conco-
ctui difficilis: at si coquatur, vberius nutrit.
Gallinæ & anseris præstantissimus est. Cetera
verò anserine partes, alia exceptis, sunt duræ, &
excrementosæ, nec facile concoctionem admittunt.
Struthocamelorum membra omnia, dura, ex-
crementaria, & cœcæ sunt difficultia. Aunū car-
niglo & sicca est, & minime nutrit: eorum cutis
exterior tenuis aridiusq; ægei item cœcoquitur, &
parcissime nutrit. Oculi a paucis eduntur: consistunt
enim substantia diluissimâ. Ceterū eorum mus-
culi tantum facillimè cœcoquantur. Ex asinan-
ribus quorū natura est ad gignendos bonos hu-
mores aptissima, ius mediocriter iam ætatis ha-
bentur. Caro ex porcellis patuulis, excrementis
scatur. Itaq; ex pedetibus animalibus fœtus caro
cibus prolantissimus est: deinde hircina, mox
vulpina. Agmina verò, humida, tum lentorem,
mucorēq; in se habere censeatur. A ceteris pede-
stibus juvenis, meo iudicio, abstinere, quibus bo-
ni succi generantur animi curamq; intendit. Pri-
mana probè ex optimo hordeo confecta, inter ca-
baria omnia prorsus omni uoxa caret: nutrit ta-
men quā panis minus. Fraxinorum nō boni
succi est, si quis eo liberalius utatur. Pisanam ve-
rò, etsi quomodiā faneratè sumptis, nō idcirco
boni succi generationē impedit. Idē quoq;
de fabis dicere, cum nec mali sint succi, nec ob-
vium illam detergendi, quam habent, obstru-
tiones faciunt, nisi insationes parerēt. Apisum ex-
tendi quidē vim nō æquē habet, ac faba: sed
insatione caret. Lentes & vitosi succi, & melan-
cholici sunt. Oculi præterea & delicti his quæ
diximus deteriores, & cicerculis meliores habet-
ur. Post hordeum olyra anumeranda est: post
hæc tyche. A panico prorsus abstineas. Huic mi-
lium consimilis est generis, sed minus malū. Ce-
cer egregie nutrit, sed nec boni succi est, & insat-
is minus q; faba, semēq; auger, ac veniens desi-
derium. Lupinus nō mali, sed crassi succi est, pro-
pterea nutrit egregiè. Fructus quos arbores se-
runt, omnes fere mali sunt succi, castaneis tamē
exceptis, quæ si in ventriculo concoquantur, ef-
ficaciter nutriunt: atq; ex crassi quidem, nunq; au-
tem sunt mali succi. Ceterum qui fructus horæ
appellatur, humorem vinosum gignunt: quod si
forte in ventriculo corrumpantur, similes leza-
libus venenis redduntur. At ficus & vix ceteris
autumnalibus fructibus sunt præstantiores:
Quippe maturæ ficus fere innoxia sunt: vix
deinde, & ex quidem appensæ. Verum carica, si
diutius immoretur in corpore, mali sunt suc-

ci, & pediculorum copiam producant. Cum nu-
cibus autem sumptis, cibi præstantissimi sunt,
cum amygdalis: similiter: sed cum his obstru-
ctioes aperiant, non tamen ita bonum succum
præstant, non timentq; verum mæscuntur cum nu-
cibus. Sunt qui caricas cum rura nucibusq; præ-
sumptas, venenis vniuersis adversari fateantur.
Reliqua arborum fructus mali succi sunt, nig po-
tissimum, quos sylvestres plantæ & fructus te-
runt. Sed malis, piris, punicisq; et mespilis, non
alimentoſi, sed medicamentosi loco utuntur, ad
ventriculi firmitudinē. Inter fructus quoq; cucu-
meris, pepones, melopeponesq; cōnumerantur:
quorum nullus boni succi est. Quod si celeriter
perfici, digerit nō possint, in succum fere lezali-
bus venenis similem convertuntur. Cucurbita
duntaxat ex huiusmodi fructibus damanda
nō est. Si tamen in ventriculo corrumpatur, ipsa
etiam malum succum producit. Mora idem, si
petulantius citò, & priusq; corrumpatur transier-
int, innoxia sunt: nisi ut quispiam liberalius utatur.
Ex oleraceis nihil est quod bonū succum
præstet. Lactuca tamen in his quæ boni malicie
succi sunt, medicotiter se habet. Post illam malu-
ia habetur. Post hanc portulaca, triplex, blitū,
rumex. Sed lactuca agreſtis, chondrilla, cantax,
gingidium, feris, cichorium, aliq; ex oleraceis
agreſtibus omnia, succum vinosissimū gignunt.
Radices olerum in se æconomia habentium, ut
allū, cepæ, porri, rapiani, & pascinæ sylvestris,
malum succū producant. Sed æri, caripæ radix, &
capitū in his quæ boni prauis succi sunt, media ha-
beret. Aues piscisq; fere omnes, boni succi cen-
sentur, exceptis lacuſtribus, palustribus, et qui in
imundis aluminibus atq; turbidis degunt. Mi-
nus enim hæc natantibus sese exercēt, vitatōſq;
aſſe, & prauo vitibus genere utuntur. Quæ verò
in meliores aquas se transferūt, adhuc animalia
ea us deteriora sunt, quæ puro ex mari viciant.
Omnia si quidem propemodū animatū, quæ in
ea mans parte veliantur, quæ dulci aquæ se non
immiscet, innoxia sunt: ut pelagica, & taxanila,
quæ tum ad bonos humores gignendos, tum ad
guitus ipsius voluptatē, ceteris multo sunt præ-
stantiora. Horū itaq; frequēs vſus, transſusus est.
Nonnulla præterea sunt quæ duplici ex humore
viūt, tum marino, tum dulci: ut lupi, capirones,
canceri, gobi, murene, anguilla: Sed quæ puro
ex mari victū perit, ea & boni odoris sunt, & gu-
ſui suavia: pinguedinis autē aut nihilominus,
vel paucissimū in se continent: diuissimq; a putredine
illata durant (quibus signis discernuntur ab
aliis) præsertim si nunc obducatur. Ad hunc enim
modum quæ duntaxat sine carne, præstantiores
evadunt. Murene igitur ex aquis impuris, pesti-
ma. Anguilla nunq; boni succi succi, vel si in pu-
ro humore venierit, nedū in eo qui purgamen-
ta vrbium recipit. Secundū quoq; locorū pasto-
raz, pisces & meliores & deteriores sunt: quod
odore & gustu explorabis facile. Ceterum neq;
auxiliorū, neq; ex aliam salubrium ciborū nomi-
nam cōsequetur, q; illorū vires accuratissime
nont, nisi corporū quoq; atq; particularū natu-
ras, quorū causa cibi experietur, agnoscat. Ex his
enim nonnulla sunt densa, & quæ spirare non
possunt.

Carica cum rura
nucibusq;
presumptis,
adversari ven-
enis.
Ficus quæ
in ventriculo
corrumpatur,
similes leza-
libus.
Cucurbita
duntaxat ex
huiusmodi
fructibus
damanda
non est.

Mora.

Oleracea om-
nia - cacocym-
ia.
Olerum rura
speciei.

Radix olerum
armonia hæ-
bentium.

Aves. Piscis.

Pelagici piscis
taxanila.

Pisces duplici
ex aquis vivunt.
Pisces puro ex
mari vitium
capirones.

Murene.
Anguilla nun-
quā boni succi
succi.

Corporum dif-
ferentia.

possunt laxa nonnulla, & que inaniuntur facili-
tatemque eausam huiusmodi illa alimēto egent,
hæc faciliore. Alia tamen glutinosa sunt, alia tenacia,
alia parcius, alia vberius alimentū desiderat. Sim-
uliter, quibus sanguis est admodū melanco-
licus, humidi calidique cibi sunt dandi: quibus ve-
rō biliosior, frigidi & humidi. Verū ubi pitui-
tiosus exsistit, vires tunc opus est qui calefaciendi
siccandique cibis uterentur. Qui probo sanguine
abundant, alendi sunt parcius us cibis, qui natu-
ram medium fortiantur, sic vt neq; aliqua prima-
rum qualitarum excellant, nec crassus aut tennis,
nec lentus aut aridus, aut deniq; friabiles sint. Por-
tō ariditas, in duris valdeq; siccis rebus: friabili-
tas autem, in mollioribus, mediisq; inter humida
& sicca inuenitur. Commune tamen vtriq; est, vt
tenaci lentore careat omnino. Ex vinis que a-
quosa tenuiūq; sunt, vinas mouent, & paucissi-
mū sunt nutrimenti. crassa verō, vt Tietrum &
Scythiū, que absolute dulcedinis sunt, non le-
uiter quidem nutriunt. Calicum vinum, austērū
simul & dulce existit. Quæ Aegia & Perperine
proveniunt, medium inter dulcem & exquisitē
astringentem qualitate, saporem reddunt: nigra-
que lux omnia sunt. Nulla enim vina inuenies
crassa pariter & dulcia, quæ nigra non sint. Alba
vina laudatūq; dulcia sunt, sed alia austera &
crassa, alia aquosa & tenuia. Ex fluxu autem, ru-
tilisq;, nonnulla mediocriter dulcia sunt, sicuti
Hippodamantiū, Faustinum, Falernū: nonnul-
la omnino dulcedine carent. Sunt autem his ru-
bra crassiora, & ex rubris, quæ proxima colore
ipso nigris sunt. Nutriunt autē hæc omnia cras-
titudinis proportionē: eamq; ob causam, qui in-
digent refectione, vt dulce vinū potent, suaden-
di sunt: ac tum præcipue, cum horum iecur, lien,
& renes, vitio penitus carent. Verū cui crassius
succus per venas redvdatur, tenuis substantiæ vi-
num: cui frigidus, acris & vctusum: cui non fri-
gidus, quod neq; acris neq; vctusum sit, accom-
modatum est. Ad bonos autē humores gignen-
dos, odoratū præstantius: sed tamen caput ten-
tat. Tenuē, ciendæ vinx magis idoneum, capi-
tū nullam inferit noxam. Viranda quæ crassa si-
mul, malique odoris, gustuiq; ingrata & austera
sunt. Ex vinis ipbanisimū succi Falernū habetur,
potissimūq; id qd dulcius. Ad alia fluxiones si-
stendas, austēris vnum vinis: quæ ad nullos a-
lios vsus accommodare solemus. Ceterū in ipso-
rum vinorū exhibitione, non minus regionum,
temporū, exercitiorūq;, quā affeclū, & tem-
peramentū hominū, ratio est habenda, sic vt mo-
derata consuetudine simplicia, immoderata cor-
rigamus contrariis. Temperaturis igitur frigi-
dioribus, rutilū dulcēq; vinū, vtpote calidū,
accommodari est. Contrariū verō, temperamen-
tis atq; dispositionibus calidis: quod illud calefa-
ciat impense, capitiq; dolores, & febres facie-
li inferat, neuōsūq; nonnullū laxat. Quod autē
crassa vina dulcēq; delicatū alium, nemini ob-
scuro est. Multum etenim, licet coquantur ægre,
crassumque succum & insulas gignat, crassum
tamen subduat: id quod si interdum efficere ne-
queat, mirum in modum nocet. Viranda ergo
quæ nimis vctusū sunt, nimisve recentia. Namq;

illa præter modum, hæc nullatenus, quando res
centia fuerint, calfaciunt: quæ tantum ad aliū
aliquem vsū cibis concoquendis afferunt, vt
enam ipsamē conficiantur ægerminē. Præterea
nec comode per alium transiunt, nec digerun-
tur, nec vinas mouent, nec sanguinis confectio-
ni nutritioniq; idonea sunt. Sepe etiam, vt aqua;
in ventre suspensa remanēt: vt si paulo amplius
ex us hausens, facillimē coaccant. Sed ex recen-
tibus vinas genus illud duntaxat turō bibitur;
quod tenuis substantiæ est: sicuti ex Italicis, Cau-
chanum, Albanum, & ex Cæciliis Thuficis non-
nulla. Aminxū quoq; quod in eo colle nascitur
qui Neapoli immittit, citō vt bibatur idoneum
redditur: quale apud nos in Asia est Tibinū, Ari-
sinum, & Turaczenum. Quæ sanē tenuia, candi-
da, & aquosa existunt, idēq; oligophora vocan-
tur. Et quemadmodū nulla vina, cum calida po-
tēstare sint, replent protinus caput, sic illa, nempe
tenuia, & aquosa, lenitēq; astringentia, non
modō capiti innoxia sunt, sed etiam leues eos ad
pitis dolores nonnunquam tollunt, qui ab hu-
moribus in ventriculo collectis proficiuntur:
Quin & aquæ pono, vinum præcipue in se ha-
beatis, nonnullis capitis dolores infert: nam &
ipsa corrumpitur, & naturale robur exoluit. Quo
fit, vt vbi ventriculum invalidum reddidit, in ea
us eius partes ex reliquo corpore famies qua-
dam biliosa defluere consentient, more eorum
quæ premit inedia. Quibus sanē offensis, mo-
xūq;, dictū vinū, sui temperamētū ratione, ho-
minem acturū liberat: pauloq; post, vbi firma-
tur ventriculū, quæ illi noxia sunt, ad partes in-
fernas desert. Hæc ergo qui calido admodū tem-
peramento sunt, aquæ potus longe accommoda-
tior est vino: quod vtiq; si interdū propinare ex-
pediat, sit quidem tenue, lenitēq; austērū. Ex vi-
nis itaq; quod verūsimū est, adeo ab albo &
austero, necnō recente & crasso distinguatur, vt
illud quidem efficacissimē calefaciat, sensibilem
hoc retingentē facultatem obtineat. Dulcissi-
mum autē acerrimūq; mei, eximie estimandū
nis est. Verū cuiuslibet generis mel calefaciendi
vires fortitur, sumptūq; ad calidū corporibus
facile in bilem vertitur. Idcirco pituitosis admo-
dum nātis, itaq; & seuo consēctis, vtiliter
datur: frigidis quoq; morbis accommodatissimū
est. Acerū multum, hoc cil, oxymel, sanitas tuen-
dæ grana etiam naturisq; omnibus vtilissi-
mum est: siquidē obstruētes omnes disciunt,
astringētesq; meatus ita aperit, vt nulla in parte
crassū glutinosūq; succi adhaerescant. Quare me-
dicamenta salubria, tenuanda omnia in se pô-
stare habēt, tutioriq; ad valitudinē tuendam
essentur, quā quæ crassiores humores gignūt:
sed bona habitudine, robūq; efficere nequeūt.
Viranda autē prout quæ vniū sunt succi, præ-
terquam æstate, cum languentium corporū sic-
citas & calori occurrunt ea. Hæc enim hoc
ipso tempore, mīla, pruna, cerasa, morisq; ido-
nea sunt: item cucumeres, pepones, melopepo-
nēq; sed parcius his vti cōuenit. Dantur quoq;
præcocta, persica, & quæ a Romanis melle dici-
tur, refrigerata tamen: necnon ipsa lactis, atq;
quæ cibaria ex lacte confecta. Sic ut in frigidis,

Vina yctasta
caliditate in apte
sunt: vtilia ad
laxandum
Vinarum rores
laxantia.

Aminxū vi-
num.

Aquæ potus
quæ mala
infert.

Aquæ potus
quibus com-
modatur.

Bile omne calfa-
ciat, atq; in cor-
poribus calidis
bilis sit. Mei
quibus com-
modatur.

Oxymel etia-
m vti-
le est omnib;
vitiis.

Cibi estote
admodū.

Natura diuer-
sa, diuersa esse
alendi velut
tenuia.

Ariditas in
quibus alendi.
Friabilitas
quibus.
Vina alia et
tenuia mou-
ent vinas.
Vinosi diffi-
cillima.

Vinum minus
crassum & dul-
ce, esse astringen-

Vinum dulce
quibus sit pro-
prium.

Vinum adora-
tum caput ten-
tat.

Vinum tenue
mouet vinas.

Moderata esse
cōsuetudine si-
milia, immod-
erata a corre-
da contrariis.

Multum delice-
re alium.

Ad illud vi-
tium ratio ex-
tenuant.

& cucurbitis, ita affectus accommodat sunt. Pri-
dens tamen vir, ad refrigerandos ætus ex bal-
neis rediens, epota prius aqua, mox vino medio-
criter a quofo, usq; per vomitum redditus, lactu-
cam edat, que innoxia est, similes vires habet re-
frigeranda. Sumat postea fullos pedes bene de-
coctos, ex aceto & garo: itemq; alas gallinæ vel
anseris, & eisdem etiam ventriculum, necnon
piscis nonnullos frisos, ex iis qui molli sunt car-
ne. Danda item ex olenibus quæ mali succi non
sunt, sicuti malua cucurbitaque. Vinum postea,
vbi frigida aqua dilutum sit, potet. Mili sa-
pius similes ætus & calores persequi, pisanæ
cremor bene refrigeratus fuit sana. Sunt qui ni-
ue refrigerentur. Sed hæc illa præcepta tradun-
tur, qui assiduos occupationibus impediuntur
qui verò huiusmodi sunt solani negotii, si exer-
citatione vti solent, quamvis sit frigidus po-
ta indigent. Qui minime exercitantur, summa
mitate cum vehementi calore vrgentur, aquam
fontanæ bibant, ab usq; niuis abstineant. Hæc
liquidum, quamvis protinus nullam corpori-
bus suum lesionem sensibilem inferat, sen-
sim tamen, occulteque crescent vitiis, cum iam ex-
tra progressu temporis incidunt, articulos, vi-
scera, nervosq; iis morbis vexat, qui vel difficul-
ter admodum, vel omnino tolli nō possunt: ni-
mirum semper imbecilliori particula, facili quan-
cumq; excipiente lesionem. Quod autem vitio-
si humores morbos gignant, cruditas assidua
maximè in causa est. Ea autem cruditas de-
terior est aliis, quam vitiosis succi cibaria effecerit.
Quæ cum duplici modo se habeant, si tenuem
quidem succum reddant, acutos morbos cum
malignis quosq; febribus invehunt: succordibus
vitiis in vnam duntaxat particulam decumben-
te, tunc erysipelata, herpes, aliæq; affectiones
calide oriuntur. Si vero crassum succum effi-
ciant, articulos & rem vitiis, podagras, an-
helationes, tum lienis ictericisq; scorbis affe-
ctus gignantur. At quibus malus corporis hu-
mor melancholicus fuerit, affectus melancholi-
ci oriuntur. Sed ex humoribus mixtis, mixtæ
affectiones proveniunt.

GAL. DE ATTENUANTE VICTVS RATIONE LIB. 414



Vm victus ratio attenuant pleriq; diu-
rnis morbis, vt arthritidi, dys-
pnoæ, tumoribus lienis & hepatis, necnon morbo comitiali, pleu-
ritide, aded conferat, vitiis truci-
ne vilo ad medicamentum, sublati sepe huius-
modi operæ precium videtur aliquid de ipsa persequi-
bere. Vocant autem eam attenuantem, quæ ad
modum incrassantem, quæ illi contraria existit:
pro eo humoris scilicet, quem vitiis in nostris
corporibus gignit. Etenim olfactus & gustus,
mentem nostram ad omnes eiusmodi cibos dis-
cernendos, satis ab vnde instruunt. Quippe quæ
sensui nostros pungunt & mordicant, ea omnia
constat esse acra, & quæ succos crassos
queat. Quæ etiâ, si largius æquo sumpta fuerint,

ventriculū mordicant, ciborūq; ita usum ma-
gnam inducunt, & halitus emittunt. Pluri-
ma autem eorū vitiis & calores graueolentes
& acres promouent: alia autem diuellunt, ero-
dunt atq; pertundunt. Ceterū corpora in quib-
us humores frigidi, crassi & leni redvdant,
huiusmodi cibos vti maiori ex parte iuantur.
Nemo igitur est qui allium, cepam, nasturtium,
porrum, & sinapi, in genere ignore esse tenuan-
tium: post illa autem, silybriū, pyrethrum, origa-
num, calamintum, silybriū, pulegium, fatu-
retia, thymū: quæ omnia viridia quidem iuan-
duntur: exiccata verò, iam non amplius sunt ci-
bi, sed medicamenta. In summa, omne quod sic-
cum est, viridi valen-ius existit. Eorū verò quæ
seca non sunt, maturiora minus maturis: & quæ
in montibus & locis siccis proveniunt, iis quæ
in campis, planis, hortis, & paludibus cre-
scent, sunt fortiora. Prædictis autem ordines pro-
xima est capparis, & terebinthi fractus: hæc au-
tem eruca, sium, apium, petroselinum, orminū,
raphanus, brassica, & beta. Mili verò & blitū,
& amplex, tametsi iis specie vitiis proxima, facul-
tatis tamen dissidens: aqua enim sunt, mihi
mily acris facultatis sortitur: quomodo tucur-
bitz, citrulli, melones, melopepones, & pruna:
humida liquide sunt hæc omnia, necnō frigida,
& puerosa, potissimū si cruda & non elixa man-
dantur. Omnia igitur tenera & incrementa, fa-
cultatis moderata existunt. Quo fit vt plera-
que medicamenta, dum oriuntur & adolefunt,
non secus ac cibi mandantur: vt silypiū, sinapis,
pyrethri, & iringis foliones, quæ omnia vbi com-
maturetur, magnam habent vim thicidendi.
Tenuant verò admodum, dum oriuntur, atque
adolefunt. Pari modo & vitia, priusquam ex-
icetur est esculentia: præterea faciculus, ruta,
coriandrum, anethum, eisdem cum illis vitiis
speciei, evidentiq; etiam faciculant. At verò a-
grestia olera, iuter ea quæ diximus, naturam me-
diam sortiuntur. Si quid igitur olfactui, vt gas-
tuit, aut vtriq; simul, acre, mordicans & calidum
apparebit, scito facultatem id habere tenuandi,
atq; incidendi. Ad hæc, si quid olfactui bouū o-
dorem inferens, aromatis speciem repræsentet,
id quoq; viribus calidum esse oportet: sed non
acutè ac mordicantia & rodentia, & insigniter
calfaciencia. Incidunt præterea & quæ saporem
habent nitrosum, aut salsum: quoniam plurima enī
alium deiciunt, nec minus in amara, facultate
tenuandi sunt prædicta. Incidendi autē in illis fa-
cultas, aceto & melle inest, oleo verò minuitur.
Mixta autem, porro, medix quodammodo
est facultatis: ab eo autem elix & chamædaphne
vtriq; nō multum differunt. Stomacho autem
minus prædictis comodat vitiis alba, & viticia,
& spinæ asparagi: omnium autem maximè auste-
ri atq; astringentes, quales sunt vitis, ac rubi. Spl-
ni verò asparagi alium deicit. Iuuant enī ven-
triculū, facultatisq; est mediocritas, & palme ger-
men. Qui asparagi amaroris quipoll præferunt,
quiltō a maiores, tantō iis sunt sicciores, & in-
cidentes magis. Semina sunt facultate suæ plantæ
similia: nisi quod illis prorsus ficiora sunt, ma-
gisq; ad calorem propensā, eorū magis tenuantia.

Acra largum
simpla, quæ
mala sunt,

Acra quæ
vitiis.

Tenuantia me-
dicamenta.

Sicca esse val-
tiora viridi-
bus.

Milia esse ne-
cessaria com-
positibus.

Cruditæ qua
fit alius dete-
rior.

Affectus à te-
nuis flouens et
li.

Affectus à cras-
sa flouens.

Tenuant vi-
tium ratio quo-
bus affectibus
e. n. r. t.

Olfactus.
Gustus.

Acra quæ
dantur.

Acra habere
facilem me-
dicamentum.

Tenuandi fa-
cultatem aceto
incendo auge-
re melle, reman-
entem oleo.

Palme ger-
men.

Semina esse fa-
cultatem suam
similia.

Non

*Sapiens est im-
mune a peccato
iuramentum.
Sapiens Deo
similis.*

à te perperam agitentur: id quod certe non pro-
bo. Est autē sapiēs omnino à peccato immunis:
ac proinde philosophi, non hominē, sed Deo si-
mitem sapientē effe dixerunt. At tu repente Deo
similis nunquam effici poteris. Ceterum si ei qui
te reprehenderit grātas egeris, pōt autē diligen-
ter tecū expendere, verēne te ille, an falsō incre-
pauerit, ex ea re senties te magnā percipere vili-
tatem. Si verō idem assidue egeris, tibi animus
sit ad meliorem frugem te morisq; tuos compo-
nere, faciliē absolutus evaseris. Ceterū hæc sit tibi
exercitatio præcipua, vt calumnias & contumelias

*Contumelias
esse oportet firmas
animo.*

requo animo feras: quod vbi feceris, atq; sedatus fueris,
habuerisq; tuas perturbationes perpēctas, tum aggredior respōdere calumnias
toribus: quorū audis rationibus, quamvis dissimē
cum eis lites tuas cōponas: atq; ita rem omnē
agas, ac si pædagogis mox sis redditurus ratio-
nem. Porro si quis sit vel apprimē potens, vel opulē-
tissimus, qui velut in virā egregiū evadere, habe-
req; admonitoris liberos, necessum est illū maiē
statē relinquitur hæ præsertim temporibus, in qui-
bus nullus adest Diogenes, qui vel opulētissimū
Principi, vel alicui Monarchæ sit ipsam veri-
tatē dicturus. His autē monitoribus duntaxat cre-
dendum est, qui & inculpatissimē vixerint, & æ-
tate provēcti sunt. Cōm autē nullus sine peccatis,
aut sine affectibus vivat, vel si optima quis natura
sit præditus, sed necessum sit vñ quēq; labi & er-
rare in aliquibus, eōq; etiam magis, quō iunior
quispiā fuerit, haud dubiē quisq; nostrū exercita-
tione per totā indiget vitā, vt vir perfectus red-
datur. Nec tamen detereri quempiam oportet,
quod minus seipsum conetur meliorē facere, enī
si iam factus exagenarius, sentiat sibi animū vi-
tio immedicabili deformari. Nā tamen nobis
cōpertū sit, animū nō posse sapientia conse-
qui: id quod forte liceret etiā, si tēneris illū ex-
coleremus: at salte ne totū illū omnino deformē
geramus, vt Therites corpus, sedulū nobis cu-
randum est. Extremū si supremū quispiā animi ex-
cellentis assequi laudat quāquam possit, ac certe
post supremos illos sapientes, in secundis, aut ter-
tiis, aut quartis vt collocetur, id facere lōgiori tē-
pore atq; assidua exercitacione poterit. Primū
igitur satis erit, si neq; in deo, male dicta iactabis,
neq; calibus feries, aut dentibus aggredieris la-
pides, neq; effracto vultu intueberis, sed intra te
ipsum cōnabis, vt occultabris ita cundis. Nam
ab ira prius liberari simulac quis velit, nō cōti-
nuō quis potest: cōprimere autē illius perturba-
tionis incēperantia, atq; insolentia potest. Quod
remediū si sepius quis viurpauit, agnoscat tē-
dem adeo seipsum minus quā antea propellum
ad irā, vt ne ob magnas quidē causas irasci pos-
sit. Porro feruorē me vñquā mea manu verba-
tū fuisse, nō memini: id quod etiā pater meus
perpetuō cauit, qui complures amicos increpare
solitus erat, & ferociter furem in famulos. Id
igitur quod in nobis est iracundiz ac furoris, ra-
tione cōficere atq; erudire oportet: erudire au-
tē exercitacione improba. Turpe enim est quem-
piam multos annos cōtinenter laborare, exerce-
rig, vt vel medicus, vel grāmaticus fiat: vt autē
in virū bonū evadat, in tanto curriculo rēporis

*Tempus su-
um deperit
iracundiam
Galenus.*

*Exercitatio
per totam vitā
requirit, vt qui
vir perfectus
reddatur.*

*Iracundiam si
non vincit, ac
certi possit re-
primi a nobis.*

*Galenus in ser-
mone de
vitiis.*

nunquam sibi quicquā laboris assumere. Ergo
ne tuus ipsius manibus serum vedas, nec quā-
diu iratus fueris, alij vt id faciat imperes, sed iū-
postem differas. Postquam enim furor refingit
ratus fueris, prudētius, temperantius dispicies;
quot verberis, famulus plectendus sit dignus:
nisi fortē melius esse videatur, inuito frān con-
cessa venia, negotio ipsū transigere, & vbi lo-
rum afferri nūllus, tum verbus duntaxat corri-
gere, minitariq; te non amplius cōdonaturum,
si rursus ille idem scelus patravit. Præstat itaq; te
facere omnia quæ facis, vbi impetus ille ani-
mi deferbuerit: quo tempore iam ratione opti-
mante, punitionis modum sis inuenturus: cum ali-
mentum impetus irascētis nūllū ab infamia, vel d
furore differat. Quamobrem à veteribus haud
immeritō animi affectus hæc quinque appellari
fuerunt: metor videlicet, ira, exandescētia, cu-
piditas, metusq;. Singulis itaq; diebus atque ho-
ris habere hanc in promptu opinionem ope-
rari, quod præstat quidem vñ quicquā se se ex-
hibere dignum, qui egregius ac frugi ab omni-
bus appelleret: hoc autem fieri nō posse vt con-
tingat nobis, nisi eum, qui singula errata indi-
cet, censorē admonitorēq; habuerimus: quem
sanē ipsum nostrorū peccatorum indicem, & ser-
uatorem nostrum, & amicū maximū exultima-
re convenit. Qui quidem & si tibi visus fuerit
aliquid falsā crimina obicere, ne ob id quidem
irasci oportet: & quōd multo melius quā tu,
ille singula peccata tui perspicere possit: & quod
licet falsum quandoq; tui crimen obiciat, in eo
tamen tibi sit vtilis, quōd te ad eorum quæ agis
diligentiorē obseruationem excitet. Curabis
autem perpetuū, vt quāvis dignus sis, quantū fa-
ciendus, à teipso, non ab alio, accipias: habēsq;
in memoria semper, quanta sit eorum qui irascū-
tur, deformitas animi, quantūq; rursus venustas
eorum qui sine ira viuunt. Omnibus accusandi
te ipsum potestatem facias, grātiāq; habearis nō
adulantis, sed oburgantis potius. Patere autem
semper domicilij tui fores, vt liceat tuis
de familiaribus omni tempore ingredi: cōm sic
affecto, atq; omnia rite facienti, verendum tibi
non sit, ne ab ingrediētib; aliquo magnō scelerē
implicitus deprehendaris. Volo itaq; vt non
modō alios omnes, sed teipsum in primis etiam
verearis, illiq; auscultes qui dixit: Omnū autem
maximē tuipsum te pudeat. Quod sanē si feceris,
poteris quandoque expertem illam rationis
vim, quā exandescimas, quasi feram quandam
reprimere, manū efacerēq;. Vt autem longē rursū
pessimū est, hominem iracundiā percitum in-
temperanter, aliquid agere, sic etiam ob amo-
rem, vinūq; & crapulæ cupiditatem: quæ omnia
facultatis appetitoris sunt affectus & opera, ob
quæ homo non iam equo vel canē, disciplinz ca-
pacibus, evadit similis, vel vñ ob illa priora, sed
vel petulanti apro, vel hirco, vel cuiuspiā ag-
gressi bellæ, quæ manifestari non possit. Quocir-
ca libidō hac perducit ad obediētiā non po-
test, quæ admodum illa poterat: castigari autē
quodammodo potest, si rebus potiri ac frui pro-
hibeatur, quarum appetens est. Nam si ponatur,
erefeit, maiōq; ac vehementior fit. Si cū caligetur,
tenus

*Abiit huius
modi iracundia*

*Furore refingit
ratus proderat
multis vñ
delectum fuit.*

*Exandescētia
est furor*

*Exandescētia
est furor*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

*Irascētia com-
positum nihil ab
infamia differt
re. Afflictus animi
signum.*

resultis atq; imbecilla redditur, ac sic imbecillitate coacta, nō vltro, ipsam rationē sequitur, veluti quoddam macropsū. Duplex itaq; in nobis est animi vis experta rationis: vna, cuius & citro excandescere & irasci est officium: altera, quæ ad id quod ipsi iucundum, suauēq; visum sit, percrepserit, antequam vtile ne sit atq; honestū, an noxium & turpe, cognoscere. Hanc igitur, quæ vehemensima est, cohibere actum oportet, priusquā vbi roremētū acceperit, visibus inuictā inextinguibilēq; se exhibeat: tunc enim vel si volueris, non poteris illam coēscere, sed dices (quod audiam olim quendam amantē) velle te quidem desinere, at nō posse. Quippe vt nōnulla corporis vna propter magnitudinē insanabilia sunt: sic vis illa, cuius est temere coēscere, plerumq; amore accenditur insanabili, nō corporum modo quæ sunt formosa, aut terū quæ pertineat ad venerē, sed etiā crapulæ & violentiæ, itēq; ob scēnitatē quæ præter naturam patitur. Quæ igitur de ira & exandescētia vincenda dixi, eandem puta de aliis affectibus me dixisse. Quæ omnia nbi sapius reuocanda sūt mēmoriā sunt, & si nō posui tam crebro, arisatē matutinis horis, semper anteq; aliquid eorū quæ acturus es aggrediaris, & vespertinis anteq; cubitū eas. Ego siquidem cōsueui admonitōnis hās, primū quidem bis legere singulis diebus, post verō etiam ore enūciare. Neq; autē fari esse putas ad ira vna dum taxat liberū te conseruare, nisi enā ab omni edacitate, violentia, nequitia, curiositate, & inuidia, te purū integrūq; cōserues. Nam nec propter sinū decet, sordentiū instar, totum calicem exhaurire: nec propter famem in conspectu omnī, insanabiliter ipsum ventrē explere: danda opera est, vt omnibus vna cētātib; minus obsonij assumamus, & a cibis galam nimīū irritantibus abstinamus: moderatē interim vicescētia, quæ salubria habentur. Progressū verō tēporis, ne respicere quidem te ad conuiuantes velim: (magis quippe nō fuerit, si in cibo & potu illis conuineator esse videris) verū, si hoc honore te aspicere decreuisti, cura sedulo, vt continētus viuas hodie q; heri. Quod si feceris, leuiter haud dubie te indices ab iis, quæ dicit, male maior negotio abstinere: maximiq; persuaderis lenitia, si quando verus modestus, temperantitq; amator extiteris. Sic enim gaudet, quicūq; in ea re primū uincit, cum amore flagdit, si plusquā dissoluti homines consecuti sinus modestus, probitatis, & continētis: sed primū quidem eos qui hūc student virtutibus, superare conabimur (est enim hec concertatio iteq; simulatio pulcherrima) post verō, etiam nō spoliō: idē memores semper pulcherrimorū dictionū, quorū vel hoc in primis est vōum: Delige optimum vitæ genus, quod reddet consuetudo iucundum. Quænam modo igitur cūm te ad vitiū iracundiæ exercere iubeam, tum argumentū vti poteris, te aliquid profecisse, quod nō amplius te exandescēcentem cerneres: ita in iis quæ ad modestiam pertinent, hoc indicio intelliges quantū profeceris, quod nec cupiditate quidem suauissimarū rerum tangaris. Exterū ad mo-

destiam vna est via per cōtinentiam. Hoc siquidem modestus superat continētē, quod illi nec cupit quidē amplius titillantes palatū cibos. Laboriosa tamē ab initio via hūc est & aspera, quædemodū ceteræ omnes honestorū studiorū exercitationes. Verū si pro malitia cupis habere virtutē, ac pro voluptatibus corporis, tranquillitatem animi: per continētē, ratione doce, ad modestiam gloriandā oportet. Ar verō & cōtentionis, & gloriæ, & principatus appetitio, animi planē est affectus, licet illis iam dictis minor. De inuidia atq; quid attinet dicere, cūm omnī sit vitiorum fœdissimū? Est enim inuidia, dolor ex alienis bonis conceptus. Sic itaq; id genus affectus omnes sunt dispungendi, vt ne radicē quidem eorū vltimā in nobis animis relinquamus. Nam ex iis quæ sic relinquuntur, solēt rursus aliquid pullulare, dum ipsū iam a nequitia & prauitate irrigatur. Porro natura in puerili etate ad vitam perficiendam, in cunctis plurimū potest: secundo autē loco, studia, exercitatio enīq; disciplinarū. Exterū ipsa puerorū ingeniā plurimū inter se differunt, cūm alia magis, alia minus virtutes ipsas scelerent: omnia tamen sunt vel maxime ad affectus propensā. Verū educatio puerorum, similis quodammodo est sedulitati, quæ in placons alendis vīmur. Siquidem, vel si optimis his plantarū sator & cultor, nunquā tamē efficit, vt rubus vult producat, quod natura illius talem a principio perfectionem capere nequeat. Rursus vites, quæ, quod ad ipsas pertinet, fructū ferre paratæ sunt, si neglexeris, reliquerisq; soli oaturæ curandas, aut multo deteriorē, aut foliō nullum edere fructum animadvertis. Mihi autē ingeniū quadam felicitate conigit, vt patrem ab omni iracundia alienum, iustissimum, frugalissimum, humanissimūq; haberem: at matrem vīq; adeo iracundū, vt interdū enīq; morderet ancillas, semperq; & vociferaretur, & cum patre contenderet, idq; longē quidē odiosius, quā Xantippe illa cum Socrate. Inter omnia potius admodum me parer, vt a nulla scēta cognomen sumerem: sed illas perpetuō artes ediscerem, per quas iustitiam, modestiam, animi magnitudinem, atq; prudentiam consequer. Laudant autem (dicebat mihi) virtutes has cūcti, tam et si sibi ipsa sint cōsita, nullam se harū habere: dāntq; operā pro vini, vt alis appareant fortes, modesti, iusti, & prudentes. Vt verō autē memoris sint atq; tristitiæ expertes, vel minimē tales esse videntur, id magno studio contendunt. Quare etiā hūc idem et in primis studendum esse, cui omnes mortales student, præq; omnibus aliā virtutibus, vñ hoc quærendum vis debebat. Quæ documenta paterna in hanc vsq; diem retineas, nec vltius scēta nomenclaturæ me addixi, neq; ob vltimā fortunæ vicissitudinē fui perturbatū animo. Quippe assuecit me pater gloriā & honorem contemnere, atque vno tantum, edinq; nudam veritatem suscipere. Soadebat etiā, ne ob vltimā pecuniæ iacturā maiore afficerer, quandū quæ reliqua essent, ad curandū corpus sufficerent. Hunc enim primū finem illis quæ possiderentur, statuebat, non efurire, non algere, nō sinū pati: quod si cū plura suppeteret, quā horum vīs

Viam ad modestiam esse rationem, per continētiam. Modestus quia in re continētis non superet. Via quæ ad virtutem ducit, laboriosa est.

Inuidia est in animo veteris sedulissimum inuidia est dolor ex alienis bonis conceptus.

Natura in puerili etate quod non habet ad virtutem formam.

Exercitatio discipularum plurimum potest ad virtutem adipsam. Puerilis ingeniū omnia esse ad affectus propensā. Puerorū educatio similis quodammodo est sedulitati.

Galeni pater nam Socrates, licet virtutibus dedicatus. Galeni mater iracunda.

Galeni vna sententia.

Dilectum primum finis quo sit.

Animi vis experta rationis est de plenis.

Concupiscentia, la facultate inmoderata.

Edendum esse, iheri & salubriter.

Continētis inuincendum esse, hūc quam boni.

Gaudet qui in ea re primū uincit, cum amore flagdit.

Concertatio pulcherrima quæ dicitur.

Consuetudine vultu intrinsecus, vna genus.

Via genus.

Via genus.

postulat, his finē ad eas res agendas, quæ honeste essent, esse vendit censetur. Nec melaret (ait bar ille) te fortunatū plus duplo quā ipse habeam, possidere, in nostrā hāc ciuitate nō mediocri honore esse præditū: vique adeo vt quædam maioris tibi causā futura sit, nullā videri, præter inexplēbilem ac summā quandam cupiditatem. Comparabat autem insatiabilem illam habendi libidīnē, voracitatē ventriculī, quā plus quā finis sit, ciborum ingeritur. Etenim cibo, vt dicebat, nulla alia causā egemus, nisi vt alamus corpus. Nutrit verō corpus, si bene concoctus fuerit: bene autem coquetur, si modicus. Nam si immodicus fuerit, concoctiōnē nō expe- rietur, sed vīus ipsius corrumpetur. Siquidem aut deiectus per inferiora, profusiōē alui exci- tabit: aut distributus per vniuersum corporis ha- bitum, malum intra venas humorē gignet. Quæ igitur in corpore didicisti, ad animū licet trans- feras: cuius inexhausta cupiditas, plura perpetu- 10 expent, q̄ ipse vīus postulet, vnicūq; omnis morōs atq; infirmitas est causā. Ea namq; accensī nōnulli, qui præsentū rerum inexplēbiles sunt, nunq; concupiscere desinūt, sed si duplum quip- iam habeant, triplū illō student acquirere. Tri- plū namq; quadruplū appetere incipiūt. Qui quidem nunq; q̄ proponunt eos, qui pauciora possident: sed illos tantū, qui plura: quos enī superare cōstāt. Quāq; certe multo sanus est ciuem in eo ceteris antecellere, quōd is quæ nunc habeat, sit omnino cōtēntus: id quod cer- 15 te (dicebat pater) in tua manu est. Contrā, diuiti- bus prætare, nō virtutis, sed fortunæ munus exi- sit, quæ plepurgē seruos atq; liberos facit longe diuitiores nobis, qui & generosi, & nobiles appel- lamur. Quōd si tu (quo in nostra repub. reperit- 20 tur pauci diuitiores) quantū optas aliquando asse- quaris, hoc est, vt plus vniuersis possideas ciui- bus, ne sic quidē satis sis habiturus: sed itē cir- cūspicies, num quis in alia ciuitate sit diuitior: quem quidem si superaueris, tibi obsecundante fortuna, ad alias progredieris nationes, & his q̄ apud illas opulentos p̄sēderis, fieri opulētior cōtēdes. Quare nunq; tu sanē omnibus diuitior, sed propter immensās cupiditates, semper futu- 25 rus es pauper. Quōd si ipso vīu rerū metieris id quod modū tuo respondeat, iam triplū vnū ex diuitibus numeraueris: aut salē ex his, qui eo quod opus est ab vident. Enīq; quatenus ad ra- tionē pecuniarū spectat, beatus, cū earū causā 30 minimē futurus sis trīstis. Si verō etiā illā, quæ ad honores appetendos pertinet, insatiabilitatē ex- ploretis, hac quoq; parte inuēdē ac finē mole- stia vitam ipsam traduces. Sin autem tibi nō sa- tis fuerit honorari ab his, qui tua consuetudine 35 videntur, sed velis ab omnibus omnino qui sunt in ciuitate laudari, etiā ab illis scilicet à quibus ignorans prorsus: fortasse primū quidem ab his ipsis cognosci volēs: tum autē, vbi cognitus fue- ris, suspiciā. At illud quidem, velle cognosci ab om- nibus, ab amicis quādam proficiat gloriæ cupiditate: hoc autē quod est, velle honorari & 40 suspici, ab inani planē & stulta ambitione. Quo- circa tibi necesse erit, vt nec pecunias quærendis inuigilans; sic tunc ad gloriæ honorisq; studiū

cupiditatē inēdenti, ob illos qui cū plures sint re neq; cognoscant, neq; honorabunt, maiori q̄ nunc tristitia & dolore affici. Si igitur in his tem- 45 per nos exercuerimus, iam exploratū habentes, insatiabilitatem virtutis esse animi p̄sumū, fun- damentūq; omniū cupiditatum, pecuniarū, gloriæ, honorum, principatus, & cōtēntionis, haud dubie citra omnem molestiam viuemus. Quæ- tum suā sorte cōtēntus fueris, is omni merore ac tristitia carebit. Quis autem nolit omnē xer- tem citra merorem transigere? aut quis nō hoc omnibus præpōserit? modū libus, imō verō sce- 50 leratis diuitis? Ille igitur hæc & alia multa mihi & aliis quam verissimē pronuntiabat. Turpe si- quidem est libertatem eam, quam humanis legi- bus accepta refertur, maximi facere: eam autem quæ & verē, & natura ipsa est libertas, non omni studio venari, sed in honestis, imperiis, atq; tyranni- 55 cis dominis inferre, lucris videlicet, minu- tissimūq; quibuscūq; pecuniariis rationibus, ac principatus, gloriæ, honorisq; ambino sis cupi- ditatibus. Quorū sanē omniū marē ego laud dubitauerim dicere, inexplēbilem habendi libidi- nem. Quis igitur talem in animo p̄stetiam habēs, possit vnq; aut honestis, aut probis evadere? aut cur nō mille fit mortibus dignus, q̄ nō to- 60 to animo talem turpitudinē odierit? Porro autē hanc ipsam multo magis & odisse & fugere de- bent adolescentes, qui se saluos esse velint. Nam si forte initio assueuerunt pecuniā insatiabili- ter cupere, fieri iam certē non poterit, vt cū ad annum p̄uenerint quadragesimū, seipsos re- 65 cuperent. Ceterū tamen si difficile atq; arduum videretur, adolescentēs ipsos in principio sese li- berare ab affectibus, progressū tamen tempe- ris omnia faciliora reddendū. Quō enim maius rationalis nostri animi pars in huiusmodi ex- 70 ercitacionibus ac studiis incrementū acciperit, eo perfectiorem obedientiā habebit. Nam cū ea quæ maxima sunt, ratio nondum exercitata peruenit, minimē dubium est, quin vbi dupli- cem excellentiam in depra spacio temporis fue- rit, sit multo facilius superata: quippe ex eo 75 quōd iam sese exercuerit, euasit multo genero- sior quā ante: prouideq; sic ab vnde sufficere exterminandis affectibus, iam etiam imbecillio- ribus reddatis.

GALENI PERGAMENTI de consuetudine, liber vnus.



Vod consuetudinis ratio ad inuen- 80 tionem eorum quæ sanitati conducunt, magnam sibi vendicari faul- tatem, non modō Hippocrates, sed Erasistratus etiā profectus est: quā quidem negligētis medici, interdum egros q̄ miserimē iugulantur: vt in Ario Peripatetico fluctitatum fuisse videtur, qui cū gracilis natu- 85 ra esset, & os ventriculī frigidissimū sortire- tur, ita vt vel ex leuissima refrigeratione singu- laria statim corripere, ob idq; nunq; fauisset au- sus aquam gustare, tandē febri occupatus, a me- 90 dicisq; præter consuetudinem coactus potu fri- gidi vti, subito fuit quidem extinatus. Aliis vero

Insatiabilis est fundamē- tum omnium cupiditatum. Constat, sua sorte qui fuerit, si omni co- rrebi tristitia.

Adolescentes si perueniant ad- fectibus priu- am insatiabi- liter cupere, fieri non possit, ut cum ad annum perue- rint quadragesimū, seipsos recuperent.

Rationem per experientiam ratio reddi q̄ oportet.

Ario Peripato- situm suū infir- mitati medicorum attribuit.

Galeni epistolae.

Insuper libellus habendi libidi- nis disparari in- satisfactis ventriculi.

Cupiditatem esse vnicūq; mori- uis merorem atq; infirmitas causam.

Diuitis præfati- re, nō virtutis, sed fortunæ munus exi- sit, quæ plepurgē seruos atq; liberos facit longe diuitiores nobis, qui & generosi, & nobiles appel- lamur.

Quod si tu (quo in nostra repub. reperitur pauci diuitiores) quantū optas aliquando assequaris, hoc est, vt plus vniuersis possideas ciui- bus, ne sic quidē satis sis habiturus: sed itē cir- cūspicies, num quis in alia ciuitate sit diuitior: quem quidem si superaueris, tibi obsecundante fortuna, ad alias progredieris nationes, & his q̄ apud illas opulentos p̄sēderis, fieri opulētior cōtēdes. Quare nunq; tu sanē omnibus diuitior, sed propter immensās cupiditates, semper futu- 25 rus es pauper. Quōd si ipso vīu rerū metieris id quod modū tuo respondeat, iam triplū vnū ex diuitibus numeraueris: aut salē ex his, qui eo quod opus est ab vident. Enīq; quatenus ad ra- tionē pecuniarū spectat, beatus, cū earū causā 30 minimē futurus sis trīstis. Si verō etiā illā, quæ ad honores appetendos pertinet, insatiabilitatē ex- ploretis, hac quoq; parte inuēdē ac finē mole- stia vitam ipsam traduces. Sin autem tibi nō sa- tis fuerit honorari ab his, qui tua consuetudine 35 videntur, sed velis ab omnibus omnino qui sunt in ciuitate laudari, etiā ab illis scilicet à quibus ignorans prorsus: fortasse primū quidem ab his ipsis cognosci volēs: tum autē, vbi cognitus fue- ris, suspiciā. At illud quidem, velle cognosci ab om- nibus, ab amicis quādam proficiat gloriæ cupiditate: hoc autē quod est, velle honorari & 40 suspici, ab inani planē & stulta ambitione. Quo- circa tibi necesse erit, vt nec pecunias quærendis inuigilans; sic tunc ad gloriæ honorisq; studiū

Velle cognosci ab omnibus, vnde proficiat gloriæ cupiditate: hoc autē quod est, velle honorari & suspici, ab inani planē & stulta ambitione. Quo- circa tibi necesse erit, vt nec pecunias quærendis inuigilans; sic tunc ad gloriæ honorisq; studiū

verò contrà, nisi audacter potius in proprièritatē, peniculum sanè est, ne exiguantur celeritatē. Sūt enim quibullā aliqua peculiariter ex propria natura, aliudq; alimentum aliq; corpori accommodatur. Ob idq; animalia ipsa absq; vlla disciplina, sed tracta à natura, nō ea pabula accedunt, quē sibi magis sunt familiaria: nunciat nimirū ad herbas, fœnum, paleas, & lordecum ad carnes verò, tum leones, tum lupi. Vt autem nō parua in animantibus iuxta varia genera proprii alimētorum reperitur differentia, sic in eodē etiā genere multa interfunt atq; magnā discrimina. Nam multa sunt quæ vinum (exempli gratia) ne gustare quidem possint, quod tamē ab aliis plurimum sine vlla modèstia bibitur: ac de cæteris quidem pari iudicio. Solēt quippe homines alia aliis audius mandare, pro lux nature ratione, quod videlicet talia ipsi faciliora concocta videantur: contrà verò quæ gustui sunt ingrata, su gere & fastidire, tanq; ea quæ ab ipsis concoqui nequeant. Est igitur hic consuetudo ipsa signum naturalis cuiusdā proprietas. Sed quod ea nō nunquam sit etiā illius causa, hinc quidē constat, quod aliquib; rerū quarundā vsus inter iniuria ingratas & noxius cū sit, vbi paulatim assueverint, iam ea illis neq; amplius ingrata, neq; noxia redduntur. Nam vt vni quodq; eorū quæ vel comeduntur, vel bibuntur, alteratur secundū qualitatē: ita & ipsum quodq; id à quo alteratur, quoq; modo datur. Quod autem similitudo quædā sit inter ea quæ alunt, & illa quæ aluntur, tum semina, tum plantæ, euidenti argumētō esse possunt, quæ ita expiissimè alterantur & transmutantur, vt quæ in vno loco fossilis est, exmiosa, ad aliū translata, maxime cōferentia reddantur. Iam verò vt corpus nō & potu immutatur, sic etiā illi quæ extrinsecus occurrunt nobis, quæq; nō minus cōsuetudini inferuntur. Primi igitur à refrigerantibus rebus cutis ipsa colligitur: dein ceteræ partes quæ illi proximæ sunt, donec ad profundiores alteratio ipsa perveniat: idq; primò & per se. Nam per accidens, calor in alio collectus corpore, cute deniat præ frigore, increvit. Ar vero si cū causa refrigerantī eiuismodi alterationes invehit, sic calefaciens, istis contrarias. Externū autē vna & eadē causa præ contraria sunt. Sol siquidē inter initia, dum nos calfacit, fundit humores, quæten lenit, caritēq; redit molliores. Si quis tamen aliquo tempore pluribus diebus nudus sub eo sit diuersatus, illi tum cutis, tum caro, dura aridq; reddetur: id quod nō est calor solius, sed siccitatis etiā illius annexæ opus. Porro balnea dulcium aquarum calefaciunt nos & humectant, quod calor habet aut humorem eductum. Quare necessium est nos novissè, aliam quidem esse rationē caloris humidī, aliam verò quæ. Ceterū corpus rārū & molle facit ab extrinsecis iniuriis afficit: durum autē multo facilius eas tolerat, ægerimq; ab illis labefactur, quod etiā patiendū facilius & dyspanti, consuetudo nō exiguit vim obinet. Quod verò ad exercitia pertinet, exercitia particulæ fortiores pariter & solidiores reddūt, ac proinde moriones suas obire ac ferre, q; ceteris, longè facilius possunt: quæ, quod exercitio carnerum, mol

les atq; languidæ existunt. Eodē etiā animi exercitationes spectant, quibus exerceri solemus: primū quidem grām anicis rudimentis, dum sumus pueri: mox rhetoricis, geometricis, arithmeticis, logicisq; theorematibus. Cū enim facultates illæ, quæ ad animi principem vim spectāt, ad omnes artes perrecheritæ sint, quāvis altera quidē obnoxiū us quid consequens, quid verò repugnans est, altera verò memores sumus: à prima sanè id habemus, vt sapientiōres simus: à secundā autē, vt magis memores. Eam tamen naturam hæ facultates habent, vt exercitio ne vires indispensentur & crescant: o cio autē languescit, ac minuantur: id quod discretissimè explicuit Plato in Timæo, secutus Hippocratem, qui vsū barbar addere, o cium verò dissolvare pronūciat. Verū ipsi exercitationibus, sicut & cibo, & potui, vigiliisq; & veneti, mensura congrua adhibenda est, quæ rem ipsam neq; vltra quā par sit, protrahat, neq; etiā de illa adimet: quia excessus dissolvunt vires: defectus verò tantum de vilitate detrahunt, quantum ipsi à recta mensura deficiūt. Facultates itaq; nostræ robur sibi comparant, si moderatis congruentibusq; exercitiis foueantur. Atq; hæ quidem sunt consuetudines differentie, à vi materiarum in quibus illæ consistunt, & à quibus sunt, desumptæ. At vti acutiores non debentur corporibus ob consuetudine aliquam, quemadmodum Erasistratus existimavit: sed ob causam quæ illas potulat. Sunt siquidem qui ex malo victu, sunt qui ex prædicti corporis affectione sanguine plurius, aut virosos humores aggregant: quos plurimum vires solet, cum aut à natura, aut à medico, quod redundat, antequā in morbum labantur, detrahunt: quæ remedia tories vtuntur, quoties aut morbum præsentem vident, aut cum adventare præsentur: adeo vt talis emendi ratio in consuetudinem illis esse verba videatur.

GALENI PERGAMENTI de tuenda sanitate liber primus.



Vm vna sit ars, quæ circa humanum corpus versatur, eius primæ ac maximæ partes sunt duæ: quarum altera sanitatis tuendæ, altera morbi profigandi facultas est. Ac sunt quidē officia earum contraria: illa quippe tuet, hinc immutare statūq; corporis, est propositum. Quoniam autē & dignitate & tempore sanitas morbi præcedit, vniq; & nos, quemadmodū hæc servandū sit prius tractare conveniet: post autē, quo pacto eodēmodum sit abigendus morbus. Veriusq; facultatis in veniendæ communis ratio est, vt quidnam ea corpora affectio sit, quæ sanitas dicatur, huiusq; cōstit: quandoquidem nec præsentē leturæ, nec amissam restituere, si cam perimus, ignores, licet. At similibus parū sanitas, calidi, frigidi, humidī, & siccī symmetria est. Infirmamentū vbi, ex similitudinē ipsarū cōpositione, numero, magnitudine, & figura cōstat. Quare quisquis in hac cōmōdō tueri possit, in optimis sanitatis custos fuerit. Tuebitur licet, quæ modos

Animalia naturaliter ad ea pabula accedunt, quæ illis magis sunt familiaria.

Consuetudo ipsi signum naturalis cuiusdā proprietatis, aliquam interdu causa.

Naturam autem vel alteratur, sic etiam, quandoque alteratur, id quod natura, similitudinem ipsi naturæ, quæ alunt, & illa quæ aluntur.

Calor interius ex accidenti crescit, inter refrigerata, contraria per sepe omni ob vna eadem causā.

Balnea dulcia calfaciunt nos & humectant.

Corpus rārū, corpus duri, cōsuetudo ad dissipationem hanc corporis non obinet, exercitia particularia reddunt fortiora & solidiora.

Exercitatio in artibus liberalibus, sicut, & c.

Facultates, memores, & c.

Animæ facultates, exercitatio, vero in dissipationem, & c.

Exercitio dissolvunt vires, & c.

Vacuatio, sicut, & c.

Medicina, primæ ac maximæ partes sunt duæ, & c.

Medicina, partium, sicut, & c.

Sanitas, sicut, & c.

Sanitas, sicut, & c.

affectus sit, nō tamen dicitur sanitas, cū ea minime in colore consistat. Neq; si pręter naturam aliquis affectus se habeat, prout nō morbus est: alioquin morbus esset nigredo ex insolatis contracta. Permagnum itaq; haberi sanitatis latitudinem cōstat, nec eam in nobis omnibus æqualiter profus inesse. Iudicabimus autē ipsam eucrasiam & dyecrasiam, in quibus sanitas & morbus consistunt, vnius sensus opera: la siquidem ad omnia vitæ mutas vbiq; nobis est iudex.

Quare actionis vniū, non autē pronuntiabimus morbum, quā ad sensibilem pervenerit magnitudinem. Porro actiones ipsę, cōstitutiones corporis necessariū sequuntur, eam quę proba est, inculpatæ probrę: quę contrā est, culpabiles ac vitiosę. Ac proinde nihil refert impręsentiri, si quis in genere functiōis, aut cōstitutionis, sanitatē & morbū collocaet: modō intelligat, in naturali cōstitutione corporis illa maxime seruanda esse, quorū beneficio ob euntur fun-

ctiōnes: & quod similitariū quidem partiū eucrasia, instrumentum autē formę, positura, numerus, & magnitudo, causę existunt functionum: quodq; hæc omnia spectentur in latitudine quādam. At verō dīuersitatē eucrasię in corporibus sanis, ex ætatis ad amissum cognosces, cūm nimirū ad omnes volūarias actiones adolescentiū ætas q̄ aptissima sit, in epior aut infantiū & senum, propterea quod humor in illis, in his siccitas frigiditasq; nimis abvndet. Quāq; cēte in functionibus naturalibus, infantiū ætas ceteris omnibus antecellit. Neq; tamē ed secus omnib. per omnes ætates licet esse sanis. Et quę admodū in ætatibus sese habeat, ita etiā in naturis eorū immensam esse differentiā temperamentorum invenies. Quibuscunq; igitur corporibus multo supra iustū caliditas, frigiditas, humiditas, aut siccitas esse cōtigit, itis planē optima temperies nō est. In quibus autem ab eo quod absolutissimē temperatiū est, dīversitas quēdam intelligitur, minor tamen q̄ quę sensu discerni possit, hæc certē p absolutissimis accipimus: ita vt sanitas, quā in latitudine contemplamur, hæc quidem mediū temperamenti sit, nec vlli vitio obnoxia, quod saltem sensu percipitur: hæc ceu intermedia, vniōq; exposita. Quocirca illi quā inculpatū diximus, exacta absolutusq; debetur cūctio: aliter quę vitio nō caret, haud ita exacta. Quippe in temperies quę intra sanitatis consistunt terminis, ita corrigere oportet, vt per contraria reducatur ad moderatū temperamentū. Sic vt igitur nec nimis gracile corpus probamus, nec qd valde est obesum: ita nec temperata corū, a quibus videlicet habitudines id genus oriuntur, planē laudabimus, tametsi vtrumq; maxime sanū esse cōspicimus. Sed quę in medio locū habitudinis sunt, quęque Græcis dictę, si vt ipsę debita partium convenientiam, speciemq; inculpatam habent: ita id totū cōuenienti laudabilisq; temperamenti beneficio acceptū ferunt. Ceterū ne tales quidem corporū habitus absoluta exactisq; temperie dixeris tēperatos: quod nunquam eodem in statu permanent: licet secundū sensum, & quarens ad vsum sit satis, nō inculpabiles modō, sed etiā optimos eos esse censimus.

Est autem optima corporis cōstitutio, si substantiam eius speciet, & quę optimo temperamento sit, & quę figuram partium, omniēq; tum numerum, tam magnitudinē, tum omniū earū, inter se contexturam, ad functiones egregie comparatam habet. Si verō in dīctis notisq; respicias, cuius corpus carnis medicritatem præferat, atq; secundum singulas partes, in medio excessuum omniū libranur, pulcherrimū simul & cōmodera tum existens. Huius ergo fortis homo, si itam vbi editus est in lucē, arti sanitatis tuendę educandus tradarur, erit vtiq; fortunatissimus. Sic namq; ad animi quoq; affectus nonnihil lucis faciet, ipsa nimirū recta victus ratione moras quo quę probos reddente. Ergo recens is vniuersi infans, cuius corporis cōstitutio omni nō vacat, primum quidem fœcis deligeret, sed corpori prius totū modicē insperio, quō cutis eius densior solidiorq; ita quę inus sunt partibus reddatur, vt resistat facili inuiriis externis. Vbi verō involutus iam fuerit, lacte pro alimēto vtatur, & balneis salubrib; aquarū. Vniuersam namq; victus rationē, humidā sibi adhiberi postulat, vt qui ceteris ætatibus temperamento sit humidior. Id quod sentis Hippocrates, ait, humidam omnē victus rationē feblicitantibus esse vtilē, præcipuē verd puellis, & iis qui tali recti victu nutriunt: vbi a morbo quidem contrarij adhibendi indicationē accipit: ab ætate & consuetudine similis. Quę enim corpora secundum naturā se habent, iis custodiri suum habitū deet: quę aliquo morbo premuntur, iis contrā, alterari & ad contrarium trahi habitū expedit. Ac seruatur quidem similibus vnum quodq;, alteratur contrariis. Si itaq; nulla præter naturam humiditas subit, pro naturę ratione alendi, ac dulci aquarum balneis humectandi sunt puelli. Nam sulphurex, bituminosx, aluminosę aquę, planē omnes siccant. Cū igitur sanguine in vtero ali nō consistit, ex sanguine autem exiguum in mamillis mutationē perpelso gignatur lac, erit vtiq; lac maternū non modō alimentum consuetū, sed etiam maxime propriū cūctis infansibus, ac præcipuē optimē temperato: quippe cuius maternū non corpus modō torum, sed etiā lac, a vitio esse alienū non sit absumile. Tribus autē remediis nutrites ipso vsu edo cōg mulcere solent infantes, dū aut offenduntur, aut plorant: nempe ipsa papilla ori indita, motu medio cri, necnon vocis modulatione. Quibus non solum eos mitigant, sed etiam somnum conciliat: vel hoc ipso restitucante natura, ad muscen eos & exercitia inopie esse ingenio propios. Aded quisquis his artibus probe vti sciet, is corpus & animam optimē instruet. Nutricibus porro triplex infansbus ex cōgrata dīctio est: in cunis, in pendentiū lectulis, in suis ipsarum vniis: notidē in vnu erum notatur etiā prima exercitiorum genera. Quippe aut a nobis ipsi, aut uemur, aut ab aliis, aut medicamento. Horum tamen tertia species, ad sanos nequāq; pertinet. Sed qui ab altero præstatur morus, nauigando, equitando, vehendo, atq; in canis, lectulin, & vniis obitur. Recens tamē nari puelli, tam valentē motū, quā est qui vehiculis, nauigis equisve

Optima corporis cōstitutio quę dicitur.

in dīctis

in dīctis

Mores reddi probos a recta victus ratione.

Infans, prius quā involutus, lacte esse nutritur.

Lac.

Balneis.

Lac.

Balneis.

Humida victus ratio quęm sanis vniuersi.

Corpora secunda naturā se habentia, seruanda esse, alterantur a quę aliquo morbo premuntur.

Similibus similibus cōferantur.

Alteratur sit per contraria: aqua siccantes quę.

Sanguine in vtero alimur.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Lac sit in similibus.

Sensu indicandam esse eucrasiam & dyecrasiam.

Infans sequitur cōstitutionem corporis.

Functiones causas quę eas efficiunt.

Adolescenti est aptissima ætas ad omnes volūarias actiones.

Infantiū ætas habet naturalem functionem rebus naturis multo, quā reliquę ætates.

Sanitas est duplex: vna temperatissima, altera vel vitio vniō exposta.

Sanitas inculpatā conferenda est: quę vitio nō caret, reducenda per contraria ad moderatū temperamentū.

Euforici.

*Caleni pater
in omni disci-
plinarum gene-
re fuit vrsus-
tus.*

*Cibi admodum
exquisiti non
esse qui pos-
sunt exerceri
ante cibum.*

*Panis optimus
quis sit.*

*Alica.
Squilla caro.*

*Crudos humo-
res necessariū
debere aut con-
coqui, aut com-
pescere.*

*Calculorum ge-
neratio.*

*Exercitiū ante
cibū mediocri-
tate.*

*Cibi constituti-
onem in mediocri-
tate, omnium co-
mendatissimi
sunt.*

desiderarent. Erat enim pater meus geometria, architectura, astronomia, arithmetica, logisticaq; studijs excellens, maximèq; omnibus quibus erat notus, ob ipsius iustitiam, modestiam, bonitatèq; ut quisvis ex philosophis alius, admirationi. Ceterū qui potest exerceri ante cibū, is laud sanè admodum exquisitos cibos desiderat: cui verò negocia & occupationes impedimēto sunt, non modò huic probato innoxioq; victu, sed salubribus quoq; medicamentis est opus. In primis igitur illa qui quiete ac pro animi sententia vitam traducunt, eam victus rationē describam, ex qua gigni sanguis optimus possit. Deinde intendū est, ut quardam his etiam præcepta tradantur, qui turbulentiā vitam, atq; negocia deditam agunt. Cibi itaq; succi probati sunt, ex frumentaceoq; genere passim purissimi probèq; confecti, diuitiā prius macerantur atque fermentatione debita, necnon sale iniecto. At cocti in cibano præstant: post quoq; furna cea secūda debentur partes. Alica verò, sicuti & squilla caro, si exactè in ventriculo concoquantur, in sanguinèq; a lecinore cōvertantur, probatissimos gignunt humores: aliquid tamen glutinosi in se habent, ob idq; mī ius iure obstruunt, & renes, quibus huiusmodi natura astrictos meatus sortitur, ac proinde distributionē impediunt. Horū quoque vīus vberior, in supradicta particulis vel grauitatē, vel dolorem nonnumquā facit. Quinetiā in venis quæ per caua lecinoris, aut per mesenteron feruntur, redundans humor periculū adfert, ne vel putredinē contrahat, vel ex ipse particularem quibus cōgeritur, afficiantur phlegmone. Quippe necesse est crudos crassosq; humores, vel concoqui, vertig in sanguinem, vel computrescere: non secus ac quæ calidis in locis diutius manent. Quamobrem inventa medicamentis salubria sunt, quæ tenuandi vim possident, quæ obstructionibus liberant. Quamquā horum frequentior vīus, vel serosum, vel biliosum, vel melancholicum procedente tempore sanguinē reddat. Quandoquidem id genus medicamenta, nō solidum incidunt & tenuant, sed etiam immodicē calefaciunt: ob idq; & solida membra exsiccant, & crassum humore reddunt, quo in renibus assequuntur calculi. Optima itaq; corporis constitutio, quæ reueratissima est, meatu, per quos humor fertur, patentiore habet: quam quidem talem conferat ante cibos exercitiū mediocriter. Tragem ex frumentaceis generis alimentis, eiusdem cum alica naturæ est: regius tamen concoquitur. Propè etiam natura ouorū atq; vires accedunt. Iam verò quæ glutinosos crassosq; humores gignunt, si in hepate conuertantur in sanguinem probum, potentissimè nutriunt. Ceterum qui cibi in omnis excessus mediocritate consistunt, nō omnino commendatissimi sunt. Eius generis panes optimi habentur: præterea gallinarum gallinaceorūq; carnes, necnon phasianorum, perdicum, attagenarū, columbarū, merularum, turdorum, turturūq; & omnium passerulorū. Pūces item faxantes, pelagici, littorales, gobii, murenx, buglossi, aselli, & simpliciter pisces omnes, qui neq; infusæ, neq; mali odoris, neq; glutinosi quicq; gustu repræsentant. Verū ad fa-

niratem tuendam, si ante cibum corpora moderatè exercentur, mirum in modum prodest: at contrā, quies & ocium disturnū, his maximo nocumēto est. Qualiscunq; autem post cibum motus, alimentū ex ventre crudum in diuersas corporis partes distribuit. Porro panis qui nec fermenti, nec salis quod far est continet, neq; probè maceratus nec coctus est, is glutinosum succum producit. Caseus omnis, crassus: vetus, mali succi esse censetur, succi prauitate caret: qui quidem ex melle sumptus, aluum subducit. Lac autē cum ex triplici, dissimiliq; substantia consistit, nempe serosa, crassa, & pingui: camelini, asiniūq; lac, serosi humoris plus habet: bubulacū & caseosum, ouillum: plus pinguidinis habulū. At lac caprillū, inter cetera lactis genera moderatè se habet, ob idq; in corporibus nostris mediū etiam præstat effectum. Etenim lac quod serosum & tenue est, minus nutrit, sed aliū magis deicit: contrā crassius, minus aluum subducit, ceterū magis nutrit. At lac caprillum, sine melle sumptum, periculolum existit, quod nimirū in ventriculo conuersione triangulari: quemadmodum vbi sanguis in grumos coëret, aut in vulnus aliquod, aut in ventrem, aut in aliquod intestinorū defluerit, grauissima symptoma inducit. Lac itaq; statim vbi est emulctum, hauriatur. Cui quidem ne in ventre concreuerit, mellis, aquæ, & salis aliqui solent nonnihil miscere. At quod ex lactis cōcreione defluit serum, aluum egregiè mouet. Quæ ex lacte & caseo placenta consistit, irritasq; etiam, quæ ex lacte & simillagine constant, crassi succi alimoniam præstant. Cochleæ crassi succi censentur: itēq; oua, quæ vel elixa, vel tosta, penitus sint densata. Frixa verò, mali succi, fumosissimi in ventriculo cocture existunt, secum etiam corruptentes admissos cibos. Mediocriter verò cocta, quæ ideo appellantur tremula, ad coctionem, digestionem, nutritionem, boniq; succi generationem, sicuti & quæ forbilis dicuntur, ad leniēdas gutturis asperitates, idonea sunt. In aqua nilibus verò, quæ mollia dicuntur, videlicet lolli-gines, sepix, polypi, aliāq; id generis, crasso & tenaci sunt succo: necnon ex piscibus, quæ cetacei generis habentur, cuiusmodi sunt thynni. Sed pelamides ex his magis ad mediocritatē tendunt. Ostree item, buccinæ, purpure, crassi admodū succi sunt: ac omnia breuiter, quæ dura testa innuntur, necnon chamæ, patellæ, pestines, pin-næ, & alia id generis. Quorum omnium succum scire debent, nō secus ac serum lactis, aluum deice-re: at solidiores ipsarum partes, serius ob crassitatem concoqui, crudiusq; & crassius, & frigidum humorem gignere: quales vires in brassica & len-te etiam videre licet. Quorum tamen succua, nō glutinosas, sed notuosas, & deiciendo aluo effica-cies est: sicuti dracunculū acerrimū, & amarissimū. Vtrumq; etiam aron præstat, sed minus effica-citer. Bulbi austero amarog; sunt succo: ex qui-bus lotia coctisq; sepia, quicq; superest, crassi succi habetur. Sed fungi inter linaui generis es-tio, frigidissimo, tenacissimo, & crasso succo re-dundant: a boletis tantū nemini inuenisse me-morix proditum est. Sed hi vbi concoqui neq; uerunt, in nonnullis cholera excitantur. Alij omnes

*Exercitiū ante
prandium mo-
deratè, conferit
ad sanitatem
tandem.*

*Lactis substantia
triplex.*

Lac serosum.

Lac crassius.

*Sanguis in grum-
os modis
transformatus.*

*Lac flatu vbi
est mollius,
hauriendum.*

*Serum lactis al-
uum subducit.*

Oua forbilis.

Pisces molles.

Cetacei piscium.

Tessera.

Dracunculus.

Aron.

Bulbi.

Fungi.

Boleti.

Alij omnes

Tuber. omnes fungi periculosisimi sunt. Tuber, leniter
 crassus, non mali succi est: cuius generis amyli ha-
 betur. Indem iuxta pinea se habet. In his quæ cras-
 si succi censentur, iecur, renes, & testes anume-
 randi sunt. Verum secur mali succi non est: renes
 testisq; nō boni, testibus gallinaceorū exceptis.
 Len ex ceteris animalibus, satis vitiosus est succi;
 melancholicusq; minus verō nocivus. Cor-
 dis substantia durior ac magis fibrosa est, quā
 quæ in aliis habetur visceribus: quare ipsam nō
 nulli inter musculos collocant. Sed musculorū
 verorum capita, nervosiora quoquomodo cæ-
 tera carne sunt, in eiq; ex ossibus ligamenta or-
 ta disseminantur. In fine autē musculi tendentes
 oriuntur: eāq; ob causam extremæ vtriq; mu-
 sculorū partes nervosiores: sicuti & medix car-
 nosæ sunt, & vberimē nutriti. Porro torus mu-
 sculus propriis quibusdā lineamentis circums-
 criptus, seinctusq; ab aliis partibus cernitur,
 obiq; functionē vnam, quæ est ex moribus vo-
 luntariis. Extremæ animalū partes, ligamento-
 se existunt, corporiq; alimentū lentum & glutin-
 osum præbent. Partes etiā quæ penes labia pe-
 destrium sunt, lenius, sed non crassum humore
 gignūt, coquanturq; cōmodē: itēq; & volatili-
 um alæ, cōmuni quādā cum corporibus se ex-
 crementibus ratione. Nam hæc omnia excremen-
 tis carent: quæ verō in ocio degunt, excremen-
 tosa sunt. Nulla cutis præpinguis, vbi probē fue-
 rit elixa, glutinosius, sed non ita quod cras-
 sum succum præstat: nec veluti extremæ partes,
 concoctioē admittit: nec bonū succum, sed ex-
 crementosorem producit. Cerebrū quoq; pars
 crassi succi est, & quæ dorso medulla excipitur.
 Sunt glandulæ eisdem in naturæ, sed mediocriter:
 necnon iuuenū viscimarū testes. In vniuersum
 autem, partes seniorum, duræ, siccæ, & cōcōctū
 difficiles sunt: sicuti & iuniorum, humidæ, mol-
 lesq; atq; idcirco faciliores concoctū: his tamen
 exceptis, quæ vbi in lucem adgessit sunt, protinus
 in cibo sumūtur. Sant enim id genus omnes mu-
 cosæ. Quæ in mammis glandulæ habentur, si lac
 in sese contineant, crassi sunt succi edulia. Quid
 si animal ex quo sumuntur, boni habitus fuerit,
 abvnde nutriti, & bonū succū efficiunt. Etenim
 lac probatissimū succa habetur. Quare nonnulli
 pulmonis vlcere affectos, portione tantū lactis
 curam putant, antea scilicet quā ipsū vlcus
 vastius atq; callosum fiat. Sed præ ceteris lac mu-
 lebre, tanq; naturæ eiusdem, nobisq; familiari-
 simum, cōmendatur cū ab aliis medicis, tum
 vel maximē ab Herodoto & Euriphone, q
 quidē vbera ab ita affectu sugenda esse pronun-
 ciant. Lac siquidem, simulatq; est emulsiō, nō
 nihil naturæ bonitatis amittit. Scire autē opor-
 tet, lac ex iis animalibus quidem, quæ boni ha-
 bitus fuerint, boni esse succi: ex iis autē quæ de-
 prauato, nō secus ac sanguis q in illis habetur, ex
 cacochymū exire. Inter crassi succi cibos anu-
 meratur vtrāq; balanorū species, quæna videli-
 cet, ac fructus etiā palmarū. Ex his autē quas
 querqus ferunt, grææ sunt castaneæ & suaves:
 quæ quidē & cōcoquantur cōmodius, & prauū
 succū non gignunt: ex enim asæ vel elixæ man-
 duntur. At quæ figura oblonga sunt, & similes

palmaribus, suisbus sunt certē nutritiōis, haud item
 hominibus congruæ. Illigæ verō glandes duræ
 sunt & acerbæ, ægræq; concoctioē admittunt,
 atq; crassum succū largiuntur: ac proinde viran-
 dæ sunt. Est autem in aulicis quidem emittitā as-
 tringendi qualitas, in acerbis autē intensā. Sed
 quantū illigæ glandes valentiorē astringendū
 possentate ceteras superant, tantū lac in re ab ip-
 sis glandibus superantur castaneæ: quarum ra-
 men vīū vberiorē cauendum, quod & crassi sunt
 succi, ægræq; coquantur, ac tum alium astringe-
 re, tum excitare inflammationes possunt. Porro pal-
 marū fructus dulcis sunt succi, crassi, & astringen-
 tem facultatē habentis: quare faciliē iecur ob-
 struit. Siquidem dulces cibi, crassiq; succi, iecori-
 ac aliis obstruções faciunt: inchoatq; in
 visceribus pleegmonē augent: necnon infla-
 mationes, scirrhusa vitia, adeoq; abcessū generā-
 tiones prouocant. Nostres autē corporibus alimen-
 tum accommodatissimū est, quod ex iis rebus cō-
 fictur, quæ nec crassi, nec tenacis sunt succi: hæc
 siquidem moderatē consentit sanguinem gignunt.
 Quod verō tenue admodum est, parum
 nutrit. In his quod vitium est cibis, qui omnino
 friabiles sunt, vt qui paucissimum in se habeant
 lentorem. Panis quippe ex panico, miliove con-
 sectus, dum estur, arendum quiddam, vel quasi
 cinerem sapientiē si aliquid indideris pinguitu-
 dinis. Quare ad bonam valertudinē q cibi cōmo-
 dissimi sunt, qui mediā quandam naturā inter
 ea quæ diximus obtinent. Ceterū quæ ex semi-
 nibus, aut omni ex fructibus intumescent, ve-
 terēq; protinus siccitatē atq; duritiem depō-
 nunt, molliorūq; & humidiora redduntur, præ-
 stantiora existunt: deteriora verō, quæ priusnam
 duritiem retinent, atque etiam minimē tument.
 Quod verō ad prisanam pertinet, quæ celeriter
 quidem target, probatissima est: quæ autē post
 multū temporis intumuit parum, vitiosa. Porro
 quod præstantius est triticū, plus quidem: quod
 deterior, minus farinæ reddit. In autem fructus
 cōmodē, iudicio meo, asseruantur, qui priusq;
 marcescant, siccantur. Nonnulli incurbitas in te-
 nues ossas dissectas, arefcere sciunt. At fungi
 cū siccari nequeant, vitium in se habere maxi-
 mum indicant. Paucissimos tamen fructus repe-
 rias, qui siccari nō possint, præter pepones, &
 melopepones, Armeniaca, Persica, & quæ à Roma-
 nis præcocta appellantur. Ficus enī siccatur de-
 rant, & cucumeres vt cucurbitæ similiter repo-
 nuntur. Qui cibi siliō in tumorem crescunt, in-
 ternū dum in aqua coquantur, q & cōficiuntur
 aprius, & ad bonos humores gignendos sunt
 præstantiores. Nihil autem in cibis omnibus
 ad boni succi generationē tam pertinet, quā si
 probē in ventriculo cōcoquantur: hæc siquidem
 & secundam, quæ in ieco re & venis fit, & tertiā,
 quæ in particulis quæ nutriuntur, perficitur, fa-
 cilis concoctioē admittunt. Fit enim nutri-
 tio, alimentū secundum qualitatē mutato, & par-
 ticular quæ nutriuntur assimilato. Ceterū præ-
 parata præcoctaq; cōmodius transmutantur, q
 cruda, cū ad inuicem cōcoctioēs succedant.
 Cunctis igitur corporis partibus leni alimen-
 tum preparat, illi ventriculus, hinc os, ori asæ

Ulixæ glandes.

Castaneæ.

Phormion facile
seu obstruit.
Dulces cibi,
quæ mala in-
ducunt.Friabiles cibi.
Panicum,
Miliū.Semia præstā
tiora quæ sunt.Prisanā quæ
præstantior.Triticum.
Fructus ad re-
ponendum ap-
tiores.
Cucurbitæ.
Fungi.Fructus qui
siccari non pos-
sunt.
Ficus.
Cucumeres.Concoctio tri-
plex.Nutritio quo-
modo fit.
Fractū me-
liorem transmuta-
tū quā cruda.Concoctio
argens.

obsonatrix, quæ variis modis concinnat cibos: quibus denique omnibus gubernatrix natura fructiferas plantas disponit. At ventriculi, valius, interinque animæ, quæ diuini substantia quæ caro consistit, eò etiam còcoctû difficiliora, nec adeo boni succi sunt, nec tam apta ad nutriendû. Sed cande sunt his quoque duriores: reliqua verò in ipsis, quæ ad concoctionem & nutritionem spectant, durities proportionè respondent: hoc tamen excepto, quod monomia causa minimè excrementis redyndant. Cum his volatilium collata, similitudinem quandam habent. Ventriculi pedestrû & volatiliû, maximè inter se differunt. Namque volanlibus crassius durior est, & concoctû difficilis: at si coquatur, vberimè nutrit. Gallinæ & anseris præstantissimus est. Ceteræ verò anserinæ partes, alis exceptis, sunt duræ, & excrementosæ, nec facile concoctionem admittunt. Struthocamelorû membra omnia, duræ, excrementaria, & còcoctû sunt difficilia. Aurii cartilago & sicca est, & minimè nutrit: eorum cutis exterior tenuis aridaque: ægri item còcoquitur, & parafumè nutrit. Oculi à paucis eduntur: consistit enim ex substantia dissimili. Ceteri eorum musculi tantum facillimè còcoquantur. Ex animantibus quorû natura est ad gignendos bonos humores aptissima, ius mediocris iam ætatis habentur. Caro ex porcellis paruulis, excrementis scatet. Itaq; ex pedestribus animalibus suilla caro cibis probatissimus est: deinde hædina, max virulina. Agnus verò, humida, tum lentorem, mucrocinque in se habere censetur. A ceteris pedestris generis, meo iudicio, abstinere, quiquis boni succi generatio animû curamque intendit. Præstans probè ex optimo hordeo confecta, inter cibaria omnia prorsus omni noxia caret: ouit tamen in quâ panis minus. Fenogrecum non boni succi est, si quis eo liberalius utatur. Præsumimus verò, et si quotidie ad satietatè sumptis, non idcirco boni succi generationè impediatur. Idè quoque de fabis dicere, cum nec mali sint succi, nec ob vim illam detergendi, quam habent, obstructiones faciant, nisi insanones parerēt. At pisum extergendi quidè vim non requirit, ac faba: sed insatione caret. Lentescit & visiofi succi, & melancholici sunt. Ochi præterea & dolichli his quæ diximus deteriores, & cicerculis meliores habentur. Post hordeum olyra annueranda est: post hæc typtie. A panico prorsus abstinere. Huic malum consimilis est generis, sed minus malû. Cicer egregie nutrit, sed nec boni succi est, & insat non minus quæ faba, semèque augeat, ac veneris desiderium. Lupinus non male, sed crassus succi est, propterea nutrit egregie. Fructus quoque arbores sunt, omnes ferè mali sunt succi, cassaneis tamen exceptis, quæ si in ventriculo concoquantur, effricatè nutrit: atque ex crassi quidem, nunquid autem sunt mali succi. Ceterum qui fructus horrei appellantur, humorem vinosum gignunt: quod si forte in ventriculo corruptum, similes letalibus venenis redduntur. At ficus & vix ceteris autumnalibus fructibus sunt præstantiores: Quippe maturæ ficus ferè innoxæ sunt: vix deinde, & ex quidem appendicæ. Verum carica, si diutius immoretur in corpore, mali sunt suc-

ci, & pediculorum copiam producant. Cum nobiscus autem sumptis, cibi præstantissimæ sunt, cum amygdalisque similiter: sed cum his obstructiones aperiant, non tamen ita bonum succum præstant, nutritque, vt eum miscentur eum nobiscus. Sunt qui canicas cum rura nucleisque præsumptas, venenis vniuersis aduersari fateantur. Reliqui arborum fructibus mali succi sunt, nig potissimum, quos sylueitres plantæ & frutices tenent. Sed malis, pirs, puniceis, et mespilis, non alimenter, sed medicamentorû loco vuntur, ad ventriculi firmitudinè. Inter fructus quoque, cucumeres, pepones, melopeponesque cònuerantur: quorum nullus boni succi est. Quod si celeriter perfici, digerique non possint, in succum ferè letalibus venenis similem conuertuntur. Cucurbita duntaxat ex huiusmodi fructibus damnanior non est. Si tamen in ventriculo corruptum, ipsa etiam malum succum producit. Mora inde, si perficiantur citò, & priuè corruptum transierint, innoxia sunt: nisi quisquam liberalius utatur. Ex oleraceis nihil est quod boni succum præstet. Lactuca tamen in his quæ boni malique succi sunt, mediocriter se habet. Post illam malua habetur. Post hæc portulaca, amplex, biter, rumex. Sed lactuca agreis, chondrilla, scandix, gingidum, feris, cicliorum, aliaque ex oleraceis agreitibus omnia, succum vinosissimû gignant. Radices olerum in se acrimoniam habentum, vt alin, cepæ, porri, rapiani, & psalmace syluestris, malum succû producant. Sed asari, caripæ radix, & rapi, in his quæ boni præstati succi sunt, media habetur. Aues piscisque ferè omnes, boni succi censentur, exceptis laculibus, palustribus, et qui in immanibus luminibus atque turbidè degunt. Minus enim hæc naturamibus sese exercet, vniatque sere, & prauo vitæ genere vniuntur. Quæ verò in meliores aquas se transferunt, adhuc animalia ea us deteriores sunt, quæ puro ex mari viciant. Omnia si quidem propensum animilia, quæ in ea maris parte versantur, quæ dulci aquæ se non immiscet, innoxia sunt: vt pelagica, & saxatilia, quæ tum sibi bonos humores gignendos, tum ad gustus ipsius voluptatè, ceteris multo sunt præstantiora. Horû itaque frequens vñs, rarissimus est. Nonnulla præterea sunt quæ duplici ex humore viuunt, tum marino, tum dulciv: lupi, capiones, canci, gobii, murenæ, anguille. Sed quæ puro ex mari victu perit, ea & boni odoris sunt, & gustu suauia: pinguedinis autè aut nihil omnino, vel paucissimû in se continent: diuiniq; à putredine illa durant (quibus signis discernuntur ab aliis) præsertim si viue obducant. Ad hunc enim modum quæ duriori sunt carne, præstantiores evadunt. Murenæ igitur ex aquis impuris, pessimæ. Anguille nunquid boni sunt succi, vel si in puro humore versentur, nedum in eo qui puegamenter vrbium recipit. Secundû quoque locorû pasturas, pisces & meliores & deteriores hñit quod odore & gustu explorabis facile. Ceterum neque anxiolior, neque exaltam salubrium ciborû notitiam còsequetur is, qui illorû vires accuratissime noerit, nisi corporis quoque atque particulari naturas, quorû causa cibi expetitur, agnoscat. Ex his enim nonnulla sunt densa, & quæ spiritare non possunt:

Carica cum rura nucleisque præsumptas, aduersari venenis.

Cucurbita.

Mora.

Oleraceis omnia cacochymia. Olerum radix speciosa.

Radices olerum acrimoniam habentissimæ.

Aues, Pisces.

1.

Pelagici piscium Saxatilia.

Pisces deploici utique marini.

Pisces puro ex mari victum capientes.

Murenæ. Anguille nunquid boni sunt succi.

Corporum densitas.

possunt: laxa nonnulla, & quæ inaniuntur facili-
tatemq; ob easdem humidiores illa alimēto egent,
hæc sicciores. Alia tunc glutinosius, alia tenacius,
alia parcius, alia vberius alimentū desiderat. Si-
militer, quibus sanguis est admodū melancho-
licus, humidis calidioribus cibis sunt dandi: quibus ve-
rō biliosior, frigidior, & humidior. Verū ubi puris-
sificus existit, cibus tunc opus est qui calefaciendi
focandiq; vires obtineant. Qui probo sanguine
abundant, alendi sunt parcius his cibis, qui natu-
ram mediam fortiantur, sicut neq; abiqua prima-
rum qualitarum excellant, nec crassius aut tenuius,
nec lenti aut aridi, aut deniq; friabiles sint. Por-
tō ariditas, in duris valdeq; siccis rebus: friabili-
tas autem, in mollioribus, mediisq; inter humida
& sicca invenitur. Commune tamen vtriq; est, vt
tenacior lentore crearet omnino. Ex vinis quæ a-
quosa tenuiq; sunt, vinas mouent, & paucissi-
mi sunt nutrimenti: crassa verō, vt Theriacum &
Sceybelites, quæ absolute dulcedinis sunt, non le-
uiter quidem nutriunt. Calicium vinum, austerū
simul & dulce existit. Quæ Argis & Perperinæ
proveniunt, medium inter dulcem & exquisitē
astringentem qualitatem, saporem reddunt: ni-
græq; hæc omnia sunt. Nulla enim vina inuenies
crassa pariter & dulcia, quæ nigra non sint. Alba
vina haudquaquid dulcia sunt, sed alia austerā &
crassa, alia aquosa & tenuia. Ex fluxis autem, ru-
tilisq;, nonnulla mediocriter dulcia sunt, sicuti
Hippodamantiū, Faustianum, Falernū: nonnulla
omnino dulcedine carent. Sunt autem his ru-
bra crassiora, & ex rubris, quæ proxima colore
ipso nigris sunt. Nutriunt autē hæc omnia cras-
titudinis proportionem: cūq; ob causam, qui in-
digent refectione, vt dulce vinū potent, sua den-
di sunt: tunc præcipue, cum liorum iecur, ben-
& renes, vino penitus carent. Verū cui crassius
succus per venas redvndat, tenuis substantiæ vi-
num: cui frigidus, acre & vetustum: cui non fri-
gidus, quod neq; acre neq; vetustum sit, accom-
modatum est. Ad bonos autē humores gignen-
dos, odoratū præstatissimū: sed tamen caput ten-
tat. Tenuē, ciendæ vinx magis idoneum, capi-
tū nullam infert noxam. Vitanda quæ crassa si-
mul, malique odore, gustuq; ingrata & austerā
sunt. Ex vinis præstantissimi succi Falernū habetur,
ponissimumq; id qd dulcissimū. Ad alius fluxiones si-
stendas, austera vtrumq; vinis: quæ ad nullos a-
lios vñs accommodare solentur. Ceterū in ipso-
rum vīorū exlubatione, non minus regionum,
temporū, exercitiorūq;, quā affectū, & tempera-
turarū hominū, ratio est habenda, sic vt mo-
derata conferemus similibus, immoderata con-
trariis. Temperatus igitur frigi-
dioribus, rutilisq; dulciq; vinū, vīpote calidum,
accommodatū est. Contrariū verō, temperamen-
tis atq; dispositiōibus calidis: quod illud calefa-
ciat impetū, capiusq; dolores, & febres fac-
ile inferat, neruōsq; nonnunq; lēdat. Quod autē
crassa vīna dulciq; delicias alium, nemini ob-
scuro est. Multum etenim, licet coquatur ægrē,
crassūq; succum & indationes gignat, alium
tamen subducit: quod si interdum efficere ne-
queat, mirum in modum nocet. Vitanda ergo
quæ nimis vetusta sunt, nimisve recentia. Namq;

illa præter modum, hæc nullatenus, quando res-
centia fuerint, calefaciant: quæ tantum abest vt
aliquem vñm cibis concoquerent afferant, vt
etiam ipsamet conficiantur agerint. Præterea
nec cōmodē per alium transeunt, nec digerun-
tur, nec vīnæ mouetur, nec sanguinis confectū
ni nutritioniq; idonea sunt. Si res etiam, vt aqua;
in ventre suspensa remanet: vt si paulō ampibus
ex ins hauseris, facillimē coactescant. Sed ex recen-
tibus vīnis genus illud duntaxat turō bibitur;
quod tennis substantiæ est: sicuti ex Italici, Cau-
chanum, Albanum, & ex Sabinis Thulesiq; non-
nulla. Aminēti quoq; quod in eo colle nascitur
qui Neapoli immaret, curō vt bibatur idoneum
redditur: quale apud nos in Asia est Tibanū, Ari-
finium, & Tiraczenum. Quæ sunt tenuia, candi-
da, & aquosa existunt, ideōq; oligophora vocan-
tur. Et quemadmodū rutila vīna, cum calida po-
testate sint, replent protinus caput, sic illa, nem-
pe tenuia, & aquosa, lenitēq; astringentia, non
modō capiti innoxia sunt, sed etiam leues eos ad
pituitas dolores nonnunquam tollunt, qui ab hu-
moribus in ventriculo collectis proficiuntur.
Quin & aquæ potio, vitum præcipue in se ha-
bens, nonnullis capitis dolores infert: nam &
ipsa corrūpitur, & naturale robur exoluit. Quo
fit, vt ubi ventriculum invalidum reddidit, in ca-
uas eius partes ex reliquo corpore sanies quæ-
dam biliosa deflueret confueuerit, more eorum
quos premit in dæ. Quibus sanē offensis, no-
xig, dictum vinū, sui temperamētī ratione, ho-
minem actutum liberat: paulōq; post, ubi firma-
rit ventriculū, quæ illi noxia sunt, ad partes in-
fernas defert. His ergo qui calido admodū tem-
peramento sunt, aquæ potus longē accommoda-
tor est vino: quod vñs si interdū propinare ex-
pulerat, sit quidem tenues, lenitēq; antierit. Ex vi-
nis itaq; quod vetustissimū est, adeo ab albo
& austero, necnō recente & crasso distinguunt, vt
illud quidem efficacia similē calefaciat, sensibilem
hoc refrigerandi facultatem obineat. Dulcissi-
mum autē acerrimūq; mel, eximie æstima-
tio est. Verū cuiuslibet generis mel calefaciendi
vires sortitur, sumptūsq; a calidis corporibus
facile in bilem vertitur. Idcirco pinutiosis admo-
dum nātūris, itatēq; & lenio confectis, vñluer
datur: frigidis quoq; morbis accommodatissimū
est. Acetū multū, hoc est, oxytel, sanatis tūen-
dæ grana ætatisq; naturisq; omnibus vñlissi-
mum est: siquidē obstruētiones omnes disciunt,
astriētōesq; meatus ita aperit, vt nulla in parte
crassū glutinosūq; succi adhaereant. Quare me-
dicamentū saluberrimū, tenuandū omnia in se pōte-
statem habet, ruitōsq; ad valetudinē tuendam
essentur, quin quæ crassiores humores gignit:
sed bonā habitudine, robūq; efficere nequeat.
Vitanda autē penitus quæ vīnōsi sunt succi, præ-
terquam ætare, cum languentium corporū sic-
citati & calori occurrentium est. His enim hoc
ipso tempore, mīla, pruna, cerasa, moriq; ido-
nea sunt: item cucumeres, pepones, melopepo-
nēq;: sed parcius his vti cōvenit. Dantur quoq;
præcocca, persica, & quæ a Romanis milce di-
cuntur, refrigerata tamen: necnon ipsa lactis, atq;
etiā cibaria ex lacte confecta. Ficus item frigida,

Vina quæ
calidiora sunt
facillimē
coactescant
latet.
Vinum recen-
tissimum.

Aminēti vi-
num.

Aquæ potio
quæ mala
infert.

Aquæ potus
quibus con-
ueniat.

Mel omne calfa-
ciat, atq; in cor-
poribus calidis
bilisq; facit.
Mel quibus con-
ueniat.

Oxytel ætatis
naturisq; omni-
bus vñlissi-
mum.

Cibi quæ
admodū
idonea.

Affectus non
virescentem

& cucurbitæ, ita affectis accommodæ sunt. Præ-
dens tamen vir, ad refrigerandos ætus exbal-
neis rediæ, epota prius aqua, mox vino medio-
criter aquoso, usq; per vomitum redditis, lactu-
cam edat, quæ innoxia est, similis vires habet re-
frigeranda. Sumat postea solutis pedes bene de-
coctos, ex aceto & garo: itemq; alas gallinæ vel
anseris, & eisdem etiam ventriculum, necnon
piscis nonnullos frigos, ex iis qui molli sunt car-
ne. Danda item ex olenibus quæ mali succi non
sunt, sicuti malua cucurbitæque. Vinum postea,
vbi frigida aqua daturum sit, potest. Milui sæ-
pius similes ætus & calores perpesso, præsan-
cremor bene refrigeratus fuit sana. Sunt qui ni-
ue refrigerentur. Sed hæc illis præcepta tradun-
tur, qui æstidus occupationibus impediuntur
qui verò huiusmodi sunt soluti negotio, si exer-
citatione uti solent, quam rarissime frigido po-
tu indigent. Qui minimè exercitantur, summa
æstare cum vehementi calore virgentur, aquam
fontanæ bibant, ab vsuq; niuis abstant. Hæc
siquidem, quamvis protinus nullam corpori-
bus inueniunt lesionem sensibilem inferat, sen-
sim tamen, occultiq; crescente vino, cum iam æ-
tas progressu temporis inclinaret, articulos, vi-
scera, neruq; us morbis vexat, qui vel difficul-
ter admodum, vel omnino tolli nō possunt: ni-
mirū semper imbecilliori partibus, facile quan-
cumq; excipiente lesionem. Quod autem vitio-
si humores morbos gignant, cruditas æstidus
maximè in causa est. Ea autem cruditas detri-
tor est aliis, quam vinosi succi cibaria effecerit.
Quæ cum duplici modo se habeant, si tenuem
quidem succum reddant, acutos morbos cum
maleficis quoq; febribus inuehant: succorūq;
vino in vnam duntaxat partem decumben-
te, tunc erysipelata, herpes, aliæq; affectiones
calidæ oriuntur. Si verd crassum succum effi-
ciant, articulosq; & renem vitia, podagry, an-
hedationes, tum lienis ictericisq; scirrhosi affe-
ctus gignuntur. At quibus males corporis hu-
mor melancholicus fuerit, affectus melanco-
lici orientur. Sed ex humoribus mixtis, mixte
affectiones proveniunt.

GAL. DE ATTENUANTE VICTVS RATIONE LIB. 414



Vm victus ratio attenuante plethys
diuturnis morbis, ut arthritidi, dys-
pnœæ, tumoribus lienis & hepatis,
necnon morbo comitiali, & aliis
pienti, adeo conferat, ut ibi, truci-
ne vilo alio medicamento, sublatis spe n̄ fuisse-
nt, operæ precium videtur aliquid & de ipsa prescri-
bere. Vocant autem eum attenuantem, quem ad-
modum incrassantem, quæ illi contraria existit:
pro eo humore scilicet, quem vtraque in nostris
corporibus gignit. Etenim olfactus & gustus,
mentem nostram ad omnes eiusmodi cibos dis-
cernendos, satis abvnde instruunt. Quippe quæ
sensu nostros pungunt & mordicant, ea omnia
constat esse acra, & quæ saccos crassos tenuare
queat. Quæ etiā, si largius æquo sumpta fuerint,

ventriculū mordicant, ciborūq; nauseam ma-
gnam inducunt, & halitus ~~maxime~~ emittit. Pluri-
ma autem eorū vrinas & sudores graueolentes
& acres promouent: alia autem diuellunt, ero-
dunt atq; perfundunt. Cæteris corpora in qui-
bus humores frigidi, crassi & leni redvndant,
huiusmodi ciborū vñ maiori ex parte iuantur.
Nemo igitur est qui alium, cepam, nasturtium,
porrum, & sinapi, in genere ignoret esse tenuan-
tium: post illa autem, imyrniū, pyrethrum, origa-
num, calaminthen, silymbrium, polegium, satura-
riam, thymū, quæ omnis viridia quidem man-
dantur: exaccata verò, iam non amplius sunt ci-
bis sed medicamenta. In summa, omne quod sic-
cum est, viridi valentius existit. Eorū verò quæ
sicca non sunt, maturiora minus maturis: & quæ
in montibus & locis siccis proveniunt, iis quæ
in campis tribus, planis, hortis, & paludibus cre-
scent, sunt fortiora. Prædictis autem ordine pro-
xima est capparis, & terebinthi fructus: his au-
tem eruca, sium, spium, petroselinum, orminū,
raphanus, brassica, & beta. Malus verò & blitū,
& amplex, tametī iis specie sint proxima, facul-
tibus tamen disident: aquæ enim sunt, minia
multis acris facultatis sortitur: quomodo tucusa-
bitæ, citrulli, melones, melopepones, & prunæ
humida siquidē sunt: hæc omnia, necnō frigida,
& puerula, postquam si cruda & non elixa man-
dantur. Omnia igitur tenera & increfcentia, fa-
cultatibus moderata existunt. Quo fit vt plera-
que medicamenta, dum oriuntur & adolescunt,
non secus ac cibi mandantur: vt silphij, sinapis,
pyrethri, & iringij stolonis, quæ omnia vbi com-
maturantur, magnam habent vim incidendi.
Tenuant verò admodum, dum oriuntur, atque
adolefcunt. Pari modo & vicia, priusquam ex-
crescent est esculenta: præterea fomiculus, ruta,
coriandrum, anethum, eisdem cum illis sunt
speciei, eidenterq; etiam calfacient. At verd a-
grestia olera, inter ea quæ diximus, naturam mea-
diam sortiantur. Si quid igitur olfactu, aut gu-
stus, aut vtriusq; simul, ac, mordicans & calidum
apparebit, scito facultatem id habere tenuandi,
atq; incidendi. Ad hæc, si quid olfactu bonū o-
dorem inferens, aromatis speciem repræsentet,
id quoq; vinibus calidum esse oportet: sed non
requæ ac mordicantia & rodentia, & insigniter
calfacientia. Incidunt præterea & quæ saporem
habent nitrosum, aut salsum: quoniam plurima enī
alium deiciunt, nec minus iis amara, facultate
tenuandi sunt prædita. Incidendi autē in illis fa-
cultas, aceto & melle intēditur, oleo verò minui-
tur. Mixacanthus porro, medic quodammodo
est facultans: ab eo autem eliq; & chamædaphnæ
vtriusq; nō multum differunt. Stomacho autem
minus prædictis comodat vñ alba, & viticis,
& spinæ asparagi: omnium autem maximè austē-
ri atq; astringentes, quales sunt vitis, ac rubi. Spi-
næ verò asparagus alium deicit. Iuvat enī ven-
triculū, facultatib; est medioctis, & palque ger-
men. Qui asparagi amaroris quippi præferunt,
quāto amantiores, tantō iis sunt ficiiores, & inci-
dentes magis. Semina sunt facultate suæ planæ
similia: nisi quod illis prorsus ficiiores sunt, ma-
gisq; ad calorem propensā, eorūq; magis tenuantia.

Arria larym
sumpta, quæ
malis infans.

Arria quibus
vitis.

Tenuantia me-
dicamenta.

Sicca esse vici-
tiora viridi-
bus.

Milana esse vi-
ciora camp-
estribus.

Arria habet
facultatem me-
dicandæ.

Tenuandi fa-
cultatem aceto
intēditur atque
melle, remittit
autem alium.

Palma gerat.

Similia esse fa-
cultate iis plā-
tis similia.

Non

Exercitatio
quæ rarissime
frigida potu
re.
Novum vñm
effe
periculis.

Cruditæ quæ
sit alim dete-
rior.
Affectus ad te-
nuantem ratio-
nem.

Affectus ad cras-
sa, succosus.

Tenuant
vici-
tior ratio qui-
bus afficiunt
eum, vñm.

Olfactus.
Gustus.

Arria quæ &
sanior.

Papaueri sem
tanquam iuno
uon, p. aub. et
placenta iuicis
et superstru
men castroru
La. laca iuon
superstru iuicis

Non omnia tamen sunt vesca, vt nec herbe ipsę. Est itaq; papaueris semen herba ipsa præstituta, adeo vt tanq; innoxii panibus ipsum & placenta permisceant. Refrigerare tamen & ipsum paulim ex hoc intelliges, quod caput grauatur, & soporiferu est, sed nõ perinde ac succus ipsius. Soporiferu est & lactuca: semen quandoquidem & olus ipsam frigidiu est & humidu. Ab his igitur frigidis humidisque & seminibus ei est cauendum, qui tenuante victus ratione vti volet. Sesami semen, succum crassum ac lentum in corpore agnita: pii vero, petroselinu, camini, carui, anisi, libythici, sinapi, ameos, dauci, seseleos, & omnium deniq; odoratoru & acriũ, euidenterq; calfacientium semen, tenuanti diuina vti vti congruit. Carteru rura semen vehemensissimam tenuanti vim possidet. Pari modo & lini & cannabi semina: quę etiã & caput tenant. Quibus tunc præcipue vendu est, dum sanguine per vrinã purgare volumus. Cerealia omnia generaliter appellantur legumina. Quę verò manu leguntur, speciatim dicuntur chedropa: sicuti & frumenta, quę falce putantur. Triticu igitur firmissimu est alimentu: succumq; crassum admodum gignit ac lentu. Quare illo simpliciter elixo nõ est vescendum: nam cõcoctiõni renitunt, & crassum succu producit. Sola autẽ ac preparatio est probanda, quę fermento constat, sale, & cibano. Paulo deterius quę minori fumo. Triticum quod grane est & densum, ac in profundo flauum, copiosissimu alimentu est, crassiq; succu ac lentu. Contrã quod leue est, & rarum, & album, minus nutrit, succumq; gignit crassum minus, ac lentu. Simila quo autẽ & alica, multu alunt, crassiq; sunt succu, ac lentu. Verũ similitudinem quidem nõ conuenit eas attingere, qui extenuante victu vtuntur. Alia verò possunt vesci moderate, tum sola aque incocta, tum verò cum mullu, aut vino dulci, sã uoq; ac tenui, quodq; viribus Falerno sit proximum. Lucebit etiã miscere tum beru tinas, tum anethi nũtibili, vel porri, vel pulegii, vel calamini thes, vel hyssopi, vel piperis. Prisana autem ipsu per se nõnihil absterget, vt hyssopu nõ magno peregrat. Mel prisane immiscere opus non est, nisi quia ea quę in thorace ac pulmonibus continentur, itudeat expectorare. In hepatis verò ac lienis affectibus ipsum admiscere nõ conuenit: Hordeacei panes, quouis illi modo parentur, exigui alimentu sunt, succumq; crassum, ac status minimu generant. Polenta verò, similiter ac panes, nutrit: nisi quod siccat magis, propterea quod fixa existit. At farina est vtriusq; humidior, excrementosiq; magis ac statulentia, & potissimũ frum lacte coquantur. Ex typha porro & aena, panes similiter cõficiuntur, qui & ægre coquantur, & siacum reddant nõn probum. Inter hæc & tancum, olyra medium locu sortitur: nimis tancu deterior tritico, quanto his melior existit. Quod verò ad acinu perinet, non arbitro esse aliud frumena genus, ab olyra & typha diuersum: sed eũdem, id quod nos appellamus typham, a veteribus eadẽ appellari. Quod semen vbi a cortice spoliatum fuerit, tritico, hordeo, & olyra, longe tenuius atq; exilius existit. Flauum propterea est, vt triticu nõ autẽ album, vt hoydes,

Fabe minus quidẽ quã hordẽ terget: vtrum sunt concoctu difficile, atq; admodu statulentu. Fabis pisa ad omnia sunt præstantiora. Erui le verò, & dolichi, & phasoli, multo fabis sunt deteriores. Lentis autẽ tamen succum crassum gignant, non omnino tamen sint aspernandæ: Lupini similes sunt lentibus, nisi quod multum ficasit. Ciceribus est statulentus, & concoctu difficilis, atq; excrementosus: ad mouendũ tamen vrinã cõmodu. Erui bouum magis & hõminu est alimentu: incidendi tamen faciliat insignitur. Vnde et ex eo medicamentu paratur, quod in illis que in thorace hærent expectorandi, nulli est insecudu. Farnogræci nõ in cõmodo alui deiciende grãtia, ante alios cibos sumitur. Cum melle quoq; eius succu exhibent, vt qui calfaciendi ac detergendi vim habet. Quod tamen caput tenet, vñus eius multu cauendus est. Prana Damascena hydromelite incocta, præstantiũ, quibus extenuante victus ratione est vtendum. Verũ his magis alui deiciendi, quę ex Iberia exportantur. Ventre præterea subducit eadẽ i marini, & concharũ omniu atq; annosoru galinaceoru iuscula. Panis & mullu prauu sunt fructu, statulentu, & difficiu cõcoctũ. Nam alui furem impeno siccant. Hortenses lobi cibo ad præparatu crassu tantu, pituitosiq; sunt succu. Ex frumentaceis cibis solũ hordẽ, tenuanti victui est innoxiu. Secundu hoc sunt panes thibaniz, qui ex tritico fiunt. A reliquis abstinendu censeo. Ex piscibus saxatilibus, montanisque aucibus, inultu copiosumq; potes alimentu ad tenuante victum accommodare. Animalia quidem quę in stagnis ac locis aqueis & campestribus degunt, humidiora sunt, atq; excrementa: quę verò in montibus viuũt, omnia sunt tum sicciora, tum calidiora tẽperie: eorũq; caro minimu pituitosa ac vici da existit. Quare animalia omnia in montibus nata, multo his quę in locis oriũtur planis, sunt præstantiora. Mandẽx etiã sunt aues, quę in turribus vineisq; agũt vitũ. Quare columbe turricolę domesticę sunt meliores: tum etiã pari modo & apri, subius domesticę: atq; vt in summa dicam, omnia quę exercerũt, iis quę sunt ocio sãet quę cibis siccioribus, iis quę humidiorib; vñtũ: & quę purũ ac tenuẽ acrem insipit, iis quę cõtrariũ, ad renuẽ victu sunt præferenda. Etenim sãũ domesticoru cõu omniu aliorum ciboru firmissimũ nutrit: plurimu tamẽ habet lentore. Quod si iis quę talẽ victu requirit, sese multu exerceat, iitẽbit ei & aurius, & rostru, & pedibus suillis vel: vñtũ præterea, & matrice, si modò ea elixa bellẽ fuerint. Qui autẽ vitam in maiori ocio degant, abvnde eis fuerit mõrãtis auibus vesci, & piscibus saxatilib; ac bẽtẽtẽr omnib; quę carnẽ habent frabilem atq; friabilem. Nam ab iis quę aut durũ habent, aut lentũ, omni nõ abstinendu est, nisi aliorum penguia nos aliquid talia esse cõpellat. Porro anguilla, & molliũ piscu pars maximã, tamen carnẽ mollem sortitur, quod tamen flauu lentu ac pituitosu reddunt, quĩ qui victu tenuatẽ vñ volum, planũ nũtũ noxia est. Hirci autẽ & boues, carnẽ quidẽ habet sãtũ friabilem, nocent tamen propter duritiẽ, & in alerando difficiatẽ. At sola car

Faba.
Anguilla.
Pis.
Erui.
Dolichi.
Phasoli.
Lentis.
Lupuli.
Cicer.
Erui.
Farnogræci.
Prana.
Damascena.
Iberia.
Concharũ.
Galina.
Panis.
Mullu.
Thibaniz.
Hortenses.
Fordenses.
Saxatilib;
Montanę.
Auicula.
Montana.
Domesticę.
Apri.
Subius.
Domesticę.
Tenitũ.
Anguilla.
Saxatilib;
Bẽtẽtẽr.
Anguilla.
Molliũ.
Hirci.
Boues.
Carne.
Anguilla.
Molliũ.
Hirci.
Boues.
Carne.
Anguilla.
Molliũ.
Hirci.
Boues.
Carne.

Sapientia est omnis animae a peccato immunitas.
Sapientia Deo simul.

Contumelias est aqua fieri dei animae.

Temporaria sunt deplorata infirmitas Galeni.

Exercitationes per totam vitam regnare, ut quis non perficiat reddeat.

Tracundiam si non vincit, et certi possit reperiri a nobis.

Galeni in sermone brevitas.

ad te perperam agitentur: id quod certe non probetur. Est autem sapientia omnino a peccato immunitas: ac proinde philosophi, non homines, sed Deo similem sapientem esse dixerunt. At tu repente Deo similis nunquam effici poteris. Ceterum si ei qui te reprehenderit gratias egeris, post autem diligenter tecum expendis, verumne te ille, an falsum increpauerit, ex ea te senties te magnam percipere utilitatem. Si verò idem assidue egeris, nobis animus sit ad meliorem fugem te moris, quod tuos componere, facile absolutus evaseris. Ceterum hoc sit tibi exercitatio precipua, ut calumnias & contumelias quocumque animo feras: quod ubi feceris, atque sedatus fueris, habuerisque tuas perturbationes perspectas, tum aggreditor respondere calumniatoribus: quorum audis rationibus, quammitissime cum eis lites tuas componas: atque ita rem omnem agas, ac si praedagogus mox sis redditurus rationem. Porro si quis sit vel apprimere potens, vel opulenter, qui velit in virum egregium evadere, habereque admonitores liberos, necessum est illi maiestate relinquat libris praesertim temporibus, in quibus nullus adest Diogenes, qui vel opulentissimo Principi, vel alicui Monarchae sit ipsam veritatem dicturus. Qui autem monitoribus duntaxat credendum est, qui & incalumniasimè vixerint, & aetate proveci sunt. Cum autem nullus sine peccatis, aut sine affectibus vivat, vel si optima quis natura sit praeditus, sed necessum sit vnuquodque labi & errare in aliquibus, eorum etiam magis, quod iunior quilibet fuerit, haudquaquam nostrum exercitatione per totam indiget vitam, ut vir perfectus reddatur. Nec ramen deterretur quempiam oportet, quod minus seipsum cometur meliorem facere, eni si iam factus sexagenarius, senarum sibi animi vitio immediatè cabuli deformati. Nam tamen si nobis còperit sit, animi non nò posse sapientis consequi: id quod forte liceret eni, si a teneris illi excoleremus) at saltem ne totum illud omnino deformè geramus, ut Therites corpus, sedulo nobis curandum est. Etenim si supremis quilibet animi excellentiis assequi haudquaquam possit, ac certe post supremos illos sapientes, in secundis, aut tertiis, aut quartis ut collocetur, id facere longiori tempore atque assidue exercitacione poterit. Primum igitur satis erit, si neque in deos male dicta iactabis, neque calcibus series, aut dentibus aggredieris lapide, neque effriteris vulnè intueberis, sed intra te ipsam cònnabis, atque occultabis iracundiam. Nam ab ira prorsus liberari simulac quis velit, non còtinuo quis poterit: còprimere autem illius perturbationis interperantiam, atque insolentiam poterit. Quod remedium si saepius quis usurpauerit, agnoscat etiam deo deo seipsum minus quam antea propellum ad iram, ut ne ob magnas quidem causas irasci possit. Porro servum si ne vnuquam meo manu verberatum fuisse, non memini: id quod etiam pater meus perpetuo canit, qui complures amicos increpare solitus erat, quod ferro citius laurent in famulos. Id igitur quod in nobis est iracundia & furoris, ratione còncerte atque erudire oportet: erudietur autem exercitacione improba. Turpe enim est quempiam multos annos còtinenter laborare, exercereque, ut vel medicus, vel grammaticus fiat: ut autem in virum bonum evadat, in tanto curriculae temporis

nunquam sibi quicquam laboris assumere. Ergo nec tuus ipsius manibus serum cedes, nec quam diu iratus fueris, alii ut id faciat imperes, sed in posterum differas. Postquam enim furor refriguerat fuerit, prudenter, tempera nunc dispicies: quod verberis, famulus plerendum sit dignus: nisi forte melius esse videatur, initio statim concessa venia, nego illi ipsum transigere, & ubi locum asseri iusseris, tum verbum duntaxat corrigere, minitarique, te non amplius còdonaturum, si rursus ille idem scelus patrat. Praestat itaque te facere omnia quae facis, ubi impetus ille animi deferbuerit: quo tempore iam ratione operante, punitionis modum sis inmentus: cum nil mirum impetus irascentis nihil ab insania, vel a furore differat. Quamobrem a veteribus haud immerito animi affectus haec quinque appellata fuerunt: metor videlicet, ira, excaecitas, enpidias, metusque. Singulis itaque diebus atque horis habere hanc in promptu opinionem oportet, quod praestet quidem vnuquodque se exhibere dignum, qui egregius ac frugi ab omnibus appellatur: hoc autem fieri non posse ut contingat nobis, nisi eum, qui singula errata indicet, censori admonitorumque habuerimus, quem sane ipsum nostrorum peccatorum indidem, & servatore nostrum, & amicum maximè exultimare convenit. Qui quidem si tibi visus fuerit aliquid falso criminis obiectare, ne ob id quidem irasci oportet: & quod multò melius quam tu, ille singula peccata tua perspicere possit: & quod licet falsum quandoque nobis crimen obiciat, in eorum tamen nobis sit vitium, quod te ad eorum quae agis diligentem observationem excitet. Curabis autem perpetuo, ut quam dignus sis, quantumque faciendus, a teipso, non ab alio, accipias habentem in memoria semper, quanta sit eorum qui irascuntur, deformitas animi, quantumque rursus viciis eorum qui sine ira vivunt. Omnibus accusandi te ipsum potestatem facias, gratiamque habebas non adulantis, sed obiurgantis potius. Patere autem semper domicilii tui fores, ut liceat nobis ac familiaribus omni tempore ingredi: cum sic affecto, atque omnia rite facienti, verendum tibi non sit, ne ab ingredientibus aliquo magno scelere implicatus deprehendaris. Volo itaque ut non modo alios omnes, sed teipsum in primis etiam verearis, illi ut asculentes qui dixit: Omnium autem maxime te ipsum te pudcat. Quod sane si feceris, poteris quandoque expertem illam rationis vim, quae excaecissimus, quasi feram quandam reprimere, manifestare. Ut autem longe turpissimum est, hominem iracundia percitum intemperanter, aliquid agere, sic etiam ob amorem, vinum, & crapulae cupiditatem: quae omnia facultatis appetitorum sunt & sceleris & opera, ob quae homo non iam equus vel canis, disciplinae ca pacibus, evadit similis, veluti ob illa prius, sed vel petulantia apro, vel hircio, vel cuiuspiam agrestis beluae, quae mansuifici non possit. Quocirca libido licet perducit ad obedientiam non potest, quemadmodum illa poterat: castigari autem quodammodo potest, si rebus potius ac frui prohibetur, quarum appetens est. Nam si potius, crecet, maiorque ac vehementior sit. Simi castigetur, tenuis

Abbas in 7. Anselmii

Fructus refrigeratio praedicta non multo melius delectat fuit.

Tractatus impetum nihil ab insania differat.
Tractatus animi quing.

Libido non red

Tractatus deformitas animi.

Quing. non est modo sed seipsum etiam delectat.

Appetitus facit ut afficiat illi et opera.

Libido non red de similes beluae agrestis.
Libido quae ratione castigari quae.

tenus atq; imbecilla redditur, ac sic imbecillitate coacta, nō vltro, ipsam rationē sequitur, veluti quoddam mancipiū. Duplex itaq; in nobis est animi vis ex parte rationis: vna, cuius & curā ex-
candescere & irasci est officium: altera, quæ ad id quod ipsi iucundum, suauēq; visum sit, præcepta fertur, antequam vnē ne sit atq; honestū, an no-
xium & turpe, cognoscit. Hanc igitur, quæ vehemētissima est, cohibere actum oportet, priusquā ubi incrementū acceperit, vicibus inuictā in-
ex-
pugnabilēq; se exhibeat: tunc enim vel si vo-
lueris, non poteris illam cōspicere, sed dices (quā-
damuolū quemdam amantē) velle te quidem desinere, at nō posse. Quippe vt nōnulla corpo-
ris vicia propter magnitudinē insanabilia sunt: sic vicia, cuius est temerē cōspicere, plerūq; amore accenditur insanabili, nō corporum mo-
do quæ sunt formosa, aut rerū quæ pertineāt ad venerē, sed etī crapulæ & violentiæ, itēq; ob-
scenitatū quæ præter naturam patrantur. Quæ igitur de ira & ex-
candescētia vincēda dixi, eadē putā de aliis affectibus me dixisse. Quæ omnia tibi sæpius reuocandā in memoriam sunt, quæ si nō posuisti tam crebrā, ardentē matutinis horis, semper anteq; aliquid eorū quæ acturus es aggre-
diaris, & vespertinis anteq; cubitus eas. Ego itē-
dem cōsueui admonitiones has, primū quidem bis legere singulis diebus, post verō etiam ore enun-
ciare. Neq; autē fat esse putas ab ira vna dun-
taxat liberū te conseruare, nisi etā ab omni eda-
citate, vinolentia, nequitia, curiositate, & in-
vidia, te purū integruq; cōserues. Nam nec pro-
pter simā decet, forbitūq; in sitar, totum calicem exhalare: nec propter famem in conspectu omniū, insanabiliter ipsum ventrē explere. De dan-
da o pēra est, vt omnibus vnā cōsentibus, minus obsequi assumamus, & a cibis gulam nimis irri-
tantibus abstinemus: moderatē interim vesce-
ntis, quæ salubria habentur. Progressū verō tē-
poris, ne respicere quidem te ad cōuiuantes ve-
lim: (magnū quippe nō fuerit, si in cibo & po-
tu illis continentiōr esse videaris) verūm, si hoc honore te afficere decreuisti, cura sedulo, vt continē-
tius viuas hodie q; heri. Quod si feceris, sen-
tes huiusmodi te iudicē ab iis, quæ dū, multo-
miori negotio abstinere: maximūq; persuadē-
ris lentia, si quando verus modestus, temperan-
tiazq; amator extiteris. Sic enim gaudet, qui cū-
q; in eis te promouetur, cuius amore flagrat. Hæc enim si ingrediamur viā, nō satis esse putabimus, si
plusquam dissoluti homines collocuti simus
modestus, probitatus, & continentis: sed primū
quidem eos qui iussu student virtutibus, supera-
re conabimur (est enim hæc concertatio atq; ex-
citatō pulcherrima) post verō, etiam nos ipsos:
idē memores semper pulcherrimi oris dictorum,
quorū vel hoc in primis est vnum: Delige opti-
mū vitæ genus, quod reddet consuetudo iu-
cundum. Quemadmodum igitur cū te aduer-
sus iracundiā exercere iubebam, tum argumen-
to vt poteras, te aliquid profecisse, quod nō am-
plius te excandescētem cernerēs: ita in iis quæ
ad modestiam pertinent, hoc indicio intelliges
quantū profeceris, quod nec cupiditate quidem
suauissimarū rerum tangaris. Ceterum ad mo-

destiam vna est via per cōtinentiam. Hoc siquidē
modestus superat continētē, quod illi ne-
cupit quidē amplius titillantes palatū cibos. La-
boriosa tamē ab imino via hæc est: & aspera, quæ-
admodū ceteræ omnes honestorū studiorū ex-
ercitationes. Verūm si pro malitia cupis habere
virtutē, ac pro voluptatibus corporis, tran-
quillitatem animi: per continētis, ratione dūce, ad
modestiam cōtendās oportet. At verō & cōtē-
tionis, & gloriæ, & principatus appetitio, animi
planē est affectus, licet illis iam dictis minor. De
invidia autē quid attinet dicere, cūm omniū sit
vitiōrum fœdissimū: Est enim invidia, dolor ex
alienis bonis conceptus. Sic itaq; id genus affe-
ctus omnes sunt dispungendi, vt ne radicē quidē
eorū vltim in nostris animis relinquamus.
Nam ex iis quæ sic relinquuntur, solet rursus al-
quid pullulare, dum idipsum a nequitia & pra-
uitate irrigatur. Porro natura in puerili etate ad
vitam perficiendam, in cunctis plurimū potest:
secundo autē loco, studia, exercitatio etq; disci-
plinarū. Ceterum ipsa puerorū ingenia plurimū
inter se differunt, cūm alia magis, alia minus vir-
tutes ipsas scēntur: omnia tamen sunt vel ma-
ximē ad affectus propensā. Verūm educatio pue-
rorum, similis quodāmodo est sedulitati, qua in
plantis alendis vtiuntur. Siquidem, vel si opimus
his plantarū sator & cultor, nunquā tamē effi-
cies, vt rubus vnū producat, quod natura illius
talem a principio perfectionem capere nequeat.
Rursus vites, quæ, quod ad ipsas pertinet, fructū
ferre paratæ sunt, si neglexeris, reliquerisq; soli
naturæ curandas, aut multo deteriores, aut planē
nullum edere fructum animadverteris. Mihi autē
ingeniū quadam felicitate conbigit, vt patrem ab
omni iracundia alienum, iussissimum, frugalissimum,
humanissimūq; habere: ut matrem vsq; ad eorū
iracundiā, vt interdū etiam morderet an-
cillas, semperq; vociferaretur, & cum patre con-
tenderet, idē longē quidē odiosius, quā Xan-
tippe illa cum Socrate. Inter omnia potim admo-
nebar me pater, vt a nulla secta cognomen sume-
rem: sed illas perpetuō artes edificare, per quas
iustitiam, modestiam, animi magnitudinem, atq;
prudentiam cōsequeretur. Laudant autem dice-
bat mihi virtutes has cūcti, tametsi sibi ipsi sint
consci, nullam se harū habere: dūntaq; opēra pro-
vidi, vt alius appareret fortis, modestus, iustus, &
prudens. Vt verē autē memoris sint atq; tristi-
tiz expertes, vel si minimē tales esse vidētur, id
magno studio contendunt. Quare etī huius a-
mici in primis studen dum esse, cui omnes morta-
les student, præter omnibus aliis virtutibus, vnū
hoc querendum suadebat. Quæ documenta pa-
terna in hanc vsq; diem retinens, nec vilius secte
nomenclaturæ me addidi, neq; ob vllam fortunæ
vicissitudinē fui perturbatus animo. Quippe
assuefecit me pater gloriā & honorem con-
temnere, atque vnā tantum, estinē nudam ve-
ritatem suscipere. Suadebat etiam, ne ob vllam
pecuniæ iacturā in dolore afficerer, quandoque
reliqua essent, ad curā dum corpus sufficerent.
Hunc enim primū fidem illis quæ possiderentur,
starebat, non efurire, non algere, nō sitim pati:
quod si cū plura suppetere, quā horum visus

Viciū ad modū
stū est nam,
per cōtinentiā.
Modestus quā
in se continen-
tem superet.
Via quæ ad vi-
tutem dūce
est laboriosa.

Invidia est in-
mā vitiōrū
fœdissimū.
Invidia est do-
lor ex alienis
bonis conceptus.

Natura in pue-
ri etate quan-
tū vim habet ad
mores for-
mandos.

In etate disci-
plinā plurimū
mō possit, a
vitiōrū adpo-
fessionē.

Puerilis inge-
nia omnia esse
ad affectus pro-
pensa.

Puerorū edu-
catō est quæ
malum cūctis
plantarū.

Galenus pater
nā laudat in
gustis dēclat.

Galenus mater
iracunda.

Galenus cō-
stantia.

Dicitur in
primis suis
quæ sit.

Animi vis ex
parte rationis
est duplex.

Quæcūq; pō-
tē in faciliā
amoderari.

Edulentiā est
salutē & salu-
bitur.

Continētius
vivendū est
hodie quā
heri.

Gaudet qui
in se te promo-
uetur, cuius
amore flagrat.

Concertatio
pulcherrima
quæ dicitur.

Conseruandū
videt inuen-
tū opusculū
vita genū.

*Galeni opus
lib.*

*Inexplebilis
habendi libidi-
ni obpari in-
satiabilitati
ventriculi.*

*Cupiditatem
esse vitium o-
mnium morum
atq. multum
causam.*

*Diuitis profla-
re, ad vitium
sed fortuna mu-
no exstit.*
*Galeni gram-
maticorum.*

lib.

*Velle cognosci
ab amicis,
unde proficiat.*
*Velle honorari
ab amicis
falsa ambicio
ne procedit.*

postulat, is sine ad eas res agendas, quæ lion-
est essent, esse vitium censetur. Nec me latet (sic
bar ille) te fortunari plus duplo quam ipse ha-
beam, possidere, in nostrâque civitate non me-
diocri honore esse præditi: vique adeo ut qua-
nam morioris tibi causa futura sit, nulli videt,
præter inexplebilem ac summam quandam cupi-
ditatem. Computabat autem insanabilem illam
habendi libidinem, voracitatem ventriculi, quæ plus
quam satis sit, ciborum ingeritur. Etenim cibo,
ut dicebat, nulla alia causa egemur, nisi ut ala-
mus corpus. Nutrit verò corpus, si bene conco-
ctus fuerit: bene autem concoctus, si modicus.
Nam si immodicus fuerit, concoctione non expe-
rietur, sed vias ipsius corrumpitur. Siquidem
aut electus per inferiorem, profusionem alui exci-
tabit: aut distributus per vniuersum corporis ha-
bitum, malum intra venas humoris gignit. Quæ
igitur in corpore didicisti, ad animi licet trans-
feras: cuius inexhausta cupiditas, plura perpe-
to expent, quæ ipse vius posulet, vnicuique omnis
morum atque tristitiae est causa. Ea namque accensis
nonnulli, qui præsentium rerum inexplebiles sunt,
nunquam concupiscere desinunt, sed si duplum quip-
piam habeant, triplum illud student acquirere. Tri-
plum nacti, quadruplum appetere incipiunt. Qui
quidem nunquam sibi proponunt eos, qui pauciora
possident: sed illos tantum, qui plura: quos enim
superare conantur. Quamvis certe multo satius est
ciuem in eo ceteris antecellere, quod si quæ
num habeat, sit omnino contentus: id quod cer-
te (dicebat pater) in tua manu est. Contra, diui-
tius præstare, non virtus, sed fortune munus exi-
stunt, quæ plebsque seruos atque liberos facit longe
diuitiores nobis, qui & generosi, & nobiles appel-
lamur. Quod si tu (quod in nostra repub. reperitur
pauci diuitiores) quantum optas aliquando asse-
quaris, hoc est, ut plus vniuersis possideas ciui-
bus, ne sic quidem satis sis habiturus: sed illico cir-
cumspectis, num quis in alia ciuitate sit ditior:
quem quidem si superaueris, tibi obsecundante
fortuna, ad alias progredieris nationes, & is quæ
apud alias opulentos ostenderis, fieri opulentior
cõtendes. Quare nunquam sane omnibus diuitior,
sed propter immensas cupiditates, semper futu-
rus es pauper. Quod si ipso vius rerum metieris id
quod modulo tuo respondeat, iam te ipsum vni-
us diuinibus numeraueris: aut saltem ex iis, qui eo
quod opus est abundent: etiam quatenus ad ra-
tionem pecuniarum spectat, beatus, cum earum causa
minime futurus sis tristis. Si vero etiam illa, quæ
ad honores appetendos pertinet, insatiabiliter ex-
prolesis, hac quoque parte intendit ac sine mole-
sta vitam ipsam traduces. Sin autem noli non fa-
tis fuerit honorari ab iis, qui tua consuetudine
vitantur, sed velis ab omnibus omnino qui sunt
in ciuitate laudari, etiam ab illis scilicet a quibus
ignorantis profusus: fortasse primū quidem ab iis
ipsis cognosci volens: tum autē, ubi cognitus fue-
ris, suspici. At illud quidem, velle cognosci ab om-
nibus, ab amicis quædam proficiat gloriæ
cupiditate: hoc autē quod est, velle honorari &
suspici, ab ami planē & stulta ambitione. Quo-
circa tibi necesse erit, ut nec pecuniam querendis
in vigilanti; sic tunc ad gloriæ honorisq. studiū

cupidinē intendenti, ob illos qui eum plures sunt
te neque cognoscent, neque honorabunt, maiores quæ
nunc tristitia & dolore affici. Si igitur in his sem-
per nos exercuerimus, iam exploratū habentes,
insatiabilitatem vitium esse animi pelisimū, fun-
damentumque omnium cupiditatum, pecuniarum, glo-
riæ, honorum, principatus, & cõtentum nonis, haud
dubie circa omnem molestem viuemus. Quis es-
nisi sua sorte contentus fuerit, is omni morore ac
tristitia carebit. Quis autem nolit omnē ætas-
tem circa mororem transigere? aut quis non hoc
omnibus præposuerit? mobilibus, imō verō sce-
leratis diuitiis? Ille igitur hæc & alia multa mihi
& alia quam verissimè pronunciabat. Turpe si-
quidem est libertatem eam, quæ humanis legi-
bus accepta refertur, maximi facere: eam autem
quæ & verè, & natura ipsa est libertas, non omni
studio venari, sed inhonestis, impuris, atque tyran-
nicis dominis inherere, lucra videlicet, manu-
sumis quibusque pecuniariis rationibus, ac
principatus, gloriæ, honorisq. ambinois cupidi-
tibus. Quorū sane omnium matrē ego liuid du-
bitauerim dicere, inexplebilem habendi libidi-
nem. Quis igitur talem in animo pestem habet,
posuit vniquam ad honestos, aut probos evadere?
aut cur non mille sit mortuus dignus, qui toto
animo talem turpitudinem odent? Porro autē
hanc ipsam multo magis & odisse & fugere de-
bent adolescentes, qui se saluos esse velint. Nam
si forte inuio assueverunt pecuniam insatiabili-
ter cupere, fieri iam certe non poterit, ut cum ad
annum pervenerint quadagesimū, seipsos re-
cuperent. Ceterum tametsi difficile atque arduum
videatur, adolescentes ipsos in principio sese li-
berare ab affectibus, progressu tamen tempo-
ris omnia faciliora reddentur. Quod enim maius
rationalis nostri animi pars in huiusmodi ex-
ercitationibus ac studiis incrementū accepit,
eō perfectiorem obedientiā habebit. Nam cum
ea quæ maxima sunt, ratio nondum exercitata
pervicerit, minime dubium est, quin vbi dupli-
cem excellentiam inde patet spacio temporis fue-
rit, sit multo facilius superata: quippe ex eo
quod iam sese exercuerit, evaserit multo genero-
sior quam antea: proindeque sic abvnde sufficere
exterminandis affectibus, iam etiam imbecillio-
ribus redditis.

*Insatiabilitas
est fundamentum
omnium
cupiditatum.
Contentus sua
sorte qui fuerit
est omni co-
rebi tristitia.*

*Adolescentis si
pervenerit ætas
fuerit per se
suum insatiabi-
litate cupere,
fieri non possit,
ut cum ad an-
num pervenerit
se ipsum re-
cuperet.*

*Rationem per
exercitationem
studii vnde se
superet.*

GALENI PERGAMENI de consuetudine, liber primus.



P'od consuetudinis ratio ad inven-
tionem eorum quæ sanitati conducunt,
magnam sibi vindicari fa-
cultatem, non modò Hippocrates, sed
Erasistratus enim professus est: quæ
quidem negligentes medici, interdum egros quæ
miserrime iugularunt: ut in Ario Peripatetico
facillimum fuisse videtur, qui cum gracilis natu-
ra esset, & os ventriculi frigidissimum fortite-
ret, ut vel ex leuissimâ refrigeratione singu-
laturam competeret, ob idque nunquam fuisset
a suis æquam gustare, tandem febri occupatus, a me-
dicis præter consuetudinem coactus potu fri-
gidæ vti, subito fuit quidem exanimatus: Aliis
vero

*Animi Peripatetici
tunc fuit insati-
bilis medicorum
actio.*

Animalia naturaliter ad ea pabula accedunt, quae illis magis sunt familiaria.

verò contrà, nisi audacter potus in propinietur, periculum sane est, ne exigantur celeritèr. Sūt enim quibuidam aliqua peculiaris ex propria natura, aliudq; alimentum aliq; corpori accommodatur. Ob id idy animalia aliq; abique vlla disciplina, sed tracta à natura, ad ea pabula accedunt, quae sibi magis sunt familiaria: iumctà nimis ad herbas, fructum, paleas, & hordeum: ad carnes verò, tum leones, tum lupi. Vrantem nō parua in animalibus iuxta varia genera propriorū alimentorum reperitur differentia, sic in eodem etiam genere multa interfunt atq; magna discrimina. Nam multa sunt quae vinum (exempli gratia) ne gustare quidem possint, quod tamē ab aliis plurimum sine vlla modeste bibitur: ac de ceteris quidem parū iudicio. Solit quippe homines alia aliter audire mandere, pro lux naturae ratione, quod videlicet talia ipsis faciliora concoctū videantur: contrā verò quae gustui sunt ingrata, fugere & fastidire, tanq̃ ea quae ab ipsis concoqui nequeant. Est igitur hic consuetudo ipsa signum naturalis cuiusdā proprietatis. Sed quod est nōnunquam sit etis illius causa, hinc liquidō constat, quod aliquib; verū quarundā visus inter initia ingratus & noxius cum sit, vbi paulatim assueuerint, iam ea illis neq; amplius ingrata, neq; noxia redduntur. Nam vt vni quodq; eorū quae vel comeduntur, vel bibuntur, alteratur secundū qualitatē: ita & ipsum quodq; id à quo alteratur, quod quomodo altit. Quod autem similitudo quaedā sit inter ea quae alunt, & illa quae aluntur, tam semina, tam plantae, eisdem argumentis esse possunt, quia ita sepiusmē alterantur & transmutantur, vt quae in vno loco solebat esse vniuersa, ad alii translata, maximē cōferentia reddantur. Iam verò vt corpus nō & potu immutatur, sic etis ita quae extrinsecus occurrunt nobis, quaeq; nō minus consuetudini inferuntur. Primi igitur à refrigerantibus rebus cutis ipsi colligitur: deinde ceterae partes quae illi proximae sunt, donec ad profundiores alteratio ipsa perveniat: idy primò & p̄ter. Nam per accidens, calor in alto collectis corpore, cute densata p̄ frigore, increvit. At verò si vtriusq; refrigerantia eusmodi alterationes invehit, sic calefaciens, istis contraria. Ceterum ab vna & eadem causa saepe contraria fiunt: Sol siquidē inter initia, dum nos calfacit, fundit humores, cutem lenit, carnēq; reddit molliorem. Si quis tamen actuoso tempore pluribus diebus nudus sub eo sit diuersatus, illi tum cutis, tum ea solis, dura audiq; reddent: id quod nō est caloris solius, sed frictus etiam illi anni ex op̄e. Potior balnea dulcium aquarum calefacient nos & humectant, quod calori habent humorem cōiunctum. Quare necessum est nos nouisse, aliam quidem esse rationē caloris humidi, aliam verò sicci. Ceterū corpus rarum & molle facit ab extrinsecis iniuriis afficitur: durum autē multo facilius eas tolerat, & gerit, modū ab illis laesactur, quā quod etiam paenitenti facilitatē & dyspantiā, consuetudo nō exiguum vim obinet. Quod verò ad exercitia pertinet, exercitiae particulae fortes partes & solidiores reddunt, ac proinde monones suas obire ac ferre, q̃ ceteris, longe facilius possunt: quae, quod exercitio caruerint, mol-

les atq; languide existunt. Eodem etis animi exercitatio nes spectant, quibus exerceri solemus: primū quidem grāmancis rudimentis, dum situm pueri: mox rhetoricis, geometricis, arithmeticis, logicis theorematibus. Cum enim facultates illae, quae ad a nimi principem vim spectant, ad omnes artes pertineant sine, quarū altera quidem cognoscimus quid consequens, quid verē pugnant est; altera verò memores sumus: si prima sanē id habemus, vt sapientiores simus: si secundae autē, vt magis memores. Eam tamen naturam hae facultates habent, vt exercitatio nes vires indispiciuntur & crescit: ocio autē languescit, at minuantur: id quod differēssimē explicuit Plato in Timaeo, secutus Hippocratem, qui vsum robur addere, vnum verò dissolvere pronūciat. Verū ipsae exercitationibus, sicuti & cibo, & potui, vigiliisq; & veneri, mensura congrua adhibenda est, quae rem ipsam neq; vltra quā p̄ sit, protrahat, neq; etiam de illa adimet: quia excessus dissolvunt vires: defectus verò tantum de virtutē destruant, quantum ipsi à recta mensura deficiūt. Facilitates itaq; nostrae robur sibi cōparant: si modoratis congruentibusq; exercitiis foueantur. Atq; hae quidem sunt consuetudines differētes, & vi materiem in quibus illae consistunt, & a quibus fiunt, desumunt. Vt vacuatio nes non debentur corporibus ob consuetudine aliquam, quemadmodum Erasistratus existimauit: sed ob causam quae illas potulat. Sunt siquidem qui ex malo victu, sunt qui ex praua corporis affectione sanguine plurimū, aut vitiosos humores aggregēt: quos plurimum lunare solet, cum aut à natura, aut à medico, quod redundat, antequā in morbum labantur, detrahatur: quo remedio toties vntur, quoties aut morbum praesentem vident, aut eum ad venturē praesentem: adeo vt mis merendi ratio in consuetudinem illis esse versa videatur.

G. AL. PERG. DE CONSVETVDINE LIB.

de tuenda sanitate liber primus.



Vm vna sit ars, quae circa humanum corpus versatur, eius primae ac maximae partes sunt duae: quarum altera vt sanitatem tuenda, altera morbi profigandi facultas est. Aē sunt quidem officia eorū contraria: illa quippe tuenda, huius immutare statum corporis, est propositum. Quoniam autē & dignitate & tempore sanitas morbi praecedit, vtrq; & nos, quemadmodum huius seruandae prius tractare conveniet: post autē, quo p̄terito modo dissimile frabigendus morbus. Vtriusq; facultatis inueniēde communis ratio est, vt quidnam ea corporis affectio sit, quae sanitas dicitur, siquidē cōstet: quādoquidem nec praesentē seruare, nec amissam restituere, si ram penitus ignoret, licet. At similitudī partū sanitas, validi, frigidi, humidī, & siccī symmetria est. Instrumentali verò, ex similitudī ipsarū cōpositione, numero, magnitudine, & figura cōstat. Quare quisquis haec cōmōde tueri possit, is optime sanitatis cultus fuerit. Tuedi vtriusq; quoq; modos

Exercitatio in animi theorematibus.

Exercitia in animi theorematibus.

Animae facultates extrinsecus sunt: quae ad dispositionem, & languorem, & morbum, & exercitia debent esse moderata.

Exercitia dissoluta sunt: quae ad dispositionem, & languorem, & morbum, & exercitia debent esse moderata.

Vitiosus humor, qui in corpore est, cum illis pabulis.

Calor internus ex accidenti crescit, cuius refrigerata, contraria per sepe contraria non eodem causa.

Balnea dulcia calfaciunt, non & humectant.

Corpus durum, crispum, ad exercitia habet, quoniam non obinet, exercitiae particulari reddi, si fuerit & solidum.

Medicina partium officia contraria.

Sanitas morbi, quae est, & tempore est, & tempore est.

Sanitas partium instrumentalis, & numerica, & figurata, & magnitudinis, & figurae cōstat.

omnes quibus vitantur, cōpertos prius habuerunt. Sanē quæ corpus nostrū lædūt corrūptūq, ea sunt genere duplicia: altera nobiscū congenita, & quæ evitare nequeas, quæq; ex ipsis generationis principijs oriuntur: altera, quæ & declinare possis, & orta à nobis nō sunt, sed aliunde perveniunt: quæ tamen nō minus q̃ illa corpus nostrū conficiūt. Etenim sanguis, semēq; genitalē, generationis nostræ primordia sunt: ille, ceterū materies quædam apta: hoc opificis rationē obnins. Cōstat horū vtrūq; ex iisdem genere elementis, nempe calido, frigido, humido, & sicco. Ceterū in semine plus est ignis subtilitatz, & ætē: in sanguine aque, ter: ex q; quantū præ pollet in hoc quoq; calidum frigido, & humidū sicco. Semen itaq; sanguine siccior est, cū sit ipsum quoq; humidum atq; fluxile. Quare nobis vtrūq; ex humida subtilitāte geniturū origo proficiat. Hanc autē sicari oportuit ad generationem sicarū particularū, elemento nempe facultate sicandi prædito cōsistente illuc liberari. Siccat autē tum ignis, tum terra. Ex illo tamen ad vtrūq; principij maior cōfluxit copia, vt scilicet tum siccare abyndē, tum calore suo ad motiones agilitatem præstaret. Ab hoc siquidem primū cogitur atq; concrevisse factus. Mox siccior redditus, vel nū lineamenta quædam cū suisq; membris obtinet. Vterius verū siccescit, exactam vniūcuiusq; speciem ostendit: ac tandem in lucem editus, magnitudine augetur, sicciorq; & valentior vsq; ad limum incrementū efficitur. Quo tempore vniuersa membra, non solum robusta & integra sunt, sed vires suas etiam summas sortiūt. In eo verō quod sequitur tempore, omnibus iam partibus supra iustum siccescētibz, nō solum cuiusq; officij minus probe administratur, sed etiam corpus ipsum macilentius, gracilius, atq; rugosius redditur, artijq; omnes invalidi, atq; ad motus suos pigrī & inconstantes cernunt. Quæ affectio appellatur senij, ipsi marcori plantarū, proveniēti ob siccitatis excessum, quædam proportione respondens. Vna igitur hæc est omni genitō corpori corruptelæ, interitusq; connata necessitas. Altera autē, quæ præcipue in ipsis animalibus cernitur, totius sub stantiæ fluor, quod insitū calor exorat. Hæc itaq; incōmoda, nullum quod genitū sit corpus effugere potest. Reliqua quæ hæc sequuntur, & quæ ad victus rationē pertinent, providētia cōsiliōq; certē potest. Neq; enim his aliunde origo est, q̃ ex ipsis iam dictis incommodis corrigendis atq; sarcandis. Nam cū tota moles animalium in perpetuo fluore sit, ni simlis altera substantia præ ea quæ defluxit, restituta fuerit, evaporabunt certē, dissipabuntq; vniuersa. Idcirco natura non modo animalibus, sed stirpibus etiam, insitras quasdam vires, deficientes ac desiderari semper appetentes, statim ab initio indidit. Cibo igitur, quicquid siccioris subtilitatz effluxit, restitutum: potione, quicquid humidioris, ita xero & ætē, igneque substantiam modum, respirata, arteriarumque pulsu ruemur. Necesse autē est, ex his omnibus colligi excrementorū proveniūt, cū nimirū his quæ effluxerunt, prius similia non sint, sed varias mutationes alterationeq; prius

quam assumentur, possident. Cū igitur effluibet q, necessaria animantibus sunt, has autem res generatō excrementorū sequatur, natura non solum eis excrementis insitūta organa, verum etiam organa ipsū facultates insitūta, quibus incitata, quædam ad se trahunt, quædam ab his trahuntur, quædam omnino expellunt ipsa excrementa. Porro hæc, quod semper mundum corpus ipsum servetur, nec obitū aliquatenus, nec ad proprias functiones imbecillia esse oportet. Atq; ita geminū iam scopū salubris vitæ sermo nostræ exposuit: alterū eius quod ex hautū est reficiēti, alterū excrementa expellēdi. Nam tenens, qui huius speciat, ne animal præpropere senescat, duos iam ductos necessariō comitatur. Ex se itaq; duplici ratione cōsumitur corpus: & quod vel status cūctis, vel a studio fluore ad iterum tendat: & quod etiam excrementorum copia obruant. Eorum verō quæ extrinsecus incidunt, vnum certe est, quod ab eo separari nō potest, sed perpetuū illi veluti cognatum adhaeret, æt ipse ambians. Alia nec necessariō, & incerta temporibus nobis accedunt. At igitur circumsusus nos lædat, calidos immodicē, vel frigidos, vel humidos, vel siccōs efficiens. Hæc, quod cōsistunt, divellant, vultuerē, articulū aliquid sua sede dimoveant. Est autē sanitas, haud quidem absolute ipsorū elementorum, sed duntaxat partū similitudinē temperamētū commodatū. Quædam modū & intrinsecū talū sanitas, in figura, numero, magnitudine, & compositione similitudinū consistit. Porro habiti sanitatis discernimus, ex functionibus secundum naturam obitis: in ipsiq; latitudine sanitatis, sanitas quædam optima, cōsummatiorq; existit: quædam velvī recedens ab hac, necita planē absoluta, quæ & ipsa suam etiam nec parum latitudinem habet. Nam cū sanitas symmetria quædam existat, symmetria autem omnis duplici ratione ducitur: aut enim veluti summa & perfectā, aut tanquāā perfectione hac deficientē paululum: vsq; & sanitas symmetria similiter duplex erit, hæc quædam absoluta & optima, illa paulō recedens ab hac, nō tamen carens, vt animal sit grauis. Quædam modū igitur corpus aliud magis, aliud minus album cernatur: ita quod sanum dicimus, magis minusq; tale esse mihi vide turid quod ex mutatione eratū atq; actionū diuersitate licet planē colligere. Siquidem cū ipse actiones quæ debite respondent temperaturæ, corporisq; constitutioni (quæ sanitas est) sint varæ: necessariō perfectō est, vt temperaturæ atq; cōstitutiones hominū, sic sanitates etiā varias & diuersas existere, secundū maioris minorisq; rationē. Non itaq; absoluta illa tantūm, quæ iustitā est, simul est & dicitur sanitas, sed etiā quæ ab hac deficit, & in qua nec doloribus cruciatur, nec vitæ actionibus impeditur. Sed nec functionū imbecillitas, morbi statim est notata, nisi adiciat, quæ præter naturam cuiusq; sit.

Nam vt sanitas est naturalis affectio actionem perficiens, sic morbus affectio præter naturam, impediens actionem. Quare nō omnis affectus secundum naturam, cōnūm etiam sanitas erit. Siquidem ægyptiorum nigra, licet naturalis affectus

Excrementū pel lentū vana et quā dūctū facultatibus prædita nō misit naturā.

Salubris vitæ geminū scopū.

Corpus ex se duplici ratione cōsumitur. Autem ambian tem est veluti cognatum corpore.

Sanitas est similitudo eorum corporum quod.

Sanitas intrinsecus in quibus consistit. Sanitatis habiti duo discernuntur ex similitudinibus secundum naturam obitis. Sanitatis iustitā latitudinē am pliam. Sanitas est sym metria.

Symmetriam omnem duplici ratione ducimus.

Sanitatis iustitā omnem esse de oportet.

Imbecillitas functionū, non præter naturam si non est iudicanda morbi.

Sanitas quædam. Morbus est affectio præter naturam, impediens actionem.

Latitudo corrupti corporis, genere duplici existere.

Primordia nostra præter naturam non esse sanguinem, & genitalē semen, illa tanquam materiam, hoc opificis rationē obnins.

Semen esse ipsū sanguine siccior.

Sicciora elementa sunt ignis & terra. Ignis maiori copiam tribuit, si ad vtrūq; nostrā generatōnis primordia.

Senij accretio despectio.

Corruptela interitusq; duplici omni modo obitu adiacet.

Animalis corporis in perpetuo fluore versari.

Animalibus vniuersi esse insitūta quædam vires, deficientes ac desiderari semper appetentes.

affectus fit, nō tamen dicitur sanitas, cū ea mi-
nime in colore consistit. Neg si prater naturam
aliquis affectus se habeat, protinus morbus est:
alioquin morbus esset nigredo ex insolaria con-
tracta. Permagnam itaq; haberi sanitatis lanti-
tudinem cōstat, nec eam in nobis omnibus aequa-
litet prorsus inesse. Iudicabimus autē ipsam eu-
crasiam & dyscrasiam, in quibus sanitas & mor-
bus consistunt, vnius sensus opera: is siquidem
ad omnia vitæ munia vbiq; nobis est iudex.

Quare actionis vitium, non antē pronuntiabi-
mus morbum, quā ad sensibilem pervenerit
magnitudinem. Porro actiones ipsæ, cōstituti-
ones corporis necessarij sequuntur, eam quæ pro-
ba est, inculpatæ probrix: quæ contrā est, culpa-
bilis ac vitiose. Ac proinde nihil refert im-
prensari, si quis in genere functionū, aut cōstituti-
onū, sanitatē & morbū collocet: modō intel-
ligat, in naturali cōstitutione corporis illa maxi-
mē servanda esse, quorū beneficio occurrunt fun-
ctiōes: & quod similitudī quidem partū eucra-
sia, instrumentalium autē forma, positura, nume-
rus, & magnitudo, causæ existunt functionum:
quodq; hæc omnia spectentur in latitudine qua-
dam. At verō diversitatem eucrasie in corpori-
bus sanis, ex ætibus ad amussim cognosces,

cū nimirū ad omnes volūtarias actiones a do-
lescētū ætate q̄ aptissima fit, inceptor autē infan-
tū & senum, propterea quod humor in illis, in
his siccitas frigidaque nimis abvndet. Quāq; i-
certe in functionib; naturalibus, infantium ætas
ceteris omnibus antecellit. Neg tamē ed secius
omnib; per omnes ætates licet esse sanis. Et quæ
admodū in ætibus esse habet, ita etiā in natu-
ris eorū immensam esse differentiā tempera-
mentorum invenies. Quibuscumq; igitur corporibus
multo supra iustū calidis, frigidis, humidis, aut
siccis esse cōgias, his planē optima temperies nō
est. In quibus autem ab eo quod absolūtissime
temperatū est, diversitas quodam intelligitur, mi-
nor tamen q̄ quæ sensu dācerni possit, licet certē
p̄ absolūtissimas accipimus: ita vt saturatis, quā
in latitudine contemplamur, hæc quidem mediū
temperamenti sit, nec vllī vino obnoxia, quod
saltem sensu percipiatur: hæc ceu intemperata,
vitioq; exposita. Quocirca illi quā inculpatē di-
ximus, exactā absolūtisq; debetur custodia: alie-
ri quæ vitio nō caret, haud ita exacta. Quippe in
temperies quæ intra sanitatis consistunt termi-
nos, ita corrigere oportet, vt per contraria redu-
cantur ad moderatū temperamentū. Sicvī igitur
nec nimis gracile corpus probamus, nec qd
valde est obesum: ita nec temperantia corū, ā
quibus videlicet habitudines id genus oriuntur,
planē laudabimus, tametī vtunq; maximē sanū
esse cōspicimus. Sed que in medio horū habie-
dinis sunt, ut quæpā Græci dicūt, si vti ipse debi-
tam partium convenientiam, iscemq; inculpatam
habent: ita id totū cōveniens laudabilisq;
temperamenti beneficio acceptū ferunt. Cete-
rum ne tales quidem corporū habitus absolūta
ex ætate temperie dixeris tēperatos: quod nun-
quam eodem in statu permaneant: licet secundū
sensum, & quatenus ad vsum fit satis, nō inculpa-
biles modo, sed etiā optimos eos esse censens.

Est autem optima corporis cōstitutio, si substru-
tiam eius spectēs, & quæ optimo temperamen-
to sit, & quæ figuram partium, omnemq; tum nu-
merum, tum magnitudinē, tum omnū earū, in-
ter se contexturam, ad functiones egregie cō-
paratam habet. Si verō indicia naturæ respicias,
cuius corpus carnis medioeritatem præfert, atq;
secundum singulas partes, in medio excessuum
omnū libatur; pulcherrimū simul & cōmoda-
rum existens. Huius ergo fortis homo, si itam
vbi editus est in lucē, artū sanitatis tuendæ edu-
candus tradatur, erit vitioque fortunatissimus. Sic
namq; ad animi quoq; affectus non nihil iudici-
et, ipsa nimirū recta victus ratione mores quo-
que probos reddente. Ergo recens is natus in-
fantulus, cuius corporis consuetudo omnino in-
vacat, primum quidem falsis deligeret, sed cōpo-
ri prius totāle modicē insperio, quō cutis
cuius densior solidiorq; illis quæ iustus sunt par-
tibus reddatur, vt resistat facili iniuriis extrusio-
nis. Vbi verō involutus iam fuerit, lacte pro ali-
mento vtatur, & balneis salubrib; aquarū. Vniuer-
sam namq; victus rationē, humidā sibi adhiberi
postulat, vt qui ceteris ætatibus temperamento
sit humidior. Id quod sensus Hippocrates, ait,
humidam omnē victus rationē febricitantibus
esse vitē, præcipuē verō puellis, & iis qui tali re-
fici victu vult assueti: vbi ā morbo quidem con-
trarij adhibendi indicatio accipit: ab ætate &
consuetudine similis. Quæ enim corpora secū-
dam naturā se habent, iis custodiendi solum haberi
debet: quæ aliquo morbo premuntur, iis contrā,
alterari & ad contrarium trahi haberi expedit.
Ac servatur quidem similibus vnumquodq; , al-
teratur quidem. Si itaq; nulla præter naturam
humiditas subbit, pro naturæ ratione alendi, ac
dulciū aquarum balneis humectandi sunt puel-
li. Nam sulphureæ, bituminosæ, aluminosæq; a-
quæ, planē omnes siccant. Cū igitur sanguine
in vtero alio non consistit, ex sanguine autem exi-
guam in mamillis mutationē perpeffo cognatur
lac, erit vitio lac maternū non modō alimentum
consuetū, sed etiam maximē propriū cunctis in-
fantibus, ac præcipuē optimē temperato: quip-
pe cuius maternū non corpus modō totum, sed
etiam lac, ā vitio esse alienū non sit absimile. Tri-
bus autē remedijs nutrites ipso vsu edoēt mul-
cere solent infantes, dū aut offenduntur, aut plo-
rant: nempe ipsa papilla ori iudicia, morū medio-
cri, necnon vocis modulatione. Quibus non so-
lūm eos mitigant, sed etiam somnum conciliat:
vel hoc ipso resuscitante natura, ad miscent eos
& exercina suapte esse ingenio propios. Adeo
quisquis his artibus probē vt fuerit, in corpus &
animam optimē instituit. Nutricibus porro tri-
plex infantibus excoqrata dimotio est in canis,
in pendentiūbus lactulis, in suis ipsarum vni-
us: tōtūq; in vnum eūdem norantur etiā prima ex-
citationum genera. Quippe aut ā nobisq; mo-
uemur, aut ab alijs, aut medicamento. Horum
tamen tertia species, ad sanos nequaquā pertinet.
Sed qui ab altero præstatur motus, nauigando,
equitando, vehendo, atq; in canis, lactulis, & vi-
nis obitur. Recens tamē nati puelli, tam valentē
motū, quā est qui vehiculis, nauigis equiue

Optima corpo-
ris cōstitutio
quæ dicitur.

Mores reddi
probos ā recta
victus ratione,
infantū edu-
candæ ratio-
nis.

Infantulo,
primum quā in-
volutus, lacte
esse instructum
Lat.
Balneo.

Humida vi-
ctus ratio quib;
conueniat.

Corpora secū-
dam naturā se
habentia serua-
da esse, alteren-
da quæ aliquo
morbo premun-
tur.

Similibus san-
gula cōfirmari.
Alterato sibi
per contraria.
Quæ siccantes
aquæ.

Sanguine in
vtero alimentū.
Lat. ferre san-
guine.

Lact similitudo
alimentum in-
fantulo.

Infantibus multū
de ratione tri-
plex.

Infantes natu-
ra proprijs
esse ad miscent,
atq; exercitia.
Infantibus mo-
tationem triplicē
excoqrant
nutricibus.
Excoqrantur
prima genera
motus.

Sensu iudican-
dam esse eucra-
siam & dyscra-
siam.

Actiones super-
tur cōstituti-
ones corporum.

Sanitatis cau-
sa quæ existit.

Adolescentes at-
q; quæmaxime
sanis ad omnes
voluntarias ac-
tiones.

Infantū ætas
habet natura-
lis functiones
reuerentiores
multis, quā
reliquæ ætates.

Sanitas est di-
plex: vna tem-
peratissima, al-
tera vitio vi-
tio exposita.

Sanitas incul-
patibilis conser-
uanda est: quæ
vitio nō caret,
reducenda per
contraria est
ad moderatū
temperamentū.

Infantū.

præstatur, adhuc non desiderant. At qui iam ter-
tium aut quartum annum agunt, in vehiculo, nam-
quid modice agant licet. Serpentes vero, iam
equitare assuecunt. Ac per se nam primū pueris
moueri licet, cum iam repere cœperunt, magis
etiam cum ingredere in mare, autem congeri
minimo nō sinit, ne pondere græuæ eorum videntur.
Sanè vel hac ætate facile dedantur, quanta
firmaturæ nobis cum exercitiis societas: cum
pueros, ne si cōdūseris loco aliquo; prohibeas
quō minus discurrant, ac pullos virulorum
modolasciant. Quippe sua cuique ætati nā-
tura satis est ad proprias convenientesque exci-
tandas appetitiones, quibus famitatem faciat,
iam vero qui optimo corporis habita præditi
sunt infantes, his animi quoque mores citra vitiū
esse par est. Qui enim iam agtam magis proci-
tates, aut animo plane demissos, aut intelligentes
magis, aut stupidi, aut appetentes vitæ modum,
hos parum idoneo temperamento esse iū par-
bus, quibus prædictorum singula administrantur,
necesse est. Infantis autem quem ad absolutum in-
culpationemque prōponimus, vi nulli ex animi
motibus corrigere, si eosdem seruare neque vitiū
tur, oportet. Sæpius vero quidvis isdem planè
generibus quibus cōsumitur. Corrumpuntur
autem mores praua cōsuetudine cuiusque horū, ci-
bi, portione, exercitationis, videri, audiendi,
potus densi, musicæ. Quare peritū horū omnium
esse cū medicū oportet, qui sanitatis tuendæ curā
suscipiet. Et tenus in cūda, stertus, ira, cura im-
modica, & multarumque vigilie, febres accendū,
ac grauissimis ægrotantibus in ira præbent: vel
viti cōuerso, eorumque mentis legem, ac
animus omnino desit, decoloratur, atque ex-
tra plia gracile, vbi naturalis calor si imbecillitate,
reddunt. Hanc enim calorem, præter cetera intrā
sanitatis fines cōsuetudine oportet. Custoditur au-
tem cum corporis, tū animi exercitatio modica.
Si quidem qui motus nimis modum excedit,
biliosam animam reddat: si iura modum nimis
substant, frigidū & pituitosum efficiunt. Quin-
etiam priorē habitudinē febres, & qui calidiores
affectus sunt: posteriorē iecioris & viscerū ob-
structiones, committunt morbi, apoplexiam sum-
ma destituta fluxionumque morbi plerique
excipiunt. Et nos ægros quotannis nō paucos per
sanauimus, folis animi moribus ad debiliū
modum reuocatis. Itaque infantes qui optimū formā
sunt temperamētū, nō leuē cura egē, ne quos
animi motus immodicos incurant. Quippe lo-
que ædū expertes, ploratu, clamore, iracun-
dia, & inordinato sonitu, dolore indicant. No-
strum igitur officium est, edēctantes quod opent,
assidue id suppedire, priusquā viciū dolor, in
nimis atque inordinatū motum vni cum corpore
etiā animū rapiat. Si quidē denentes, aut ab ex-
terno quopiam offensus, aut alui exonerare, aut
mieri, aut esse, libere cupientes, aut multitu-
dinem stratorū, vinculaque arctiora nō tolerantes,
aut denique diuturnā quietem petentes, perinde ac
discrepan plorant, enomiterque moentur. Nullū
enim animal vilo immodico delectatur, sed fem-
per medium modum experit. At medium ipse
modus non vni omnibus est, sed ex eorū sem-

per eā numero, quæ in collatione ad aliud spē-
ctantur. Eum igitur qui curam infans edican-
di suscipiat, ac rem medioritatem, convenientis-
que cōtētiorem esse oportet. Hæc autem omnia,
visū, tectum in a tali animū, ita puerū per-
genda censeo: in primis de nutrice ipsa nō mi-
nimum habendam esse curam, quid edat, quid
bibat, quo pacto in somno, venere, & exercita-
tione se habeat, vi videlicet lac eius egregie sit
temperatus, quale cœrre erit, si sanguis eius sit
optimus sit. Sanguis porro sit optimus, si modica
exercitatione, & cibo tam boni facci, tum ius-
to tempore modis assumptis: præterea ponō-
ne temperata, modiceque assumpta. A venere om-
nino abstinendum esse, quæcumque lac præbebit,
mones. Nam & in enfes vi cōsuetudine pro-
vocantur, & lac odoris gratiam in deterius mu-
tiat. Quinam alique concipiunt in vitro, quo
alienus à puellō adhuc lactente nihil est: cum
quicquid sanguinis optimus est, absumatur in
fœtū. Quare vbi mater concepit, vel aliquo mor-
bo est affecta, alia nutrix est inuenienda: cuius
lac gustu, odoratu, visus explorandum est dili-
genter. Si quidem quod optimum est, id gustan-
ti, olfactienti planè suauis, intuenti candidum,
equabile, ac medium liquidū crassitie apparebit.
Quod vinosum est, ē diuerso aut crassum & ca-
seosum, aut liquidum & feruū ac liuidū, nam
consistētia, colorē in æquabile nobis vi-
debitur. Idem gustantibus amarorem, aut sal-
sedinem, aut qualitatem quampiam extraneam
exhibebit. Tale verō nec olfactienti suauis erit.
Atque lacis probi improbique hæc sunt indicia.

Puellam autem ipsam primū candorem solo lacte
nutrire: at vbi primores dentes emiserit, cum so-
lidiore quodammodo iam cibo assuescere con-
uenit. Corpus autem infans consiccare oportet
oleo dulci, idque postea quā vniuerfum lac
accurata cōcoctū fuerit: alioqui alimento cru-
do vniuerfum corpus replebitur. Quare post lō-
grum somnū fricandi occasio captanda est.
Malorum tamen puerorum, qui parēte plagis &
minis noīūt, is duplex tum fricandi, tum lau-
andi temporis occasio est. Prior ac cōmodior, cum
a matutino somno surrexerint, deinde luserint,
ac iam cibum petant. Quod si qua occupatio-
ne, qui puellam alit, auocetur, modico paue pre-
bito, ludere permittat quantum vult. Deum cum
rursus cibum petierit, tum fricat, lauetque. Mini-
mè tamen bibere ei permittendum post cibum
est, quem balneum excipit: quando ita præcipi-
tanor eorum que ventriculus cōninet, distribui-
no in corpus fiet, id quod in corporibus pro-
fus sanis canendum est. Præstiterit autē semper
viri nobis proposito puellō, balneum cibū se-
quatur. Nam quibus virilis est ante balneum ci-
bum dedisse, horū planè improbandæ habitudi-
nes sunt. Cæterū nec Germanis, nec hominibus ad
genus aliis ægredientibus, hæc documenta prodimus,
nō magis quā apri & vrsi, sed Græci, & ita quo-
rum amulitū studia. Nam que obsecro nostrū
tulerit, modō editū in lucem infans, atque ad
vitro calentem, ad flamen deferri, ibique (sic ut
ri apud Germanos aiunt) ceu candens ferrum,
in frigidum humore submergit, vt & roboretur
corpus,

Puellæ autem
sunt munitur
cogendi ad mo-
tem.
Natura nostra
cum cœtibus
habetur ma-
nus accipien-
da.

Puellæ optimæ
præditi (viri-
tū habet), ni-
mi quod mieri
inculpatū for-
titer.

Seruari quidvis
infem gen-
bus a quib. ex-
tinguitur.
Mores autem
que corrupte
re solent.

Caloris natu-
ralis custodiam
diuino.
Mores viti-
et quorum vi-
lumen exstinguit
causā.
Mores a luo-
dam lase-
dam quod effi-
ciat.

Infantes natu-
ralis in viti-
modis animi
motus, cœtibus
dam.

Infantes quibus
de causis
placet.
Immoderata
lumen animal de
lactator.
Medis semper
experit, consili-
re, in relatio-
ne ad aliud.

Nutrix vilius
tamen quidā
linguistis ob-
solutum esse.

Sanguis vili-
mus a quibus
exstinguitur.
Venere iocundū
candem viti-
cū, quid ad
cū, & lac elu-
trā gratiam a-
miciat.

Nutricem gra-
uam esse ca-
paciū in luo-
re solent.

Lactis optimi
nota.

Lactis viti-
nota.

Lactis viti-
nota.

Lactis viti-
nota.

Infantū pri-
mū quodam so-
lū lacte nutri-
tū, postea ve-
ro assuescere
cōcoctū lac
cibi.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Infantis corpus
fricandum oleo
dulci, postea
vniuerfum lac
cōcoctū.

Cuius quatuor
modi sunt
duo.

Pueri iam ha-
biti ad ludo-
reddito quae
pergranda.
Pueri optimi
temperatu cur
interdudum
fit vno.

Vinum cur ne
adulte quali-
tate modici pro-
puandum fit.
Vinum ad
quid vtile.

Puellis potio fru-
gida a cibo est
commoda.
Aqua optima,
omnes qualita-
tes in eis habet.
Aquaem des-
servata.

Aëris differe-
ntia.

Aëris qualita-
tem tempera-
tura quidem na-
tura tempera-
ta intertempe-
ratu ad can-
cerat requirit.
Pueri secundum
septennium in
gratia tempera-
mentum.

Educatio opti-
ma probo cau-
santibus, &
grauibus disci-
plina paratur.
Pueri more per-
fuidis esse ter-
tio septennium.
Victori die &
salubriter do-
bet esse ad na-
gocum muna-
mentis, sed in
geri corpore.

corpus, & periculū de vigore illius sumatur. Pre-
stat itaque nec adeo densare cutem, vt corporis
transpiratū prolubet: nec rarefacere ita, vt facili-
tā qualibet extrinsecus incidenti occasione lax-
datur. Corpus autē proposui nobis puelli, medi-
um excessus omnis exiit. At vero cum mitti
iam is in ludum est habilis, non necesse est assu-
dus præterea balneis vti, sed interim cum lucta-
ri conducit, medio ceteri insibi ante cibum exerce-
ri sat erit, ac balneo plerumq; abstinere. Viū fa-
uē quamdiutissimē qui ea natura puer est, ne gu-
stare quidem suaserim, quod lumen et nimis &
calfaciat corpus, caputq; habitu repleat. Quare
nec iam adultus vinū, nisi modice sumptū, est vi-
le: quod videlicet ad iram & libidinem præcipite-
rit facit, & partem animæ rationalem, hebetem
atq; turbidam reddit. quanq; his ipsis ad bilis ex-
crementa vel mittenda vel expellenda, est sanē
nō in vtile: non nimium verō ad eam siccitatem,
quæ in solidis partibus aut ex immixtis labori-
bus, aut ex proprio temperamento provenit.
Iam puellis potio frigida, ac præcipue a cibo &
per calores, non incommoda est. Aqua tamen fon-
tana & recens alius est præferenda. Quæ autē o-
mnium optima est, ea penitus nō gustus modō,
verum etiam olfactus, omnis qualitas expers
videbitur: erigit iucunda gustui, & celeriter per-
transibit præcordia. Porro quæ aqua ex petra cō-
tra septennium fluit, solēq; avertim habet, æ-
dē quidem concoquitur, ac tardī trāsitus est, tar-
dēq; incalcit, atq; refrigeratur. Cuius ad orien-
tem solem erumpit fons, quæq; per terram pu-
ram colatur, eadem calēs ac refrigeratur ocyssimē,
omniq; ætati vtilissima est. Idem de aëre etiā
est iudicandum: quem optimum, hoc est, purissi-
mum, in pulmones trahere, omnibus iuxta sa-
lubre est. Nam impurus aër, omni ætati aduersa-
tur. At verō quæ ex calore, frigore, siccitate, hu-
miditateq; diuersitas aëris contingit, nō perinde
se ad omnes homines habet: sed corporibus
quæ optimo temperamento sunt, etiā optimē
temperatus aër est saluberrimus. In quibus verō
aliqua exuperans qualitas dominatur, ut vtilissi-
mus aër est, qui ei qualitatē pari gradu aduersa-
tur. Porro vbi puer iam est secundū septennium in
gressus, calidum est, eodem gradu quo prius, illi
temperamentū: humidū verō nō eodem, quan-
doquidem omne animans ab ipso statim orta,
siccitas indies efficitur. Cuiusq; optimi status
corpus contingit, is ad quartūdecimū vsq; an-
num iam traditam victus rationē obseruet, mo-
do semper exercitū seruato. Laetant autē calida
potius q̃ gelida, vt qui nondū hinc citra noxam
perterriti: adhibeaturq; illi educatio optima, q̃
probris couersutudinibus, & grauib; disciplinis
paratur. A secundo autem septennio vsq; ad ex-
pletum tertium, licebit tibi ad robustissimū cor-
poris habitum provehere hominē, aut instrue-
re is animi donibus quæ ad scientiā, sapientiāq;
pertinent. Nou est tamen eadem vtrobq; victus
ratio. Atq; hæc maxime erate pernici ab solūq; cō-
uenit, quæ spectant ad mores. Vt aliquis autē in
pergrandissimū prolata vitæ, etiā bona valitudine
perpetuū vitatur, is liber oportet sit ab omni ne-
gocio publico, nimirū sibi viuens duntaxat, fo-

lūq; indulgens corpufculo. Etenim immortale
fieri quod genitum est, planē non potest: vt vero
in longum perduret tempus, id maxime fieri po-
test. Nam qui optimū sortitus est corporis habi-
tum, si ab omnibus quæ ad publicum in vita spe-
ctant, secedat, sibiq; tantū vacet, nec morbo villo
quoad fieri poterit vnquam tentabitur, neq; ante
longissimū vitæ tempus morte occupabitur.
Cæterum cum huic tali edendum, bibendumq;
sit, ad reparanda quæ ex corpore effluunt, necesse
vniq; est, excrementorum habeat rationē. In pri-
mis igitur excrementum a sincero separatur, &
paulatim impellitur per omnia intestina, vsq;ue
ad rectum vocatur: ad cuius exitum musculi qui-
dam inserti sunt, qui ipsum, ne immaturē effluat,
coercēt. Postea verō quā plurimū congeitum
iam graue animalī fuerit, tunc foras agi iuuat, ad
celeritatem emissionis etiā abdominis muscu-
lis vnā cum transverso septo adiuuantibus. Ictio-
nari excrementū aliud est, quale quod florē
in vino appellant aliud, quale quod fæx dicitur.
Attrahitur alterum a vesicula quæ iccinon sub-
ditur, alterū a liene. In his collecta excrementa,
alterum in priorem intestini tenuioris partem,
alterum in ventriculum, ab hisq; per omnia in-
testina permeant. Quod autē in venis & arteriis
excrementū acervatur, euismōdī planē est, quale
in lacte concreto serum. Hoc renes a sanguine
secerneutes, ad vesicam transmittunt. Cuius col-
lo transuersus enim musculus inest: quo arctato
supprimitur, laxato emittitur lotiū, ad id con-
ferentibus etiā abdominis musculus. Reliquū
excrementorū genus in singulis animalis nasci-
tur partibus, ex ipso vnde aluntur succo. Huic ex-
crementū nullus certus a natura præscriptus me-
tus est: expellitur tamen partim per ipsa molliora
corpora, ac partim per sudore, partim per la-
tentem transpiratū discuntur. Sed in hoc peritatu
insensibili, etiā craisiōris excrementi nōsūdū ex-
cernitur, a quo tunc pili, tum ipsius cutis sordes
gignuntur. Cū igitur eici omnia excrementa
hæc oportet, expedit arbitror primum nouisse,
quibus maxime causis remouentur: dein ratio-
nem iniri, quæ nec in ipsas incidatur. ac si quan-
do incidatur, q̃ primum error corrigatur. Atque
ne incidatur quidem, hinc licet assequamur, vni-
que si excreta ab vnde sunt, nec ne, compertū ha-
buerimus. Porro is quæ in ventre continentur
excrementa mora cōtingit, aut ipsius cibi potio-
nis culpa, aut ipsius ventriculi vnā cum inte-
stinis. Et cibi quidem potioisq; vitio, aut propter
qualitatem eorum, aut quantitatē, aut propter
ordinē, vitandūq; modum. Et propter quali-
tatem quidem, si acerbā, austera, aut siccā nature
fuerint: propter quantitatem, si iusto plura aut
pauciora sint assumpta. Ordinis culpa, si quæ sic-
ca, attingentia vitæ sunt, primo: quæ humida, pin-
guia & dulcia, secundo exhibentur loco. Modi
vius ratione, si cōm his fuit edendum, totum se-
mel sumserit. Quæ ventris aut intestinorū vi-
tium sequitur excrementorū mora, vel ob natu-
ralē eorū affectum accidit, vel certē acquisitiua.
Ac quæ quidem nature eorū vitio cause pro-
veniunt, ex præiis corporis habitibus aliqui sunt.
Recentū autē ventris affectionū acquisitiuarū,

Excrementi a
sincero separa-
ta feruore, quo
modo fiat.
Vesicula repul-
sum excrementū
tenui fecit.

Bile flana in
fucra intesti-
ni excrementū.
Atta bilis a lie-
ne in ventricu-
lum mittitur.
Vnam feru-
re a sanguine,
per reneq; in
vesicā demittit.
Colla vesica
mouit ut.

Excrementum
quæ in singulis
partibus gigni-
tur, excrementū
dū, non fuisse
aliquem certū
metum de natu-
ra præscrip-
tum.
Pilosum gene-
ratum.

Excrementa al
in supponit
quibus de cau-
sâ possunt.

*Afflictionem vel
tra acquisitionem
torem, differe
tia ob.*

*Interperit ven
tra a quibus
gignatur.*

*Flema bilis tri
ora quibus de
causis possit.*

*Angustia rasi
ron vnde ex
turi possit.*

*Astringitua su
care.
Atre bilis quid
da fistatur.*

*Excrementum sin
gula in a quo
bus supprimi
possit.*

*Meatus later
es quibus par
tibus sint tribu
ti, ad excremen
ta excremēta.
Cerebrum ani
ma domitili
plurimum cana
libus expurga
tor.*

*Oculus qua par
te expurgatur.*

*Restitutio ex
crementi cau
si, citra a
lia sunt adu
benda.*

*Exercitia quā
vis praestit ob
er medicamen
ta tenenda sunt.*

octo sunt differentiae: quatuor uempe simplices
intemperies, totidemq̃ cōposuit: a quibus maxi
mè in ualefacientibus, in ualida potest reddi ex
pulsrix facultas cum ventris, tum omnium intesti
norū. Creantur porro eiusmodi intemperies,
aut a cibo & potione, quibus vis infir medicinalis:
aut a vitio aëris ambientis, aut a lauacro, aut
ab vñctione, aut deniq̃ ab alia re, quæ extrinsecus
ventri adhaerescens, cum alterandi vim possi
det. His igitur de causis excrementum ventris
supprimitur. At fluxu bilis excrementum mola
tur, aut propter attrahentia expellentisue facul
tatis infirmitatem, aut propter vasorum quibus
deducitur atq̃ excrentur angustiam. Porro infir
mitas tum vesiculæ totius quæ subicitur hepa
ti, tum eorū meatuū qui ab ea in iecur subeūt,
tum eorum quibus in intestinum exomitur bilis,
ex recenti prouenire potest intemperātia. An
gustia verò vasorū, aut phlegmonis vitio fit, aut
propter scirrhus, aut obstruccionē, aut circum
iacentiū partū innixū, aut oscillorū cōiuentiā.
Iam ipsa proximariū partium cōpressio, aut pro
pter immo dicam copiam eorum quæ in se conti
nent, aut propter phlegmonē aut scirrhum acci
dit. Aequè & oscillorum cōiuentiæ, aut pro
pter horum quicq̃, aut siccitatem. Siccitatē cō
ciliant & quæ valenter astringunt, & quæ partem
calfaciunt & siccant. Ad eundem modū atre bi
lis excrementū aliquidō fistetur, si ben quidem
proportionē respōdēte bilem excipiēti vesicæ: 30
vena verò quæ a porta iecoris in ipsum inseritur,
vasū illis quæ excrementū biliosum attrahunt:
atq̃ ea deniq̃ vena quæ ex liene in ventriculū fer
tur, proportionē etiam respōdēte mearū illi qui
excrent bilem. At excrementū quod per singu
las cōgreditur animalis particulas, & copia sui, &
crassitudine, & præterea lentore remoratur. Ad
hæc, ob imbecillitatem caloris, transiūq̃ angus
tiam. Sunt tamē partes quæ præter latētes meatus,
alios quosdam patentes atq̃ conspicuos ob
tinent, vt cerebrū, & oculus: idq̃ aut ob principa
tum particulæ, aut propter actiōnē exquisitiū
obundam, aut propter continentiū corporum
spissitudinē. Est namq̃ cerebrū rationalis animæ
cui domitiliū: quod cum osse solido vndiq̃ se
ptum sit, plurimis maximisq̃ canalibus expurga
tur: primum per nares & palatum, secundū per
vtranq̃ aurem, tertio per caluæ cōmissuras. Nec
ab simile est etiam aliq̃uid ab eo cōfluere ad o
culos. Oculi verò ipse per euidētes meatus eicit
quicquid in eo excremēti gignitur, idq̃ iuxta na
res & genas. Illud autem cōmune omnīū excre
mentorū sit documentum, vt retentionis causæ,
contrariā semper causam admoveas. Vt, exem
pli gratia, si ex comestorum pau citate & siccitate
restricta aluius sit, plura & humidiora exhibebis:
ac sic de ceteris. Obstruēta quippe sunt aperien
da: intemperata reducenda per cōtrariā ad natu
ralē temperiē: sicuti & quæ crassa & viscida sunt,
incidenda, tenuiora viciū ratione, ac præci
pue exercitiis, quæ tam cibū q̃ medicamentis te
nuantibus tanto præstant, quanto sanus est nullo
corporis nostri habitus in cōmodo exigi quæ
redvndit, q̃ pariter & carne liquida, & solidis ex
temū audis. In his autē tribus primis generib, cō

fistit sanitatis tuendæ studiū, & quæ ac medendi
methodus: nempe corporibus, causis, & signis.
Corporib, quidē, iis quæ & sana iam sunt, & cō
statu seruari debēt. Signis verò, corporū acciden
tibus, ex quibus ipsa corpora dignoscūtur. Cau
sæ sunt, ex quib, cultio da sanitatis perficitur. Ha
rū materiæ quatuor generib, juniorū, pbatissimi
sunt cōplex: ad mouendi, educendi, faciendi,
extrinsecus incidendi. Sarius tamē fortasse fue
rit ad mouendi, educēdis, faciēdis, & inciden
tibus, alterari immutariq̃ corpus dicere. Muta
tionē verò aut in qualitate fieri, aut in quantita
te. In qualitate, dum aut incalcescit, aut refrigera
tur, aut siccefit, aut humectū redditur. In quanti
tate, dum alitur aut nutritur. Iam in anitionem
ipsam duplicē quoq̃ esse, alteram excremento
rum, alterā naturalis substantiæ nostræ, assidue
desuēns, quæ nutritioni ex aduerso opponitur.
Porro alimentū est secundum Hippocratem, tri
plex. Aliud enim est nutritiū, aliud veluti nu
trientiū, aliud quod nutriturum est. Quarū disse
rennarum primæ, ipsius substantiæ suorem o
ponas rectē. Secundæ autem, tum luxorrhagi
am, tum omnem sanguinis inanitionem. Ter
tiæ deniq̃ lienteriam & vomitum. Iamq̃ in hoc
loco primum commentarium claudimus.

GALENI PERGAMENI de sanitate tuenda, lib. II.

Ponatur nobis in hoc cōmentario salu
berrimæ naturæ puer, qui iam tertū ætatis
sue septenniū ingreditur: cuius corpus es
singere quoad fieri potest optime, proposuim
sit. Cum autem vt corporum ipsorum numero
sa diuersitas est, ita vitæ rationum quibus viu
mus, sint species diuersæ: fieri nequit sanè, vt in
qualibet propostū vitæ absolute optimam cor
poris nostri curam exhibeas, sed eam tantū
quæ cuiq̃ optima sit. Quare omnibus iis qui aut
seruitute, aut cū impediri negociis, corpori cu
tando vacare nequeunt, optimam prout cor
poris curam scripsisse, supervacaneum fuerit. Iis
autem qui omni modo liberam vitam degunt,
præcepisse fas est, quemadmodum victuri sint
felicitatē & diuinitatē. Porro quod simplex in
culpatūq̃ in omni genere est, id ceteris omni
bus ceu regula quæda præponi posuit. Ac sim
plex inculpatūq̃ in corporib, quidem est quod
optimo est habitū: in vitæ generibus, quod om
nino liberū est. Primū igitur hoc libro duo hæc
coniuncta tractemus. Itaq̃ in optime notæ pue
ro, qui tertū septenniū ingressus est, ac vni cor
poris curæ vacat, labor cibum præcedat, sintiq̃
medio circa omnia, labor scilicet, cibū, potio, som
nus, & venus, quemadmodum rectē monuit
Hippocrates. Quanq̃ certē venus, quæ somnum
debet excipere, tantū florentiū est, vñ quo tem
pore etiam eius est vñs. Quæ autē hanc vel præ
cedunt, vel sequuntur etates, aut planè semen
non effundunt, aut certe infucundum, aut malè
fecundum. Porro laboris ipsa appellatio, idem
mhi significare videtur, quī cōmuni exercitati
onis appellatione. At nō quivis motus exercita
tio videtur, sed tantū qui vehemētor est. Quoniam
autem

*Sanitati tuen
da studium per
hocq̃, media
da, cōsultare in
corporibus, cau
sa & signis.
Causarū modū
cōmuniū quo
que genera.
Aliorū corpus
quod plustat
possit.
Nutritiū fer
re aut in quali
tate, aut in
quantitate.
In anito du
plex.*

*Alimentum tri
plex, secundum
Hippocratem.*

*Locupletissimū
quod in omni
genere est, præ
poni ceteris cu
regula debet.*

*Labor cibum
præcedat.
Medicina debet
re esse omnia.
Venus, quæ for
mā debet sus
cipere, a florenti
bus iamq̃ effu
cundis.*

*Matu vehemē
tur tantum, di
citur exercita
tio.*

autem eorum quæ ad aliquid dicuntur, est quod vehementius, dicitur, fieri potest, vt idem morus alteri fit exercitatio, alteri non fit. Terminus igitur vehementer est altera respiratio: quando in quibus nulla fit respiratio mutatio, hos nondum exercitationes vocamus. Sunt autem excitationis duplicia commoda hæc quidem ad excrementorum mansionem, illa ad solidarum partium bonam habitudinem conferentia. Nam quoniam vehementior motus exercitatio est, in-

strumentorum duritiem, genuini caloris augmentum, & spiritus valentiorum motum necessitudo inducit. At ex instrumentorum duritia sequitur ad labores robur & renitentia: ex calore, distributio validior, immutatio expeditior, nutritio abfolutor, omniumque corpori fusio, ob quam solida mollescent, humida tenuantur, exigui meatus laxiores fiunt. Sed ex valentiori spiritus impetu, & purgari hos omnes meatus necesse est, & excrementa expelli. Quoniam autem exercitatio

digestionem in corpus adiuuat, non debet, cum administrabitur, aut cruditas, aut multitudo succorum, vel in ventre, vel in vasis consistere. Quoniam verò & exigui meatus expurgat, & excrementa expellit, vtilius est ante cibum eam administrare. Siquidem quæ impura corpora sunt, atque ab excrementis parum purgata, licet quò magis nutritis, magis lædes. Quare tunc ad exercitacionem commodissimum tempus est, cum hebetus cibis duplici concoctione iam prorsus

cofectus fuerit, & ea quæ in ventriculo, & ea quæ in vasis sanguinis agitur, ac iam denuò cibandi tempus inest. Quod si prius aut posterior exercitacione vtare, aut crudis humoribus hominem impleueris, aut pallidæ bilis preuentum auxeris. Atque huiusce temporis nota, color est vrinæ. Quæ enim aquæ speciem præfert, crudum adhuc in venis esse indicat succum cum, qui à ventre submittitur. Quæ verò rufa, biliofus est, iam dudum concoctum esse huiusmodi succum. Quæ modicè

pallet, peractæ modò secundæ concoctionis est signum. Cum namq; bili infecta vrina nondum est, aquæ speciem alborèmp præfert: cum verò plus iusto eius bilis acceperit, rufa cernitur. Ergo cum mediocriter est rufa, mediocriter ve pallens, tum est exercitacio adeunda: sed expulsi prius

excrementis, quæ vel in vesica, vel in inferioribus intestinis continentur, ac partibus solidis molli fricthone sensim concalascit, crassiusq; tenuatis humoribus, necnon reclusis per exigui meatibus, ne vel excrementis repleatur vniuersus corporis habitus, vel rumpatur aliqua pars ex solidis, vel prædicti obturètur meatus. Oportet itaque, vbi in teolo suauiter perficando sic calcescit totum corpus, vt floridus quidam rubor per totam eius cutem fundatur, oleo randè ipsum subigere: id quod nunquam tentandum est, priusquam incalascit cutis, & laxetur eius meatus. Vinctio autem ipsa fieri nudis manibus debet, ac medium, inter mollem & durum, modum seruatis: infringendūq; prima confectione bladius, inde sensim paulò fortius, donec caro manifestè citra contusionem prematur, adeoq; vniuersum corpus legitime compactum esse videatur. Haudquaquam tamen tam valida fricthone

diu vtendum, sed semel aut bis in quaq; parte, ne eius pueri corpus daretur, exciterue, quod seruare in medio temperamētō est animus. At procedente tempore, vbi iam adolefcit, tum danore fricthone vtetur, ac præterea frigida ad exercitacionem lauatione. In preparatoria verò illa ante exercitacionem fricthone, quæ luc spectat, vt corpus molliat, molle duritq; medium qualitatem dominari oportet, ac pro eiusdem qualitatē ratione, compleri singula. Vnde autem quimmaximè ex manuum iniectu circumactūq; fricthone nō esse debent, quò vniuersæ musculorum fibre, omni ex parte frictrunt, nec superne modò deorsum, aut inferne sursum adhibet, sed etiam tum in subrectum, tum in obliquum, tum in transuersum, tum in subtransuersum. Quas quidem differentias fricthionem, dicere ex hac figura licebit



Dura porro fricthione ligari corpus, molli solui, multa extenuari, medio cri transferre, autor est nobis Hippocrates. Quæ differentiarum quatuor ex quadruplici omnis fricthionis tum virtute, tum vtu oriuntur. Quod si medias quoq; harū annumeres, sex in vniuersum differentiarum existunt. Iam verò mollem fricthionem necessariò consequitur vt corpora emolliat: sicuti durat, vt impingat indurētq; illa. Srigitur dura ligandi, molli soluiendi vim habet: quæ supra modum soluta corpora sunt, ea duriter planè fricanda sunt: contra, quæ cōstricta sunt, mollior. Quæ modicè se habent, manifestum est ea nec mollior nec duriter, sed mediocriter esse fricanda. Sicuti verò in iis differentiarum quæ in qualitate spectantur, non solum dura molliorq; consistunt, sed etiam media, ita & in iis quæ ex quantitate ducuntur non solum multa, & pauca, sed etiam media intermedium. Cur autem in iis differentiarum quæ ex qualitate trahuntur, omiserit medium Hippocrates: in iis verò quæ ex quantitate, exigam, iam dicam. Cum enim ex contrarietatibus, aliæ quidem in fricthionum genere (vt dura & molli, multa & pauca) aliæ in affectuum quo ab iis procedunt, necessariò consistant, vt colligano & solutio, gracilitas & crassitudo: ac prior quidem affectuum contrarietas, ex prior fricthionis contrarietate nascitur: secunda autem non item (venit enim in hac, vt gracilitas proveniat ex multa, carnis incrementū ex medio cri fricthione: quandoquidem pauca augendæ carni non sufficit, sed exci-

Fricthio
varia vtenda.

Fricthio
di
uersarum va-
ry rym.

Fricthio
moda.

Contrarietas
alia in fricthio-
nem generat, a-
lia in affectum
quo ab eo pro-
cedunt consi-
stunt.

frictionē vti-
lis differentia
vnde differentia
Hippocrati se-
cundū affectū
cōstituitur.

fando calori modico, id quod aliis cōmune est
omnibus) ob id nimirum secundum affectum
cōstitueretur, seu longe vtiliores iis, quae in fri-
ctionibus spectantur, ipsarum frictionū distri-
xit viles differentias Hippocrates. Meminit ita-
que dura, mollis, multae, & mediocri frictionis,
subdicens ceteras, quod ab his corpus in cōtra-
rias affectiones ducatur: quod vni cum ipsis
protinus se pronunt, tum media carum opera,
nam ea quae per coniugationem faciunt. Media,
cum neq. ligare corpus, nec soluere, nec carnem
augere, nec minuire studemus. Quae per coniu-
gationem, cōm, verbi gratia, pariter colligare, &
carnem addere. Quis enim nō videat, cum du-
ram carnem addicere corpori volumus, frictio-
nem duram vni cum mediocri modo perendam
esse? veluti cum mollem addere studemus, fri-
ctionem mollem & quantitate mediocrem ad-
hibendam: & per alias coniugationes ad portio-
nem? Particulares porro frictionū coniugatio-
nes, sunt nouae in vniuersum. Quippe si tres quae
a qualitate frictionum sumuntur differentiae, tri-
bus quae a quantitate ducuntur iunxeris, nouem
coniugationes effeceris, vt per subiectam for-
mulam constat.

Qualitas.	Quantitas.
Dura.	Pauca.
	Multa.
	Mediocris.
Mollis.	Pauca.
	Multa.
	Mediocris.
Mediocris.	Pauca.
	Multa.
	Mediocris.

Frictionē ge-
nera omnia duo
respectu colla-
tionem.
Pauca habita-
dum optima
qualis frictio
cōmmoda.

Meminisse autem oportet, haec omnia frictio-
num genera respectu collationē dici: quando
quae hinc dura est, alteri mollis fuit. ac sic intel-
ligendum de ceteris. Igitur optimae habitudinis
nobis propositum puerum, cuius volumus pri-
stinam mediocritatem seruari, neq. duriter, neq.
mollior, neq. multis frictionibus, neq. quantita-
te mediocribus, sed paucis, & qualitate mediocri-
bus, infricabimus: nihil vltiā moliri, q. vt ad exer-
citandum corpus ipsius preparamus: ac rursus,
cum iam satis exercitatum sit, apothera curamus.
In traditione autē harū differentiarū, Hip-
pocrates vsus est doctrina quae per rerū elemen-
ta instituitur, cen aliis omnibus vtiliori: quippe
quae & sub cōpendium rem omnē cogit, & me-
morie affigit, & remissitē facit suggerit, ac
omnium quae singularim aguntur, rectum vsum
promptē suppediat, seu ad pauca & certa ele-
menta referens. Quis enim non facit membra-
tionem frictionum differentias, vsum, ac vires inue-
nit, si intelligat illam semis sententiā, quae docet,
constringere quidem frictionem duram, soluere
mollem, minuere multam, augere mediocrem
posse? Ex horum namq. notitia ac memoria, pri-
mū sanē quae omnia in verbis cōtexta sunt,
differentias inuenias: mox omnibus inter se cō-
plicitis, nouem illas cōiugationes efficias, quas
paulo suprà descripsimus. Sed iam de affectuum

nomnibus nōnihil dicendū est. Ac duri quidem
& mollis vocabulū, quidnā significet, planē con-
stat: rari autē & densi, nō vsque adeo. Est enim pro-
priē rariū, qd meatus magnos per totū obinet:
sicuti ē diuerso densum, qd coisēd paruos. Tam-
enū per metaphorā, de laxo cōtōlogi ligē ipsa vo-
cabula dici audias, Quia ratione & acrem & ignē
aliquid rariū dicimus, aquū & terrā dēnsas, quae
ramen & vnita sunt, & ex similibus natura par-
tibus consistant, nec villos eiusmodi meatus obti-
nēt. Oportet autē nō nominiū inspicere numerū,
sed affectuū genera duplicia in totū existimare,
alterū quod in similibus, obseruatur, de quo mol-
le durum vē dicitur: alterū qd in instrumētibz
meatū ratione, consistit, qd densum, vel rariū
vocat. Hi nēq. corporū ipsorū proprii affectus
existunt. Ceterū ad institutū redeundo, frictio
ipsa luter dū per se corporibus nostris cōmodā
aliquid affert: interdum iis quae cōmodum affe-
rant, subministrat. Efficit autē frictio, rara den-
sando, & mollia durando: atq. haec quidē omni-
no dura esse postulat: praeterca dura molliendo,
densū laxando: quae contrā sit mollis oportet.
Pari modo & quae carnis augēda mīnuenda vē
causa suscepta est, vtrāq. per se vtile aliquid cor-
pori praestat. Quae tamen ad exercendū corpora
preparat, itē quae post executionē adhibetur,
haec exercitationibus subseruit: illa modicē cal-
ciedo tenues meatus recludēs, & simul excre-
ta carnis fluxilia reddens, & solidas emollitē par-
ticulas: altera, quam apotherae pueri, hoc est,
recurratē appellat, cum plusculo oleo admi-
strata, simul sua pinguedine humectat, & soli-
das emollit particulas, & quae in corporis me-
bris cōtinentur, discutit. Sed preparatoria illa fri-
ctio in optimi status naturā calciedis corporis
causa suscepta, fiat mollis primū: mox verō ex-
citationem aggressiua, dura. Quod si quid erro-
ris contingat, id potius ad durum atq. densum
deflectat, q. ad laxum & molle. Nam transpiran-
di defectū, exercitio sarcire licet: alterius verō
affectionis vitium, quod est ad externas iniurias
opportunitas, neq. aliis corrigi facit potest, fa-
cilit vtrū excrementū modō, vtrumetiam cor-
poris nutrimentū evaporetur. In iis autē frictio-
nibus quae a quietate ducuntur, in proposita natu-
rā & aetate, si qd delinquant, versus id qd minus
est id esto, cum augendi eiusmodi corpus, haud-
quaquā sicca, nobis studium sit. At verō ipsa fri-
ctionū mensura, secundū temperaturā aēris quae
corpus fricandum ambit, secundūq. aetate aut
dierū tempus, atq. adeo constitutionē regionis,
debet variari. Ceterū dum propositū hominē eo
corporis statu de quo quem non posset, obiter et-
iam regionē ipsius potestate numerum definui:
cum nec optimo temperamento, nec irreprehen-
sibili omnino membrorū modulo, corpus vllū
in iis regionibus quae a temperamenti modo re-
cesserunt, gigni possit. Quippe sicci, graciles, &
veluti rorescēt, in xistiosis tractibus homines
sunt. Rursus frigidiore plagae incolae, in x quali
temperamento videntur, vt in quibus externa
frigeant, interiora impensē caleant. Itaque apud
Gallos, Scythas, Aegyptios, Arabas, ne per som-
nium quidem vsquā est vidisse id corpus, quod
veluti

Kerni quid.
Densum quid.

Emollit cor-
re praesent mea-
tibus.
Affectū dupli-
cia genera.

Frictio dura.
Frictio mollis.

Frictio ex-
citatoria sub-
seruitur.

Apotherae pueri
recurratē quae
vsum praestat.

Frictio prepa-
ratoria quae
caliditatem ad-
distinguit.

Doctrinā quae
per rerū elemen-
ta instituitur,
efficitur omni-
bus vtilior.

Frictio dura
distinguitur
a frigida: mol-
lior a calida: me-
diocrem auge-
re possit.

Frictio mē-
sura aetate quae
sit varianda.

Corpus optimi
temperamenti
in regionibus in-
temperatis gigni
non potest.
Regiones in-
temperatas quales
producent corpora.

velvi Polydetti regula existit. Cui in nostro simi-
non pauca similia videas. Siquidem nostræ re-
gionis, quæ in latitudine non parum extendi-
tur, id quod in medio habetur, optime sanæ tem-
peratum est, cuiusmodi patria est Hippocratis.
Eiusmodi igitur locum cum corpori proposito
dederis, anni quoque tempus, veris mediis ipsum
dabis: ex die autem, meridie. Eadem exigit ra-
tio, ut ne domus quidem in qua exercebitur sit,
ipsi præferat die calidior frigidiore sit, quàm

publicus totius vrbis aer: qui hyeme quidem ca-
lidior, æstate autem frigidiior, vel arte parandus
est, quò exacta temperie corpus, frictiois tem-
pore fruatur. Sunt autem rubor & tumor in æ-
ris temperie & corporis statu temperato, in eam
frictiois notæ. Velvi enim si calidam insuam-
dam, primùm quidem corpus intumescit: si largius
insuamdam, decumilita frictio quoque attollit qui-
dem primùm, postea contahit, ac molem depo-
nit. Huius ergo qui carnis augendæ causa friscan-

tur, tunc planè insuamdam frictio est, cum corpus
& intumuit, & ad summum ferè tumorem perve-
nit. Qui autem ad exercitandum iam præpara-
tur, huius minimè id tempus expectandū, sed lon-
gè prius desistendum a frictione est, potissimum
cum optimi temperamenti sunt, & ætate adhuc
pueri. Preparatio verò frictiois est finis, ut
solide partes molliantur, humide solvantur, cor-
poris exigui meatus laxentur. Porro expedit ne-
que paulo animosiorem esse, qui exercitatur, ut
laxus iam vinibus enis exercere audeat, quod con-
tingit iis qui sunt calidiori temperamento: ne-
que item ignavi, qui integris adhuc viribus, labore
tamen detrectet, quod solent ei qui aut laborant
pleriora, vel frigidum temperamentum forsum
tur. Porro natura optima, quæ huc est nobis pro-
posita, frictiois, exercitatioque, ac tum cibi,
tum somni mensuras aperte indicat. Hæc tunc
primùm quodlibet horum respuit, cum eius vitæ
non eget. Quare ipsius quidem nature ad singu-
la que agi debent promptitudo & alacritas, et
qui tali præfinitur corpori, facit index mensu-
ræ. Quippe sanū corpus ipsum, si suprà omnia in-
venit proprio nature suæ impetu directum: maxi-
mè si in iis quæ ad annum pertinent, rectè sit
educatū. Nam multo in malis moribus à pueris
educant cum sint, in deficiuntque & intemperantia
viventes, bonitatemque nature corrumpunt. Sic vi-
tæ contra nonnulli vitiosissimi corporis naturæ fortis-
si, temperantia vitæ, & temperantius exercitatio, na-
ture vitia cōmendant in melius. Genera exerci-
tationum sunt, luctus, pænicatio, pugillatus, cursum,
& alia id genus: quorū nōnulla tantū sunt exerci-
tatio, ut illa ipsa que modò diximus: nonnulla ve-
rò exercitia simul & opera, ut cum aliquis, exem-
pli gratia, fodit, aut remigat, aliudve quippiam
exerceat, in vsum mortaliū. Atque horū etiam ple-
risque est, quādo velvi pro exercitatione tantum
vitare. Triplex autem ipsorū in vnum est usus:
cum intermitten opus tantū gratia visperitur: in-
terim meditationis, sed quæ ad vsum futurū sit
operis: necnon pro exercitatione tantum. At nul-
lum exercitium, ut exercitium, aut perpetuum
diem obitur, aut alio tempore quàm ante cibū.
Seruari verò tum modum exercitatiois tum in his

oportet, tum vocatam apothrasiam. Quod si
enam idonea frictio ne vsum, ad eam quis accedat,
iam omnes exercitationis numeros impleverit.
Ac genera quædæ exercitatiois sunt ea quæ dixi-
mus: qualitas vero seu differentia, velocietas, tan-
diditasque movendi sunt: præterea quod aliud solu-
stum, aliud imbecillum est: ad hanc, velicentia
& lenitas. Vitendi verò rationes sunt humilimo-
di. Nam aut perpetuus motus est, aut intercusus:
& si perpetuus, æquabilis, aut inæquabilis. Sin
intercusus, aut certo ordine, aut citra ordinē. Ille
igitur vitendi rationes ab ipso negotio capiuntur.
Quæ verò ab iis quæ extrinsecus sunt posita du-
cuntur, eiusmodi sunt, quod aut sub diu exercita-
tio sit, aut sub tecto, aut in mixta vmbra, aut ca-
lenti loco, aut frigido, aut temperato, aut sicco, aut
humido, aut medio, aut cū pulvere exiguo muni-
tū, aut cū exiguo aut exuberanti pleg, aut etiā
sine vtroque. Omnium autē exercitatiois cōmune
est illud, quod earū auxilio, animalibus ex ipsorū
corporibus, insitit caloris augmentū excitatur. Is
tamen proprius exercitatiois effectus nō est, si
modò & iratus, & perturbatus, & quandoque afflic-
tus naturalis etiam calor augetur. Pund quæ ira, nō
augmentū, sed velvi feruor est caloris in corde.
Iam verò ex exercitiis ipsis, aliam partem aliud
alio magis fatigat: quædam sentit motus sunt,
quædam oculis, quædam agitant, quædam robore &
nuxu adhibitis, quædam sine his, ad huc, quædam
cum robore pariter & celeritate, quædam languide.

Fodere ergo, solutū exercitatio est. Simuliter, &
quarorū simul quorū libebis cōficere impendit
robusta exercitatio est, nō tamen celsa. Ad hæc
sublatio maximi oneris, inambulationque acclius,
huius quoque generis sunt. Præterea si quis per vi-
nem manibus apprehensum scandat, aut ex eo
arripito sublimis pædat, ac diu ipsam teneat, nec
substitū is, validiūque laborē exerceat, citra tamē ce-
leritatem. Ita verò & si quis manibus in pugili
reducatur, iude prolatis, vel in alio sublati, duriū-
mè in habitu eodem consistat. Quod si adhibitu
quempiam deducere sibi manus iubeat, nec ta-
men ipse remittat, vel impendens huius tum mu-
los omnes, tum nervos ad robur cōparat, ut quo-
rum maxime propria sunt omnia id genus exer-
citia. Iam si cuiuspiam iussis vi te violentem detra-
hat, in dēcatque, dum toto erectus es corpore, nō
leuem ad membrorum robur exercitatioem
obiers. Robur aut partium & exerceat & firmat,
qui aut quæ complectitur mediū, ab absolute sese
iubeat, aut ipse se à cōpesciente soluat, ita etiā
& si quis auragonitum suum à lotere aggressus, iū-
bus apprehensum, ceu aliquod onus sublatū, vi-
cissim proferat, reducatque. Aequè verò qui pe-
dioribus ac adverso innixi, magno se conatu re-
trudunt invicē. Enī qui à cervicibus pendentes
deorsum trahunt, ad robur præparant. Cæteri
talitā omnia exerceri citra palæstrā aut copiosum
pulverem queunt, quo cuius cōcalato loco, ere-
ctus atq; stannbus. Quæ verò luctantes inter se
moluntur, cum robori augendō student, hæc aut
pulserit aut alium, aut palæstram desiderant. Sunt
infinitæ alie in palæstra exercitationes id genus
robustæ, quarū o omnium peritis vitiūque prædioribus
callet, si ipse à gymnasticis diutius, ut à medicis

Exercitatiois
quædam

Exercitatio
vitiis
de rationibus

Exercitatiois
omnium quæ-
sit cōmune.
Caloris quod
augentur por-
turbatiois, ita est velvi
feruor caloris
in corde

Exercitatiois
du-
nosa genera

Exercitatio ro-
busta obis, celsa,
talit.

Exercitatio mu-
sularum maxi-
mè propriis
quæ.

Exercitatio
qua nam citra
pulverem, et quæ
minime possunt
admodum frangi.
Palæstræ à gym-
nasticis à differre à
difficili, ut diffusi à
mobili requant.

Hippocrati pa-
triam esse tem-
peratissimam.
Ver.
Meridies.
Domus extrin-
se de pueris, quæ
nā esse debeat.

Frictiois me-
dia indicat vñ
rubor et tumor.

Frictiois re-
mota, ad car-
nis augendæ
gratia præsta-
bit, sit in pueri
tumor.

Frictiois præ-
paratoria sum.

Natura opti-
ma domus ex-
hibenda, ut
jures indicat:

Sanum corpus
ipsum sibi su-
per natura om-
nia cōducit
ad vsum.

Naturam ho-
minem qui cor-
rupta, et quæ
miseram, tam
quæ vitia et
compendit.
Exercitatio
genera.

Exercitatio
simplex vñ.

Exercitatio mul-
tis alio tempo-
re, quam ante
cibum adhibe-
bitur.

Exercitia qua
celeritate ab
robore peragun-
tur.

Isaalis pifis.
peru pifis.

Exercitatio ve-
hemens ex re-
bulla celeris
composita est.

Exercitia em-
pne.
Maximum.
Lumborum.

Exercitatio in
thorace sunt
respirationes
vires.

Voluntaria ac-
tiones, quae
partium sunt
propria.

Motuum natu-
ralium species di-
uerfa.

Facilitas
naturalium
quatuor guber-
nari emaci par-
ti.

Motus cordis
arteriarum
intermittit
naucum.

Pulsus a quib.
causis moritur.

Veneris opus
a quib. causis ve-
nem possit.

Motuum qui ac-
tiones non sunt,
difficiliter tri-
plex.

Exercitatio est
omni vifera.

coquus. Peraguntur autem celeritate, citra robur & violentiam, curfus, vmbatilis armorum con-
tentio, necnon quae summis manibus fit concen-
tatio, tum quae per corycum & pilam exercitatio
a distantibus & currentibus administratur. Huius
generis est & quod *isaalis pifis* Graeci dicunt, &
quod *peru pifis*, necnon celeris voluntario & cir-
cuius in palaestra. Potest & solis cruribus, mani-
buse, idque erectus, ac vno loco consistens, cele-
riter exerceri. Porro exercitatio vehemens, ex ro-
buita celeris composita est. Non in postremis ve-
ro vehementes haec sunt, fodere, discum mittere, sal-
tare, idque sine intermissione: similiter, graue quod
vis telum iaculari, continuius fimbriam iacta-
bus: aut graui armatura testu, celeriter agitari.
Sed qui aliquo talia exercetur, iustemittere pau-
lulum solent. Quae vero remissiones exercitatio-
nes sunt, ex sine interposita quiete magis sunt.
Ceterum incellus, curfus, crurum exercitationes
sunt: acrochinsimi & sciamachae, brachiorum ac
manuum propriae. Lumborum autem, assidue se in om-
nes partes torquere inclinaret, idque aut pondus
aliquid e terra tollent, aut assidue in manibus
sustinent. Thoracis vero & pulmonis, maximae
respirationes, propriae exercitationes sunt. Maxi-
ma aut vox praeter iam dicta, vocis quoque instru-
menta omnia permouet. Porro voluntariae actio-
nes, musculorum, neruorum, atque tendonum sunt om-
nes propriae: cum ipsis tam vni mouetur ex acci-
denti & ceterae animalis partes, vi motus ipse ce-
lerius & vehemens edatur. Reliquorum autem
motorum qui vel naturales sunt, vel pro animi e-
duntur affectibus, alij cordis & arteriarum, alij
venarum & lecinoris actiones sunt: atque horum
quidem primu & maxime: secundo loco, reliquae
omniu partiu: quandoquid quatuor naturalibus
facultatibus omnes gubernantur. Ac arteriae
quidē cordisq; motus nunq; sane omnino inter-
mittitur. Ceteru magnitudine, paruitate, veloci-
tate, tarditate, & vehementia, variē interdiutur atque
remittitur. Vna igitur mutatio quae causa est, na-
turalis caloris actio, diminutioq; atque haec quide-
m pro anni tempore, nutrimento, potione, bal-
neo, frictione, somno, vigilia, itemq; animi affec-
tibus, & voluntariis actionibus, incidit. Altera cau-
sa est, secundu quantitatem animalis spiritus alte-
rano, quae pro motus voluntarij differentia va-
riatur. Tertia, quae ex firmitate, infirmitateq; na-
turalis virtutis accipitur, pro subtilitate ipsius cor-
dis & arteriaru bono contrariove temperamen-
to accidens. Quarta deniq; est, quae ex instrumen-
ti ipsius malo affectu xstimator. At venarum o-
pus, vna cu aliis instrumentis, quaeq; natura ad
alimenti dispensationē excogetur, pro cibo po-
tione, tum vero pro distributionis in corpus,
& coactionis, & nutritionis ratione varia-
tur. Huius vero mutationis, arteriae quoque capi-
ces sunt. Qui vero motus actiones non sunt, ho-
ru triplex intelligitur differentia. Alij oisq; animan-
tibus ex seipsis insunt, vt quae antea commemorau-
imus. Alij extrinsecus adveniunt, vt nauigatio.
Alios medicamentis prouincit. Nonnulli itē motus
placēt mixti, vt equitatio: quae quidē qui ex-
ercetur, simul & agit & agitur. Concurrit autē
praecipue secundu viscera. Quis quidē vbi quid-

piam fricare voluerit, statimatur is qui fricas, & ter-
go, ac modo in dextris, modo in sinistris, manus
iniciat. Sane coactionem nonnulla quae sub septo
viscera sunt, & maximae tum respirationes, tum
vores, parit modo efflatum. Iam ipsa spiritus co-
hibito, exercitatio quaedam musculorum est, non
minus certe eorum qui in abdomine, q̄ qui in tho-
race insunt. In summa vero, validi & ocyssimi
motus, gracile, musculorum, duru, compactum,
atque vegetu corpus efficiunt. At remissa, tardi, &
laeguidi, diuerfam omnino affectionē iocundat.
Praeterea igitur, quicquid in palaestra motum
geritur, accurate permouet: quidq; motus effi-
ciat, ignorat: cum hoc ipsum ad gymnas-
tam solum spectet, cuius praeterea minuter est,
indicane nimiru illi omne actionu exercitatio-
rum materia. Ergo gymnastes propositu nobis adole-
scentis, omnium quidem exercitatio-
rum vices cum
sciat, deligit illi ex omni genere quod moderatu
medijq; inter vtrunq; excessum est: quod si
alterare, sed plane seruare optimu corporis stati-
conuenit. Ac prout ex omni genere mediocri-
tas adhibenda est, frictione, exercitatione, bal-
neo, cibo, somno, ita vt neq; durior illi, densior-
ve, nec mollior aut rarior corporis habitudo
reddatur: huc quippe ab extrinsecus imminenti-
bus facile offenditur: illa corporis inhubet au-
ctum. Exuat autē se per ipse propositus, vbi in
lono iam perfecta coactio censetur. Mox frictio-
nis ratio huc spectet, vt membra molliatur. Post
haec exercitetur, dum & corpus intumescit, & co-
lor illi floridus appareat, & motus propere, aequa-
biliter, & continēdit. Inter lae vero sudorem
cum calido vapore mixtu cernes. Inhibenda vero
exercitatio tum primu est, cum aliquod horu
fuerit mutatu. Nec tamē pronus laudandus, cuius
est corpus, sed vbi summus exercitatio-
nis vigor remissus aut sedatus fuerit. Quod si illa vult
cohibito anilecti implere, perfundit oleo, atque apo-
therapia vnde deinceps debet: de qua in sequenti
libro dicemus. Lauacru autē ipsum omnino me-
dio temperamento eligendū est, ad propositu aeta-
tem atque naturā. Cui ne puluere quidē est opus,
si domus in qua exercitabitur, optimē constituta
sit. Quae si fuerit calidior, tum pulueret & vitendum.
At eo si vitetur, omnino erit lauandū. Sin non vitetur,
liceat & illud dimittere, praefertim hyeme.

GAL. DE SANITATE TUENDA LIB. III.

de sanitate tuenda, lib. III.
E St autem apotheraia duplex. Vna quidē
eum exercitatio-
nis species: altera vero eu-
pars, de qua impraesentiaru agendū est. O-
mnis igitur exercitatio-
nis probē peractae postre-
ma pars, apotheraia dicitur: quae duplici obli-
suscipitur, & vt excremeta expurget, & vt corpus
a lasitudine tutum reddat. Proprius tamē apo-
therapia scopus est, vt lasitudinē quae succede-
re immo dico exercitatio soler, submoueat, atque
prohibeat. Ceteru optimē constituto, a nobisq;
proposito puero, cum eodq; alius, qui tunc-
tan nim bonae valeritudinis grana exerceatur, etiā ra-
ro lasitudo succedat, quemadmodum superue-
nire soler athletis, ceterisq; etiā qui corpus ope-
re ex necessitate fatigant: eis tamen apotheraia
est ex

Viscera fricas-
da ratio.

Vifera quae ch-
cantant.

Spiritus cohibi-
tus afflatu ab
dominisq; reer-
citatus.

Motuum diuer-
sorum efficien-
tia.

Praeterea qd
se mouet gym-
nastic.

Mediocritas in
in omnibus est
sequenda, ad co-
seruandum eo
optimum corpo-
ru habitum.

Puer quoque
exerceri debet

Exercitatio
quando inhi-
benda sit.
Exercitatio cor-
pus quando la-
uandum sit.

Lauacru quae
esse debet
exercitatio.

Apotheraia
duplex.

Apotheraia
quid.

Apotheraia
duplex vbi.

Apotheraia
proprium lo-
pus.

et ex vīu, si nō laetitudinis nomine (i qua etiam nos secutores reddet) at certe excrementa purgandi gratia. Qualis autē apothērapia sit attingenda, ipsa finit, ad quos tendimus, demonstrabit natura. Cūm igitur & excrementa digerī, & quae tensa ex exercitacione sunt, molliari expediat, durae certe frictiones fugiendae sunt, nec his minus à lentis cauendū arborur. Nam postq̃ à se corpus non amplius dimouetur, periculū est ne frigeat ac densescat, dū nulla ope externa cal-
 10 fit: quare nō solū celeriter, sed adlubus plunum manibus, largioriq̃ oleo circūfuso, fricandū est. Oleū quippe ad velocitatē frictōnis cōducit, remittit tensā, similēq̃ molles ac molliat mēbra defatigata. Sed nimis molles frictio etiā vitāda est, vt quae neq̃ alius penetrat, neq̃ ea quae in angulis meatibus haerent, discuntur: cuius profectō causa, tum ipsā fricandā partū tensionē, tum spiritus colubino nem inuigumus. Media igitur frictio, quae ab vtriusq̃ distat incōmodo, eligenda est. Nō exigua autē apothērapie portio spiritus colubino videtur: cū qua si leuiter cōtrahantur abdominis musculi, partes quae in ventre cō-
 20 siliunt, quicquid excrementi est in ipsis, exprimentur. Si verō ferriant planē panaris abdominis musculi, nullius earū partium excrementa vacuabunt. Quae tamē in thoracē & pulmonibus de lītērit, ea deorsum trāsferent. Expedit autē huc transferētū ponus, q̃ in illis maneat, tanto profectō magis, quanto etiā eorū quae in ventre, q̃
 30 quae in pulmonib. & pectore cōtinentur, promptiore exitus patet: haec enim vel euomūt facili, vel deliciu nrutilla cum conatu & vi eiciūtur per rufies. Verū si quis perinde vt septum trāversum, ita abdominis quoq̃ musculi anhelitus colubino nem intēdat, exquisitus planē expurgabit ea quae sub septo sunt viscera: nō transferēt tū quicq̃ à spiritus instrumētis, ad ea quae nutrimento sunt delegata, sed totū in ipso thoracē pulmonib. q̃ excrementū manebit. Quare colubino nem anhelitus id genus impraeferatū nō
 40 p̃robo: multoq̃ minus, si quis omnino nō distet nō septo, valide ac vehemētē musculi abdominis contrahat: quando ita necesse est venas omnes, partēq̃ quae circa collū sunt, flari ac sanguine impleri: excrementa verō sursum atq̃ ad caput, nō deorsum & ad ventrē ferri, vt in tibialibus, acuramq̃ & maximā vocē edentibus indies videre licet. Est autē omne liuuiū inodi opus, mixtū ex maxima expiratione, & ex colubino nem spū-

ritus: nimis in cisternis cōfērtim factus, maximo expiratu edito, idē cum validissimā musculorū tum qui collis insident, tum qui abdomine sunt, tensione. At in spiritus colubino nem, eadē vtrorūq̃ musculorū facta tensione, nullo tamen spūritu etiā permisso, in his qui tibia forant, aut acutā vocē edunt, musculi pari modo tensi: splintu tamē nec penitus colubito, nec toto simul emissio, sed mediā rationē seruāt. Causa autē hanc acōnō inū est plarynx, in qui in tonus quidē
 50 spiritus simul cōpūli frīstū, latissimē ē ex pandit: in spiritus colubino nem, prius clauduntur: in his qui tibia forant, aut vocē acutā simul & magna vītur, mediū quēdā haberi seruat. Ceterū colubito spiritus, quae ad apothērapia est vīlis,

attollit ea quae ad ventrē spectāt, idēq̃ tensis thoracis musculis, & remissis qui sunt in septo & ab dominante nāq̃ deorsum excrementa trāsferūt. Secundo autem loco habenda est, quae medio crite eos qui in abdomen sunt musculi tendit, quod videlicet ea quae sub septo sunt viscera, apothērapia frictū sennant. Atq̃ his ipsi de causis fasciarū circumactis fiant, quae fricantes ipsi dum à tergo fricandorū cōsistunt, circa totū ventrē ad-
 60 hūbent. Alia verō cūm à frōte se collocauit, ceruicibus circa dorsum circūvolucionē efficiunt, duabus manibus circūducunt. Alias praeterea costis, spinis, & pectori accōmodant, idēq̃ cōuerso pariter cum his quodāmodo eo qui fricatur. Circa lumbos verō similes fasciarū circummedis fiet, tendente se ad singulas eo qui fricatur, nō tamē cum omnibus pariter se reuertente: cūm neque cōtinuos motus, nec vehemētē eis cōtingere ex apothērapia, si vti ex preparatoria, conueniat: certe aliquos, & quibus ex intervallo frictōnes sint interpolatae. Hac enim vel maximē
 70 ratione, & calorem qui exercitacio est adan-
 80 dūq̃ seruatur, & simul excrementa propriis ipsius tum tensionibus, tum moribus excreant. Ad quod sanē opus colubito spiritus cōducere non parum mili videtur. Quippe exilia instrumētum rum foramina, vehemētiori spūritu inflatu videas etiam expurgatis opifices: extruduntur siquidem quae ante occurrūt: attrahuntur quae ad latus sunt posita, impetu ipsius spūritus vtraque acta. Cū autē vehemētissimā materie impetus, diuersis rēponibus ac rationibus, contrarios edere effectus possint: obstruere quidem, cūm crassum & multū fuerit, quod cōferunt ac praecipe agitur: purgare verō, cūm exigū tenuēq̃ est, nec praeperē, nec violentē cogitur simul vniuersum expelli: rectē ita quidem sententia illi faciunt gymnastis, qui inter ipsam vehemētē exercitacionē interponunt colubitionē spūritus, nec non frictionē quae apothērapie debetur, simul hominē recreantes, paulatimq̃ ipsius cunctis expurgantes meatus. Nobis autem propo-
 90 sito iuueni, cūm medio crite exercicio atque etiam victus ratione vtratur, non est opus interpolatio-
 100 ne id genus, quam ob contrarias causas athletae postulant. Ac de apothērapia quidem abvnde vobis est dictum. Nunc de balneis agere tempe-
 110 stuum videtur, ac primū quidem de aquis dulcibus calefactis. Earum igitur, si media temperie sint, vis calida & humida est: fin tepidiores, humida & frigida. Quod si iusto calidiores reddantur, calida quidē, sed non perinde humida. Quippe horre corpora, contrahiq̃ calēs eorū meatus cogunt, ita vt neq̃ madescere ab extrinsecus accedente humore possint, nec excrementū quod intus laet, quicquam emittere. Ceterū ab his incipiendum, quae medium temperamētū obtinent, quae per se semper calefaciunt & humedant, licet interdum ex accedenti aut per habitum digerant liuiores, aut supervacua fluxione corporis particulas impleant, aut molliant, aut concoquāt, aut vires firmēt, aut soluant: ad
 120 haec siquidem quantitas quoq̃ earum non minimū confert. Huius autē balnei iuueni à nobis de scripto perexiguus est vīus, vt qui omnia tum ex

Spiritus colubino, quae ad apothērapia est vīlis, quae sit modus.

Fasciarum circumactis quae sunt à tergo, quae à frōte se collocauit, ceruicibus circa dorsum circūvolucionē efficiunt.

Spiritus colubito qui cōtinetur cōferat.

Materia impetus, contrarios edere effectus possit.

Spiritus colubito qui cōtinetur cōferat.

Aquam dulcem calefactam, per se humedant, cum per se calefaciunt, aut accedente calore, variis facultatibus fortis.

Aqua modica calefacta, per se humedant, cum per se calefaciunt, aut accedente calore, variis facultatibus fortis.

Exercitium corpus qualem ab apothērapia frictione expectat. Oleum commoda.

Frictio media inter molles et duras adhibenda. Spiritus colubino quod confertur.

Musculi ab lo-
manu vni cum
spūritu trāfer-
so intensi, quod
accidat.

Spiritus colubino quae non probanda.

Effatus quomodo fieri.

Spiritus colubino quomodo fieri.

Pharyngem et se causam tam efflatum, cum colubito spūritu, atque adeo ipsius vociferationem.

medioxi exercitatione, & dicta apothepia fit conſequutus. Nihil ſecius tamen ſi probe balneo adhibeas, ipſum quoq; apothepiar pars aliqua fit. Si quidem duras tenſasq; partes emoluit: excrementū, liquamentūq; ſi qd intus ad cutim hæret, evo cat. Verū neutrius horū eger talis adoleſcētulus: quare elui ſibi in balneo ſudorem & poluere, ſi quādo hoc vitur, magis poſtulat, q̄ caleſcieri. Ergo tranſire tantū ad ſolū viſq; nō in balneo morari is debet. Sed nec immorari huic

in piſcina eſt opus: imō lotus quarenuſ dictum eſt, ſeſtinet cōſeſtum ad mediocriter frigidam. Si quidem optimū corpus quoad augetur, frigida lauandum non eſt, ne eius incrementū moretur. Vbi verō iam abvnde eſt auctum, tum frigida quoq; affluſciantur, vt quæ & illud roborer, & cutem duram atque denſam efficiat. Tempus autē ad id per cōmodum, eſt æſtans initium, vt ante hyemē, toto interpoſito tempore, cōſuetudinem ſpernenda inducatur. Eſto præterea

30 dies, quo aſpicabimur, q̄maximē tranquilluſ, & quoad iſt tempus feret, calidiſſimuſ: cuiuſ etiam calidiſſima pars eligenda eſt: ſcivi & gymnæſterium medioxiter temperatum. Qui verō frigida vterur, in quartū maximē ſeptimūq; medio conſiſtat, priſtinū ſalubritatē ad vnguem ſeruſ: ſitq; iſt cum animo hilari, tum minimē abiecto: ac primum quidem lenteſt duriorib; fricetur, q̄ autē, vehementiūſ: dein oleo pro vt aſſueuit

fricetur: ac poſtmodū exercitetur exercitationib; multitudine parib; ſed citatiōib; q̄ antea. Ab his in frigida, eamq; nec tepidam, nec glaciālem, totuſ ſimul inſular: altera namq; repercuſum caloris non facit: altera ſerit inſuetuſ, atq; impenſe refrigerat. Quāq; hac procedētē tēpore vterur, ſi neceſſitas exigat. Exeunt verō ab aqua fricari oleo, idq; a planib; expedit, quoad cunſ ipſa in caleſcat. Poſt hæc cibū pluſq; cōſuetuſ, portionē in tra conſuetudinē, capiti: quo vltro ipſe faſturuſ eſt, modō ſunt omnia ritē peracta. Nam ſi frigida

lauatione & pluſ appetit, & meliuſ cōcoquant, ac minus ſitit, veniūtq; ad exercitationeſ poſt tri die planē meliori habituſ: corporiſ quidē mole, pari ei quæ antē, exterū cōpacta & muſculoſiore, ac vegetiore: cute verō duriore ac denſiore. In hoc ergo ſecundo præterea die, ſimilit̄ omnia ſunt peragenda, enī tertio & quarto. Poſtea verō procedente tempore, ad eundem modū frigidam iterum ingredi iubebimur, videlicet poſt eam quæ priori ingreſſui ſuccēſit frictiōē: verū tertio eam ingredi, minimē laudo. Nam ſi ſecundo id iſſeſſe eſt abvnde, præſertim cum pro arbitrio noſtro remorari ac detinere illi hominē liceat. Cæterū ſi egreſſuſ frigidam, coloratior ex frictiōe ciō reddatur, id mediocriter moratū ſibi indicat. Sin & tardiuſ ei calor redeat, & decolor diutiuſ maneat, pluſ æquo moratum docet. quare ex notis quæ in cute ſunt, diſceſ moræ menſuram. Quia verō fieri nō poteſt, quin iuueniſ exercitacionib; dediuſ, aut ſuipluſ, aut

enī gymnæſtæ errore aliquid in laſitudinē incidat, nō nihil de ipſa dicendum eſt. Porro laſitudinis in vniuſum octo ſunt differentiæ: quatuor ſimpliceſ, totidēq; cōpoſite. Nam quoddam incendi tendi corpus videtur, & quod mou-

ti ſe, vel viceriſ, vel phlegmonis ſenſuſ obortatur, affectioneſ nō ſunt, ſed ſymptomata. Simpliciuſ igitur laſitudinē differentiari, prima eſt vicerioſa: quæ oritur ab excrementorū copia tenuiſ ſimul & actiū, adeo pungentiū ac veluti vulnerantiū tum cutem, tum carnē inter exercitandam, vt enī horrore ac ceu cōcuſſio vniuſi corporiſ interim obortatur. Secūda eſt laſitudo tenſiua, citra vllum viceriſ ſenſum. Accidit namq; in vehemēti tenſione, omneſ muſculorū fibreſ tendi, eaſ tamen in primis laſſari, quæ per longitudinem tenſionē porrigimur: quippe vbi tenſiæ fuerunt immo derationē, tendi adhuc vidētur, etiam ſi nulla iam tenſione vrgeſtur. Tertia differentia dicitur conſuſoria, quā nimiuſ ceu conſuſa aut phlegmonē obſeſſaſ parteſ ſentimur: eiq; tum ſolet maximē incidere, cum muſculi nimiuſ exaltati attraxerūt quippiā ex circūſuſſiſ ſibi excrementiſ. Quod ſi enī tum tendonib; tum nerviſ idem affectuſ incidat, *Arteriarū*, quaſi oſiū laborem, ob peniſiorem ſenſum, eum vocant. At differentia quarta, quæ improprie dicitur laſitudo, tum incidit, cum muſculi ſupra iuſtum ſiccantur, ſic vt ſqualeſeſ contractimq; corpus videatur, atq; ad motū quodammodo pigrū, citra tamen vllum nūc deſcriptorū ſymptomatiū. Harum autē quatuor differentiārum ſingulaſ, ſua remedia ſunt. Cæterū laſitudo vicerioſa, maximē in ea incidit corpora, quæ & mali ſucci ſunt, & excrementiſ abvndant. Succedit verō recentibuſ cruditatib; cum aut exercitatur immo derationē, aut in ſole ſunt morati. Nihil tamen obſtat, quo minus in corpore boni ſucci & citra cruditatem proveniat, vtq; ob exercitacioneſ exceſſum. Remedium autē huiuſ eſt redvndantiſ evaporatio, quæ ſit frictiōe tum multa, tum molli, cum oleo adhibita, i quo omniſ aſtinēndi viſ abſit: quod genus maximē Sabini eſt. Adverſiſſimum verō huic affectioni eſt, qd *apud Graecōſ* & Hiſpania & Iberia portatur: quodq; enī ſit circa Aulonē.

Vtendum itaque eſt dulciſſimo oleo & copioſo, primo quidem die, quō ſuſpecta laſitudo omni no nō ſit futura. Secundo verō, vt ſi qua incidit, diſcutiatur. Diſcutit porro eam apothepia, in qua ſollicit motuſ adhibeas quantitate medicorū, qualitate tardiorēſ: idq; cum frequēti interpoſita hiſ quiete, qua vtiq; fricare hominem oportet, pluſib; cōſtreclantib; quo nō nec frigefcat pars vlla, & excrementa ocuſſimē digerantur. Porro frictiōnū pluſ adhibebimur iſ, qui in cute & ſub cute excrementorū collectam vim habet: moruſ verō, quos ipſemet edant, in altera laſitudine, in qua pluſ eſt in ipſiſ congeſtuſ muſculiſ. At laſitudo tenſiua, pro remedio relaxationem poſtulat: ea namque tenſioniſ contraria eſt, quemadmodum & duritatiſ molliſ. Hac autē laſitudine affecti, relaxabuntur panca molliſſione oleo dulci egellidq; frictiōe: tum intermiſſione & omniū, aut quiete, aut lauatiōe mediū temperamēti, argi in calida pluſcula mora: quod ſi biſ tēre lauare, pluſ proderit. Hi verō & poſt balneum vngi deſiderant, priuſquā veſtiātur. Quin etiam poſtero die, cum eſt cubili ſurgant, vngi hiſ expediri: nūquam tamen oleo extreme frigido, nec dura frictiōe. Tertia laſitudo, quæ

*Laſitudo vici-
rioſa vnde prop-
riatur.*

*Laſitudo troſi-
ua quæ la-
cidat.*

*Laſitudo con-
cuſſoria quæ, e-
r quando ſu-
tiatur.*

Arteriarū.

*Laſitudo ſqua-
lada.*

*Laſitudo vici-
rioſa quæ poſt-
ſumam corpore
inſiſtat.*

*Laſitudinē v-
icerioſa remedia.*

Oleū Sabini.

*Laſitudinē ef-
ficā vicerioſa
quibus morbiſ,
ac ſiſtendū
ſunt tractando.*

*Laſitudinē tē-
ſiua curatio.*

*Balnei media-
te calidū rſuſ*

*Frigida lauandam nō eſt opus
m corpore, quā
diu augeſcit.*

*Frigida lauatiō
nō eſt rſuſ.*

*Frigida lauatiō
tempore æſtatis
gymnaſterium
aptum.*

*Frigida lauatiō
ne rſuſ, mediū
quæ rſuſpiciū
atq; rſuſpiciū
atq; rſuſpiciū.*

*Aqua glaciāle
ſerit inſuetuſ
atq; impenſe
refrigerat.*

*Frigida lauatiō
ſum cōmoda.*

*Menſurā moræ
ſutura in frigida
balneo, rſuſ
notuſ quæ in
te rſuſpiciū
ſuſpiciū.*

*Laſitudinē
differentiā
in vniuſum ſunt
olū.*

exvehementissimis nascitur motibus, atque eos maxime invadit, qui exercitationibus assueti non sunt, evacuatione supervacante, exenti requiem, & inflammationis refrigeratione desiderat. Ego & oleum copiosum & tepidum cum frictione molliissima, & longissima in mediis temperamenti aequi mora, huiusmodi lassitudinem coarctat. Quod si paulo tepidius aqua sit, praestaret. Ad eundem modum & multa quies, & vinctio assidue, breviusque omnia que id quod lassatum est, quiete, lenimentorum recreant, ac quod supervacuum est per halitum digerant. Differetia autem quarta, quae gracilitatem tantum, atque ariditatem inducit, primo quidem de nihil diversum postulat ab his quae iam dicta sunt, praeter calidiores aquas, quae sensum contrahat, calefaciat, & roboret cutem. Secundo de apothecariis exercitationem, quae tum motu, tum frictione, & pauca, & mollis, & tarda sit. Praeterea solius similiter calidum: verum protinus insilient in frigidum, quod videlicet ipsi robur in cute vna cum calore conferant, & minus sic distrahantur, & facile in escam & cutem nutrimentum reserant. Postulat autem id corpus nutrimenti & madescere, id quod similiter vtrumque praestat humidum nutrimentum. Ceterum lassitudo vlcerosa post legem iam apothecarij consuetum nutrimentum desiderat, aut etiam parcius, praeterea humidius. At quae tensio nem lassitudo praefert, ea etiam magis quam vlcerosam, parce nutrire postulat. Quae vero phlegmones sensum addit, ea supra reliquas omnes, tum humidissimam, tum minimam, tum vero quod refrigerans quippiam habereat, requirit. Boni fuci tamen nutrimenti omnes quae lassitudinem grauant, iuxta postulant. Cauendum tamen in vlcerosis & ea quae phlegmones sensum exhibet, glutinosus cibus est, cum qui excrementorum digestionem moretur. At in tensionis lassitudine, eam exhibendum eiusmodi nutrimentum est, sed minuto eius modo. Lassitudo autem interdum lassitudine soluitur, cum videlicet leuissimi exercitationibus, partes postea adhibendas videtur expedire. Si vero lassitudo interdu modula est quies, partim in his quae ex congestis excrementis lassitudines conlidunt: partim in his quae tensionis & phlegmones emulsum praebent: partim tamen nutriendi sunt in hac lassitudine quae phlegmones sensum praefert: in vlcerosis vero, pro consuetudine, vbi cesset apothecaria sunt vni. Si vero vberius cibandi, in ementia illa quae lassitudinis differetia. Simili ratione, & mediis temperantibus aquis laudandi in his tantum differens lassitudinis est, quae ex redvndantia supervacuorum sunt natae. Porro humidum nutrimentum siccat medetur ipsam tamen nec remedium nec quatio lassitudinis est. Sed cum membra sicciiora sunt facta, nulla tamen nec tensio subest, nec tunc acrius excrementum, nec phlegmonum affectus similis, rescire nutrimento humectante expedit, quae ex laudato humore sunt siccata: alioque gracilis & aridus si fuerat, postea die cecidit corpus. Porrigitur autem interdum minus pro consuetudine, aut propterea quod pars opus non est, aut quod coquoque id non possit. Iam vero, in eo quidem affectu qui ex nervosorum partium tensione co-

sistit, calidior si ex consuetudine lauari non convenit: simili ratione neque in his quos excrementa excitant. In gracilitate autem quae circa hanc consistit, expedit calidior aqua, quam quae medio critere habeat, lauari. Siquidem si affectus relictus, in appositione eius quod est detrahit, consistit: id quod nequirat cedere cum existente laxa. Cogere ergo hanc prius, astringeret atque densare oportet, si quae plenitudo nutrimenti expectanda est vitulata. Sane si rogit, claudique tum frigidam, tum feruens aqua. Verum si frigidam visu laedi hominem metus est, utpote qui iam ex multa exercitatione & laxior, & vacuus est redditus. Ex feruenti, ut nota certe nulla, ita secuta in cute densitas paritur, ipso qui in ea derelinquitur calore non nihil conferente. Unde nec immorari in frigida nimilud debet qui ita est lauius, ut quae feruentia lauium non modo frustretur. Ceterum si duraxat corporibus quae bona lassitudines sunt, quarta illa impropria lassitudinis differentia incidit: cuiusmodi sunt athletarum qui bene sunt nutriti, nec non propoli nunc in dispartitione iuuenis. Sunt itaque tres proximae ac simpliciores lassitudinis differentiae, illae primae de quibus iam egimus. Post has ex binis copulatis aliae sunt tres. Ab his vero septima est, vbi in vno coeunt tres notae. Remedium vero commune in omnibus complexis consilium est, ut ei quod superat, sit intentus: nec tamen quod celiquum est, plane contemnas: proprium vero, ab his membratis affectibus accipiendum est. Si vero lassitudines ipsae numero tres, si invicem illas coniungas, quatuor coniunctiones efficiunt: ita sane si his quartum affectum addas, multo plures existunt. Quod dicimus, ex descriptione licet clarius intelligas. In ea prima locum vlcerosus habet. Secundum, in quo resio est molestia. Tertium, quae phlegmonum similis est. Quatuor, in quo corpus gracilis est redditum. Ex his igitur, aut primus cum secundo coniungitur, aut cum tertio, aut cum quarto: aut rursus, secundus cum tertio, vel quarto: aut denique tertius cum quarto: ita nimirum ut ex binis coniunctis affectibus, sex in vniuersum complexiones oriuntur. Rursus, cum tres vni miscueris, quatuor aliae sunt. Nam aut primum iunxeris cum secundo & tertio, aut cum secundo & quarto, aut cum tertio & quarto: aut rursus secundum cum tertio & quarto. Postrema omnium complexionum erit, vbi quatuor simul coierint, ita ut vndeum numero in totum fiant. Erant vero & simplices quatuor: efficiuntur itaque in vniuersum quindecim.

Simplices affectus.

Vlcerosus A. Tensionis B. In quo phlegmones sensus est, C. Gracilitas, D.

Compositi.

AB. AC. AD. BC. BD. CD. ABC. ABD. ACD. BCD. ABCD.

Quod si praeterea oculus cum aut aliorum symptomatum differentia, tum secum, tum cum his quindecim complexione, in numeras alias complexiones inuenies. Vnusquisque igitur horum praestitutum, si quidem per se consistat, simplex remedium exigit. Sin alteri sit coniunctus, illi praecipua medendi ratio adhibenda est, quae dignitate

Calidior aqua quam quae moderatur se habens, in qua sit affectus vinctum.

Carum est claudique ab aqua tam frigida, tam feruens.

Frigida lauium vbi prius laui sit, quoniam qua admodum frigidum per lassitudinem.

Quarta illa impropria lassitudinis differentia incidit.

Lassitudinis tres aliae differentiae oriuntur. Prima, cum bene inter se copulantur, ac simpliciores denique sunt in vno simul coeunt.

Complexiones affectuum istae sex in vniuersum sunt.

Complexiones affectuum istae sex in vniuersum sunt.

Lassitudinis quindecim complexiones inuenies.

Affectus simplices, si quidem per se consistat, simplex remedium praestant.

Lassitudinis quatuor differentiae.

Lassitudinis quatuor differentiae.

Vbi ratio sit lassitudinis, aut quatuor differentiae.

Lassitudo interdum lassitudine soluitur. Lassitudo in quibus soluitur de sit quae.

& viribus anecellit. Ac dignitate quidem & viribus maior laesura est, quae phlegmones sensum praefert, quam excrementosa. Est affectus iam dictis proximus, ut ipsa meatuum cutis angustia, quae obstructus illis aut densatis contingit. Ac obstructio quidem ex lentis crassisque excrementis oritur: densitas, tum ab iis quae astringunt, tum quae refrigerant. Verum obstrui propositum nobis corporis cutis, si ad praescriptam rationem nitè agatur, non potest: densari certe aliquando potest, tum ex valido frigore, tum aluminoso balneo. Fieri autè potest, ut & post balneum, sudoremve, prius laxata cutis, aures flatus incidens, obstructio nem quampiam densationemque efficiat. Cui remedium est calidior: ac proinde valentior exercitatio, ac balneo calidior vtendum. Magis autè ad rem pertinebit, si in prima domo pinguior oleo aliquo antiquo, relaxantem (quale Sabinum est) volutetur. Mora verò in frigido solio diuturna ne sit, sed neque quod frigida. Inducti autem, vngantur aliquo, quod mediocriter calefaciat. Oleis quidem, ex iis quae in Aegypto habentur, cicino & raphanino in reliquo orbe, dulci, tenui, ac modicè antiquo. Vnguentis verò, fusino, gleucino, irino, amaricino, & cômagine. Ex quibus sanè gleucinum, prorsus acopum est, ac relaxans. Paulò hoc calidius, magisque relaxans, fusinum est. Irinum verò & amaricinum, & cômaginum, etià fusino calefacere potentiora, iis affectibus qui propriè frigidas dicuntur, sunt idonea. Cuius tamen densitati sanandae, etià anethum est satis, maxime si ex viridi anetho fiat. Facit & ad tales affectus acopum quod ex abietis semine conficitur. In vniuersum autem, cum in idem variis affectus coierint, hi, si vnam medendi rationem indicent, vniq; intenti magis eam rationem conveniet, quam si singulis seorsum consisterent. Sin contrarij sint, iis qui vincit affectus prius est corrigendus, ira tamen ne reliquum omnino negligas. At qui vel propter aetatem, vel etià alia ratione imbecilles, concubere, in his virium infirmitas necesse est superet. Qui verò firmiores & iuvenes, veluti qui nunc est propositus, horum habitus corporis in raritatem magis, quam vires in imbecillitatem, mutantur. Itaq; autem corriguntur hi per ea quae cogunt & contrahunt, qualis preparatoria existit. Quod si etià ex venere, & refrigeratio sennatur, tum praecipue preparatoria exercitatio est vtendum: quandoquidem ea non solum calore exercitur, sed habet etiam cogit, atq; costringit. Si vero anni tempus non diluadeat, neq; si frigido balneo abstinendum censeo. Sit autem cibus & humidior, & parcior, mediòque temperamento, vel calidior. Nam cum corpus à venere & laxius, & frigidius, & imbecillius, & siccus sit redditum, debent planè quae densent, & calefaciant, & vires reparent, adhiberi, atq; ad haec studium omne impendi. Post vigilam autem vel mitià, vel ambas, quae apothepia dicitur exercitatio idonea est, si tamè cruditas absit. Nam si quae sub sit, omnino exercitandū nō est. Cum autè à vigilis & tristitia graciles magisque aridi, ac minus dicto audientes planè cernuntur, siccus existimandū est iis redditū esse corpus. Quare tales affectus,

partim molli frictione ex multo oleo, partim terperato balneo sanantur: partim tarda & modica agitatione, quaeq; subinde interponat quietes. Is verò apothepioci exercitij erat modus. Ad eundem modum ex quae ab ira, vel potius penuria siccitatis sunt, corrigendae sunt. Contraria prorsus à iam dictae ratione humiditates emendare conveniet, quaecumq; ex occasione proveniant: quippe studium in his ad siccationē dirigitur. Ceteri ex longiori desidia, & humiditatis alamenti immodico intemperatiusq; vsu, contracta humiditas est, longiori remedio est opus: sin ex liberaliori portione quae pridie sit hausta, citra vllum capitis, aut oris ventriculi affectum confiterit, eam vel vniuo die perfranse licebit, si sicca frictione & largius, & exercitatione veloci, & parciore ponere, & sicciori cibo vtire. Porro si laesura dimis siccitas vllas à somno appareat in proposito iuvene, atq; is siccior iusto certatur, vngendus dulci oleo est: frigidiusq; vbi omnino parcissimè, ita neq; denique, nec molliter est, idq; matutino tempore. Quod si etiam curis densitatem corrigere studes, vniq; quae ex duris tum frictione, tum contractatione, praeterea vehementi exercitatione orta est, mollis frictio cum copioso, & dulci oleo medetur. Quae verò contracta ex frigore est, eam primū frictione sicca ac celeri, deinde cum oleo adhibito calefacientes, naturae suae restitueris. Laxiatè verò, quae frequens balneum, & mollem frictionem, & vneris vsum confutata est, paucula frictione, primū quidem sicca, deinde cum oleo quopiam eorum quae astringant sanantur. Humiditatem quoq; nimis portioni successit, sicca frictio cum linteo administrata, vel cum manica, interdū etiam solis manibus, corrigit. At vespertina frictio iis vtilis est, quos vel laesura valida premit, vel siccitas male habet, vel atrophia macerat. Igitur in natura proposita, cum valida laesura, vel immodica siccitas corpus afficit, prandium minus esto: tum ab eo ad cenam longius interponatur tempus. Praeterea plurius quiescat: modicum tamen inambulet, quò cibus per erectū agitationem concussus subsidat. Vnius etiam sit, si & alius exonerare possit. His etenim probè peractis, securus oleo dulci frices, idq; ventre prorsus intacto. Quod si in musculis ei vicinis vel laesurae sensus aliquis, vel siccitas appareat maior, vniq; debentur mediocriter, & blandè, & suspensa manu.

GALENI PERGAMENI de sanitate tvenda, lib. IIII.

Nunc autem primò de morbosus symptomata differere est animus, provt citra exercitacionem incidunt. Secundo loco de illis quae similitudinem quandam cum his habent. Ac quae immodicas quidem exercitaciones laesura excipit, sanorū symptomata est: quae verò sine his consistit, morbosum. Itaq; & ab Hippocrate cōmodissime dictum esse videtur, laesurae sponte natas nunciare morbos. Atq; vlcerosus quidē sensus symptomata laesurae est. Causa verò vnde ea nascitur, affectus laesurae

Siccitatis à vngulis & anini effectibus esse, quomodo corrigenda.

Humiditatis rationes diversae, siccitatis varietates sanantur.

Cutis densa quomodo relaxanda.

Laxitas cutis quae ratione sananda.

Frictio vespertina quibus vtilis.

Prandium quando esse debet minus.

Laesurae sponte nate morbos pronuntiant.

Obstructio vnde oritur. Densitas vnde.

Oleo calido & relaxantia.

Vnguentis relaxantia.

Anethinum vnde generū esse apertum cito densa laxanda. Affectus varij si in vnam coeant, quid agendum.

Veneris ex vno imbecillitatem reddi, aut eos laxi, aut refrigerati, quae ratione corrigi debent.

Vires reddi corpus laetius, frigidum, imbecillius & siccum.

Apothepia quando fieri debet.

Veneris non esse si sub sit aetate.

Cerebrum
nunc unde for-
menda sunt.

Hancem cras-
sities pignus
per laborem qui
cum sudore ab-
runtur: tena-
res autem in
illis, quo ab-
que sudore sunt

Sudorem esse
nam succum
qui in vasis
in corpore ab-
runtur.
Vrina indicat
tantum quae con-
tinentur in ve-
sit.
Vrina quae
et tenuis quod
indicit.

Turbulenta
vrina indicat
dicit.

Vrina ferme-
ntat specie
vria.

Sudor quid in-
dicat.

Color a succo
profectus: non
a solidis ani-
malis partibus
Succi a quibus
censu in corpore
laetant.

sic etiam comoda. Hinc autem mali succi nota su-
meantur. Qui in ocio degunt, hi pituitosum suc-
cum solent accumulare. Quos multus labor ex-
ercet, hi biliosus, vel melancholicus, illum cra-
ssum, hunc autem gignunt. Quamvis autem di-
stinctiores labores fuerint, tanto sunt ad artem
generandam bilem magis proclives. Præterea
qui cum multo sudore obeuntur, hi crassius ex-
crementum faciunt: qui sine sudore peraguntur, ma-
gis tenuis: veluti qui hyeme, & frigido ætate statu
colliguntur. Ad hanc etiam, non solum vrinae mul-
titudine & qualitas, sed ipsius etiam sudoris con-
sideranda est. Cuius in eo qualitas dignotio non
modo ex gustu & olfactu, sed ex colore etiam faci-
lis est. Pallidus quippe cernitur sudor, pro cuius-
modi bilis ratione. Saepe tamen post validissimos
labores & vehementem ætatem, plavæ flavae conspi-
ciuntur. Aliquando medius, atque ex ambobus mix-
tus. Ad eundem modum & ipse bilis humor se ha-
bet. Qualiscumque vero is in corpore habetur, ta-
le necesse est eius appareat serum. Ac sudor qui-
dem succorum qui in vniuerso corpore abvndat,
nota est: vrina eorum tantum qui vasis continentur.
Itaque tum consistentiam, tum colore vrinae, nec-
non quæ in ea peudent, aut sident, pendere opor-
tet, ut quæ offendant qualisnam sanguis
sit qui in vasis habetur. Quando si is biliosus sit,
serum quoque eius biliosum esse necesse est. Simili
modo pituitosum, si pituitosum. At ubi crudus
planis est, vtiq; tenuis aquosus vrina cernitur,
nihil nec quod fidat, nec quod peudeat in se ha-
bens. Vbi autem concoctus, hæc in vrina appa-
rent, desuperque tenues quædam nubesculæ. Quod
si turbida sit, qualis veterinorum visitur, crudus
succus refertas Venas indicat, non tamen cessare
naturæ, sed eos valenter concoquere. Si vero ce-
leris separatio crassi a liquido in ea cernitur, sicut
quod subsidet album, læue, & æquale, immixtam su-
perat ut ipsos omnes succos naturæ indicat. Sin
cui emingitur, pura sit, pronus vero tuerbetur,
iam crudi succo concoctione aggredi naturæ docet.
At si interpolito tempore tuerbetur, non protin-
us, sed post aggressuram insinuat. Similiter si
pronus separatio fiat, quod quod subsidet, sit al-
bum, læue, & æquale, superiorem longe naturæ
succis quos concoquit, indicat. Sin bonum sit
quod subsidet, sed longiori tempore colligatur,
etiam naturam temporis spacio superaturæ suc-
cos declarat. Si vero vel omnino nulla separa-
tio, vel id quod subsidet, malum sit, imbecillitas
naturæ significatur, egeat ope aliqua ad succos
percoquendos. Sicuti vero vrina succorum qui in
vasis sunt constitutione prædita: sudor, & alia
quæ per vniuersum animalis habitum conspiciuntur,
eorum qui illis sunt affectus demonstrant. Quippe
superantibus in eo calidis succis, insolitus
caloris sensus percipitur: frigoris vero, cum
frigidi dominantur. Iam albiores, pituita domi-
nante: pallidiores, bill abvndante, cernuntur. Sig-
dem color a succo provenit, non a solidis anima-
lis partibus, vtiq; cum se succi in altum non rece-
perit. Accidit vero id illis propter frigora, rigo-
res, vel animi affectus: vel in timore, vel ingenti-
trem tristitia, vel incipientem verecundiam: quo-
rum si adsit nullum, nunquam se in altum reci-

plunt succi. Acque neque in eum violentius ur-
ruentes, hanc advenit nunquam, nisi animus ali-
quo modo affectus sit, aut æstu immo dico ani-
mal extrinsecus obfessum. Ergo si neque ambien-
tis violentia, neque vilius animi affectus subsit, cer-
nissimum succi animalis cognitio ex colore datur.
Quare si ad rubicundum quod pro natura mutari sit
corpus, sanguinis abundantia subselle significat:
si ad nigrum, nigrum superesse bilem ostendit.
Porro color plumbeus, quiq; mixtus ex albo &
liuido est, crudus & pituitosus dominari succos
indicit, minus tamen humidus quod sit pituita comu-
niter dicta: cui si adsit lenior, vitreus succus dicitur
at Præzagora. Generaliter igitur cuiusmodi suc-
ci omnes albi crudus sunt: nomen daturum verò
aliis aliam fortitur. Ipsorum autem & biliosorum san-
guis in medio est: hi siquidem ex eo supra iustum
percocto sunt: illi autem, ex nondum perfecto.
Ac singulorum quidem varietat differentiæ. Ce-
terum in corpore lassitudine affecto, ubi paulu-
luidum vel citra sanguinem restitum, vel vitra pro-
cellum est succus, audacter mittendus est sanguis:
ubi plus, considerandus agendum: ubi plurimum,
in hoc nullum omnino mittendus. Inspicere ve-
rò & quantitatem convenit, ut, verbi gratia, si bo-
nus sanguis exiguus sit, reliquus vero succus
plurimus, vtiq; in his abstinentiâ à detractio-
ne sanguinis est. Sin is quidem exiguus, sanguis ve-
rò copiosus, audacter in incidenda vena est. Den-
deicere alium oportet, ratione habita de abun-
dantia succi copia & specie. Quod si quis detra-
hi sibi sanguinem nolit, huic deicienda largius est
alium: aut si id quod suspensum habet, alia ratio-
ne educendum est supervacuum. Iam verò, si in
venoso vasorum genere copia semicrudorum hu-
moris subsit, in reliqua autem corpore multitu-
do horum mordacium, cum duo hi nobis scopi sint,
nempe semicrudorum percoctio, atq; acrimia & mor-
daciæ eductio, abstinere eos covenit ut omni
valido motu, quos lassitudine secuta fuerit. Blan-
de tamen vinctos atq; oleo perficis, perquam
suis lauate balneo expedit: inde in ocio absti-
nentiâ habere, atq; etiam somno, si id fieri possit.
Nihil enim eque concoquit, aut malos succos dis-
cutit, ut somnus à balneo. Conducit autem ad
somnia non in postremis etiam & balneo ex-
psum. Quod si secunda die & tertia, similiter gra-
natum sentiamus hominem, iterum atq; iterum
vtemur eadem medendi ratione. Sitq; tibi som-
nus & causa & signum sperate vilitatis percip-
modum: sicuti est diverso, non posse à balneo dor-
mire, nec causa, nec signum est comodum. Sed ex
somnia vigilisq; plerumq; redundantis succi in-
dicia sumuntur. Frigidi namque succi, * soporem
& longiores somnos inducunt: calidi & morda-
ces, vigilas. Sicuti autem in primo, ita in secun-
do die, ex simplici cremore pisanæ, aut ex alica,
cui paulillum aceti ad incidendum permittitur
sit, si cruditas suspicio subsit, sorbitionem mini-
mam eis exhibebimus. Quippe ut largior nutri-
tio nocet, sic abstinentia omnimoda, nauseam in-
ducit, ventriculum lædat, resoluit vires, ac prauum
succum accumulat. At bouti quidem succi est alica.
Ceterum nil lentior ipsius corrigatur, adie-
ctis aceti & porri modico, non solum obstruet,
sed

Color corporis
quando sit co-
quissus nota
erunt, qui sub-
iunguntur.

Color plumbeus
quid indicat.

Vitreus succus.

Sanguis mittendus
quando in
lassitudine sit.

Alium esse lar-
gius recommenda-
re quod per la-
titudine vilitatis
reducit detracti
sibi sanguinem
noluit.

Somnus a bal-
neo, concoctus,
ac malos succos
discurat.
Balneo elide-
re a somno.

Frigidi quid sit
sopor, soporem
calidi a sit, vo-
pulis pignus.
Cruditas qua
sorbitionem
da.

Abstinentia om-
nimoda inducit
nauseam, ac
prauum succum
accumulat.

Alica lentior
corrigenda a-
ceti & porri.

sed

sed etiam nutrit plenius, q̄ propositis sit ex vlla. Hac itaq; ex causa p̄sana cremor in hoc casu tuor est, vt qui tum modice nutrit, tum facile per angustia permeet, dissiccetq; & dissoluat quicquid in crudis habetur succis. Horū ipsorū grana & multa his idonea est, & xanthoxyli, & apocini, & piper, & zingiber, atq; omnia breuior, quæ circa vniuersi generationem succi, humorem coassum dissolunt, soluantq;.

*Cruditatibus
qui cibi potif
que congruant.*

*Diuturnis pro-
latis, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

Frugum itaq; maximè apta, est p̄sana: olerum, sola lactuca: piscium, qui dis-
cuntur susantes: panis, qui in elibano coctus, &
fermentatus, & modice purus est: aues monticolæ: polio, oxymeli, multa, vinum tenuis, & albi.

Quæ verò vniuersam cient, hoc casu non probos. maximè quæ prevalentia exclus sunt, & san-
guinem calefaciunt, & liquant. Quippe quod con-
coquendum probe est, huic tanta, & vniuersa non
conuenit. Hæc itaq; omnia secundo die ita facien-
da sunt, atq; cuius præparatio, quod si tum
laxitudinis sensus leuatur, tum cætera pro natura
ordute appareant, fricare quidem liber alios,
exercere verò parò hominem adhibere. His ita
petitis, si nullus laxitudinis sensus præterea su-
persit, ad consuetudinem statim exercitationis redu-
cere ipsum. Sin quicquam appareat priorem aut
symptomatum, aut notatum, rursus tu quoque
in id intentus, mutare tentabis ea quæ particu-
larum non rectè habent. At si in eodem lassito
corpore, reliqua eadem habeantur, sanguis au-
tem bonus exiguus sit, crudique humores pluri-
mi, huic nec sanguis mittendus; nec alius deici-
endus, aut exercitatio, aut omnis in motus, aut bal-
neum adhibendum: sed seruandus in omni qui-
etis est, dandiq; ipsi cibis, potio, medicamen-
taque sunt singula eius generis, quæ attenuent,
dissolunt, & possunt succorum transiundinem,
idcirco manifestū calorem. Ergo nuncius hos
maximè oxymeli, aliquando etiam p̄sana &
multa exiguo quopiam. Sufficient enim huic vniuersi,
si modò alij vili, tenuem: ipsa nimirum crudos
rum humorum copia, quos paulatim conco-
quant, ad corporis alimentum ab venteris. Quo-
niam autem peccordia vniuersa omniibus tun-
gidis indatisq; sunt, & facit quicquid ad alium p̄sana
in flatum vertunt, non in ualid fuerit. & longi-
gi piperis, aut albi, aut turgis aliquid cum cibo
dare. Sed album quidem lupra reliqua duo ge-
nera alium roborat. Nigrum aut eligendum est,
quod præcellet pondere. Vilius tamen sit & Dio-
scoridico medicamento vni, cuius duplex est cō-
positio. Nam alijs ex paribus omnibus, cum
no, piper, ruta, nitroq; id cōstituit: ac potest sic
magis ventrem soluere: alij cum reliquorū pa-
tri pondere miscetur niri dimidii. Præstiterat
cuminū esse quod Aethiopicū vocant, piper verò
vel longum vel album. Maccrabitur cumini
in aceto maximè acuti: dein cōtinuū id rinditur,
ad eum prius modicū fringitur vas fictile, qd
coctum in camino q̄ optime sit. Sunt verò & ru-
ta folia modico caucta. Sumitur & per se me-
dicamentum hoc, & cum p̄sana cremore, & ante
& post cibum. Porro ad eum vsum maximè com-
mendatur, quod mel optimum, opumq; despu-
matum admixtum habet. Apposuit sane reme-
dium sic affectus est, & quod ex tribus piperibus

constat, vniuersum non admodum medicamentū
tolisū sit, atq; ex variis cōsuetudinibus, quale est
lad quæ vniuersum in his fluxionibus quæ a capite
descendunt ad pectus. Expedi autem præpara-
tum habere vtriusq; ad manū. Simplex igitur il-
lud, quo ad cruditatē quæ in primis est vniuersi
tine, huiusmodi est: Ad cuiusq; terris piperū dra-
chmas quinquaginta, ad vnde adduntur anisi, &
thymi, & zingiberis, singulorū drachmæ octo.
Hoc magis simplex est: quod detractū sit zingibi-
ber. Alterū verò est, quod ex eisdem cōstituitur:
verū ad cuiusq; triū piperū drachmas quinquaginta,
reliquorū cuiusq; sexdecim drachmarū in-
uoluit pondus. Debet autē, si haberi potest, auti-
simum Cretense esse. Thymum aut Atticum, aut ex
editis locis & siccat: cuius quicquid lignosum est
circūcidis, coma ipsa vni cum floribus iniicietur.
Eisdem verò & piper, quod longū quidem est, in-
tegrum, nimirumq; foratū: argis vnde & zingiberi.
Quod autē piperis qualitatē tēperat, ac nec ma-
ceratum resoluitur, nec etiam peritulum est, pi-
per id longum vti maxime idoneum est, sic ni-
minè fuerit adulteratum. Nigrum verò nec faxile,
nec rugosum, nec crassū cortice esse, sed maxi-
mum plenissimūq;: quodque nocte album etid
piper cōmendant. Deinde omnibus simul tritis,
& per tenuē cribrū transmissis: mel optimū, cu-
riorisq; desputatū miscetur: id quod debet esse
odoratū, si uinum, acerrimū, dulcissimūq; atq;
crassitudine quadam mediocriter, & quæ suam cō-
tinuitatē tueatur. Hoc igitur medicamentū & ante
cibum, & post, & cum vniuerso tubitum rectè dat-
tur, coctilemque pleni mensurā: aequè huius qui-
dem, vt paruis parui, & maximis maximis, ita me-
dis ad p̄sana q̄ præterea etiam zingiberi, quod
ex barbaris adfertur, aceto maceratum. Est ita
vniuersæ herbe radix, a collecta statim in aceti li-
uicta. Extinguitur enim eiusmodi medicamen-
tarum calor: circa ipsas primas venas nec in to-
tum perfertur corpus, veluti aliorū quorūdam;
cuiusmodi est quod diacalaminthem appellat.
Idcirco etiam oxymeli hic vniuersum est, cuius
talis est cōpositio. Cū meli optimo super car-
bones ipsam abundulera, cōcicta in ipsum ace-
ti tantum, vnde gustanti nec cōtinuū nimis, nec
dulce videbitur, ac denuo super prunas coques,
quoad planè vniuersæ amborum qualitates sint.
Hinc ab igni depones, cūq; vti voles, aquam
et miscibes, ita nimirū temperans vti vniuersi.
Quod autem pluribus id cōueniat, vni aceti parui, mel-
lis a quo detracta spuma sit, duplum est miscen-
dum. Pro vniuersa uisusque tum gustu aut natura
plus aut aceti, aut mellis non addicere conuenit,
id esse summoque naturæ convenientissimū oxy-
meli ratum, quod illi vni in cūctissimū est. Cum
aqua verò ita facies oxymeli. Quod triplici opti-
mæ aquæ miscibes meli: dein coque modico
igni, donec spumare desinat. Ac mali quidē mel
multū egerit spumā: quod etiam diutius cōcoqui
debet. Optimum verò vti breuissimum coquere
tempore, ita minimū spumæ evomit. Post verò
dimidio a ceteris diectio, rursus coquendum, donec
qualitatem omnino sit vnitas, nec a ceterum cru-
dum sentiat. Conscitit sane oxymeli, etiam
tribus statim a principio mixtis, ad hunc modū.

*Diuturnis pro-
latis, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

*Cruditatis
vitia, non
esse cruditatis
vitia.*

Apomeli refrigerat.

Mullum ex pluma aqua confus.

Plumam aqua non probat Galenus.

Apomelites est profusum.

Vina quae autem sunt lentiora et si crudioribus commodum. Capparum et amygdalis sunt ad eructationem.

Vinorum genera varia. Vina crudiora ad ueritatem.

Vomitum cur ut videretur per ducere laetudinem copulatur. Vomitus reuocantur ab alto. Vomitus iatri pellentes.

Vomitum quod videretur. Vomitum profusum. Vomitum quod humorem ab alto in corpore habentem digerit, quod

Aceti vni parti, additur mellis duplum, & aqua quadrupli: atque hac ad tertiam vel etiam quartam partem coquantur, spuma interim decantata. Quod si valentius id facere studes, tantundem inuicias aceti, quantum mellis. Apomeli optimum aqua conicitur, bibulamque totaestate refrigerantis vice. Potest verò cui id libet, & ad quam propiussumus affectionem eo comode vti, potissimum ubi coacuit: id quod sepe contingit et, aliis magis, aliis minus, vt potest ex aqua confecto non pluma, sicut multa, sed quilibet. Quamquam potest qui volet, & ex aqua pluma id conficere, ipsamque plumam aqua probatam, id si uiderem: verum neque ipsam proba, & tunc est de teris si accipit, potissimum ad ea que nunc sunt proposita. Quinimo medicoribus etiam accet, quod non omnino incuriosus est confectum. Sanè cura concipiendi in eo est, vt nec super admodum sit viciuosus, coquanturque bene in fontana aqua, quae & pura sit, & dulcis. Oportet enim expresso si fauus melle, carentem in aqua coquere, quoad nulla inde spuma existat. Ergo tum hac vitendum potione est, tum verò ad viciuosius que leuiter accescunt. Natriumque praeterea cibis est, qui citra calorem extenuent, cuiusmodi capparis est, si ex oxy-melae vel oleo sumatur. Quod si crudos illos succos sanis attenuatos speras, vini dabis quod & substantia sit tenue, & colore saluum album: hoc enim ad succi bonitatem, & concoctionem facilius vinum mouet. Sunt verò in Italia, prioris generis Falernam, & Surcinum: posterioris, Sabium & Albanum, & Adrianum. In Asia verò, prioris generis Lesbium, & Aruicum. Secundi Titaczenum, & Arsyicum. At crassa & nigra vina sunt reuocanda. Quod si his adhibere melius habere se sentit, etiam lazure tum hominem debetis, vngeretis, ac molliter fricare. Vt vero primum in vrina hypostasis censetur, tunc frictionem augere, tum ad consuetas exercitationes paulatim reducere. Hoc tempore vnguiculis iis quoque vitandum, quae per halitus euocent. Vomitu autem minime in affectibus id genus vitatis, ne succi reuellantur intro mordaces, qui videlicet carni inhaerent. Quae admodum autem exercitatio, frictio, balneum, fomenta calida, vinctio calefaciens, iracundiaque, humores ab alto reuocant, ita quae refrigerant attinguntque cutim, ad haec tristitia, horroreque a quacunque causa calida frigidaue procedens, nec non omnia quae introitus impetu faciunt, ea inquit a cute ipsa moti humoris ad interna coactant. Haec itaque omnia deuitanda tum sunt, cum idem homo pariter & lasitudinem sentit, & venas habet crudis succis repletas. Nam nec qui extra sunt, recte intro reuocantur: nec qui intras, foras. Imò qui foris sunt, leuiter educendi per halitus sunt. Ergo quibus intras crudi succi copia est, & foris lasitudinis sensus, his hyssopum in melle coquens, nō statim nec primo die, sed in sequentibus dabis: vomitu verò abstinebis, nisi vbi crudos crudi lasitudinis succos euacuatione contineas. At verò si vni cum sensu vicioso, est crudior copia aut alio calore, aut ab immodico motu in corpore habitus sit transmissa, quae quidē si non in venis, sed in solidis animalis partibus haeret, sic sunt ea exhibenda sunt, quae vel

ad cutim vsque suum calorem transfundant: fricandimque largiter oleo quod relaxandi vim habeat, ac potissimum manē, cum surgant a somno. Nam ea frictio concoquit crudum succum, similique corpoream molem animas nutrit. Quiescendum verò diu post haec est. Cedit autē negotiū felicius, si homo exigui cibi pridie sumptus, nec aliud, a carnā bibere, quam tenue vinū, solumque. Post ipsam autem quietem diurnam, modice manubulandum est: ac dein tum denuo multa frictio, tum balneo modice calido, & alimentis quae boni sint succi, vitendum. Quoniam medicamentis eis diacalaminthē audacter dabis: cuius talis est compositio: Accipe calaminthē, pulegiū, petroselinū, scelleos, cuiusque viciuosus si feminis apocumlinum thymi, singulorum vni. liij. Libythalet, vna. xvj. piperis vna. xlvij. Haec omnia vbi electissima fuerint, simul tundenda cribrandisque sunt resui cribro. Tenuis quippe medicamentis in totum corporis habitū maxime digeruntur: veluti & diuerso, crassiora in ventre haerent. Idcirco Dioscoricum medicamentum crassius facere solet, quoties delictare alium per id studet. Minusculum his ita preparatis mel optimū est, cuiose desumpatur. Porro vbi eius erit post magnam frictionem, ante exercitacionem & balneum: potestque etiam cum aliquo cibo mixtum assumi. Post cibum autem nunquam nec hoc medicamentum, nec aliud viliū quod ad distributionem vehementer facit, sumendum est. Licet & sine admixto melle siccum medicamentū reponere, eoque lasius vice vti. Ad ipsorum autem concoctionem ciborum, praestat sane aut medicamentum diatrion pipereton simplex, aut ipsum piper potiori inspersum, aut etiam quod ex sacco melle cydonij edicit medicamentum porrigere. Verum ad ea quae nunc agimus, optimum omnium est, quod conit ex calaminthē. Nam crassa lenius attenuat, & per halitum educit, & vrinam mouet, & muliebria prouocat, estque iucundissimum gustui. Vbi igitur circiter duos vel tres primos dies ita preparatus homo est, exercitacionibus consue ita tradatur, animaduertens prius vniuersis quas iam diximus moris. Nam si omnia comode se habere videntur, plenē exercitandus est. Sin minus, etiam ante medicitacionem desistet, prius dicta victus & modū ratione tractandus, donec postmodum circa exercitia omnibus exsententia se habentibus, ad consuetum victum reuocari iam possulet. Quia verò & acopo quod ex abiete fit, vti expedit his qui in carne & tota corporis mole succos coagulerant, qui aut concoqui desiderant, aut per halitum digeri, apponamus eius compositionem. Igitur abietis pulcherrimum semē, quale circa Septembrem colligitur, conicere oportet in oleum, quolibet anni tempore, vbi prius contritus fuerit. Postea verò si spaciū diu ad minimū quadraginta in ipso oleo relaxante (quale Sabium videtur esse) ma duerit, ipse liquor est percolandus. Conicietur autē in quinq; & viginti olei heminas, eius feminis modius Irahicus. Excolato oleo, quatuor cere libras adiangito: refine vero abietinis tertii vnius librae partē: inicies etiam & pinet refinae tantundem. Quod si harū copia uis sit, eam loco

vitendum si rationem moderandi.

Diacalaminthē confectio.

Tenuis facili digerit, Crassiora in ventre haerent. Porro vbi medicamentum dabitur, crassiora reliqua.

Distributio medicamentum, cuiusmodi crassius facit ad distributionem.

Diacalaminthē medicamentum vti.

Acopo est abiete compositio, cuiusmodi crassius facit ad distributionem.

terebinthina vendum. Coques aut cōmodius
hæc in vase duplici, aut certè igni lento. Medica-
mentum enim hoc aptissimū ad omnē lassitudi-
nem est. Vile etiam est & quod ex populi flori-
bus fit. Est autē id tale: Ex illis enim adluac rōni-
tibus mediocriterq̃ rōntitis, modius Italicus
in quinderim aut viginē libras Sabini olei aut
alterius similis, immittitur, quotidiēq̃ sub sole
feruido simul rotā id dimovebitur, si id fieri li-
ceat. Itaq̃ post binos aut ternos menses potes sō
re expresse habere oleū, quod sine vlla mordica-
tione, nihilo minus quāsi abietinū, per habitum
digerat. Cui tantundē ceræ & refinæ libebit ad-
dere, quantum illi esse adiciendum diximus. Si
q̃b̃ verō humidū id quod exprimitur, crassius vi-
debitur, far fuerit vel quintam partem ceræ adhi-
ci. Sunt qui in duplici vase eleganter id medica-
mentū conficiant. Qui verō celerius id prepara-
re cogitur, hunc necesse est aque vinive quartam
aut quintā partem, ne torreatur, iungere. Atq̃ ad
ea quidē de quibus nunc agitur, vniū aqua est:
vinum verō ad articulares affectus. Ergo & hæc
medicamenta succos quicunq̃ nō crāsī nec lem-
tū carne cutēq̃ resident, evaporant: necnō q̃d
ex chamæmelo fit oleum, tum ipsum solum, tum
ceræ quartā, refinæ duodecimā parte immixta.
Potest etiam & anethinum oleum, aut per se, aut
cum rera & refinā, similiter discutere in halitum.
Preparatur autem in duplici vase, flāq̃ ex ane-
tho viridi, maturōq̃. Iam sampyichinum oleum,
hyeme, & regione frigida, ac tempestate simili,
idoneum medicamentum est. Simili ratione ros-
maris herba, aut betæ albe radix, aut agrestis ca-
cum eris, aut aliter, aut vini albe, efficiantur et-
iam discunt, vbi suas vires iū oleo similis facul-
tatis quæque ipsarum dimiserit. Quod si eorum
singulis, vel rerum solum, vel cum ea refinā in-
ieceris, non solum pulcherrimū, sed etiam quod
in loco bene hæreat vnguentum facies. Abvnde
autē omnino erit, si ceræ quartam partē, refinæ
duodecimā addas. Si verō abietinam simul & pi-
neam refinam iungas, aut cum līs etiā terebin-
thinam, aut si lūx desint, humidā pini resinā, aut
resinā quæ in fictilibus est, aut enā quam fri-
xam appellant, sic quoque medicamentum fere-
ris, quod evaporandi vim habet. Porro vbi præ-
ter vlcerosum sensum, etiam ropia humorū cru-
dorū in toto corpore abvndat, conroquenda,
quidem ipsa cruditas primarum venarum est,
concoquendāq̃ simul & discutienda quæ extre-
mas oblidet corporis partes: semper ipsius cura-
tionis studio in id propensio, quod assigere ma-
gis viderur. Nam si pari noxa ipsi infenserit affec-
tus, respectu æquali curādi sunt: sed ita tamen,
vt inter initia potiores merendū partes ei præ-
stentur, quā primis venis consistit: in fine ve-
rō, ei qui ioxa carne. Medio inter hæc tempore, am-
bæ rationes quālibet miscbēntur. At lassitudo
tensiva, cum vltra exercitacionem incedit, abv-
dantiā indicat, quæ solas animalis partes di-
stendit. Vbi igitur sanguinis reyvduonia gra-
uat, opmū est vel venam runderē, vel scarifica-
re malicolum. Ex his autem quæ in vlceroso affe-
ctu retentissimæ, vbi vniūso succo miscetur, licet
retocuari & de alio quovis, cum solus consti-

terit. Iam verō lassitudo quæ phlegmones sen-
sum infert, si quidem sponte oriatur, subito ac-
cendit vehemēnissimā febrem, nisi missione
sanguinis malo prius fit occursum. Itaq̃ nec cū-
ctari, nec parū detrahre convenit, sed (nisi quid
obstet) ad animi vīg̃ defectum. Optimum verō
fuerit, his eodem die, si fieri possit, detrahre: ac
primū quidem ita mittere expedir, vt animi
defectum homo non adcat: secundo verō, ne
defectū quidem ipse eī formidandus. Quip-
pe, qui priore detractiōe resolutus est, secun-
dam sustinere haud poterit: in hac verō si quid
tale homini incidit, facile reuorabitur. Qui ve-
rō sic affectū sanguinem non miserat, hi si e-
vaserint, vtiq̃e fortunæ beneficio id arreptum fe-
rent. Aestimare autem diligenter oportet, qui
sanguinem snot missuri, iox rhorarēne, dorso, &
lumbis tensio, pulsantēq̃ dolor figatur: an iox ca-
pite potius & collo. His namq̃ affectis, humera-
lem venam diuides, maxime si repletum caput,
& calidum sentiunt: illis verō internam. Si verō
omnino equaliter lassitudo occupat corpus, am-
barum mediam. Ac si ab incisi quidem vena fe-
brile corperit, alterius est ars, nempe curati-
uæ, huius prospicere. Sin autē tum non febricitent,
primo die post incisam venam, aut pñāz cre-
morem, aut sorbinoo ex alica solum dabis. Se-
cundo verō etiā lauare liret cum copioso oleo,
nistrare autē moderatissimē, lactuce, vel cucur-
bitæ, vel pñāz aliquid offerens. Est & alica nō
in vñis. Si cucurbitæ copia nō sit, malua, berag̃,
& lapario, & arripice vtendū. Quod si carnē
quoq̃ gustare velut, fixatiles pūces, vel oniscos
in albo iure (quod anetho, sale, oleo, & porri ex-
guo, in aquam coniectis conficitur) broc elixor
dabis. Vino autē vñsteris ipsos, secundo die
parcet. Tercio verō, si quidem aque potionem
facile toleret, tunc quoq̃ vino abvñebit: si non
ferat, potissimum quidem apomrli dabis. Hoc
si non sit, album & renue vinum offeres, aliq̃ue
pro ratione exhibebis, quæ vt boni sint succi, ita
minimē calcesciant. Cavendum tamen vel maxi-
mē est, ne propter & multū, sed sensim, & pau-
lanim rennāz. Alioq̃e minimē ipse ventricu-
lus poterit tantam ciborū colluvem pro digni-
tate concoquere, ac proinde plurimū crude succi
ei rapitur in vñnerium corporis habitum. Ven-
ter quoque sua ipsius causa nutrimentū suscipit,
vt eo nimirū fruatur. Vbi autem expletus fuerit,
quod reliquū ciborū est, exprimit, pessumq̃ ceu
onus alienum deicit, videlicet ad ipsa iretina. Ab
his verō rursus ad vepas suggerentur, a qui-
bus tandem in vñuicēfā animalis partes diffe-
minatur: vbi alimentum ipsum nadium iam con-
roliquem ternam, alendo corpori assimilatur.
Vnde multæ exantant corpora habitus, nisi resi-
quantur lentē, plurimum excrementorum in to-
to co rongerant, atq̃ ex iis nō leuiter egrotant.
Quoniam autem per lassitudinē quæ phlegmo-
nem repræsenter, vis calide sanguinis congesta
in corporis mole est, venæ autem sectio succos
e vñis emittit, vile est post prorem detractiō-
nem tantisper intermittere, dum aliquid eorum,
qui in corpore sunt humores, renigrare possint
ad yenas. Quod namque quoniam committendum

Lassitudo
quæ phlegmo-
nes sensum in-
fert, curatio per
sanguinis mis-
sionem vsq̃ ad
animi deliqui-
um, admini-
stratur.
Secundo missio
quando fit eodē
die vtendū.

Humenda ve-
na quidē factū
da,
interne vena
in quibus in-
terenda,
Medus quando
aperita vena,
Lassitudi-
nem vñis
vñis vñis

Abi iure con-
positio.

Ventriculus
sua ipsius causa
nutrimentū
suscipit.
Nutrimentū
vñis

Sanguis de-
trahitur pri-
mo & secunda
curatio per
dum sit signū.

non est vt in his maneat, vt pote ex diuisione cor-
ruptum, idcirco detractioem sanguinis etiam
secundo de iteramus aliquando verò & in ter-
tio, vbi videlicet & reuelli, & ex his in alia
transfere visum est conducere.

GALENI PERGAMENTI de sanitate tuenda, lib. V.

Cum hominū naturæ sint numerose, diuer-
sam victus & exercitū rationē postulant,
quæ ex arte quæ valetudinē tuetur peten-
da est. Huius enim beneficio contingit, vt qui ab
ipso ortu imbecillum corpus non fuit sortiti, sen-
sibus illis, ab omnique prius morbo & dolo-
re alieni, ad summam senectutem perveniant.
Ego verò, tamen si nec salubrem corporis statu
ab ortu ipso sibi nactus, nec vitam planè libere
egenti, hac tamen usque arte usus, quod octauum
& vicissim annuum est minimo quidem labora-
ui morbo, nisi fortè diaria febris, ob lassitudinē
aliquando contraxerim alioque licet non mo-
do hanc, sed bubonē etiam assurgere, si quis libe-
ram vitam sit nactus, vacetq; ab utroque genere
exercitiorū, & eo quod in quiete, & eo qd
in qualitate consistit. Ego corpus optime consti-
tutum, ad sui custodiam, tum in exercitationibus,
tum in ponentibus & esculentis, necnon in som-
no, vigiliis, balneis, atq; vniuersis animi actio-
nibus, medium vniuersi excessus, idē in qualitate,
quantitate, & facultate, postulat. Quod si in ali-

quo sit errata, corrigendas errorē est, per contra-
riū excessus viurpanonē. Vt autem corrigendū nō
erres, primū corporis affectus ad vnguem scire
oportet. Deinde omnī eorū quæ priore deles-
ta videris, meminisse. Nam affectus quidē, qd
delictū sit, docebunt: recordatio eorū quæ pri-
us sunt acta, quantum tibi consuevit sit recte du-
cendum, insinuat. Imò verò id quod peccatū est, me-
moria factorū ostendit: & prout corrigetur, ex
præsenium collatione docebit. Vt, exempli gra-
tia, si mollis quāvis pituitas possideat corpus
videatur, primū quidē frictiōnē meminit, & con-
uenit, an molles; & cū pinguitudinē & balnei
leniter tepidis sint adhibere. Ab his vō uocari ad
memoriā debet, an exercitationes tardæ & ex-
iguæ præcesserint. Dein, an potio vberior fuerit.
Mox, an cibos plures, aut natura humidiores ac-
ceperit. Postremū, an multum dormierit. Proxi-
mus molli corporis affectus, est humidus: hoc
differens, qd mollis ipsorum corporum propria
qualitas est: humidus, qui in eo continetur, humo-
rum. Diferentia in tactu: nam humidus affe-
ctus cū madore cutis est: mollis sine hoc: quan-
q; est profecto & molle corpus humidum: his i-
psius patibus non tamen cum molitie necessa-
riū cōiunctus est humidus affectus. Potest namq;
dara care esse, & tamen mador sudore & cor-
poris emitti. Accidit quidē immodice affectus,
habitu rarum durum efficit: indicat autē, aut ei-
bus potione si penuriam, aut vigilas, aut viræ so-
litudinem, aut marum frictiōnem, aut deniq;
exercitationem immodicam. Hæc itaq; conside-
rans, corrigere quonidē errorem poteris, præ-
quam si in auctus, curatu difficalior exadat. Sen-

per autē in emineris, excessum omnem contra-
no excessu emendandum esse. Cui præceptū
corporū dignoscendorū peritiūm addecent;
singulorū remediorū facultates adiungunt, vni-
ueris iam artis quæ corpori hominis tuendo di-
cata est, peritus fueris: cuius opus licet præsentem
sanitatē tueri, & amissam recuperare. Atq; opti-
mum quidem corpus cuiusmodi sit, dictum iam
est. Quod ad huius perfectionē deficit, scireli-
cet tribus id de causis defectus: aut quod statim
in vtero, vniuerso sitū fuit: aut quod qualibet de
causa in non naturalem affectum post concessit;
aut ætatis ratione. Omnia verò corrigenda per
contrarium excessum sunt. Nam senium, frigi-
dum & siccum clim sit, per ea quæ calefaciunt &
humectant, corrigiunt. Talia sunt balneum dol-
cis & calidæ aquæ, vini potio: præterea ex cibis
quicquid humectare calefacereq; sentiant. Quod
pertinet ad exercitationem, frictiōnem, atq; om-
nem motum (qui cibum debet præcedere) scire
licet positam ex parte verum dixisse.

Vi loci, sompni, cibis, de membris sopori.
Nunc hæc iuxta scilicet.

Postulat autem senium, non secus quāvis iuuenē,
corpus, dimouere aliquando. Imū corporū quæ
in florēt ætate sunt, nō desunt qui quietem re-
quirant. Senium verò nemo quieta ex toto po-
stulat: sed neq; exercitiū veliemus. Cui enim ven-
tulo quodam excitari, accendendi calor eorū desi-
derat: vehementiori autē motu deicitur. Cū
igitur senium omne corpus sit frigidum, nec po-
tente stimulo nō sit trahere, atq; id probe con-
sistere, ex edictū nutrim, plurimū frictiōne pingui
adhibita post omnī maturas iocatur: quippe
quæ vitale robur excitet, ac modicè calefaciat,
efficiatq; vt sit distributio nutritum facilius, atq;
nutritio promptior. Quare multos etiam labo-
rantes atrophias, cuiusmodi frictiōne adhibita, fa-
cile parca diebus carne implemus. Frictiō nam-
que ex oleo administrata manē, veluti exercita-
tio quædam sit senibus. Post hanc inambulatio, ge-
statioq; ex senis viribus cōlectata. Etenim exer-
citatio acuta corpus tenuat: contraria crassius red-
dit: multa corpus siccatur: medio cris obestum præ-
stat. Vt exercitationis formæ quæ senibus vi-
les aliens ve sint, tum ex corporis totius affectu,
cōsuetudinē, tum vni ipsi quæ infestant, in-
telligitur. Ex totius corporis affectu nam opi-
mi huius cōgruis, si vti in iuuetute ad veliem-
tissimos quosq; labores maxime idonei est, ita
in senectū hē habet ad omnes mediocres. Quod
verò a medio critate recedit corpus, ad plerūq;
id exercitiorū ineptū est. Quippe vniuersi figu-
re thorax, in his quæ per vocem administratur of-
fenditur. Per ambulatiōnē gracilia crura laxan-
tur de ceterisq; pari iudicio censendum. Quic-
quid autē ex his parum rite ad initio cōditum
est, id exercitando imbecillū redditur. Senibus
verò quæ præcipua ad sanitatem exercitia sunt,
hæc per valēdiores corporis partes sunt obuen-
da. Sed habenda consuetudinis in primis est ratio.
Nam quæ consuevit, vt minime lassantia
quos exerceant, etiā delectat: si vti & diuerso, quæ
insueta sunt, tum displicent, tum verò lassant.
Porro quibus operibus arte opus est, ea ne anti-

Excessus omni-
suario est
excessus ex-
cessus

Defectus de o-
pima consue-
tione, tribus de
causis contin-
et.

Senium siccum
& frigidū, hu-
mectantibus si-
milis & calida-
tionibus corri-
gendum est.

Senium humidum
quoniam ex to-
to postulat: sed
neq; exercitiū
veliemus.

Senium corpora
plurimum sa-
uari plerūq; su-
cūm, post su-
mam maturas
nam adhibita.

Frictiō nam-
que ex oleo ad-
ministrata manē,
veluti exercita-
tio quædam sit
senibus.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Exercitationis
formæ, quæ se-
nibus vires sunt,
vnde sint crura
laxanda.

Severi consuetudine
Laboribus suis
excedenda.

gere quidem senes debent. Senes igitur con-
fueris laboribus exercendi sunt, sed tamen vix
memoria eorum remissa. Tertium quoque dirigit quæ ex
citationis formæ præscribit, ab affectione sum-
rit. Nam quæ conuales morbi, vertigines, gra-
vis ophthalmia, vel auris dolores ex leui occa-
sione male habent, iis inclinato capite, doñdeve,
aut humi volutari, exercitari non expedit: sed
eum ambulatione sepe, tam cursu mediocri, tam
gestatione in vehiculis cura fangatione vti. Si
milis modo quibus aut infantes, auris pater-
eas quæ circa collum aut totum caput consistunt,
fluxiones procombunt, minime quæ caput im-
pleat exercitatione suffinent: sed sunt his omni-
bus quæ per crura gerantur vtilissimi et diuersi;
qui imbecillis sunt, cruribus his superioribus, par-

Exerceri quis
perueniens et
que infirmis
patib. debet

*Inferius partem
dura laborum
non sunt fructus
de.
Fructus proli-
bi daturum p-
curatorem vo-
catus, si duas
vel tres betas
ante accipere
adducta sit.*

Trusa p'acit
picanda esse,
curse exercit

Brachia gra-
ua & pul-
sa & omni-
bus in-
terceda-
tione
quibus vid-

Semel enim in die
 quatuordecim diebus
 tabernaculum expe-
 ditur in unum.

est morbo conualeſcant, in viſtu eſſe cū audiam.
Tutus ergo eſt imbecillo ſeni exquum dareſſe
de, ſicut Antiochus medicus ſoluſ eſt eſſe
re, qui circa tertiam vel ad ſummū quartam ho-
ram, panem cum artico melle ſumebat. Poſt ſexti-
tiam autem, iam exercitatus & lotus, præſtebat me-
dio ceteri, premiū ſiſ ſumptis que alium deſic-
poſt hæc maxime piſcibus, vel quos ſaxales vo-
cant, vel qui in alto mari degunt. Ruſus in ceti-
ta & piſcium viſu ad ſinituſ ſumptis autem aut ſur-
cum muſco, aut æuem exiure ſimulcit: qua quæ-
dem viſus ratione ſenſibus & mirapris omni-
bus integris ad extremū durantiſ. Sciendum au-
tem eſt, vti pueri vinum eſt aduſiſſimū, ita eſſe
quantiſſimū ſenſibus. Eſto autē id eſt hæc que
calidiſſe nature exiſtunt, quælia ſunt in Gre-
cia quidem Ariuſium, & Leſbiuſ, & Myſium: ex
Italiæ verò Falernuſ & Surrentinuſ. Proxima
hi ſunt in Italia quæ Tiburnuſ & Signinuſ,
ambo vetera: quando nouella diu ſtuitur in vi-
tre. Secundo ab hiſ locis ſunt Adriaticuſ & Sabi-
nuſ, & Albanuſ, & Gabianuſ, & Triphinuſ.
præterea omnia Amioza que in Italia naſcuntur,
& circa Neapoliſ & in Tuſcia. Ergo de hiſ mo-
dox antiquitatis bibendum ſenſibus eſt, vti quæ
quibus valentiuſ caput non eſt. Quibus autem
eſt, hiſ & Falernuſ, & Surrentinuſ, & Ariuſium
& Leſbiuſ, & Myſium, & Tmoliteſ, idonea ſunt.
Huc autem dergi omne conſilium debet, vti vi-
num ipſum ſit ſubſtantiæ tenuiſſimū, atq; fulu-
colore: quaniſ pallidum eſt modum etiam exiſti-
Calidiſſimū autem vinuſ, ſi color eſt ſpecieſ,
ſauum: minime vero calidum, albuſ. Que me-
dia inter hæc ſunt, proxt alterviri magis acce-
dunt, ita vinuſ exiſtunt. Viſ digger illud ma-
ximū ſenſibus eſt modum ex viſu accedit, quod
omnia ceterum membra caleſcit: alterum, quod
per vrinæ ſerum ſanguiniſ expurgat. Que om-
nia præſtat tenue ſimul & ſtatu vinuſ. Que ve-
rò ex pallidiſ aut ſtatuſ viniſ ſubſtantiæ pingui-
ſ, fuer, hæc & ſanguiniſ augent, & corpus nutri-
quo ſit vti ea viliſ ſenſibus interdum ſint, vti quæ
quo tempore nec ſerofam humiditatem in ve-
nus habent, & ab liberaliſ deſiderant. Ceteruſ
que duo ſo venter morantur, vti craſſa ſimul &
aſtringentiſ viliſ, eorum fanē nullum aptum eſt
ſeni. Si qua ergo ſenuſ dulcia vino vti & baloe-
velit, vbi nanc comederit, huiſ optimuſ Fa-
ſthianuſ ſenſibus fuerit, aut aliqvid illi ſimile
Poſſunt etiam viniſ ſi vti ſenſibus, que melle con-
diuntur. maxime vbi ſuſpicio eſt gignendi cal-
li in renibus, aut podagra, articuliſ morbo
impetuſ futuriſ. Verum quia obſtetriciſ & cibis
craſſum atq; lentum ſuccum gignentiſ, difficil-
lor curatuſ eſt ea que & viniſ procedit, ideo ca-
uendum ſenſibus eſt multo ſiſce, aut caſei, aut
ouorum, aut cocleiarum, aut bulborum, aut ler-
tiſ, aut ſuiliſ carniſ eſu: multoq; magiſte angu-
larum, aut oſtrearum, aut cartilaginum eorum, aut
ſtrynnorum, aut cetariorum viſum frequentiuſ.
Sed neq; ex carniſbus ceruina, caprinæ, aut bu-
bulaſ eſt viliſ, nō modò ſenſibus, ſed neq; viliſ
rati. Omnia verò iuuenibuſ quidem nō maluiſ eſ-
cibus. Senibuſ tamē, oca eſt eſt modum: atq; ha-
cibiſ multo minus æquua. Hæcina verò ſeniſ

Scia autem
ex partem
hanc esse
Ante hanc qua
visus tuus ra
tione, noscitur
et membra
nobis integras
ad extremam
decem.

Vincet verum
 est autem
 fides. et
 apud
 homines.

made.

Vincum Radice
Eradice Vincum
off. alium
to detinere
idem.
Vincum quod
Mada praefer
finibus.

Vita incerta
de senibus.

Carbo-animatus in vitulis,
fuit crassus,
capillus, & bu-
bula.

Vitiosa esse
placuit.

Vitiosa verò plurima sunt. Eorum autè que per omnes partes similes habent intemperantiam, maxime improbanda sunt; quæ valde habent ipsas intemperantias, ac possunt in frigidam, humilè & ficcas. At eorū quibus inæqualiter se habent corporis partes, illa quidem maxime morbis parent, quorū principis maximè partes contrariè temperantibus affectæ sunt. Mios obnoxar valetudin sunt, quibus ignobiliores partes ita se habent. Afficiunt autem interdum partes id per consensum aliarum, atq; consensu lege. Primum ergo de iis verbis facit, qui equali subintrat temperie, id est ab iis qui præcalidi sunt, auspicias. Dictū sunt alibi à nobis est, nō posse diu in temperiem viri solam perse durare: quid id ipsi sibi ipsi alteram ex necessitate accipiat. Sciendum etiam est, temperiem optimā corpori in solo sentia credere: reliquas autem ætates, hæc etiores existere necnō corporales quidem actiones, præcipuas adesse periculis animales autem, ætate, quæ à potestate ad remissionem vsq; succedat. Nec tamen est hæc ætates annorū numero circūscribere: nisi forte in latitudine quadam. Paterescere quippe incipiunt aliqui, ubi explevit ætas quartumdecimū annum. Quidam vno post ætate, aut etiam amplius. Idem præterea remissionis nōnulli habent statim à trigentesimo annis nōnulli post quatuor & trigentesimū. Ac robur quidem omnibus nunquid, post ipsam summam vigoris ætatem: nō tamen hi, quæ ætatem amittunt, tamen minus hanc quam ætate laudabilem habent. Nam cum iam nōlo sanitatis sit amplius, nō solum vsque ad initium senectutis, verum etiam in ipsa senectute tota (quæ quibusdam naturalis esse morbus videtur) sibi dicuntur homines, sanitate senectutis congruentes: quæ tamen, sanitas absolute non est, cum ætationes in senibus nō sint perinde valide & firmæ, vt in iis qui ætate florescant. Quare horum sanitas, propter ipsam actionum virtutem integra est, & de qua queri non possit: senum sanitas, quæ rationis non vacat. Quamvis enim omnes actiones habet, nullam tamè validam possidet. Porro corpora quæ à prima statim genitura prouenit ad morbos statim sortita sunt, ita sanè ad senectutem nunquam perveniunt: aut si quando pervenerint, vno saltem diutino morbo penitus laborant. Qui autem salutem viuendi rationem ignorant, credibile etiam est, hos citius quam pro natura ratione interire. Sed iam à diis cōvertamur sermonem, qui equaliter per omnes partes, calidius sunt sortiti temperamenti: ceterum in humiditate & siccitate se habet modici. Ac talia quidem corporis natura, ab initio statim magis apparet sana, quæ cum in vtriusq; oppositione est vitiosa. Citius quippe edet dentes, & citius articulatam vocem, ingrederetur citius, & singulis annis ad portioem increcet. Postea verò à delescentia annos compleuerit, exinde ad remissionem vsq; manifestè apparebit calidior, ita vt eo morbus, tum symptomatis quæ à bile oriuntur, facile sit obnoxar. Multus namq; calor dum humorem absumit, siccus reddit temperamentum. At cum flores iam ætas in caliditate sit, nimium composita eorum temperies, calida si-

mul & sicca erit. In talibus autem temperamentis, bile abundare tum palida, tum stans solent. Sunt verò, qui hæc natura sunt, à dierum vsq; adolecentiæ, similiter educandis, qui optimè sunt natura. Si igitur bilis ipsa venter supererempetat, per vomitum expellenda est, post excretionem ad quæ tepida propinquant nam vitiorum vitendum nō est, nisi dūcilem vomitionis aqua. Quispe cuiusmodi quædam natura sunt, quibus vitium dulcoris aquam potibuerint, est concedendum. Præterea etiam magis in temperamentis eorum ab inter calidius fieri etiam sunt, vnde potest est. Quia & exercitarius vitiosus est: non acutis exercitationibus & præcipientibus potest tunc, & mollihus. Sunt etiam omnes qui hōstia sunt, graciliores. Acutis autem exercitationibus exheruant & lentè implent corpus. Sunt verò in ætate impense calido temperamento spati, & apti exercitari prope nō debent: sed abinde hæc sanas facit iam bulatio, balnei, & molli ex oleo frictio. Quos etiam vitiat à quibus balneum, oili in dextra præparatur, ut præ dolore, tensionem vnde aut gratiam sentiant. Item quidam eorum incredulit est, quæ cum oberti sunt reddit ex tali vitia ratione. Amiqui autem vinum inuicem est: album verò & tenue, idoneum. At si quando corruunt quæ dūcilem aqua dextra præcordia sentiant, alio dūcilem aliquid est eorū quæ leuiter obstruenda debent, ab emendandis ab us cibis, qui crassum efficiunt succum: itaq; dūcilem afficitur se sentit. Vile tamen hunc & linguæ in eo macerantur ab initio coma, offere: præterea id tum ex eodem est amio & amara antygalis efficitur: quod etiam bibere ex oxymeliter præstat in eo tempore, quod inter sorgendum à somno, laodiamq; intervient. Non in velle est & medicamentum diacalaminthæ, ex oxymeliter: cuius tamè assiduū vsu cauere oportet in biliosis temperamentis. Porro alimē species, si quis horum temperamentum vertere in melius studet, cōtraria esse intemperantia debet. Ceterū qui versatur in rebus ciuilibus, & multis negotiis distringitur, huic tunus est, vt necenter solum temperamentum mutare, sed similibi nutrimentum assumat. Nutritio siquidem fit, cum is qui nutrit cibis, corpori quod alit, assimilatur. Citius autem assimilatur si cæcæ, & humida humidis. Quibus verò æquale temperamentum est, is quod iucundius fuerit quod edunt, tantū vsq; fit magis nutritio. At qui inæquale temperiem sortiti sunt, is diuersam est, quod à sumptu iucundum est, ab eo quod cuius est particula idoneum. Duplex autè est, idipsum quod cuius cibus natus dicitur. Aliud quippe fecit simplicis qualitates, aliud secundū totam substantiam esse cōueniens dicitur. Atq; illo quidem vinum, dum aut motate intemperiem per oclū volumus, aut seruare, propter negocia. Hoc autem quod tota substantia maxime idoneū est, sola experientia discitur, habere vim non vulgarem, ad mutationē alimentorum in substantiam animalis nutriendi, citius substantia conueniens. Finit autem & qualitatibus cōuenienti, vsq; fit seruare temperamentum studet: humidis naturis humectante cibo

hilem abunda
re in calidior
fuerit tempera
mentum.

hile purgat
mentum in
molesta.

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

Calida est
temperamentum
in præcordia
dūcilem aqua

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

hile in venter
est ab inter
calidius fieri

temperiem
vnde per se diu
durare non
possit.

temperiem opti
mam solo ad
loquium acco
dere.

alios corp
non adeo pra
cipuas partes
re emittunt.
propter hanc
vsq; ad decli
nationem.

actus citius
scribi uenero
annorum nos
possit.

robur interi
ni emittit post
viginti ætate.

sanitatis lat
tudo est am
pla.

sanitas sanum
non est sanitas
absoluta.

corpora ab ini
tio possunt con
stare, ac per
venire ad sen
ctam: aut ali
quo semper
morbo teneri.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

calidiori ab
que excessu in
moderatam aut
sensatam tempe
ramento qua
aliqua.

Occupati argu
ere non debent
temperamentum
mutare.

Naturæ sibi, et
naturæ corporis
assimilatur.

Occupati argu
ere non debent
temperamentum
mutare.

Naturæ sibi, et
naturæ corporis
assimilatur.

Occupati argu
ere non debent
temperamentum
mutare.

Naturæ sibi, et
naturæ corporis
assimilatur.

Occupati argu
ere non debent
temperamentum
mutare.

Naturæ sibi, et
naturæ corporis
assimilatur.

Occupati argu
ere non debent
temperamentum
mutare.

Naturæ sibi, et
naturæ corporis
assimilatur.

Occupati argu
ere non debent
temperamentum
mutare.

Naturæ sibi, et
naturæ corporis
assimilatur.

Occupati argu
ere non debent
temperamentum
mutare.

Naturæ sibi, et
naturæ corporis
assimilatur.

Occupati argu
ere non debent
temperamentum
mutare.

Naturæ sibi, et
naturæ corporis
assimilatur.

Calidus & frigido temperamento, aut semper contraria exhibenda.

cibo maximè quadrante: sicca verò eo qui ficit: fin alterare placet, contrarius. In eo verò qui est in calido frigido ve ad intemperiam lapsus, contraria dare semper expedit: cum efficaciores, quàm quæ ex siccitate & humiditate consistunt, eiusmodi intemperies sunt, faciliq; simulibus nutrimentis in morbosam intemperantiam abeunt. At si siccius quodvis membrum efficiat, nihil manifestè lardet. Pari modo nec si humidiori suam seruet humiditatem. Evidenti verò argumento tibi ætates sunt. Quæ enim à primâ genitura, adolefcentiam usq; habentur, humidissima vis caro est.

Stiles partes esse admodum fortis, hinc modica capacitas, superflua humiditate redundant.

At senilis ætas, tum caro, tum ceteræ partes admodum sicce sunt, licet medice capacitates superflua humiditate impleantur. Corpus itaque iusto calidius, si quidem in primâ constitutione medium siccitatis humiditatisq; habitum obtinuerit, omnino id in incrementi statu siccius efficitur: idq; tum magis, tum celerius, si etiam natura erat siccius. Sed & senectutem idem cinis, quando vix ad summum incrementum pervenerit citius. Hi ergo in præcipui vigoris ætate potissimum hominam victus rationem postulant: quæ humectantibus cibis & balneis, tum exercitatio num, quæ prævalidæ & multæ sunt, abinentia; perficatur. Prodest illis & frigide potio. At Venus sicci temperamenti inimicissima est. Vitandæ quissimè illis sunt exsiccationes, & lassitudines, & sollicitudines, & vigilæ, & motus omnis celer. Iracundia verò, cum biliosas naturas maxi-

Intra dies via.

mè accendat, acutas febres parit. Eatenus autem intendere, remittere speciem victus oportet, quatenus supra naturalem habitum aucta diminutivæ sunt temperamenti elementa. Accutur quidem temperamenti contraria victus ratione: custoditur similis. Sanæ calidioris humidiorisq; nature in puerili ætate, fluxionum, putredinis, & redundantie morbis tentantur maximè. Quo magis & pluribus exercitationibus, & exacta ventris concoctione iugentur. Itaque & ante cibû bis terq; huius lauent, & calides sponte ortus vitantur, maximum inde cõmodum sentient. Quippe huc dirigitur in his consilium, ut ipsas animalis particulas seruemus humidas. Quæ res omnis temperamenti cõmunis est, si modo contraria ratio omnium animantium corpora cinis ad senectutem perducit, ipsa est, cuius culpa omne genitû corpus mortale sit. Nam cum non liceat corpori elusere progressum ad siccitatem, idcirco senescere vobis, corruptump;

Corruptionis necessitas, re de accidit nobis.

est necesse. Etenim ad maximè duritiam, quicquid erit minimè siccitatem. Ac proinde qui maximè humidi sunt, huiusmodi sunt longævi, & sanitate, ubi corpus ad robur pervenit, plus ceteris fruuntur: & reliquis qui parem ætatem valent, vigentes ad extremum usque senium persequuntur. Nam tamen humidum temperamentum in principio deterius sit, tempore tamen reliquis præstantius evadit. Quo magis qui tunc huius corporis suavitati præstitur, excrescentis omnium retentiorum oportet maximam operam navet, tum balneis ante cibû plurimis, tum exercitatione, tum apoplegmatis & purgationibus: sedante omnia cibis boni succi, necnon vini potione, quod vias promoueat.

Longævi maxime esse, qui maxime videntur humidi. Humidum temperamentum in principio deterius, tempore tamen reliquis præstantius evadere.

At frigidiorum temperamentorum tres summe differentie existunt. Nam aut modice se habent in altera opposicione: aut altera qualitas in his exasperat, utque vel siccatas, vel humiditas. Pessimam tamen merito sicca temperatura est: quippe quod temporis spacio fenescentibus accidit, id us statim à principio contingit. Ergo istos humectare calefacere oportebit: quod fiet exercitatione modica, & nutrimento humectante, & calido: præterea calidi vini potione, & somno liberaliore: illud interim providentibus nobis, ut quondam excrementa omnia expellantur. Venere autem adversissimam esse temperamenti sicci, iam diximus. Quare adversari eam his præter siccitatem sunt quoq; frigida, etiam verisimile est. Nam innoxia venus utrumq; est, qui calidi sunt & humidi, tum verò qui genitura à naturaliter abundant. Malum verò & illud frigidum temperamentum est, quod cum humiditate coniungitur: maximèq; est illi fluxionû morbis obiectum. Succurrit huic & balnei abstinencia, & exercitio, & tenuiori victu, & vinctuonibus quæ modice calefaciant. At qui frigidus natura sunt, ceterum in sicci humiditq; temperatura se modice habent, minus q; vel ad sanitatem, vel ad corporis robur tum inepti, quàm qui suori in illis intemperati. Horum igitur excitare, summare, quæ calorem expedit: in humiditatis verò siccatansq; specie, rota victus ratio sit media. Nunc autem de his dicamus, quibus corpus itatus est inculpat, vivunt tamen vitam feruleam, aut ne gociis implicatam: sed ita, ut ad extremum dici libere possint sibi vacare. Salubris & inculpat corpus itatus, in latitudine intelligi debet, sicuti & ipsa sanitas. Cum autem ad extremum dici dico, distinguendum est: circæ solutum ætatum, hyberniumve, an circa quinquagesimam, dies ipsa sit æstimaanda. Romæ siquidem maximi dies ac noctes paulo maiores quinquaginta æquinoctiali bus horis sunt: ceterâ minimi, paulo intra novem. In magna verò Alexandria, maximus dies quatuordecim horarû est, minimus decem. Ergo qui in brevissimis diebus & longissimis noctibus à ministerio sole occidente redit, huicificari per orem, & lauari, & modice dormire licet. Nemo autem tam infelix est forte, qui in maximis, & etiam in minimis diebus, non possit aliquid mediocriter agere. Ceterû qui exercitatio nò assueverint, sed circa frictione pronus perfunctioleo cõsueverint lauari, satis per se transpirabiles, ita ut neq; assidue, nec longo tempore ægroter, q; nò alia cõsuetudine transferendi non sunt: sicut neq; vili aliq; nisi qui iam longo tempore ægrotauerint, aut negrotare autem solent, aut redundantia, aut acci vitio. At si quidè redundantia vitia ægrorent, succo adq; venientem modum sunt vocandi. Sin succori, a vitio, ad meliorem frugè reducantur oportet. Vbi igitur qd exhalat à corpore, minus est us que accipit, redundantia omni morbi solè. Quare prospiciendû est, ut eorum qui eduntur & bibuntur, respectu eorû usq; expellantur, seruetur conveniens mediocritas. Seruabitur sanè is modus, si ponderetur à vobis in vitiis quantitas. Deirahimus porro de nutrimenti vel quantitate, vel qualitate, vel etiam

Temperamentum 17. præmiteretur differencia tres.

Sicca ipsorum esse pessima exigit.

Sicca frigidus temperamento prædicto, quo tunc veloxum di simul & humectandi.

Venus adversatur temperamento sicci & frigidi.

Venus quibus innoxia.

Humidus & frigidus temperamento, quo sit corruptio, vitiis ratione.

Solutum ætatum, hyberniumve, an circa quinquagesimam, dies ipsa sit æstimaanda.

Romæ siquidem maximi dies ac noctes paulo maiores quinquaginta æquinoctiali bus horis sunt: ceterâ minimi, paulo intra novem.

In magna verò Alexandria, maximus dies quatuordecim horarû est, minimus decem.

Ergo qui in brevissimis diebus & longissimis noctibus à ministerio sole occidente redit, huicificari per orem, & lauari, & modice dormire licet.

Nemo autem tam infelix est forte, qui in maximis, & etiam in minimis diebus, non possit aliquid mediocriter agere.

Ceterû qui exercitatio nò assueverint, sed circa frictione pronus perfunctioleo cõsueverint lauari, satis per se transpirabiles, ita ut neq; assidue, nec longo tempore ægroter, q; nò alia cõsuetudine transferendi non sunt: sicut neq; vili aliq; nisi qui iam longo tempore ægrotauerint, aut negrotare autem solent, aut redundantia, aut acci vitio.

At si quidè redundantia vitia ægrorent, succo adq; venientem modum sunt vocandi.

Sin succori, a vitio, ad meliorem frugè reducantur oportet.

Vbi igitur qd exhalat à corpore, minus est us que accipit, redundantia omni morbi solè.

Quare prospiciendû est, ut eorum qui eduntur & bibuntur, respectu eorû usq; expellantur, seruetur conveniens mediocritas.

Servabitur sanè is modus, si ponderetur à vobis in vitiis quantitas.

Deirahimus porro de nutrimenti vel quantitate, vel qualitate, vel etiam

Redundantia morbi, quæ solè erit.

Humidus & frigidus temperamento, quo sit corruptio, vitiis ratione.

Solutum ætatum, hyberniumve, an circa quinquagesimam, dies ipsa sit æstimaanda.

Romæ siquidem maximi dies ac noctes paulo maiores quinquaginta æquinoctiali bus horis sunt: ceterâ minimi, paulo intra novem.

In magna verò Alexandria, maximus dies quatuordecim horarû est, minimus decem.

Ergo qui in brevissimis diebus & longissimis noctibus à ministerio sole occidente redit, huicificari per orem, & lauari, & modice dormire licet.

Nemo autem tam infelix est forte, qui in maximis, & etiam in minimis diebus, non possit aliquid mediocriter agere.

Ceterû qui exercitatio nò assueverint, sed circa frictione pronus perfunctioleo cõsueverint lauari, satis per se transpirabiles, ita ut neq; assidue, nec longo tempore ægroter, q; nò alia cõsuetudine transferendi non sunt: sicut neq; vili aliq; nisi qui iam longo tempore ægrotauerint, aut negrotare autem solent, aut redundantia, aut acci vitio.

At si quidè redundantia vitia ægrorent, succo adq; venientem modum sunt vocandi.

Sin succori, a vitio, ad meliorem frugè reducantur oportet.

Vbi igitur qd exhalat à corpore, minus est us que accipit, redundantia omni morbi solè.

Quare prospiciendû est, ut eorum qui eduntur & bibuntur, respectu eorû usq; expellantur, seruetur conveniens mediocritas.

Servabitur sanè is modus, si ponderetur à vobis in vitiis quantitas.

Deirahimus porro de nutrimenti vel quantitate, vel qualitate, vel etiam

vtraque. Ac quemadmodū de q̄stitate dematur, norum est. De qualitate demitur, cūm vniū maximē alentis cibi loco, aliū exigui nutrimenti apponitur. Qui igitur celeriter notabilem abvādiāntiam acceruant, iis de vtrāq; qui nō celeriter, aut nō notabilem, iis de altera demptum esse fat fuerit, vtra videlicet homo ipse potius voluerit. Qui verō vitiosus congruent succosus, h̄ nōn perinde vt qui redundantiam cōgunt, vni tantūm rei sunt intēni: quandoquidem hec vnica est vl iō riosi fucci species. Cuiq; tamen horum ab iis cibis potioniūq; abstinendum est, quēsum quē ipsi nō congererent vino sum succū facile gignant.

Ac sanē omnibus his cōmune auxiliū est aliū delectio, siue q̄ veneris conueniens mediocritas. Nam quibus inculpara corporis constitutum est, nō debent h̄, veluti sicci sup̄a p̄ceptum est, ā venerit omnino abstinere. An verō semel in die, an bis, sit iis qui eiusmodi vitā agunt, comedisse exvū, cūm ex corporis ipsorū natura, tum ex cōsuetudine, atque adeo tolerantia ad ipsius cōsuetudinis mutationē, indicationis petendæ sunt. Et corū quidem quibus biliosus venter est, primi semper ciborū ac portionū sint, qui aliū delectat.

Nempe ex viniis dulcia, & quæ mollire ventrem possint. Ex cibis olera cū oleo & garo. Viranda verō ex viniis austeria: ex cibis, qui astringūt: nisi si firmandi aui ventris gratia, post totā commotionem exhibeantur. Si quidem astringentū vīas, in iis qui imbecillius os ventris obtinent, nō solum aliū non cōprimat, sed etiam ad deīciendā illam conducit. Quicūq; verō palāstrix exercitū ante balneum sunt vī, priusquā districte nego cīs vitæ se addicerent, iis vt ab ipsis abstinnisse et in cōmodissimū, ita vt similiter vīantur, p̄ter in cōmodum etiam fieri non potest. Ergo apothierapia iis vīendum censeo: & simul de suile carnis modū nonnihil demendū.

Quibus autē ante balneū aliquod effuisse et melius, si quidem in die (gratia exempli) tredecim horarū æquinoctialium, circa horā decimā curaturū sint corpus, h̄ hora quarta solum panē assumāt, id quod ipse sum solitus facere: Modus autem eius sit iis, qui decima hora possūt esse cōcoctus. Sed nec post assumptū ipsum bibendum est. Eorum porro qui repleti cibo se exercent, nō nullis caput repletur vaporibus, & in iecinore aut pōderis, aut distentionis, aut vtriusq; sensus percipitur. Si igitur caput repletum sit, succurrendū ambulātionibus est, sed potissimū ante cibum. Nihil tamen vetat quā post cibū. Ceterūm has quāmaximē lētas esse oportet, illas h̄ celeriores. Si iecur obstructum sit iis quæ in vīis eius harentia expēdiāt. At quæ ob h̄

hepatis meatūs aperiant, eadem tarditati cōcoctiois conducunt. Horū optima sunt oxymeli, & diatrio pepercon, quod nihil non familiare receperit: ad hæc extenuatoriū vīctus. Vbi verō corruptū ciborū in ventre accidit, quibus id quod corrumpitur, per alium descendit, iis maxīmū id compendū ad sanitatem est. Quibus autem nō descendit, h̄ provo candi iis sunt, quæ deiciunt leuiter: enimmodi vīn dioscolinon, vīn cūm pari cum reliquis pōdere nitrum immixtum habet: & quod ex ficis & nucio compo-

nitur, aliqd; quæ ex nucio vel epithymo cōficiūtur. Porro iis qui sic sunt affecti, etiam vomitus ante cibum ex vini dulcis ponone conducit: nec non alui subductio, ex convenienti intervallo, medicamine dialoēs (quod amarum vocant) exhibito. Nam si lōgo tempore vīnosū succum augeri sinas, grauis quīspiam ipsis incidit morbus. Consulendum verō his est, ne quid formidum, aut male olens, aut facile corruptibile nutrimentum accipiant, sed qui boni succi sunt potius eligant. Ars quippe quæ sanitatē tueretur, iis qui sibi paruerint, firmissimam sanitatem promittit: qui verō aut voluprate, aut ambicione vīcti, parere recusant, iis perinde est, ac si omnino nō esset iam verū, iis qui nimis gracies sunt (sōlet enim accidere nonnullis gracillas ob frigidā & siccam intemperantiam, nonnullis propter dīgerentis in corpus, vel nutre nris, vel ambarum facultatū naturalem imbecillitatē) illino ex pice cōducit maximē. Dein vīngentū illud quod dro

pax dicitur. Prodest tamē si ante balneum manu mediocriter molli corpus perfricas, quoad rabore contrahat: deinde dura frīctione, non multa, cutem cogens, densam eam durāmq; efficias. Ab his, si medio cri exercitatio ne vīam, ac lorum, citra longam tamen in solio moram; hominē abstergas, mōxq; vīngas oleo exiguo, & cibum offeras. Quippe studium in his est, vbi bonum sanguinē in corpore molem attraxeris, vt tum uicem vni firmes, tum ne quod attractū est exhalet, prospicias. Ac firmatur quidem nutriendi vīis exarato in carnis calore. Non exhalabit qui in has sanguis attractus est, si oleo vīnteris: vtpote quod emplastrici medicamēti vim habet. Quod si xras non redamat, etiam si frigida lauatione vni cum predictis vīantur, magno fructu cōmodo. Contra verō in iis qui immodicē sunt obesi, minuenda digestio est, augenda verō corporis exhalatio. Minuetur porro digestio, aliquid vīnteris deiectione. Corporis autem exhalatio inaugebitur celerī exercitatione: cuius generis curius est: p̄terea vīngentū iis quæ evaporandi vim habent, fricandū plurimū. Frictio tamen ipsa esse mollis debet, ac quæ laxum corpus efficiat. Quæ ratione p̄p̄ngue quemdam paruo tempore ad mediocritatē carnis redux. Sed & alius quæ totum occupant corpus intemperantias, simili methodo corrigere conuenit: primum, eorum quæ agi expedit, invento scopo: innox meritis quæ ipsā p̄stare queant. At iam ad inæquales corporis status accingor. Sanē inæquales status tristitiam sunt, pro vt compositio corporis nostri est triplex. Vna ex primis elementis; ex quibus constant similes particule. Secunda ex iis quibus similibus, ex quibus instrumentalium compositio consistit. Tertia ab iis, compositio tonus corporis ex ipsis instrumentalibus. Ac facillima quidem, tum ad discernendum, tum ad curandum, tertia est: difficilior secunda: maxime lubrica est prima. Cōmo dius ergo ad tertia incipitur. Quare exordiamur dispositionem ad capite, quod intemperatē naturæ sit, adeo vt multa excrementa gignat, vnde lēdi subiecta membra cōtingat, in quodcūq; excrementa decubuerint. Ac promptissimē quidem in os

& nares

Veniens autem cibum quibus conducit.

Dialoēs.

Arī sanitatis tenenda, in qui sibi parauerint, firmissimam sanitatis promittit. Graciesitas viti.

Graciesitas viti medio.

Nutriendi vīis quæ rationes firmiter. Oleo vīnteris prohibet exhalationem paruum.

Obesi effi cibū digestum in nocidū, æquādam autem ex halationem. Exhalationem molentia.

Inæquales status tristitiam sunt. Compositio corporis triplex.

Nutrimenti quiddam minorā de quantitatē, aut mutandā qualitatē, aut vtriusq; facere dūm sit.

Alii delectio quibus sit auxiliū cōmune.

Nutrimēta vīnteris solutiva, quibus ante alios cibos sint ingerenda.

Astrictrationem vīis in iis qui os ventriculi imbecillū possident, ad aliquid deiciendum conducit. Apothierapia vīis quibus cōueniat.

Exercitia post crapulam, quæ mala soluant producere. Caput plene succurrendum ambulātionibus.

Obstructionis remedia ita ad cōcoctiois faciem. Oxymeli, Diatrio pepercon. Deuocari alio leuiter dioscolinon medicamentū, quod ex huius, & ceteris, & epithymi consistat.

Capitis excre-
menta in quos
partes filia de
cumbere.
Larynx infla-
mentum est
virescens, quod
si recipiat
alimen-
tum, patet a-
dunera.

Tabes vnde gi-
gnatur.

Calida in ven-
triculo fluxio
quid mutetur.
Frigida in ven-
triculo fluxio
quid fiant.

Citta.

Capitis proflin-
dum est, pri-
cipalem ad co-
nsumendum
à deflexio
morsu est
virescens, patet
tenuis.

Capitis labrum
in vultu
calida, frequenter
balneo dulci
aque modica
esse.

Caput vultu
monstrat alicui
resoluto recu-
dam esse.

Arteria quan-
toscenda in ca-
put.

Balem non con-
flueret in vultu
enim, si vultu
enim exhibet

& nāres excrementa impetū faciūt. Decidunt ve-
rō & in oculos: nōnulli autem in aures. Sed ex-
crementi in os decursum, tum gula excipit, tum
aspera arteria, cuius summa pars ori coniūcta,
quæ larynx dicitur, instrumentū est vocis. Ergo
is larynx ab illis quæ caput decidunt madefactū,
principiū quidem raptē vocem facit: proceden-
te verō tempore paruum. Si verō longius etiam
procedit malum, totam admittit: quippe cum la-
rynge, arteria quoque ipsa vni hūmectat. Quod si
actis fluxio sit, nō solum ad vocem ineptæ præ-
dictæ partes fiunt, sed etiam grauissima eis ero-
sio accedit, quæ & palmo simul exviceratur, qui
morbus tabes dicitur. At si in gulam & ventrem
feratur fluxio, quæ quidem frigida est, in frigida
intemperiem corpora mutant: quæ calida, in cali-
dam. Hac verō etiam spacio exulcerat. Verū in-
ter initia appetentia & concoctio proferunt.
At frigida quidem fluxio tarditatem concoctio-
nis & crudelitatem, & acidosis ructus creat. Quod si
etiam corrupta sit, alimentū quoque vertit in cor-
ruptelam. Si verō inferius se noxa recipiat, & ie-
junium, & colon in refectum affligit, tangitque vasa
quæ in mesenterio sunt, per quæ fit in iecur cibū
digestio. Ac nōnullos quidem fastidium vitorū
excipit: alios appetentia canina, aut etiam cibosū
cibi cupiditas, qualis est circa affectus in graui-
dibus. Nec latet vnam quoque, & paritiamia, & para-
lides, & antiaides, & erosiones dentium, & vice-
ra, & in ore putredines, hanc fieri quæ in capi-
te in ipsa decidit, consequi. Sani autem in his
omnibus est, ipsum mali ceu fontem prius tolle-
re, caput firmādo, quā ad ceterā curatio: nos
conuertamus. At si id præ magnitudine natura-
lis intemperantia non licet, saltem illi prospice-
re, ab ipsa scilicet vitæ specie, providentem indica-
tione semper accepta. Quibus igitur ex calida in
temperie caput malè habet, hos frequenter balneo
dulcia aquæ fouere expediat. Calidarum autem
quæ sponte nascuntur, noxius his vias est. Si-
quidem quæ ex his sulfureæ bituminosæque sunt,
ex propterea quod calefaciunt, inimici ceterisq; calido
naturaliter capiti sunt: aluminosæ verō, quoniam
angustos meatūs claudunt. Solis autem his
sponte natis quæ dulces fiunt (si tamen ipsi vten-
dum sit) in citra noxam poterunt. Nam quod
vile etiā aliquid ipsi præstare possunt, hoc dace-
re nō perinde rursus est: quiddā nec calidæ fortasse
forent, si omnis calefacientis medicamentosa vir-
tutis essent expertes: Quibus verō caput vehemen-
ter calidum actumque est, ut præstat æstatis
tempore rosaceo, per vngui, quod ex rosæ in oleū
omphacini salis expertis insectis, componitur. Sūt
capita quæ propter artumque temperamentū in
veneginis & capitis dolore in cadunt: in quibus
etiam incidere ærenas solemus. Sed hoc genus
propositæ artis limites egreditur. Quæ autē ex
numis acuto nervorū sensu (quæ in capite ori, in-
ter alia os etiā ventriculi texunt) frequenter do-
lent, his sanè mederi, propositæ artis officium est.
Potius tamē consiliū est id agere, quod minus hęc
Vltimo modo incidunt, curando ne aut biliosus hu-
mor in ventrem profusus conflatur, aut ætheri-
minis inde expellatur. Atque ut ne profusus quidē con-
flaret consilia eris, si citius cibum exhibeas. Vbi

enim totius corporis biliosus temperamentum
est, necnon imbecillus venter, nisi in corrobore-
tur cibo, defluat in eum quas corpus accumulat
superflus sanies: ex quarū vapore dolores capi-
tis, suffusiones, atque morbi comitiales gignuntur.
Horum itaque omnium vniuersa vicius rano ad frigi-
dus potius, humidusque mutanda est. Quod ad-
tem in ventrē cōstitit, id vomitione ac ventris dis-
tentione expellendū. Stomachus verō cibis quide-
m quondē priusquam bilem cōtrahat firmā-
dus. Purgetur etiā medicamentis ex maiori inter-
uallo, abstinētiā coma, & compositione ex aloē,
quæ picram nominant: quippe hæc quod alimē-
tum in tunica biliofi ventris se recipit, expurgat ab-
stinētiā parum id præstare valente, ut cui vis in-
finitū dererendi astringendū, ac talis, quæ sor-
des tunicarū ventris deiecerit: nō si quid aliud
in eo imbibitū est, foras extrahat expellatque, sicut
aloē. Quæ verō post hanc ventri extrinsecus ad-
moventur vñctiones, et modicæ astringentes sunt:
ut melini, malthichini, & nardinū. Ac æstare
quidē potius melini; hyeme nardinū, vere mā-
stichini fumendū. Est autē opulentiæ mulierib;
& quod præstantius nardino vnguentū sūt, nem-
pe foliatū: præterea quæ spicata vocantur, quæ
ventrem & corroborare possunt, & calefacere. Si ve-
rō nō modō caput calidam sanē transmittit ven-
tri, sed etiam venter ipse calidam intemperie ha-
beat, vñgi refrigerantem potione, tum cibo;
semper vñ cōueniet: atque eam qualitatem in his
pro temporū anni ratione intendere variē, ac re-
mittere: nusquam tamen ad contrariā peruenire.
Ad eundē modū si vtrique pars sit frigida intem-
perie affecta, illis calefacientibus est vtendū: va-
riē tamē ea pro ratione temporū intendenda re-
mitteādū sunt. Porro difficilis cōnexio est, quorū
vis vel in calidum ventrē frigida & pituitosa san-
ies defluit, vel in frigidū calida. Atque harū duarū
alterā semper expertus sum magis ad curandū
rebellem: nempe in quā frigidi pituitosif succi
in calidū decidunt ventrē. Pessimus verō in sita-
tus est, si præter id, homo etiam ea natura sit, vt
neq; alium facile solubilem habeat, nec vomere
ex facili possit. Si verō pituitosus succus in capite
in frigidum naturā ventrem decurrat, facile his
succurritur, si manē aliquid medicaminis diarrhœ-
peperon sumpserint. Sed & piper solum, præci-
piē quod album est, cōminutū, atque aquæ immi-
xtum, bibere his licet. At potio abstinētiā his ad-
versissima est, vt quæ pituitosum succū ipsorum
ventri affigat. Sed neq; aloē valde his conduci,
cōm ei biliosū nārendi humoris facultas sit: eo-
que excitata salubriter est cōpositio quam picram
dicunt, quæ acrimonia calorū eorum quæ in se-
libet, crassos & lenos succos defleat, ac deterē-
get. Verum assidue vñ hoc medicamentum nō
cet, sicut diarrion peperon, aut diacalaminethes.
In totū ergo ad aloē drachmas centū, reliquo-
rum cululgi coniciuntur sex drachmæ, quæ ipsa
quoque sex sunt. Atque hæc est picra quæ Romæ om-
nibus præparat. Ego verō etiā alias duas cōpono:
atque in altera, totū quæ calefaciūt, plus in altera,
minus cōdico. Vtrūque autē fiet, si aloē solius pos-
derit nunc prescripto, aut addamus, aut detraha-
mus viginti drachmas. Ceterū si elingnamini co-

Ventriculū im-
becillū, nisi cor-
roboretur cibo,
resque sanies
excremita ut
parat.

At si ventris
est imbecillus
non solum in
se, sed etiam
in vñgi.

Picram ex aloē
expurgat hūm-
orem album
cibitibus in i-
psum ventricu-
li sanies, &
abstinētiā vig-
nti.

Vñctiones ro-
borant ven-
triculum,
foliatæ vngui
se.

Spicata vngui
se.

Frigida intem-
perantia capi-
tis, quod vñgi
quod modo iu-
cendū.

Status vñgi-
alis possumus
qua.

Diarrion piper-
on piper, ex
aque succurre-
re ventriculo
frigida in quā
pituita deflu-
at: ad caput
sanitatem autē
esse aduer-
sissima: atque
lora valde rē-
se.

Picra vñgi, atque
cōpositio in vñgi.

Atque in altera,
totū quæ calefaciūt,
plus in altera,
minus cōdico.

pia nō fit, ponendū pro eo est optime calidū duplum. At in quibus quidem venter aut frigidus est, aut enī temperatus, ad frigus tamen propensior, ut aptū diopsolūcū est: quod dupliciter cōfici assuevit: ut nempe qui alio sunt adstricta, nitro, quod Berenicarū vocit, cum cumino, ruta, & pipere, pari pōdere admixto: ut verō qui sunt soluta, dimidio. Grauis autē nec facile tractabilis cōplexio est ventris, qui intemperanter calidus sit, cum frigidū capite: quippe ut ventris ab his quæ calorē accendit, offendatur. Ergo in us quilibet sunt affectus, id agēdum, vt prius distices,

dictet gēsis, ut quæ minime calefaciūt, quod genus oxymela esse nouimus. Iam lubrica atq; ad curatiōē difficilis cōnexio est, vbi tales partū affectus coierint, in quibus os ventris imbecillū ac nauoscosum est, sicutur autem venter, lis igitur cōuenit primo loco olera cū oleo & garo, aliaq; quæ ventrē mollire solent, sumere. Post iustū autem cibi modum, aliquid eorū quæ stomachum

roborent, accipere. Ea sunt mala, & pira, & puni ca. Ipse autē qui affligitur, omnibus scorum vsu explorans, quod minime noxiū, tucundū simūq; in venter, eo in quantitate mediocri vta tur. Atq; in totum magis qui ita sunt affectu deiciunt, si quid astringens post cibū sumpserint, q̄ si eo caruerint. Si quidem eorū vsu roborans vē

tricular, natāes succos pellicat ad intestina, quos etiam cōtinuata expulsiōne propellunt. quē admodū ē conuerso, vbi humor aliquis mordax, ad expulsiōē sui circa sedem nos irritat, quē tamen cōhibere propter ciuilia negocia cōactū, ne

que ab his expediti cum expellimus, signum est illum ipsum humorē, cōn uersione factū, alii intus pulsum esse versus superna, vnde sepe numero capnos dolore tentamus. At vbi renes calculi aut topios gignūt, totus vērū labitus grauis est (quæ iniquis cōnexio, æterni maligni tātēdē credit) hi medicamenta & victū quæ extenuare possint, requirūt, ita tamen gradū corpori inimicissima sunt. Ceterū cum interrogaret me quispiam, qui q̄b tales renūm affectus, siculissimi, victus ratione & vsus, in maximam siccitatem inci

derat, quo vitis victus, citra renūm noxam, mēderi quis posset siccitati illi suæ, p̄nsanæ tremorem excogitauī, & pisces tum saxatiles, tum qui in alto mari degunt. Simili ratione & ex volatilibus quæ cumq; simulacra carnē habent, Porro multæ ex mōrānis volucribus tali sunt temperamen

to. Quas nanq; in vrbibus cōclusas humido nūtrimēto impinguntur cappones, aduersissime huius sunt. Optima verō sic affectus caro est, vt ex auiibus, perdecim: proxima atragenarū, & turuprū, & meralarū, & turdorum. Quod si montanarū auium copia nō est, deus quæ in agro viciat, & gregalibus columbis, passeribūq; qui in turribus nidificat, fūmere licebit. Sunt autem in editis locis huiusmodi turres. Ita nanq; & gallinæ, & gallinæcis qui in corte aluntur, vti

licet. Ex lactibus autem, solum asinū est cōcedendū, propterea quod ceteris omnibus est tenuius. Ac breuiter, melia inter extenuantem im puruantēq; sit eorū victus ratio. At si obesus sit quæ calculus infestat, audacter huius tenuis vitæ, quæ in iungio. Eadem & iis qui arthrogium vi

tiis laborant, conuenire p̄cepta censēbis. Scire tamen licet, podagra antidota multū distare a nephritis, nō tantū quod crassos glutinososq; succos attenuent, sed quod etiam calefaciūt & siccant. Nam calculosus, quæ valde calefaciūt, dare nullo modo cōvenit. Iam verō partes quæ læsæ sunt ob deflexionē at capite, nō omnes cōtra

borandæ venter, sed ex tantum, quarum permagnus est vsus: vt oculus, atq; auris. Idcirco decedentibus in has partes excrementa at capite, deriuatio per vicinas partes molienda est, ac ad nāsum potissimum trahēda, quæ in illa decumbūt, idq; per ea quæ iterum tementa moment, atq; eius obstruēdiones apeniunt. Si ad nāsum nō sequuntur, in os ipsum apoplegmatissimas sunt deducendæ. Oculis verō ipsi robur aducies, si siccū collyrio, quod ex Phrygio lapide constat, vtare:

ac sic palpebris specillo inducas, ne oculi mēbra nam intus cōtingas. Ita nanq; mulieres quotidie faciunt, cum siliis oculos granatū edolant. Ad aurium verō robur adhibeas vel glaucium solū super cōtētrū cū acetō, ac mox tepidū: aut collyrium quod diagaucium vocatur, aut diarrhodon, aut corcodēs, aut nardum, aut quod dicitur, aut deniq; solata & spicata vnguentā. Ceterū vbi satis firmate sunt, ita vt nihil iam in has confluat, assidue aliquid instillandum est optimi vnguenti nardum. Porro aurū viciat, Andronis medicamentū, similibūq; medebitur. In

terim tamen aucterē materiam ad nāsum & os oportet. Vt autem ex his quæ at capite defluunt, leduntur nōnulla eorū quæ illi subiecta sunt, sic ex iecinore & renibz, & liene, in alia partes quæ ipsi sunt imbecilliores, morbi incidunt: nā

nūm semper ipso excremento at fortiori ad imbecilliorē partē demissio, donec ad imbecilliam omnī deueniūt. Atq; ad hunc modum, quorū nulla sui cura est, alius alia parte assidue vexatur. Qui verō nihil colligit supervacuum, nec qualitate, nec quantitate, his manent imbecille partes semper in tuto. Iam quod redundat, aut per totum colligitur corpus, diciturque affectus plethora: aut in parte aliqua principē: sed quæ alioquo natura sit imbecillior. Ante omnia tamen

est definiendū, propinque affectū laborer membra: an propter aliud, quod prius ipso sit affectum. Sed extrinsecus enī imbecillie parti nō oportet accedere: plurimū tamen ex vitiosa victus ratione. At credere itaq; magnitudini naturalis infirmitatis membri conuenire, ac tenuiorem quādem victum quam antea, exhibere hominē: nū idēcam exercitacionem iniungere, cauendo ne quod ab externis causis nox inciderat. Postea si ab

his neq; ipse gracilis fiat, neq; imbecillia eius parua affligatur, imitandum eidem victus rationi est. Sin autē aut omnibus membris fiat gracilis, aut male afficiatur quod vitioso est habitus, mutare talem victus rationem debet: vniq; sit affligatur, aut victum hominis in tenuiorem mutabis, aut certo anni tempore purgatione vteris.

Ac alius quidem vna quorūvis purgatio: vere incipere: si in facinoris altera quopq; post hanc, aurū nō est opus. At si sanguinis quidem abundantiam corpus accumulauit, mittendus is est. Sin vitiosum succū, vasculūq; propno ad id medicamēto fue

rit. Quod

Podagra remedia distat a nephritis.

Calculosus molle mēdo distat a valde calefaciente.

Deriuatio per vicinas partes molienda est.

Collyrium faciem ex phrygio lapide constat, vtare: ac sic palpebris specillo inducas.

Andronis medicamentū, similibūq; medebitur.

Andronis medicamentū, similibūq; medebitur.

Andronis medicamentū, similibūq; medebitur.

Andronis medicamentū, similibūq; medebitur.

Andronis medicamentū, similibūq; medebitur.

Andronis medicamentū, similibūq; medebitur.

Andronis medicamentū, similibūq; medebitur.

Andronis medicamentū, similibūq; medebitur.

Andronis medicamentū, similibūq; medebitur.

*Potiones quæ
de vintum.*

rit: Quod si ex tenui victus pars afflicta leuatur, sed corpus maciat, picanone vintum. Porro status corporis totū eū est pessimus, qui genitale semen copiosius calidiusq; gignunt, quod eos ad expulsiōem sui proritat: post quā & vētris os illis resoluatur, & ipsi toto corpore nō solum relaxantur, instēcillib; fiunt, sed etiam sicci, graciles, pallidi, cauisis oculis cōspiciuntur. Quod si propterea quod ex cōcubitu sic veaxat, ab hoc se retrahat, nō modō capitis molestiam, sed sē machi offensionē, fastidiūq; sentiunt, nec ex continentia magnopere iuuantur. Accidunt enim ipsi per oōcturās imagines nō minora incommoda illa, quæ ad cōcubitu fenserunt. Sumere igitur h; debent nōo cibos modō, verum etiam medicamenta quæ semen extinguant: tum verō ex cōcitantionibus vii, quæ supernas tantū partes exerceant: ac deniq; a balneo lumbos totos vngere vnēione aliqua refrigerante, qualis ex omphacino oleo, & rosāceo, & melino cōfocitur. Ipsi autem oleis, nē defluant, ceram adicere poteris. Vbi verō cerarum id in mortario subegeris, cum eo succum aliquem refrigerantem miscebis accuratissimē: videlicet semperuui, aut solani, aut vmbilici Veneris, aut psylla, aut polygoni, aut tribuli, aut portulacæ, aut lactucæ. Porro lacta ramen succū suum non remittit, nisi dum in mortario raudetur, assilum sit humoris quippiā tenuis aquosicis substantiæ, qualis vix immatura est, & rosarum. Quin etiam lini semen si in aqua coquas, refrigerantem cremorē efficit. Ego verō cum ē plebe cuidam consulerem, vt plumbi laminam renibus superponeret, quō nocturno careret Veneris imaginibus, tali præsidio ad iutus postea mihi egit grātas. Alter autem qui plumbi durinam non tulit, ex dictarum herbarum, cum eisq; mollium amerinæ & rutæ foliorum appositione, necnon ex assiduō eius seminis ipsius amerinæ, singulare præsidium sensit. At quæcūq; ex papauerē mandragoræ vnctiones sunt, omnino fugiendæ sunt. Sed neque vt predictis, ita his quop; substratis vtendum est, cum in vigore cōsistunt. Quin rosas experiri quiddam suavi, sensitiq; ex iis substratis leuamen cura vllam renū ooxam. Alios autē, qui vbi cibis boni succi modicē se impleuerunt in corna, postea concubare dormientes, postero die cum satū dormierint, ac surrexerint, iubeo linteo fricari, quoad rubor per cutem appareat: mox aliqua ex oleo fricione modicē vii: tum exiguo interposito tempore panis aliquid fermentatū & in clibano coctū, & puri, ex vino mixto, illis gustandum porrigo: atq; ita ad cōsuetum opus dimittam, magnā huic vilitatem expertus. Non dissimilem roborandi per cibum stomachi rationē, & grammatico cuidam, quod assiduē morbus comunalis vrgebat, suasit ac misicē contulit. Maximē verō in sudicium veni hominis iuandū, vbi didici rum spasmus incidere, cum diuōs a cibo abstinentiesset, magnūq; si dolor interim, iræ interuenisset. Quin etiam haberi eius murebar gracilem: circūcinctū mlin de hac ipsa re, stomachum assiduē bili vrgeri est falsus. Nōnulli itaq; immo dicē veneris vū lēditur. Alij citra noxā vū eius ad sensū vsq; sufficiūt. Verū hac ambo generata

*Semen calidū
copiosiusq; gignit,
ad vī ipsū ad
expulsiōem sui
proritat, qualis
villus ac mōdō ratiū
cōmet.*

*Semen rubellū
est.*

*Linū suum in
aqua coctum,
refrigerantem
cremorē efficit.
Plumbū lami-
nā lumbū ha-
rentem, facit
contra Veneris
nocturnas ma-
gnes.*

*Vulnus ex
papauerē man-
dragoræ vt su-
genda.*

ia. Totum verō quod in medio est, id cum maioris minorib; discrimine, ad magnū hominū numerum se extendit. Ac de his hæcenus. Huic autem cōmentario iam colophonē imponam, vbi medicamen illud descriperō, quod ex malorum succo conficitur, tum ad appetendi vim excitandam, tum ad iuuandam facultatē coëctricem, robūq; conciliandū ventriculo, maximē confereas. Accipies igitur succū malorū cotoneorum; quæ dulciora maiorib; sint, sextariis Romanis duos, quibus mellis optimi tantūdem miscebis; aceti sextariū vnum & semissem. Hæc cum super prunas modicē cōxeris, & spūmū detraixeris, immitte zingiberis vncias tres, pipēris aibi vnciā. Denique in simili igni recoquas, donec mellis crassitudo consistat. Quæ vtiq; crassitudine, stomachica medicamēta parari solent. Hoc porro pharmacū, etiam iis quibus lavandū iecur est, salutare in primis existit. Illud verō latere nō debet, seum id maximē dandum q; mediocri cochiearis modo. Quamquā nec si æquo sit sumptum, quicquam lēdit. Cōmodē quoq; dabitur, etiam si prius pransus quispiam, antequam id sumperit. Maximē tamen tempestiue id duabus horis aut tribus ante cibum obaleris. Quod si id astringere magis volēs, ex succo acerborum cotoneorū conficies ipsum. Licebit autē pipēris zingiberisq; portioni addere, si vti etia detrahēre, atque omnino nihil illorum misce, provis qui tali est medicamine vltus, aut calidum biliosiusq; ventrem fortitur: aut contrā, si gidum atq; refectum pituita: aut deniq; in medio cōstitutum temperamento.

*Medicamētu
ex cyclamēno
sunt & vī
copiosius.*

GALENI PERGAMENTI de vī respīratiōis, lib. vīus.

M

inimē sanē vulgare esse respīratiōis vīum, hinc liquet, quod ea priuati, nē momentum quidem possimus viuere. Ex quo manifestū est, respīratiōē ipsam, ad nullam particularem actiōē, sed dē solam vitam conferre. Cum igitur actiō animæ, vita sit, quæ plurimū a respīratiōe iuuatur: tandū certē vilitatis modum nos ignora re oportet, quandū animæ substantiam (quæ nobis incognita est) ignorauerimus. Coarguitur autē faciē Erasistrati opinio, dicentis, impossibile esse vt cor ex pūmōne aerem transfumat, circa respīratiōis cōhibitionem. Nani si milles qui inspīratiōem faciat, plurimūq; vndique premari orotem, & nihil rursus expirare, appareat certē nihilominus in ipso cor pulsans, hoc est, tum attrahens, tum expellens: suffocatur tamen interim homo idē eodem magis & citius, quod plus inspīrauerit: quod nimirum tunc non substantia, sed qualitate spiritus, cor opus habet. Quare lūius suffocatiōis medela, vnica expīratiō existit: quæ quidem si confertim & cum magno strepitu fiat, valde compresso thorace, & telerato asperæ arteriæ orificio, efflari appellatur. Si igitur ipsum cor substantia tantū egeret spiritus (quod nimirum Erasistratus exillimabat) magis vtiq; ex penuria ipsius, quā ex abvndā in oboritur.

*Respīratiō
priuati, nē mo-
mentum quidem
possimus viuere.*

*Vita est actiō
animæ.*

*Animæ substantia
est nobis
incognita.*

*Suffocatiōis
medela, expī-
ratiō.*

Efflari quod.

lesiones, id quod minimè apparet, cum tunc præcipue affligatur, dum maxime illius copia redundat. Similiter confutatur illorum etiam opinio, qui solius nutritionis ipsius animalis spiritus gratia, nos respirare contendunt, cum suffocatio, respiratio colubita, non propter inopiam nutrimenti animalis spiritus accidit. Adeit siquidem largus tunc in pulmone spiritus: longiusque requiritur tempus ad hoc, ut animal propter inopiam nutritivum spiritus pereat. Etenim substantia animæ, etiam si non vna sit, per omnem tamdiu vitam, ad multum tempus durat. Ergo si non ob substantiæ, relinquatur quod ob qualitatē penuriam, animalia in respiratiois colubitione extinguantur. Quæ igitur ista qualitas sit, inquirendum venit. Porro quandoquidem ubi amphor quim secundum naturam caliditas in locis circa cor & thoracem fuerit collecta, statim, & amplius solito, respirare appetimus: vident utique posius refrigerationis gratia, respiratio fieri. Rursus, si per se ferat in eisdem organis (quemadmodum in magna fame, & ubi quis in magno frigore sit veratus, contingit) non solum non refrigerare eam, quæ in nobis est, caliditatem oportet, sed etiam calfacere, refrigerationis gratia respiratio minimè fieri apparet. Nonnulli tamen huc obiectum occurrentes, infimum calorem semper egere refrigeratione contendunt: verum cum auctus is sit, ampliori: pauciori verò, cum imbecillior est reddidus. Hanc autem controver-
siam diluamus, flammæ exemplo proposito: quod quidem (ut animalia) aëre priuata extinguuntur: quemadmodum indicant cucurbitæ medicinales, vndeque circumposuit. Nec verò tantum si quis cauum quid circumponat flammis, sed in balneis etiam, & solis ardoribus, & frigoribus excellentibus, & vellem enter ventilare, & materiam multitudine obrutæ, sicut & inopia alimentis, similiter exongi videntur. Augmentum autem ac roborantur à moderato frigore, & si moderate ventiles, & cōmoderate alimento nutritæ. Omnes autē flammæ duplici moveri motu videntur: altero à materia ex qua accenduntur, per quem maxime sursum feruntur, & vnde equaque disperguntur: altero iteic contrario, ad sua ipsarum principium, ac veluti radices vergente, per quem confidunt & contrahuntur. Etenim si facis iuxta maximè supernam extremitatem accendere, confestim ad infernam perveniet ignis. Si quidem cum omnis flamma celeritè corrumpatur, ob id necessarium est, velocissimam eius esse generationē. Atqui generatio vniuscuiusque flammæ, est ex subiecta materia accēdi. Corrupti igitur omnis flammæ est necessariū, si aut materia, aut altero motu priuatur. Quippe ex contrariis moribus, quorum alter alterum mutuo excipit & consequitur, alterum sine altero conservari impossibile est. Ob id igitur, moderate frigido ambiente aëre omnis flamma opus habet. Qui enim excellenter calidus est, motum aliterum ipsius immodicè extrā extendendo, frigidus verò alterum immoderate intrā protrudendo, extinguit. Vterque autem à modicè ventilatus, flammam materiam applicat, ut frigidus aer temperatè: supra modum verò moveri, flammæ di-

spargit veluti etiam calidus vehemēter ambiens. At verò moderato, omnium cōservatrix flammæ exsistit. Eodem igitur modo caliditas animalibus insita, materiam vnde accenditur, sanguinem habet: nec non à natura infimum principium motus in vtriusque partem, ita ut altero priuata, etiam reliquo ex necessitate destruitur: & ob id ipsum, siue à respiratioe prohibeatur, siue à sanguine, statim corrumpitur: nam & lucernæ flammæ tolles suffocando, aut omnino oleo priuando. Simile itaque ponito cor funiculo, oleo sanguine alicui organo cauo pulmone: nam circumsus est cordi forinsecus, ad cucurbitæ similitudinem. Verum quo tempore expirat animal, assimilantis potius ipsum cucurbitæ foratè: ubi verò respiratio colubetur, imperforatè & vndeque occlusæ. Quæ in modum itaque cucurbitæ perforata intra se non potest flammam extinguere, respirantiem per ipsum foramen: quæ verò è vestigio est conclusa, cum per suffocationem extinguit: ad eundem modum pulmo arctus & densus, qualis est in respiratioe cohibita, extinguit: perforatus autem & rarus (talis enim existit circa respiratioem) infusam caliditatem cōservat. Tam expiratio ipsa, ad evacuandum id quod veluti fuligo sanguinis est, mirè conducit. Famula quippe, & fumus, & fuligo, & omnis eiusmodi vitæ materis superfluitas, non secus quàm aqua, cōfuevit ignem extinguere. Ex omnibus itaque sunt recipiendi, si qui dicunt, infestis caloribus gratia respirare animalia. Nam & moderatè illum tum ventilari, tum refrigerari expedit: motumque aliquem præfici fuliginoso excremento, quod nascitur ex vitæ sanguinis, explodendo. Itaque ex ventilatioe principii caloribus insitis, & ex moderata refrigeratione, & ex eius quod in ipso veluti fumosum est, defluxione, vnum conservatur caput & summa, cōservatio videlicet naturalis calor. Quare in balneis diuino verantes exoluimur, ac tandem morimur: idly non ob evacuationem ex toto corpore spiritum, sed quod perspiratio tam que per vniuersum corpus, quæ quæ per os fit, offendatur, calidum spiritum attrahens. Nam cum torpedini talis vis insit, ut vel per infusum ipsi rideantem piscatores maxime stupescat: certè mirum esse non debet, si aer etiam ambiens, suum nobis, qualiscunque illa sit, qualitatem cōmunicet. Porro per vehementes excretiones, peris et cōtissimas febres, amplius & frequentius respirare solemus: minus autem & rarius, ubi loci circa cor & pulmonem refrigerati sunt. Valde namque & crebro ventilare parum caliditatem non conuenit. Siquidem maior flamma ampliori aëre, minor pauciori habet opus: omnis tamen flamma eo indiget, ac proinde & calor omnis aliquam ventilationem desiderat. Tam verò pueri, & puberes, plus & crebrius respirant, ob id forte quod plurimum habent calidi iuau (necessariū enim sequitur ad magnitudinem caliditatis, magnitudo & frequentia respiratiois) aut quod eorum spiritus, si quidem à respiratioe nutritur, ampliozem aërem desideret: quem dum conficitur, plurimū fuliginis procreant. Vbi enim amplius alimentū elaboratur, ibi amplior superfluitas gignitur. At senibus, cum

Caliditas a
animantis ma-
teria, est san-
guis.

Pulmonem effi-
medica cucur-
bitula simul.

Respiratioem
confert ad san-
guinem expellens
deum fuliginem.

Respiratioem
fieri in modo cal-
oris aëris gra-
tia.

Balneis diuino
cur non exol-
uamur, morimur
trahunt.

Torpedinis vi-
res.

Respiratio ma-
gis quæ parua
quantitas accen-
dat.

Calor omnis a
aëre ventile.

Pueri quia po-
tiores, et crebrius
respirant.

Animæ substantia
ad multum
tempus durare.

Suffocari ani-
malia ob quali-
tatem penuriam,
dum respiratio
colubetur.

Flamma quæ
moderate
pulsat.

Flamma

Flamma à qui-
bus augustinus,
Flammæ mo-
tu duplici.

Motus flammæ
cum confusio
tum altero si-
ne altero fieri
re, non est pos-
sibile.

Flammæ con-
fusioem egere
moderate frigido
aëre.

Sensibus respi-
ratio est parva
qua est rara.

Respiratio par-
va frequentius
in quibus diffi-
cultas adhibet.

Spiritus anima
li esse aut sub-
stantiam ani-
mae, aut primum
ipsum instru-
mentum.

Spiritus ani-
mae vnde au-
tem tractat.

Spiritus ani-
mae praecepti
natura est in-
spiratio qua
fit per naves.

Caliditatem
moderatā vnde
natura corpori
si maxime ne-
cessaria.

Caliditas ab-
que respiratio-
ne saltem esse
possit.

Respiratio
organica.

Delirium in
difficile febribus
non accedit.

Athronem men-
bris praecepti
si calorem
modico laedi-
t. Constrictio me-
bris in qua an-
sistat.

cum pueris adolescentibusque frigidiores existit, respirationis adest minor, & rara. In calidis praeterea regionibus & naturis, semper editur respiratio maior, & densior: frigidus vero, minor, & rarior. Parum etiam & potenter respirant, qui cibum acciperent & potum, ob septem transuersos arcuationes: sic & praegnantibus. In aqua etiam inter cutem, & in hepate, ventriculi & splenis in inflammationibus, similiter respirant eadem de causa. Iam vero quandoquidem ubi ventriculi & splenis spiritus intra cerebrum vulnerantur, ita tum immobiles ac sensus expertes: dos reddunt: oportet vni quae omnino hunc ipsum spiritum, qui substantiam animae existeret, aut primum spiritus instrumentum. Qui sunt spiritus cunctis necessarii nupri debent, certe rationi est consonum, partim ab aere per inspirationem attracto, partim a sanguinis evaporatione, illi nutritione accedere. Nam si arteriae carones circa collum vinctus contringantur, nihil offenditur animal, quod pertinet ad respirationem, nec non ad motum & sensum. Vnde liquet cerebrum spiritu per eas a corde allato, non valde habere opus. Reliquum itaque est, aut evaporationem ex sanguine ipsi sufficientem existeret, aut per naves inspirationem. Atqui nec evaporationem largam contingere verisimile est, si arteriae laqueo excipiantur: quare necessum est ex inspiratione per naves potissimum alimentum partem animae spiritui accedere: id quod sentit Hippocrates dicens: Principium alimentum spiritus, os, nares, guttur, pulmo, & cetera respiratio. Ex omnibus enim his nutritur nullatenus impeditur. At si quod ex his impediatur, per reliqua tamen ei alimurum suggeritur. Est itaque maxime & vtilis & necessaria animalibus moderata caliditas, praeterquam animalis spiritus, & principalissimus organus, in quo etiam vulnerari corpori. Iure igitur principium naturalis caliditatis, ipsum videlicet cor, respiratione in tantum egens habemus, quantum etiam ipsi moderata caliditate indigemus. Siquidem citra respirationem impossibile est saltem esse caliditatem: proinde totum corpus est transpirabile. Ceterum respiratio moderata omnibus aliis membris per arterias contingit. Cerebro vero & cordi duo praecipua adiacent respiratio organica: illi nares, illi pulmo. Verum ut moueatur pulmo, thorace opus habuit. Quod si etiam sanguis evaporatione ad nutritionem animalis spiritus indiget, id quod credibile est, maximum habuerint sane animalia & hoc a moderata caliditate comodum. Etenim ubi sanguis mellicholicus aut etiam biliosus est, in viscosos vapores soluitur: atque alter ad atram bilem, alter ad animi alienationem perducit: propterea quae in viscosis febribus agri ipsi delirant. Constat moderata caliditas ad vniuersumque membri conferuandam propriam constitutionem, actionemque similiter: quae si nulla re promptius laeditur, quam si calore immodico: quemadmodum & constitutio ipsa, quae in debita temperatura quatuor qualitates constituit. Atque in aliis quidem organis actionum offensae parui momenti est. In his vero quae ad vitam pertinent, magni refert. Postremo in

his quae non solum ad vitam conducunt, sed ad alia etiam rationem principium habent, maxime. Talia autem sunt cor & cerebrum: quorum constitutio rationis lesio vitam damnum infert. Nequit autem contritus ipsorum aliter breui offendi, quin per caliditatem immo deram. Nec ob aliam causam in spiritibus inhibitionibus defungimur vitam: quam ob immoderatam caliditatem. Prima itaque respiratio vtilitas, per inspirationem & expirationem compleuitur: alteram nimirum refrigerantem & ventilentem, alteram expellentem fuliginosam. Secunda vero, quae est nutritio animalis spiritus, per inspirationem denitatur accidit. Quod vero cum cor a pulmone aerem partim quidem ad se attrahat, partim vicinis arteriis transmittat, ipse aer qui expiratur nihil per cloraeperat, quae per inspirationem attrahitur est, in caussae esse videtur, quod vapor quidam omnino expiratur, per copiam portioni spiritui in cor & arterias transumptae.

GAL. DE CAUSIS RESPIRATIONIS LIB. VNVS.



Virespirationis causam efficientem deprehenderit, is demum solus tum offensiois differenter, tum curandi modum cognoscet. Ceterum cum tres sint in genere respiratiois causae, facultas voluntaria, instrumenta voluntarii sensientia, & ad haec vtilitas ipsa, ob quae etiam prioribus causis opus habemus: vtilitas sane principem inter respiratiois causas locum obtinet, vt quod quae innat caloris comoderationem conseruat, & animalis spiritus substantiam alit. Voluntas vero disponit, & velvnd rhythmum coaptat respiratiois actiones. Verum instrumentorum species multitudine & multiformis existit. Quaedam enim ad venturam spiritus destinata sunt, quaedam aerem suscipiant, quaedam ea quae mouentur mouent. Principium itaque est aer, qui per os & nares attrahitur, materia existens vtilitatis respirandi, bisariam partem: cuius altera quidem & minor pars, ad cerebrum per naves suggeritur: altera vero maior, per asperam arteriam ad pulmones illabitur. At qui arteria ipse organum vocis, via est etiam respirationis. Pulmo autem, velvnd profundus ventriculus, destinatus spiritus est: cuius dilatationem & contractionem thorax gubernat, qui muscularis mouetur, & ossibus inarticulatur: praeterea septum transuerfum, respiratiois similiter organum. Circulare enim id est, in centro quidem nervosum, circum circa vero carnosum. Sic etiam in media costarum regionibus duo & viginti musculi numerantur, praeter duos alios primarium costarum, & roridem extremarum. Vltra hunc, tres alii ex collo vtrinque provenientes: deinde qui iuxta spinam porrecti, & cum ipsis, qui circum abdomen consistunt, octo. Actot sane sunt musculi inferuentes respiratiois. Actiones autem singularem, eorum quidem qui in septo transuerso sunt, vt respiratio non inuoluntariam operentur: eorum vero qui iuxta costas consistunt, vt thoracem ex parte dilatent, & contrahant. Qui cum da-

Respirationis
parua vtilitas.

Respirationis
secundaria vtilitas.

Expiratum aer
cur fit per in-
spirationem.

Respirationis
causae esse in-
pouere tres,
vtilitatem res-
pirationis, in-
ter causas illas
obtinere primum
per locum.

Instrumentorum
respirationis
species multi-
plex.

Aer est mate-
ria respiratio-
nis.

Aeris portio
nam ad cere-
brum, alia ad
pulmones illa-
bit.

Arteria aspera
viva.

Pulmonis vna
thoracis vna
septum trans-
uerfum.

Intra costales
musculi duo &
viginti.

Musculi abdo-
minis octo.

Musculi in-
feruentes res-
pirationis, de-
numerantur.

Musculi tho-
racis actiones
particulares.
Musculi intra
costales dupli-
ces.

à pulvisbus verò, ei qui per totum animal est dispersus, conungere: ac velox quidem pulsus, si cum & omnis motus, ab vilitate virgente, facultate intergra, & promptus organis perficiatur (quæ quidē a nobis alibi sunt demonstrata) eadem certe esse possint causæ velocis respirationis. Possibile est tamen esse vilitate sufficienter virgente, etiam si facultas moderatè debilis sit, quandoque motum fieri velocem. Si verò magis debilitetur, usque amplius possibile est velocem actionē fieri, sed pro

veloci densam. Omnis autem densitatis actio: nū vna causa assignatur, prioris videlicet actionis defectus: si quidem illa virgente, coguntur festinare expeditus. Porro sermo à nobis habitus in cōmentariis de pulsibus, respirationē videtur fuisse cōmunis. Primū quidem, nam de omni motu illic differimus in vniuersum. Deinde,

quia parum abest, quia omnis respiratio pulsui proportionē respondeat. Quippe similiter virgile, est composita ex contrariis moribus per cessationes distincta: atque eiusdem vilitatis gratia contingit. Præterea ex partibus eius, inspiratio quidem cōsumis exsistentis pulsus dilatationi, iustam caliditatē refrigerat: expiratio verò, veluti contractio pulsuum, humidum sanguinis excrementū excernit. Quia & ad nutritionē animalis spiritus ambas actiones conferre: & ex cessationibus, eam quidem quæ post dilatationē fit, beneuolentem esse: quæ verò contractionem sequitur, longiorē ambobus cōmunia existunt. Eundem autem causarū concursum magnitudo respirationis, quem vocitas, postulat, nempe vilitatē virgentem, facultatē robur, & promptitudinem organorū. At tarditas paruaque: non omnino opus habent cōtrariis omnibus simul, sed vnum ex ipsis præsertim adesse oportet: plura non est necesse. Quemadmodū igitur si parum sit quæda caliditas, perspicue maior, non tamen velocior: si autem plurius, & maxima & velox & densa inspiratio redditor: eodem modo vbi caliditas secundum naturam imminuta fuerit, alij, causis immotis manentibus, necesse est parum, tardam, & raram inspirationē fieri: sed paulo minus quàm secundum naturam minorem, multo verò tardiorē, plurimū autem rariorē.

Robusta enim existente facultate, non est possibile multo minorē fieri dilatationem. Sed si quæ ad vilitatem pertinet, admodum exoluantur, plurimam cessationē fieri verisimile est: non tamen propterea omnino tardē moueri, modo facultas robusta sit. Porro quæ in aucto calore, eadem & in animæ spiritui ad nutritionem virgente, species erunt respirationis difficilioris, eius videlicet quæ circa * inspirationes consistit.

Quemadmodū enī immoderato fuliginis eadem respiratio difficilior sit: ita etiam circa expirationē efficitur, quæ circa respirationē relate sunt. Veloces quippe erūt, & magnæ & dæ, vbi multa eiusmodi superfluitas collecta fuerit: tardæ autē & paræ & raræ, circa actiones cōtrarias. An igitur sic ratio possit, reduciatur autē aliquid eorū quæ ex videri apparēt? Ego sanè omnia hæc circa ætates, regiones, vniuersas cōditiones ætatis ambiculis, exercita denique & morbos, maximè sensentia repetio. Vbi. n. abundat caliditas, ve-

locet, magnas, & densas videtur esse inspirationes fieri: vbi rursus frigiditas, contrarias, nempe tardas, paruas, & raras. At verò quibus animalis spiritus evacuatur, & ob id citius nutritione labent opus, hi non solum valde, sed & citè & dense inspirant: quibus nihil vacuatur, hi contrariū illis habent inspirationis speciem. Si verò ambo concurrant, & calor augmētū, & spiritus cōsumptio, hi omnīū maximam, & velocissimam, & densissimam inspirationē faciunt: & maximè si ambo fuerint aucta vehementer: quemadmodum vbi ambo fuerint admodum imminuta, minimam, tardissimam, & rarissimam sunt inspirationes. Ipsa enim expirationis species, si quidem multum sit offit superfluitas collecta fuerit, maxima, velocissima, & densissima erit: Si verò paucissima penitus fuerit superfluitas, minimam, tardissimam, rarissimamque. Etenim ex ætate omnes quæ in augmento sunt: magnam, velocem, & densam facere inspirationem verumus: quæ verò decreverunt, taram, parvam, & tardam, propterea quod illis caliditas amplior, his longè minor existit: & illis quidem animalis spiritus substantiam cum corpore coaugeri est necesse, his verò cōtrahere. Iam verò eadē in ætatibus quidem cōtrahitur, ob insti caloris robur, atque adeo ob ipsam augmentū, maxima humorū copia absumitur: in decrecentibus autē, quantum necesse est: ad ipsam vitam duntaxat, vtpote quæ neque augescit amplius, & iam sunt perfrigeratæ: mento sanè illis velox, magna & densa: his vice versâ, per omnia cōtraria editur expiratio. Quemadmodū verò secundum ætates, ita & iuxta tempora, & regiones, & omnes ambien-

tis cōditiones, tum pulsus cum respirationibus, tum respirationes cum pulsibus proportionem habent: in caliditate quidem ad magnitudinē, velocitatē, & densitatem, mutatur: in frigida verò, cōtrario modo. Quin etiam in exercitiis improbiis (quod in eis augeatur quidem caliditas, absistatur autē animalis spiritus) valde, velociter, & dense respirare solemus: quiescentes verò, parū, tardè, rarèque: quando quidem sic marcescit caliditas, spiritus autē neque in torpore, aut omnino modicè absumitur. Ex balneis enī, calida quidem, velocem, magnam, & densam faciūt respirationē: frigida verò, contrariā. Potro in somnis, magnitudine & velocitate motus, expiratio inspirationē excellit: quando quod tororū cōsumptio priores & concotiones maximè tum perficiunt. Vnde verisimile est, coaccuari in illis plurimū fuliginosū extremum. At per affectus febiles, maximè vbi circa aliquod respirationis organū, aut circa cor, maxima caloris copia est collecta, omnis respiratio magna, velox, & densa redditur. In quibus verò perfrigeratus est calor, cōtraria profertur. Atque his etiam, vti aliis omnibus, pulsus & respiratio proportionē habere videtur. Neutrū namque ipsorū in totū perire est possibile, quidū vixerit animal: est interdū ob paritatem nonnullis perisse putari. Hoc autē discernere est inter respirationē & pulsū: quod illi quidē, cum sit animalis opus, volūtas possit coercere, ac proinde in varias species mutare, vel si vilitas bona sit, & facultas integra, & organa respirationis ad operandū præparata.

Expiratio siue propter caliditatem diffinitur: inspiratio siue propter caliditatem diffinitur.

Augmentum & decrementum inspirationis.

Augmentum & decrementum inspirationis.

Augmentum & decrementum inspirationis.

Augmentum & decrementum inspirationis.

Augmentum & decrementum inspirationis.

Augmentum & decrementum inspirationis.

Augmentum & decrementum inspirationis.

*Pulsus est natus
solum ab illo.*

*Respiratio in
flammata tho-
racis.*

in illis

*Difficultas ab so-
lutione arteriarum
producta quae-
ritur.*

*Spiritus in-
qualiter, quon-
iam non
sunt.*

in illis

*Tumores præter
naturam rari-
tatem spiritum
transversum,
parum, velo-
cem, & densum
faciunt spiritum.*

simia: pulsus autē, vrpote existēs opus vitale, nec
supprimi, nec variari possit, quandiu tres illi cau-
sae inculpabiles conspirant in vnum: Ob idque
circa inflammatas partes dolor vehemens ob ar-
teriarum motū oritur, quod in nostra manu nō
sit motum facere magnitudine minorē, aut velo-
citate tardiorē. Thorax itaq; vnum ex respira-
tionis organis, quod quidem respiratio motus
voluntarius existit, ad simulandū eū crumē mo-
uebitur. Quamobrem si fit inflammatus, & ad mō-
tum cogatur, tardius multo q̄ oportebit, dilata-
bitur, ac proinde cum respiratione difficili, ani-
mal in discrimen suffocationis perducet. Cetera
ne suffocet, de hōre actiones edit, nō amplius
tantum cessans, quantum solet tunc secundum
naturam haberet. Quamobrem tunc est necesse
totam respirationē fieri parvam, tardam, & den-
sam, multoq; sanē minorem, q̄ par est, nō autem
ita multo tardiorē. Dolor quippe nō adeo gra-
uiter vexat thoracem, ob motus velocitatem, si-
cuti ob magnitudinem dilatationis. Quod si so-
lus dolor thoracis particulas affligat, manente
calore cordis intra naturae terminos, tunc mo-
tus thoracis manifestē tardior reddetur. Si verō
ardor quidam in ipso corde oboritur, veloci-
tas quidem minime exoluitur, aufertur autē hic
etiam multū de magnitudine, pro qua densitas
generatur, ob vrgentē vtilitātē. At quae ob solū
ardorem contingit dyspnœa, ea magnū & velo-
cem & densum spiritum efficit. Ob idq; magni-
tudine tantum & velocitate, ab ea quae propter
dolorem solū orta est, distinguitur. Quae verō
ex ambabus causis cōiunctis generatur, ab ea
quidem quae ob ardorem fit, sola paruitate dif-
fert: ab ea autem quae propter dolorem, sola ve-
locitate. Ceterum difficultas respirandi ob perfrige-
rationem naturalis caloris, paruum, tardum,
& rarum spiritū reddit: cum aliarum nulli simul
tarditas & raritas accidat. At quantum in defecti-
bus & excessibus caliditatis, ipsa respiratio
species à rhythmo naturae excedat, tantum etiam
cum pulsibus cōmuniter & eodem modo habet.
Differt autem ab illis, in eis quae ob dolorificos
organorū affectus accidunt. Nam reliquae affec-
tiones instrumentorū, quae citra dolorem per
obstructiones, aut durities, aut compressiones,
aut omnino coarctationes quasdam fiunt, cō-
similes variationes in vtriusq; actionibus, anima-
lis & vitalibus faciūt. Quippe in id genus affec-
tibus, parvus & velox, & densus spiritus redditur
circa pulsus & respirationes, necnon iniqua-
lis, quae vel praecipua earum affectionū est nota.
Ac parvus quidem tunc spiritus agitur, propterea
quod ob angustiam fuceptionorū instrumentorū,
paucior q̄ oportet attrahitur: densus autem,
quia nō expletur vorū vtilitatis: atq; ob ean-
dem causam densus. Vt autem quae respiratoris
instrumentis sunt propria cōmemorem, tumores
praeter naturam, qui circa ventrē, hepar, sple-
nem, colon, hisq; cōiunctas partes consistunt,
ob septi transversī coarctationem, paruum & ve-
locem & densum faciūt spiritum. Iuxta eundem
modum & aqua inter cutem laborantibus, & ge-
rentibus veterum, & sic quae supra modum ci-
bo expleuerunt, & qui prominētem ventrem ha-

bent, huiusmodi sit respirationis species. In or-
thopnœa etiam (quae erectae ceruicē spiratio est,
sitis collectus viscidus & crassus humoribus circa
asperas pulmonis arterias) & similiter vbi circa
pulmonē aliquid induratur, aut tuberculū gigni-
tur premeus atq; coarctans ipsam arteriam aspe-
ram, parvus, densus, veloxq; spiritus redditur.
Ad eundē modū si in thorace tuberculū tale cōsti-
terit, parvus & densus & velox spiritus generabi-
tur: occupante nimirum tumore praeter naturam,
pulmonis regionē, in quā dilatare extendeba-
tur. Perinde autē est, ad hoc vt compressus pul-
mo nō possit sufficere attrahere, siue thora-
x totus angustus reddatur in affectu quocūq;, si
ue in media regio occupetur à quibusdā praeter na-
turā corpusculis, siue ipse etiam pulmo induretur,
aut obturetur, aut in tumescat, vel vti in peripneū-
monia virtus cōtingit. Vna enim in his omnibus
cōiuncta est causa, ob quā parua inspiratio red-
ditur, coarctatio videlicet asperae arteriae. Ceterū
parua tamen inspirationis densitas & veloci-
tas sequitur, si faculta robusta fuerit. At cum in-
tra pulmonē affectus ipse consistit, q̄vis thorax
distendi plurimū possit, parū tamen inspiret: ita
etiam vbi intermedie ipsorū organorū regiones
faciat occupat. Vbi verō rotus thorax aut for-
tibus, aut alter parvus & angustus redditur, tūc
distentionē parua efficiens, pulmōni causa est
velocis inspirationis: quem admodū & septum
transversū, quādo ab aliqua mole maxima infer-
nam regionē opprimatur. Porro suppuratorum
affectus, q̄vis saepe ex pleuritide oriatur, his proxi-
mis relatis annumeratur, quae videlicet iuxta
pulmonē coarctationē citra dolorem faciendū,
parus reddunt inspirationē. Quomodo igitur
haec respiratoriorū organorū vitia citra dolorem
consistunt, ab iis quae cum dolore fiunt distin-
guentur, si & parvus & densus vtriusq; similiter
spiritus reddatur: Mōtus velocitatis. In affectibus
siquidē dolorificis modice respirant & densē, nō
tamen velociter, nisi fortē enī febri adsit. Quae
praesente, licet iuxta paruitatē & velocitatē respi-
rent similiter, tamen densitudine distinguuntur,
quippe non modice densitudo ipsi spiritus: id qd
nō evenit illis, qui ob solam coarctationē instru-
mentorū difficultate respirant. Quin & expiratio
febriliterbus maior similisq; calidior est: quod nō
cōtingit illis, qui ob coarctationē parum & densē
expirant. Verum in doloribus organorū respira-
tionis, minimē quidem ob affectionē ipsam, sed
ob actionis facultatē, quae animalis existit, spiritus
parvus & densus redditur. At species difficul-
tatis respirandi, quae ad coarctationē pulmonis
cōsequatur, nihil opus habet facultate ad sui ge-
nerationem. Perfricuum igitur est, q̄ amplius in
magna thoracis motibus dolore vexantur par-
tes quae in vētre consistūt, minus verō in paruis:
& ob id parvus & dēsus erit spiritus, nō solum in
plenitudo, sed & quibus stomachum, aut ven-
trem, aut hepar, aut splenem, aut pectoris, aut
intestina, aut praecordiorū musculos, dolorifica
affectio infestat: cum nimirum ea omnia parim
appensa sint, partim agnata respiratoris orga-
nus, atq; ad eorum motū moneantur, ac proinde
offendantur in respirationibus. Quare illis etiā

*Orthopnœa
quod sit, & vo-
da signatur.*

*Inspiratio
paruitatē den-
sitatis & veloci-
tatis sequitur, si
facultas robu-
sta fuerit.*

*Empyema red-
dit paruum in-
spirationem.*

*Mōtus, veloci-
tatem distinguat
affectus dolori-
ficus organorū
respirationis,
ab iis quae citra
dolorem susci-
piant.*

*Expiratio fe-
briliterbus qua-
lior.*

*Spiritus par-
vus & densus,
quibus se per ve-
nit affectibus.*

Respiratio enim proinde dicitur, quia currit, ut siam dolor affligat animal.
Tolus fere est asinus.
Asinus parum & deus, dolens exultat fignum.

Alienatio motus obliuiscitur animalium, etiam in quibus postea differunt & magnas obliuiscunt.

Alienatio motus currit & maiorem spiritum tollunt.

Spiritus quoque in diffinitione organorum sita est, semper proportionem respiciat, quibus pro natura de se habent.

In quibus sita est difficultas, tot iam numero quatuor, sed deinde similes expirandi.

Inspiratio enim expiratio collata.

Respirationem duri in aequali.

non vulgaris providentia inest, ut ne gravior dolore affligatur animal. Quod verò ad pulmonem spectat, parum abest quin omnino sensus sit expertus: itaque libet pronum clare iam nobis in videri, parum & densum spiritum signum esse doloris, non modò respiratoriarum particulari, sed etiam aliarum omnium, quæ cum respirationis organis cōmouentur. Ignor naturales facultates omnes, semper necessarias sibi operibus valcant, & nunquam torpent, aut negligentes sunt: quæ verò sub voluntatis potestate cadunt, ex sepe, ubi voluntas ipsa circa alias actiones destituta fuerit, negligentius perficiuntur. Quare qui animi alienatione laborant, animalium actio num obliuiscuntur: quas omnes, ut longo interposito tempore faciat, sic confertim & magnas: Ceterò si quis minus quam oportet bibat, non ad dies tantum, sed ad integros menses durare possit: in verò minus quod par sit respirare, nec minimam diei partem durare queat. Proinde respirationis vitia in expleta in iis qui cōmoti sunt mente, sollicitè ad actiones excitat: quibus sanè maximis, totū illud recuperat, quo per cessatio nis tempus fuit defraudata. Atque ita non raro modò, sed magnus alienatorum mente spiritus reddi tur, tantò quàm cōuenit maior, quanto videlicet: contra quàm in potu contingit: multo enim rarius, paulò verò plus bibunt. Porro ubi secundum naturæ se habent organa, quantitas spiritus semper est ipsorum diffinitionibus similis: aut cōm præter naturā fuerint dispositi: nam possibile aliquando est plurimū diffendi thoracē, verò ob cōactionē pulmonis, aut ob aliam causam, parum inspirari aeris externi. Neque igitur ad affectionē omnī spiritalium instrumentorum proportionē, sed solidam asperarū arteriarū, inspirationes sunt. Sufficit autem ad dignoscenda omnia huc, inspicere quantitas aeris inspiratur, & quantitas per expirationem reddatur: * Ex enim cōtractiones thoracis circa abdominis musculorū cōactionem, nunquam magnam possunt facere expirationē. Quæ verò illorū etiam impulsu fiunt, quæque efflationes existunt, magnitudinis sunt officina. Ut autem ad compositas respirandi difficultates veniamus, cum aliqua sit magna inspiratio, & aliqua velox, finitque contrariæ his parua & tarda, necessum est quatuor fieri omnes inspirandi compositas difficultates: parnam videlicet & tardam, magnam & velocem, parnam & tardam, parnam & velocem: tōndemque similiter expirationes. In cessatibus verò impossibile est cōpositam respirandi difficultatem speciem fieri, cum vna tantum in eis oppositio habeatur, sive raritatem & densitatem consistens. At verò ipsis motibus mutuo inter se collatis, inspiratione dico cum expiratione, species quædam erunt consonantiae rationis respirationis. Possibile est enim inspiratio nem fieri magnā, expirationem autem parnam: aut vice verā, parnam inspirationē, & expirationem magnam: aut vtriusque parnam, aut vtriusque magnam: sic & velocem, aut tardam vtriusque: aut alteram velocem, alteram tardam. Quin & inaequalis est aliqua respiratio, quemadmodum & pulsus, tum circa motuū cōiunctiones, tum circa motū

vnū. Similiter & ordinata & inordinata fieri respiratione potest, perinde ac pulsus. Et sanè quos differetias inaequalium pulsuum, tum circa vnū motū, tum circa plures consistentiū existunt, tot etiam reperitur respirationum. Et enim si inspiratio aut expiratio varietur, siue ex tarditate in velocitate, siue ex velocitate in tarditate motu transiente, cōpositam siue inaequalem ipsam actionē dicemus. Similiter si cessatio aliqua interceperit, seu citive alterutrum motum, siue inspirationem, siue expirationē, cōpositam etiam esse dicemus: tum eam quæ interrupta est, vtrā tandem ea existat. Aliquando autem, licet raro, est visum in vno eodemque homine simul intercepti vtriusque, nimirum & collecta in arteriis asperis tanta humorum colluie, quæ suffocare animal possit, ob plenitudinē perniciosam, aut peripneumoniā, aut denique suppurationē non expurgatam. Quemadmodum etiam ob arteriarum lætium obstruiones compressionesque, interdum pulsui inaequalitas gignitur. Ob facultatis præterea inaequalitatem, quæ vna vice non potest ipsam actionem perficere, ut in pulsu, sic etiam in respiratione, est quando inaequalitas cernitur: hoc tamē interiecto discrimine, quod ad ipsam sanè respirationem, quandoquidem actio animalis exiit, plurimum ipsa voluntas confert: nihil autem ad pulsuum motus, quod hāc facultate vitali proficiantur. Vbi igitur voluntas stitit ad actionem cōducit, ut in pulsu inaequalitatem, eadem prænotio affectionis est in vniuersis hominibus. Vbi verò aut totum, aut plurimū confert, ut in ipsa respiratione, ibi amplius mores ergi expendere oportet. Sed quemadmodum differetia facultatum efficientium actiones, tum circa pulsus, tum circa respirationes, differetias prænotiones facit: sic etiam circa ipsam organorum naturā, quædam iudicationis alteratio erit. Pulsus enim per læues arterias, respiratio verò tum per asperas, tum per musculosum genus perficitur. Primum siquidem animalis facultas mouet musculos ad respirationis generationem: huius rationem: qui tandem pulmones cōmouet, quorū pars asperæ arteriæ existunt, in quas aer qui inspiratur, illabitur. Quemadmodum igitur harum cōactiones totam respirationē sepe inaequalem reddunt, sic & musculorum aberrantes motus & inordinati. Atque illarum quidem, ut reprocularum spiritus: horum verò, ut organorū motionis est noxa. Ceterum cōactiones in arteriis asperis, tumores præter naturam declarant eos. Porro affectusque simul & aberrantes motus musculorum existunt, convulsionesque, concussiones, atque tremores, ob quos nimirum respiratio inaequalis reddetur. Omnium itaque respiratoriarum inaequalitatum, aut asperarum arteriarū cōactionem, aut thoracis musculorū aberrantem motum, aut facultatis ipsam efficientis debilitatē, in causa est. Musculorū igitur genus proprium & priuatum destinatum respirationibus est, præter pulsuum rationē. Præterea facultas quidem respiratoria arbitriū, voluntatem permittit: est vitalis autē facultas, nullū dominiū superiorem agnoscit, sed prorsus libera & iuta. Quin etiam eximū quid ad inaequalitatis generationē

Respiratio vtriusque nota, inordinata.
Respiratio vtriusque nota, inordinata.
Respiratio vtriusque nota, inordinata.

Respiratio vtriusque nota, inordinata.
Respiratio vtriusque nota, inordinata.
Respiratio vtriusque nota, inordinata.

Respiratio inaequalis vtriusque nota, inordinata.
Respiratio inaequalis vtriusque nota, inordinata.
Respiratio inaequalis vtriusque nota, inordinata.

Mores ergi quando exponit.
Mores ergi quando exponit.
Mores ergi quando exponit.

Pulsus per læues arterias fit.
Pulsus per læues arterias fit.
Pulsus per læues arterias fit.

Respiratio per asperas arterias & musculos.
Respiratio per asperas arterias & musculos.
Respiratio per asperas arterias & musculos.

Musculorū affectiones & aberrantes motus.
Musculorū affectiones & aberrantes motus.
Musculorū affectiones & aberrantes motus.

Respiratio inaequalis vtriusque nota, inordinata.
Respiratio inaequalis vtriusque nota, inordinata.
Respiratio inaequalis vtriusque nota, inordinata.

Respiratio vtriusque nota, inordinata.
Respiratio vtriusque nota, inordinata.
Respiratio vtriusque nota, inordinata.

respirationis organum, ipsius tumor cōprimat, nihil maximus sit, & caput illius occupet, haud quidem sufficiens est vt respirandi difficultatem ex deirio inductam superet, spiritū paruum & densum reddens. Quandoquidem opus est dolore ipsū consistere circa aliquam partē, quæ iuxta respirationem mouetur: aut aliquod ex organis respiratorijs coarctari, vt paruum & densus spiritus fiat.

GALENI PERGAMENI
de difficultate respirationis liber
tertius.

REST autem Hippocrates rationalis diuisione vsus, sexto populari morborum libro duas oppositiones difficultis respirationis inter se complicans, eam scilicet quæ secundum magnitudinē & paruitatē est, illi quæ secundum raritatem & densitatē, quatuor in vniuersum fecit cōiugationes: vnam videlicet, magnā & raram: secundam, paruum & raram: tertiam, magnā simul & densam, quartā, paruum & densam. Quibus etiam adiecit ibidem, & reliquas duas cōiugationes, quæ ex collatione inspirationis cum expiratione oriuntur: vtpote magnam inspirationē & expirationē paruum. Inspirationem exiguum, & magnā expirationē. Dux siquidem oppositiones inter se complicatæ, quatuor coniugationes efficiunt. Porro qui methodicē vult diuidere, in primis expendat oportet, qualis naturæ existat, quod diuidendū venit. Quod si simplex esse videatur, quæ iuxta substantiā ipsius rationē sunt, quot sint, & quæ, ac qualia, considerandum. Si verō compositū, vtique, aut singulas eius partes diuidere expediat: totum autē, ex modo compositionis. Igitur dictio Hippocratis ira habet: Spiritus paruus densus, magnus rarus, paruus rarus, magni densi, extra magnus intra paruus, intra magnus extra paruus, alius extendens, alius vrgens, dupla intra reuocatio veluti super inspirantibus, calidus, frigidus. Quod itaq; ex spiritus intra & extra meatu, totius respirationis actio composita sit, quodq; altera eius pars inspiratio, altera expiratio appellatur, ignorat nemo. Quod verō nullius alterius rei, q̃ moris, propria sunt velocitas atq; tarditas, iam est a nobis expositū. Ceterū magnitudo & paruitas, vt motus propria sunt, sic omnino inseparabilia existunt ab eo, quod per localem distantiam fertur: ob idq; iuxta vtriusq; respirationis partem dux differentes oppositiones erunt: altera iuxta velocitatem ac tarditatem, altera iuxta magnitudinē & paruitatem. Est autem & alia oppositio iuxta densitatem & raritatem consistens: quæ quidem nō tanq̃ motui, sed tanq̃ alui rei ex ipso distinctis consistat, incit respirationi. Quare in his tribus oppositionū generibus omnes respirationis differentias esse necesse est. In velocitate quidem & tarditate, propterea quod hæc propria, & ab omni motu inseparabilia sunt. In magnitudine & paruitate, quod per distantiam organa respirationis mouantur. Densitas autem & raritas (quæ tertia oppositio est) neutrius proprium ac primariū respirationis partū proprium

aut inseparabile existit, verū totius respirationis pars sit per accidens: quādoquidem ex duobus cōtrariis motibus quærit distinctus consistat. Hæc itaq; sunt primæ differentie totius respirationis. Ceterum cum respiratio res sit, quæ & facere aliquid, & pati possit, aliud vtrius fuerit differentiarum genus in ipsa, vtrius videlicet parte æqualiter inæqualiterq; perfectā: aliudq; rursum ipsius totius vt compositæ, partibus inter se mutuo collatis. Hæc cum ita habeant, sciendum prius quatuor differentias difficultis respirationis, in proposita Hippocratis diuisione assignatas, totius respirationis esse, cum ad neutrius eius partem raritas densitasq; pertineat. Similiter etiam sequentes duas: nam & in his dux totius respirationis partes mutuo inter se conferuntur. Quæ verō deinceps aliter dux sequuntur, vbi ait: Alius extendens, alius vrgens (quibus tardus & velocus pulsus significatur) eas sanē alterius ipsius respirationis partis proprias, maximèq; substantiales, putandū est. Tarditas namq; & velocitas ab omni motu inseparabilia sunt. Quod postea deinceps habetur, Dupla intro reuocatio, veluti super inspirationibus, inæqualem inspirationē ostendit. Inquirenda est autē eadem oppositio & in expiratione, quam ego omisissimū puto a transcribentibus, potius quā ab ipso Hippocrate. Addebat præterea & optimè differentias prædictas, calidum frigidumq; spiritū. Quāq; certē in Prænotionum libro, horum trium, densi, & magni, & frigidi tantum spiritus mentionē, talis dictio nō videtur: Spiritus densus exuens, dolorē, aut calorem effert, necnō in locis supra septem transuersum significat. Magnus autē & per multum tempus, delirium ostendit. Frigidus verō ex naribus & ore prodiens, valde iam perniciosus est. Reliquas autem differentias subicit, tum propter breuitatē veteribus familiarissimā, tum propter aliquid animi, quæ ipsimet erat genuina Hippocrati. Demōstratū enim a nobis est, q̃ grauis sit semper luc vir, vt qui ea quæ alius medicis nota sunt, prætereat, veluti quæ a nemine eorū quæ arte ingenuè exercent, ignorari queant: quæ verō talibus sunt ignota, omnia diligenter, similiterq; perspicue exponat. Merito itaq; differentias densitatis, vt quæ medicis esse ignote non possint, vna summa comprehensas exposuit, diuicent: Spiritus densus, dolorē, aut maximū incensum significat, in locis supra septem transuersum: tanq̃ sanē, posuerat nos intelligere, quæ cum paruitate quidem, dolorem significet: cum magnitudine verō, incensum inexpressibile partium supra diaphragmā, quod inmodicæ caliditatis partū quæ intra id sunt, respirationē in magnitudinem & densitatem augere nō possint. In plenitudine itaq; & peripneumoniis, anginiq; & orthopneis, densus sit ac paruus spiritus. Imo verū etiam si pleuritis nō addit, solus autem dolor costas infestet, spiritus densus & paruus reditur. In vniuersum autē, siue tumor quis sit premeus coarctansq; quodcunq; respiratoriū organum, siue dolor cuncta quancunq; partem, sic appropinquante respiratorijs organis, vt ipsi motus simul moueatur, densus ac paruus ipse spiritus erit. At calore maximo in respiratorijs organis co-

Respirationis
totius quædam
sunt differentie.

Respirationis
difficilis quæ
tam magis
notat.

Methodicē diui
sionē quæ sit
consideranda.

spiritum frigidū, per ex naribus prodiens, admodū perniciōsus est. Armentatū se. Vt vtriusq; familiarissimū. Hippocratis gratias.

Spiritus densus
quid significat.

Respirationis
differentias om
nes in tribus op
positionibus, cum
probandi.

Spiritus paruum & densum in quibus accidit.

*spiritus densus
fimus & ma-
gnus quando
redditur.*

*Organum respi-
rationis dicitur
aliquis, cui per
nasas, sed creditur
magis spiritui.*

*Febris calidi-
tas multum den-
sum spiritum
reddere.*

*Peripneumonici
spiritum parum
parum & den-
sum.*

*Orthopneumia
quod continet
spiritum.*

*Orthopneumia la-
borans est ut
spiritus re-
lla.*

*Respirationem
parum & den-
sum utriusque
spiritus respi-
rationis respi-
rari.*

nis coaceruato, spiritus densus simul & magnus agetur: id quod indicat in omnibus exvrenibus febribus eū conspicuū. Quare ignorandum non est Hippocratem, densum quidem & parū, dolori: spiritū autem densum & magnū, incendio caliditatis tribuisse. Quemadmodū enim dolentibus cruribus, progredi multū non possumus, eodem modo ubi aliquod organū ex his quæ inter respirandum mouentur, doluerit, parum respirare cogimur, & citius desisterē cupimus: 9 sic citius a dolore immanes reddamur. Ceterū quanto citius quā oportuit, motus respiratōis cohibetur, tantō ipsum animal defectuosius est inspiratione recreatū. Quemadmodum igitur si quis pauciores cibos, quā sit ex vīu, accipiat, hic statim aliorū ciborū opus habebit: sic si quis minus quā expedire sit, inspirauerit, hic citius inspiratione indigebit: quæ occasione spiritū densū cōtingit: id quod etiam sentiens Hippocrates in libro de Vitiis ratione in acutis morbis, ait: Spiritū intrā retentum, prohibet quidem spiritū intrō ferri, cogitque eum citō expiari. Porro iuxta copiam eius quæ inspiratur, substantiæ, oportet magnitudinē ipsius respirationis metiri. Reliqui autem Hippocrates exemplum difficilis respirationis ortē a dolore, quod multis locis iam ipse dixerit, actiones organorū a dolore impediti, quodq; illius cognitiō oppidō q̄ facilis sit. Nec verō tantū a dolore & retento spiritū, omni densitas respirationis potest, sed vel maxime etiā ab incendio febrilis caliditatis: cuius quidem est multū densūq; spiritum reddere. Magnus spiritus, quantitate circa singulas iudicatur respirationes: multum verō, possibile est aliquando ex multis paruis coaceruari: ut videre est in pleuritidis, qui cū magnū quidem spiritū semel ducere ob dolorem nō possunt, quāvis aërē largiori ob febrem opus habeant, continuatē tamen actionē, quāle multitudinem spiritus magnis respirationibus colligunt. Quod enim paræ magnæ, hoc multæ paræ præstant. Similiter in peripneumonicis multo est opus spiritu, verū ob coarctationē locorum parum inspiratur: quare densitas iacturam paræ inspirationis restituit. Quod autē in orthopneumia paruum & densum ob coarctationem fiat spiritus, haud scio an quisquam ignoret. Ceterum omnes qui ob talem coarctationem sufficenter inspirare nō possunt, stertorosam faciunt respirationem, & in suspiratione discurrunt veniunt, si decumbant: ob id tū totum thoracē, tū collum, eos rectū habere oportet, cū non paruum auxilium ipsis ex huiusmodi figura accedat. Quippe ampliora similēq; longiora sic fiunt omnia respirationis organa, partim quidem per rectam figuram in directam extenta, partim vero minus in sese cōdicere prohibita. Iam verō relicta etiam parua simul & rara respiratione, Hippocrates frigide memuit, quod nimirū nō alia sit parua simul & rara, alia verō frigida. Nam 30 cū magna & densa ex immoderato calore collectio in organo respiratorio gignatur, necessariō certē parua & rara (quæ illius contraria existit) his ipsis organo perfrigeratio oriatur. Si quidem calida respiratio, cuius similiter meminit,

eadem est cum densa & magna, sub quā videlicet cōprehenditur. Etenim spiritus frigidus, omnino paruus & rarus est: densum autē & magnū indicare incendii organorū respirationis, minime sanē quis dixerit, nisi & ipse etiam esset calidus. Solum verō frigidam expirationē dixit esse perniciosam Hippocrates, mortisq; nunciū, quod perfrigerati respiratorii organo planē sit perniciosum, cū nimirū inter eas sit cor frustum, iuxta caloris sons & principii. At vehementer illorum caliditas, aut dolor, aut desipientia, nō omnino sunt pernicioſa, licet nō sint extra periculum. Nam si facili respiratio valde magnā vim ad saluam habere putanda est, in omnibus acutis morbis, qui cum febribus sunt, & intra quadraginta dies iudicantur (quale documentū nobis reliquit Hippocrates) vtriusque respirationis difficultates minime vacabunt periculo. Verum quæ iam morientibus accidunt, ut videlicet ipsa expiratione frigida, ea nullū magnū momentū in prænotionibus habent. Est enim bonorū medicorū opus, non quæ iam idiotis apparent, præſagire, sed quæ ipsos latent, & cū nihil mali exger habere putetur, cernuntur. At frigida spiratio Hippocrates meminit, ut omnes respirandi difficultates complecteretur, & quod etiam magna simul & densa ipsa opposita existeret. Porro in Prænotionū libro nihil de inæquali respirationis difficultate scripsit nobis Hippocrates, quandoquidem propositū illi erat in prænotionibus solum ea quæ verē acutorum morborū propria sunt, recensere: quæ verō diuturnis propria essent relinquere. Quare rationabiliter etiam illic inæqualem respirationis difficultatem, ex alio morborū genere, consulsorio videlicet, procedentem, omisit. Acuti autē sunt morbi, qui omnino cum febribus cōtinentibus sunt: ut pleuritis, peripneumonia, plirenitis, ac febris æstivans. Nec meminit in prænotionibus de iis respirandi difficultatibus, in quibus aut sola inspiratio, aut sola exspiratio est magna: sicuti nec velocis, nec tardæ respirationis: quod ad quinq; iam dictas difficultates respirationis differentias hæc omnes reduci possunt. Iam verō exspiratio rara simul & magna (id quod etiam docuit Hippocrates) continuatur oscitationum & signum & causa medicatoria existit. Nam cū oscitatio continua fiat ob vaporosum quendam crassūq; spiritū in genere nasiculorū contentum, certē exspiratio quæ rara est & magna, eū quidē signū, ut affectiois in contrarium mutare: causa vero medicatoria, quod contrariorū sint cōtraria remedia. Etenim per talem expirationē spiritus diutius cohibetur, quæ ratione singularis sanatur, videlicet aliena evacuando, eadem etiam mediis oscitationibus poterit. Quemadmodū autem ipsa detentio spiritus superflui excernere potest, sic respiratio continua, ventillare simul potest & excalescere perfrigerata: exuſum eorum & signū, & causa facilius. Iuxta hanc igitur rationē etiam in secundo Morborū populari consiliū Hippocrates, ut iis qui perfrigerati essent, excandescant in duceremus, & reuocandi caloris, et sanguinis in vasa subter cuticulam colligendi gratia: tanq̄ sanē innatū calorem excitare queat excandescant.

Expiratio frigida quæ mortis nuncia.
Cor frigidum calidum fuit & peripneumonia.

Spiratio facili, ad salutem magnam vim habuit.

Medici optimi morbum quod sit.

Acuti morbi sunt, qui omnino cum febribus continentibus sunt.

Expiratio rara simul & magna continuatur cum ipsa oscitatione atq; multā existit.
Oscitatio est ita causa, contrariorū sunt contraria remedia.

Spiratio continua remedia remedia, sicuti perfrigerata, & excalescere refrigerata.
Refrigerata per se excandescant.
Excandescant innotum calorem reuocant, et densorem reddunt respirationem.

que quidem quod densior etiam omnino reddat respirationem, nemo ignorat. Vtemur itaque ipsa in refrigeratis, decoloratis, gracilibusque, non tamen perpetuis, sed ex intervallis, & opportunitate temporibus, ne videlicet facultate valde laxemus. Verumtamen vero quod Hippocrates ait, spiritum frigidum ex naribus & ore prodeuntem, valde perniciosum existere, id in morbis acutis intelligendum est. In aliis autem morbis, qui contra febrem consistunt, sæpe frigiditas totum animalis haberi apprehendit. & accidit quidem neque huius extrinsecus periculum, non tamen penitus perniciosum. Ex his enim est strangulatio vteri, omnesque spiritus interceptiones, quæ mulieribus quidem assidue, viduis præsertim, accidunt: rari autem aliquando & viris. In huiusmodi enim omnibus affectibus, præ multitudine materię frigide, innatus calor opprimitur, ad similitudinem illius, quæ suffocatur mulis humidis lignis obstruitur. Quare enim accendere quandoque possibile est hanc, ubi materiam exasperaverit. Aliquando tamen consumpta materia, necessarii etiam & ipsa extinguuntur: quare in iis qui per acutos morbos sic expirant, nulla spes salutis relinquatur.

Quod autem in spiritibus interceptionibus non omnino respiratio perierit, licet minimus rarissimisque spiritus per illas trahatur, hinc cognoscitur manifestissime, quod si aut pili, aut tenuissimi lana, ægri prædentes naribus, illam moveri percipiunt. Atque in affectibus suis id genus omnibus spiritus densius, causa similesque signis salubre existit: quemadmodum continetur observationi, exploratio rara simul & magna. At verò anhelosa respiratio, quæ & densum spiritum facit, & thoracem nimis distendit, oritur aliquo idem quidem in affectibus multa inspiratione indigentibus. Fit tamen interdum à cursu, aut ab alio quovis exercitio improbo. Eiusmodi etiam spiritus accidit in omnibus ardentibus febribus: & quando obstratio, aut compressio, aut coarctatio, instrumenta respirationis infestat. In vniuersum autem, quod aut tumor, aut dolor quispili, in partibus iuxta illa consistit, parvus & densus necessarii spiritus ducitur. Porro spiritum impense densatum, anhelatione consuevit vocare Hippocrates: quæ admodum & sublimem eum, qui parvus simul & densus fuerit, qualis in anginis percipitur. At obsecrum spiritus aut esse tabescens multum, sicut & non parientibus. Etenim non parientes mulieres (sunt autem hæc omnino quæ non probe purgantur) maximæ à spiritibus interceptionibus, apprehenduntur: perinde ut illæ, quæ diu sunt orbatæ suis viris. Quare spiritus qui conspiciat & insignes non sunt, eos obsecuros nominat. Ac sermo de respiratione difficili suum iam hic finem sortiatur.

GALeni PERGAMENI

de pulsum vsv, lib. vnu.

On esse eundem vsum pulsum & respirationis, contra quam medici existimant, certe rationibus huius quispili consistere possit. Primum: nam respirationem si cui adamas, illico morietur. At pulsa si complures particulas priues, non magno opere laxas. Quippe si vel arterias quæ

per inguina descendunt ad crura, vel quæ per alas feruntur ad manus, laqueo compleri velis, vniuersas quidem, quæ in iis artibus sunt, arterias pulsu priuabis: non tam arduus ipsis aut mori admetas voluntariis, totum sensum. At si nervos funiculo religes, immoratur prius, insensibilisque extempro reddes particulas. Debet itaque & arterie, vbi similiter nervis essent affectæ, quod singulis membris antea consuevit vtile, id ipsum protinus præstare desistere. Ad hæc si ipsas quæ in collo sunt arterias vinculo exceptis, nullis evidentem noxam animali attuleris: tamen si cor cum cerebro, princeps scilicet instrumentum actionis vitalium, cum principe animalium, cõnectant. Si igitur cum sint læsæ arterie, nihil tamen officient, cõstat vni & eodem valentes sunt, nihil eas cõferre. At si obiciamus illi qui arteriarum vsum sic negligit, nos maxime præ sagire ex pulsu: id mihi me quidem fieri ut ex causis id genus, quæ plurimum habet momentum, sed vt ex opportunis signis, responsum dabit: vt si quis morietur ex incuria vnguibz nigricantibus coniecerit. Cor si quidem principis viscus existere, ex quo omnes arterie oriuntur: & promde eas eundem cum illo motu seruare, offenditque similiter, atque ita non exiguus rei indices esse possit. At maior medicus atque philosophus pars, inde eundem vniuersus motus esse vsum existimant, quod vterque similes interdum ex causis mutationes accipiant. Nam & qui exercetur, & qui in balneo lauitur, & qui aliter quovis modo exaltatur, cor non modo respirationem celeriori frequentioremque ac maiorem cõfuerit fieri, sed pulsum etiam pari modo mutatum. Præterea qui algent, aliterque quolibet modo perfrigerati sunt, horum sicut respiratione rarior, tardior, ac minor visitur, ita & pulsus. Similiter qui vrennibus prehenfi sunt febribus, vt maxime & celeriter densi sumque respirant, sic etiam maxime, densissimæ, & velocissimæ, ius pulsant arterie.

Quod si ab immodica repletione pulsus sentiantur maiores, respirationes minores, ne id quidem sermone hunc reddat ambiguum. Quippe minor etiam respiratio quàm pulsus: idcirco habent, quod angustus transverso eorum septo superest locus. Ceterum quanto minori, tanto hunc & crebrior habent: scilicet respirandi paruitatem, assidue iatis opes penitant. Id eodem tantumdem minor simul & frequentior respiratio potest, quantum maior simul atque infrequentior. Dicimus autem hoc loco rarior pulsum eum qui cõmissioni succedit, non vni cum eo qui cõmissionem præcedit comparantes (quippe quo est frequentior) sed ad respirationis speciem referentes. Igitur si respiratio parium pulsu modo, isdem ex causis mutatur, non tamen pariem nominam, eum perit, asserit, licet ubique hinc etiam colligere opposita: nempe tum ambos motus à natura eiusdem vsus gratia esse datos, tum non eiusdem: id quod esse impossibile. Itaque nobis investigandum est, qua parte altera rationum claudet, ipso respirationis vsu pro norma nobis proposito. Qui quidem duplex existit: nempe alter qui maior est, insiti caloris custodia: alter qui minor, animalis spiritus nutritio: in quorum vtroque ex attractio per nates spiritus

Nervi sunt intertempus partes in quas prohibetur delatus: non tamen per se.

Præcipuum est pulsum ius.

Cor est arteriarum principium.

Pulsus est respirationis vnde colligitur: sed vni cum motu vni.

Respiratio est pulsum vnde est causa materiam vni respirationis.

Respirationem immodica repletio pulsus sentiantur maiores, respirationes autem minores atque crebriores.

Respirationis vsus est duplex: vni insiti calorem custodire, alter animalis spiritus nutritio.

Spiritus frigidus est ex naribus effluens, in acutis tantum morbis esse perniciosum admodum.

Respirationem non omnino perierit: per interceptionem spiritus quæ ratione cognoscitur.

Anhelosa respiratio vnde perfrigeratur.

Spiritus parvus et densus quod ducatur. Anhelatio. Sublimis spiritus.

Spiritus obscurus, quibus sit malum. Spiritus interceptionibus perit ac videtur frigidissime accipit.

Pulsus est respirationis vnde est duplex: vni insiti calorem custodire, alter animalis spiritus nutritio.



*Cerebrum sui
respiratione
per arteri.*

*Respiratio ple-
ni sunt & car-
tidibus ad ha-
sum cerebri con-
voluta.*

*Spiritus ani-
malis rebra-
rit per visus
et motus.*

*Corpus vivit
fieri esse sub-
transpirabile
& fluibile.*

*Flamma rectio
que illis sub in-
combustio medi-
camentis.*

*Respiratio sola,
cordis calori
non tenet.*

*Calorem con-
duci reliqua
partes per par-
tes duplex.*

*Calorem & cor-
dis membrum
etiam denotari
per venas.*

*Respiratio
et pulsus est
in idem.*

*Pulsus est de-
bitus calorem
nando gratia.*

accedere cerebro vtilitatem dicimus. Id quod vi-
deri possit in causa, ut caronidibus arteriis (quæ
sanguine calido & halituoso plene, cum per-
tinent ad cerebrum, antequam duram eius mem-
bram transierint, iuxta ipsius cerebri basin
multis ac variis plexibus involuta, admirandum
quoddam recte faciunt: ut quædammodum
in vasorum retium revolutionibus semen, atque
in voluminibus intestinorum chylus, ita in eo
sanguis ille diutius hærere, perfectius elabo-
retur, adstricti simul animali qui in cerebro est spi-
ritui, alimentum copiosum) vinculo excipitur,
per diem integrum animal sine noxa perduret.
Quæquam certe si cogitar tale animal curre-
re, diu quidem id facit probe, postea vero fæ-
lile, atque elanguescit: cum nimis ille animalis
spiritus, quo pleni sunt ventriculi cerebri, asiduè
nutritur potu, absumaturque per volntra-
ritas, præcipueque violentas motiones. Ceterum
si animal quiescat, quævis commercium cum cor-
de sit interceptum cerebro, satisfacere tamen ei
diu tutus ille renicularis potest, cum animalis spi-
ritui in motum voluntarium minime tum con-
sumptio. Mirum autem esse non debet, si aliquis
partis haud omnino pereat caliditas, etiam si ar-
teriz illius vinculo constringatur. Nam cum
totum corpus sit sibi conspirabile & fluxile, cer-
te si non per arterias, at per alia, & præcipue per
venas, propter eam quæ est vna in alteram
transitum, in omni partem deferretur à cor-
de calor aliquis. Nec vero simile est, aut insu-
per caloris principium pati, aut aliquid eorum quæ
ab illo calore accipiunt. Id siquidem semper ter-
nare est opus, ut quod tum cæteris pulsandi vim
præstet, tum ea calfaciat: his autem ad salutem est
fatis, si non omnino sint frigida. Nec mirari præ-
tere debemus, si principium ipsum, vbi respiratio
ne priuatur, plus quam cætera noxæ contrahit:
quippe sub incurabilibus medicamentis flamma
lic extinguuntur. Iam vero si cor nudatum refrige-
ret, celerrimè perit animal: sin calidus seruet, pati-
tur nihil. Quod si corde refrigerato, ac propte-
rea animali iam mortuo, in alterutro ventriculo
tum eius, & præcipue in sinistram, inserat digi-
tum, magni tibi calorem deprehendes, longèque
maiores quam in aliis sit partibus, dummodo,
pro naturæ modo se habeant. Si quidem ut par
hæc caloris portio cordi est minima, sic reliquis
partibus omnino est magna. Proinde ubi quod
pro naturæ modo est, non seruat, cordis quæ-
dam calor, qui veluti flamma est, perit: reliquæ
calor longo tempore durat. Porro illi sola respi-
ratio calorem tuetur. Aliis autem partibus du-
plex eius custodia est: pulsus videlicet, qui veluti
quædam est respiratio, & quod ex abundantiore
naturæ gratia accedit, quod à corde consistit. Quod
autem non solum per arterias, sed etiam per venas
conduat à corde calorem, hinc colligere licet, quod
quibus ex visuulo excepti fuerunt, ob vulnera,
partes in quas ferebantur, fuerint perfrigeratæ.
Cum igitur nihil iam ad veritas videatur, quo mi-
nus vnus respiratio & pulsus vnus, finisque
sit, facile promptum collectu arbitror, caloris
in quæ parte custodiendi gratia pulsus condi-
tum esse: atque ita, quod ex respiratione vni præ-

statu cordi, id ex pulsu calori illi qui in toto est
animali, accedere: cōmunem vero vtriusque esse,
& animalis spiritus nutritionem: magis tamen
arteriarum propriam. Quoniam igitur in his quæ
de respiratione vna tradidimus, nobis monitra-
rum est, namque calorem per inspirationem quidem
refrigerari, per expirationem autem purgari, sum-
mo scilicet extremum excusio: ambas vero actio-
nes ad eam quodammodo consistere aliquid vnde: pa-
tet arbitror, quod in pulsu etiam idem dicendum
erit: nempe in dilatatione arteriz, subsistens quam-
piam attritus: in systole, quod ex humorum desyn-
thesi in toto animali contractum est, veluti funi-
dum superfluitas, expellit. Verum quædammodum &
fauces, & pulmones, & vniuersum pectus, dum
recipiunt spiritum, dilatantur. Indem arterias, quod
trahunt tempore, dilatari oportet, non quod spi-
ritum reddunt, ut existimant Archigenes. Qui
& quæ illa quæ arteriarum contractioni succedit,
cum multo maior sit ea quæ dilatationem sequi-
tur, si vni quæ inspiratio necin præcedit, ea quæ su-
peruenit illa: ostendit itaque, etiam secundum hoc
hæc quædam similitudinem inter ipsam respirationem
& pulsum. Cuiusmodi etiam in intrinsecis
spiritibus res pulsatio est, cuiusmodi arterius di-
latatio exultat. Et cuiusmodi est illi emissio spi-
ritus, quæmodi est arterius contractio. Cuius quæ-
dam duplicis & compositi arteriarum motus,
quæ nominamus pulsum, autor & origo est cor.
Ceterum cum vis illa, unde cor contrahitur di-
lataturque, in omnes arterias per tunicas earum in-
fluit, eas cogit aperiri, quædammodo ipsi
cor: visque sicut illud dum dilatatur, ea quæ oscu-
lis suis appropinquat, trahit eumque contrahit,
expellit: sic & arteriz, cum se aperiant, ad se ven-
dunt trahunt, cum contrahuntur, in omnem par-
tem expellunt, videlicet per vniuersos meatus,
quibus in intestina, ventriculum, vniuersam ca-
uitatem, atque adeo in venas se aperit. Quippe si
animali aliquid, ex his quibus arteriz sunt amplius,
magnas multasque arterias quis valueret, vniuer-
sum per eas sanguinem euacuarit. Sunt itaque arteriz
& venis communia oscula, per quæ quidem,
dum dilatantur arteriz, ex venis trahunt: in eas,
dum contrahuntur, reuertunt. Sacrum numerum per ora
quæ in eam sinuntur, quicquid halituosum su-
mimusve excrementum habet, excrevit: recipiunt
autem ex ætate ambire, non exiguum in se portio-
nem, per aliæ spiramenta similiter. At à corde
quidem accipit plus reddit autem minus, propter
membranas illas, quæ in earum superne na-
scentur parte: quæ in certis aliis impertitur.
Iam vero cum sanguis in arteriis, etiam recte se ha-
bente animali, cōtineatur: manifestum est non ideo
dilatari arterias, quod spiritus profecto à corde
impletur: sed potius ob id impleri, quod dilata-
tur. Quippe si essent sanguine vacuæ, si eni foras
se possent, ut exiguo tempore, quod à corde con-
fluit, ad fines earum perueiret: sanguinem verò in
se habentibus, si eni omnino nequit, vtmotus ce-
lentis cum ea dilatatione cōsentiant, quæ ex eis
à corde implendis proveniat. Arteriz itaque seipsas
mouent, vti cum se attolles summum talem: idque
eadem qua cor ui: quæ scilicet ab ipso corde ordi,
per tunicas earum transmuti diximus. Est enim ut

*Animalis spiritus
nutritionem
esse magis cum
magis respiratione
et pulsu.*

*Calorem inma-
trone respirari
per inspirationem
et purgari aut
per expirationem.*

*Dilatatio arte-
riarum systole
trahit spiritus
attrahit systole
impellit pulsationem.*

*Arteriz dilata-
tione dum tra-
hant spiritum.*

*Pulsus est respi-
rationis facili-
tudo.*

*Cor est prin-
cipium compositi
arteriarum mo-
tus.*

*Pulsus facili-
tudo à corde in-
fluit arterias,
per ipsarum in
arterias subsistit
tas.*

*Arteriz tra-
hant, dum di-
latantur, expel-
lant cum con-
trahuntur.*

*Arterias trahit
re à venis et in
ipsa polio per
communem res-
pirationem.*

*Arterias partem
quæ in certis aliis
impertitur. Sanguinem
in arteriis
tamen in arteriis.*

*Arteriz non
qua implentur
dilatantur sed
qua dilatantur
implentur.*

*Arteriz seipsas
mouent, vti cum
se attolles sum-
mum talem.*

Respirationem
esse opus an-
imalis potest
pulsus, vnde
in.

Dialtolem esse
etiam arteria-
rum actionem.

Expiratio est
actio remissi-
ua.

Systolem natu-
ralem esse rela-
tione ad actionem.

Systolem repe-
rit, quae efflu-
tum propor-
tione respicienda.
Incomparatio
cuius dialtole et
systole qualis.
Calorem per se
motum ad in-
terius converti.

Partis expira-
tionis et systole
excellunt.
Septima systole
variorum.

Pulsus à quibus
mutantur pulsus.

Molles tunicae
quod sunt ap-
prietur ad motum.
Quomodo lar-
diores dantur.

respirationis vis animalis, quae à cerebro profi-
citur, sic pulsuum vitales facit, quae à corde
emanant, electrix. Porro venae, animalis vim iam
functo, snu illas vacuae sunt sanguine, prorsus in
seipsas huius, ut in superna earum tunice pura, ad
mittantur cum inferiore: at arteriae, partibus dis-
cretis nunquam non conspiciuntur: quod sanè pro-
pter alteram earum tunicam, quae dura est, evenit.
Quod autem non modo systole, sed dialtole fit eni-
metio arteriarum, contra quod nonnulli arbitrantur,
admodum perspicuum videtur: cum nimis ipsa
dialtole sub vitum robore magna sit: sicut è dia-
uerio parua, sub facultate imbecillat. Ad haec, si
quemadmodum expiratio, sic dialtole actionis ef-
fet remissio, utique nec intensio in ea, nec remissi-
o, sicut nec in spiritus emissionem, perciperetur:
nec omnino robur, & vehemètia actus, quae per-
cipiuntur. Dialtole itaque mihi ex genere actionis
videtur Deinceps considerandum, an sicut ex-
piratio remissio actionis thoracis est, ac tanquam
cessatio quidam: efflatio verò actio, atque idcirco
intensionem & remissionem admittens, quod ex-
piratio non facit: sic systole in pulsibus relaxatio
sit arteriarum opens, aliis huic annexa invenia-
tur, quae efflationi responderet, actio. Ac mihi id
quod videtur esse verissimum. Etenim rationabi-
le est, ubi ex humorum devotione collectus fulgi-
nosus vapor plurimus fuerit, tum animal efflatum
appetere. Contrarium vel ob succi temperiem, vel
caloris mediocritatem, nihil talis excrementi colligi-
tur, ut expiratio dumtaxat. In arteriis quoque, ubi
tale excrementum redvndat, simile efflatum systo-
lem edat. Reliquas, cum id quod ex ipsis vacuatur,
habui quod fumo est similis. Quis obrem ita qui se
ingurgitat cibo, per somnum sit remissior: quid-
em dialtole, systole autem intensior: quippe tunc
intro magis quod foras naturali calore se coherente:
eodem enim circa viscera & ventrem, qui succos
& cibos coquoat, iam plurimo collecto, neces-
sarium est excrementum, quoniam id quod copiosius
gignitur, naturale vacatione desideret. Proinde
expiratio quidem maior, & plerumque efflatio-
ne perficitur: contra vero autem arteriae, illi propor-
tione respondens. Similiter ambax & in pueris ex-
cellunt, quod sit in eis vehemens propter incre-
mentum concoctio. Contra sensu etas tardior &
minor videtur habere systolen, vix tamen minus
necessarii, nimis & imbecilliter coquoant, & mi-
nime succo cohaerent. Ad proportionem lioris o-
mnium, tum anni tempus, tum regio, tum omnis
vno verbo circundantis nos aeris ad frigus et ca-
lorem mutatio, pulsus alterare videtur. Pari modo
& animi affectus omnes, & vitae sortis, & mor-
bi, arteriarum motum introitus extorsive pro-
mouent. Qui vero iniqui sunt, arterias non agendo
aliquid, celeriter interitus descendere sed pro-
pter tunicarum molliem, ubi à dialtole dimittun-
tur, & vltimus & celerius quod duras, in seipsas red-
dere: facile redargui possunt. Quippe faciliores
ad motum erit molles tunicae, cum scilicet facul-
tates ipsae aliquid per eas molliunt, vix tamen ita
gis eis obsequentes. Dum vero postquam ab his sunt
motae, rursus permittuntur ad statum proprium re-
dere, tum vix duras, quod molles, ob imperit, robur
& firmitudinem suae constitutionis, revertitur mul-

to celerius: quemadmodum grandiores arbores,
quae ut cum renixu trahuntur, sic dimissae, res-
cendunt celeriter. Diximus igitur, & quod pul-
sus à naturalis quae per totum corpus diffunditur,
caloris gratia sit conditus: & quod dilatare arte-
ria, is calor refrigeretur, contracta rursus purge-
tur: & quod motus hi, spiritus non omnes omnino
sint similes: & quod animalis spiritus coeducant: & quod
vna retantur, respiratio & pulsus dissident, neque
illa ab animalis facultate, nec à vitali oriatur.

GAL. ENI PERGAMENTI

introductio in pulsus.



Inter se arteriae pulsuum habent non
modum sibi inter se, verum etiam cordi
ipsi persimile, adeo ut vix ex vna ipsarum
potius de reliquis iudicium faceret: non
tamen mori omnium aequabiles sen-
tias, sed earum quidem quae partibus exambax
insunt, clarius: quae vero in vltimis, obscurius:
quae aliter carne multa insequuntur, aut intra ossa
sunt, aut aliter corpore oribus subiacet, vix in omni
sensu haudquaquam deprehendendis, nisi forte extra-
buert animal. Nam sic motus arteriae quae spinæ
incumbit, tangentes epigastrii plerumque depre-
hendendi solent. Porro quae in temporibus sunt, raris
pedis, & inferna parte corporis, esse perpetuo mo-
tu sensibili predaet sunt. Verum ne expediat, neque
honestius, nec si vsum species, maiori com-
modo aliam arteriam, si eas quae in corpore sunt
praeterierit, & quod maxime perspicue & expo-
sita sint, & secundum rectitudinem sita.

De quantitate dilatationis.

Tibi autem tangenti, arteria sentietur in omni
dimensione extendi. Ad dimensionem est corporum
omnium sunt tres: a longum, latum, & pro-
fundum. Ceterum cum animal secundum naturam
habet, corporis arteriam moderate admodum di-
latari: cum autem contra prae naturam habet,
interdum secundum quamvis dimensionem par-
tem mittitur, partem ex parte quo casu memo-
ria tenere oportet, cuiusmodi pulsus naturalis ex-
stiterat. Tum si in qui est praeter naturam, auctus
laetudine invenitur, latum: si longitudine, lon-
gum: si profunditate, altum appellare. Ad por-
tionem & his contrarios, qui videlicet natura-
liunt minores, angustum, breuem, atque humilem
vocabis. Pulsus vero secundum omnem dimen-
sionem in statum praeter naturam traductorum, qui
vix est diminutus, parvus: qui auctus vix
est, magnus nuncupatur. Atque haec pulsus sunt in
dilatationis quantitate differenz.

De motus qualitate.

Proprie motus differenz sunt, celeritas &
tarditas: quarum illa quidem, motus quidam est
concitatus, lux autem exolus: quas ita demum
distinguemus, si eas ad motum naturalem com-
parauerimus. In occurrus porro qualitate, lan-
guor ac vehementia consistunt. Ceterum durities
atque mollietas, tunc ipsius arteriae sunt quali-
tates: minime autem propriam pulsus differen-
tiam constituunt, licet cum eo percipiantur. Tres
igitur habet differenz pulsus, & praeterea quartam
in percussione arteriae repetens.

Pulsus vix.

Respiratio &
pulsus quomodo
differant.

Pulsus habet
etiam etiam
etiam etiam.

Pulsus non a-
qualiter percipit
in arteriis om-
nibus.

Arteria sensibi-
lem pulsus edat.

Corporum ar-
teriae est omni-
um arteriarum,
vix tangitur.

Arteria in om-
ni dimensione
extenditur.
Dimensio per
partem esse ita.

Pulsus, qui na-
turae modum
excedit, dicitur
esse durus &
tardus.

Pulsus celeritas
quid.
Tarditas.
Languidus pul-
sus.
Vehemens.
Pulsus durus
atque mollietas,
ad tunicas ar-
teriarum referuntur.

De tempore quietis.

Quintā autē aliam numerabis, quæ est in intermissione, quæ inter percussiones intercedit. Voco enim percussiones, cum arteria tactui nostro occurrat: intermissione autem, quietem quæ inter duas percussiones intercedit: secundum quam, frequens, rarus, atq; inter vtrūq; medius pulsus iudicatur: quo in medio pulsus secundum naturam consistunt. Porro omnes hī temporis etiam quantitatē diiudicant. Nam frequens dicitur, cum quietis tempus breue fuerit: rarus, cum diuturnum. Non fuerit autem alienum, si tyroni bus contra tactu arteriæ ponatur esse insensibilis.

De æqualitate atq; inæqualitate.

Æqualitas autem & inæqualitas in dictis omnibus differentis inveniuntur. Nam ubi in illis ordine se consequentibus est æqualitas ac similitudo, æqualitatem tunc vocitamus. Verbi gratia, si pulsuum ordine subsequen-
Æqualitas pulsus quomodo diiudicari solet.

In æqualitate pulsus quod.

tudo fuerit æquabilis, ibi tam pulsus in magnitudine æqualem dicimus: sin in celeritate, celeritate æqualem. Ad eundem etiam modum in vehementia, frequentia, & languore. In æqualitas porro, æquabilitatis est labe, in qua vis pulsuum differunt ipsa accidit.

De pulsū ordinato inordinatoq;.

Nonnunq; autem & post certam quandā percussionū numero præfixitarum seriem, pulsibus æqualibus inæqualis vnus intercedit, qd multis modis. Nam tres æquales, quartus inæqualis subsequitur, seruaturq; id deinceps vno renore: aut quatuor, quintus: pari modo & in omni alio numero. In quibus certè omnibus æqualitas nō seruatur, ob eamq; causam pulsus sit inæqualis. Quia verò certa quædam series seruatur, ob id ordinatus vocatur. Quæ certa periodos si minimè seruaretur, pulsus is diceretur enī inordinatus.

De inæqualitate quæ in vno pulsū accidit.

Accidit autē & in vno pulsū inæqualitas, tum partibus arteriæ situ & motu inter se dissidentibus, tum cuiusq; pulsus motu sibiipsi non consentiente. Inæqualitas igitur in partium situ accidit, cum arteria ipsa à propria sede traducitur. In motu autem, cum arteriæ velocius aut tardius, tempestius aut serius, vehementius aut languidius, tempore diuturniore aut breuiore, assidue aut penitus nihil, mouentur. At in singulis pulsibus partibus est inæqualitas, cum pulsus est interiticius, repetitiue. Præterea cum motu celeritatem eandem, aut vehementiam, aut languorē, aut magnitudinem, aut paruitatem non seruat. Sunt igitur hæ simplices inæqualitates.

De pulsuum inæqualitate composita.

Compositæ autē fuerint, quatenus licuerit alteram alteri, ac singulas singulas, aut vnā plures, aut plures pluribus copulari. Quarū nōnullæ quidem adeptæ sunt propriam appellationē: quænammodum pulsus vermicans, formicæ, & hæctici. Vermicans quidem, cum arteriæ velut reptantē vermem, atq; fluctus instar subsistentē nobis representat, nō autē tota ipsa vno tempore dilatarit. Cæterū si cum exigua dilatarione id accidat, vermicæ: sin cū magna, fluctuosus simpliciter appellatur. Perspicuū autem est, qd vermi-

In æqualitate pulsus quod.

Vermicans pulsus quomodo accidat.

Fluctuosus pulsus.

cans pulsus, languidus est & frequens. Qui verò languidus summe fuerit, frequens ac paruus, is formicæ cognominabitur: qui tamen celeritate præ se ferat, nō tamē est reuera celer. Hæctici verò, qd modo febris, ita pulsus quoq; nuncupatur, quod nihil magnopere immutetur, sed perpetuū sui similis, coherens, ac nunq; solumus permaneat, viptore toto corporis habitu in febribus eiusmodi ac pulsibus, in statū morbosum murato. Virgitar quæ sunt dicta, denuō in memoriā reuocem. Pulsus magnus est, qui fit cum arteria multū in longū, latū, & profundū diducitur. Lægus, cum in longitudine tantū. Latus, cum in latitudine. Altus, cum in profunditate. Pulsus autē vehemens est, qui valide tactū percutit. Mollis, in quo arteriæ tunica blanda est ac tenera. Celer, qui fit dum arteria exiguo tempore dilatarit. Frequens, cum paruo interposito repetit. Æqualis, qui serie cōtinua sibi est æqualis. Ordinatus, qui singulis periodicis est æqualis. Qui verò in vna percussione est inæqualis, in vna percussione dicitur inæqualis. Pulsus omnibus hæc cōstram, sans sunt perspicui. Liqueat præterea, quod aliorū contrariorū omnium vnus est medius: æqualis verò & inæqualis, nullus est medius: sicut nec ordinatus, & inordinatus: quodq; illorū quidem omniū mediū ipsi sunt secundum naturam, in his verò solus equalis & ordinatus.

De causis pulsuum.

Cum ab omni causa pulsus mutari soleant, triplicem & generalissimā mutationis ipsorū differentiam statuo. Ac prima quidem mutatio, naturalis existit: secunda nō naturalis, qvis nondum præter naturā: tertia deniq; præter naturā. Verū omnes hæ mutationes, differentias naturales sequuntur. Arteriæ siquidem, aliq; aliter natura mouentur. Proinde primas eas illi esse exploratas oportet, qui vult dignoscere, à qua causa, & quatenus pulsus ipsum mutari esse cōgent. Primum autē cuiusq; pulsus experientia certō didicerit: ob idq; arteriā tangere sæpe cōuenit, potissimū quidē perfecte sani, ac dum ab omni vehementi motu quiescat: post autē, & in ipsis affectibus. At cum fieri nequeat vt pulsus omnium experientia explorētur, certè artifex plurimū poterit, si eorum quæ multis passim similiter insunt, scientiam sibi cōpararit. Nam cōmunio quædā naturæ viris inter se est, quemadmodū etiam mulieribus: quam qui probè calluerit, à recto aberrare non poterit. Ac viri sanē in vniuersum mulieribus pulsus habent maiorem multo, vehementiorēq;: cæterū tardiorē paulo, ac longè rariorem. Qui autē natura sunt calidiores, maiorem quidem, ac longè rariorem, verū non multo vehementiorem. Muratur verò pulsus, & per ætates. Puero recens in lacem ætate, pulsus frequentior est, sicuti seni rarior. Qui verò ætate sunt inter hos media, iis pulsus ad portionē respondent, propterea quod proprias ad pueri aut senis ætate accesserint. Pari modo puero quidem celerissimus est, seni verò tardissimus: medii medix ætates sortiuntur. Cæterū inter ætates,

Vermicans pulsus qui dicitur.

Vermicans pulsus non est celer.

Hæctici pulsus.

Pulsus magnus.

Longus.

Latius.

Almus.

Vehemens.

Mollis.

Celer.

Frequens.

Æqualis.

Ordinatus.

Pulsus inter æqualem & inæqualem vultus cū medius: sicuti nōq; inter ordinatum & inordinatū.

Pulsus mutationem differtentia triplicem.

Pulsus cuiusq; propriam experientia cognoscit.

Pulsus virorū.

Pulsus calidiorum.

Pulsus graciorum.

Pulsus infansul.

Pulsus senis.

*Pulsus barrens
tamen.*

maximus florentiū est pulsus: minimus autē fe-
num: medius inter ipsos puerorū, est paulo ma-
ior. Præterea florentium quidem vehementissi-
mus, scitum autem languidus, puerorum deniq;
medius. Sed per anni tempora pulsus etiam mu-
tantur. Siquidem vere medio, pulsus sunt maxi-
mi & vehementissimi, celeritate verō ac frequen-
tia, moderati. Pariter etiā & autumnō medio se
habent. At progrediente vere, magnitudo quin-
dem ac vehementia ipsius minuitur: augetur
autē celeritas & frequentia: ac tandem ubi æstas
advenit, sūt languidi, parvi, celeres, ac frequen-
tes. Austino verō progrediente, omnis minuitur
magnitudo, vehementia, celeritas, & frequen-
tia: ut cum hyeme accesserit, iam sunt pulsus in
paruitatem, languorem, tarditatem, ac raritatem
mutati. Porro in veris initium, autumni exitus:
ita vers exitus, autumni initio responderet. Tum
quem admodum æstatis initium, æstatis exitus:
sic hyematis initium, hyematis exitui responderet. Pro-
inde de quæ ab æstate media, hyematis media, in
vtriusq; partem distat, itidem æqualiter pulsus
immutat. At æstas media, partem hyematis media
est similis, partem dissimilis. In vtriusq; enim pul-
sus sunt parvi, ac languidi: æstate tamen sunt ce-
leres, ac frequentes: hyeme verō tardi, ac rari.
Non tamen sunt parvi pariter hyeme atq; æsta-
te, sed æstate minus: nec pariter hyeme atq; æsta-
te languent, sed minus hyeme. Mutantur & per
regiones pulsus, p̄c̄q; alias constitutiones aeris
ambientis. In calidis quippe, tales redduntur pul-
sus, quales sunt media: in valde frigidis, quales
hyeme media: in temperatis, quales vere medio:
quæ verō inter has sunt media, ad portionem se
habent. Mulieribus vtero gestibus, pulsus sunt
maiores, frequentiores, ac celeriores: ceteris ve-
rō modū suum naturale retinent. Somnus etiā
permutat pulsus. Nam principio quidem mino-
rem ipsum, tardiores, rariorem, & languidiore
efficit: procedente verō tempore, tarditatem in-
tendit, & raritatem, idque præcipue post cibum.
Maior autem fit tunc & vehementior. Quod si
diuturnior sit fuerit, rursus in languorem muta-
tur & paruitatē: tarditatē autem & raritatē reti-
net. Qui a somno sunt excitati, protinus quidē
pulsus sunt magni, vehementes, celeres, frequen-
tes, & turbati quodammodo: verum nō ita mul-
to post, reuertuntur ad mediocritatē. Quod ve-
rō ad status corporis acquisitionem pertinet, non
aliter h̄, q̄ naturales, pulsus immutant. Quis do-
quidem qui natura erat gracilis, factus postea
quod dracus (quē Greci *ἀράχνης* vocant) pulsum
habet ei, qui talis uteris est, similem de ceterisq;
pari indiviso. Corporis quoq; temperamenta ac-
quisitionis, haud secus q̄ naturalis, pulsus immu-
tant. Inter causas autē non naturales, incipien-
tes quidem exercitationes, quo vis ad mediocri-
tatem pervenerint, pulsus vehementiores effi-
ciunt, magnos, celeres, ac frequentes. Si quis ve-
rō multū ac supra vires laboret, parvos, langu-
idos, celeres, ac frequentissimos. Sin modū plu-
rimū excesserit, sed et vires fit exolutes mag-
noperē, parvos admodum, languidos, tar-
dos, ac raros pulsus habebit. Quod si ad virum
progredatur dissolutiō, pulsus habebit viri

dissolutarum proprios. Balneariū quæ moderatē
calidis sunt, magnos, celeres, frequentes ac ve-
hementes: quæ verō immodicē, parvos ac langu-
idos, præterea celeres & frequentes pulsus efficiūt.
Quod si sibi nō cesserit, parvos & tardos, raros,
& languidos. Quæ autē frigida sunt, repente qui-
dem parvos ac tardos, raros & rariiores pulsus
reddunt: post autē aut stuporē, aut robur indu-
cent. Quod si refrigerarint, stuporēq; induxe-
rint, parvos & languidos, tardos & raros: sin ca-
lorem conciliarint & robur, magnos quidem ac
vehementes, celeritate tamen ac frequentia mo-
deratos efficiūt. Copiosior cibis, q̄ ut vinci pos-
sit, pulsus inæquales luxuri & inordinatos efficit:
moderatus autē, magnos, vehementes, celeres,
atq; frequentes: parvior, q̄ sit ex vitiis, minorem &
breuiore pulsus mutatio nō efficiūt. Vinū, ceterū
quidem, ciborū instar, pulsus immutat: in eo ta-
men differt, quod repente immutat, quod q̄ mu-
tatio quæ ab eo proficitur, citius desinat, q̄ quæ
ab eis proveniat: ac deniq; quod celeritatem magis
sugere & magnitudinē, q̄ vehementiam & fre-
quentiā. Aquæ omniū quæ sumuntur, mutationē
minimā efficiūt: mutat tamen & ipsa ad portionē
ciborū. Reliquis verō omnia, quantum possunt aut
alere, aut calfacere, aut refrigerare, tantū arteria-
rum morū immutant. At scitis constitutiones, ac
ciborū copias tanta, ut vires opprimat: præterea
exercitationes, balnea, & somni, vbi modū exce-
dunt, omnis sunt præter naturā. Nam causæ quæ
naturales & non naturales diximus, quantum
excessu cedunt in causas præter naturā. Cusarū
verō quæ nō quantitate modō, verum etiā gene-
re sunt præter naturā, numerus est infinitus. Por-
rō causarū omniū præter naturā, alix quidem vi-
res vitales veluti solvunt & dissipant: alix autē
veluti premunt & grauāt. Ac solvūt quidē, alimen-
ti inopia, morborū malignitas, eorūq; aut diu-
turnitas, aut vehementia: præterea affectus ani-
mi immodici, necnō vacuationes immoderate,
Opprimūt autē, tum ipsa materiarū copia, tum in-
strumentorū affectus: inflammationes videlicet,
scirrhi, tumores, moles, abcessus, & corruptiones
varie. Solvūt itaq; vires, parvi, languidi, ac val-
de frequentē pulsus efficiūt: pressæ verō, pulsus
mutant, cū in reliquam omnē inæqualitatē, &
ordinis cōfusionē, tum in eam quæ in vehementi-
is spectatur, & magnitudinē: nam iniquitates
hæ, oppressorū viriū maximē propriæ existunt.
Quin etiā in eiusmodi affectibus, morus quidam
funditus pereit, ut iterum. Ceterū qui in-
tercidunt, minorē: qui pereunt, maiorem lesio-
nem indicūt. Solutariū igitur ob alimentum inopiā
virū, pulsus vertuntur principio quidem, in lan-
guorem, paruitatē, celeritatem, ac frequentiam:
ad medium autē, in languorem, paruitatē, tarditatē,
& raritatē: postremū in paruitatem summā, lan-
guorem, frequentiam, & clementiam celeritatis
imagine: qui pulsus est, quem formicantē ap-
pellant. Vermicis autem pulsus, fit quoq; & ipse
viribus iam dissolutis, sed aliquantū adhuc res-
tans: in eodem ac formicante discrepat, quod
nō itidem in summū languorem ac paruitatē re-
ductus sit, tum quod perspicuum habeat in vno
ictu inæqualitatem, quæ sit, dum partes moveri
tempe-

*Pulsus differre
tre pro balneo
dum diversita-
te.*

*Pulsus differe-
rentia pro mo-
do cibi assu-
pti.*

*Vini qualiter
pulsus immu-
tat.*

*Aquæ quomo-
do pulsus im-
mutat.*

*Immodica om-
nia esse præter
naturam.*

*Constat pe-
re naturā des-
servire.*
*Vitalium facul-
tatem solvunt.*

*Vitalem facul-
tatem quæ op-
primant.*
*Pulsus faculta-
tem solvunt.*
*Pulsus faculta-
tem opprimunt.*

*Pulsus faculta-
tem solvunt ob ali-
menti inopiā.*

*Formicanti pul-
sus.*
*Vermicis pul-
sus.*

*Pulsus differe-
rentia secundū
diversa tempora.*

*Pulsus differe-
ntia pro diversis
tate regionum.*

*Pulsus gestibus
vtero.*
*Pulsus dormien-
tibus.*

*Pulsus exper-
tior a somno.*

*Pulsus mutari
ab acquisitione
habitudinis et
temperamentis,
perinde ac a
naturalibus.*
*Pulsus differe-
rentia pro exerci-
tationum diversitate.*

temperantius aut ferius incipiūt: vnde tardus est minus q̃ parvus: nonnūq̃ autē nihil penitus habet tarditatis, ob id ip̃sum, nimis malignus existit. Atque a febribus exitialibus atq̃ acutis oriuntur syncopæ, pulsus vermiceant nō habent: quibz vniq̃ reliquis virium solutiones ṽt plurimū conuulsat, ac eis præcipue, quæ sine febribus accidunt: aut certē cum exiguis admodū. Ob eam ṽtq̃ causam syncopæ quidem cordicæ, formicæ: cholerae verō morbosæ, ac fluxus ventris vehementes, hæmorrhagiæ, fluxus muliebres, reliquæq̃ affectus qui corpus inuadunt celeriter, ṽt plurimū vermiceant: cum autē extremū adsiciant, formicæ sequūtur. Iam verō ab ira pulsus fit alius, magnus, vehemens, celer ac frequens: A volupate autē, magnus, ac rarus, nō tamen vehemens diuersus. A mœstia, parvus, tardus, languidus, atq̃ rarus. A metu recenti quidem ac vehementi, celer, turbulentus, inordinatus, atq̃ inæqualis: in veterato autē, pulsus i mœstia est similis. In omnibus porro his, si fidus perseverauerit, aut vehementes admodum fuerint, tales pulsus sunt, quales consequuntur solutæ vires. Dolor autem qui pulsus immutat, aut quia vehemens, aut quia in partibus principalibus est, id facit: quemadmodū inflammatio

Cum igitur adhuc parvus est, etque in ipso ortu, maiorem, vehementiorem, celerem ac frequentiorem pulsus efficit: auctus autē, vehementiusq; admodū factus, viam robori vitali noxam infert, minorem, languidiorem, celerem ac frequentē. Qui verō vires iam dissolut, pulsus mutat in languorem, parvitatē, & falsam celeritatis imaginem, imminuentē frequentiam. Inflammatio nam pulsus, communis quidem omnium, quasi ferratilis est: ut patet quidem arterie alia quidem dilatasi videatur, alia autē minime, quæ videlicet durior sentitur. Habet autē pulsus hic & turbationis non nihil: præterea celer quidem est ac frequens, magnus verō non semper. Proprius cuiusq; incipientis quidem, maior est naturalis, vehementior, celerior, frequentiorq;. At in ea quæ adhuc crescit, omnia hæc sunt auctiora, pulsusq; iam palam est durior & turbulentior. Cum verō ad vigorem pervenerit, evidenter quidem est, durior, ac turbulentior, sed minor quàm antea: non tamen languidior, nisi morbus vires exuperaret, quo casu frequenter, & celer redditur. Quod si diu admodū persueverit, namq; scirrhisoforum durefact, pulsus tenuitas ac durities prædicta scedat. Hæc itaq; illi phlegmonia accidit, quæ totius animalis pulsum immutat. Eius verō quæ animal totū nō turbat pulsus, in parte saltem inflammatione accensa, est cuiusmodi effe illum in toto corpore diximus. Intenditur autē ac remanitur prædictior quodq; aut pro inflammationis qualitate, aut pro ipsius instrumenti phlegmone obsessi natura. Nam quæ partes magis sunt nervosæ, ex duriores, ferratiliq; magis, ac minores pulsus efficit: quæ verō sunt venosæ magis atq; at teriores, cōtrarios. His autē pulsus minor est in partibus magis arteriosis, ibidēq; facile inæqualis & mordinatus efficitur. At præter ipsius pulsus differentiā, quibus scptū transverberum est inflammationum, celeriter si conv-

luntur: sufficit aut quibus pulmones. Syncope prelienditur, quibus os ventriculi. Atropina laborat, quibus hepatis. Non cœcoquant, quibus venter, vixne supprimunt, quibus renes ex-
feriuntur inflammatione. Ad hepatis sensu exa-
ciori prædit, pulsus, propter dolores, immu-
tantur: hebenori aut, duntaxat propter affectu. Ita-
que pulsus pleuritico celer ac frequens est, non
tamen magnus admodum. Est præterea non languis
quidem, non ramentum, quod ad affectu speciat,
vehemens. Porro quantitas frequentie in pul-
sue excedit consuetu modum pleuritidis, cum pleuri-
tis ipsa in peripneumonia transit, aut enim minatur
syncope. Infra modum aut subleuit, cum in cata-
phora, aut in nervorum læsione definit. Eodem
modo & inæqualitas illa ferratilis, quæ pleuri-
tis maxime est propria, remittit quidem, si pleuri-
tis fit mollis, ac facile cœcoquantur: interdu aut
tem, si ea sit exitialis: inducit ipsam esse cœcu
difficile. Tales aut pleuritidis, si simul addit im-
becillitas viri, periculi præsentia munitur. Sin vi-
rum robur non desit, signum est res cœcoctas iam
esse, aut in empyema transierat, aut in tabidum
marcorem degenerasse. Cæterum si pleuritidis
coquantur, sensim deponit pulsus omnem muta-
tionem præter naturam. Cum vero transit in empye-
ma, sunt pulsus empyematis proprii. Pari modo
& marcoris proprii cœs accidunt, qui tabidos
marcores sunt incursum. Talis aut est purulen-
torum nuper ordiuntur pulsus, qualis virulentis
inflammationis: hæc siquidem ipsarum est suppu-
rationum principium. Nonnunquam autem est inæ-
qualis & inordinatus: omnibus tamen est hec-
ticus. Cum vero iam pus instat, cæteri quidem est simi-
lis, nisi quod magis æqualis. Postquam autem est
ruptum, languidior, lentior, tardior ac rarior. Mar-
cescentium pulsus non simpliciter, neque secundum
vnam speciem, mutatur. Qui namque vni cum phle-
gmonæ nodum soluta paulatim emarcuerunt, pul-
sus habent languidos, celeriores, frequentes val-
de, atque cum depressione in angulum redactos:
quos vitæ myuron vocant. Porro marcescenti-
bus omnibus communis est pulsus hec-
ticus: deinde autem in distoles magnitudine myuron imitatur
inæqualitas: postremo vero ea que in frequentia
consistit: quæ omnibus etiam perpetuo inest, qui
in marasimum inciderint propter inflammationes:
aut quibus propter cardiacos effectus, vel
syncope in marasimum, periculi præsentia immi-
net: quæ vni ex toto periculi quod præcepit
effugerit, nihilominus tamen tempore proceden-
te marcescunt. In hiscotum pulsus, parvus, lan-
guidus, mollis & celer est, hec-
ticusque mediocri-
ter. Peripneumonicorum, vero, magnus, aliquan-
tulum fluctuosus, languidus, mollis, non aliter
quam lethargicorum: nisi quod inæqualitate supe-
rat, tum ea que in vna percussione consistit, tum
quam systematicam vocant. Cum autem peri-
pneumonia omnes aut febris accessit aut
febris grauis nonnihil habet, vtrumque præva-
luent horum, secundum illud frequentie quantitas
maxime deprehenditur. Nam si in peripneumonia
sit inflammatio febris, pulsus est admodum fre-
quens: si febris paulo magis pollet, infrequentior.
Lethargicorum pulsus, cum sit magnitudi-

*Pulsio differens
seu fructus di-
versos synco-
pas.*

Tracandorum
pulser.
Voluptas que
modo summi
pulsum.
Massarum pul
sar.
Metacantho pul
sar.

Puisse diffuser
 sa pro vaine
 sa douleur.

Polysyllabismus
monosyllabismus
disyllabismus.

*Pulsio differ-
tia pro infla-
tationum, et
partium infla-
tationum ne-
tore dancu*

Septo transfor-
si infirmo.
quanti terra
me con valia-
net orbi: ne suf-
focatos meo pul-
mones phlegma
ne obfide.
Pneumoniae
pulmo.

*Serratus in e,
quadrans piam-
raticum.*

Pterostichus
diffusus.

Paraliteros
pulsus, et quod
in vegetis na-
turali mactam.

Marce. Epist. 10
- p. 100.

Myrica palustris
Palustris betula
palustris mar-
cescens *co-*

Руби́катум
ро́зум.
Реторике́н
сестре́ ро́зум.

† Peripneumonia
- cu qua adfuit

Lebergyne
polymer.

linguore, & mollitie, peripneumonicorū pulsui cōsimilis, eodem tamen est tardior, languidior, minus inæqualis, magisq; deficiēs quā intercedens. Porro cōfusio ordinis vplurimū inæqualitates sequitur: nam inæqualē pulsū raro quidem ordinatū reperias. Cæterū minores noxæ, inæquales & ordinatos: maiores verō, inæquales & inordinatos efficiunt. Phreniticorum pulsus est parvus: rarissimē autem magnus fuit visus, roburq; mediocre habere. Durus præterea est, ac nervosus & frequens, & valde celer. Videas autem licet & speciem inæqualitatis in sinu, in eo nonnunq; vehementer accidere. Quin & tibi sæpe videbitur tota arteria suo ipsius loco relictā, sursum deorsūq; ferri turbulentiūsimē: cuius magna frequentia eminentem minatur synco-pen. Est & alius quidam nomine carens affectus, ex phrenitidis & lethargi generibus mixtus: quo detenti, bonam quidem temporis partem oculos claudunt, suntq; somnolenti ac stertunt: post autem oculis in cōmuniētibz atq; immotis intuentur diutissimē, nō aliter q̃ carochi: tum si quis eos intertoret, invirōque ad colloquium trahat, tardi erunt ad respondendū, difficilisq; plerūq; autē turbulenter effutunt, quicquid primū in buccam venerit. Atq; eius sanē affectus pulsus sunt frequentes & celeres, quo modo phreniticorum, sed minus. Pari modo & roboris habent minus quā illi, verūm lazi sunt, atq; parvi, nec dum extrā movētur, quicq; habet cōsertim ac simul interitum: sed alia ratione veluti intrō properantes suffugiūt, systolem quidē accelerantes, suffurantes autem diastolem. Non tamen, ne in hac quidem sint phrenitidis similes, cūm non habeat, nescio quid, interitum. Catochōn, hoc est, detentorum pulsus, cætera quidem similes sunt lethargicis, magnitudine, tarditate, ac raritate: quemadmodū & totus affectus a lethargo specie nō multū discrepat. Catochōn tamen pulsus imbecilli non sunt, nec molles, sed in his vel multūm disident: quemadmodū certē & quidd lethargicis totus habitus sit solutus, ac tumens, carochus verō contractus, coactūsq; præterea detentorū pulsus æqualis est: inæqualis autem lethargicorū. In convulsis, ipsūm quidem corpus arteriæ coactū esse videtur, compactūq; vndiq; nō tanquam à quoquam compressum, aut arctatum: nec rigidum planē, ut in febribz, & maxime in earum accessionibus: nec propter duntim dilatari difficile, quod temporis longinquitate accidere solet, præsertim si vitia quædam, aut viscerū affectus adfuerint: sed nō aliter quā si corpus nervosum causū, ut intestinum, ab vtroq; fine fuerit extensum. Talis est motus inæqualis arteriæ, quæ instar funis, sursum & deorsū traditūtur. Nec enim vllum est diastoles aut systolę signum, sed confusio potius simile quippū hic accidit. Apparet autē vehementes esse ac magnus convulsorū pulsus: ut verō nec languidus est, nec parvus: nō tamen adeo vehementes aut magnus vti videntur. Percussio enim multis imponit, quæ propter tensionē quidem, robusta: propterurbationē autem, exilire apparet. Vnde aliis quidē altior, aliis quasi strepitum quendā asperū ad tactum nostrū videtur

efficere. Quem pulsū, qui fuerit exercitatus, facile deprehendet, cūm nulli sit alteri similis. Paralyticus pulsus parvus est, languidusq; & tardus: nonnullis tamē rarus: sicuti aliis frequens quidem verūm penē deficiens inordinatē. Epilepti corū autē & apoplecticoꝝ pulsus, sunt similes: quo circa quæ de epilepticis memorabitur, eodem & de apoplecticis dictū fuisse est putandum, nisi quod omnia sunt in his intensiora. Porro quādiu mediocriter natura ipso affectu turbatur, tantisper nullam mutationē in pulsū est reperire cōmemorabilem: sed solū veluti tensa in vtrāq; partē videtur arteria, quemadmodum in convulsis. Vbi verō invaluerit affectus, ita ut opprimat vires, inæqualitatē quandam ac tensionē fortē accuset, longiorq; fit pulsus, languidior & rarior. Quod si affectus ipsas vires decerit, pulsus efficitur languidos, frequentes ac celeres. Angina laborantium pulsus, tensionem quandam habet cōvulsioni assimilem: magnus tamen est, ac fluctuosus, quo modo peripneumonicorum. Atq; vtrumvis in eo prævaluerit insigniter, sapendum illud est transmutatio expectanda. Nam si pulsus peripneumonicorum similis præpoller, in peripneumoniā: si cōvulsioni, in convulsione, angina terminabitur. Cæterū qui ex ipsis nimis anguntur, his pulsus fit parvus & rarus: expirantū autē, iam frequens & inæqualis. Orthopnoæ acutę pulsus est inæqualis, inordinatus, & penē deficiens, cūm autem mediocriter est malignus, frequens: cūm ad extremū vrget, rardus ac deficiens: cūm hominem iam ē medio tollit, frequens ac languidus. Suffocationis à matrice ortę pulsus, est cōvulsoriē extensus, ac rarus: eius autē quæ est exalialis, frequens, languidus, inordinatus, & penē deficiens. Os ventriculi affectum, si quidem infestetur inflāmatōne, cū facit mutationē duntaxat, cuiusmodi in inflammatione corporis nervosi fieri iam diximus. At mortuus illius, vomitus, nausea, singultus, appetitus privatio, atq; dissolutiones, præterq; quod pulsū parū efficiūt & languidū, ipsūm etiā nimis frequentē reddūt, & quibusdā moderate celeriorē. Cōpressio autē sola, citra ea omnia, rarus, tardū, parū, obscurū. Præterea quibus fames est magna, pulsus est eiusmodi. Qui verō affectus in frequentē ipsū pulsū permūtāt, si diutius perseverarint, aut vehementius affixerint, hī pulsus vermicanē efficiūt. Qui in raritatē, præterq; quod memoratas differentias inveniunt, talem præterea quiddā pulsus speciem in ea inqualitate, quæ in vno pulsū accidit, efficiūt, ut corpus arteriæ in multas partes cōmittitur esse videatur. Hydropicus pulsus, ascit quiddē, longus, frequens, & subdurus cum quadā tensione est: tympanitę autē longior, nō imbecillus, celerior, frequens, subdurus, cum quadā tensione. Eius verō qui in toto nascitur corporis habina (quæ Greci *anædromos* nominant) fluctuosus, lanor, ac mollis. Elephantiasis rarus pulsus, imbecillus, tardus, & frequens. Intericorū pulsus sine febris, minor, frequentior, durior, non languidus, neq; celer. Eorum qui sumperunt helleborū, paulo quidem anteq; vomant, latus rarus, languidior: cūm autem vomunt ac divelluntur, inæqualis, & inordina-

Paralyticorum pulsus.

Epilepticorum & apoplecticorum pulsus sunt similes.

Epilepticorum pulsus.

Angina laborantium pulsus.

Orthopnoea acuta pulsus.

Suffocationis producta ab utero pulsus.

Pulsus, differentia duos, pro variis organorum affectibus.

Hydropicus pulsus. Hydropis terna speciem.

Elephantiasis rarus pulsus. Intericorū pulsus. Pulsus autē qui sumperunt helleborum.

Inæqualis pulsus, qui ordinatus sit, reperitur raro. Phreniticorum pulsus.

Cataphoricus signus, & pulsus.

Catochon, hoc est, detentorum pulsus.

Convulsorum pulsus.

Percussio arteria multis imponitur.

Inordinatus : cūm meliusculē iam habent, ordinatus quidem, sed adhuc inaequalis, minus tamē quā prius . Cū autē inaequē iam, & penē ad statū naturalem redierūt, equalis & maior ī antea, vehemēnēdū. Qui vero ex his syncope corripuntur, convelluntur, atq; singulātū, in pulsus parvus & languidus, inordinatus, celerior, atq; admodū frequē. Qui ex his suffocatur, parvus, languidus, inordinatus, inaequalis, nō tamē frequē, neq; celer, sed subardus magis. Præ se fert autē & fluctuosū quiddā & latum, & nōnunquam exiguum quiddā arterie tensionē

excellit, vel eo est inferior. Vocatur qui excellit, longus; qui inferior est, brevis. In latitudine, moderatus, & alij immoderati duo: nempe latus, qui moderatum excellit: huic contrarius, angustus. Indem in dimensione profunditatis artus, unus moderatus est, alius altus, & alius humilis. Hæc pulsuum sunt in una dimensione acceptorum differentie. At differentie pulsuum quæ crinis simul dimensionibus, sunt septem & viginti. Perficere has manifestè in tabella. Unus enim erit longus simul & latus, aliusq; , qui omnibus præponatur: alius longus, latus, & profunditate moderata, scribandiq; secundum: alius longus, latus, humilis, qui siturdie tertius: similis que reliqui omnes cognoscuntur via & ratione, ut dixi: primæ dimensionis maneat immota, trariam vltima pariter, hoc pacto. Quartus longus, moderata latitudine, & altus. Quintus longus, moderata latitudine, similisq; moderata profunditate. Sextus longus, latitudine moderata, humilis. Deinde alij tres, primæ dimensionis longum servante, secunda angustum, tertia trifarij variante. In his novem, una dimensio permanet, longitudinis longe: alie omnino cōmutantur. Mox alteri novem, dimensione longitudinis in mediocritate servata, variantibus reliquis. Ad hæc novem alij, vbi longitudinis brevis dimensio fit, & alie immutatur.

GALENI PERGAMENI

de differentiis pulsuum, li-
ber primus.

Prima genera pulvum.

Vandoquidem arteriæ corpus est
cauam, longū & circumduſile, ha-
bēty perpetuū geminū motum ex
contrariis conſtitutū partibus (aur
enim in ſeſpam vندیg cōſiderat, ut
rē diſſidatur: qui duplex motus vo-
lū in vtroque gemina quies accidat
altera à diſtentione, priuquā cōſtralia
contractione, priuquā diſtendatur.
tem binas quietes experientiū tactus
nec minus demonſtrat ratio. Nam
rē motum natura, q̄ priorē ſedaue-
ditur. Arqui ſedari, ſuſſistere eſt, & in
ſic motibus intercedit quies. Experi-
ſeſcitatur, quoddam eſſe tempus pro-
uſus motus: aliquod etiam intermiſ-
narum item vniuſq̄ proprium. Iam
arteria diſtentionis, vt reliqua omnia
briū et, longitudinem, latitudinē, pron-
onari poſſet in ſingulis diſtentionibus
antes aliqua diſtentionis & contra-
actione contentiōnē quandam neceſſa
vt aur ager, aur languidē, aur prōptē,
operetur. Eſt etiam ipſa arteriæ tuni-
lia aur dura: necnon intercepto in-
uacua quodammodo, aur plena. Arq̄
aliquando æqualia, aliquando inæ-
r. Temporis item diſtentionis aliqua
eſt cum tempore contractionis. Aliū
ſu diſtentionem conſtituit præter has
diſtinctas omnes que in vnum pulſum in-
feruntur generales, quas reſtimus.

Quibus dux accedunt alię, quas collectivas appellaut. Ex his in plurim pulſum mutua cõ-
 ſentione, æqualitatem & inæqualitatem, ordinẽ
 & eius perturbationem æſtimamus.

Differentiae causae generis pulsum.

Ad motum ipsum pulsus, aut moderati & naturalis esse, aut tardiores, aut celeriores, oportet: quæ tres pulsuum circa motum differentie existunt. Firmitas pulsus celer, vbi modico tempore ipsa arteria mouetur: tardus, cum multo: moderatus, vbi mediocri. Differentie pulsuum in dissennotis quantitate, si quidem in singulis discernantur dimensionales, no nem numero sunt, in vnaquaque trium dimensionum tres. It longitudine arterie, qui moderatus in ea est, qui hum-

Terebra pulvis.
Brevis.
Larva.
Angustius.
Alia.
Humilis.
Pulvis diffusi-
bilis. Brevis
fuit. Lumen
nigra. arrip-
tione. fuit septi-
mum.

430000 000000
000000 000000
000000 000000

1. *...*
 2. *...*
 3. *...*
 4. *...*

100

70

1. *Introduction*

Arteria corporis
qualis.

Palsus quid
 Palsus rursus qu
 in cruce.

Militem cūtra
frons non ex
diti naturam
proui, quā
proui feda
uerit.

Arctura fortis
est dimensio
ma, perinde
reliqua corpe
ra.

діагнози не слід
вважати.

ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ

Properties of
an equation for

Deformation
value ratio

first.

பல்கலைத் துறைகளில்
உயர் கல்வி வழங்கும்

Color yellow.
Tardus.

*Diff. americana pro
fuerit in d. l. b.
tunc. Secunda*

James Joseph
rū, fūnd nōd

1	Longus	latus	altus	magnus.
2	Longus	latus	moderatus	
3	Longus	latus	humilis	
4	Longus	moderatus	altus	
5	Longus	moderatus	moderatus	gracilis.
6	Longus	moderatus	humilis	gracilis.
7	Longus	angustus	altus	
8	Longus	angustus	moderatus	gracilis.
9	Longus	angustus	humilis	gracilis.
10	Moderatus	latus	altus	turgidus.
11	Moderatus	latus	moderatus	
12	Moderatus	latus	humilis.	
13	Moderatus	moderatus	altus	
14	Moderatus	moderatus	moderatus	medius
15	Moderatus	moderatus	humilis.	
16	Moderatus	angustus	altus	
17	Moderatus	angustus	moderatus	
18	Moderatus	angustus	humilis	gracilis.
19	Brevis	latus	altus	turgidus.
20	Brevis	latus	moderatus	turgidus.
21	Brevis	latus	humilis.	
22	Brevis	moderatus	altus	turgidus.
23	Brevis	moderatus	moderatus	turgidus.
24	Brevis	moderatus	humilis.	
25	Brevis	angustus	altus	
26	Brevis	angustus	moderatus	
27	Brevis	angustus	humilis	gracilis.

19	Moderatus	celer	tardus
20	Moderatus	celer	celer
21	Moderatus	celer	moderatus
22	Moderatus	tardus	tardus
23	Moderatus	tardus	celer
24	Moderatus	tardus	moderatus
25	Moderatus	moderatus	tardus
26	Moderatus	moderatus	celer
27	Moderatus	moderatus	moderatus

Itaque tres in his sunt aequales, secundum 10. 12. 10. bella, & tertiusdecimus, & vigesimusseptimus. Celer enim secundus est: tardus tertiusdecimus: medius vitimus. Et iam alij duodecim pulsus, in primam tabellam transcunt. Nam primo primæ tabellæ, duo sunt similes, primus nempe & quartus secundæ tabellæ, hic tarditatis plus, ille celeritatis habet. Ex tertio, tertius & oonus, ille plus obtinet celeritatis, hic mediocritatis. Quinques viginti & quartusdecimus, ille maiori celeritate, hic tarditate præditus. Sexto decimusquintus, atque decimusoctavus, hic plus habet mediocritatis, ille tarditatis. Septimo vigesimussecundus, & vigesimusquintus: hic mediocritate, ille tarditate excellens. Reliqui de secunda tabellæ duo, vigesimus, & vigesimussexus, octavus sunt primæ tabellæ similes, hic mediocritate præstitus, ille celeritate. At duodecim secundæ tabellæ reliquos, qui prorsus sunt inæquales, nihil cum illis prioribus tabellæ consentire, clarissimè est: in quibus sunt ipsa est alcripta inæqualitas, non quod alij illi duodecim qui conveniunt cum prima tabellæ inæquales nō sint, sed quod in temis hi differentis motu aperta inæqualitas est prædicta, cum in binis differentis eam habeat alij. Sunt autè, si ordine à primo numerus, quintus, sextus, septimus, octavus, decimus, duodecimus, decimussexus, decimusseptimus, decimusnonus, vigesimusprimus, vigesimustertius, vigesimusquartus.

De tertia differentia pulsuum in vna parte inæqualium.

Qui repetentem pulsus, siue feriētem iterum (quem Archigenes dicrotum vocat) duos esse pulsus existimant, hallucinantur. Nam qui in vna distentione intermittit, quanquā iterū feriant, non ob id tamen eos dixeris duos pulsus existere. Quæmadmodum enim dum in malleo ad incudem ex longo intervallo prior validè pulsus incutitur ictus, illi secundus mitior accedit, veluti resurgente haud ita multum ab incude malleo, recidentem in eam languidius & breviori intervallo, sic dicrotæ pulsationes in vna distentione inæquales oriuntur. Arteria siquidem in occursum quasi repellitur, moxque redit. Cuius delapsum à primæ distentionis fine nulla dirimit manifestæ quies, qualis anima dvertitur inter systolem & diastolem, sed simul atque attolli desinit, ipsa arteria recedit, atque paulisper vibrata, mox occurrit iterum: id quod etiam in tractibus ramis deindeq. dimissis accidit. Atque vbi cum vi maiori tanta pulsus coequant, ipsius arteriæ partes vno eodemque tempore, hic quidem attolli, decidere illæ videntur. Sic itaque cum gignitur dicroti, differentis eorū in illis omnibus, que retulimus generibus erunt, plenitudo, durities, magnitudo,

vehementia, celeritas, & his contrariorum, tam in ipso primo motu, quam in reditu ab ipsorum discessu. Nā magnus potest esse & non magnus, sicuti & equalis & inæqualis: ac sic de ceteris differentis, quarum sanè cōmurationes, multas species constituunt dicrotorum pulsuum: quorū si quidem in vna distentione sunt differentia, inæqualitate occupant vnam partem duntaxat.

De inæqualitate diversarum partium in vna distentione.

Inæqualitatis quæ secundum diversas partes, primæ differentia sunt duæ, iuxta quas aut conōnuus est motus, aut intercisus. Reliquæ ex harum divisione gignantur. Nam cōtinuus, aut est equalis, aut inæqualis. Si equalis, aut remittatur celeritatis, aut intercisus à primo, sex modis, necesse est, ut paulo antè exposuimus. Inæqualis siut differentia plures, pro pulsus magnitudine longa, vel brevis, vel moderata. Nanque duobus digitis si motus occurrat, sex differentia existet: si tribus, quatuor & viginò: si quatuor, septuaginta octo. Nam cdm eorum quæ tres differentias habent, coniugationes existant viginisēptē, si quartū illis accedat, cui tres differentia inest, vnam & octoginta numero esse ratio postulat. Quibus si tres quæ erant aequales pulsus, eripias, reliqui quidem erunt septuaginta octo.

De differentis motus interrupti.

Interrupti motus primæ differentia sunt quatuor, quarum singulorū complures. At quatuor in hunc modum. Aut primus & tertius digitus motum senouit, non secundus autè & quartus: aut primus & tertius & quartus, nō autè secundus: aut primus, secundus, & quartus, minimè vero tertius: aut primus deniq. & quartus, secundus & tertius nequaquā. Vbi igitur primus & tertius duataxat sentiunt, nouenque pulsuum io singulis generibus differentia fiunt: vbi vero primus & tertius, & quartus, vigenque septenque. Totidē cdm primus, secundus, & quartus: at cum primus & quartus, non tertius. Atque hæc quidem est iam inæqualitatis diuisio, quæ diversis in partibus fit. Cōmiserunt porro variis modis ambæ inter se primæ differentia, ut non iam diversas tantum partes, verum etiam singulas teneat inæqualitas.

De inæqualitate quantitatis distentionis in diversis arteriæ partibus.

At verò inæqualitas quantitatis distentionis diversas quidem arteriæ partes occupans, cum anima dvertitur credō, tum percipitur facillimè, & interrupta, & conuua, æqualiter & inæqualiter. In vna verò arteriæ parte nō recipit huius generis inæqualitatem vnus pulsus, quod prius quā finem motus attingat, magnitudinē minimè deprehendi possit. Si quidem magnitudinis & paruitatis differentiam, nisi iam moueri arteria desisterit, nequaquam cognoscere possis.

Inæqualitatis vitalis contentione differentia.

Inæqualitatis verò contentione vitalis, eandem distentionem eam inæqualitas motus habet. Nam aut eandem partem, aut distinctas reoet. Eandem tribus modis: aut interrupto motu, aut perpetuo, aut dicroto. Distinctas bifariā, vel cōtinuo motu, vel intercisio. Singulorū præterea

Inæqualitatis pulsus, quæ secundum diversas partes arteriæ partem, sic differentia.

Interrupti motus in pulso, differentia quatuor.

Dicrotum pulsus, siue ferientem iterum, aut dicrotum, aut dicrotum, sed vni pulsus existere.

Dicrotum pulsus, siue ferientem iterum, aut dicrotum, aut dicrotum, sed vni pulsus existere.

Dicrotum pulsus, siue ferientem iterum, aut dicrotum, aut dicrotum, sed vni pulsus existere.

Inæqualitatis quantitatis distentionis in diversis arteriæ partibus.

Inæqualitatis vitalis contentione differentia.

terea horū generū totidem sunt singulares differentie, quot motus. Quin & cōmiseri etiam possunt vna in parte inæqualitates necesse est, vti illas quæ in diuersis sunt.

De inæqualitate corporis arterie.

Sed inæqualitas corporis arterie, ex qua pulsus aut mollis aut durus redditur, in vna quiddam non potest parte fieri: in diuersis fieri duobus modis videtur (non aliter ac inæqualitas motus & contentio) vti aut continuus motus sit, aut intermissus. Quo sit ut differentie huius generis sint eadem, atque prædictæ illorum. Verum arterie pars vna non potest in toto esse distentionis, mollis, dura in fine: aut contrā primò dura, in eorum mollis. Quare hæc tamen quidem ab hoc pulsus genere diuerſi & multitudine, duo genera distendunt priora, motus & contentio.

De inæqualitate ab infusa materia in cōiuratione arterie.

Pulsuum genus quod efficit infusa materia, in quo quidem pulsus plenus & vacuus est, eisdem habet questionibus ac superius quod quantitate distentionis constabat. Videbitur namque hic quoque obtinere diuersas partes posse in vno pulsui inæqualitas: vnam nempe eandem non posse. Porro quia evidenter in arterie sede febris calor qui sit, quàm si aliam tangas partem, cognoscitur, ideo probatur quibusdam, inter alia hoc etiam genus pulsuum annumerari, quo calor qualitatem pernoscimus. Cuius quidem generis inæqualitas & inæqualitas in vna distensione versantur. Ac inæqualitas erit differentie, prima, tum quæ diuersas partes, tum quæ singulas tenet. Quas iterū si prædictis rationibus secas, alteræ particularitatem plures nascuntur.

De inæqualitate ab sede arterie.

Est & aliud genus diuersum inæqualitatis in vno pulsui, quod à sede arterie proficiscitur: vbi pars quiddam eius dextrorū, pars sinistrorū, pars sursum, pars deorsum deflectitur: id quod accidit aut in duobus locis, aut pluribus.

De pulsui vndoso & vermiculante.

Aliud item inæqualitatis vnius pulsus genus est, quod vocatur vndosum. Ad cuius sanæ generationis rationem minimè videtur arteria in eadem inæqualitate simul distendi vniuersa: sed primò primarius pars, deinde secunda, mox tertia, & sic consistenter: idque cum elevatione quadam vndosa; altera vnda semper priorem excipiente. Prioris siquidem partis arterie dilatationem, secundæ cōsequitur, ut interueniat pars à motu libera nulla: verum propemodū quieti similis est finis vndarum. At non reperitur tamen vllam partem prius quiescentem. A vermiculante porro hic pulsus magnitudine differt. Neque enim eos qualitas, sed quantitas separat. Vtrique tamen, omnibusque eorum speciebus aliquid in eis commune, siue & aliquid propriū commune, vnde non enim uterque inuenit, vndoso quidem, exurgere quasi vndas in arteria alteram ab altera: vermiculanti verò, esse verius gressui cōsimilem. Differentie autem eorum hoc modo speciem sunt. Quibusdam enim recta fertur vnda: quibusdam in obliquum deflectit. Quidam etiam breui longitudine, altitudinem insignem sortiuntur. Sunt con-

trari, qui longiores altitudinem humilem: alii qui lati sunt, nonnulli angusti, alii etiam pari celeritate præditi, alii secus. Et contentio hanc etiam vnda plus, illa habet minus: interim finis est istarum differentiarum inæqualitas. Habent autem utriusque huiusmodi, cum vermiculantes pulsus, ut tales sint, à sola distentionis inæqualitate ipsius quantitatis. Vna enim hæc inæqualitas, adiuncto sibi, ut parium motus alter antevertar, alter cūctetur, huiusmodi pulsus gignit.

De pulsui formicante.

Iam verò ut vndoso pulsui succedit vermiculans imminuto ira formicans vermiculanti, vbi multis amissis motibus, in vno eundemque propriis parui defu erit. Quare inæqualitas ex præ exiguitate nos fugit. Est porro hic pulsus parvus (quo nec alius est minor) languidissimusque & creberrimus: non tamen (ut quibusdam visus est) celer.

De vibrato & convulso pulsui.

Superius autem vibrato & convulso, qui hæc tamen quidem sunt inter se similes, quod vnam locum arteria non teneat, sed sursum deorsumque agitur, naturali sese deserta. Distant tamen vel hoc ipso, quod non adeo in affectus in convulsi uos cadat in vibratis magnopere, admodumque perspicue: ac præterea, quatenus ex terminis vtriusque retrahi, contendique & conuelli convulsi videntur. Vibrant omni isto vacante. Ad hæc magnæ frequenter est dilatare vibratis, ac convulsis parua. Et partes arterie quædam superiora petere, quædam demum vno eodemque tempore aperte in vibratis cernunt: convulsus verò id per paucis & obscure accidit. Breuiter sentias vel vni fidem quandam intensam in convulso pulsui, quæ illi res cum nullo alio conuenit. In vibratis nihil simile animaduertas. Maxime enim iaculis motum eorum, quæ magna vi emissæ, celeriter impetu vibrantur, asimiles. Omnes autem hosce pulsus qui præter quinque illa prima genera in vna distentione inæquales sunt, horum duorum accessio constituit, quæ sunt, genus inæqualitatis in arterie sede, & cum maius aut ferius motum partes aspicantur.

De pulsui caprizante.

Pulsus etiam caprizans inter inæquales in vno pulsui refertur: estque etiam compositus, expers tam in inæqualitatis virtutis, quæ primis quinque generibus adiuncta erat. Verum vbi motum arteria interpellat quapiam in parte, motum potissimum generatur, licet non semper, sed vbi motus à quiete alter celerior primo & vehementior oritur.

De inæqualitate crebritatis, raritatis & rhythmi, in diuersis pulsibus: qui collectiuam inæqualitatem appellant.

Vbi omnia ordine æqua iustum sunt intervalla per omnes pulsus, æqualem distictam habere tunc pulsus esse: vbi verò partim maiora, partim minora, in æqualem in crebritate, raritateque. Rhythmi iam etiam eodem modo ex proportionem temporis iustum ad intervalli tempus constantem, cum deinceps maneat eadem, æqualem esse aiunt: quædammodum inæqualem, vbi talis proportio variatur.

Inæqualitas corporis arterie, sit in vna parte non potest: in diuersis partibus, modis duobus.

Inæqualitas pulsus ab infusa materia.

Inæqualitas vnius pulsus à sede arterie proficiscitur.

Vndosus pulsus quomodo fiat.

Vermiculatum pulsuum ab vndoso non qualitatem, sed quantitas, sed quædam sunt sola distentione. Vndoso & vermiculato pulsui, quæ eadem est quæ propria insit.

Vndoso pulsus succedit vermiculans.

Vermiculanti pulsui succedit formicans.

Formicans pulsus est omnium minimus, non minus est celer.

Convulsi pulsus.

Vibrati pulsus.

Caprizans pulsus quomodo generatur.

Collectiuam inæqualitatem.

Inæqualitas in crebritate, raritate, secundum distictam pulsus.

Aligulimus quod de æqualitate, quod in æqualitate dicitur.

De inequalitate crebritatis, raritatis, rhythmici, in vno pulsu.

Inaequalitas crebritatis, raritatis & rhythmici, in vno pulsu continetur exanimatur.

Partes arteriae aut omnes vna motu exordiantur, aut lax quidem maturius, illae autem tardius. Si igitur moveri omnes simul ceperint, postea autem morte, minus æquis temporibus dilatacionem altera aggrediantur, duorum generum in vno pulsu inequalitas erit: quod videlicet illa sit quidem cognita, ubi primum secunda de stentio corpis, in secunda tamen ipsa minime continetur: sicut nec ipsæ rhythmici, nec genus crebritatis & raritatis, cum & hæc ipsa fiant in vno pulsu, & quamvis ut cognoscantur, omnino secundum desiderent: quandoquidem ante huius initium, prioris nequid finis cognosci: quo incognito, nec crebritatem, nec raritatem, nec rhythmum valeas cognoscere. At verò tempus partis quæ præ ceteris prima motu deficitur, minimum est: maximum eius quæ vltima: proportionem autem mediam, in quantum aut à prima, aut à postrema absint. Contrà ac tempora motus, quietum tempora, longiora sunt illis quæ primæ à motu desistunt: in illis quæ postrema, breviora. Quare tempus motus quem habuit pars, quæ prima moveri desit, minimum, cum maximum tempore quietis eiusdem comparatur. Et vltimæ tempus, quod maximum erat omnium motus temporum, ad minimum confertur quietis eiusdem partis. Atque ita rhythmus in singulis commutatur, quatenus proportio temporis motus ad quietis tempus non eadem in omnibus manet.

Rhythmus inaequalitatem quæ modo fuit.

Si itaque dilatio quidem prior, in omnibus simul partibus suspicetur motum, sed non pari in omnibus tempore: secunda autem deinde & ipsa motum incipiat, non tamen simul omnium partium, sed prius quidem eius quæ prior quiescebat, secundo autem illius quæ secunda, atque ita deinceps: inequalitas quidem ita rhythmici fiet, crebritatis & raritatis non item. Nam quies cum in omnibus æqua sit, differentiam in crebritate & raritate efficere nullam: non respondet tamen motus tempus, tempori quietis. Siquidem motionis tempus non erat omnibus par: quietis erat, ac proinde non idem omnibus rhythmus erit. Quod si cum moveri arteriæ simul omnes partes ceperunt, non item simul omnes alteram distentionem ordiantur, nec priorem terminaverint simul, sed ne quies quidem in omnibus æqua sit, binas in eo necesse est differentias esse. Nam crebritatis & raritatis in alterutra differentia inequalitas fit, at non rhythmici tamē necessario. Possunt quippe omnium partium tempora motus, quietum temporibus respondere. Et si hoc, erit quidem rhythmus æqualis. Sin autem eadem in omnibus partibus proportio non confert, simul perdetur rhythmus. Iam verò ubi vna omnes partes moveri ceperint, motus æquo sint tempore, si secunda dilatacionis non idem omnes initium partes ordiantur, sed quædam maturius, quædam inaccesserint sensu, non erit iam rhythmus æqualis, sed crebritatis tantatque differentia. Hanc enim impares quietes inequalem efficiunt: rhythmum verò, proportionum commutatio. Ac tot sunt inequalitatis vtriusque vno in pulsu generis differentii, cum omnes vna partes arteriæ disten-

Rhythmus est, si inaequalis proportionum commutatio.

di ceperint. At ubi hæc primò, illa secundò distendi ceperit, si omnes simul quiescerint, ac dein distentionem vna alteram auspicate sint, necessario inequalitas in altero tantum genere fiet rhythmici. Quod si alteram distentionem arteria iuxta orsa sit, ac priorem, ut in vtraque distentione eadē pars prior altera pari intervallo incipiat, idem sit in omnibus partibus constant: atque illæ etiam simul priorem distentionem abolerunt, necessario vnoque in vtroque genere inequalitas erit: Ne omne tempus quod est ex motu & intervallo constaret, omnibus est æquabile arteriæ particulis. Sed motui proportionem, quod totum tempus in æquas partes non distribuatur, non respondet proportionibus quætuor. Quare simul inequalis rhythmus necessario erit singularum partium: & quatenus tempora intermissionum differunt, etiam crebritatis tantatque coniungi cum his inequalitatem est necessarium. Si verò altera distentio, perinde ac prior fecerat, initium motus partium sit orsa, non sit autem prioris distentionis finis omnibus idem, dux differentie oriuntur. Potest enim & longè quidē quiescere prius, quæ prius motum est auspicate: potest etiam posterior. Si igitur tanto quiescerit prius, quanto cepit, fiet ita æqualis in vtroque genere pulsus. Sin multo prius atque est auspicate quiescerit, duorum generum inequalem pulsus efficiet. At si quæ prior cepit desistat posterior, duorum generum omnino inequalitatem creabit: si videlicet aut multo tardius, aut paulo, quiescerit. At verò si nec prioris distentionis initium ex omnibus simul partibus, fiat, nec secundæ, est cum rhythmus possit esse inequalis, nec non crebritatis & raritatis genus. Verum si sic motui tempora temporibus quietum respondeant, rhythmus æqualis erit. Si verò tempora sola paria fuerint intermissionum, æqualitas erit in altero genere. Sed hæc infrequentia sunt: inequalitates vero permixtae. Nam omnes possunt simul partes à motu cessare, & non simul. Et cum non cessant simul, hæc prius, illæ posterior: iam enim vel longè prius, vel longè tardius,

GALENI PERGAMENTI de differentiis pulsuum, lib. II.

Non eundem usum hic liber pollicetur, ac primus: sed quam veratrum rationem habet, vel sciam omnium cum pane, & carnibus eundem que nunc dicemus, cum superioribus habent. Nutrire enim mentes illa sanas, hæc rescare pravas sententias valent, ut morbos quosdam. In primis autem mihi cum sophistis est bellum circa usurpanda nomina. Illi quippe ipsas res negligentes, barbaras quasdam voces, vendicunt citra delectum contractas, Græcorum communis nominibus: neque his sanè integris, legitimis, sed corruptis sumis: atque ita nobis aures obtundunt, quæ perpetuo sumus solliciti, ut nominibus quæ purissimis sensum interpretemur: ut clarissimè quæ mentem suam possit significare, ita sermone uti cum optimè, exultantes. Ad hæc verò, illi priusquam homonymiam distinxerint, singula definire conantur: vnde necessum est eos quam turpissimè hallucinari. Neque enim nomina sunt, sed rerum definitiones. Proinde quando

Sophista res ipsas negligens, de nominibus antiquis & sollicitus.

Definitiones sunt rerum, non nomina.

Definitiones i-
pſas tot debere
effigias res.

Chriſti doctrina
impri ſub
ſannat Gale-
nos.

Græci linguæ
vixit communis
dat Galenus.

Ad aliquid, et
ſe admodum mul-
ta generibus.

Pulſus maioris
doli, diſtans
quorū aut ſex
differentias.

Maximus pul-
ſus.
Dignus ſimpli-
citer pulſus.

Pulſus maximus
et parvus, ſub
prædicamento
Ad aliquid eſt.
Et quantitas
ſignificat.
Longus pulſus.
Latus.
Alnus.
Magnitudo
nulla cenſa-
re poſſit abſq̃
dimensionibus
tribus.
Quantitatem
vixit extenſio
vixiſſe eſt ma-
gnitudinem.

quando ab vno nomine res indicantur multæ,
tot definitiones, quot res, neceſſariò deſideran-
tur. Vbi verò vnus res plura nomina habentur,
vni tantum definitione eſt opus. Porro vbi Ar-
chigenes etiam de octo qualitatibus pulſuum re-
merariam illam ſuam nobis ſententiam protulit,
deſuiſſet aliquam addere, ſi non firmam demõ-
ſtrationẽ, et certè rationem validam: vt ne quis
immo ſtatim, veluti in Moſis & Chriſti ſcholam
impingens, leges audiret nulla itaſilitas demõ-
ſtratione. Olim etenim homo duarum linguarum
peritus, offendeſatur digito, omnibùſque erat
admirationi. At ſopliſtæ hodie nos multas e-
diſcere volunt, cæterum barbariſſimas, cum ta-
men præſtaret ipſis doceri vnam græcam adeò
ornatam & cultam, præterea communem omni-
bus, ac plenam humanitatis. Qua quidem ſi
imbutus fueris, neutiquam vt illi fateberis, omnia
prima genera pulſuum, qualitates exiſtere. Si-
quidem inter differentias ipſorum reſerri tum
magnum, tum paruum, tum medium conſtat:
necnon longum, breuem, latum, anguſtum, atq̃
alios deniq̃ aliter nominatos: quorum quidem
omnium vnum eſſe cõmune genus conſtituta in
qualitate, nemo ſanè mentis fateatur. Quippe
ipſius magni pulſus & parui, nõ qualitatem, ſed
aut quantitatem, aut ad aliquid, aut cõmune-
tam cum ad aliquid quantitatem eſſe genus, rationi
conſentaneum videtur. Neq̃ enim ſumus neſci, multis
generibus eſſe cõmune Ad aliquid. Siqui-
dem albus & nigrus ſunt in coloris genere. At-
qui color qualitas eſt. Iam ſuperius & inferius e-
tiam in genere Vbi: maturus item & tardius in
genere Quidam. In aliis etiam pluribus generali-
bus prædicamentis, verſatur Ad aliquid. Proinde
mirum non eſt, ſi in prædicamento quantita-
tis illi adſit etiam locus. Quare optimè ſanè va-
leas moderatum pulſum, qui deſideratur, oſten-
dere, ſi exquiſitè moderatū cognoris. Cæterū in
maiori pulſu, qui videlicet moderatū excellit, ſat
fuerit cõſtituere quinque aut ſex differentias. Ete-
nim illum qui omnes ſuperet, maximū appella-
bimus. Qui medius eſt inter maximū & mediū,
ſimpliciter magnus. Iam interponendi huic &
illi vtrinque bini alteri: vnus paulo maior modera-
to, alter qui magno paulum cõcedit. Alius item
qui magnus ſuperet: ſicvbi & alius qui ſit proxi-
mus maximo. Dicimus itaq̃ maximum & par-
uum pulſum, ſub prædicamento Ad aliquid eſſe,
& quantitatem ſignificare: in eſſeq̃ vtrinque ma-
gnitudinem, vt magno magnam, ita paruo pu-
ſillam. At longus dicitur, qui longitudine ex-
cedit medium: laſus, qui latitudine: altus, qui pro-
funditate: quorum intelligitur nullus in tribus
dimensionibus arterie, citra quas nulla magni-
tudo conſiſterit. Siquidem quantitas vnus eſt ex-
tenſionis, non magnitudo, ſed longitudo eſt: ex
qua nõ nullus longos & breues dicimus, nõ ma-
gnos vel paruos. Nec verò ita lineam vnq̃ appel-
lamus, ſed aut longam, aut breuem. Verum cor-
pora quæ trinam dimensionẽ ſortiantur, ea ma-
gna & parua appellamus. Proinde pulſus qui ab
vna dimensione cognoſcantur, a magnitudi-
nis quidem genere reiiciuntur: ſub eo autem qui
ſecundum quantitatem eſt, continentur. Vbi igitur

a proportionem tres illæ dimensiones diſcedunt,
atq̃ aliqua vel aliquæ illarū minuuntur, vel ſupe-
rant, quatuor & viginti pulſuum differentie na-
ſcantur: quas nos, quò vigintiſeptem eſſe obti-
nentū tres dimensiones pulſu differentias oſ-
tenderemus, cū prædictis tribus in tabella pro-
poſuimus. Quibus omnibus vnum commune
genus, quantitatẽ ſcilicet diſtentionis arterie, in-
venimus. Quòd ſi liceat etiã contractionẽ tactu
diſcernere, & in hac quoq̃ reſeruitur totidẽ di-
ferentia. Enimvero qui nullū aut longū ſe ſim-
pliciter pulſum poſſe animo cõprehendere, cum
omnino ſi aliqua ſit prædictis latitudine & pro-
funditate, mihi rudes primarū diſciplinarū vidẽ-
tur: quando quidem nec magnū etiam ſic concipere
poſſent, quòd videlicet ſimplex non de-
tur, niſi ſimul celer vel tardus, vel vehemens, vel
languidus, vel particeps ſit aliarū differentiarū.
Etenim qui ſine aliis eſſe nõ poſſunt, nõne me-
ra fatuitas eſt, ne cognitioni quidem repræſenta-
ri citra illa poſſent? Porro ex vnica dimensione
pulſus, multa nos cognoscere poſſumus. Nã vt
certè rem demõſtrare magnus pulſus poteſt, ita
etiam altus ſolus, non ſimul cum ipſo conceptis
aliis dimensionibus animo. At vero pulſus bina-
rum dimensionum, nec ad viam & rationẽ quic-
quam faciunt eorum, qui trinis ſimul dimenſio-
nibus intelliguntur, & a diuidendi ſunt metho-
do abduſti. Porro vbi ex omnibus differentiis
volumus intelligere compoſitū ipſum, tunc am-
iubet, vt propoſite rei totam perſpiciamus natu-
ram. Eam itaq̃ nos in ſimplices differentias reſo-
luimus, quòd aliq̃ eo, compoſitum exactè in-
telligi nequeat. Niſi verò totam rei naturam in
vnum completi, neq̃ in vna differentia & ſim-
plici conſiſtere valeas, nulla erit ars, nulla via vel
ratio, nulla deniq̃ vtilitas. Quamobrem nos pri-
mū pulſum vniuerſam naturam didicimus in
differentias, quæ ipſam conſtituunt: atq̃ hanc
quantitatem diſtentionis vocauimus, illam qua
litas iſtus, aliam qualiteris tunicæ, aliãſq̃ ordi-
nis commemoratas. Deinde in lue rursus ſimpli-
ces notionem inſtigauimus: vt quæ habet ra-
tionem differentia quantitaris diſtentionis ad
totam pulſum ex omnibus cõſtaram naturam,
ita inueniatur aliud, ad hanc ipſam ſe ſimiliter
habens. Sunt autem differentie omnes vniu-
cuſq̃ dimensionis, aliarum omnibus copulan-
dæ: vt in vnaquaq̃ binarum dimensionum co-
pulatione exiſtant nouem differentie, omnes vi-
gintiſeptem. Adſcribam vnã, poſtea de reliquis
etiam licebit diſcere.

1	Longus	latus
2	Longus	moderatus
3	Longus	anguſtus
4	Latus	moderatus
5	Moderatus	moderatus
6	Anguſtus	moderatus
7	Breuis	latus
8	Breuis	moderatus
9	Breuis	anguſtus

In hac ergo tabella tres longitudinis differen-
tias cõpſcantes cum tribus latitudinis, nouẽ ef-

Pulſum diffi-
rentia vigintiſep-
tem.

Compoſitum
non poſſit medi-
tari abſq̃ ipſius
reſolutione in
ſimplices diffi-
rentias.

ficumque differentias. Altera erit eodem modo tabella, cum tribus longitudinis differentis, conjunctionis profunditatis tres habens. Tertia præterea, in qua profunditatis tribus, copulabuntur tres latitudinis. Erunt itaque omnes differentie viginti septem, cum singulae tabellæ novem contineant. Cæterum hos omnes pulsus, qui concipiuntur huiusmodi, ob dictas causas omnimodis tradidimus autem eos, qui singulis dimensionibus intelliguntur, numero novem: atque eos qui tri-
nas simul, quos in tabella descripsimus, viginti septem: quorum omnium fecimus cômune genus quantitatæ distentionis. Porro excessus pulsuum atque defectus, qui vna dimensione intelliguntur, à principio dividere poteris: vt in magno nobis est demonstratū. Nam moderati soli singulis generibus indistinctibiles sunt: alij autem, plures diuisiones recipiunt, ac sua quidem natura infinitas. Quod enim genus maiore & minore excessum & defectum obinet, infinitas necesse est differentias fortitur, non tamen secundum sensum. Ergo esse quoddam genus pulsuum, qui in quantitate distentionis consistunt, satis ostensum est. At quandoquidē celer quidam est, & tardus, & moderatus, in arterie motu pulsus: atque horum cômune genus qualitas est motus: num aliquid invenire cômune genus valeamus qualitatibus & quantitatibus, nobis est attendendū. Quod si nequeamus, in prima referemus genera, tum quantitatē distentionis, tum qualitatem motus. Cū autē qualitas motus differat à qualitate corporis ipsius arterie, certē qualitates prædicamentā cômune erit vtriq; generi: tamen genus haud item ambæ qualitates viliam cômune obtinent. Nam per homonymiā vtraque affectio qualitas dicitur. Neque enim eadem est in ambabus qualitas, sicuti in albo & nigro, atque frigido & calido. Genus autem pulsuum in quantitate distentionis, à genere motus, corporis arterie, planē distat: quantitas siquidem à qualitate distat: atque idcirco etiā à genere contentione, necnon à rhythmico, & ægrotæ ordinis & perturbationis illius, sicuti & æqualitatis inæqualitatisq;. Quæ quidem prædicamentum Ad aliquid attribuitur omnia. Proinde superest, vt illud cōparemus cum genere crebri-
tatis & raritatis: nam hoc consistere videtur quantitas temporis quietis. Sed sub idem sic rursus prædicamentū reducitur: genus amborum tamen non erit idem. Nam genere toto quantitas dimensionis corporis, à quantitate abest temporis. Ac nullum sanē esse, apertū est, in pulsibus genus altius, quantitatē genere distentionis. Verū differentie ipsæ interdum quidem atque cōmuniter accipiuntur, tum pro generibus, tum pro speciebus: peculiaribus autem pro illis quæ in diuisionibus reperiuntur, quæ nec species sunt, nec genera. Differentie tamen nomen potest omnibus assignari qualitatibus, quantitatibus, relationibus, & vno verbo, vniuersis. Nam ab eo quod differat vnum ab altero, nomen differentie factū est & conceptum. Differunt autē quedam statim primis generibus prædicamentorū, vt homo, albam, bicubitale, dextrā. Nam vnum illorum est substantia, alterum qualitas, aliud quantitas, aliud Ad aliquid. Quedam subiectis

generibus sub his: vt album & triangulare. Color enim, illius est genus: huius figura. Hæc rursus ambo prædicamento subiecta sunt Qualitatis. Itaque albo primū prædicamentum cum triangulari conuenit: est enim vtrunq; qualitas: cæterum generis sunt diuersi, hoc figurati, illud colorum. Alia iam specie differunt, cum non differant genere: vt album & flauū. Similiter alia differunt numero: vt, grana exempli, album ab hoc albo, peculiari quadam differentia distat, sed eidem speciei subditum est, albo: præterea vtriusque idem genus est color, & commune prædicamentū Qualitas. Atque ita sanē quodlibet à quouis, alterum ab altero prorsus aliquatenus differt. Quando igitur differet: si à differendo appellata est, & inventa: differre autem tum indidua, tum species, tum genera inveniuntur subaltera, & semel omnia quæ aliquo modo sunt: differentiaq; rebus omnibus inest, nō autē qualitas: malē vtriq; Archigenes prima genera differentiarū pulsuum, qualitates vocauit: nos autē rectē, atque ordine, cum hæc, nam alia omnia, differant. Quare etiam vniuerso operi titulū fecimus, De differentis pulsuum.

GALENI PERGAMENI de differentiis pulsuum, lib. III.

S I amor sapientiæ atque honesti singulis iuxta placeret (vt ait tragicus) nulla foret mortalibus contentio ambigua. Nunc quia non videntur omnibus idem nec honestum, nec sapientia esse, neque etiam verum, necessario controuersia nascitur. Cæterum qui in dubia opinione versatur, quod non assequatur scientiam, ei condonandum fuerit. At qui de nominibus digladiantur, nec viliū hic faciunt finem aut modum, minime mihi venia digni videntur. Nam rerū cū sit ea obscuritas, vt si vel in tripulum hæc vita nostra prorogaretur, ne tum quidem exacte cognoscere omnia possemus (qua ratione adductus Hippocrates, vitam aut effe breuem, & artem longam) quo modo, qui in iis quæ ab re sunt tempus conterit, absurditatis impudenti notam abiciat? Et enim de nominibus laborare, est prorsus operam ludere: res autem ipsas expendere, artes locupletare. Perinde siquidem est si vocemus ipsum pulsū Dionem: dicamus autem illum dignosci exacte, si comprimamus arteriam, nec leuiter attingamus: necnon pulsū proficisci à robore caluitatis vitalis, esseq; signū salubre in morbis: & præterea quales indicationes soleat promittere. Porro ipsius robur ictus, in tactus impulsu, repulsa, subuersioneque positum esse, omnibus in profecto est: at à qua causa fiat, controuersum existit: vniquisque siquidem propriam opinionem tuetur. Citius autem Moysi affectu & Christi sua deserant dogmata, quàm qui sectis addicti & consecrati sunt, tum medici, tum philosophi. Itaque inter pulsus est quidam, qui tactum ipsum sub vertit: id est, valde & cum renixu quodam pulsat. Dignoscitur autem is, vbi plurimum in huiusmodi digito, non leniter palpamus. Causa cuius existit, facultatis robur pulsus efficientis. Proinde si de medicis vocabulis primò omnis nostra potestas sit instituenda,

Moderati pulsus singulis generibus indistinctibiles sunt.

Differentia non modo sed etiam.

Pulsus differentiarum genera prima, Archigenes perperam qualitates vocauit.

Contentio est vnde nascitur.

Vita brevis, aut longa.

Differentia in verum atque pro generibus speciebusq;. Differentia non nisi quibus pulsus assignandi.

Pulsus proficisci à robore caluitatis vitalis, esseq; signū salubre in morbis. Robor ipsius arteriarum uelut, non quod pulsus sit. Chrysostomus distinetur summum Galenus exprimit.

Pulsus contrarius.

Vacuum nihil in arte dicitur. Pulsus vacuum, quomodo intelligendus sit.

Vicium aut vacuū vas præcipui dicitur casu substantia ratione. Metaphorice est abstrahendum ab artificiali doctrina. Sanele corpus nullum esse plenum aut vacuum. Dura quæ sunt, mollia quæ.

Tactus autem solidus, mollior. Mollia esse quæ cedunt tactui. Dura esse quæ nostram repellunt cutem.

Aristoteles præfator Platoni.

Molle esse quod in seipsum cedat, aut migrat alio.

Durities autem qualitas tactus. Qualitates tactus quæ sunt.

tuendis, contentum eum pulsū, non vehementem vocemus. Nunc quia à pluribus iam pridem vehementem est vocitatus, nomen nihil mutamus: tamen non finis nesci, vehem enim non actioni semper tribui, contentæ simulatque citare. Iam verò dum vacuum pulsū appellante, cum nihil omnino vacuum in orbe datur, bisariam illum interpretabimur. Nam aut arteriam sic intelligimus vacuum, ut quæ aërem tantum contineat: & quamquam sit plurimum inflata & distenta, vacua tamen sit appellanda, ut inflatus culeus vacuum dicitur vino: aut ita illam vacuā esse dicemus ut vites ipsos, quādo aëre ex pulso, eorum tunice consistunt. Ac primā sanē significatione erit pulsus talis, qualem Erasistratus naturā eam semper asserit esse: altera nihil à paruo differet. Itaque necessum videtur, ut aut paruum pulsū, aut aërem, vocemus vacuum: itemque contrarios iis plenos, magnum scilicet, atque eum qui humidam speciem refert. Præcipue tamen infuse substantiæ ratione appellare licebit plenum aut vacuum vas: ratione autem tunicarum arterie, aliter: quas rectius sanē duras & molles, non plenas vel vacuas appelles: cum simile corpus (nisi per metaphoram, quæ à disciplina artificiali abstrahenda est) quod vacuum vocetur vel plenum, sit nullum. Quidō quidem autem omnia corpora, ex terra, aqua, igne, & aëre constata sunt: in quibus exuperat quidem vel terrestris elementum, vel aquæum à gelu concretum, non possunt ea non dura esse in quibus verò igneum, vel aëreum, vel humidum elementum excellit, non concretum, necessum est ea mollia existant. Præterea si prædicta foraminibus sint, vel meatibus, si superior ibi sit terrestris substantia, vel aquosa concreta, facit necessariō ad rationis duritiem corporis: si subtilis vel humida, sed non concreta, ad molliem. Est autem in nobis tactus iudex corporis duri mollioris. Quem quidem dum applicamus obiectis, quæ offendunt illum admittere, & quasi subeunt cedere, mollia appellamus. Contrā, quæ vim afferunt cuti nostræ, & protrudunt, si hæc cedens virginitus intus excipiat, dura illa vocemus. At si omnino cedat & decidatur ab uterque, id quod concedit, imbecillius omnes: quod dicitur, validius appellant. Porro Aristoteles elimarius quā Plato non id quod eedit, appellat molle: sed ei addit, modō, quod in seipsum: modō, quod loco non dimouetur. Quod si simul utrumque addamus, ut in secundo libro de Generatione & interitu Aristoteles fecit, ac molle dicamus esse, quod in seipsum cedit, nec migrat aliō, adhuc definiemus aptius: utrumque siquidē soli accidit molli. Nam cedere quidem, commune solum pectus est molli, & imbecillitati in seipsum, solius est molli: ut nō in seipsum, imbecilli tantum. Præterea, ut in vicinum locum migratio, propriū infirmū est: ita nō demigrare, vnius molliis. Iam verò, ut tangibile est corpus durum, sic durities est qualitas tactus. Si quidem qualitates tactiles sunt, calor, frigus, humiditas, siccitas, grauitas, leuitas, durities, mollietas, lentor, friabilitas, asperitas, leior, crassitas est atque tenuitas. Quæ omnes exprimi tangibiles qualitates possunt, & corpora non secus

iis prædita. Quippe horum pariter septem sunt oppositæ coniugationes, & nomina quatuordecim. Prima est oppositio calidi & frigidi. Secunda, siccitatis & humiditatis. Tertia, grauis & leuis. Quarta, duri & molli. Quinta, leni & friabili. Sexta, asperi & leui. Septima, crassi atque tenuis. Ducum igitur corpus: quod sit propriè & primariè appellatur, renititur, & nihil tangenti cedit. Quia verò multa corpora duro accidunt, vnumquodque eorū metaphoras nobis suppeditat: inter quas sanē ut repudiamus obscuras & tectas, sic probamus illas, quæ apertam illustratēque similitudinē præ se ferunt. Ut, dum legem duram & iudicē dicunt, qui à venia danda sunt omnino alieni. Corpus itaque arterie, vel durum, vel molle primò & præcipue est dicendum. At pulsus eius statim denuncians, non propriè, nec primò, sed per accidens venit durus aut molliis vocandus.

GALENI PERGAMENI de differentiis pulsuum, lib. IIII.

At verò, ubi etiam ante definitiones, ipse res notæ existunt, nullas profecto est vitis definitionum: quemadmodum in pulsus appellatione, quam intelligunt etiam omnes mortales, nedū medici. Proinde incusandi sunt, qui circa definitionem pulsuum inter se maxime digladiantur, alij aliud esse pulsū censentes. Sunt porro definitionū prima genera duo: alteram quod planè rei notionem explicat: alteram, quod ipsam essentiam docet. Virtus est suæ utrique definitioni: illi quæ notionem explicat, ut omnibus sit testata, qui eodem sermone vtuntur, & ad rei essentiam ne aspiret. Huic quæ essentiam docet, ut ei quæ non omnes subiiciat, consentiat, non sit tam eum ea eadem. Ac prima quidem debet ex se ipsa fidem habere, res perspicuas explicans, manifestasque. Vnde Aristoteles eam definitionem nominis appellauit: scilicet alteram esse definitionem aut, quæ quid sit, explanat. Etenim quibusdam in partibus curis, nō modō tactu, sed etiam oculis, motum quandam percipimus. Qui quidem in iis qui rectè se habent, in multis corporis partibus cernitur: de quibus est carpus manus. Palim siquidem illi deprehendimus ascensum quandam atque descensum, præterea mediam intermissione. Quam sanē mononem omnes pulsū appellant. Hunc qui breuibus possit interpretari, optimè definitionem ille non omnis efficeret, si nec omittat quicquam, nec superfluum aliquid addat. Vbi dicat, eum talem motum, esse arteriarum pulsū. At si quæ tunc arterie explorant, facultatēque repererit quæ arteriarum motionem excitat, ipsius motionis vsum cognorit, is certe ut prætergressus motionem esse, sic vniuersam essentiam pulsū generationis tenuerit. Veritatem ista quidem nequeas definitione vniuersa complecti. Vnde sit, ut nulla pulsū definitio profus

essentialis constitui possit: aut certe prælonga erit. Sensibilis itaque illi arteriarum motus (quem quiete interpellari diximus) pulsus vocatur. Nihil autem apertius est, quā motum ipsum in altum lazum & longum extendi, in gracilibus corporum, atque in maximis pulsibus. Carterum

Tactum ut porum seipsum opposuimus.

Durum corpus simpliciter.

Metaphora quæ nam sint recipienda.

Pulsus dicitur durus aut molli ex accidenti.

Definitiones prima genera duo, notissime videlicet, atque essentialia.

Definitio nominis. Definitio quod sit explanans.

Arteriarum motum in corpore esse oculis percipibilem.

Pulsum essentialis definitio, quæ breuissimè, nulla constans potest.

Pulsus quid.

*Pulsus vñ
est intera inna
ti caloris.*

*Arteria attra
henti dum dila
tantur: respi
ritus autem con
trahitur.*

*Pulsus defini
tus essentia.*

*Consultis &
remor, in solu
cissis nervis.
Palpitationem
peritiam in
tate.*

*Rarum & cre
brum duo pul
sum, ut respo
ndent, pro dis
cretis a quatu
or modis.*

*Pulsus esse in
sum motu ait
Zeno.
Definitio res
qua in genera
tione est, huius
que habeatur
prima.*

integram pulsus definitionem feceris, si vñ eum generationis adiunxeris, quæ tutela innati caloris existit. Facit autem ad procreandum animalem spiritum, illa spiritalis substantia, quam arterie continent. Atq; attrahunt quidem arterie, dum dilatauntur: excernunt autem dum contrahuntur. Igitur definitio essentialis, quæ oratio est rei efficientiam edocet, necessarium est genus explicatura, & differentias, & vñ generationis: causam item efficientem, & materialem, aut instrumentalem, aut vñque appellare volueris. Vt Genus, aut motum, aut actionem, aut passionem arteriarum. Differentias, quod per distentionem & contractionem, quodq; sponte. Vñ, quod innati caloris nomine, vel spiritus vitalis generandi, aut herede etiam animalis. Causam efficientem, quod vis sit quædam cor distendens & arterias, aut vitalis, aut animalis, aut vñque. Materialem denique & instrumentalem, conformacionem arteriarum ad actionem, videtur demonstratur. Atq; ita suam quæq; secta rationalis, fortinetur definitionem. Nos verò dicimus pulsus esse peculiarem actionem, cordis præcipue, deinde arteriarum, quæ distentione & contractione moueantur a facultate vitali, quod caloris natui medioctius retineatur, generetur autem in cerebro spiritus animalis. Verum apud tyrones cuiusvis disciplinae, minimè sanè proficere debet substantiales definitiones sunt: sed vbi à notione exoritur, ad essentiam eos notitiam ducemus, hic tam, promptæ memoriæ gratia, rem vniuersalem limitata complecti ratione fuerit expedire. Cum valeamus igitur, cordis & arteriarum motus, quando illa distenduntur vnde quæq; rursus in se confidunt, pro dignitate obeuntur. Sin autem ægrotemus; vt palpitamus, vel concutimus, vel convulsus, vel tremulus motus arteriarum apparcat, nul noui est, si pulsus vocemus modò convulsus, modò vibratus, interdum palpitantem, interdum tremulum. Quanquam certe convulsio ipsa tremore, in solis contingit ueris. Nam palpitatione peripicuè ent fieri in cutem: sicut vñ & in carnosis partibus, quæ potiores sunt musculari. Porro quietes pulsus non leuè obfusiores sunt, quàm respiracionis: ob idq; nonnullas inter partes pulsus minimè annumerantur. Quiescit autè thorax & pulmo id temporis quod intercedit inter ingressum spiritus, & eiusdem exitum. Ac pro tempore quidem haurimus quietum, raram appellant, vel crebram respiracionem. Similiter dicuntur rarus & creber pulsus: suntque vñ cum æqualitate sua & inæqualitate, cõtemp ordine & illius perturbacione, ex eorum genere, quæ non parua nonciatur. Idem intermitentes pulsus & intercurrentes; ex eodem hoc genere, futurorum sunt haud negligenda signa. Non perperam autem Zeno mixtum quendam motu ait esse pulsus, non simplicem, neq; uniformem: cum ex cõtrariis motibus consistit, vt motus respiracionis. Porro quod cõmune est omnibus pulsibus, id debet in definitione proficere: nempe res per quam pulsus concipiuntur, dicuntur, non per quam certi quidam pulsus. Ad hæc, rerum quæ in generatione sunt, definitio causam efficientem complectens, optima

habetur: de quibus est pulsus, qui vt ceteri motus, dum sit, est. In vniuersum igitur, definitione quidem significationem explicare proposui nominis, si quidem proposui rem non omnes planè assequantur, non dico conducit, sed necessarium est. Necessarium etiam, vbi quis vel veritas de industria, vel præ insupore imprudens, significationes cõmutet nominis, tribuens aliis rebus, ac omnes homines. At si absq; vtroq; horum sit, omnino res nō est aperienda definitione: quod suū ipsam nomen abvnde declarat. Nam definire omnia velle, ad sophistici pertinet disciplinam.

*Definitio
quando citre
explicanda,
quidam muni*

*Definitio emula
verbi, ad sophi
sticam pertinet
disciplinam.*

GALENI PERGAMENI de dignoscendis pulsibus, liber primus.



Peculiariter autem hæc quæ ad pulsus dignoscendos spectat, minimè quidem oratione prolixam desiderat, sed tempus aliis simul omnibus longius: quandoquidem taciturnitas nobis opus exercitatio, vt vel paruum eorum ex ætate differentiam sentiamus: nec in nostra manu est illius exercitatio. Itaq; ad exercendum taciturnitatem medicus plurimū temporis postulat, utpote cui plurimi vno eodemq; tempore affectus arterie sint perpendendi: primū distentionis quantitas: dein qualitas & temporis motus: quin & motus facultatis cõtenno, ac deniq; ipsius tunice arterie status. Hæc enim simulatq; illa attollitur, omnia sunt cognoscenda. Quin etiam caloris qualitate, * impulsus, qui in arteria motione fir, a peritiam indicat: & etiam æqualiter an in æqualiter illa quæ memorauimus omnia, vna in parte & in diuersis fiant. Atq; in distentione hæc consideranda sunt. In contractione sanè similia illis: præterea tempus inter vtraq; mediū, quod quiescit, duplex illud: vñ à distentione ante contractionem: alterū à contractione ante distentionem: & horum natura proportio, videlicet temporis motus ad tempus motus, temporis quietis ad tempus quietis, & vtriusq; simul ad vtriusq;. Quæ sunt vniuersa ante alterū arterie ictum cognoscenda, cõfecto iam primo pulsu. Nam cum iam alter inciperit, cum ipso prima sunt attendenda, quæ declarata in priori fuerūt: tum verò quod æqualitate eorū & inæqualitate per spicias, omnēq; differentiam, quæ in illo tempore exposita, cum in quæ in hoc, conferenda sunt. Inde tres, quatuor, quinque, atque adeo multi deinceps sunt pulsus videndi, vt ordo tibi atq; cõfusus sit explorata. Ad quorum omnium absolutissimam cognationem, totam humanā requiri vitam existimo. Quancūq; certè exercitatio a studiosis, vñ tandem scientificam cognationem conciliatur, cum maximo emolumento: vbi quispiam fuerit, vt veritatis studio accensus, sic ab immensa diuitiarum siti, ac gloriæ cupiditate (quæ hodie dominatur inter mortales) alienus: Neq; verò delictis deditor, sed egregie nauis industriosis, hæc cõmentatio delectat. Porro dum pulsus admodum manus, hic quidem firmus est insignenda, illic applicanda leuius, vt in vehementi & languido pulsū. Nam illum, nisi premas arteriam,

*Pulsus digno
scendos admodu
litterarum tempus
desiderat.*

*Tangendi arteria,
qua simul
fuit propensio
de, ad disten
tionem pulsuum.*

*Vita humanā
totam desiderari
ad exercitiam
dignoscendos
pulsuum.*

*Exercitatio af
fictiva vñ, atq;
scientificam co
gnationem con
ducit.*

*Pulsus vehemē
tissimus cuius
corda est mag
is: vt in tempore
applicanda
leuius.*

non

nō dignoscas: hunc tantum abest vt cognoscas premendo, vt semel etiam si ita facias, videatur immortuus. In convulsivo autē pulsū, aut minime sentiri dūstis, aut parum certē & obscure videtur: arteria nimirum ipsa in fids modum sursum deorsumque iactata. Similiter etiam si ē vibratus pulsus, vbi arteria propriam sedem deseruit. Si tamen animum intendamus, nō modicū ictus (vt opinantur Empirici) sed distictio etiam omnium pulsuum, tactu ipso cognoscitur. Quod autem contractio etiam sensui possit, his rationibus evadit perspicuum. Quandoquidem tangentia corpora partim leniter sese ac mutuo tangunt, palpantia duntaxat: partim vero virgute, impellunt, evertunt: atque ita quod fortius est & durius, veluti subit imbecillius & mollius: alterum autē cedit, evertiturque, ac veluti amplectitur id quod virget: sanē discessus eorum mutui nō potest eodem modo effici: ceterum quae in superficie tangunt, discedunt subito. At quae cedente molliore, longius progressa, veluti intrat illud, nō revertuntur immo subito: sed quanto ā primo occursum progressa genitus virgebat, tantum illis discedentibus sensibile superest. Tempus namque intercedet inter primū impetum discedendi, & extremū finem, secundum quem nō discedere amplius, sed subsistere iam dicuntur. Quo tempore toto, paulatim discedente altero, paulatim etiam alterus remissio pressu, vtriusque sentitur motus. Iam si hoc accedat, vt quod ab imo mouetur, ferat hunc sensum: & quod tangit, superne incumbat: praeter hoc, quod pressus ei qd incumbit, detrahetur, etiam accidet ei, vt veluti subfidat: quia quod prius excipiebat, & sursum impellebat, nunc defertur. Quorum sanē omnium in vasis ipsis & vmbus, positis periculum facere, cognosceret, si se habere contractus corporum, atque recessus, vt diximus. Sentimus itaq; ab impressione vellemientium pulsuum, carnem nostram, vna cum ambiente illam cute, repellit: huic autem est adiuncta moti & prementis cognitio. Quinetiam recedente arteria sentimus in ipso corpore nostro motum. Si quidem inter compressa, siue ea cuius est, siue carnis pars, committatur descendente arteriam: persistant eodem, qua deiecta erat, occupata: similique sit, vt in excessus cognitionem veniamus. Nam sentimus primos omnes, affectus nostrorum corporum: deinde, quae hos induxerunt foris obiecta. Vbi igitur ā premendo recedit arteria, sola inaequalitas pressus, redium & contractio eius annunciat. Porro languidos pulsus, si quis leniter tangendos illos ignoret, fortasse aboluit homini pulsū dicit: qui quidem mentietur inde, qd non recte ipsos terigit. Contra planē vehementes, quos ipsorum deprehenditur robur, requirunt, vt qui tangunt, digitos valde infigant. Repellat enim hoc tibi magis videbuntur, quo eos virgute magis. Vnde etiam contractionem omnes vehementer pulsus habent sensibilem: languidiorum vero nullus. Ceterum qui maximus simul & vehementissimus durissq; sit (quatenus coniungi cum magnitudine durities valeat) non autē velox, hic a peritissimā habet contractionē. Omnes autē, quatenus plus vel minus de illorum aliquo ha-

beant adiunctum, ceterum percipiuntur aut facilius aut agrius. At verō non vt maximos simul & vehementissimos, ita durissimos eisdemque maximos vnquam pulsus reperias: ac ne duros pariter & maximo: sed qui inter durum & mollem medius est pulsus, cum maximo connexus invenitur frequenter. Etiam durum simul ac vehementem non raro eundem cernas: sicuti & durum simul & vehementissimū. At vehementissimus & durissimus nunquam idem pulsus existit: nec maximus, vehementissimūq; atque idem tardissimū. Quippe maximi & vehementissimi maiori ex parte sunt celeres: si minus, at nō tardi. Vehementissimus ergo & maximus, qui nec mollis sit, nec velox, clarissimam contractionem adducet. Claram etiam vehementissimus certē, & magnas, & duras, & etiam vehementes simul & magnas, & duras. Minus autem quilibet horum, sed evidens tamen: contractio vehementis, magni, & mollis existit. Manifesta adhuc vehementis simul & moderati magnitudine atque duritia. Imo verō qui tribus differentis est moderatus, perspicuam adhuc contractionem fortitur. At non facile contractio vehementis & parvi, qui omnino etiam durus est, cognoscitur. At parvi, durusque, sed contentione moderata, etiam obscurior est. Iam si parvus nec durus sit, & moderato robore, vt deprehen daturis, sensum flagrat probe exercitatum. Languidus pulsus, neq; cum magno coniunctus, neq; cum parvo, apertam obinet contractionem. Is si cum duro iungatur, necessario erit minimus. Itaque non cuiusvis pulsus potest contractio sentiri: nec quorū potest, perinde omnium est evidens. Ceterum vel vehemens, vel non languidus is pulsus sit, est necesse, qui sensibile tangentibus contractionem fuerit representantur. Porro ex sanis, qui moderato sunt corpore, & temperata natura, in flore aetatis, maxime Vere inter anni tempora, regionemq; incolunt temperatam, atque robusti sunt, & omni robore, metā, saturitate, motiq; vacui, hi pulsū vehementem magnūq; omnes habent. Qui si se moderate exercuerint, foris sint modicis balneis, vel vini non permulsum hauserint, vel irati sint, vel aliquam operam strenuam navaverint, non magnos iam & vehementes tantum, sed quāmaximos, vehementissimosq; pulsus habebunt. Idem si laborant fynexa tertiana, vel ardenti, mni, & simplici, vel qua alia magnopere calida, & veluti ferente febris: praeter ea diuturnam aliquā, quae ex bubone proficiuntur, & ex adfectionibus, modicisq; institutibus, maximos etiam, & vehementissimos pulsus habebunt. Quorum quidem si arterias coniungas, clarissimam contractionem persenties. Nam vt maximum recessus arteriae spatium & tempus in illis est, sic a peritissimā erit cognitio. Sed nōnnulli etiā conducat dūstis, ad percipendum systolem, quā ad vinctus magnopere conferat. Quod igitur distentionis violentiae semper respondeat contractionis sensus, hoc contractiones dignoscantur clarius, quo violentioribus succedit dilatanonibus. Magnus in pulsus haud facile & duro miteretur. Ceterū quib; valida vitalis facultas est, sed in vinctu

Cum vultum
pulsus.

Vibentem pul-
sum.

Citraltationem
pulsus etia fen-
turi posse.

Durissimus simul & maxi-
mus pulsus
non reperiri
vngunt.

Pulsus inter se
convenit, ut qui
eodem non pos-
sunt.

Contractio ar-
teriarum in
quibus contractio
sit pulsus
bus obscura.

Arteria systole
quidam deprehen-
datur.

Pulsus languidi
de esse leniter
concretales.
Pulsus vehementes
non sunt valde
approbati.

Diaria febris
vnde proficiat
ter.

Arteria dūstis
differt planē
ad percipienda
systolem.

delinquit, ac præcipue in vini interpectus ponens, ut tales pulsus cōtingunt, conspicuū est in eis ipsius arteriæ cōtractio. Iam tarditas, quā tum auget recessus tempus, tantū manifestiorē motum offendit. Quod verō ad manus applicatiōem pertinet, si comprimendo applicemus tactum, nulla differentia sensibilibus ex manus super arteriā, vel subter, applicatiōe inuenitur. Vel si palpatio tantum, veluti suspensio dignis, ne tum quidem vllam differentiam animaduertamus. At tertius applicandi modus, qui medius est inter compressionem & palpatioē leuē, ne obiri quidem potest, si infernē tangas arteriam. Si quidem liberare oportet tum manum omnibus voluntariis monibus, & veluti languidā admoquere. Quod nō fecerimus, delabatur manus ita grauitate depressa, vt minus cōtractare possit arteriam. Proinde superne attingere tantum licebit, infernē autem nequaquā. Quatenus igitur in vehementibus magnis, nec velocibus pulsibus, ab arteriæ distentionibus tactū repellit accidit: hæcenus recedente illa, sensibilibus contractio fiat, necesse est. At verō contractiōē magis comprimendo, quā leniter attingendo, dignosces: nec minus si infernē tangamus, quā si superne: quōd perinde utrobique arteriæ contractionem tactus sequatur. Verum manus ipsa quæ tangit, non modō promptē sentiat oportet, verumetiam sit mollis: sic enim vel minimos motus dignosces. Similiter etiam, si per longius intervallum feratur, clarius cōtractionem percipiet. Et enim media applicatiō quæ circa vllam vim sit, hæcenus motum sentiet in pulsibus minime certē languidis, quatenus visus: in languidis verō sentienda, etiam visui conceder. Altera, cum premimus, in languidis, supra primam, motum arteriæ obscurabitur in vehementibus percipiet prius ceteris. At tertia, qua veluti suspendimus manum, motum finē quam breuē sentiet. Iam verō maxime quidem arteriæ, quæ secundum dorsum est sita, cuius fugit pridem motus, simulatque contrahit animal, ad abdomen motus percipitur. Arteris quippe, leuiora corpora, vbi distenduntur, facile secum attolunt: grauiora ægrius, prægrauia autem ne mouent quidem. Hinc fit, vt crassus pulsus exiguus insit, quōd videlicet longitudo eius minuat. & latitudo fiat limitior, cōstricta nimirū a multa carne. Ascensus item in illis vbertate corporū incumbentū supprimitur. Gracilium verō, ceterum robustorum, insignem latitudinē & longitudinē pulsus habet, conspicuum etiam ascensum. Verumenimvero iustum distentionis nostrum sensum effugere, cum ob corpora quæ degrauiant arteriā, tum incedunt etiam ob interne quietis magnitudinē, nemini obscurū existimo: quemadmodum & ipsius contractiōis finem. Nam cum maiorem motum in contractiōibus nō sentiamus, sed vel parē ac in distentionibus, vel quod verum est, minorem: omnem autem in distentionibus non percipimus: planum est vtiq; nec totum nos percipimus in contractiōibus. Tanta autē pars distentionis nō sentitur, quanta inter arteriæ primum impetum motus, & ictus vsq; ad nostrum tactum distributionem

intercedit. Similiter quando tantū sentimus contractionis partem, quantā distentioni s, aut paulo minorē: erit etiam contractionis pars illa quæ nō sentitur, pars distentionis parti, aut aliquantū maior. At verō arteriæ interna & externa quies, per accedens pulsus partes dicitur. Quārū extera quidem, simpliciter manū admouens, quantā illa sit, maxime deprehendens: aut si enī premere libeat, idq; in vehementissimis pulsibus, videlicet vrgendo hæcenus, vt motum ipsum nō hēdas. Internam autem si premas, quoad tibi per præsentem liceat vehementiam, ita maxime illam dignosces. Atque externam quidem totam quietem, si ordine amingas, planē animaduertes: internam verō, vni cum partibus quæ sentiri nequeunt, vtriusq; motus, sine videlicet contractionis, & distentionis initio. Vbi igitur dignoscere externam quietem est animus, circa vllam vim applicare tactum debemus. Contrā, internam, si vrgas comprimāque, non cognoscas: Nam contractioni arteriæ constantissimē debet hætere tactus. At premere minime nisi in vehementioribus licet. Liqueat itaq; in his etiam solis internam quietem posse dignosci: imō ne hic quidem exactē, sed plerumq; sanē multo maiorem quā vera sit: interdum paulo, attramen adhuc illam maiorem animaduertes. Necessario enim duō ei tempora accedunt partium insensibilium vtriusq; motus: & quod ad finem contractionis est, & quod in distentionis principio. Quæ cum aliis aliam longitudinem habeant, nec parem semper accessionem tempus internæ quietis habebit, nec exactē vnquam dignosci poterit.

GALENI PERGAMENI de dignoscendis pulsibus, liber secundus.

D Einceps autem quæ partibus pulsū insunt, accuratē exponamus, à distentione auspici: quōd princeps hæc pulsuum pars sit, & plurimam habeat cognitiōis in se vrietatem, plurimumq; ad præfigiendum sit vtilis: Porro cum multa sint quæ distentionibus insunt, inter ea omnia motus principalissimas partes occupat, ex ratione substantiæ pulsuum maxime ad illas pertinet. Omnis autem motus tempus habet, quo sit: præterea celeritatem vel tarditatem, vel æqualitatem, vel inæqualitatem: ad hæc, vbi feratur, spaciū. At aliter videtur tempus dignosci, aliter tarditas & celeritas. Neque enim si motiōis sit breuissimum tempus, continuū pulsū dixerō celeritorem existere. Est autem pulsus celer, qui in paucō tempore motum finit: tardus, qui multo. Ceterum motus præditi longiori tempore pulsus, est nō rarō velocior eo, qui breuissimū obtinet. Hallucinatur igitur qui formicantē pulsū, quōd imbecillus, crederet, & paruum sit, celerem esse existimant. Si quidem ad indicandam motus alicuius celeritatem, non modō tempus, sed spaciū etiam in quo sit motus, ratio est habenda. Nam fieri non potest, quin arteria quæ breuissimō intervallo vehitur, minus consumat temporis, quā quæ maximo.

Si igitur

Applicatio manus ad corpus quale molenda sit.

Contractio arterie qualiter discernenda sit.

Manus tangens de apta qualitate esse debet.

Applicatio manus ad corpus vtri distentionis.

Arteria dorsalis pulsus in se habet ad abdomen distent.

Crassus pulsus exiguus cur alibi.

Gracilibus simul & validis pulsus esse dimensionem conspicuum. Insensum distentionis arterie, & contractionis finem, cur nostris sensum effugiat.

Quietis arterie per accedens pulsus partes dicitur.

Quietis arterie dignoscendum ratio.

Quietis interne tempus in pulsū non possit exacte dignosci.

Distentionis esse principis pulsuum partem, plurimamq; ad præfigiendum esse ducere.

Motus quæ insunt.

Pulsus celer & tardus a quo sit. Formicantem pulsū non esse celerem.

*Celeritati pul-
sum deinde
da, quid expo-
dat oportet.*

Si igitur & spacium spacio, & tempus respōdet
tempori, æque celeriter fieri motus dicemus. Si ve-
rò maior sit proportio spaci ad spacium, quam
temporis ad tempus: vel temporis ad tempus,
quam spaci ad spacium: hos motus minime exi-
stimamus pari celeritate fieri. Siquidem si spaci
cum spacio collati maior sit proportio, quam
temporis comparati cum tempore, manifestum
est cum motum necessarii celeriorē existere.
Contra, si prioris motus spacium minorem ha-
beat proportionem ad spacium alterius, quam
temporis, prior necessarii erit tardior. Fingamus
igitur iam duos affectus impares pulsus, scilicet pro-
funditas profunditatem decupla, & tempus tem-
poris dupli: pulsus certe, cuius altitudo erit de-
cupla, multo erit celerior altero. Nam humilis si
in eodem constans motu, decuplo in profundita-
tis dimensione increuerit, fieri ille quidē æque
ac alter altus, sed tempore longe maiori, q̄ ille. In-
venit autem est humilis pulsus breui tempore du-
rans, qui alto diuturno sit tardior. Iam verò ver-
miculata atq; formicans pulsus mutuo inter se cō-
vertuntur: quippe ut vermiculata extremus
de lapsu formicantem gignit, ita formicantia
incrementum generat vermiculantem. Quam-
plurimum autem inter se, tardiorē dicam aliquē
motum, an tardum: celeriorē, an celerem. Si-
quidem celer & tardus proferuntur absoluto ser-
mone: at celerior tardiorq̄, referuntur ad alteru-
rum, similisq; in alia differentia esse ratio vide-
tur. Porro magnus & parvus, sicuti & maior &
minor pulsus, si non ad relationem, at certe ad
quantitatem prædicamentum spectant. Dicimus
autem vnamquāq; rem magnam vel parvam,
non absolute, sed cum aliis sui generis compara-
tam. Atq; hoc sane inter magnū & maius inter-
est, quod maius quidem omni minori posuit
tūc dici: magnū verò nō quolibet maius, sed tan-
tum cognatum. Eadem de minore & parvo disti-
ctio est: necnō de celeri & celeriore, tardo & tar-
diorē, duro & duriorē, molli & molliori, crebro
& crebriori ac sic de ceteris omnibus, quæ pa-
rim cum altero quolibet cōparata, parum cum
alia tantum cum quibus conveniunt, talia vel ta-
lia dicuntur. Nec verò si cum omnibus quæ sunt
eiusdem generis magnū comparemus, statim
sic nominabimus. Ceterum cum medio ipso,
moderatōq; in vnoquoq; genere, cum cum regu-
la, singula comparantes, quæ illud quidem exce-
dunt, magna esse dicimus omnia: quæ contra,
parva: id quod vñ venit in omni vita, & præci-
pue in artibus vniuersis. Nam ad moderati om-
nes examē referuntur. Verum pro ratione a-
tutū, habitudinū corporū, temperamentorū,
anni temporū, locorū, statū, institū-
torū vitæ, ac deniq; animi affectū, alios ma-
gnos, alios paruos, alios moderatos pulsus di-
cimus esse. Iam hos celeres, illos tardos, quōs-
dam moderatos: parque modo in ceteris diffe-
rentiis. Siquidem pro singulis earum causarum
Indices ipsi pulsus variantur. Quæ causæ quum
semper mutuo permixtæ sint, difficile, ac potius
impossibile fuerit, repetere distinctam aliquam
differentiam pulsus, quæ omnino & sigillatim
earū cupiamus respondere. Quare satius fuerit &

*Vermicantē &
formicantē pul-
sum sibi mutuo
convertere.*

*Magni & ma-
ius dīstīnctū.*

*Comparatiōis
magni & par-
ui dīstīnctio
esse ad ipsius ge-
neris modum.*

*Pulsus varietas
pro ratione di-
versarū cau-
sarū.*

tali inquisitione superfedere: per singulas autē ca-
sas clausuram exercere hominē, cuius pulsū
ipse iam exploratis: ac sic pendere, quam in
illum muranone eiusdem pulsus moliantur: id
quod etiā in aliis atq; aliis hominibus est facien-
dum periculum. Ceterum si necq; id quod com-
mune est, in suas diuisissimas partes, nec causas
quæ per se & primario agunt, ab ita quæ ex acci-
denti sunt distinxerimus, haud dubie in iudicio
pulsuum turpissime hallucinabimur. Nam si di-
xeris exercitatorum tales pulsus existere, nec ad
dideris quorum exercitatorum, nec explicaueris
ipsius exercitiū speciem, nec modum, nec qualita-
tem, nec deniq; quantitatem, vñq; magnum la-
psū committes, quod videlicet rem communem
minimē in suas differentias seueris. At verò si qui
plethoricus sit, ac rhorace & pulmone affecto;
simul vt caput exerceri velociter, in dyspnoeā
inciderit, vñq; pro dyspnoeā ipsi pulsus varia-
bitur: quorum alterationem tu exercitatiōi at-
tribues, quod causam ex accidenti minimē à
propria distinxeris. Ergo ne in experiundo falla-
mur, corpus propositum designabimus ad expe-
rientiam, cum sanum sit, ac nulli externæ obno-
xium alterationi: tum exercitatiōem qua ad id
vtemur, moderatē quantitate seruabimus: præ-
sertim in mutatione illi attendemus, æquid ca-
su incididerit, non ex ipsa exercitatiōis natura.
Si enim tria hæc respiciam, nullo negotio inueni-
eris, quemadmodum & quatenus omnis ad-
uentitia causa pulsū ipsū immutet. Itaque si
in omni genere causæ, alterationem experientiā
didiceris, non est quod sis sollicitus, vt qualis sit,
qui natura moderatus est pulsus, præcias. Sed si,
qui sit singulis, de quibus agitur, peculiariter, te-
neas, quatenus mutatus hic est, cum ab aliis cau-
sis, tum verò ab ipso morbo, noscā licet. Por-
rò moderata exercitiā pulsū in magnitudinem,
celeritatem, vehementiam & crebrentiam cōver-
tunt. Pro iterantibus autem, maximi sunt iuue-
num pulsus: senum minimi: eorum quorum æ-
tas declinat, maiores quidem quam senum, mi-
niores tamen quam iuuenum: senum deniq; mi-
nimi. Exoriri autem quæstio possit, cur paruos
pueris sit pulsus: quāquā certe nullam reperio
causam, cur debeat in eis esse talis. Proinde mo-
deratū pulsū cognoscere, adhuc magis ne-
cessariū videtur. Potest quippe vel pueri pulsus
moderatus excellere. Quare nisi moderatū prius
pulsū inuenieris, ne Empiricus quidem ipse ob-
seruationem accuratē instituere poterit: cum nō
omnium ægrotiorum vñ sit consuetudine per-
sanitatē, quod experientia naturam illorū agnos-
cat, indeq; memoriā, cum ægrotantibus tam
complet. Vñ igitur optimam constitutionē
humani inuenieris corpus, primū animad-
vertendum est, qui nam eius sint pulsus: idque
nec obiter, nec negligenter: sed in eo statu ho-
minem accipiemus, vbi suum propriū motum
pulsus, si nulla externa causa immutari, retineat.
Hoc fiet si homo ipse ab omni excessu & defectu
sit immunis & liber. Postea investigandæ sunt
corporis vitiosæ constitutiones: earumq; excessus
atq; defectus, cum moderata & optima con-
ferendi. Dein verò, vbi quantū oporteat earum

*Pulsū exa-
men qualiter
modum sit.*

*Pulsū cogni-
tū per motu-
tionem, præ
stāda esse.*

*Exercitiā mo-
deratū quom-
do immutet
pulsū.
Vñq; differen-
tia secundam
causam.*

*Pulsū mo-
deratū esse in-
venire.*

*Pulsū mo-
deratū cum ali-
cuius inueni-
endū.*

naturarum pulsus dissidere ab inculpatissimæ pulsus perpendere, longoque visu exercueris rationem simul & tactum, iam demum certo putabis te moderatū tenere in omni genere pulsuum: illōsque etiam, qui aliquo modo ultra hunc sunt, & citra. Idcirco quicumque aut corporis nostri optimam naturā, aut vitiosam non novit, atractione quidem perspexit eas, sed visu ut dignosceret nō laboravit, nīl illi hinc fructus feret hic sermo: siquidem illa prius sunt ediscenda, postea huc veniendum. Naturæ igitur optimæ pulsus, aliorū omnium medius, ac velut mensura & regula quædam existit: cum quo vbi ceteros comparamus, celeres, tardos, magnos & parvos dicimus esse. Ipse verō qui medius & est & dicitur, nullo nomine quod immoderationē significet, nominatur: sicuti neque homo eo ipso præditus: quem quidem non crassum, non gracilem, non calidum, frigidum, humidum, aut siccum dicimus, sed omnibus partibus corporis temperatū. Ceterum dubitaverit quispiam in hunc modum:

Pulsus naturæ optimæ, aliorū omnium regula et mensura esse.

Arterias inter si maiori, & si minori corde similes semper motu ferantur.

Arteria inter dissimilis.

1111111

gnis pulsibus & tardis dignoscendis, optima natura inventa, cogitatio vni in illa arteriæ cuiuscunque magnitudine corporis atque distentionis, recordandum illi & æstimandū est, arteriam hac maiore, quanto oportet maiore distentionem habere, in naturis optimis. Quæ si tantarum pulsuum appellabitur: si vel maiore hac, vel minorem, magnum vel parum. Arteriæ deprehendit in optima natura magnitudinē, aut per dissectionem, aut ex collectione signorū. Quod si nesciat etiam quanta sit arteria præditis optimæ natura, certè eorum pulsus memor, si in alterum postea incidat, & colligere possit, num par sit maiores hinc aut minores, quā illam habere arterias: cum magnitudine iam distentionis cōferre poterit, cōsiderare, an magnus, an parvus, an moderatus sit pulsus. • Etenim si quanto videtur arterias maiores habere homo qui comparatur, tanto maiorem etiam distentionē sortitur, moderatum esse illius dicimus pulsū. Quod si arteriæ magnitudo videatur superare magnitudinē distentionis, aut minor quā illa sit, magnum tunc, vel parvū pulsū vocabimus. Præterea si arteriæ corpus videatur esse maius quā pulsus, parvum: si arteriæ minus, & pulsus maior, magnum. Haud secus in reliquis generibus pulsuum: ut in ipsius motus genere, in quo celeritatem & tarditatem dignoscimus: in genere quiens, in quo celeritatem & raritatem: contensionis, in quo vehementiam & remissionem: ad hæc, corporis arteriæ, in quo duritiem & mollitudinem. Nam per hæc omnia, tum moderatum inveniemus in optima natura, tum immoderatos vel ob excessum, vel ob defectū, non inter se, sed cum moderato comparabimus.

Pulsus moderatus quemodo in dicendum sit.

Arteria magnitudo quemodo cognoscenda.

Pulsus magnus vel parvus quemodo dicendum.

Pulsus in omni genere, moderatus immoderatusque in veritudo ratio.

Pulsus celeris vel tardus quemodo sit.

Pulsuum celeritatem vel tarditatem ut cognosciamus, neque temporis, neque intervalli quantitates esse spectandas.

GALENI PERGAMENI de dignoscendis pulsibus, liber tertius.

Celer autē pulsus vocatur, qui paucō tempore suū motum absoluit: quemadmodum tardus, qui multo. Etenim si hoc prius nobis constet, moderatus pulsus quanto tempore, quantum confecerit intervallum: deinde alterius offendamus, qui par habuit tempus, spaciū minus: multo tempore dicemus hunc motum fuisse. Siquidem si duo prii dimisi in diversos locos non æquē distantes sint, & simul reverti: alterum, quod inter paucō tempore absoluerit, collaudamus: alterum increpamus, quod multo. Nam ex vix longitudine æstimamus, quā paucum vel multum temporis dicimus, non absolutō sermone. Ceterum ad dignoscendum celerem pulsū vel tardum, nec quantitatē temporis, nec intervalli (vix iam quod verum est fatear) cōsiderandam censemus: imō ne proportionē quidem illorum, de quibus (ad extirpandum errorem quorundam, qui ex solius temporis quantitate, iudicium ipsorum pulsuum ferebant) verba fecimus in superiori libro. Nam celeritatem quidem & tarditatem, ut primum occurrit arteria, noscimus: rationem verō temporis ad tempus, & intervalli

arterie? & vniuersam diffentionem gracilem, si circumferentia sit parua: Quod si gibbosiores ac praeruptiores videantur obliqui occurfus arterie, præterea cauior quodam modo & humilior in profunditate, adeo vt ne circuli quidem circumscriptione cernatur amplius, sed veluti recta linea: profectio spectat illi talem pulsuum latum fore atq; humilem. Et ductio, si motus obliqui pariter, longè citra medium constiterint, ac medium ipsium tam gibbosius appareat, planè in pulsus altus & angustus existit. Si semel angustus eius in latitudine occurfus evadat, vt non modò insinuat esse obliquum motus, sed & totius peristole omnino videatur, difficilis cognitio est, vel potius cognitio non potest, quantum in his est; qualis sit pulsus. Iam verò opportunum est & de rhythmo etià aliquid dicere. Qui quidem cum in collatio temporis diffentionis, cum tempore contradiotionis constitit, prius paranda nobis separatum vniuersi temporis notitia est, id quod fuerit laborio si sumus: quandoquidem minù diffentionis, & contractionis finis, cognosci non possunt. Iam quatenus aliquid motus nos latet, ceteris etiam præteritis & tempus. Ceteris ad explorandum quantitatē motus, quantum promota spacia fit, perpendimus. Quod si finem diffentionis accuratè teneamus, ratio cum sensu consumpta, nobis eius quantitatē subiiceret. Possumus itaq; (nisi partem altem præter finem motus sentiamus) quatenus habeat temporis ignorantiam tamen quantum intervalli perfecta sit. At verò in vehementioribus pulsibus, si modicè arteria compresserimus, perspicimus quidem inuicem motus, sed quantitatē ignorabimus intervalli. Non potest autē simul et examinari quantitas temporis motus, & celeritas vel tarditas percipi. Porro ad dignoscendum rhythmum, so lam quantitatē temporis quæ in motu absumi videtur, exploramus. Quare in ista de manu ea applicatio est, quæ arterie omnem motū intrinsecus accutissimè. Si agitur pulsus magnus, sed languidus fuerit, in eo certè nō possum deprehendere totius dilatarionis motū, sed externi finis duntaxat, recessumq; præterea nihil. Prouide leniter istiusmodi pulsus sunt palpatandi: quia tactus s applicatio ne quantitatē animas vertere intervalli diffentionis poteris: temporis motus nō poteris. At verò in contractione non tantū temporis motus non inuenies quantitatē, sed ne ipsius quidem intervalli: cuius etiam vel qualitas nobis ignota erit. Qui enim motus etiamnum qualitas dignoscatur, vniuerso sensum latente motus. Numrū requiritur prius essentia rei, quàm ipsa qualitas. Quæ quidem si fugat sensum, parari nequit ipsius qualitas notitia. Quandoquidē igitur motum diffentionis & contractionis arterie noscimus in illis tantum pulsibus, qui minime languidi exiit, in eorum sanè soliorū notitiam rhythmū venimus, digni ita moderate applicati, vt nihil motus externi interpellent. In solis itaq; vehementissimis pulsibus exactè rhythmus dignoscitur: quod in ceteris magna pars intrinsecus diffentionis, & contractionis finis, non fugiat, id quod maxime rhythmum offendat.

GALENI PERGAMENI de dignoscendis pulsib. lib. III.

Et autē in diffentione arterie veluti quidam ictus, qui, dum tangimus, tactus ferit. Hic, si violentus sit, proprie existimabis ictum vocari: si violentia careat, nō item. Constat porro ictus ipse multas ac varias species pulsuum. Duri siquidem pulsus, vehementes, magni, celeres, alti, convulsui, & vibrati est conuers, atq; communis symptoma. Quare cōfundendi nō pulsus non sunt, sed discernendi si suis notis. Cōm igitur tactum impelli à pulsu, si illius debet sentire occursum, necesse sit (impelleri enim non perinde semper, sed nunc plus, nunc minus, interdum vt palpet tantū) quicunq; motus eam protrudunt, & longè submouent, istanē violenti ictus specie referat. Ad protrudere quidem longè potest motus arterie duræ, veluti fluctum conuulsa: & qui robore mouentis eam fluctantis veluti exierit: præterea qui magnitudinē diffentionis præceditur plurimū etiam, qui quæ fertis celeritate impellit valentem & qui præ altitudine veluti subit ac intrat: quique quod sensus fit, æque mouetur: ac deniq; in quibus visus rationem, simul tensionis & duriciæ, celerisq; occurfus imaginē repræsentat. Ceterum in istis in vultus quotidie medicos, qui illos omnes pulsus vel maxime discrepantes, dicant vehementes esse. Etenim quod occurfus celeritas, non eadem sit cum violentia ictus, hinc cognoscere licet, quod nec longius celer pulsus impellere valet tactum, nisi similis sit magnus. Vade liquet non hoc cum sua sponte obtrudere symptoma, sed ob magnitudinem iustitiam. Qui posse longè impellere magis ad magnitudinem pertinet: vel etiam ad hanc per accidens, videlicet vehementer rationis. Magnitudo siquidem, non quod longius intrat, sed quod multis in partibus longitudinis præter & latitudinis & profunditatis attingat tactum, cognoscitur. Si enim pulsus circumferentia quæ sanis magna est perceptorimus, ex ea facile ascensum, qui ex multa profunditate fit, cōiciemus. * vel si tactus totum intervallum afflictus nō fuerit, sed externū tantū finem persenserit. Si verò à primò dilatarionis imperu, velimus motū ipsum sentire, magna ex parte magnitudinē interpellabimus, ita vt ne magnus iam esse pulsus videatur: idē vbi magnitudinē vellemtia est adiuncta. Nam si in pulsibus qui citra vehementiam sunt magni, aut ascensui occurrat, aut ipsam arteriam cōprimet, mox totus pulsus perierit. Iam verò si magnus pulsus tribus dimensionibus præditus, nisi etiā vehementis fuerit, minime tactum protrudit longius, manifestum vtiq; est, nec altum id sua natura effecturum, qui vnā tantū dimensionē operatur, sed quod simul aut vehementer sit, aut certè minime languidus. Omnes itaq; illi pulsus, vt longè propulserit tactum, planè vehementis desiderant. Quamquam & alius etiam, à quibus diuersi durities non potest, violenter feriant, vt vibratus, & convulsus. Qui quidem non alivnde cōparantur ictus violentissimis, quàm à duritie perperat. Quamobrem duo tantū genera haberi pulsuum violenter ferientium: nempe vehementium

Rhythmus in quo consistit.

Diffentionis et tempus, ex ista collatio fieri oportet, per se ipsum.

Idem.

Idem.

Rhythmus dignoscendo quid explorandum.

Essentiam rei prius requiri quam qualitatem.

Rhythmus in solis dignosci vehementissimus pulsibus.

Idem quo consistit motus pulsus.

Idem.

Tactum nostris quo motus repellant.

Idem.

Impellere tactus solus magnitudinem est, non vehementiam ad tactum.

Magnitudo pulsus tactu cernitur.

Idem.

Pulsus autem alius: vehementis non posse tactu protrudere. Pulsus vehementer ferientis, duo tantū genera haberi.

*Dura quæ di-
centur.
Mollia quæ
sunt.*

nium, atq; duriorum. Etenim quibus carnis natura
natura cedit, ea dura vocantur: quæ verò carni,
vt aqua, hæc mollia dicuntur. Fingamus itaq; ma-
nus nostram nunc aquæ rapido fluctu ex ad-
verso occurrere: nunc lapidi, quem altera manus
sensim admoveat: nuncq; ab aqua percipimus pla-
ne ipsam everti, non pressam tamen: & lapidem
ab hac everti, sed pressa ab illo. Nam durum qui-
dem, quod minus progrediamur, obitare per se
non potest: sed aut per pondus, aut motum ac-
quisitionis impedire interdum poterit: vehementer
autem, suapte natura repugnare, cohibere, repel-
lere, ac deturbare intelligitur. Liqueat igitur, aliud
nos cum vehementer tangimus, aliud cum du-
ræ tactus: nam hæc premunt carnem tantum, illa
impediunt progressum. At quia sepe fit vt am-
bo conveniant, atq; id quod occurrit sit durum;
pariterq; vehementer moveatur, non potest sensu
eius etiam non duplex nobis offerri: vnus veluti
prementis, alter vel vtii eventus. Quis si fiat ita,
vt sint certe, dura pulsus, in premento tactus, co-
muno ponenda est, vt vtriusq; ictus violentia con-
veniat: sed proprium duri sit premere, evertere
vehementis. Hallucinantur autem Archigenes,
dum pulsus, cum arteriæ status cognoscitur, ple-
num pulsus appellat: potius is durus, aut mol-
lis, aut moderatus dici mereatur. Dum verò aut
secundo alio pleni pulsus genere cognosci quali-
tatem subdantur in arteriis cõrentes: quam quæ-
sitatem intelligat, haud pro dignitate explicat.
Cæterum grauissimè peccat tertium aliud genus
pleni pulsus assignans, cuius vi, ea quæ in arte-
riis sunt, innotescant nobis. Quippe tactus, ipsi-
us sine in arteriis tantum fit, ac simul humores
aliqui, indicare nõ valet. Quin et nullus pros-
fus est sensus, qui cõmonstrare valeat, in arteriis
contentus sanguis, quomodo sit multus & qualis.
Imò verò in ipsa aqua inter cutem neutiquam li-
cet nobis, humorem sit an spiritus, qui in regio-
nibus continetur ventris, ipso tactu explorare,
nisi pressu cute cauata: quam nec frequenter cau-
uari conspicias in synceris ascitis, & in eo hydro-
pe, quem tympanitem appellant. Sed ad veram
notitiam comparandam pulsare cogimur abdo-
men, vt antediximus si veluti tympanum resonet:
secundo loco alter componere hominè, conver-
teretq; in larera, quod fluctuationem aliquam ex-
audiamus. Siquidem vt strepitus in motu tym-
pani spiritui nobis annunciar, sic fluctuatio humo-
rem. Vno autè admodum tactu, haud facile de-
prehenderis, statimne an aqua subit, tamen si cun-
ta his contrabuerit: tanti adest, vt per crassam ar-
teriæ tunicam, & quæ peritonæi est excupula, qd
lata sit ipsa arteria noscamus. Præterea ex ma-
gnitudine quidem pulsus, copiam contenti hu-
moris cognoscimus. Sed nõ perpetuò hinc nobis
quod ille arbitratur) humidum esse ipsum
humorem constat. Solæ itaque fluctuationes &
strepitus sunt, ex quibus cognosci potest quid
sit, aut quale, quod continetur. Sensus
autem tactus, manet sui semper
similis.

*Duri proprium
est premere.
Vehementis est
proprium everti
teret.*

*Archigenes
falsè Galenum.*

*Aliter.
Hydrope,
Tympanitis.*

*Contentiones
quantitas quæ
laxitas, vultu de
prehendatur.*

GALENI PERGAMENI de causis pulsuum, lib. I.



*Pulsus à quibus
mutantur.*

Vt immutat pulsus, partim cõti-
generationis sunt causæ, partim tan-
tum alterationis. Ac generationis
quidem, tum vius, cuius gratia fit?
tum facultas ab qua, tum in stru-
menta per quæ discurruntur. Alterationis, et
ex omnes, & quæ precedentes vocantur, & quæ
harum sunt procata: hæc. Nam implex sunt, nõ
in pulsibus modò, sed in aliis cunctis; causatum
genus exstitit. Vnum quidem prius atq; præci-
puum, quod cõrrentis ideo appellatur, quia cõ-
essentiam complectitur, nimirum generatissimam
(vt modò diximus) exiens causam. Reliqua verò
duo genera, vt sunt pulsus, in causis nõ sunt: quia
se tamen existunt illorū qui iam sunt, manifestis-
sime. Quippe humorum crassitudo, abundantia;
lenitas, acrodo, efficere nõ valent pulsus, altera-
re valent. Ita frigidum balneum; vel calidum, &
hyems, etiaq; breuiter frigus & calor, alteran-
dorum pulsuum sunt, non gignendõrum, causæ.
Cæterum quas vltimò cõmonerauimus, procata-
tæ hæc sunt principientes dicuntur. Quas ve-
rò antehac, illæ nempe quæ circa humores ve-
rantur, antecessores. In summa autem, quæ cun-
que extra corpus possint, quicquid in corpore
immutat, procata: hæc causæ; siue principien-
tes vocantur, & seu incipientes prius quàm dispo-
sitiones corporum. Quæ quidem ipsæ dispo-
sitione, quando continentis excitant, ipsarū an-
tecedentes causæ redduntur. Densetur enim ab
occurso externi frigoris, cutis: cuius densitas,
naturalem huius digestionem reprimat. Re-
pressus ille coarctetur, tandemq; febrem accen-
dat, ob quæm vius pulsuum muretur, ipsiq; simi-
liter pulsus. Hic certe occurrit externi frigoris
est procata: hæc causæ: cætera vsq; ad vium pul-
sum omnes antecessores. Causa igitur procata-
ræ hæc, antecessoribus causis mediantibus,
quæ vium pulsuum permittit, quæ via ex cõri-
nentibus causis existit, dicitur etiā pulsus ipsos
variare. Neq; enim possit vlla cõrrentis causæ mu-
tari, vt constant maneat eius effectus. At prius
quàm continentis alteratio attingat, pulsus im-
mutari non possunt. Ideoq; principes hæc, & præci-
pue sunt, primæq; causæ pulsus. Cætera sunt
harū grata, nec per se alterare ipsos pulsus pos-
sunt. Quare illum qui peruenit evadere artis de
pulsibus velit, in omnibus causarum generibus
apprimè esse exercitatum oportet. Porro quæ
nos gignendorum pulsuum origines sunt conti-
nentes causæ, etiam sunt alterandorum. Si
quidem differunt causarū in quantitate quall-
tate, pulsuum differendæ in qualitate & quan-
titate contrahunt. At verò cùm perpetuò cor-
ipsum vni cum arteriis omnibus, quidvis super-
stices est animal, cernamus habere motum illum
pulsantem: homine autem iam vita functo, tum
arterias, tum cor, ipso pulsu destitui: sanè con-
stat aliquam fuisse causam, à qua ille motus exci-
taretur. Quam quidem causam, licet eius effec-
tia non fugiat, quod facultatè tamen habeat fa-
ciendi pulsus, illam facultatem vt beamus. Quam

*Causarum
genera tria.*

*Causæ continen-
tes.*

*Causæ procata-
ræ.*

*Causæ antec-
cessores.*

*Causarum quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ conti-
nentes alteratio-
nem pulsuum, est
vltis motus.*

*Causæ præci-
pue pulsuum,
sunt continen-
tes.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

*Causæ continen-
tes, sunt quæ
pulsus mutant,
generales vno
exemplo tradi-
tas.*

autē omne facultas, alicuius facultas sit, haud dubie eius notio et rei relationis subiecta. Ceterū dum robur facultatis, virtutēve dicimus, aut contrā infirmitatem & vitium, huc nomina ad functionem referimus. Siquidem quæ obit efficiunt functionem causa, interim ad eam inclusit appositā, interim deterius. Quod sit, ut modō præclarior: postea si res ferat, deterius, functio ipsa obeatur. Ac præstantior ad functionē dispositio, facultatis virtus & robur est: deterior, infirmitas atq; vitium. Quod verō ad pulsuum visum spectat, gratia tuendi caloris vniuersi corporis, insinuatū videtur, ut videlicet illum refrigerent: & si quid sit fuliginis ex succo ad additionē contrā, id est vitio excrementum. Conferūt etiā ad gignendum animale spiritum. Reliqua & tertia gignendorum pulsuum continetur causa, ipsum est arteriarū corpus. Siquidem omnia facultas quæ alicuius causa agit, instrumenta querit ad opus appositā. Erat autem hic instrumentum accomodum, quod ipsius tunica esset, atq; intus cauum. Vbi igitur illa facultas refrigerantem substantiam trahit, arteriarū corpus distenditur. Vbi verō fuliginosum expurgat, contrahitur. Nunc itaq; præpoller dilatationis viū, nunc contractionis: consequiturque omnino alteram motus partem reliqua. Cū ergo ex his causis pulsus proficiantur, omnes variationes illorū pro causarū alterationibus fiant est necesse. Unde tot sunt primæ & generales pulsuum differentie, quot causarum. Et facultatis quidem differentie sunt, robur & imbecillitas. Nam caloris, ad vitio, refrigerantia. Arteris tunc, durities, & mollitudo: atque præ his omnibus, in singulis generibus, cōmemoratorū mediocritates: quæ ut naturales efficiunt pulsus, qui medium locum inter excedentes sortiuntur, ita excessus ipsi, pulsus gignunt præter naturam. Ad facultatis robur necessarium pulsuum vehementem facit, infirmitas languidum: sicut instrumentorū durities, durum, mollitudo mollem. Ut autem incrementum vel decremento natui caloris consequatur semper vnum & idem genus pulsuum, non est necesse. Nec enim celer, nec magnus, aut creber incidit semper, vbi natura ad vitium: nec dum exungitur, tardum, vel paruum, vel rarus. Disputat autem contra magnam Archigenem, quod celeritas pulsus non a robore potius, q̃ a facultatis imbecillitate proficiatur. At neutrum sequitur necessarium. Magis tamen peculiaris celeritas robori facultatis est, abundantiaq; caloris, necnon mollitudini instrumentorū: tarditas autē contrariis. Eodem modo valide facultati magnitudo, & copie caloris: tum etiā mollibus instrumentis familiaris existit: paritas verō contrariis. At crebritas nulli necessario ex cōmemoratis inheret: magis tamen facultate imbecillitate est propria, copieq; caloris, ac durities item instrumentorū. Similiter raritas magis ad contraria declinat, non tamen illis perpetuo annexa. Si amplius in corpore fuerit collectus calor, animanti cū maiori erit opus respiratione, tum maioribus pulsibus: & quia maioribus: cōtinuū etiā celerioribus & crebrioribus. Ut enim qui sitibundi sunt, nō multū modō, sed & celeriter po-

tant, & crebro: ita qui refrigerio indigent, copiosum simul & celeriter, crebroq; attrahūt. Quomodo obrem peculiaries dixi esse pulsus copioso calori, magnū, celerem, crebrūq; nō tamen illi perpetuo annexos. Possunt etiā ut tales evadant, facultatē validam, atq; ipsa instrumenta mollia. Quod si infirma facultas sit, aut instrumentū durum, nec magni esse, nec celeres possunt, cū instrumentū quidem sit per duritiā aduersus mouentem facultatē contumax: illa verō amollere quatenus oportet attenuas, per imbecillitatē impositas. Quare ut celer pulsus vel magnus fiat, ita oportet causarum genera inter se cōstant: nempe, ut visus illorum generationis virget facultas valida sit: mollisq; arteriarū tunica, aut contrā rigida. Porro vbi solus calor increuit, & manifesti facultas, tunicaq; arteriarum immota: pulsus necessario maioris & celeriores fiunt, vniq; cū calore augentur, donec ad maximam distentionem pervenerint. Celeritimi verō neq; quidem prius erunt, quā calor ipse superauerit maximam distentionem, ita ut ab ea satis refrigerari non possit: tunc enim celeritate restituitur motus defectus, atq; sic evadent pulsus celeritimi. Ceterum neq; hæc satisfaciunt calori vehementer incenso. Nam quod temporis inter duos motus antea quiescebat, nunc id præsecutū, adeoq; efficit breue, ut totus vnus efficit motus cōtinuus nulla interceptis quiete videtur. Hoc tamen accidit, vbi extremē calor fuerit accensus: tunc enim, cū tres sint præfidi rationes in excessibus vniuersis, omnibus simul vitur. Nam & plurimum consequitur refrigerantis substantiæ, celeritimēq; & in primis astringit. Quorum primū maximos pulsus, secundum celeritimos, tertium creberrimos reddit. Nec vbi liberaliter illum magnitudo distentionis refrigerat, ierit celeritatem sicut nec crebriorem vbi ab ambabus auxiliū recipit: sed alterius illarū semper defectus, corrigitur altera: magnitudinis, celeritatis: celeritatis, crebriatē. Quod multis crebriatē pulsuum causa vna est, prioris actionis defectus. Iam quoq; defectū naturalis caloris nullus comitatur ex necessitate pulsus: familiaris sunt tamen ei parvus & tardus præcipue, mox etiam rarus. Nam ut natura quæ iampridem refrigerata est, nec multū requirit, nec celerē refrigerū, sic nec brevibus intervallis. Porro inter magnū pulsū & paruum, naturalis intercedit & moderatus: cum quo comparantes & æstimantes reliquos omnes, qui maiores sunt eo, hoc magnos vocamus: qui minores, paruos. Indem inter celerem & tardum medium moderatūq; naturalis existit. Sic inter crebrum & rarū, durum & mollem, mediū sunt naturales. Ad naturalis nō item videtur, qui inter vehementem est mediū & languidum. Valide quippe facultatis est opus, vehementis pulsus: veluti infirmæ, languidus. Cuius sanē nō est contra naturam firmitas: imō hæc virtus est, & secundum naturā infirmitas verō facultatis, vitium, atq; præter naturam. Iam verō vinū modicē epoto, cū maioribus & celerioribus, tum vehementioribus aperte pulsus evadunt. In ira autē, & exercitioribus modiciis, nō perinde aperte: imō si quid illis accedit vehementer

Pulsus fuisse insinuat gratia tuendi caloris vniuersi corporis, quod fuliginis ex succo ad additionem contrā, id est vitio excrementum.

Arteriarum corpus insinuatū videtur, ut videlicet illum refrigerent: & si quid sit fuliginis ex succo ad additionem contrā, id est vitio excrementum.

Pulsus variationes pro causarum alterationibus fieri. Pulsus res efficitur primæ differentie, quot causarum. Et facultatis quidem differentie sunt, robur & imbecillitas. Nam caloris, ad vitio, refrigerantia. Arteris tunc, durities, & mollitudo: atque præ his omnibus, in singulis generibus, cōmemoratorū mediocritates: quæ ut naturales efficiunt pulsus, qui medium locum inter excedentes sortiuntur, ita excessus ipsi, pulsus gignunt præter naturam.

Pulsuum alterationes quæ a quibus causis magis proficiantur.

Calori copioso quatenus pulsus sunt familiares.

Pulsus celeris vel magni gignendo, consistit in vnum quæ causa debent.

Celeritimi pulsus quando gignuntur.

Pulsus creberrimi quod causa caloris extremi accenditur.

Crebriatē pulsuum causam quod prioris actionis defectus. Caloris naturalis defectus qui pulsus sunt familiares.

Pulsus omnes medi sunt naturæ, excepto illo qui habetur inter vehementem & languidum.

Vinū modicē epoto, quod pulsus sunt etiam vehementiores, modiciis pulsus quales.

vehementior, id adeo est minutū, vt animaduer-
tēde possit. Cūm igitur in effuso sit, a facultate
distendi arterias, probabile est ipsam plus & ce-
lerius eas attollere validam, minus autem & tar-
dius infirmam. Vt autem priora repetam, quorū
pulsū postulat generatio vna causam, huic per-
petuo illi adhiberebunt, cuius fidelissimum signū
existit: vt vehemens, valens facultas: languid-
us, imbecillus. At quorum nisi plures interius
causae, constitutū generatio ueque, hos familia-
res causis esse dicemus, non autē significare cer-
tam ex illis aliquam. Eodem modo, si ex vna ali-
quando causa pulsus proficiat, sed non sem-
per ab ea, familiaris quāde omnibus causis erit,
quae efficiunt eum: cōstantē verō nullam ex eis
indebit. Neque enim si celeritas pulsū adsit,
statim robur quoque necessariū facultatis adue-
nit. Imo est, cuius maior sit visus generatū anima-
lis spiritus: & est eam caloris sit copia, vel in-
strumentorū mollietas, vel locorum quaedam, vel
omnia simul. Haud abster si magnitudo sit pul-
sam, erit vel facultatis robur, vel impendū ani-
malis spiritus maius, vel calor in corde abun-
dantior, vel mollietas organorū, vel quaedam
horum, vel vniuersa. Qui auster optime cōstitu-
tus ac temperatus fuerit, sit homo ille calidior soli-
tus evaserit, atque hacce sit aliteras duntaxat, ve-
hementem pulsū non immutaverit: imo nec
duritiam, nec mollietudinis genus: sed in magni-
tudinem & celeritatem vertet, interim etiam in cre-
britatem, prope magis vel minus eius calor in-
creverit. At si frigidior iusto sit factus, primū ra-
ritas perspicua erit, deinde tarditas, postremo
parvitas. Nam cum valida facultas exstet, effi-
cantiū minor sit visus, primam actionem nec par-
vam necesse est, nec tardam esse: secundam ve-
rō post longius tempus, quam si virgeret visus, est
conferentia rationi. Iam si maior fuerit refrige-
ratio, eque magno calore visus ipse remissus, vna &
langua celeritatis morus, atque minor statim e-
rit diffentio. Si plurimū sit refrigeratio progre-
ssa, necessum est pulsus ipsos rarissimos quidem
esse, ceterum nec tardissimos, nec etiā minimos.
Nam perfectē tardi vel parvi, si valida facultas
sit, vel si admodū sit ipse visus remissus, nunquā
sient pulsus. Eadem & in respiratione est ratio.
At vero vbi non modō visus, veramentū facultas
instatur, quatuor tōti diffentiae diuerſae in vai-
erſum erunt: Quorū primū quidem circa facul-
tatis imbecillitatem, caloris quoque augmentū verſa-
tur. Si igitur magnopere sit imbecillus facultas,
calor autē igneus, parvi & tardi pulsus, creberr-
imū orientur. Si uoxa sit moderata, atque sunt
crebri, sed in diffentione & motu mediocres. Se-
cunda coniungio iam imbecillitate & perfrige-
ratione obſistit: cui pulsus compenit cum imbecil-
litas, tum parvus, tardusque, sive pulsus p̄rioris cō-
iugationis: sed nō aequē illi, ad extremam de-
venerit crebritatem, nisi vbi omnino facultas pro-
strata fuerit: tunc enim pulsus minimus erit, in-
cerumitēque & deficiet frequenter. At si modicē sit
facultas infirma, validaque refrigeratio, creber
minimē evadit pulsus, quē videlicet visui faciat ra-
lis facultas sana: Tertia coniugatio sit, vbi calor si-
mularque facultas augetur: quā quē coniugatio

vehementissimi pulsus & maximi comitantur,
sed non peninde celerissimi. Creberrimi verō ferē
non sunt apertē. Quarta coniugatio est, in qua
cōiunt robur facultatis, & caloris p̄rioris: cui-
us sanē sunt pulsus magnitudinem modicam, sed
tardiores, & lanis rari. Nam cum sit parvus tum
pulsus visus, totumque facit magnitudinis diffen-
tiosis tucatur, haud immeritō diuissimē quie-
ſcent arteriae: tamen ob facultatis robur, diffen-
tiosis nō impeditur apertē vel dilatare quāti-
tas. Quia ratione etiam, nec multū prepollet tar-
ditas. In vniuersum autē, ipsius ictus qualitas,
seruentis naturae responder. Porro molle inſtru-
mentū, quā promptē in omnē partē extenditur,
facile dilaturat: durū non absq̄ magno negotio.
Iam comes est promptitudo diffentiosis, mag-
nitudinis: tenaxitas & cōrumacia: paruitas: itēque
celeritas, prioris generis: sive aliteris, tarditas:
non tamen ex quo & magnitudo & paruitas.

Paulo enim celerior est pulsus profectus a molli-
tudur instrumentorum, quo quom procreat duri-
ties: maior autē permulso: quia tunice ipsius ar-
teriae, visus duiores interim sint, ad celeritatem
quandā motus sunt faciles: ad magnitudinē ve-
ro diffentiosis, inexpressibiles omnium. Nam opus
est, vt in omnē partem extēdatur facili, quod ma-
ximā dilataciónē sit reflecturū: huiusmodi enim
est molle. Ceterū vbi a natura longissimē aut ad
mollietudinē, aut ad duritiē, corpus attēratū re-
ceſſerit, tardior mollis pulsus sit durior: magni-
tudine tamen nō modō eum etiāmiū superat, sed
illum etiam quē secundum naturā habet. Iam ve-
rō cum duriorum instrumentorū dura diffentio
sit, ac prōinde minus expleatur visus: molliū con-
trā, insignis diffentio fiat, & quae vbi par sit ex-
pleto, merito cum duris pulsibus crebritates,
cum mollibus frangentes cohercent. Quod si quan-
do incidat, vt cum duritie concurrat refrigeratio,
& calor cum mollietudine, tum pulsus durus,
mollibus evadent rariore. Si igitur durior cor-
pus arteriarum sit cōiunctum cum innata calo-
ris refrigeratione, pulsus efficit iusto minores,
tardioresque. Si superet durities, minores quā
tardiores. Si uero refrigeratio, contrā tardio-
res quā minores. Ad eundē modum crebri-
ores, si durities refrigeratione superior sit: sin
vincat refrigeratio, rariore. At si par sit vtriusque a na-
tura flexus, tanto sient pulsus minores, quanto
tardiores: a raritate vetō & crebritate nō abdu-
crunt. Est altera coniugatio, in qua cum calore
superat mollietudo. Quae etiā tres necessariū pri-
mas diffentias producit. Interim etiam par mol-
litudinis est & caloris mutatio: interim prepol-
let vel mollietudo, vel calor. Quare si quantū na-
turam mollietudo reliquerit, tantūdem deficiat
etiam ab ea calor, magnos necesse sit, & celeres
sieri pulsus: tamen statim crebros, quē vi
generandorum eorum visus vincat magnitudinem
diffentiosis. Si mollietudo praeficit, magnitudo
etiam superabit celeritatem. Si verō iam prepo-
leat calor, vi vsum actio complere nequeat, cele-
riorē vt fiant necesse est, quā maiores pulsus,
simulque etiā crebri. Quod si ab vnde natura fru-
atur visu, atque magni atque celeres. Sed & tertia
erit causarū complexio, quae pulsū in hoc

Pulsus qui
nam vni
per causā ad
visum, atque
fideliter indi-
catur: qui
visus famihar-
tatem ipse
causā dicitur.

Celeritas pul-
sam a quibus
causis erit pos-
sit.

Pulsus ma-
gnitudo erit
ex quibus nota
fuerit posuit.

Facultas cel-
eritate valida,
namque pulsus
sua perficitur
di vel parvi.

Pulsus differe-
ntia quatuor di-
facultas simul-
atque visus motu
atque.

visus qualitas,
seruentis natu-
ram sequitur.
Molle inſtru-
mentū in om-
nem partē dila-
tatur, contra
quā duriorum.

Pulsus diffen-
tiosis, pro mol-
lietudine vel du-
ritate generat.

Duris pulsus
crebriore: mol-
lis rariore
causis effi-
ciuntur.

Calore restituta
cum mollietudine
instrumētis
rari, quae pulsus
diffentia or-
iuntur.

*Quia si fit ad-
iuncta instru-
mentorum duri-
tas, quae pul-
sus differentias
admitat.*

genere variant, ubi calori sit adiuncta duri-
tas. Quam igitur uterque plurimum à natura de-
clinat, pulsus erunt celerissimi, creberrimi: mini-
mi autem nequaquam (nisi simul facultas obla-
ta fuerit) sed aliquatenus iusto minores. At si im-
modicus calor sit, & instrumentum non magno
pete durum, verum paululum à moderato va-
riet, tantum abest ut iusto fiat distantia arteria-
rum minor, ut etiam maior evadat. Erunt autem
celeris, vtra causam excellat: maximè tamen
cum calor: quo tempore luculentior erit & bre-
vitas. Superest coniugatio ex mollitie & frigidita-
te. Quia verò magnus pulsus hic quoque est mol-
litudini affinis, & parvus frigiditatem, vtra lon-
gius à natura deflectat qualitas, illi necesse est
pulsus असimulenter. Enimvero omnes natura-
les pulsus inter excessus moderatos & medios
annumerantur: non tamen quicunque sunt mode-
rati, etiam naturales existunt. At verò quot ex-
cellentiam caloris affectus sequuntur pulsum,

*Frigiditati mol-
litiæ erga omni-
bus conueniunt,
quae pulsum
differentia pro-
ducunt.*

*Pulsus omnes
qui moderati
sunt, non tantum
nisi et natura-
les existunt.
Pulsus diffi-
rentia, pro mi-
nuta modo
quae facultas
& instrumenta
miserantur.*

tot est viciu generandi animalis spiritus. Sic in-
strumentorum durnes facultatis imbecillitati
coniuncta, paruus pulsus, & tardus, & crebros
concitat: robori, paruus & crebros, non etiam
tardus, imò longe interim quàm par sit, celerio-
res. Verum si instrumentum sit molle, facultas autè
valida, maiores quidem manifestè pulsus sunt,
at aliquantò tardiores, rarioreque. Quod si ad
mollitudinem instrumenti infirmitas adiun-
cta sit facultatis, si quidè requis vtriusque, similis
modicus fuerit à natura flexus, moderatè simul
& naturales videbuntur si pulsus esse, nisi quod
erunt mollitie varij. Sin valde immodicus sit,
parus, tardus, atque crebri fient. Si verò imbecillitas
inquit præpollat, tunc etiam erunt parus, tardus,
crebri. Si superior sit mollitudo, accedent pul-
sus ad moderatos. Restat iam ut omnes simul
obmittamus differentias conuentionu causarum
pulsum: ex quibus octo coniugationes con-
stantur. Dux, quum remissa facultate pariter &

*Conueniunt
causarum va-
rietas pulsus,
octo coniugatio-
ne.*

vfu, modò mollis solito sit instrumentum, modò
durius. Dux altera, ubi languescat facultas, &
vfu auctus sit, instrumentum vel molle, vel du-
ra. Præterea aliq dux, quando valida sit facultas,
sed remissus vfu, cum variante instrumen-
torum differentia. Reliquæ dux, quum valens
facultas sit, auctus vfu, accedat instrumento-
rum, quum diximus, differentia. Ac languida qui-
dem facultate simul & remisso vfu, omnino in
paruitatem & tarditatem mutantur pulsus, in v-
traque differentia instrumentorum. Cæterum non
redduntur necessariò crebri vel rari. Sed si par-
ua facultatis offensio sit, nec insignis instrumen-
torum duritia, nihil crebritate pulsus variant: si-
quidem non pulsus modò, sed vniuersæ actio-
nes crebriores ob defectum evadant, qui earum
accidit singulis. In defectu, vfu estimatur. Quæ
ergo remissus hic fuerit, paruusque læsio facultatis,
omni per instrumentum nimiam duritiem, nihil
in actione desiderabitur. At si facultas sit ma-
gnopere læsa, modicè vfu remissus, instrumen-
tum bene dura evaserit, non poterunt non pul-
sus fieri, quum postulat vfu, minores: itaque im-
perfectum simul officium: ac quantum quidem im-
perfectus, tantò etiam crebrius. Verum provi-

*Alii non omnes
reddi crebriores
ob defectu qui
accidit illis.*

facultas plus vel minus, aut vfu offensus est; et-
iam pulsus ipsi necesse est plus vel minus ad par-
nitatem transirent & tarditatem. Nec verò exis-
tendum est, alterationem pulsum quæ ex omni-
bus simul causis moderatè oblectat præcedat,
maiorem oportere ea esse, quam facit vna. Pos-
sunt siquidem, vel ob vnicam tantum causam ex-
actè affectam, ad vniuersam devigire ipsi pulsus
alterationem. Igitur facultas extremè delecta,

*Facultas extre-
mè delecta, ma-
nens est ipsi
pulsus.*

minimos efficit pulsus, etiam si molles quidè sunt
ex instrumentorū sunt, virgeat autè necessitas. Ita-
que ad pulsus extremos contrahendos, interdū
plures causas desiderantur, interdū satis est vna.
Maximus quippe pulsus nequam fieri possit
ob facultatis robur summum, citra opem alia-
rum: minimus autè nonnunquam ob imbecillita-
tem sit solam. Quare ante omnia in pulsum al-
terationibus, attendenda quantitas est causarum
offensionis. Ut autem ad tertiam & quartam coniu-
gationem explicandas nos convertamus, ubi lan-
guescat facultas, virgeat vfu, durūq in instru-
mentum sit, non solum ad crebritatem, deinde ad pa-
ritatem, postea ad tarditatem, pulsus videbitur ve-
rire: non necessariò tamen, nec perpetuò, oec etiam
in quolibet illorum, nec simul concurrunt omnia.

Etenim ubi læsio insigniter sunt omnes cau-
sæ, minimi, creberrimi, & tardi ipsi pulsus fiunt.
At si offensio sit instrumentorum & facultatis
parua, ac generationis eorū multus vfu, hi non
erunt iusto minores, nec tardiores: imò interdū
manifestè celeriores: maiores autè si non aperte,
paros certe perspicue moderatos. Si verò infir-
ma facultas sit, & maior vfu, vna cum molli-
tudine instrumentorum (quod in quarta coniu-
gatione contingit) si quidem permultum vfu
non crescat, nec longè à natura abfint facultas
& instrumentum, multo magis increfcat pulsus in
magnitudine, quàm in celeritate. Crebrior
etiam iusto erit, sed non perinde ac ille tertij cō-
plexus, quod vfu quatuor magis hic satisfaci-
at. Quod si paululum vfu & facultas à natu-
rali statu deflectant, instrumenta verò multum ad
mollitiem deflectant, ad modicioratem pulsus ho-
rum affectu accedat, tum quantitate distantio-
nis, tum qualitate motus, præterea quocies tem-
pore, tantumque vna occurfus mollitudinem statim
naturalem excedent. Si verò non ita deflectant
instrumenta vfu & instrumenta, facultas aut vhe-
menter laboret, tales pulsus admodum parvi erunt &

crebri, modicè verò tardi. Si autè durū sit instru-
mentum, facultas valida, & vfu remissior (hoc e-
nim erit quintum coniugium) minores pulsus gi-
gentur, non tamen necessariò tardiores, sicuti
nec crebriores. Verum si admodum remissus sit
vfu, & instrumentum modicè dura, non minores
modò, verum & perspicue tardiores atque rario-
res fient. Si vitium vfu, à vitio instrumentorū
vincatur, abvnde fuerit se pulsus parvus, & cre-
bri. Si verò instrumenta sint mollia (quemad-
modum per sextam coniugationem) vniuersum mi-
nor quàm naturalis, quod quidem conspicui pos-
sit, pulsus ipse videbitur, nisi singulariter vfu sit
immixtus: & omnino hoc rarior apparebit, quod
dissolutior sit vfu. Porro si vfu aucto faculta-
tem valente, mollia sint instrumenta (hanc enim
constituo

constituo contagione septiman) prorsus magni erunt pulsus & celeriores crebri verò non semper, sed vbi modice ipse vñs increment. At si arteriarum duplex sint truncae (que oñia & vltima est canisagatio) si parua quidem durities sit, sed vñs insignis mutatio, maiores, celeriores, crebrioresq; quàm iustum sit, ipsi pulsus evadent. Sin autē æquos vñs & celeritas, nec illo admodū longo intervallo, in aetate deflexerit, pares quidem naturæ alibus, sed celeriores atq; crebriores fient. Iam si insignis lætio vñs & instrumentorū sit, ut hæc planē duriore sit reddita, illæ vrgat impetū, celeriores etiam vñs moderatis erant, minorēq; & crebriores. Cū igitur à valida facultate vehementer deflecti pulsus non possit, nec mollis à mollioribus instrumentis: si quando pulsus deprehendens celerem (qualem diximus familiarē esse robori facultatis, vñque vrgenti, & mollitudini instrumentorum) si quidem cum neuro illorum celeritas sit consuetæ, intelligas cum pulsus oriāi solo vñs vrgētē: si verò cum altero, omniū ex illo oriatur, quod signum tale producat, necessariūque etiam ex incremento vñs. Non possunt siquidem celeres pulsus existere, si vñs nec magni, nisi vñs possit. At quatenus ad robur, vel imbecillitatem facultas trahit, ex propriis eius pulsibus degnoscat licet. Eadem est ratio & in qualitate instrumentorum notanda. Quātus autem pulsuum generationis sit vñs, colligendum est ex commutatione magnitudinis, crebritatis atque celeritatis. Si enim pulsus maximus sit, creberrimūque & celerissimus, finis vrgēt vñs. Sin magnus tantum, & paulo celerior sit, non tamen immutato. Ex aliis etiā signis, citra pulsus, ipse vñs cognoscitur. Nam siue copiosus sit calor, siue exhalantur animalis spiritus, id haud magno negotio exploratur: quod videllect calor quidem tactum nō fugiat; ac per terea spirandi difficultate, sin, atq; interno laborantis sensu prodatur: animalis autem spiritus absumatur in his qui exercentur immo dicē, ac per halitum digeruntur: & quibus humores fluunt ad interna.

GAL. PERGAMENI de causis pulsuum, lib. II.

Inæqualium pulsuum quidam in arteriæ vno motu labefactant equalitatem, aliquam evadunt in pluribus: quam medici collectuam inæqualitatem appellant. De cuius fanē causis primo loco considerabimus. Comitantur enim eiusdemodi pulsus inæqualem cordis temperi, vñque instrumentorū & facultatis. Nam aut obstructionibus, aut compressionibus, aut duritiei, aut plenitudinem quæ æstimatur ad vires, seu facultatem. Cū igitur tres causæ sint continentes pulsus generationis, instrumentum, facultas & vñs: non potest ex vñs alteratione consistui collectuam, quæ aperta sit, inæqualitas: quod nec repente, nec cumulatē adeo vñs inquam immutari vñs possit, ut pulsus (verbi gratia) prior sit magnus, vel celer, vel crebrior, alter tardus, vel parvus, vel rarus. Ceterum non quos ratio collig-

git esse impares, vocare inæquales solemus: sed quos dilucidē compertimus sensuatale existere. Porro inæquandā (quæ videtur inpati calorū esse vel vñs quidam sensor) habet sanē interdum & ipsi inæquales pulsus: nō illos quidem, sua sponte (semper enim timor fuerit, iure ergo tunc & inæquales apparent, cū nō ta rationi. à diversis aliterentur causis, sed etiam natura cōtūras. Nam propter vindictæ cupiditatem, alii, magni, celeres, vehementer: quum verò timor est maior, ac capienti mali, quum ipse inferendi, parus, humiles, languidi, & tardus fiant. Quare iuvicem vñque pro causæ prepossitenti natura, videtur variari: ac celeris modō quidem ita, modō metus. Quamōdō ipse timor vehementer existens, inæquales efficit pulsus, idq; nō vñs, sed facultate obliuā, nec imperante omnibus instrumentis. Non tamen omni facultatis læsione succedit collectuam inæqualitatem. Si quidem cūm per se infirma est, igitur pulsus nō ita crebri inæquales. Vbi verò inapte natura est valida, opprimatur autē à copia humorū, aut etiam cōtumacia instrumenta fortitur, tunc illā inæqualitatem efficit. Cū itaq; delapsa in imbecillitatem insignē facultas arteriæ fuerit, pulsus pñmū languidi, parvi, tardiq; sin illa, quantū in ea est, valeat, sed aliqua copia opprimatur, variō ita & inæquales cōstitit pulsus: plurimos qdē languidos, tardos & paruos, cūm videlicet gravis onere est pressa: plurimos autē vehementes, celeres atq; tardos, vbi leuior. Quod si nec admodum gravis, nec nimis levis offensio sit, cōtrarij ex æquo, parēq; numero ipsi pulsus conspiciant.

At instrumentorū vitia, in hunc modum gignunt inæqualitatem. Vbi enim circūiectis regionibus arteriæ, quæ ad hoc destinatæ sunt, ut illam dissecant ex capiat, aliud corpus incedit, non possunt per illud restitit arteriæ dissecant. Itaq; singulari aditōnē defleuit, tandem cōstitutum vñs magnū opus absoluit, quod aliqui vñs nō expleant. Quo tempore violentē & vehementer agere ipsa facultas cogitur, ut explodat omnino illa, quæ sua instrumenta obediēt, & prolubuerit motu. At sic sanē maior prioribus, & vehementior, & celerior, necesse est pulsus evadere, qui etiā crebrior: vel ab ipso principio fuerat, quādo quidem impariū vñs actio-num, necessariū comes est crebritas. Si igitur pariter imperiū facultas in omnibus quæ cōsequuntur diffentionibus, retineret, æquē magni semper fierēt, & vehementes, & celeres pulsus: quia verò non reuēnt, sed refert se ad pristinū motū, ne incassū defangitur, varia oritur & cōtinua inæqualitas. Accidit etiā interim inæqualitas ob sanguinis copiam, aut in venas, aut in arterias ipsas insum. Ea tamen facillime sanguinis detractiōne sedatur. Si quidem sanguinis copia in venis, vici-nas arterias nō secus ac tumor præter natus à cōstringē & premens, si per venā vacuetur secū uenem, subitō arteriis ampliū exhibet locū. Quod verò sanguis in ipsas arterias insumens, præcipuē si crassus vel lentus sit, viam intercipiat spiritus, vñque & difficillimas edat inæqualitates, nemō est qui nesciat. Vbi igitur aut valide compomuntur, aut obstruuntur arteriæ, vel si integra sit

tracunda est
velut animal
calorem ferit.
tracunda, dam
nā est timor ad
necesse. p. s. s.
magis affe-
ctum esse
tracunda dicamus.

Timor vehemē
qua ratione
pulsus inæqua-
les efficiat.

Facultas arte-
ria eximie im-
becilla, vel ali-
qua mole huma-
rum oppressa,
quæ pñmū co-
dat.

Instrumentorum
vicia quomodo
inæqualitatem pul-
sus efficiant.

Pulsus in inæqua-
litatem accide-
re interdum ob
sanguinis copiam
in venas aut in
arterias insum-
sam.

facultas, inæqualitas corripit pulsus. Quod si vna cum instrumentorū affectu, facultas etiā perpeffa fuerit, clarissimū est magis variam inæqualitatem existerē. Verū si instrumentorū illius sita sit, sed magno pere facultas infirma, decurtata inæqualitas fiet. Ab admodis enim digna viā etia facultas, minores semper imbecillioresq; pulsus creat. Ceterū ipsarū facultatis imbecillitatem, quæ quidem prima & exigua exilit, minores languidioreq; nō autem decurtator pulsus efficit. Quæ verō est hac tantō maior, vt iam facultati sint oneri applicari digiti, hæc pulsus decurtatorū est causa. Quorū nō quidem, qui ad primum reuertitur motū, reciprociq; vocantur, minorem imbecillitatē ostendunt: qui verō alibi vbi resistunt, maiore. Quemadmodū si perfectē pulsus deficeret, extremam imbecillitatem nuntiaret. Verū hæc omnia exploranda esse applicatis arteriæ dignis, non suspensib; apertissimū est.

Differet autem abolito pulsus, ab eo deficiente: quod illa quidem velut priuatio sit tonus functionis: hæc, dimidiat tantū amissionis. Qui sanē deficiens pulsus quanto decurtatus est grauior, tanto leuior existit ipsa pulsus abolitione. Atque hi quidē tres status quatuor nōxæ differēt. Quartus est reciprocorū decurtatorū: nempe omnium leuissimus. Quintus hæc addit intermittentiū, qui præcedit deficientium statum. Quod enim in vno aut altero erat, aut certē in numero pulsuum certo, id statim deficientium in omnibus efficit. Porro intercurrentes pulsus, contraria ratione ac intermittentes, nō sciuntur: qui quidem etiam inter quales, qui acutus sunt, consistunt: inceditq; vbi valens facultas copia humorum, vel instrumentorum obstruēione impeditur. Vt ergo ad repellendā quæ molestant, maiores sæpe & vehementiores ædit, celerioresq; pulsus: ita plures quoque in euicemodi præsertim statibus, atq; alii pulsus sunt: itaq; decretoriam excretionem portendunt. Nec verō tantum facultatis infirmitas inducit intermittentes pulsus, sed instrumentorū etiā valida obstruētio, compressioq; & contractio, vbi in senilib; prorsus arteriæ allidere valeant. Nunc verō de causis inæqualitatis in vno pulsu est agendum. Sōlet igitur celeriter quidem primū concitata arteria, deinde parua interposita quiete, motu quodam tardo reliquū distentionis absoluerē, dum & vsus vrget, & facultas, quantum in ea est, obsecundat: interruptur tamen ab instrumentorum vitiō, aut ab humorum insigni abvndantia. Etenim facultatis robur, priors motus celeritas in dicat: si vni vrgentem vsus, motus qui sequitur quietē. Quippe nisi vsus vrgeret, nonnulli inceptum motū facultas abfolueret: sed vbi inhibitus primū eius motus esset, ibi desineret distentionem, vnuq; hunc faceret parū pulsus. Est & alia differentia distentionis per mediam quietem distinet, in qua motus vtriusq; est celer. Videtur tunc facultas propriam contentiōnem sueri, copetq; humorū reluctari: quare differentia hæc omnī est saluberrima. Est præterea quidam alius status medius in ter vtriusq; vbi motus secundus medius est inter tardum & celerē, hoc est, moderatus. Hæc sunt tres differentie di-

stentionum quiete interpellatarum. Sunt præter hæc & tres alix, vbi tardo priore motu, alter infariam variat: vt aut tardus, aut celer, aut moderatus fiat. Ex quibus pessimus est, qui pulsus vtriusq; motū tardum habet. Ac longē hoc commodior, in quo celer alteri: medius inter vtriusq; vbi sit moderatus. Haud aliter: cum a primo motu moderato, alter tibi modis conueritur, cōmodiorem significabit statum celer motus: perniciōsiorem tardus: medium inoderatus. Quin etiam tempus quietis, quō fuerit in singulis harum differentiarum longius, hoc est deterius. E diverso, durum motuum tempus meliorem declarat statū. Præterea vtriusq; distentionis magnitudo, opuma: contra pessima est paruitas. Similiter velocissima optima, remissio pessima. Quod si omnia quæ cōmemorauimus mala, in vno pulsu cōueniant, hic illorum pessimas erit: contra, si omnia cōmoda, opima. Transcundo autem ad eos pulsus, qui tonus distentionis habent quidem perpetuum motum, non vnum tamen partem celeritatem, certē quā iam inde ab initio in celeritatem inuiguit, nouus onerari facultatem annunciant: qui contra, magis. Ceterū facultate oppressa, nullus horum existit. Est autē propriū qui in contraria affatim mutantur, non solum grauati facultatē, sed etiā obtinēt & premi instrumenta. At in cōtraria affatim mutantur intelligi, si cum moueantur celeriter, subito fiant tardi: aut si ex tardo primo motu evadant celeres. Oriuntur enim hæc, cum ex obstruētionibus & compressiōnibus, tum ob facultatem humorum collum oneratum. At verō vibratus pulsus sit, facultate existente valida, instrumento duro, videt vrgente. Quorū si absit quicquid, & minimē vibratus exiit. Ceterū violenta duræ arteriæ distentione, proxime illius generationē cōstituit. Vrgit autē vsus, vbi functio ipsi nō sufficit, idq; aut ob propriū imbecillitatē, aut obstruētiā instrumentorū, vt etiam maiore vsus. Cum igitur in proposito pulsū gentie facultas requiratur vegeta: relinquatur vt vel vsu incretēte, vel redvndantibus instrumentis, vel vtriusq; in cōtra, distentione in vibratis pulsibus ipsi vsus sit impar. At vsus, abvndantia caloris augetur, vel exhaustio animali spiritui. Contraiecta instrumenta sunt, ob obstruētiōnes, compressiōnes, atq; duritiem. Quæ sanē diuinitis inflamatis, scirrhis affectis, resiccatis, perfrigeratis, ac deniq; distentis accedit instrumentis. Itaq; iam omnes inuenimus causas originis vibratorū. Nam intemperata inæqualitas, si pægre datur, vibrationē quidē auget, nō tamen causa est eorū generationis. Dicitur autē pulsus qui fieri nō potest, quin sit vibratus (in hūc signatur modū. Vbi parte illa arteriæ, quæ tangimus, duriores sint frigidioresq; atque ita difficilis mouetur partes vtriusq; fere, quas nō attingimus: ac deinde partē mediā distentione sua cōtinerent, retraxerintq; intro, ac secum rursus extrahunt, bis necesse est ipse tactus ferri. Atq; huiusmodi pulsus est dicrotus tantum, nō autē vibratus peripetivē. Alter verō qui iuxta & sane vibratus est & dicrotus, fit ad hunc modū. Vbi enim arteriæ sublate cum vibratione pars illa quæ sola cute est interfecta, iactetur faciliē,

Distentionem pulsus quiete interpellatam tria differētia.

Pulsus in cōtraria affatim mutantur, quid propriū.

Vibratus pulsus unde fiat.

Vnus pulsus quidē vrgens.

Vnus pulsus ab vndantia caloris augetur, vel exhaustio animalis spiritus.

Instrumenta cōtraiecta quomodo fiant. Dicitur pulsus qui necessariiā vim vibrat, est generatus.

Dicrotus tantū pulsus qui dicitur.

Dicrotus vibratus unde.

alix

Facultatis obliuio facies dicitur, variis pulsibus inæqualitatem producat.

Decurtatorum pulsuum differecia.

Pulsus abolitus à deficiente pulsus quomodo differat.

Pulsus decurtati reciprocus. Pulsus intermitteutes.

Pulsus intercurrentes.

Decretoria excretionem qui pulsus indicat. Intermittens pulsus à quibus causis oriri possit.

In æqualitate in vno pulsu causa.

alix autē partes vtriusq; sitē, crassitudine numeroq; oneretur corporū incumbitur, adeo vt ne motus quidē earū occurrat tangētibz: necesse tum est, parte hac, quæ est aperta, omni sibi sub-
lata, reliquis non manifestas, quæ vtriusq; sunt, adhuc attolli: ac proinde etiā mediā, quæ delata iandudū est, de integro vna cum illa quæ vtriusq; sunt, attolletur, ita vt redeat, occurratq; iterū foras ipsam tangētibz. Planū est igitur dicrotum pulsum, interm ex magna in temperie orū trahere, paruūq; duritie arteriæ: interm ex ingenti duritie, cōiuncta cum impetie aliqua, vel crassitudine, vel collumie humoris, vel carnis. Caprizans verō pulsus hoc cū dicroto conuenit, quod his pulsus, causa autē nō cōuenit. Neq; enim cum instrumentorū duritie necesse illi est, nā cum in temperie, vt iungatur. Verūm vbi facultas cōtentioū uatūā retinet, arceatur autē a motu, vel humorū collumie, vel obstructione, vel compresio nem instrumentorū, quæ tū dū tentionē intercipit. Cuius altera pars post quietē, iurē robustior est illa, quæ eam antecedit, quod ab impetu collectæ facultatis oriatur. Quod si enim ille secundus impetus inferior atq; imbecillior fuerit, erit sanē in caprizante deterior pulsus, non tamen dicitur caprizans. At vndosū & vermiculantes pulsus, sola differunt quantitate, sub vno cōprehenſi genere. At sunt sanē inter eos nōnulli, qui in diuersis partibus arteriæ, inæqualitatē, idq; in vna dū tentione, forūntur. Sunt autē illorū generationis causæ, imbecillitas facultatis, vel copia humorum, vel instrumentorū summa molli-
tudo. Nam cum vni a principio in arterias permeant, totum vas attolletē pari firmitudine nequeat, licet quæ propinquior, est parti principi, motum primō auspicatur: sic vñ quæ remotior, serius dū quod Eratūstratus perpetuo fieri, externū falso, arbitratū. Siquidem nemo ignorat, omnes arteriarū partes naturaliter eodem moueri tempore. Raro autē, idq; præter naturā, partes cordi viciniores mouetur prius, ac dein remotiores. Qui pulsus nec vndosus, nec vermiculans est, nisi etiā hoc illi accesserit, vt quod siuere per arterias videtur, sicuti alicubi, & quiescere appareat: mox verō iterū siuere, ac iterū retinere, atq; hoc per vniuersam arteriā. Porro qui ex his a copia humorū gignūtur, ab illis quos imbecillitas facultatis, citra humorū copiā, induxit, sola magnitudine differunt: vnde hi ob paruitatē, vermiculantea: illi ob magnitudinē, vndosū appellari sunt. Et causam habet illi consecutus languorē, hi ab undantia humorū. Sed consequitur etiā extremā molliadinē instrumentorū lūuifcūmodi pulsus. Cuius rei molles ac tenellæ virgæ, quæ vndoso modo tendūtur, vobis exemplū suggerūt. Validam itaq; facultatē vndosus habet: cuius mirum ope, magna poterit arteriarū partes attollere: imbecilliorē vermiculans, quod paruis intervallis tum * ipsa facultas moueatur. Quem certe uicē esse, inæqualē alioqui, etiā intermittente evadere. Decurrit enim pulsus cōsequitur imbecillitatē ipsius facultatis, a qua nimirū pulsus creatur. Vbi enim a corde vsq; per mē in arterias singulas, magis ac magis diloluitur in partibus remotioribus, minores tunc

languidiorēq; necessariū earum motus fient. Si autem verum sit illud, reperiri nōnunquam minores motus in partibus origini propinquioribus, ad inæqualitatem iostempetie arteriarum causa id genus pulsuum est referenda. Siquidem instrumentū a parioribz, eodēq; si lūuifcitate & calore sit modico temperatū, facilis ac magis mouetur: si quidam autem, aut impense humidum, aut frigidum, lentius minifcitur. Annuncens autem & circūnnes pulsus, fieri aliquando similia modo possunt: sepe alius de causa accideret. Si enim valida sit facultas, corpora autē incumbēna arteris marcescant, quia parte illorum maxime marida, atque eo leuiore, emicaret motus possit, ibi etiam maxime illius magnitudo eluceat. Quod si huius partis dilata tione alius vtriusq; minoribus comparet, decurritur motum in vtriusq; partibus cernendus quod fieri in facultatibus validissimis nequit. At vñ ex situ arteriæ fit inæqualitas pulsuum, vbi tēduntur in alas corporis partes, in quas diutius quentur. Porro inflammationes, scitū, abfcessus, & erudum quorūdam generatio tuberculorū, ac breuiter omnes præter naturā tumores, vicinas partes sō se trahere valent. Squallida præterea duntis, frigūq; immodicum, necnon convulsioſa intentio, ac breuiter in temperia inæqualis, arterias ipsas distortet. Convulsioſus autem pulsus ab ipsa specie, & affectu, quē denotare solet, rectē nomē accipit. Tendi enim ad vtrūque arteriam putaueris, statimq; homo convulsione corripitur. Est enim confluxio vna (vt rectē dixit Hippocrates) & conspiratio vna, & omnia consentiunt omnibus, etiā omni natura cōmunis. Nam nisi hoc esset, duo a iuncta esset, non vnum, quifq; nostrum. Corripitur cerebro arterias, vinculum societatis, transmittit: cerebrum neruos cordi, pari vicissitudine: qui quamquam non magis sunt, mandatū tamen rationis perferre possunt. Singulis præterea arteriis fibræ a neruis deductæ ad societatem coherant, per quas fit mutus quidam, non modō actio, sed affectuum etiam consensus. Nihil itaq; mirum, si cū vniuersum nervosum genus cōiunctum arteriis sit, cōmunis appareat affectus. Vt autem de alti, humilis, la, angust, longi, & brevis pulsus etiam generationē dicamus, sciendum est, in valentibus omnibus & ægrotantibus plerifq; dum dilata tū arteriæ, nos eorum superficiem * supernam multo clarius percipere, quā partes obliquas, & quod illa propius ad nostrū accedat tactum, & quod eum * paucioribus interpositis corporibz feriat. Proinde si rectē expēdas, naturalis pulsus est altior, q; deficiat semper eius in latū motus, præpelleat autē in altum. Verū quia si altior omnī nobis est mensura, & veluti regula quoddā, nec aliū ipsum, nec angustū vocamus, sed moderatū, atq; inter omnes excessus mediū. Etenim lōgus & brevis ad hūc colatus dicitur. At verō dū moderatū eū pulsū dicimus, nō sensum, sed naturalē, proportionē & mediocritatē, cōstitui mus æqualitatis normā. Nā si p sensu iudicū facias, in illo pulsū lōgitudine pergit, pfunditate: quæ ad modū hēclantidini. Equisdem alto pulsus in iracundia & ante ludicationē

Caprizans pulsus dicrotus.

Vndosus & vermiculantes pulsus sola differunt quantitate.

Arteriarū partes omnes, dum per naturā modo se habent, eodem mouentur tempore.

Vermiculantes pulsus. Vndosus.

Decurrit pulsus vnde pronunciat.

Annuncens pulsus, circumnecit vnde de quo gaudet.

Extrema vnde de quo gaudet.

Convulsioſus pulsus la, a.

Convulsioſus in toto corpore est vna.

Membrorum principium ut ofus.

Arterioſa fibræ a neruis deductæ.

Pulsus naturalis est altior semper vnde.

Pulsus modicus est qui dicitur.

Pulsus alti, la, itq; vnde.

*Pulsus alii qui
sunt decedens.*

fieri manifeste cōperio: latos autē ut plurimū in
excretionibus decretoriis. Pulsus igitur modera-
ti memorēs, si quādo offendamini ipsius motus
admodū altitudinē auctā, latitudinē autē aut nū-
hil, aut parū, rectē vocabimur eos pulsus altos.
Quod si latitudinē manifestū incrementū accē-
dat, eos magis, & simul & altos dicemus. Si am-
bo incrementa, altitudo, simul & latitudo, sed nō
multū latitudinē altitudo superet, hos magnos
appellamus duntaxat. Cūm verō eadem propor-
tione altitudo ad auctā latitudinem vincat, qua
etiam in naturalis pulsus superaret, is pulsus can-
dens, quā moderatus, retinebit speciem. Itaque nō
altus, ut negi ille, sed maior tantūmodo videtur.
Quinētia eadem est & in lōgitudine et ratio. Nam
vbi eadem proportione augeatur, qua profunditas
& latitudo, vniuersum pulsū, ut diximus
modō, repræsentat maiorē. Quare ut magnus sit
pulsus, nō requiritur ut pares sint motus qui in
dimensionib. tria sunt augentur, sed tantūm ut pro-
portione aequales eant. At constat eorū pro-
portio, vbi nulla præter naturā insignis in crassi-
tudinē mutatio, aut in gracilitatē corporis fiat:
præterea nec siccitas immodica, vel humiditas,
vel maximē distentionis necessitas. Perit autem,
aut perturbatur, cuiuslibet horū præsentia. Ut si q̄
tera omnia se rectē habeant, facultas autē cōpel-
latur ita magnā facere distensionē, ut eius remō-
rem circūiecta arteriæ loca nō capiant, in eo asse-
ctu necessum est alius pulsus appareat. Quā enim
is est a tollitur magnitudinē distentionis arteriæ, ut
nūquā cōarctetur, naturā trium dimensionū
proportionē tuebatur. At cōarctata, tantūm detra-
het de illa dimensione quantum est progressus pro-
hibita. Quo circa ita fit, licet corpore sit optimē
cōparato, sit pulsus altus. Distentionis enim sum-
mum excessum, ne is quidem cōmōde ferat habi-
tus, sed iam ex imo premitur, & ex obliquo arte-
ria. Sola ergo pars illius ea, que intrata sola cu-
te est, nēpe suprema, omnē calorē excipit: qua-
re necessariū sit alius pulsus. Ceterū multis gra-
tū corpore, nec facultate admodum firma, pul-
sus, si irascitur, magni, & nō alii videtur esse. Nā
cū in aliis pulsibus tantū facultatis robur desi-
deretur, ut maximā distentionē moliri posset, &
quā loca arteriæ ambientia excipere nequeant
manifestū vniq̄ est, in cōmemoratos affectus nō
posse altos pulsus incidere. Iam verō vbi natura
li robore facultas aliquatenus deficiat, & lati-
tudo sit insignis locorū, pondusq̄ accedat arte-
riæ ex superioribus partibus, hic pulsus collatus
admoderatū, est sanior. Etenim aut altitudo im-
minuta, aut latitudo aucta, potest latum pulsū
efficere. Invenitur autē motus nonnūq̄, qui qua-
tuor occurrat dignis, sed ita angustus & obscu-
rus ut subtilis fides speciem referat: atq̄ in quidem
pulsus lōgus vocatur. Ac talis quidē pulsus, qui
videlicet fidem aut pilum refert, nō solum rari-
carum maximā siccitatē ostendit, sed etiam indi-
cat facultatē imbecilliorē, quā quæ possit con-
tinuam instrumentū distendere. Quod igitur si hæc
vera sunt, nō ita tam talis pulsus sit brevis: ita
quod huiusmodi pulsus, in tenui corpore, cō-
tētiq̄ & aliquāto duntaxat cito accidat. Etenim
si cutis remissa & crassa, magnā partem motus &

*Pulsus magnus
augendo quod
requiritur.*

*tratus sit pulsus
altus.*

*Pulsus latus
quando acci-
dens.*

*Pulsus latus
qualis, & quid
significet.*

obscuretur, vltiq̄ tenuis simul cōtētiq̄, totū om-
nino seruabit. Vnde liquet cōspirare gracilitatē
tenuis corporis oportere, & duntaxat cū simul
& instrumentorū, cū facultatis imbecillitate,
nō summatamē, ad talem pulsū gignendū. Ac
vocatur quidē per excellentiam lōgus: pro-
priē autē tenuis & gracilis. Nam propriē & abso-
lutē dicitur lōgus, cuius neutram aliquā dī-
mensionū percipimus. At verō brevis ut pulsus;
vbi in parua quāpiam particula, ateria sola cute
contingitur, ob idq̄ sensibilibus pulsū partes au-
tem ex utroq̄ illius latere omnes in profundum
merguntur, vnde prodere mortū nequeunt sensi-
biles. Dicitur etiam per excellentiam hic pulsus
brevis. Propriū tamen eius nomen est: crassus &
turgidus. Nam qui simplicitet brevis est, vel ex
corpulentia nascitur, vel ex paucitate. Proximū
est ut de ordinatis & inordinatis agamus. Qui
quidem quandoquidem in quales omnes sunt,
sed in eo variant, quod æquilateralē hī certis or-
bus seruant, illi cōfusi vnde quaq̄ sunt intelligē-
dum est, causam, que cōtingit inæqualitatē efficiat,
semper firmam in ordinatis & suam esse: in inor-
dinatis autem, nequāq̄. Insuper ordo, ut in equali-
tas, naturæ, si quid aliud, est singularis: Quare si
alterum eorum sit cōturbarum, minorem signifi-
cat offensionē: si utrumq̄ maiorem. Concul-
rant autem ambo in inordinatis: alterum in or-
dinatis qui sunt inæquales. Quod verō ad ma-
torum rhythmorū causas pertinet, si rectē qui-
dem est demonstratū, a illi per arteriarum dila-
tationes æream quandam substantiam: in con-
tractionibus autem excrementa excerni, & quasi
fuliginem ad vitiorum humorum: certe necessum
est, cū distentionis vīas inflet, maiorem fieri,
celeriorēq̄ distentionem: cū contractione,
contractionem. Quamobrem, quibus in stati-
bus plurimi insunt humores, ac promde
plurimum excrementi colligitur (semper enim
quāntatī cōfectorū succorum, excrementorū
respondet quantitas) que sunt vīa ad iuuentu-
tem in us nonnihil cedit contractioni disten-
tione. In quibus autem paucissimi (quod contingit in
senibus) longe maius est distentionis tempus rē-
pote contractionis.

GALENI PERGAMENI de causis pulsuum, lib. III.

Quandoquidē pulsuum alterationes, que
ex primis & præcipuis causis pficiuntur,
abvnde & sermo ante habitus enarravit,
illas nunc explicabimus: quæ ab aliis omnibus
sunt, quæly non perse planē, sed quod mutant
primas, causæ pulsū vocantur. Ceterū quia hæc
partim præter naturā sunt, partim naturales, par-
tim etiam inter hæc medix, quas nō naturales ap-
pellant: rationi videtur consonū, ut à naturali-
bus exordiamur, idq̄ eundem sequentes ordinē,
quē in libro tyronibus descripto obseruauimus.
Viri igitur & in vniuersum, mulieribus habent
pulsū lōgē & maiorem, & vehementiorē, pan-
to rariorem tardiorē, si vtrū & satis rariorem. Si-
quidem cū masculis calidior & siccior femina,
necesse est vīum generationis pulsū, & in-
strumentorū constitutionē, differre in illarū
proin-

*Pulsus latus
qui proprius de-
cens.*

*Pulsus simplici-
ter brevis qua-
lis, & quid signi-
ficet.*

*Pulsus ordina-
tus inordinatisq̄
constat.*

*Ordo aequali-
tatis natura sua
mutatus exi-
sit.*

*Ab illis moribus
mutatorū cau-
sa.*

*Arteria dilata-
ta trahit eo
ut contracta
repellat fulgi-
ginem.*

*Excrementorū
quantitas respē-
dit quantitati
confectionis
succorum.*

*Canforum dif-
ferentia et
place.*

*Viri in vniuersum
sunt maiores.
habent pulsū
lōgē & maiorem
& vehementiorem.*

Ma est calidior et succor
ferrina.

proinde ipsos pulsus. Atqui copiosi caloris magnum pulsus esse familiarem ostendimus. Ignoramus cum mas sit nō calidior modo, sed multo calidior ferrina, utq; maiores, ac multo maiorem quam illa pulsus habebit. Siquidem pro naturali temperamento, maior tantū, non multo maior erit ipsius viri pulsus: si autē accesserit à peculiaribus vite institutis utriusq; differentia (illa enim in ocio vivit, hic in multis laborib; ut sane multo iura calidior viri reddidit, sic pulsibus est q; ferrina longe maioribus. Addidimus autē sermone particulam illam, in uniusq; ut iudicis vice stimuli esse, ad totius rei perscrutandum naturam. Sic enim statim de naturali differentia viri & mulieris meditabimur, reperientq; uniuscuiusq; aus in omnibus animalibus, masculinum valentius feminino esse. Ceterū secundum alias differentias præter naturam (ut videlicet si hominem frigidū prædixit temperamento, mollitēq; educatum, cum biliosa viragine cōferta) censē in muliere ipsa reperies quā in viro pulsū longē maiorem. Naturalis itaque differentia, ut apud quidem ad femellam, maiores tantū, atq; vehementiores: ut viri autē ad mulierē, multo maiores ac vehementiores pulsus producit: quod attribuitur vite naturalis robur laboribus crescat. Quinetiam & facultas robur, quod manibus adest, & ipsum aliquid conferet ad magnitudinem pulsuum. Quippe validis facultatibus magni pulsus peculiares existunt. Taceo totū corpus virile, ad perscrutandū esse optimē comparatū, purum, excrementisq; vacuū, neq; compressū; feminis autem cōtrario modo dispositū. Quare ut illorum habitus ad magnitudinem, sic harum ad paritatem pulsus videtur aptus. Nam etū ipsi ad sit instrumentorum molities, quæ ad pulsus magnitudinem faciunt, plures tamen fortiores quā alie, sunt paritatis causæ: nec plurimum viri à mulieribus dissident molitudine. Quod si multo mulieris instrumentum sit mollius, cum facilius sit celsum moribus infestantibus, ad ipsum erit etiam in causa, ut minores in eis pulsus fiant. Est autem mulieris pulsus celerior quidem pulsui virorum, non tamen excessu insigni. Si quidem cum earū pulsus sit multo minor, quā ut possit vsum explere, augeat quantum potest celeritatem: cui eandem ob causam accedit crebritas. At verò infans masculus maiorem tantum, vehementiorem, rariorem, non item multo, pulsū habet, quā infans femella. Qui natura calidus sunt, multo habent maiorem, celeriorē, atq; e crebriorem pulsū: non autem multo vehementiorem. Ceterū impræsentiarum calidos (ex moris est) dicimus, qui humi ditare, siccitateque temperari cōsunt. Validitate exsuperant. Illi igitur quō calidiores sunt temperatis, eo maiores habent, celeriores atq; crebriores pulsus. Cur autem non multo vehementiores, id quidem iam exposuimus prius, de ipsō non nihil postea dicetur. Graciliores citra vsum affectum alium, maiore, rarioreq; multo, vehementiorem paulo pulsū sortiuntur. Nam cum gracilior ipsa, regiones arteriarum magis dilatat, leuorūq; incumbētia corpora reddat, pulsibus magnitudinem laud con-

Virū naturalis
robore labori-
bus crescit.

Facilitatem
validis magno
pulsus peculia-
res existunt.

Mollitū infest
mentorum, ad
pulsus magni-
tudinem fa-
citur.

Mulierum pul-
sus est quare vo-
rum celerior.

Calidiores
natura pulsus.

Graciliores pul-
sus quales.

rehundendam conciliat. Atqui, ubi pari relicto vsum, crebris magnitudo, rariore tunc necesse est pulsus fiant, idq; tantō, quāto salientius maiores. Maiores verō erit multo, proinde rariore etū multo erunt. At vehementiores esse apparebūt, nō quod vsum acquisierint robur, sed quod in augeant quā habebant tensionem. Pro ætati bus hoc prædicto pulsus variatur. Infans pulsus celerissimus est, rarissimus sensus: omnes qui inter hos intercedunt, proportionē seruiant, pro ut vel ad puerū, vel ad senem accedit propius. Celerissimus item pueri pulsus, tardior senis existit. Requirat ætatem pulsus ambigūt inter hos. At senex à puero, longē magis rariore, quā celeritate distat. In vehementē & magnitudinis differentia, maximus est, ut in ætatibus, pulsus iuvenū, minimus senum, medius & paulo maiore pulsus puerorū, huiusmodi sententiam iuvenū, languidissimus senū, medius inter hos, puerorū est pulsus. Etiam cum calore nō paucō pueri prædicti sine, subitanea quorūq; remigret illū, nō paucō possulant. Quinetiā subitanea animalis spiritus in illis nō tantū nutrire oportet, ut in adultis, sed etū vna cum infirmūq; augeri. Itaq; his nominibus pueri magni dilatationibus egent. Quia verō quā humores exhaurent plurimos (videlicet nutrimentū & incrementū ratione) ob idq; feliginosorū excrementorū ætatu per totū corpus habitū contrahant, utiq; desidērant etiam arteriarū maximas cōtrações. Maximū ergo, huiusmodi celerissimū pueri utriusq; motū requirūt: sicq; infra vsum est functio in eis. Nam licet similes celeres sint, & magni, vsum tamen non expleant: quare hic crebris opus est moribus. In senibus autē planē contrahit, calor paucus, cui par est generatio feliginosorū excrementorū, ipsiusq; animalis nutrimentū. Iure itaq; habent cōstantios illis pulsus, paruos, tardos & raros. Sunt ergo pulsus puerorū magni, si eam magnitudinem eos arteriarū cōferas: parvi autē, si quantitatē tantū ditionemnon inspectes, eamq; ad pulsus humorem cōferas. Sed tamen ad maximos pulsus fortissimū pueri, ne si ad magnitudinē quidem eos arteriarū perpendas. Siquidē nec facultas eorum perveniat ad summū robur, & cōstet ut in eis molles arteriarū tunice, multo de maxima dilatactione detrallat, tamen est pulsus eorū mediū superet. Porro molitudine instrumentorū, quæ remotæ cōtractione sunt, ad pulsū magnitudinē cōferūt: quæ verō premittunt atq; gravantur, ad paritatem: præcipuē si facultas destituitur robore. Cū autē utriusq; morus plurimus infans vsum sit, minimus senibus, & omne interpositū tempus ætatu utriusq; vsum cernunt, magna autē cōtraçãois: rationi consonū est, ut quantū à pueris recedant ad senes, tantū semper utriusq; motū habeant tardiorē, magis autē cōtrações. Atq; ex his afficitur differentis rhythmorum pro ætatibus. Est autē vehementissimus iuvenū pulsus, & languidissimus senū: quoniam illi quēdā facultas validissima est, his debilissima. In aliis etū ætatibus, pro robore illarū vel imbecillitate, pulsus remissionē & vehementiam different. At verō pro anni temporibus, medio quidē Vespertinus maximū & vehementissimū sunt, ut utiq;

Pulsus ferit
dam etate de-
ferrina.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Infans pul-
sus maximus.

Antomus quæ
le fili pulvis.

Hymæ quæ
sunt pulvis.

Pulsus differens
tempora refertur
ad vsum.

facultatem, &
instrumentum.

Ver medium
esse temperatissimum
quæ tempore
habent optime corpo-
ra.

Pulsus prolixi-
mus optima cum
sit utrumque cor-
poris qualitas.

Agitate, ergo
vires pulvis,
sed laqueus
facultas.

Hymæ angu-
stus facultas,
sed pulvis vire
minuitur.

Constituta pla-
nitas habet
calidum, &
magis.

Calor inuasi-
tus est operatus,
ut acquisiti-
tus inuasi-
tus.

Calor ad vici-
tudinem habet
fides imbeci-
litas.

Pulsus inuasi-
tus a repositus,
ad finem quæ
a temperatus.

poribus: celeritate verò & crebriitate commode-
rant. Pari modo medio autumno. * Progre-
dientem autem Ver, nōm hūc de magnitudine & vehemen-
tia detrahatur, sed auger celeritatem & crebri-
tatem, ita vt incurrat etiam languidi, parui, celeres,
et vtriusque. Autam progredu cuncta in-
mittit, magnitudinem, vehemenciam, celerita-
tem, & crebriitatem. Sic autem hyeme, in parui-
tatem convertuntur, remissionem, tarditatem,
& raritatem. Responder autem initium veris, ex
temeritate autem nihil finis, initio huius. Acta
tū item principis, suo, & principis hyemis, suo
finis. Premise quæ pari spacio a media æstate &
media hyeme in vtranque deflectunt partem,
similiter variant. Porro media ætas, parum con-
venit cum media hyeme, partim diffidet. Nam
parui vtriusque & languidi sunt: sed celeres: cre-
bri æstate tardi, rari hyeme. Non perinde tam-
en parui æstate ac hyeme: sed æstate minus.
Nec ita hyeme languidi, vt æstate. Quæ igitur le-
uitudinem temporis addidit, ad has referuntur
res easque: ad vsum, facultatem, & instrumenta-
ta. Nam prout in ipsis horum singula variant,
mutatur pulsus. Ac medio quidem Veris, æris
status non amplectentis, temperatissimus est:
itaque corpora etiam sunt sana. Sequitur eo præ-
cipue tempore, facultas est robustissima, & mo-
deratissima calor, nec non instrumenta ipsa li-
bera ab omni ecclesia. Vnde & pulsus corpori-
bus quidem optimè comparatur, maximus & ve-
hementissimus sunt. Nam in peculiases sunt va-
rietates facultatis, & moderato vsum, instrumentis
naturalis lege constituitur. Si vero vsum nonnulli
mediocritatem excedat, non modò magni & ve-
hementes, sed etiam celeres fient. Quod si ne sic
quidem functio expleat vsum, mutatio transi-
bit in crebriitatem. Aestate porro crescit vsum, sed
languescit facultas. Quam obrem aliquatenus
decrevit illa velut enim simul & magnitudo:
sed tamen hæc minus. Nam quia virget vsum,
augetur nonnulli: vnde etiam celeritati & cre-
briitati accedit momentum non contemnendū.
Hyeme contrā, quā æstate, est validior facul-
tas, non quæ tamen vt Ver: sed vsum remi-
tuitur generationis pulvisum. Quare languido-
res pulsus hyeme quā Ver sunt, & vehemen-
tiores quā æstate: ceterum sanis sunt parui,
quod & facultas infra summum sit robur, & vsum
remissus admodum: quæ ipsa in causa re-
missio est, cur tardi, rari existant. Tam verò vbi
Hippocrates dixit, Quæ augentur, plurimū ha-
bent calidi: non simpliciter calidi dixit, sed inna-
tadidit, vt quæ alterum scire calidum acqui-
situm esse, cuius magna copia iuuenibus suppe-
tat. Est enim temperatus calor narius, acquisiti-
tus autem imtemperatus, & quasi igneus. Simili-
ter quando inquit, Ventes hyeme & Vere natu-
ra calidissimi sunt: de calore natui intelligit.
Quæ quidem etiam obtrineant ætate paucissimū,
adventitio calore abundant: vnde marcescit po-
tius, quā nutritur, corpus. Ad hanc & adventi-
tus calor tantū abest vt functiones meliores red-
dat, vt eas etiam longè inferiores efficiat illis, quæ
ad moderato proficiuntur. Pro regionibus
etiam, perinde vt pro natura temporū. In vehe-

menter calidis, sicut media æstate. In magno-
re frigidis, vt media hyeme: in temperata, ita vt
medio Vere. Ad hanc proportionē, quæ mediū
locum fortuntur. Similiter alij itatus æris non
circumdantur, calidi quidem, temporibus calidis,
frigidi frigidis, mediū medio Veri respondent.

Prægnantissimus pulsus, maiores, crebriores & ce-
lerrimos sunt: cetera verò nentur. In eis liqui-
dem, præter vsum, priorum miratū est nihil
incretū autem is, & augetur, quod mulier non
sibi tam sibi respiret ac pulset, sed sibi etiam ca-
gatur: quare celeriores, maiores, & crebriores
sunt pulsus. Somni etiam, si quid aliud, inter
naturalia censetur, qui & ipsi vsum pulsus:
initio si quidem minores, languidiores, tardio-
res, rariorēque illos efficiunt: procedentes, tan-
ditatem pedetentim augent, & raritatem, præ-
sertim a cibo: tunc tamen sunt maiores, velle-
mentioresque pulvis: tandemque diuturni si sus-
tineant, ad remissionem & paruitatem redeunt,
tarditatem & raritatem feruientes. Etenim fa-
cultas concitatur per somnum se intro recipit
magis: Cū ergo intro mouetur, concitatur
materiam, primo quidem veluti imbecillior red-
ditur: oneraturque paulo autem potē, dum alius
mento frulur, quod consistit, donā manū ipsa,
calore animantis augetur. Quia igitur oneratur
facultas initio somni, atque debilitatur, op-
porteret minores pulsus & languidiores existi-
re: at mox est contraria, & diuerso maiores, velle-
mentioresque. Cur autem concitatio per so-
mnum exactius fiat non in ventriculo modo,
sed in arteriis & venis, non est huius loci expli-
care. At verò quid quidem dormientibus mo-
tus calor qui foras tendit, est inminutus: vi-
get autem, qui intro: contractionem quidem
oportet celeritatem fieri, distentionem verò tar-
diorē: & proinde totus ille pulsus non est ab-
solutē tardus: potius quā velox, sed tantū alte-
ra parte tardus. Nam si motus qui intro pergit,
præpollens, prorsusque confidet ac raris inde
incipiat, qui foras tendit, huiusmodi hic pul-
sus distentionem producat plenam. Si vero
præpollens motus qui cōtrahitur foras, contrario
existente debili, minime sine tūc ob extremo or-
ditur collapsu in distentionē, ac summā tandem
assequitur magnitudinem. Porro dormientem
pulsus, quæ parte foras mouetur, similis est vigi-
lantium pulsibus: quæ intro, permultum videtur
distare, quod terminos internos motum sensus
nostr non assequatur. Minor tamen est & lan-
guidior, præsertim in ipso principio. Præterea tar-
dus in distentionibus est, & in contractionibus
velox, introque recurrens magis. Quare si vhe-
mentem eum in contractionibus dicas, nihil e-
res. Etenim excrementū fuliginosum, quod tunc
ex confectis succis copiosius colligitur, arteria
externe & vehemencius desiderat. At verò vbi
absolutē succi confecti sunt, si in somno perma-
near homo, immoderatus erit vique talis som-
nus: ob idque merito vterque motus erit minor,
tardus, imbecillus & rarus, cum nimirum som-
nus sit moris frater. Nam si alimentū elabora-
tionem excipias, quæ communis somno cum vi-
uentibus adest, ceterā mortem referunt: non
videre

Prægnantissimus
pulsus augetur,
crebrius &
celerius.

Somni quæ
pulsus facient.

Concitatissimus
facultas per so-
mnum se intro re-
cipit magis.

Contractionem
arteriarum per
somnia, car co-
llegere ipsa de
contractionibus
facit.

Somnus post
frigus facit per
duram immo-
deratam en-
tem.

Somnus est mor-
tis frater.

videre, non audire, nihil intelligere, vel cogitare, vel sentire, ratione carere, ac breuiter, proictum esse. Quid itaq; aliud est somnus, illo communi ablato, quam ad interitū via? Qui ex per-
gulfus. *Somnus est via ad interitum. Experiatur pulsus.*

gulfus, crebres, & cum quadam vibratione habent: qui mox mediocriterate assequuntur. Non perinde autem in somnum incidimus vigi-
30 *Somnus quo fit modus.*

les, ac ex somno evigilamus: quod hoc fere sub-
tō, illud omnino pedetentim fiat. Etenim turbu-
lenta insomnia, vel si quis vociferetur, perstre-
pat, aut ipsam dormientem tangat, celerem sic,
& subitaneam cōbitat mutationem. Quare tunc
pulsus illi quos nuper cōmemorauimus, claris-
sime percipiuntur. Fit autem somnus, vbi natu-
sus calor aut ex fangione, & nimia siccitate
ad alimentum sese cōuertit: aut ob immodicam
humiditatem foras nequit progredi. Quorum pri-
mus quidem saluber & naturalis exiit: secun-
dus autem, qualis est in comatibus & lethargis. 30
Cui opposita est phrenindum & vigiliarum nō
naturalium vigilia, vbi deficiat natus calor est,
& quasi inflammatus, atque idcirco foras
etiam mouetur immodicē. Accitna habitudi-
nes corporis, peritū pulsus vt naturales immu-
tant. Nam grauis natura, si quadam euaferit,
et qui talis natura est, asimilem pulsum habet:
ac sic de cetera habitudinibus est dicendum, se-
mota tamen omni virium immutatione. Iam
etiam temperamenta corporis accitna, pulsus 30
naturalibus temperamentis mutant similitudinem.

Calida siquidem calidis, frigida frigidis, asimiles
pulsus creant. Nam temperamentorum in humidi-
tate & siccitate discrimen, continetur in habitu-
dinibus corporis. Sicci quippe gracilitas, cor-
pulentia est humidis familiaris. Præterea duritia
corporis, sicca temperamenta mollitudo, humi-
da comitatur: atque ita pulsus his mollis est, illis
durus. Vt autem mutationes alias, quæ cau-
sis naturalibus carent, recensamus: exercitatio-
nes quidem, si moderate sint, vehementes, mag-
nos, celeres & crebros pulsus efficiunt: sin autē
multæ, viresq; laborantis excedant, paruos, lan-
guidos, celeres & crebros in summo. Nimiū im-
modicæ, adeo vt ægræ iam se possit homo moue-
re, et multis interpositis quæbus, aut nihil prorsus
possit, sed remissa vires impente sint, pulsus
mire paruos & languidos, tardosq; & raros.
Quod si peruentum eo sit, vt vires oppressæ sine
pulsu creant illis proprios. Etenim facultas in
exercitationibus, vniuersam adhibet contentio-
nem: vnde pulsus excitantur vehementes: visus
autem increuit, vnde magni, celeresq;. Cū vero
ille duplici ex occasione augeretur, nempe &
exhalatione spiritus, & incremento caloris: ob
id nimis crebri sunt pulsus, quod eorum visus
haud sans magnitudine & celeritate comple-
tur. Quod si adeo quis laborare cogatur, vt non
modò superiores facultates labores sint, sed con-
tinenter necesse habeat interquiescere, huic vni-
uersum corpus refrigeratur. Quare pulsus ob
imbecillam facultatem, languidi sunt & parui: ob
frigus, nec celeres, nec crebri. Balneæ calide,
moderate si sint, pulsus creant magnos, celeres,
crebros, vehementesq; immodicæ, paruos &
30

languidos, tamen adhuc caleres & crebros.
Quod si hic non cessent, paruos languidos, ra-
dos & raros. Etenim ex balneis commodatis,
si quis eis opportune vtatur, videlicet vbi de
fessis fuerimus, incaluerimus, refrigerati, refici-
cati, nauseate affecti, aut inæquali intemperie
fuerimus, aut denique evacuationē desiderave-
rimus, manifeste corpus iuuatur. Nam corpori
refrigerant modicam temperationē, vires
corrumpunt, opportuno calore augent, ac de-
nique vni cum sudoribus nonnihil & statim
discutiant. At immodicæ balneæ, ipsam faculta-
tem dissolunt, vsūque præter modum intē-
dunt. Frigide balneæ, illico paruos & langui-
diores, & tardos, rarosq; pulsus efficiunt. Pos-
tea, pro vt id sit quod induxerunt, omnino vel
torporem conciliabunt, vel robur. Quæ torpo-
rem induxerunt & refrigerarunt, paruos & lan-
guidiores, & raros & raros efficiunt. Quæ ex-
calfecerunt, & robur concitarunt, magnos, ve-
hementes, celeritate & crebriate moderatos.
Etenim balneæ frigide statim refrigerant omni-
no: postea verò vel confirmant, vel obtrunt fa-
cultatem, vniq; perfrigerant. Itaq; & pulsus pro
ratione immutantur causam. Porro in lon-
giora frigida, arteriarum motus plus intro quam
foras fertur: quod & calor illiculicō magis fe-
ratur. Cibus adeo copiosus, vt opprimat fa-
cultatem, pulsus inæquales atque inordinatos
concreat. Modicus, magnos, celeres, crebros, ve-
hementes. Parcius quam qui satis nutrit, non
acque ac moderatus, ceterum minus mutat, ne-
que id diu. Vinum pulsus cetera vt cibus va-
riat: hoc verò inter est, quod illico immutat, & ci-
uius mutatio a vino profecta recedat, quam illa
quæ a cibo: quod item celeritatem amplius &
magnitudinem, quam vehemenciam & crebri-
tatem augeat. Etenim appositio quam facit vi-
num, celeris est, quod humidum sit & calidum.
Præterea, quæ assidua ac subitō nutriunt, hæc
leuiter permeant. Quamobrem, vt celerem, ita
minimè diuturnam a vino appositionem corpo-
ra accipiunt, cū facile digeratur per halitum.
Porro quod nutrit, pulsus ita vt cibus variabit:
quod autē amplius quam ille calfaciat, insigni-
ficam ad dilicti illis & magnitudinem, & celerita-
tem. Iam verò in choleis, magnis alui fluori-
bus, mensibus, ac omnibus deniq; quæ immodi-
cè corpus vacuantia, ipsam facultatem debili-
tant, cōtinenter pulsus vermicultantes accidunt.
Vbi autem oppressa est a febre cacoëthe facul-
tas formicantes oriuntur. Siquidem vt pulsus
vermicultans sit, tardus omnino esse atque rarus
debet. At in acutis febribus (cuiusmodi necessa-
rio sunt cacoëthes) non sustinet pulsus caloris
copia, vel tardum in summo, vel fessum fieri ra-
rum. Ceterum tardus est, aut certe nō celer pul-
sus, vbi facultas opprimitur.

Balneæ calide
moderate si sint,
pulsus creant
magnos, celeres,
crebros, vehe-
mentesq; im-
modicæ, paruos
& languidos.

Balneæ frigide
statim refrigerant
omnino: postea
vel confirmant,
vel obtrunt fa-
cultatem.

Pulsus pro
est variis modis
mutatur.

Vinum quod
calorem ipsius
pulsus immu-
tat.

Vini appositio
ad corpora, vt
celeris ita ma-
ni diuturnam
conferat.

Vinum cur pul-
sum, quod ca-
loris, motum
ex celeritate
reddat.

Vermicultant
pulsus quibus
afflictibus acci-
dant.

Formicantes
pulsus quando
signantur.
Cacoëthes
febris.

Somnus est via
ad interitum.
Experiatur
pulsus.

Somnus quo
fit modus.

Somnus natu-
ralis quo.

Somnus præter
naturam.

Vigilia immo-
dica.

Accitna habi-
tudines, pulsus
vt naturales
immutant.

Accitna tempe-
ramenta, peritū
de vt natu-
rales permeant
pulsus.

Pulsus pro ex-
citatio
varietate ma-
tata.

Vinum pulsus
augeri ob ex-
halationem spiri-
tus, & incre-
mentum caloris.

Pulsus pro va-
rietate calidi-
tatem balneæ
moderate.

GALENI PERGAMENI de causis pulsuum, lib. IIII.

I N hoc autem libro, de causis pulsuum præ-
ter naturam dicamus, ab animi perturba-
tionibus orsi. Ite igitur alius est pulsus, ita pulsus quo
magnus, vehemens, celer & creber. Siquidem
30

facultates animalis moderatrices, si quando impendat necessitas, maiore vi suas obeunt functiones: ad quod in iracundia conspicitur. Similiter etiam per bonas iudicationes, pulsus sunt manifeste vehementes. Tunc siquidem facultas, vel molestia expledat, seipsam excitat. Lætitia magnus, rarus, & tardus est pulsus: at ut huiusmodi vehementia. Lætitia enim diffunditur per universum corpus calor, ac plus foras eius motus effertur, ut tristibus intro. Unde maior sit merito pulsus illorum, non tamen vehementior. Ceterum ea que diximus, & de moderata lætitia, & que propria ratione pulsus ipsos immutat, non de immodica, que vires ipsas * resoluit, intelligenda veniunt. Tristitie parvus, languidus, tardus & rarus est. Nam cum tristitia ipsa refriget, calorem intro concitet, merito contrarios pulsus superioribus efficit, qui lætitiæ sequuntur.

Pulsus reddi vel hemiten per bonas iudicationes.

Lætitia pulsus. Lætitia diffundit calorem per universum corpus.

Tristitia pulsus. Tristitia refriget.

Timor pulsus.

Timor immutat rariorem pulsus.

Pulsus pro dolor rariorem mutat.

Pulsus pro dolor rariorem mutat.

Nervosissimi partes pulsus duriores edunt.

tes, & minores: que pluribus venis præditæ sunt, & arteriis, contrari. Atque inter hos maior est, damus arteria in parte abundat: sitque tunc inæqualis, ac facile inordinatus. Porro quibus sepe transversum est iustam materiam, hi convulsiouibus sunt obnoxii: quibus pulmo, suffocatioibus: quibus os ventriculi, syncopsis: quibus iecur, atrophæ: quibus ventriculus, cruditatis: quibus renes, vrinæ suppressioni. Ad hæc, partes insigniores præditæ sensu, pulsus etiam dolorum nomine mutant: que minus sentiunt, pro affectu tantum. Etiam omni parti que inflammata est, hæc necessarii duo accidunt, calor immodicus, & tensio: que corpori vniuerso communicantur, ubi autem pars nobilis inflammata fuerit, aut insigni prædita inflammatione. Atque immodicus calor qui vniuersum corpus occupet, febris est, que vsum pulsum alterat dulcedem. At partis inflammatione tenso pervadat arterias: que ambrem pulsus durior reddetur, præcipue in versuosis partibus, quod præ ceteris hæc tendantur inflammationibus, ut que sunt sua natura iam tensæ, atque vni secum partes vicinas contendunt. Nihil autem est mirum, si inæquales in arteriosis partibus inflammationes fiant pulsus, cum eorum facultas infestis, opprimatur humorum colluvie, ipsæque sint affecta instrumenta. Pleuriticorum celer est pulsus & creber, nec admodum magnus. Videri etiam possit vehemens. Est tamen nec vehemens, nec languidus, quod ad affectum attinet. Etiam pleuriticorum pulsus, quia nervosior durioremque arteriis pulum, imperitiam ponit, ut videlicet durum pulsum, est vehementer existimant. At vero illa inæqualitatis species, que servantis præbet imaginem, pleuritidis in primis propria est signum: si quidem remissa sit, mollis & facile maturanda: si vero magna, difficilis, & admodum crudæ pleuritidis. Tales cum imbecillis facultate coniungantur, periculose existunt cum firma autem, aut tardè coquantur, aut ad suppurationem desecent, aut rabidos eas excipit marcor. Ac illius sanæque maturefcit, pulsus pedetentim deponit omnem mutationem præter naturam. Quæ vergit ad suppurationem, pulsus suppurationis proprios foratur: sicut & marcorum illa, que in tabem degenerat. Est autem ipsa pleuritidis inflammatione costas succingens membrana. Itaque febrilis acutè, quia pars affecta, cordis est vicina. Quia vero eo modo febricitant, ideo habent & pulsum celerem: durum autem insigniter, quod pars nervosa affligatur. Iam quia ita habet, ideo minor est pulsus, quam febris expedit. Quare ut & creber fiat, par est: quod magnos pulsus calor postulet, refragetur autem durities. Si quidem quantum ab usu abest magnitudo ipsius pulsus, taurum a crebritate pensatur. Inæqualis autem in his est crebritas, quod neq. humorum qui inflammationem committunt, una sit species. Quare si sint biliosiores, etiam febris acutior erit, cōsequenter facultatis offensio quædam. Sin piuitiosiores, & levior erit febris, & ad soporem proclivior. Nunquam enim in pleuritide & peripneumonia sit, ut caput non afficiatur, quod humorum excipiat in illis inflammationibus putrescenti fuliginē. Verum si patris humor fuerit biliosus, vaporē eductio infir

Inflammatio durior pars, vna sim promissa indicat.

Inflammatio partis, accidet necessario immodicum calor, & tensio. Potes quid.

Arteriosis partibus inflammationes fiant pulsus. In febribus pleuriticorum pulsus.

Pleuritidis proprium signum, quod febris vocatur pulsus.

Pleuritis est inflammatio costarum succingens membrana. Pleuritidis cur acutè subiacet.

Pleuriticorum pulsus celer, durum, minor quod febris expedit, nec non creber erit.

Pleuritidis varia symptoma- ta pro differentia humorum a quibus excitatur.

Pleuritidis cur caput peripneumonia non afficiatur.

insistit fuliginis acrem, qui mordicat & erodit, irritatq; cerebrū: itaq; ad delirium perducit. Si pituitosus sit, nec fumo acri similis, sed caliginis crasse turbulenti atq; quasi nubem quādam ad caput attollens, humectat id grauiter cerebrū, coagitat in grauem somnum deferri, atque sopiri hominem. Recte ergo, cum pulsus in maiorem crebriorem mutatur, aut peripneumoniam, aut syncope[m] nuntiant. Peripneumoniam, quod occupet semper, offenditq; lateris inflammatio vicinior pars, ut quæ a calido gignatur feruentēq; humore, atq; facile mobilis syncope[m] verò, ex affectu facultatis, vel per neruorum lesionem, vel soporem, cum ex pituitosis humoribus vaporantibus cerebrū ipsum repletur. Quod si lēssio progredi ad ramulos valeat, consequetur offensio neruorum: sicuti sopor, si nequeat. Ac talibus quidem humoribus, rariorē: contrariis, puta biliosis, crebriorē iusto modo pleuritidis pulsus eveniunt. Porro autem medius est inter raritatem & crebriorem modus in pleuritide, ubi qui morbum committit humor sanguineus sit. Sic etiam modus medius duritiæ ex tali humore, ac moderata inflammatione oritur. Augetur verò, aut ob inflammationis immo dicam magnitudinem, aut ob humores biliosos. Itemq; per contraria imminuitur. Suppuratorum pulsus initium statim pulsus refert vigetis inflammationis: nonnunquam est inæqualis & inordinatus ob vitia instrumenta & facultatem imbecilliorē, sed omnibus hæcticus. Vbi verd iam pus adfuerit, cætera quidem sit pulsus similis, æqualior tamen. At quem erumpit, languidior, latior, tardior & rarior. Qui igitur multum puris interthoracem & pulmonem collectum habent, si suppurati appellantur. Qui sunt, ubi maxima iuxta costas inflammatio, pervenit ad suppurationē. Interim affectus in comitatur peripneumonias. In vniuersum autem, omnes quibus inflammatum viscus aliquod conversum ad suppurationē, aut suppurati siue purulenti dicuntur. Marcotis nomen translatum a marcetibus stans est, quæ penuria alimentis extinguitur. Vbi igitur animantium naturæ calor eo dē modo marcescit, oportet esse languidum pulsus. Siquidem sic affectus, redditur facultas languida, ac proinde etiam sunt parui. Iam celeritate etiam quādi videntur præditi, quod neq; hæc habesse a febribus possit. Quia verò & febricitant, & facultates sunt imbecillæ, itaque pulsus habent parui, necesse iam simul & cerebrum obtinent. Porro facultatis imbecillitatem comitatur etiam circumnatus pulsus, qui in vtraq; parte decretus existit. Planum autem est, si affectus habituosus pulsus semper vndequeque similem, quod non ex humoribus morbus, neq; spiritu oritur, sed in ipsis consistit solidis partibus. In his enim corporis habitus vniuersus, ut carbo quidem, est factus: quæ de re hæcticos neoterici medici hos pulsus appellant. At quibus iam calor extinctus est totus, quod accidit potissimum senibus, rarior quoque sit pulsus. Hunc marcorem Philippus vocat ex morbo senium: quo præcipue occupantur proveciores ætate, & interim etiam iuvenes. Qui igitur vna cum inflamma-

tione, quæ nondum discussa sit, emarcuerunt, lægidos & celeriores, mirèq; crebros pulsus habent, ac decurtatos magnitudine in vno ictu. At verd hæcticus pulsus omnibus marcetentibus inest: enīq; eis communissimus. Post illam autem inæqualitatem distentionis magnitudine decurtata: quæ etiam adest pleriq; deinde crebrior: etenim hæc quoque omnibus qui ex inflammatione marcetunt, perpetua adhæret. Paucis autem marcetentibus in aliam inæqualitatem pulsus, ac illam quæ penes magnitudinem est, permittitur. Phrasicis habent pulsam paruum & languidum, ob facultatis imbecillitatem: at non nimium celerem, ut plerique febricitantes, quod vrenti febrī non derineantur. Ceterum habet & hi, ut febrim, sic pulsus hæcticum. Peripneumoniarum magnus est pulsus & languidus, mollior, similiter atque lethargicorum pulsus, nisi quatenus præpollat inæqualitatem, & in vno pulsu, & collectus, quam vocant: in vno ictu, nam veluti in interpellatur, vnde usq; ac inter dum bis feriens redditur. In collectis autem, cum altas dissetennas sortitur, tam modò intermittit, modò intercurrit. Neg enim est mirum, vel magnam esse pulsus illorum, vel languidū, vel inæqualem, ob pulmonis inflammationem, visceris tam laxi & molli, fistulæq; in artibus vndiq; infinitis cui, tamq; vicini cordi. Nam quæ laxum est & molle, & vndique vacuum, a pituitoso fiore atq; crassiore inflammatione sanguine. Talis enim fluxio, tunica vasorum irrigat, frangit autem vim facultatis, quæ in illis est: quo fit ut magnos simul & languidos pulsus efficiat. Quia verò cordi est ipsum viscus consuetum, multiformis inæqualitas gignitur: nimirum pulmonis arteris oppressis, constitit, atq; languidus redditis. Raro itaq; in peripneumonias pulsus dicroni accidit: quod si valorū duritiem postulet. Id pro offensa magnitudine, vel intermitte[n]tes pulsus, vel intercurrentes cernentur. Cum autem febre teneantur acuta omnes peripneumonici, atque habeant adiunctum non nihil comatus, si insignior esse videatur febris, pulsus erit admodum creber: si maius coma, minus creber existet.

Lethargicorum pulsus, pulsus peripneumoniarum est similis, magnitudine, remissione, molitudine: sed eo est tardior, rariorq; ac minus inæqualis, intermitte[n]s potius quàm intercurrentes. Est cum dicronis fiat. At vndosus semper in altis quidem sporibus est. Gignitur autē lethargus etiam ex pituitoso humore. Vnde merito eius pulsus similis est peripneumoniarum pulsi sui: verū hoc tardior, quod procul sit a corde remotum cerebrum. Est autē intermitte[n]s potius quàm intercurrentes, cum longè frigidior sit, atq; ut ita dicā, letalior morbus lethargus, quàm peripneumonia. Etenim affectus frigido, facultates quæ valde refrigerantur, proprius pulsus intermitte[n]s existit. Phreniticorum pulsus est parvus, modicèq; contentus. Rarissimè autem conspiciet[ur] magnus. Est præterea durus, nervosus, mirèq; celer & creber. Habet præterea non nihil vndosi: atq; interim subterre[n]te tibi videbitur: interim enī præcisus cum convulsionē quādam. Etenim febrili propriū celeritatis symptoma hic obinet

Phreniticorum pulsus si in maiorem crebriorem mutatur, nuntiant peripneumoniam, aut syncope[m].

Pulsus durities a quibus vniuersum suppuratorum pulsus.

Suppurati qui dicuntur. Suppuratio quida[m] accidit.

Marcotis nomen unde trāslatū, Marcotenus saluus pulsus.

Marcotenus febricitare.

Marcotenus pulsus est vnde quæqueque apud, quoniam consistit in solidis partibus. Hæcticus pulsus.

Senium ex morbo.

Marcotenus si maiorem crebriorem mutatur, quæda[m] syncope[m].

Phreniticorum pulsus.

Phrenitis habet ut febrim, sic pulsus hæcticum. Peripneumoniarum pulsus.

Pulsus febricitans letis, mollior: cum sit a pituitoso re inflammatione sanguine.

Peripneumoniarum pulsus ad esse febrim acutam, nonnulli quædam.

Lethargicorum pulsus.

Lethargus gignitur ex pituitoso humore.

Lethargus esse peripneumoniarum morbum peripneumoniam. Phreniticorum pulsus.

evidentiſſimè, in vitroque termino diſtentionis, præcipue extremo. Invenitis etiam inæqualitatis in poſitu genus, inſigniter aliquando in illo appa-
 re. Inò totam ſubinde arteriam, ſua ſede de-
 ſerta, cõſpicias atrolli poſitus cum vibratione e-
 bullientè, quàm more pulſus diſtenti. Pari mo-
 do detractam ponis, quàm cõtactam. At verò
 in modica eius crebrietas proximè denunciat ſyn-
 copam. Nec ſanè cauſas illorũ quæ diximus in-
 venire magna boſis fuerit, ſi ſcias generari à bi-
 boſo humore plerentis, vt lethargum à prurito
 ſo. Præterea lethargum à præcipiti gignit in cere-
 bro: phrenitum verò in tenui meningè, atq; ſepto
 tranſuerſo. Qux ſi memineris, etiam parvus me-
 ritò pulſus & durus eſſe, nò habebis necèſſe diſ-
 ſectare. Atqui ſi affectus calidus eſt, pulſus autem
 parui, omnino etiam credi ſunt. Porro phreni-
 ticorum pulſus rariſſimè vadoſus percipitur, q̃
 mollitudine vacet. Quod verò ſubterrere im-
 becillæ facultatis ſit ſignum, alibi à vobis oſen-
 ſum eſt. Vbi enim arteriarum facultas ob caloris
 copiam diſtendere illas amplius conatur, idq; tu-
 nicæ duritiæ prohibeat, quodammodo videtur
 pulſus ſubterrere; id quod tunc poſſiſſimè ac-
 cidit, vbi ſyncopa imminet: quo modo vbi con-
 vulſio, etiam motus pulſum eſt, convulſius. At
 hoc plerentia pulſus habent perpetuum, vt cum
 convulſione quadam motus eorum abruptum
 par, non autem paulatim deſinat: calor ſiquidem
 viger, ſuntque dura ſtrumenta. Iam vetò in-
 ſignis illa crebrietas, cum ab imbecilla facultate
 exoritur, ſyncopem inſtare portendit. Eſt &
 alius quidam affectus ex phrenitide & lethar-
 go conſtitus: quo quidem qui tenentur, vt plu-
 rimùm oculis conſiſtunt, ſomnolenti que ſunt
 & ſtertunt. Rurſus oculis fixis, inconſueti-
 bilique duritiſſimè, vt catoda, inveniuntur. Quod
 ſi illos ad colloquium compelles, difficiles ſunt,
 ad reſpondendum tardè: plerumq; etiam ſtulte
 loquuntur, temerèq; reſpondent. Horum igitur
 pulſus ſunt celeres crebriſque, perinde vt phreni-
 ticorum, minus tamen: & roboris item minus q̃
 illi obtinent. Iam autem ſunt, ac breues. Exter-
 num motum non habent ſubritò truncatum, ſed
 alio modo veluti intrò ſe propiſcentes ſubterfu-
 giunt, ac concitant contractionem, & quaſi ſuſ-
 titantur diſtentionem. Caro chorum pulſus cæ-
 tera lethargicis ſimiles ſunt, magnitudine, tardi-
 tate, crebriſſime: vt nec tonus huius affectus ſpe-
 cies latè ab illo diſidet. Caro chorum tamen nò
 imbecillis eſt pulſus, nec mollis, ſed in his ſanè
 multum diſfert: vt etiam in hoc, quòd laxatur le-
 thargia atq; inſumelicit totus habitus, contra
 ſtipatur cõgrediens catodis. Præterea æqualis eſt
 caro chorum pulſus, inæqualis lethargicorum.

Convulſorum ipſum corpus arteriæ videtur
 compactum, & vndiq; coactum eſſe, veluti in-
 ſtrumentũ cauum ex vitro ſine diſtentione. Mo-
 tus autem ipſius arteriæ eſt in modum chordæ
 furſum deorſumq; agitata, inæqualis, idq; mini-
 mè certis temporibus. Cæteri vellemeus & ma-
 gnus convulſorum pulſus videtur. Eſt verò hic
 non imbecillus nec parvus: non perinde tamen
 vt videtur, vellemeus vel magnus. Ictus enim
 imponit, dum ob tenſionem validus, ob vibra-

tionem ciliare apparet. Paralyticorum par-
 uus pulſus, languidus, tarduſq; eſt. Nònulli ra-
 rus quoque, alius creber, ſed nonnihil inordinatè
 intermittens. Eſt enim parvus & tardus, quia
 morbus eſt frigidus: languidus, quòd facultas
 infirmior. Comitialium & attonitorum pul-
 ſus ſunt ſimiles: quare quæ de comitialibus ex-
 ponemus, eadem de attonitis, ſed cumulatis,
 ſunt accipienda. Dum affectus non viſquea deo
 invaluit, nulla inſignis in pulſu mutatio cen-
 ſetur. Tandem eſt convulſus intentè iurè vtrique
 arteriæ. Sin autem affectus ſuperet facultatem,
 inæqualitatem atq; tenſionem validam ſibi con-
 trahit pulſus: necnon minor, languidior, rarus,
 tarduſq; efficitur. Si morbus opprimat facultate-
 tem, languidus, parvus, celeriq; pulſus concil-
 liat. Auguſtæ pulſus tenſione quadam prædi-
 tus eſt, convulſus perſimilis. Magnus eſt & vado-
 ſus, vt pulſus peripneumonicior. Cæteriũ
 ſi peripneumonica ſpecies ſuperior ſit, in perip-
 neumoniam; ſi verò convulſus, in ſpſmum
 angina deſinet. Quicunque autem ex anginoſia
 ſuffocantur vehementer, paruum hi habent &
 rarum pulſum: vbi verò iam animam agunt, cre-
 brum atq; inæquale. Plus autè vel minus ten-
 ſionis habet angina pulſus, pro vt humor in fau-
 ces inſiſtens aut bilioſior, aut pituiſſior fuerit:
 necnon pro ipſorum inſtrumentorũ in albedi-
 ne diuerſitate. Siquidem neruoſiora & contem-
 pora vehementius pulſum teſtificant: carnoſa &
 remiſſa, illum vadoſiorem efficiunt. Ortho-
 pneuxia acuta (talis enim eſt, quæ diuturna) inæ-
 qualem habet pulſum, & inordinatum, deficientemq;
 ngultum. Qux mediocriter eſt grauis, cre-
 brum. Qux violentiſſima, tardum & deficientem.
 Qux iam permiſce hominè, crebrum, & lan-
 guidum. Cæteriũ pro diuerſitate oſenſæ, vel
 creber magis, vel rarus ſit pulſus. Nam celer, ob
 facultatis imbecillitatem ſit nunquam. Vteri
 ſuffocationis pulſus, vt ſi convelletur, protenſus
 eſt, atq; rarus. Quod ſi exaltis ſit ſuffocatio,
 creber, inordinatus, & nonnihil deficient. Cum
 enim neruoſus ſit locus affectus, par eſt vt pro-
 tendatur pulſus, quaſi cõvulſus exiſtat. Qux ve-
 rò affectus eſt frigidus, aduulſa eſt raritas. At
 vbi oppreſſa iam proſus facultas ſit, recte ſit cre-
 ber, inæqualis, & nonnihil deficient. Os ven-
 triculi affectum, ſi duntaxat ſit inſiſtarum, tra-
 pulſum immutat, vt ſolet corporis neruoſi in-
 ſtammatio, ſi comprimitur, vellicetur, langue-
 ſcat, ſingulat, vomat, nauſeat, faſtidiat, do-
 leat, pro genere cuiuſque ſymptomatis. Nam
 vellicationes, vomitus, nauſea: ſingultus, lan-
 guor, non ſolum paruum & languidum red-
 dunt, & interim modicè celeriorem, ſed etiam
 admodum crebrum. Sola verò compreſſio,
 rarum, tardum, paruum, & languidum, qua-
 lis etiam per caninam famem conſpicitur. Por-
 rò omnes affectus qui in crebriſſimè mutant,
 ſi ſint diuturni, vel grauiores eualeſcant, pul-
 ſum gignunt vermiculatum. Qui verò in rari-
 tatem, non ſolum commemoratas differentias
 adaugent, ſed ſpeciem etiam inæqualitatis in
 vno pulſu generant, vt multis locis perſimile
 corpus arteriæ videatur: nimirum ob ipſius in-

Phreniticorum

pulſus in modo

ca crebriſſimè,

proximè denū-

ciat ſyncopam.

Phreniticum à bi-

boſo product

humore.

Lethargum ab

humore prurito

ſo emitti.

Lethargi gigni

in cerebro.

Phreniticum g-

ignit in tenui

meninge. Et in

ſepto tranſuer-

ſo.

Phreniticorum

pulſus quod-

nam adſu per-

petuo.

Catalepticorum

diſcriptio &

pulſus.

Caro chorum

pulſus.

Catechorum le-

thargicorum q̃

diſtinctionem.

Convulſorum

pulſus.

Paralyticorum

pulſus.

Paralyſis eſt

morbus ſine

ſententia.

Comitialium

pulſus aſſe pul-

ſum apopleſi-

corum ſimilis.

Angina pulſus.

Orthopneuxia

pulſus.

Vteri ſuffoca-

tionis pulſus.

Pulſus differre-

ntia pro variis

ori venterali

affectibus.

Famæ cauſa.

*Mydriopum seu
gula speciei
quam pulsus
differentiam
fortiatur.*

Aflicti.

*Tympanitis re
pleta viscerum
corpus spiritus.
Anasarca im
buit humiditate
se viscerum
corpora habi
tam.
Elephantiafi
pulsus.
Ictericorum
pulsus.
Flena bilis ob
struat vias dis
cand.*

*Ventrum epa
tom quater
folet pulsus
mutari.*

strumenti interperiem. Aquæ inter cutem pul
sus: Ascite parvus crebrior, subdurus, & cū qua
dam tensione est. Tympanitæ longior, non im
becillus, celerior, eteher, subdurus, cum quadam
tensione. Illius quam anasarca vocant, vndosus,
lanior, mollior. Ascites quidem, copiam acce
ruas nō modicam secundum ventrem humoris
aquis, simul magnas arterias intendit, grauat,
refrigeratq. At tensionis quidem nomen meri
to reddit pulsus cum tensione quadam subdu
rum. Quia verò facultas læsa & refrigerata est,
minorem. Iam quod minorē iusto, hoc etiam cre
briorem, præsertim vbi adiuncta sit febris. Tym
panites minus grauat, verum nō minus tendit:
quare pulsus etiam subdurus gignit, cum nōn al
la tensione, sed aliquanto celeriores, minūq. im
becillos, quā ascites: at crebros, iisdem de caus
is ac ille. Longiores, ob leuitatem tegentium ar
teriarum corpora, quæ quidem in tympanite adeit:
etenim spiritus vniuersum corpus replet. Anasar
ca autē, quia imbut vniuersum corporis habi
tum humiditate copio sa, tunicas reddit arteria
rum molles, ac proinde pulsus mollores, vndos
us, latiorēq. efficit. Elephantiasis pulsus par
uus, languidus, tardus, crebrior est. Ictericorum
pulsus est, si absit febris, minor, durior, crebrior,
non languidus, nec celer. Vim enim posidet de
ficcandi aīa bilis, vt muria, & mare. Quam ob
rem tunicam arteriarū in durando & deficcādo,
pulsū quodq. reddit duriorē atq. minorē, ac
proinde etiam crebriorem. Cæteri nec languid
us est, nec celer, quia nec imbecillitas, nec fe
bris adeit. Qui sumpserunt ventrum, hi pau
lo ante vomitum, vbi comprimunt, pulsū li
bentiatum, rarum, languidiorem, atq. tardiorē:
interea dum vomunt & diuellunt, inæqualem
& inordinatam. Cū rectius habere ceperint,
ordinatum quidem, sed inæqualem ad adiuu
mū tamen quā ante. Vbi vero iam ad natura
lem reuertuntur statum, æqualem ac maiorem
quā dudum, vehemētioremq. Qui horum syn
copa corripitur, conuelluntur, atque singul
nunt, paruum hi, & languidum, inordinatumq.,
& celeriorē, atq. multum crebrum sortiuntur.
Qui ex his suffocantur, paruum, languidum, in
ordinatum, inæqualem, non autem crebrum, nec
celerem, sed potius tardum. Representat etiam
nonnihil vndosus & latus, atq. inter dum parū ar
teriz tensione.

GALENI PERGAMENI de præcognitione ex pulsibus, liber primus.



*Præcogniti ha
bri non futuri
non modo, sed
præcogniti o
tineat, atq. præ
teritorum.*

*Canterum pi
peratum pul
sus, ma gene
ra.*

Vōd non tantū futurorum præ
cognitionis sit, sed præcognitionis etiam atq.
præteritorum, satis id Hippocrates
demonstrauit. Cuius quidem qui
peritus futurus sit, eum in iis quæ de
dignoscendis pulsibus, deq. differentiis, & caus
is pulsū a nobis tradita sunt, prius exerceri
oportet. At verò causarū pulsū diximus esse
vnum genus, eorū generatōni coniunctū, quod
scilicet naturale existit: alterum autem contrariū,
nempe causarū præter naturam: ac tertium de

nique causarum non naturalium. Quæ triage
nera referuntur ad illorū essentiam veram: aliud
autem quartum, ad apparentem. Quod quidem,
quia propriū est in primis præcigendi com
mentationi, diligentissimè est explicandum. Por
rō nullus pulsus mutari potest, nisi effectrix eius
facultas, vel tunica arteriz, vel vīus, quā obre
fit, in aliqua sint mutatione & alteratione. Vbi
igitur pulsus, exempli gratia, maior equo videat
ur, expendendum est, facultasne sit robustior:
an hæc eadem manserit, mollior autem euaserit in
nica arteriz: an quod increuerit vīus, talis muta
tio acciderit. At si facultas robusta sit, pulsus ce
rit vehemēti. posuimus autem eum maiorem
duntaxat videri. Quod si tunica tantum arteriz
emollita fuerit, pulsus necessariō erit mollior. Si
igitur neutrum appareat, clarum est mutatū ali
quatenus esse vīum pulsū generandorū, quē
esse docuimus duplicem: primum atq. maximū,
tutelam natui caloris: alterum, animalis spiritus
generationem. Sic voco illum quō virtus anima
ad voluntarias functiones. Cæteri si parua fiat
a natura & alteratio ob vīum, sola pericula erit
magnitudo, nōdum autē celeritas. Si maior, in
creuit magis magnitudo, & clarē celeritas ap
parebit. Si adiuu amplificabitur, magnitudo
celeritatēq. augebuntur, atque accedet præterea
crebrietas. Sit autem nō sit factus maior pulsus,
sed talis esse videtur, gracilius solio aliqua de
causa euasit hominis corpus. His cognitis, in
eundem examen cit, primum in corporibus sim
pliciter sanis: mox in iis, vbi adiunctus est ali
quis ascitis motus: postea in corporibus sim
pliciter ægrotantibus: ac postremo in iis, qui
bus alteratio quæpiam adeit externa. Etenim in
corporibus inculcata valetudine præditis, doce
bit magnus pulsus & temperamentum hominis,
& corporis liabitudinem. In corporibus vbi adi
unctus est ascitis status, illum præpollere mo
tus, cui magnus pulsus est peculiaris. At in iis
qui ægrotant simpliciter, indicabit magnus pul
sus calidam & morbicōstitutionem. Si vñ cum
morbo recens ab aqua externaque alteratio ad
sit, illum vincere motum, cui magnus pulsus sit
familiaris. Reuocandus autē ad memoriam pul
sus est moderatus (qualis reperitur in corpori
bus optimē temperatis, atq. ab omni qualitate
adventitia alienis) & quē nunc in venimus, ma
gnus, vt in comparatione illius considerandus
est, ex qua causa in magnitudinem ipsam exce
uerit. Aut enim ex gracilitate corporis, aut ex ca
lore temperamenti, aut ex ascitis motu. Cæteri
um motus ascitis mox desinunt: permanent ve
rō amplius ob gracilitatem & temperamentum.
At verò omnium alterationū quæ corpori acci
dunt, certissimā assequimur in illis corporibus
cognitionem, quorū naturam noscimus. Hæ
autem non agnosimus semper, quare nec in ex
actam vbique cognitionem venimus: verū in
cognitione absoluta tantū abierimus, quān
tū ab ipsius naturæ cognitione. Igitur mutationes
pulsū ex causa externa, in hunc modum sunt
discernendæ: Quæ ex balneis, cursibus, frictio
nibus, cæterisque moribus sit, non est diuturna,
sed mox ad pristinum statum reuertitur. At ma

*Pulsus vīum
esse motum,
qua ratione de
prehendamus.
Pulsus genera
dorum vīus est
duplex: tunica
lanior caloris,
& animalis
spiritus consue
tatio.*

*Pulsus modera
tus in quibus
nā generatur.*

*Ascitis motus
mox desinunt.*

*Pulsus muta
tiones a causa
externa, quo
modo desinunt
da sunt.*

gnitudo pulsuum ex vino & cibo profecta, diu-
tius existit. Hæc ex vehementia exploratur,
quæ illi coniuncta est. Nunc tantum si propo-
situs est, qui diutaxat sit maior. Iam etiam ma-
gnitudo quam ira concitat, adiunctam habet
vehementiam: quæ alioqui prudentem non la-
teret, si oculos iram respiciat, vniuersum corpus.
Etenim calor quidam copiosior secundum pe-
ctus ratorum, non secus quam exercitatorum,
percipitur. Atque hi sanè sunt artificiales modi cau-
sæ, solum dignoscendæ. Externos autem, vbi mi-
nimè in tentatores, ac pelsimos sycophantas,
fraudulentosve incidere, partim per inuestiga-
tionem, partim ex eo quod non discerneris ab æ-
groto, quamoptimos fore iudico. Nam qui sicut
dum medicus non semper ægros adest, nec illi
volunt veritatem exponere, hi sunt difficilissi-
mi, & medicum requirunt accuratè prudentem.
Cui sanè ad veritatem peruestigandam esse pri-
mus scopus debet ipsius accessioneis tempus: dein
ægotantis cõsuetudo & mores. Sunt siquidem
qui medico imponant, nihilq; magis habeant in
votis, quàm vt coarguant illum, eumq; nihil firmi
sire demostrant. Quare tunc habenda omnia
suspecta sunt, distinguendiq; tum quæ prop-
ria artis ratione pertineant ad dignoscendum,
tum quæ adueniunt extrinsecus. Alij contra sunt
candidi, modestiq; nec cellat quicq; dissimulauit-
ve: quare in his nil clam factum, est suspicandum.
Porro cum magnus pulsus nunc ad moderatum,
nunc ad alium quemlibet referatur: cumque du-
plex sit hic quilibet, aut minor moderato, aut ma-
ior: deinceps de incremento ad magnitudinem
est dicendum. Vtriusq; pulsus: dico enim mino-
ris eo qui mediocrius est, & maioris. Commune
igitur est omnis ad magnitudinem incrementi,
solum auctum calorẽ esse, quo scilicet tempore
nec facultas affecta sit, nec instrumenta, sitq; im-
motus ægotans. Proprium autem est deæxui
illius à natura, vnus magnitudinis incremen-
tum. Reliquorum duorum etiam, nempe celeri-
tatis & crebritatis nonnunquam. Cõmutatio-
nis etiam pulsuum in paruitatẽ, tres numero sunt
differentiæ. Aut enim ex moderato, aut ex maio-
re quàm hic sit, aut ex minore, mutationes in pa-
ritatem contingit fieri. Vocatur autẽ qui mo-
derato est maior, absolutè magnus: qui minor, pa-
uus. Sit igitur pulsus cuiuspiam homini minor q̃
dudum, mutatione præditus præterea nulla vl-
lius generis. Etenim minor solito pulsus sit, aut
cui imbecillior facta sit facultas, aut instrumen-
ta duriora, aut vsus remissus. Nunc autẽ nec im-
becillior facta facultas est, alioqui coniuncta sit
cum paruitate remissio: nec corpus arteriæ du-
rius (neq; enim tum minor tantum, sed & durior
pulsus esset) superest ergo solum esse alteratum
vsus: ac si id tempus quiescit homo fuerit, quan-
titan refrigerationis quantitatẽ respondere muta-
tioni. Quæ quidem mutatio accidit ex maiori
pulsu, q̃ qui sit naturalis. Nam de naturali statu
ob frigiditatem mutatio ad paruitatẽ, simul etiã
rariorem eum atq; tardiorẽ reddit. At immi-
natio ex magno supra modum aucto, statim ad-
iungit sibi celeritatis & crebritatis aliquid: quod
qui multũ vltra modũ sit auctus, tribus in gene-

ribus variet. Quamobrem qui magnitudinẽ tantũ
imminuit pulsus, & reliqua seruat immota, hic
est qui paulo maior sit iusto, solidiq; ex paruo in-
cremento calor is consistat. Iam verò, quemadmo-
dum vbi corpus caluit præter modũ, magnitudo
planè prima, mox celestas, inde crebritas appa-
ret in pulsus: sic etiam vbi refrigeratur, raris pri-
mò percipitur, deũ tarditas, ac vltimo loco pa-
uitas. Porro causæ refrigeratẽ totidem numero
sunt, quod numerantur calfacientes. Aer siquidẽ
frigidus nos circumstans, inspiratq; & aqua
frigida, vel balneum, vel medicamentũ corpori
inunctũ, refrigerat. Quinens longa quies, & vel
vñ latebris, & pituitosis cibis, medicamentisq;
refrigerantia, ac breuiter, metus diuturnus, cor-
pus frigidus efficiunt. Ex contentis in corpore
humoribus, qui frigiditẽ peramentum cum antea
quiesceret, nunc cõmon, aut tenuiores quodam-
modo calidis sunt effecti, etiã corpus refrigerat.

Arteris alnudo semper æqualem latitudinẽ
distentionẽ habet: sed sit vt occultetur aut arceat-
ur sæpe à corporibus circumiectis & oppositis,
vel vniuersus motus, vel certè eius quedã pars:
idq; aut in profunditate magis, aut in latitudi-
ne, aut simul in vtraq; dimensione. Vbi igitur per
totum corpus sensu nostro pulsare nulla arteria
percipitur, iam affectus dicitur pulsus priuatio: re-
vera tamẽ in corpus viuũ nunq; cadere potest.
Neq; enim est vnq;que, quin cor vnũ cũ arteriis, in
omnib; agitur. At verò longi dicuntur pulsus,
quibus sensibilis motus longitudo naturalẽ ex-
cedit: breues, quibus infra naturalem statũ est:
quibus par est naturali statui, moderati. Tantũ
enim animadverterit semper de motu arteriarũ,
quantũ permittunt adiacere na corpora. Vnde
fit, vt corpulenti breues pulsus fortiantur: gracili-
les verò, longos, & quadrans, moderatissq; esse
moderati videantur. Iam etiam apparentis mo-
tus lita, non æquẽ semper vt profunditas, lantudo
impeditur. Verũ vbi arteriarum regiones in
obliquo, vel adipis, vel carnis, vel vaporum, vel
humorũ sint plenæ, ac incumbens superne cutis
nihil eas oneret, lantudinis tantũ obfcuratur mo-
tus: & magis si vellemus pulsus & magnus, quã-
rẽm in ipso est, fuerit. Cum verò regiones vicine
sint mundæ, rugosæ autẽ que eas tegit cutis, ma-
gis profunditatis motus lateris eo corpore, ac
ponus si non vehemens pulsus & magnus, quod
in eo est, sit. Si igitur pulsus in venias lãgiorem
iuitũ, si quidem vnã lantitudo eius profunditatisq;
increscit, vide gracioli hominẽ solito, an cal-
dior eualet, remoto motu aduentio. Nam si
factus gracioli sit, idq; tantũ, quantũ est pulsus
maior, vnũ hoc tantũ eum immutauit. Sit autẽ
nũ tantũ, non hoc modũ est causã, verũ
etiam calor. Quod si in eadem constitit habi-
tudo corpus, solus mutatus est calor. Si uerò
fratior eualet, duplo auctum calorem æstima. Si
longior sit factus pulsus, & lantior, nũ autẽ per-
inde auctus profunditate, sed moderatus, huic
præter superiores notas, necesse est rugosiorẽ
eualet luperne arteriæ incumbẽtẽ cutem. At
si conuersas membrũ, vt quæ eius pars modũ su-
perior erat, nunc sit inferior, nulla tum profun-
ditas videbitur impediri. Atque hi quidem duo
pulsus

Canfarũ digno
sciderant qui
sunt artiheden
in modo.

Canfarũ digno
sciderant qui
sunt artiheden
in modo.

Canfarũ digno
sciderant qui
sunt artiheden
in modo.

Canfarũ digno
sciderant qui
sunt artiheden
in modo.

Canfarũ digno
sciderant qui
sunt artiheden
in modo.

Canfarũ digno
sciderant qui
sunt artiheden
in modo.

Canfarũ digno
sciderant qui
sunt artiheden
in modo.

Canfarũ digno
sciderant qui
sunt artiheden
in modo.

Gracilitatem
corporis qui
pulsus significat.

pulsus, in primo libro de eorum differentiis, omnium primum inter vigintis septem pulsus constantes ex dimensionibus terminis, sunt in tabellam reperi. Reliquorum autem vigintiquingque haud difficile fuerit causas simili etiam methodo investigare. Igitur ubi supra proportionem profunditatis & latitudinis longitudinis fuerit extensa, corporis significat gracilitatem: non tamen ubi ¹ imminuta intra proportionem profunditatis est, corpulentiam denotat, sed vel naturalem quandam conformationem, vel situm arterie inaequalem. At vero quæ quidem in omnium primo, ac magno distincta sunt pulsus, eadem etiam in vltimo, nempe breui, angusto, humilique (qui nimirum vocatur parvus) sunt distringenda. Nam si naturaliter comparata sit corporis habitudo, hic pulsus non solum videtur parvus, sed etiam talis existit. At cum crassior sit, si ² quantum homo seipso crassior evasit, tanto sit pulvis minor, erit tum quidem quod ad ipsum attinet, moderatus: sed ob corporis crassitudinem minor moderato videtur. Si longè sit crassior quam pulvis minor, is pulsus quantum in ipso est, mediocriter erit maior. Sin autè minus sit crassus quam parvus pulsus, hic, si eius naturam spectes, naturalis erit minor. Quod si gracilius corpus sit, quam videatur pulsus parvus, is sane est parvus natura, sed non perinde videtur parvus, ac verè est: quod gracilitas, quatenus à natura recessit, hæcenus ei speciem magnitudinis augeat. Similiter etiam in aliis pulsibus omnibus adhibenda eadem est distinctio, quæ de parvo & magno pulsus est adhibita: sciendumque illorum quorum vel parvum esse natura, vel magnum, vel moderatum. At tres hi pulsus in quantitate distinctionis possunt, quod ad ipsius rei naturam attinet. Videntur verò esse vigintis septem, ob crassitudinem vel gracilitatem corporis, vel ob rugosiorrem cutem, vel regionum arteriarum inaequalem angustiam, vel proprietatem conformationis. Jam verò longus, angustus, & humilis pulsus, quod qui dem ad suam naturam pertinet, idem erit & parvus: nimirum longitudine ipsa accedente ob tenuem habitudinem corporis. Quod autè & languidus sit, hinc evadit perspicuum, quod nunquam facultate valente, pulsus esse parvus ad summum possit. At duritiem nihil est necesse coniunctam esse huic pulsui. Oportet tamen cor vni cum arteriis esse refrigeratum, atque etiam minus perfrigeratum. Quod verò refrigeratum esse, læsam esse facultatem sit refrigerari autè, mutari usum, utique intelligere oportet. Facultas essentia singularum partium, in singularum illarum posita comodo temperamento est. Nam tum demum suum quæque munus obit strenue, ubi sit temperatissima. Contrà male fungitur, si immoderate sit: atque hæcenus male, quatenus sit immoderate. Ad eundem modum cordis corpus cum immodicè fuerit refrigeratum, calidum, humectatum, aut exiccatum, pulsus pro sua immoderate modo facit languidus: id quod, illi est facultate oblatam esse. At verò consuetudine habere cum sanguine in ipsius contento finibus, & cum spiritu, qui calidior longe ac naturalis status requiritur, sit, aut cum eo qui in involucri cor ambiente consistit, vel in pulmone, aut cum ipso etiam involucri cor ambiente,

& pulmone: usum est tantum variasse, citra facultatis offensam. Ac sic eandem rationem habet, refrigeratum esse, & refrigerari. Nam si in ipsa cordis temperie frigidum elementum præpollat, facultas læditur. Sin verò in tunica cor ambiente, & in pulmone, sanguineque & spiritu, quos eius ventriculi continent, usum est remissio. Jam humiditates & siccitates, si in ipso corpore cordis consistant, nocet facultati: si in quopiam vicino, non immutant usum. Si quidem probè temperatura, intempericque, ex quatuor sunt elementis: usum verò incrementa vel remissiones, duntaxat ex calido & frigido. Porro ubi iam ad vltimam usum dissolutionem deveniat, corporibus vicinis cordis vehementer refrigeratis, non poterit etiam cordis corpus non immoderate existere: id quod nihil est aliud, quam facultatem debilitari. At verò ubi cum duritie coniunctus est pulsus ille oblongus, angustus, & humilis: necessarium etiam adesse vel languidus, vel medius inter languidum ac vehementer: declaraturque esse affectus in corpore, qui reddit arteriam duram. Hæc est scititas, vel contractio à frigore, vel tensio. Scititas quidem in ardentissimis febribus, ubi pessime inveterant: ac præcipue in marcore torrido, certisque melancholicis & quartanis febribus generibus. Contractio sit à rebus refrigerantibus. Tensio ab affectibus convellentibus, & ingentibus inflammationibus. Ex scititis verò contractio arteriarum & tensio nascitur, cum aliis, tum vel maxime ubi lien & hepatis cirrho indurantur. Sed ratio eiusmodi affectus deprehenditur, & per vrinam, & alui excrementa, perque tum linguam, tum uniuersi colorem corporis, atque adeo etiam per febrium genus. Qui autè alij corporis affectus pulsus creant durum, partim originem ex recentibus offensionibus repentinam trahunt, reliqui omnes pederentim. Offensiones quæ inducunt eiusmodi affectus, sunt vini potio & frigida immodestia. Saepe etiam fructus refrigerantes, balneumque frigidum. Deprehendes noxam à vino illatam, cum subito pulsus non durus modò, sed maior etiam sit, celerior & vehementior. Cæteras à vino in cõmuni discernes, quod nec magnitudinem adiunctam, nec vehementiam, nec celeritatem habent: singulas autem seorsum. Vbi symptoma aliquod apparuerit, eorum quæ fructibus id genus ingentis solent supervenire: ut delirium, exempli gratia, quod à vinosis fructibus proficiscitur. Jam verò si nervorum originem aliquis dictorum affectuum occupet, convulsivas dispositiones inducit. Sic enim illas appello, quæ ante mortem, convulsiones aliquod necessarium comitatur symptoma. Ac moritur sane omnes in hunc modum affecti, etiam minus calidi, contrà ac illi, qui corripuntur syncope: hi si quidem vehementer etiam frigidi, vivunt adhuc. Est autem oportere primum nosse, omnes duos simul & parvos pulsus, quamcunque simè fieri vibratos: & si qui vibrati non sunt, eos aut ob vitiata facultatis imbecillitatem, aut remissionem usum, aut vtriusque concursum, non admittere vibrationem. Nam si quidem vltus magnam postulat distentionem, visque parari valeat vitalis, sed vnum refragetur corpus

Temperiem in
temperiem
corde, ex qua
tuor elementa
constant.

Scititas in
quibus morbo
ar
temis ad ad.

Contractio.

Nonnulla à
vino, quomodo
deprehendenda.

Convulsivæ di
spolitiones qua
sunt.

Duos simul
parvos pulsus,
quomodo fieri
vibratos.

*Vibratio pulsus
quidam acutus.*

*Vibratio pulsus
sive si alius non
nihil roborem
facilitati pos
sibile dicitur.*

*Moderatus pul
sus quomodo
dicitur.*

*Celerior pul
sus calidus
tardior frigidi
us tempera
mentum dila
tas.*

*Celeris pulsus
modi magnitudo
modo adin
gitur crebrius.*

*Mutationes pri
mae et simplici
ssimae pulsus
in naturam
et tarditatem.*

arterie, quod attolli in magnam distentionem
prædurie non possit, vibratio in eum statum
incidat. Nulla præterea ratione fiat arterie vibra
tus motus. Quocirca hic pulsus qui videtur vi
bratione carere, aut extremam imbecillitatem
virtutis, aut remissionem vsus declarat maxi
mam. At vibrans si sit, non nihil roboris facul
tatem possidere portendit, nec pulsuum vsuum
profusus dissolutum existeret. Ad eundem modum
si pulsus citra vibrationem a longiori sit natura
li, angustior & humidior, non longissimè tamen
a natura in singulis his recesserit, sed ali
quantulum: si quidem etiam sit durus, frigidita
tem, vel facultatis imbecillitatem indicat, vel
vtrunq; simul. Atq; hæc ex cōsequentiis discer
nuntur. Sin verò simul & durus sit, & vibrans, il
los significabit affectus, à quibus durus pulsus
produciatur: facultatē tamen nō imbecillam, vt in
illis, nec dissolutā vsuum. Quanta verò vtriusq; sit
noxia, in facultate indicabit vehementiæ & remis
sionis differentia, vñ cum quāritate ipsius vibra
tionis: in vsu, differentia celeritatis & crebri
tatis, cum vibrationis item quāritate. Reliqua ex an
tèdictis coniciunt. Haud aliter si nō paulum, nec
multū tribus differentiis pulsus ille à naturali re
cedat, sed mediocriter & moderate, ex dictis no
tato discrimina. Celer etiam pulsus dicitur, inter
im cōparatus cum moderato, interim cum quo
libet alio. Præterea ille ipse moderatus, nūc ab
solutē dicitur, quem in optima natura conspicimus
nunc: nunc de vnoquoq; homine, qui inculcata
sanitate fruatur. Atq; hæc ex comparatione ab
solutē temperati æstimatur, docetq; quale nam
sit ipsum temperamentum. Accelerior quidem
calidius, tardior frigidius temperamentum de
clarat. Verum solam non est reperire mutationē
in celeritate & tarditate, nec in sanis, nec in
affectis corporibus. Nam qui calidior est tem
peramento, quā simpliciter moderatus, si vi
deatur habere celeriorē pulsū, eum habet ne
cessariō maiorem. Et cui pulsus est aliqua ex oc
casionē celerior solito, omnino etiam est maior:
neuter tamen horum necessariō est crebrior: si
quidem crebritas illis, vbi calor accumulatur co
piofior, accedit. Itaq; cum celeritate, modō ma
gnitudo, modō etiam crebritas est coniuncta. Si
militer mutationes in tarditatem pulsuum, par
tim ex moderato statim in raritatem simul mu
tantur: subinde etiam in paruitatē, vbi amplius
vsus sit immixtus: partim ex sanis nō natu
ralibus, nunc aucto vsu, sepe vñ cum mutatio
ne in paruitatem, interim cum raritate, nonnō
quam cum mutatione in vtrunq;. Ceterū mu
tationes pulsuum eo immixtus vsuum, in tardita
tem fiunt, cum raritate & paruitate. Habet pri
mas & simplicissimas pulsuum mutationes in ce
leritatem & tarditatem: quarum causæ antecede
ntes & primitivæ, eadem inveniuntur ratione,
atq; illæ quas de magnitudine & paruitate expo
suimus. Mixtæ verò mutationes atque composi
tæ, cum vehementia, vel remissione, vel duritie,
vel mollitudine cōiunt. Quæ etiam examinandæ
discernendæ sunt eadem vi & ratione, quæ
eum de longo, angusto & humidi disputaremus,
dedarauimus. Vt, exempli gratia, si simul & ce

lerior esse & mollior videatur pulsus, animadu
vertendum est, tantōne celerior sit, quantū mol
lior, an magis. Nam si quantū est mollior, tantō
etiā celerior sit, à sola mollitudine ipsa mutatio
est facta. Sin celerior q̃ mollior, nō à mollitudi
ne tantū, sed etiam ab vsu aucto. Contrā si mo
lior quā celerior, quantū mollior est, tantū
detrahit solius vsus remissio. Similiter in alas cō
iugationibus danda opera est, vt præpollentem
causam investigemus: magnitudinē quārem ex
proportionis excessu deprehendes. Cum igitur
in distentione arteris quatuor generales sint
differentiæ: prima, eadēq; inter omnes maxi
mē pulsuum propria, quæ in qualitate consistit
motus: secunda, quæ in quantitate distentionis
tertia, quæ facultatē quarta deniq; & vltima, quæ
tunicam arterie indicat: hoc certē postremū ge
nus, non est proprium pulsuum, sed adveniens.
Ceterū tum ipsum, tum penultimum genus,
causam semper à qua gignuntur, manifestē de
clarant: duo autem reliqua genera superiora, nō
perpetuo. Etenim duobus obvenit generibus
posterioribus, vt ab vna vtrunq; causa constitua
tur: primis verò duobus, vt ab omnibus causis,
quas tres demonstrauimus esse: quare in primis
illis ad inveniendam causam, q̃ in vitiis, pluri
bus opus est distinctionibus. Porro secundū ge
nus, quod circa distentionis quantitatē verita
tur, hoc præter cetera habet, quod septem & vi
ginti pulsuum differentias cōplecti videatur, quæ
tamen sunt tres duntaxat. Porro veliens
pulsus à facultatis semper robore sit: prout
quarō vehementior fuerit, tantō facultatis ma
ius esse robur significabit: languidus, ex facul
tatis imbecillitate: quare a quantū languidior sit,
tantō facultatem ostendit imbecilliorē. Haud al
iter durus pulsus efficitur ab arterie tunica du
ra: mollis à molli. Præterea quantitas pulsus du
ritiei mollitudinisq;, quantitatē duritiæ molli
tudinisq; arterie declarat. Ceterū qui medius
est inter durum & mollem (qualis dicitur moder
atus) primus natura est inter eos, soliusque dicitur
naturalis. At inter languidum & vehemen
tem hæc ratione medius est nullus: quod languidus
sit oriundus ex facultate imbecilla, & decli
scente à natura: veliens autē à firma & rectis
sime habente. Verū alio modo, inter languidū
& vehementē medius aliquis esse possit. Modus
autē dignoscendi per tactum adhiberi est. Nam
cū à pulsu evertitur, eum vehementem voca
mus: vbi tactus evertit pulsuum, languidum: vbi
neutrum sit, medium cum pulsuum dicitur inter
vehementē & languidum: qui quidem nō aliter
atq; languidus, præter naturam est. Porro altera
tiones pulsuum, a quæ quidem in remissio
nem & vehementiam fiunt, illæ certē & solæ fre
quenter fiunt, hoc est, citra illam aliarum differ
entiarum mixtellam, atque etiam ab vna causa:
vt si ceteris causis naturalem modum seruanti
bus, facultatis robur sit paululum auctum, aut
imminutum: interdum tamen ab vna quidem
causa gignuntur, at non solæ: quemadmodum
vbi facultas aut imbecillima, aut robustissima
effecta fuerit. At mutatio pulsū in duritiem &
mollitudinē, si quidem ab vna causa procedat,

*Distentionis ac
terra quatuor
generales sunt
differentia.*

*Quantitas di
latationis arte
ria, septem & vi
ginti pulsuum
differentias cō
plecti.
Vel remissio
pulsu à facul
tate semper
robore.
Pulsus durus et
molli vnde
profluunt.*

*Medius pulsus
inter naturam
et durum
inter languidū
et vehementē
posse.*

*Medius pulsus
inter languidū
et vehementē
quomodo di
gnoscatur.*

omnino aliquod vni generum aliorum mutabitur. Quod si sola consistet, ex concursu plurium causarum gignitur. Simul autem & sola & ab vna causa nequaquam fiat, nisi minimo plane spacio à natura recessit. Causæ antecedentes quæ robur facultatis adaugent, partim in ipso insunt corpore: sicut humores quidam sunt semicotti & crudi, qui iam concoquantur: & naturæ ad iudicationem impetus: ac præterea iracundia. Partim adueniunt extrinsecus, ut vinum, cibum, modice exercitationes, & omnia quæ intemperies corrumpit. Deprimunt verò facultatem inedia, vigiliæ, solitudines, metiores, vacationes immodicæ, vehementes dolores, vel quum quadam proprietate accidentes, ut quem stomachici affectum appellant, qui animi deliquium inducit. His adauge omnia quæ cordis vel arteriarum creant intemperiem. Mollem reddunt arteriam humidi cibi, frequentiores balneæ, somni multi, mollior vira, & delictæ: quæ omnia intra septa naturæ manent. Præter naturam autem sunt, simulque idem molliuntur, letiarius, coma, hydrops, & si quæ sint alia quæ largo humore ac maxime pituitoso arteriarum tunicas imbuunt. Igitur præsentem constitutionem singularem coniunctarum causarum pulsus primam omnium indicat: qua cognita, antecedentes & externæ causæ, quæ coniunctas introduxerit, deprehenduntur. Atque in hoc præteritiorum præcognitio consistit. Nam futurorum, ex his quæ comitantur dispositionibus, præscia sumuntur.

GALENI PERGAMENI de præcognitione ex pulsibus, liber secundus.

Contractio etiam habet quatuor genera pulsum, quos scilicet dilatio. Siquidem vel locior & tardior, maior & minor, vehementior & languidior (si naturam ipsam spectes rei) sit contractio: sit motus: ac præterea etiam arterie corpus, aut durum, aut molle reddatur. Haud dignoscas tamen horum generum, præter tarditatem & celeritatem, vllum. Porro tum diffensio tum contractio arteriarum, naturalia caloris tueri medio crinitatem: diffensio, veluti inspiratio quædam, excessum caloris refrigerando, & ventilatione quod exinguitur incendendo: contractio in modum expirationis fuliginem expurgando. Ergo celeritas contractionis iudicio erit fuliginosorum excrementorum ingentem colligi: multitudinem, expurgarique id temporis, quando cunctum veniatur. Tarditas contractæ, nec eius multum coaceruari excrementi, eoque neque evacuatione desiderari. Atque aceruat quidem magna copia fuliginis, * vbi humores putrescent: quo tempore necessum est febres accendi: pauca autem, dum corpus bonos humores continet. In aliis statibus qui medijs inter hos sunt, pro portione singulorum statuum. Inter eundem & dormienti, plus: per vigiliæ & inedias, minus. Eadem plane ratione pro ciborum natura, ex illis qui prauos humores gignunt, plus: minus ex his qui probos. In febribus ad eundem modum, in accessibus, plus: aliis temporibus mi-

nus: adeoque plus ex crasis & lentis humoribus, qui pituitosi sunt, & quos crudos appellant: ex biliosis minus & melancholicis: medio modo ex sanguine, qui & ipse putrescit in inflammatio nibus: unde oruntur febres, cum aliæ, tum illæ, quarum adeo est immodicus ardor, ut cutem devrant, & carbunculum generent. Eiusdem ferè naturæ sunt herpes depascentes in omnibus. quippe hi, ipsi humores putrescunt. Alio autem modo putrescentes in alperis arteriis succi. Pulmonem enim suo vino contaminant: quod viscus tempore etiam ipsum putrescat. Colliguntur autem in alperis arteriis id genus succi, vel per distillationem à capite, vel ex pleuritide, vel per pneumonia, vel pulmonis affectu, vel angina, vel ex translatio pære. Originem hinc ducunt putredinis, quod minus probe expiantur. Nam vni sunt viscosi, & locus calidus, maturam desiderant evacuationem. Subinde etiam fit, ut cum pulmone rumpitur vas, immittat sanguinem aliquod in ipsas arterias alperas: qui quidem diuturnitate putrescens, tabem excitat. Quod etiam devenit celerius, quem vas emittunt exulcerata. Ergo in omnibus his, contractio arteriarum secundum quantitatem augetur, etiam sensu id plane non percipitur. At celeritatis clarè incrementum dignoscitur. Nunc ad crebritatem, raritatemque nos conuertamus: quarum duplex est vitæque, quod etiam quibus contingit arterie duplicibus esse: vni ab distentione ante contractionem: alteri post contractionem ante distentionem. At quidam ambabus est commune: aliquid proprium vtrique. Comune, quod duabus de causis abbreviatur, vel quod prior productus sit motus, vel quod sequens anticipet. Contra protenduntur, si vel breuior fuerit prior motus, vel si remoretur posterior. Vtrique proprium, quod demorat possunt illud autem ab eis constat significari, quod ex producto altero motu, vel anticipante altero potest prodire: aut contra, ex abbreviato altero motu, & morante altero. Quando enim sinceras calor, paucissimi que excrementis pollutus, distentionem maiorem & celeriorē concitat: contra qui confusus excrementis est putribus, contractionem: vbi ex anticipatione vel magnitudine distentionis pulsus creber fuerit, calorem purum indicabit plurimum increuisse in corpore. Vbi vero quod maturius incipit contractio, impuri copiam, atque excrementis referti caloris, arguet. Nec aliter, cum rarior pulsus externa quiete sit: siquidem ob distentionem breuior, indicabit esse refrigeratum calorem: si ob contractionis moram, humosa immixta esse excrementa. In quiete interna & diuerso, si ex productione contractionis creber sit pulsus, suppurallare abvndantiam humorum excrementone: si ob maturiorem distentionis exorsum, auctum calorem esse. At vero cum rarior in hac quiete pulsus est, si ob imminutam contractionem, pauciora excrementa annunciat: imminutum calorem esse, si ob distentionis moram. Quod si coniuncta ambo sint, ut & protendatur motus prior, & alter anticipet, siue in externa hoc quiete, siue accidit in interna, compositum declarauerit affectum ex illis, quorum singularem significabat vtrumque.

Causa antecedens, quæ facultatis robur adaugent, sunt depicte.

Facultati quæ deprimant.

Arteriam mollem reddentia.

Pulsus autem alia omnia iudicat: causa naturæ, atque constitutionem.

Contractio arterie insunt quatuor genera pulsuum.

Diffensio contractio arteriarum vtriusque.

Contractio in arteria ingentem multitudinem excrementi fuliginis indicat. Pulsi fuliginosi excrementum quoniam de plus, & quod de minus accendit.

Sanguis in inflammationibus, tempore refertur, quæ febres gignit palat.

Hemorem in asperis palmarum arteriis distillationem, unde illos confusos, quæ de cania putrescunt.

Tabem vnde crebramur.

Quies arteria duplex, Quies arteriarum quod sit communis.

Quies arteria non vtrique quod sit proprium.

Idem si pulsus sit rarior, in vtra hi coherint ambo quiete, cōtractus prior motus, & alter nimis tardatus, erit status tunc quoque duplex, atq; ex vtroq; compositus. Ceterū externa quies clarē sentitur, interna autē ne obscurē quidem. Eam tamen cōiectura quis assequi possit, ex vtriusq; motionis impetu. Iam verō cōtractio ipsa, interim nō tam diuturna est, quā dissemio: interim æquē diuturna est, cum diuturnior sit, non ramen quintuplo (vt ait Herophilus) sed paulo maior. Inæqualium pulsuum quidam in vno icū inæqualitate sortuntur: alij verō in plurium æceruo, quā collectiuā inæqualitatem appellāt. Omnes autē in vniuersum, aut ex obstruccionibus, aut ex compressionibus instrumētorum, aut abvndantia humorum, ad facultatem collata, aut cordis inæquali intemperie constant: estq; inæqualitas in cōmodior, quæ circa vnum pulsuum, quā quæ circa æceruum, versatur. Iam verō intemissio motus arterie, siue in vno pulsu, siue contingat in pluribus, periculosior est aliis inæqualitatibus omnibus. Vt igitur ad collectiuā (quæ aptior est) auspicemur, facultas ipsa gignit intermittentes pulsus, vel grauata, vel impedita ob cōfratitudinem aut copiam humorum obstruccionem, aut opprimentium arterias, aut etiā occupantium spacia, in quibus illæ distendi solent. Est cū inflammatio vel scirrhus corpora incumbētia arteriis infestans, earum distensionem cōfecerat. Si verō ipsarum arteriarum tunicae tale quid occupauerint, maius periculum imminet: si vti extremum malum, si cordis corpus inuaserit: nam si sibi syncope corpiuntur. At intemperies cordis nō est perinde exāialis, sed est longē minor inflammatione. Cuius quidem intemperiei comes facultatis imbecillitas est: pulsusque languidus, præter talem affectum, indicat nihil. Nam moderato cor præditum temperamento, pulsus e dit vehementer: prauo, languidum. Paruum itaque & languidum pulsuum sola intemperies reddit: non tamen connuō in æqualem, nisi humoribus contentis in ipso corde, & in arteriis & venis cōiunctis illi, sit facultas inferior: aut etiā ipsius cordis corpus, inæquali intemperie affligatur. Sunt autē raris pulsus intermittentes finitimi: hoc ab eis differentes, quōd rhythmum vniuersum amittant. Qui quidem cō periculosiores existūt, quō fuerit ipsa intemissio maior. Porro si arteria duorum pulsuum tempus moretur, haud scio an quispiam esse superstes possit: at vnius pulsus tempus, aut paulo amplius, intermittente arteriarum motu, sepe-numero conspeximus hominem liberari, præsertim quum ætatem senilem ageret. Etenim facultates languidæ, à paruis sæpe occasionibus offenduntur: siennæ autē, tantum dēiciuntur à maximis. Proinde qui habitu sunt valente, didi à morbis immunes fuerunt, periclitantur si eis prehendantur. At imbecilli, quique assidue

Herophilus.

Collectiuā inæqualitatem, inæqualis pulsus vnde generatur.

Intemissio arteria periculosior est aliis inæqualitatibus omnibus. Intermittentes pulsus vnde exoriuntur.

Intemperies cordis est minor inflammatio. Cordis intemperiei comes est imbecillitas facultatis.

Inæqualis pulsus vnde generatur.

Pulsus duorum moris intermissio. Cæterum dubitatur an quispiam vacare possit.

Valide facilius tamen cōmuniatur à maximis occasio.

Imbecillia corporis cur vbi moderantur in morbis, facilius resistunt.

pueri ab illis, quōd concoquant digerantq; per halitum, humorum copiam & cōfratitudinē, quæ intemperies inæqualis produxit: cum nimirum concoctrice facultate sint validissima, corporeq; mollissimo, ac faciliē perspirabili. Iam verō naturalis arterie motus, sanitate refert: vniuersus, morbum omnino intemissus, mortem. Et quæ admodum solucit apoplexiā ingentem quidē est impossibile, leuem autē non faciliē: sic intermissio diuturna pulsuum vt tollantur, fieri non potest: brevis autē potest, haud tamen citra negotium. Cæterum diuturnam voco, quæ excedit duorum pulsuum curricula: breuem, quæ intra duorum pulsuum tempus manet. Iam mora à pulsibus intermittētib; repentina corripit, non aliter ac ab apoplexia. Vtrobique enim cordis calor extinguitur, desinitur respiratio.

10

ne. At raritas quidē ab intermittente pulsu discernitur diuturnitate temporis: interdum etiā, quōd raritas interim habet æqualitatem cōiunctam omnium icūum: intemittentes autē pulsus necessariō inæqualis existit. Ad hæc, ingens frigiditas raris pulsus producit: quæ quidē vel corpus cordis, vel sanguinem spiritumq; illius, vel * cōsentientem ei aliquam partem occupat. Si igitur corpus ipsum cordis prehendant, ita languidos, tardos, & paruos reddit pulsus, vt ipsa præpotens est. Quæ verō à parte proficiscitur alia, raritatē longius quā cætera genera, à natura avertit. At more tum minus potest declinari, vbi frigiditas corpus cordis inuaserit: quāq; & repentina etiā in altera differentia oritur. Ac moriuntur quidē priores illi interdomendum potius. Alteri autē, hi cum illo modo, tum etiā inter loquendum. Intermittentes pulsus perniciosiores sunt raris: * siquidem generatio ipsorum fit raritate producta: solutio autē, est reditus quædam per raritatem, in cōmoderationem pristinam. * Raro pulsus aduersatur creber, si vti intermittēti intercurrente. Fit autē ipse intercurrentes ex crebritate inæquali, quōd functionem obeat cor minus plenam, quā vñs postulet: id quod fit sanē, vti ab humorū colluuiē oneratum est, aut in instrumenta obstruēta, aut in artē cōacta. Quæ quidē causa erat etiā intermittētū. At disident inter se, quōd repugnat in intercurrentibus, ac decertat cum noxiis causis productis: in intermittētib; autē, hoc nō sustineat facere. Quare iudicationem sæpe attulerunt pulsus intercurrentes. Iam verō omnes ardentissimæ febres, pulsuum crebrum sortiuntur: quarum quædam extra periculū sunt. At qui in syncope sunt crebri pulsus, propter remissionem (quæ perceptū coniuncta est cum omnibus syncope) exsunt periculōsi. Ceterū raritas nunquam vacat periculō, si vti nec remissio, nec paruitas. Sola autē extrema vehementia in pulsibus, non modō vacat periculō, sed est etiā maximē vñlis. Magnitudo autē summa, vbi coniuncta est cum mollitie morbosa, periculum nūciat: fin cum salubri aliquo arterie statu, nihil subest ci mali. Præterea velocēs pulsus tardis sunt securiores: siquidem summa celeritas, summa tarditate est securior. Summa quippe tarditas, non secus ac raritas,

Intermittentes pulsus moris periculosa. Ibi non sicut & parva, quādam ratione.

Pulsus omnis ne intermittens mortem referat.

Raritas ab intermittente pulsu quomodo designatur.

Rarus pulsus vnde generatur.

Intermittens pulsus cor paruos facit raris.

Intercurrentes pulsus intercurrentes aduersatur.

Intermittens pulsus vnde exoritur.

Ardentissima febres omnes, pulsuum crebrum faciunt.

Raritas pulsuum nunquam vacat periculo, si vti nec remissio, nec paruitas. Vehementia pulsuum est vñlis.

Veloces pulsus tardis sunt securiores.

tum

tum incidit, cum calor natus exstinguitur. Celeritans in crementum procedit ab vii urgente, atq; a valida facultate. Verum formicans pulsus, nec omnino est celer, nec summum attingit creberrans. Durissimus pulsus perinde est, vt mollissimus, periculosus. Nam ex scitro ille, aut inflammatione insigni visceris, aut ex contritione per frigida, aut ex siccatate ab ardentissima febre profectus, aut ex valida convulsione: hic ex alto comate, & leucophlegmatia, atq; ex immodica humiditate habitus gignitur. In summa vero, omnes pulsus, qui longe à naturæ modo recedunt, non sunt laudabiles. At languidissimus, tardissimus, rarissimusq; omnium pessimus fuit: ab illis, minimus, mollissimus, durissimus: inde creberrimus. At non celerissimus vel maximus: sed sunt in modicè periculosi. Vnus

verò inter omnes extremos optimus est velocitissimus. Inæqualitas etiam intermittens in vno pulsū, omnium periculosissima est, præsentemq; mortem annunciat. Hæc fit, vbi distentionem interpellat quies. Vbi igitur vehementer secundus motus sit priore, commodius est: vbi languidior, periculosus. Iam tardior item, signum periculosius exhibet: celerior, tunus. Gignuntur quippe hi pulsus, dum simul & certat natura, & impeditur ab infalubribus causis. Est etiam melior motus vellemens, & celeris languido & tardo. At verò prior motus alterum nihil excelsit, sed, in magnitudinis paruitatisq; distentione: si vni neque in duritia, aut mollitie: est quod interdum vibratus sit, durior alter occursum videatur. Et enim vibratio est duræ arteriæ symptoma, vbi amplius cogitur vi distendi. Pessimus autem est pulsus is intermittens, cuius tempus quietis prolixius fuerit. Inæqualitas igitur intermittens in vno pulsū, causas habet genere easdem, ac collectas: fed quàm illa est deterior longè. Corpus cordis facultatē quandam obinet, quæ distendit & contrahit, tuenda gratia innati caloris. Hæc in contractionibus fulgitosum excrementum effundit: in distentionibus allicit refrigerium. Vbi igitur ex æquo calidum, vel frigidum, vel purum, vel turbidum, ipsū cor facit, omnes eius partes pari impetu ad functionem contendunt. Vbi verò alix calidiores, alix frigidiores extiterint: ac hæ omnino mundæ, illæ abvndantia excrementorum confusæ non eodem omnes impetu ad munus feruntur, sed hæ anteverunt, illæ cunctantur. Vt autem

plures & maiori vi ad actionem properantes fuerint, vniuersum cor excitant: ita contrā, vbi pauciores sint quæ ad motum festinant, quæ consistunt plures, vniuersum in longiore quiete continent. Iam verò calidiores si motus præfint, maturior simul & celerior, maiorq; distentio editur: si frigida, serior, tardior & minor. Motus itaque principatus maiori numero partium deservit: sæpe etiam magnitudinis vsus. At verò si alteræ partes alteræ vel paulo sint plures, vel plæ

res, vicinæ vincunt, atque vincuntur, vniuersaq; efficiunt & inæquales totius visceris motus. Capræzans pulsus est illorum, qui intercipiuntur quiete: succedente interdum salubris cordis affectibus, quemadmodū etiam

dicrotus, qui ex genere est intro retractorum: & comitatur nonnquam inæqualem cordis intemperantiam. Et enim si vnā contingat, vt quædam sint partes cordis præcalidæ, alix fumosa fulgine præfocentur, ad contrarios profluent motus, vt hæ quidem distentionem moliantur, illæ confidant. Ac tunc sanè distentioni contrāctio potest succedere tribus modis. Primò, cum distentionem, prius quam mensuram implet, contrāctio exceperit: secundò, vbi prius completz succedat, externa quiete deperdita: tertio denique, dum distentionem nõdum perfectam contrāctio retrahit, ceterum delubris reddita, reliquum permittit compleri. Haud alter etiam contractionem distentio, nunc abolutam consequitur, nec permittit consistere: nunc etiam prius quam sit completa, impediam & vicium excipit: nonnunquam retrahit nonnullis, superatur tamen. Atque hi articularum motus sunt interdum vel citra affectum cordis, aut propter eorum inæqualem intemperiem, aut facultatis imbecillitatem, aut etiam duritiem tunice. Porro ipsius facultatis essentiam, nihil aliud putamus esse, præter qualitatem temperamentis. Tres autem affectus hæcienas, originemq; bis ferentium pulsuum inuenimus: vnā vibratorum, hæc sola re ab illis distinctam, quod cum breuem pulsus longitudinem habeat ex vtriusq; parte arteriæ, obliqua vibratio sit: quæ obrem dicrotus, nõdum vibratus videtur. Alteram, in qua non vibratus est pulsus, sed arteria dura, & imbecilla facular, vt à corporibus decumbentibus opprimatur, aliqua tamen parte iuxta cutem sita, attollatur liberè. Atque hi quidem duo pulsus tam dicroti sunt, tum duri. Tertius qui ex intemperie nascitur, haud est dicrotus, sed bis modò pulsans, nec necessariò durus: possumus tamen eum dicrotum appellare. Et enim intemperiem quæ cordis corpus affligit, comitatur pulsus bis ferens: consequitur etiam ille, cuius externa quies est amissa, & cuius impeditur distentio. Est & aliud frequens genus inæqualitatis in vno pulsū, vbi arteriæ principio propinquior pars, prius mouetur. In quo genere vndosus atq; vermiculans pulsus constituitur, i molli arteria & non valida facultate profectus. Ac vermiculans quidem, non modò non validam, sed infirmam etiam facultatem denunciat. Vndosus autem, interdum non satis firmam, ac nonnunquam medioctriter validam, cum præsertim sudorem decretorium promittit. In humidis enim reperitur & pituitosis morbis: in quibus etiam tarditatem & raritatem, magnitudinemq; solet acquirere. Quod si alitudinem præterea, & vehementem sit nactus, decretorium haud dubie sudorem significat. Magis hic sperandum est, si plures vehementes & alii appareant, quàm cōtrarij. Qui si æqualiter etiam fiant, salubre simul & breui pollicentur sudorem, maxime si cōcoctionis morbi appareat indicia. Vndosus itaq; pulsus, ex humidā mollig; arteria oritur, simulq; ex facultate modicè affecta: vermiculans autem, ex molli quidem, verum ex imbecilla insigniter facultate. Quæ obrem enī sine febribus solet supervenire vniuersis largis evacuationibus. Decretoriū pulsū

vermiculans pul-
sus, si infirmā
facultatem denun-
ciat.

Vndosus pul-
sus, quod sudorem
decretorium pro-
mittat.

Vndosus pul-
sus ex humidā mol-
lig; arteria uo-
lucit.

Vermiculans pul-
sus, si sine febribus
solet supervenire
vniuersis largis
evacuacionibus.

Decretoriū pul-
sū

*Decurtatorum
pulsu duplex
genus.*

*Decurtatorum
pulsuum duplex
fonsditi rati.*

duplex est genus alteri in vnica distentione, alterum in a ceruo. Quod in vnica distentione fit, facultatis imbecillitatem vni cum corporis gracilitate arguit. Est autem ad modum digitis arteria tangenda. Deinde si animadvertatur interea in arteriæ primis paribus maior pulsus, vel vehemensior, vel vterq. in postremis minor, vel languidior, vel ambo: primus digitorum applicatorum est attolendus, perspicue idemq. vtrum similis illi quæ antea erat, quam hic sustolleretur, sequentes digiti motu percipiant, an vehemensior atq. maiorem. Ergo si motu similem, digiti sequentes sublaris digiti, sentiant, sua sponte arteria decurtatâ distentionem habebat: quod nobis infirmæ facultatis à corde prodeuntis, vestigium erit. Nam illa quando rectè se habet, vsque ad finem arteriarum omnium continet quæ attollit eas, similiter permeat. At in pulsibus decurtatis, paulatim remittitur, tantq. efficitur imbecillior solio, quantum est à principio remota. Quod si eleuato tu primo digito, postea motum percipias validiorem, ac maiorem quàm antea: declarat ille quidem etiamnum facultatis arteriæ imbecillitatem, sed minorem censè quàm alter: quod illic facultas remitteretur à principio discordantibz maneat, quantum in ipsa est, par, sed granata ab insectis digitis, imbecillus moueatur arteria: quod quidem minus habet periculum. Neq. enim ita ipsius cordis, vt arteriæ quam tangimus, ostendit affectum. Alterum autè, potius cor esse imbecillum significat. Porro si omnino pulsus deficiat, tum multo magis declarant facultatis imbecillitatem: quo tempore sunt submouendi omnes digiti, ac dein spacio paruo interposito, deintegro admonenda. Bisariam autem ipse aboletur pulsus: vel quia prorsus non pulsant arteriæ, id quod extremum est malum: vel quia pulsant quidem, sed ita languide & parum, vt fugiant sensum: citèq. sanè hic affectus, si citra deliquium aliquod a summi repentinnm accidat, difficiulus. Reciprocatur autè motus, modò ex vitima pulsus abolitione, modò ex paruo pulsû & languido. Sed ille quidem* deficiens reciprocus dicitur, hic reciprocus decurtatus. In huiusmodi æstimandis, sic debemus partem componere, quancunq. tangamus, vt subter artem noster sit tactus. Omnis verò sunt pefsimi pulsus, qui ab amisso motu minimè reciprocant in verso membro. Minus hic, qui in verso illo videntur moueri. Quibus etiam minus, qui sunt decurtati, non tamen perdunt planè omnè motum. Iam etiam hic minus reciproci decurtati, adeoq. si multis simul occurrant digitis. Ceterum numerus digitorum, quibus motus fit occurrurus, suus cuiq. est arteriæ. Ad quæ rem magis pertinet naturam tenere ægrotantis. Quibusdâ enim natura sua pulsus exiit minor: sicut & aliquibus breuior. Quod si nos nature ipsius ægroti proprietates lateat, ex cõmuniori bus differentiis conieciatur faciemus, tempera menti scilicet, & habitudinis corporis. At in temperamento, præsertim calidi & frigidi differentiam expendimus: in habitudine, gracilitatis & corpulentie. Ac sic interdum, vt ambæ inæqualitates pulsuum, tum quæ in vno pulsû, tum quæ

in a ceruo consistit, concurrant. Saepè quæq. illa quæ in vno pulsû consistit, nõ adest: quæ autem in a ceruo, manifestè conspicitur. Latet autè inæqualitas vnus pulsus, aut ob affectionis exiguitatem, aut ob ipsorum pulsû breuitatē. Vtrumque itaq. genus decurtatorum pulsuum, significat facultatis imbecillitatem. Verum si in vna fiat distentione, etiam gracilitatem indicat. Firmitur decurtatus pulsus in quibusdâ, ex causâ præter naturam: in nonnullis tamen inuenitur ex propria conformatione: quo modo innuens & circumnuens pulsus. Qui quidem fit, si arteria ita fit conformata, vt eius pars duntaxat media, nudè cum subiecta sit: partes autè vterq. altius demergantur. Quamquam fit etiam ob facultatis imbecillitatem, quæ attollere onus non potest. Ex horum enim genere est pulsus tremulus, qui non perinde est conspicuus. Quia verò imbecillitatem facultatis sequitur tremor, necessarium est ideo etiam tremulum pulsuum languidum simul & paruum esse: quæ de re fugit sensum. Pulsus igitur tremulus, facultatem imbecillam, tunicam arteriæ mollem, corporisq. gracilem nunciat habitum. Videtur autem quisque ordo perturbationi eiusdem generis præstare, propterea quod ordo nature nostræ in primis familiaris existit. Ordo etenim fixam quodammodo causam esse & perpetuam, indicare videtur: perturbatio autem illius, variantem, nec in vna manentem vel magnitudinē, vel speciem, vel regionem. Ceterum talis causa non perniciosior, sed inærior censenda est. Itaque nihil certi, nihil ordinis perturbatio firmi habet: nec tale, quale ordo, vel bonum, vel malum.

GAL. DE PRÆCOG. EX PULSIBVS LIB. II. de præcognitione ex pulsibus, liber tertius.

DEinceps agendum de his pulsibus est, qui dispositionibus præter naturam peculiariter existunt. Etenim quicquid præter naturam est, aut affectus sunt, aut causæ horum, aut symptomata. Cùm igitur ex affectibus, hi quidem similia sunt, hi autem instrumentalium partium sint proprii: exordiar à similiarum affectibus, qui quidem sunt octo numero, ab intemperie omnes profecti. Quorum quatuor dicuntur simplices, calor, siccitas, frigiditas, humiditas: quatuor compositi, frigiditas siccitati, caliditas siccitati, frigiditas humiditati, caliditas humiditati cõiuncta. At verò pulsus per intemperiem, nisi arteriæ sint affecti, vel cor, alterari nõ queunt: possunt tamen arteriæ nihil lex corde affici. At affecto corde vt innoxie permancet arteriæ, impossibile est. Ceterum frigida & calida intemperies cordis promptè in omnes arterias permeat: humida & sicca ægrina. Peculiaries igitur pulsus copioso calori sunt, magnus, celer & creber. At magnus, non tantum calorem excellentem, sed & instrumenta requirit mollia, facultatēq. validam: itaq. non erit calidæ intemperiei perpetuus. Celer etiam firmam possulat facultatē, ac instrumenta quæ distendantur promptè: quare nec hic quidem perpetuus erit. Creber similiter, si largè

*Decurtati pul-
sus significat fa-
cultatis imbecil-
litatem.*

*Pulsus innuens
est: cum ex circū-
nuentis causis.*

*Pulsus tremu-
lus quod mollem
est.*

*Ordo est fami-
liaris nature
nostræ.*

*Perturbatio or-
dinis quod signi-
fici.*

*Artem præter
naturam esse tres
differentias, affe-
ctum, causas,
symptomata.*

*Corde affecto,
necessario cõ-
municatur affectus.
Calorem periculi
res pulsus quo
fuit.*

*Pulsus aboliti
infirmitatem.*

*Pulsus deficiens
reciprocus.
Pulsus recipro-
cus decurtatus.
Arterias tãq.
destru.*

40

50

60

Caloris peculiaris pulsum nullum esse iussu parabit.

si large vsui à magnitudine & celeritate sit factum satis, nulla fiat ratio: si non expleatur vsus, fiat: proinde perpetuus ne hic quidem fuerit. Quamobrem ex peculiaribus nullus erit inseparabilis. Si igitur calor solus increuent, & in naturali statu maneat facultas, instrumentique, quum mutatio ipsa est parua, magnitudo tantum pulsum augetur: quum maior, etiam celeritas: vbi insignia, iam etiam crebrietas. Proinde maximus pulsus, idemque celerissimus & creberrimus, summum incrementum caloris significabit. At si celerissimus & creberrimus sit, non autem maximus, hoc nisi facultas sit imbecillior, vel arteria durior, accideret nulla alia ratione posuit. Similiter vbi ingens sit crebrietas, nec simul celeritas & magnitudinis par incrementum, calorem quidem etiam tunc oportet esse copiosum, sed vel facultatis imbecillitatem, vel instrumentorum duntiam. Ceterum imbecillitati erit adiunctum languidus: duritiei durus pariter & vibratus. Si durus citra vibrationem sit pulsus, ac summè creber, imbecillam facultatem vna cum calore magno nuntiabit: & quum talis languidus sit, minabitur syncope. Est autem aliud, cor & incallescere & incaluisse. Etenim vbi à substantia quam in suis ventriculis continet, ipsum cor calsit, potest firma facultas esse: vbi verò & incaluit, & in eandem incidit caloris intemperantiam, qua tenebatur sanguis & spiritus ventriculorum, tunc eam intemperantem sequitur necessario imbecillitas facultatis. Quod si incaluerit largius, & per ipsum totum calor febrilis permeauerit, febrem excitat heclicam. A calore itaque cordis ipsi pulsus variantur. Qui quidem calor duplex quum sit, aut est certè à putribus humoribus genitus, vnde acrem qualitatem atque fumosam contrahit: aut cum vapidam quadam & suauis humiditate conjunctus, sola quantitate à natura recessit. Ille igitur prior constat & xgrè solubilis est: secundus autem, non vique adeo obfirmatus: qui quidem balneis, exercitationibus, cibo calido, viuis potus, atque ex animi affectibus tumori & iracundiae solet superuenire. Porro calor qui diuersus est à nano, breuem habet externam quietem: celeriore autem, quam pro portione distentionis, contractionem. Qui quantitate sola variat, maiorem simul & celeriore distentionem contractionem. At qui etiam fuliginosus est, longè citatiorem distentionem, contractionemque celeritatem reddet. At verò si cor quidem calidius sit, frigidiore autem arteria, ipsa motuum exordia simul vtroque fient, si modo venæ à corde facultatem citra lisionem recipiant. Cor tamen singulis arteriis maiorem, celeriore, vehementioreque pulsum habebit. Etenim motus principium à corde illæ omnes habent: eius autem speciem sortiuntur singulae, prout cū ipso corde temperatura consenserint. Porro nonnunquam accidet, vt arterie eodem tempore non accipiant ex corde influentem facultatem: verum quæ cordi propiores sunt, primæ: posteriores, quæ remotiores: quod potissimum evenit, si arterie frigidiore & cor imbecillius col-

Meliora febris quando excutitur. Pulsus à calore cordis variatur. Cordis calor duplex.

Arteria habens motum principium à corde. Arteriae nunciam quum non vult omnes tempore à corde influentem facultatem recipere.

uerint. Nonnunquam etiam in corde ipso percipitur temperamentorum pugnantia. Nam modò frigidus visceris corpus æquo est, & in ventriculis contenta substantia calidior: modò è diuerso substantia frigidior, cor autem calidius: vbi etiam pulsus sunt moderatus similes. At vbi aer, quem inspiramus, infectus putredine sit, putredineque ipsa ad cordis corpus peruenit, febrem pestilentem ac letalem accendit: quæ quidem ex caloris acredine, ipsoque caloris genere agnoscitur: & ex pulsus etiam, qui parum à naturæ modo recedens, in eodem statu perpetuo manet: à quemadmodum in heclicis febribus, quarum saluè duæ hæc propria sunt signa, si perpetuò sibi illæ videantur similes, nec invasionem vllam accessionis, nec incrementum, nec vigorem, nec remissionem habeant, nec febricitare se percipiant ægrotus. Hos pulsus nihil est necesse maiores iusto, atque interim nec crebriores quidem esse: at omnino celeres tamen, cum febrientium pulsibus vniuersis ad sit perpetuò celeritas. Ceterum quibus putridus ille calor, non cordis corpus inuadit, sed humores in ventriculis illius contentos, (deprehenduntur enim affectu hæc peste, si febrem primum percipiant, sed dein æqualiter semper febricitent. ad hæc, si pulsus non habeant perualidum) multi horum seruantur. Frigidæ intemperaturæ ipsius cordis, pulsus paruos, tardos, atque raros efficiunt. Ac primum sanè crebrietas immutabitur, dein celeritas, ac vltimò magnitudo, si quidè illæ facultas sit: nam si ipsa fuerit offensa, ad paruiterat & tarditatem potius, quàm ad raritatem pulsus mutabitur. Ceteram vbi facultas laboret plurimum, etiam coniuncta frigiditas sit, pulsus extremè quidem sùt parui, sed non tardi extremè: imò nonnunquam moderatus similes: crebriorem tamen non abiciunt prius nam, sed etiam adaugent. At vbi paululum debilitata facultas sit, & frigiditas viget plurimum, longissimè ad raritatem pulsus defleunt, parum ad paruiterat, medio modo ad tarditatem. Eodem etiam arterie modo, si in nano temperamento consistit, mouebuntur. Nam si corde frigidiore existente, ipse calidiores sint æquo, tantum alterabunt pulsum illius, quantum à natura recesserint. Vacant huicemodo affectus febre, quod fiant refrigeratio corde à succis frigida, usdemque lentis & crasis. At verò si perinde vt cor arterie etiam iusto sint frigidiore, remissionem motuum illius augebunt: quod in genere eodem. Accidit autem interdum frigidus iusto esse cor, humidiorumque excrementorum plentia: quo tempore pariter & minor & rarior distentio sit, contractio verò celerior. At si ipsum corpus cordis incidit in intemperiem aliquam inæqualem, necessum est pulsus ipsius cordis, adeoque arteriarum omnium, variè inæquales fieri. Sic quidem & collectiua, & ora: vnum pulsum inæqualitas, in omni genere accidit: quod à subita fiat in magnitudinem, paruiterat, celeritatem, tarditatem, remissionem, crebriorem & raritatem, mutatio. Verum in duritiam & molitudinem, subita mutatio fieri vnquam non

Corde in se nonnunquam varia intemperantia.

Pestilentium febrem pulsum paruum à naturali recedens. Meliorum febrem duo signa propria.

Febrientium pulsum vniuersis ad sit semper celeritas.

Frigidam cordis temperantiam qui concutitur pulsus.

Cor, si laboret inæquali motu, pulsum vniuersum variè inæquales efficiere.

potest. Non vibratus autem interdum & vibratus, subita quadā vicissitudine sese in affectibus excipiunt, aduēta ad cordis intemperiem duritia vel tensione artēriarum. Porro pulsus his fectiens, intemperiei corporis cordis propriū symptomata est. Ceterū si durities accesserit, tam hoc indicium labefactatur: nam si dicrotum conuerteretur cōmūnem plurimum affectuum. At vibratus dicrotus gignatur, vbi pulsus qui absolute est vibratus, demūta sit longitudo. Dicrotus verō non vibratus, quē est ac vibratus durus: sed talis per suam tarditatem efficitur, & corporum omnis incumbendum. Iam verō vbi cordis corpus

præter modum est calidum, materię autem contentę in eo frigidiore, aut etiā partes illi adherentes, tribus id coningere differentis potest. Aut enim illud tantō calidius est, quantū hæc frigidiore: aut multo illud calidius, quā hæc frigidiore: aut minus illud calidius, quā hæc frigidiore. Quarum prima differentia pulsū representat ad vnguem moderatū, magnitudine, celeritate & crebritate. Ad remissionē autē tantū depellit, quanto spacio naturalem temperaturam viscus ipsum reliquit. Sicut autē pestilentem non paucæ febres inde ab initio hæc, distātiq; ab omnibus aliis febribus, quæ ex magna putredine oriuntur. Præterea macrorem interdum sequuntur & iram à principio quædam hæc febres: alter nescio an inde ab initio fiat hæc. At successu temporis, multis aliis succedit hæc, quas perpetua æqualitas satis manifeste declarat. Notitia autem firma in huiusmodi affectibus ex vrina quidem investigari nō potest: ex pulsibus autem initio adhuc atque primis diebus per febres hæcticas nō facile cōparatur, cūm speciem cōmūnem habeant tunc cum diuturnis febribus. Verū elapso triduo, iam clariore sunt etiam pulsū iudicio. Siquidem apertē hæc celeriores, quā decet, pulsus habent, tantq; languidiore iusto, quantū calor incrementi. Deinceps de illis febribus dicamus, in quibus cor calidius est, quā vicina frigidiora. Nam in huiusmodi affectibus, pulsus celeriores simul & maiores, & crebriores, languidioreq; iusto erūt. Longius tamen ad remissionē & celeritatem, minus ad crebritatem & magnitudinē, diuertent à natura. Stabiles & cōstantes harum generatio est, ut ceterarū hæcticarum. Quod si non ita longē viscus à natura deficiat ad calorem, vicina ei longius ad frigiditatē: minores pulsus in his & rariore erunt: at celeritate vel similes erunt naturalibus, vel tardiores. Similes, si non multo frigidiora vicina sint: tardiores, vbi multo longior intervallo, hæc ad frigiditatem à natura deflexerint, quā ad calorem cor. Remissionē etiā quantitati caloris respondebit. At verō si frigidiora iusto sit ipsum cordis corpus, materia porro, reliquaq; vicina, eo calidiora, erūt & hic tres numero differentię, & variabunt pulsus in vnaquaq; sicut superiores. Primū æquē refrigeratū sit cor, vt incaleuerit vicina: tardior æquo erit si pulsus, si insignis fuerit alteratio: cui etiam remissio respondet. Ceterū si viscus sit frigidus omnino, quā postulet naturalis modus, & vicina similiter calidiora, febricitabit vtig homo,

nō hæctica tamen febre, sed vel diaria, vel ea quæ humorū putredinem sequitur. * Vtriusq; autem sunt propria signa. * Diaric quidem coniuncta cum frigidiore corpore cordis, si ex æquo à natura vterq; pulsus recesserit, nihilq; magnitudinē à naturali differat, nec crebritate ferit, nec celeritate, nī vtrq; insignis sit mutatio. Erit etiam tunc tantō languidior pulsus, quantū viscus frigidius. * Eius autem quæ humorū putredinem

10 lequitur sunt indicia, par semper magnitudo in pulsū: nō tamen vt in eo qui secundum naturam erat: nec eadē erit paritas in aliis generibus. Verū vbi à natura æ parum recessus est, nihil ferit: vbi maiori intervallo, apertē in contractione pulsus celerior sit. Iam etiam clarē in extrema quiete crebrior & languidior apparet tantō, quantū refrigeratum est cor. Pingamus rufus, magis refrigeratum cor esse, quā vicina incaleuerint, sicut febris ephemera: horum pulsus manifeste languidiore erunt, & minores: at tardi non perinde apertē, sed * pro ratione excessus, quo vicinis partibus est cordis corpus frigidius. Si verō sit febris putrida, pulsus languidus aderit, perinde vt superior: sed illo etiā minor in distentione, tardiorque: at contractio naturali celerior erit. Ponatur rursus tertium genus cōmutationis, hoc est, minus ad frigiditatē cor declinasse, & ei cōiuncta ad calorem: ac febrem esse diariā: pulsus habebit hoc corpus tantōq; par est imbecilliores, quā corpus cordis fuerit intemperatior: ac maiores & celeriores naturali, sed maiores q; celeriores: ad hæc crebriores erunt. Hæc omnia sunt accipienda, pulsibus nec in duritiā, nec in molitudinem apertē mutatis. Omnes febres diarię, in magnitudinē, celeritatē, crebritatēq; pulsus, quantū in ipsis est, mutant. Nam si cōcurrat alius affectus, missam oportebit mutationē esse, ex illa, & hac, quæ comitatur febrem. Similiter febres hæcticę, pulsus in eadē differentia conuertūt, quantū in eis est: ampliusq; in eis mutatur celeritas. At quæ ortæ sunt ex putredine humorū, in vigoribus vtriusq; habent morū celerem, & distentionis, & contractionis. Præterea crebritatem ex æquo mutant, cūm externæ quietis, tum internæ. In initio accessions, non perinde, sed magis augment contractionis celeritatem. In incrementis cum hanc, tum etiam externam quietem plurimū concitant, vt pulsus in illa creberrimus esse videatur. Atq; hi pulsus febriū per se sunt proprii. Reliqui omnes qui febricitantibus accidunt, alios potius affectus, quā febres, sequuntur. Quorū etiam affectuum sunt duo genera: aut facultatis, aut instrumentorum vitium. Quippe ad causas inueniendās, quæ immutant pulsū, tria hæc sunt animadvertenda, instrumentū, visus, & facultas. Porro pulsus qui ab inflammatione excitantur, ab his quæ humorum putredo efficit, distinguntur duritia. Siquidem pulsū ortorū ex inflammationibus, durus occurfus existit. Quare si durum occursum, quem efficit tensio arterię, discernere ab eo vales quæ generat frigiditatem atq; duritiā, tres prædicere hinc causas præteritas poteris, potum frigidū, meracius vinum, inflammationē. Siquidē indurescunt ex immodiciis frigidæ potionibus arte-

Diaria febris
velut propria
signa.

Febris putrida
propria signa.

Pulsus hic fe-
rens, intempe-
ries corporis
cordis propriū
symptoma est.

Pestilentes non
paucæ febres ef-
se ab initio hæc
dicunt.

Hæctica febres
quæ ab initio
sunt.

Hæcticarum fe-
brium notitiā
ex vrina inve-
stigari nō possi-

Diaria febris
vel putrida
quando febri-
catu homo.

Diaria febris
qualiter pulsus
mutatur.

Febris putrida
qualiter pulsus
mutatur.

Causæ mutan-
tes pulsū vt
inueniuntur, et
fiderat oportet
instrumentum,
visum, &
facultatem.
Artem à qui-
bus causæ duc-
rentur.

arteriarum tunice, & à vino immodice pote ex-
iccantur. Iam vero febris hæctica * rarissimè à
principio oritur, quamquam eo tempore non-
nunquam sint ortæ. Ad hæc, nec magnus pul-
sus, nec vehemens, vñquam cum febribus hæcti-
cis coeunt: sed si alterutrum habeant horum, mi-
nimè sanè sunt hæctici. Si simul utrūq; habeant,
planè sunt diuturnæ, si quidem eorum contractio
non properet. Propria est enim eius quæ sequi-
tur putredinem humorū, celeritas. Ceterum in
remissionibus accessionū, celeritas contractio-
nis exoluitur: ininò autem gignitur, ac per incre-
mentum augetur. At vbi iam propè vigat adue-
nit, ingens incrementū suscipit distentionis cele-
ritas, contractionis pari celeritate manente. Vbi
verò vigeat iam planè febris, in illa accessione
ad summā celeritatem distentio pervenit, immi-
nuiturq; celeritas contractio. At verò pulsus in
vtrāq; partem mutatio (si adiecerimus * dis-
tinctionē) accessiois initium nunciat. * Disten-
tū autē ipsa erit, si mutatio citra alienam occa-
sionem acciderit. Atq; occasiones quidem ipsæ,
partim externæ sunt, partim ab ipso corpore o-
runtur: quarum vtrūq; sunt notæ. Verum cla-
rioris doctrinæ grātia, appellabimus quæ proce-
dunt ex corpore causas, vnde vel facultas, vel in-
strumenta alterantur, antecedentes: harum autē
ipsarū causas, quæ extra corpus posite induxe-
runt alterationem, externas, seu proccararcticas.
Potrò in qualitas pulsū, quæ se in vadit vñ-
cum accessioibus, compressarū vel obstructa-
rum modò arteriarū, vel copie humorū oppri-
mentium facultate, est signum. Quæ igitur pul-
sum mutationes sunt, dum cordis calor auge-
tur, aut confluunt in trō humores, aperte ac-
cessionis initium annunciat, si quidem ab aliis oc-
casionibus sint remotæ. Existimare autem con-
venit, vbi acutus materię humiditatis initio ac-
cessiois ad cor pervenit, in primis quidem, mor-
tis periculū esse: quod periculum maxima muta-
tio pulsuum in raritate, tarditate, paruitatēq;
prænunciat. Nam si his insignis remissio succe-
sserit, exemplū peribunt. Sin autem ablit remis-
sio, contendit natura eam superare, atq; arteria-
rum motū maiorem, celeriorē, crebriorēq; ex-
citāt: ut vterq; motus celerior quidē fiat, sed cla-
rior contractio, in cretatiq; hic breui manife-
stē, donec augeat accēssio. Tandem vbi mate-
riam superaverit, calor quasi flamma succēditur:
atq; iam est vigor accessiois, vbi fuliginosum na-
tura excrementū, expiratione & cōtractione ar-
teriarū expellit. Quod verò est veluti cinerium,
non perinde, quia crassum est, potest excernere,
sed per insignes quosdam meatus educit. Hoc in
partibus in flammatis, pus est in ipsīs vasis, sed
mentū vrinx. At si cor ficcus quomodo modo
naturæ evaserit, vñ secum omnes alterabit
arterias: id quod interdum in vna animalis par-
te ipsas arterias accler, iurandum autem in pluri-
bus. Est cū sint contra quomodo affectū ipse
arteriæ, sed tamen eius affectio recipit: ita ve
confluit illis mediis quidam affectus in humi-
ditate siccatēq;. Præcedentes causæ quæ indu-
cant arterias, sunt aqua sulfurea aluminosaq;, &
omnia breviter quæ exiccandi vim possident.

Pulsus in vtrāq;
que partē mu-
tatio, accessio-
nis initium nū-
ciat.
Causarū ge-
nū duplex.

Causa antecē-
dens: quæ dis-
tendit.
Causa exter-
na, seu proccar-
arctica, quæ
inducit.
Inequalitas
pulsuum in vna
accessione,
quæ indicat.

Vigor accessio-
nis quid sit.

Causa inducē-
tis arterias
quæ sint.

Quæ quidem intemperies vbi quæq; arterias in-
valeret, pulsū reddidit duriorē. * In corde au-
tem siccam intemperiem producit sicca victus ra-
tio, diutius administrata: præterea medicamē-
torū exiccantiū tum efus tum pono, in quibus
est vinū merum: ad hæc cibi portioisq; abstinen-
tia, immodicus labor, senū, sollicitudo, tristitia,
diuturnæ vigiliæ, febris hæctica, præter ceteris,
marcida. Causæ humiditatis intemperiei sunt orde-
mata, quæ partes diutius tenuerunt: leucopileg-
matiz, quæ ipsū etiam cor mutāt: omnia deniq;
principium viferum exdemata cūm arterias
humectant & cor, tum pulsus efficiunt molles.
Pulsuum causæ mollitudinis mediocres sunt, ci-
borum copia humidiorū, multū ocium, somnus
longus, balneæ à cibo. At durior pulsuum antea
ostendimus esse paruitatem, ut mollium magni-
tudinē * comitem: quas quidem celeritas atq;
tarditas, crebritasq; & raritas consequuntur. Sunt
autē primæ ac veluti cōiunctæ causæ generatio-
nis pulsū, vñ atq; facultas. Porro in corde nō
excitatur tumores, qui pulsū duriorē efficiant,
quemadmodū in aliis visceribus inflammationes
& scirrhi: siquidem prius humor corpeptus syn-
cope intereat, in illorum tumorū auspiciis.

GALENI PERGAMENTI de præcognitione ex pulsibus, li- ber quartus.

Reliquum autem in hoc libro fuerit, ceterarum
partium dispositiones, quibus coe-
consentens cōmutat pulsus, omnes expli-
care suo ordine: vbi hoc ante omnia admonue-
rimus, totius corporis pulsus, antequā cor con-
sentiat parti prius affectæ, fieri nō posse ut in cō-
muni alterationē trahatur in parte tamen ali-
qua, licet offensione cor non percipiat, arteria-
rum motus variari posse. Partes animalis respi-
rationi servientes duæ tantū sunt, pulmo & tho-
rax. Nutritionis multo plura quā duo instru-
menta, iecur, ventriculus, in testina, lier, renes, &
vtraq; vesica. Celerrimam cordi & omnī maxi-
mam noxam, dat pulmo. Sedem habet enim om-
nium ei cōiunctissimam, illiq; vasis q̄maximæ af-
finis est, & confluens per maxima ostia in ventri-
culos eius. Quamobrem si quando solito cali-
dior evaserit, continuo cor calfacit: si vñ & re-
frigerat, frigidior effectus. At humiditatis & sic-
catis intemperiem, non perinde acillas, sed ci-
tius etiam has tamen, quā cetera in instrumenta,
impartit. Vbi igitur ob pulmōis exaltatiōē, cor-
præuū calorem contraxerit, pulsus efficii, qua-
les solet vñ ausus efficere. Qui affectus si sit
diuturnior, in periculū vocabitur illud, ne in fe-
brem hæcticam incidat. Atq; perinde respiratio
& pulsus alterabuntur, siue solum per se cor in-
temperatum sit, siue consentiat pulmōi. Maio-
rem tamē in toto sinu thoracis æstus percipiet,
qui ex pulmōe laborat, calidūq; planè expira-
bit, & fiet etiam aliter magis, & calidioribus e-
rit faucibus atq; lingua, rāq; maior ex parte sic-
cior: quæ, si in graue malum, cum æspredine
quadam nigrescet. At si pulmo refrigeratus sit,
cor ei consentiens, pulsus primò in eam altera-
tionem adducet, quæ vñ exolurum consequi-

Cor rari-
tas quæ
pulsus

Humiditatis
perit causa

Pulsus molles
& duri quæ
efficiant.

Pulsus generam
dorum primæ
causæ sūt. vñ
atq; facul-
tas, Cetera
namq; ob
obvius tumo-
res quæ
dantur effici-
t.

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

Cor
pulsus

tur: pro celsu temporis, ubi hec tunc frigiditatem contraxerit, pulvis ex citabit, quales huius, si polleat, tribuunt. Cæterum quibus primus refrigeratus est pulmo, frigidam respirationem percutit. Si succitate fuerit intemperatus pulmo, à primo pulvis penè nihil mutabit: tandè cõsuetudine illi corde, ipso duriores efficiet. Huius fauces, ramentum nihil finant, promptè ardeat. Humida intemperies vuidas reddet fauces, sicut exstinguit, tempore ad mollietudinem pulvis ipso traducit. Atque simplicibus his, discernere cõpositas intemperies licebit. At verò fluxionis omnium quæ in pulmone impingunt, cõmunis est inæqualitas pulsus: verò minor quidè, à subtilibus simul & paucis: insignior autè à crassis & viscidis, copiosisq; fluxionibus, pñficatur: quod videlicet hys magis obstruant, grauior, & cõprimant. Duriores q; oportet sunt pulsus, per intemperiem siccam, & inflàmato induratosq; tumores pulmonis: contra, molliores, per ædem. Frigida intemperies parua, tardam, raramq; respirationem gignit, non alter ac pulsus. At fluxiones frigide, pulsus similiter mutant respirationem autem, nec parua, nec tardam, nec raram reddunt. Quia enim cõstrictus pulmo est, paucus spiritus recipitur qui cõm naturæ nõ faciat sanis, cõtingit vt altera actio, statim celeris efficiatur & magna. Respirationis itaq; ipsecies est omnibus fluxionibus eadem: non omnibus accidit similiter suffocatio, * sed calidioribus omnibus magis: quod quidem largiore attrahi spiritui natura non postulat. Solè intemperiem nulli suffocationis periculi excipit. Porro si arterie raris alperæ sint oppletæ, nihil pulsus duritia variant: sin leues, quia totius animantis arterie intendantur, pulsus efficiunt duriores. Intemperies thoracis eadem alterationes inducit, ac paulò antè illæ pulmonis: tumores, pro multitudine & genere humorum qui efficiunt eos. Variat autè, quod citius cor, ac magis pulmone q; thoraci consentiat: & quod interim pars thoracis affecta sit * masculus, interim succingens costas membrana. Maior siquidem tensio oritur, ubi duræ partes & spissæ intumescunt. Vnde etiam pleuritici semper duriorè pulsum quàm peripneumonici habent: æqualem tamen, nõ vt illi inæqualem. Iecunore affecto pulsus ex intemperie variant, vt superius docuimus. Si excitati sint tumores præter naturam, conueniunt ferè etiam in his, sed minus ex inflammationib; indurascunt, quàm ex thoracis inflammationib; & tantò quidem, quantò quàm ex pulmone magis. Nunq; autem ex thoracis vel iecunore tumore pulsus molliis gignitur, quod nec instrumenta ea vaquæ ædemate pituitosè astringantur. At cor cõsentit iecunore, vniculo caue venæ. Consentit autè septo transverso cor præter omnes alias thoracis partes, quod ex ipsa caue vena in illud venæ inferuntur. Tensionè verò nulla perinde alia pars inferi arteriæ præcipue si nervosa eius pars sit affecta. Quod si à solis excrementis * quæ in eo gignuntur, ab his seve intendatur, dolor ac dyspnæa ab ipso principio oritur, postea putrescentibus excrementis febricitabit. Si ex fluxione quæ alium de in ipsum decumbit (omnino autè hæc fit vel sanguis bilis, vel calidi sanguinis & tenuis oportet:

nam crassum sanguinè & pituitam lentam, propter densitatem, nunq; recipiat) necessariò hi delirabunt, pulsusq; habebunt insigniter durus: itaq; etiam paruus, ac proinde ereberrimus, citim nimis etiam copiosus sit calor. Iam verò omnia quæ magnis pleuritidibus accidunt, respondent sympromanibus partis nervosæ septi transversi: tum quod succingens costas tunica multis nervis prædita sit, tum quod adhæreat septo transverso, membranisque thoracis interpleuricibus, per quas ad cor cõtinuatur. Ac maximè sanè indicium exitialis pleuritidis est, si pulsus sit magnopere durus, ob idq; similiter paruus, & ob ambo hæc, ca lorémq; ereberrimè. Pleuriticus namq; cum tali pulsu est nullus vaquæ servatus. Cæterum hi minus, quàm quibus inflammationè est septi transverso, delirant: siquidem proprius accedit ad cerebrum, diaphragmatis nervosus exortus. Ventriculus intemperie affectus, pulsus ita vt superiori immutabit. Si tumore secundu fundum, aliorum more. Si ad eius os est cõstitent, pulsus ob nervos multitudinem erit durior: non ita durus tamen vt ex septo transverso, aut costas succingente membrana. Si quidem quia si nervi insigni sensu præditi futuri erant, ob id molles & magni sunt cõditi, atq; à principio ipso producti. Igitur ob mollietate ipsos, & quod ea pars sit carnosæ, nunq; ex ore vetriculi ita durus sit pulsus, sed tum paruus, tum ereberrimè: quia propter examini sensum de fatigatur q; pñm, de cingit facultas: quæ quidem ne paulisper quidem illic copiam humorum sustinet, sed degrauatur, pulsusq; inæqualis, atq; interdum languidus efficiet. Cætera instrumenta nutritionis, quæ propiora quidem sunt cordi, & magnis vasib; ei copulata, celeritas & magis id in cõsensum trahent: quæ remotiora sunt, & parvis affixa, minus & tardius. Eodem modo quæ dura & cõtenta, nervosus prædita sunt plurimè duris, facile hæc durus pulsus efficiunt: quæ contra, molles. Quæ sensu vigent, vitioq; in cõmodo facultatem afficiunt. Porro qui in clusi in spissioribus corporibus & cõspati sunt humores, si maiorem dolorem, q; qui in rarioribus & mollioribus sunt, cõcitant. At verò si cerebrum, aut illius etiam meninges, laborè inflammatione, necessariò febris atq; delirium sequitur: nõ necessariò autem per aliarum capitis partium inflammationes. Nam musculorū temporalium inflammationes, si magnæ sint, febris, delirium, spasmos, soporèq; frequenter inducunt, non tamen semper: quippe si parvæ sint, nunq; talia symptomata excitant. Cerebrum ipsum vbi in morbosam intemperiem incurrit, symptoma necessariò, qd intemperiei familiarè est, inducit: in caloribus immoderatis, si quoniam do soli perse acciderint, delirium si sic citan cõturbati, vna cum vigiliis. Vigilia si quidem proprium est sic citatis symptoma: vt humiditatis, somnus profundus: ac refrigerationis, fatuitas. Cæterum si cum frigida humiditas cõtæt, altus sopor inducitur. Si verò longè calidus humiditatisq; cerebrum, q; sit sequi, evasit, sopor vigiliis atq; delirio iunctus oritur. Vehemèns frigiditas cerebri, sic citan cõturbata, motu prius ad vniuersu corpus. Si cerebrum admodu calidum sit, nec adit sic citan, * in cõturbata arteriæ pulsus moderatè erit: magnitudine

Sopor transverso affectus, vt pulsus variat

Pleuritis exitialis quæ pulsus facit.

Diaphragma inflammatum cor delens facit. Ventriculus affectus quales pulsus facit.

Oris vetriculi nervi quales.

Fluxionem omnium in pulmone intemperies, cõmunis est omni quælibet pulsus.

Pulmo frigida fluxione infestus, quæ quali est respirationem.

Fluxiones cunctas pulmonis ædemate committit fluxum respirationem.

Thoracis interius perit tumores, quæ quali pulsus alterationem inducant.

Iecur affectum quæ quali pulsus producat.

Ordemate nec thoracis, nec iecur infestis vaquæ. Cor cõturbatum, vniculo caue venæ. Cor qualiter infestatur, septo transverso.

Cerebri aut morbosam inflammationem, necessariò febris atq; delirium sequitur.

Cerebrum intus perit affectum quales symptomata inducant. Vigilia vnde.

Somnus profundus, fatuitas, Vigilia sopor.

verò, celeritate, & crebritate hæcenus superabunt, quatenus præaus calor nativus excesserit. Si non modo sit calidius, sed siccus præter naturam, statim utiq; etiam tenuis meninx, quæ regit cerebrum, in eandem affectionem incidit, vniq; cum ea omnes nervi atq; arteriæ inde pulsum nanciscuntur duriorem, quæ earum tunice & exsiccentur & contendantur. Quod si ex bilioso humore affluencia eorum in affectum calidum & siccum devenierit, etiam magis tenduntur arteriæ: si verò ex calidi ac veluti feruentis sanguinis, siccitas minor & maior tensio cum ipsas meningas corripit, tum nervos atq; etiam arterias. Si igitur arteriæ corpus cum siccitate videatur durius, alterutrum est exultantem obfidere ipsum cerebrum, vel intemperiem calidam & siccam, vel copiam bilis: inflammationem autem si cum tensione. At si cum ambabus dispositionibus, affectum pariter constanter esse ex sanguineo & bilioso humore. Ad elidantur sane omnes in hunc modum affecti: modice tamen qui sola intemperie laborant, habentque et infirmas omnes voluntarias actiones. Qui verò à bilioso humore affliguntur, non eas habet infirmas, sed delirant impetibus. Qui ex atra bile feruescere ob putredinem id patiuntur, facillime alienantur: quorum pulsus etiam sunt duri, siccitatis atq; tensionis ratione: similis parui ob duritiem, & iusto celeriores, quia febriunt: nec non crebri, quod vix non fiat sana. Humida intemperantia cerebri, molles tempore efficiunt pulsus, somnolentumq; hominem. Si ad illas febrilis calor accesserit, morbus appellatur lethargus, pulsusque speciem referet arteriæ cõtente, quamvis illa sit mollis. At magni pulsus in morbis hisce omnibus hæcenus erunt, quatenus auctus sit calor. Celeritas aut omnino minima est, aut his nihil prorsus interducitur: crebritasque similiter. Si verò ex bile simul & pituita ipsæ affectus sit mitius, nec prorsus vigilant, nec alio fopore tenentur, sed somnolenti desipiunt, genasque atrollere nequeunt: quare pulsus eorum etiam sunt miscellanei. Si morbo frigida citra materiam in cerebro oriatur, cui cor cõtentiatur, minores, tardiores, atq; rariores æquo pulsus additur, idque absque ulla tensione. Sin autem cum ea intemperie materia etiam melancholica affluerit, aut crassa & glutinosa pituita, fiet ut arteriæ tendantur, ac proinde pulsus durior videatur. Si humida & sterculenta pituita comitata sit intemperiem, sine tensione molliter pulsabit arteria. Si mista fuerit pituita, simul mollis erit, & non nihil interius pulsus. Neque autem obsecro est, quin si pulsus sit mollior, erit etiam maior quæ antea. Subtilis meninx quæ disjungit cerebrum, absque illo pæpetuo dictorum quicquid non potest, neque etiam absque meninge cerebrum: sed statim sibi affectum vltro citroque communicant. At dura meninx, quia longissimè à cerebro distita est, affecta esse sola potest. Cuius affectus si insignis sit, ut cor ad cõtensum atq; arterias sollicitet, pulsus, quemadmodum in affectibus cerebri, alterabuntur. Calidi itaque affectus illius usum augent: frigidi cum hunc remittunt, tum arterias sensum induunt, præcipue eas quæ corde sunt altiores. Sicci intentum & durum pulsum efficiunt, humidi molles: at tamen non ita molles & duras, ut cerebrum, sed duriorem & minus mollem. Si quidem corpora sua sponte dura, si in affectus indurantes

inciderint, maximam cõtrahent duritiem. Quæ autem natura sunt mollia, si in humectantes & solutes incurrant, semel remittuntur atq; mollescunt. Sin dura arripiantur affectibus humectantibus, aut mollia indurantibus, nequaquam acquiescunt extremum sibi cõtineri statum. Porro qui cerebri & pulmonis gratia molles sunt pulsus, ita sunt molles, ut nullus alius. His præ cæteris vicinior est ille, quæ ex iecinore & liene oritur ædemate affectus. Nam scirrhus etiam hæc viscera obfessa, pulsus satis duros efficiunt: minus, si sint inflammata, quæ si labore scirrhus. Cerebrum atq; pulmo, fortassis ne scirrhus quidem admiserint: duris enim corporibus & spissis licet affectus, non raris & mollibus familiaris exsistit. Igitur affectus supra omnem modum frigidi, pulsus duros efficiunt, alioqui nequaquam. Ad hæc arteriæ viciniores affectus, promptius in molitudinem atq; duritiem transeunt. Quæ verò longius distite sunt, aut sic cor interposuim adfit, minus, Quod si teneas, non est quod dubites in cæteris morbis faciei, collis, & artuum, quales pulsus gi-gnantur. Nam pars affecta si sit spissa atq; dura, pulsus efficiet duros, siue inflammata, siue scirrhus affecta, siue supra modum refrigerata ipsas arterias sollicitet. Si sit carnosior, etiam vel inflammata sit, vel scirrhus induraret, duros quidem, sed minus superioribus. Sin ordema habuerit, molles. Cõtinent autem arteriosis celerius vicinæ omnes arteriæ, & cor venosis secundum has: tardissime autem nervosis. Iam verò cum insigni lien scirrhus esset affectus, frequenter cõpeximus non cõsecutam aquam inter cutem, quæ indurato iecinore nec cessant succedit, fitque tum pulsus præditus signis vtriusque affectus, exsistens partim mollis, partim durus & tensus. Oritur porro hydrops ob hæc morrhoidum mensuram immodicam vacationem, aut suppressionem insolitam. Testes, etiam extra inguina sint, statim tamen febres propter vasorum vicinitatem accendunt. Et tamen superne à remi regionibus vena & arteria descendunt per peritonæi foramina, ad testes, vasa sane magnitudine insigni. Præterea ipsa erythroides tunica adnata peritonæo est: ob idque si sit inflammata, pulsus efficiet duri, ac proinde minores. A testibus inflammatis non perinde durus oritur, sed magnus tamen, febris ratione. Quæ est partes arteriosæ & venosæ sunt, maiores pulsus excitant: quæ nervosæ, aut omnino nihil, aut paruos: at tetanos & spasmos generant.

Ac præsentium quidam cognitio nihil est aliud, quæ affectuum invectio. Cognitio autem præteritorum est inventio causarum, quæ induxerunt affectus. At ex præsentibus præfaga, quæ futurorum sumuntur. Vnus igitur ac primus quod præcognoscere cupimus, est, qualis exitus habiturus sit morbus. Secundum, quo tempore iudicabitur ad salutem aut mortem. Tertium, quinam modus erit ut saluti, aut mortis. Quæ omnia ex dispositionibus præfagiuntur, ex quibus morbi genus, & facultatis imbecillitas, vel robur, dignoscitur. Morbus porro cognoscitur ex loco affecto, eiusque dispositione. Facultas ex cõmodo temperamento, vel intemperie corporis solidorum. Nam si imbecillitates quædam ob spiritum acciderit animalis, breves sunt illæ, & symptomatum ratione cõsequuntur. Ergo si facultas vigori morbi sit sustinendo, homo necessario servabitur: si

Delirium quod cerebri affectus signatur.

Cerebri intemperiem humidam quæ signatur. Lethargus quod de gignatur.

Meningem tenuiorem affectum posse ab ipso cerebri, siccis neg. hoc ab ipso illa. Meningem duriorem affectu quæ pulsus signatur.

Pulsus mollissimus esse, qui ex affectu cerebri & pulmonis emanatur.

Scirrhus durus tantum corporibus, familiaris existit.

Partes spissas et duras, pulsus duros efficiunt.

Aquam inter cutem necessariam succedens indurata videri.

Hydropsi causa. Testes inflammatis cor statim febres accendunt.

Cognoscere quæ vult optatum.

Morbus vade cognoscitur. Facultas vade cognoscitur. Saluti spes, quando affligitur, quæ quando sit deperit.

quidem nihil & delictū fuerit extrinsecus. Sin autem facultas sit impar, moriatur is est necesse. Iā verō qui sunt evasuri, eo liberabuntur tempore, quo natura morbum superaverit * aboluntissimē. Qui autē sunt morituri, tunc peribunt sanē, cum facultas adeo vincetur à morbo, ut functio aliqua necessarii ad vitā penitus exstinguatur. At rano tum salutus, tum morbi, indidem enī præficietur. Porro functiones requiritur ad vitā, ubi exstinguuntur, hæc quidē suffocant, hæc vitalem facultatē prosternunt: alix simul & hanc prosternunt & suffocant. Quæ igitur facultatem vitalem suffocant, à thoracis, pulmonis, & asperæ arteriæ, gutturis, fauciumq; procedunt dispositionibus, nōnullæ etiam in ipso corde constitunt. Quæ facultatē prosternunt, ab stomachicis dispositionibus (quas sequitur syncope) hepaticisq; diuturnis, ob quas ciborū vīu nō pōpōtūtur, præterea ex longis doloribus, vel vehementibus, ad hæc ex omnibus hæc febribus, ac breviter cordis ingenti intemperie ortæ, deiciunt illam. Similiter animalis facultatis imbecillitatem quidē comitantur maximas intemperantias cerebri: quæ vero vcl yn suffocationes sunt, tum repletiones vetriculonis illius, obstructionesq; meatuū illuc ductum. Proinde cui status facultatis ad vngūē pīpīctus sit, locūq; affectus, ac illius dispositio, hæc ad futura prænoscentia peritissimus erit. Cognoscitur autē ipsa facultas & ex actionibus, & ex intemperie agnitiūm. At vero ubi oēs pulsus per se languidi sunt, facultas vitalis est imbecilla: id quod accidet per vniuersum corpus, si ipsum cordis corpus intēperatum fuerit in vna parte, si sola illa pars. Vbi verō earundē artēriarum nunc languidus pulsus sit, nunc vehementis, facultas nō est per se quidē imbecilla, sed abvndantia humorum degeneratur: quæ inxqualitas ob eandē occasionem sit & in cæteris diuersis pulsuum. Ceterū si pulsus vehementes & magni, numero contrarios vincāt, minus facultas à copia ipsa ostenditur: sin parui & languidi, magis. Præterea inxuales in vno icū, si fines motuum validiores & celeriores efficiāt, nūciāt facultatē robustiorem exteris, qui languidiores & tardiores efficiantur. Si verō in tali cōstitutione alius pulsus videatur, statim is magnus erit, ostendēq; naturam plenitudine superiorem. At languidus pulsus nūq; alius existet. Verū magis & minus vehementes, quō aliorū simul & vehementer evaserit, robur facultatis, motūq; minime impeditum declarat. Omnes igitur huiusmodi pulsus iudicium morbi cum excretionem futurum indicāt. Quare contractionis motus est spectandus: ea liquidē semper abicit priorem illam celeritatem, idq; nunc magis, nunc minus. Melior autē indicatio expectari solet, cōtractionis celeritatem plus exoluta. Quod si enī signa cōcoctionis accesserint, optimam iudicationem hæc status pmitit. At pulsus magnus & vehemens, si non præcedat eum inxqualitas, non semper excretionem portendit. Alio autem semper quidem, sed si inxqualitas nō præcesserit, modicas excretiones prænuñciat: copiosas, cum multas sequatur inxqualitates, quæ declarent facultatem copia onerari. Non est autem eadem facultas vitalis & nutritiva, natura-

līve. Illius liquidē hoc vni opus est, generatio pulsus. Naturalis, id qd familiare est ad nutritionem, allicere, & qd est alienū, excernere: præterea retinere, alterarq; familiare alimentum. Hæc appē ad nutrienda corpora desiderantur, sicut ad natū caloris mediocritatem tuendam, diffusio & cōtractio cordis & artēriarum. Quam facultatem oēs in stirpib. invenias, neg in animalibus frigidis: cuius generis sunt oīstræ, & quæ petris, vel aliis solidis corporibus adnascuntur. Anima lia calida, maxime sanguine prædita, aptissimā hanc facultatē, & vehementissimā obtinent. Hæc in contractionibus pulsuum tantum eicit extrēmum fuliginosum, qd obesse potest caloris mediocritati: in diffusionibus item, qd se refrigeret, allicit. Altera facultas nutritiva, conveniens attrahit alimentum, excernitq; incommo- dum. Distinguit igitur facultatum principia sunt, ipse tē mutuo in singulis instrumentis inter se confunduntur. Nam artēriæ, quatenus nutriuntur, facultatē nutritoria gubernantur: cuius excernere alimentum excrementa est minus: quā eadem modum alterius vitalis, fuliginosa excrementa expellere. Quæ cum abvndant, maximā simul & celeritatem cōtractionem ipse artēriæ moluntur. Vbi verō nulla hæc excrementa fuerint, humores autem, qui putrescebūt antē, sint assecuti cōcoctionem, ab altera naturali vi cōcoctionis excrementa expelluntur. Quæ facultas sanē nō per solas artērias & venas dispergitur, sed per omnia animantis membra, pcrq; carnem, nervos, ligamenta & ossa, disseminatur. Hæc igitur est illa facultas, quæ iudicantes efficit: cuius quatenus artēriæ participes sunt, nutrimenti excrementum expellunt. Altera facultate pulsatrice, quam solæ ipse obnunt, in cōtractionibus recētem fuliginosum expellunt: diffusionibus autem refrigerant allicit. At vīu nō perpetuo par vtriusq; est actio, sed præpollentis vīus excēdit nonnūq;. Itaq; ex se eam pulsum figurat, si quidem est facultas respōndeat. At verō si humidum excrementum præpollat, cōtrahitur plurimum: distenditur autem nō plurimum cor cum artēriis, sed hæctenus duntaxat, ut satis refrigerari ab extrema cōtractione suppetat. Sin autem paucus fuerit humosus calor, copiosissimus autē mundus & purus & quasi flammæus, in plurimum distenduntur: at contrahuntur eatenus, quatenus satisfiat alteri vīui. Quare semper æqua magnitudine distēno sit & cōtractio, nisi casu nobis admoventibus digitis, fiat repentina mutatio. Vide alius pulsus excretionem significat, cōcoctis qui inducebant febrem humoribus supervenientis. Semper enim omnis excretio, naturæ lege plecta, sequitur cōcoctionem: quippe secundum ventrem conficitur natura excrementū à cōcoctione excernere. Cæteras excretiones ex quib; cōcoctionem præcedunt, nunc q; vellicetur ab illis q; cōbnet, nunc q; degeneretur, ante tempus cōcoctionis moliri cogitur. Haud aliter totius corporis facultas, posteaquam satis familiarem succum singularium partium cōcoctis, tum demum excrementum excernit, nisi quid eam irritet importune. Copia excrementorum, tum ex plethoricis signis quæ præcesserunt, tum ex presenti caloris inflammatione

Exclusionē requiritur ad vitā, ubi diffinita.

Prænoscentia futurum qui sit peritissimus indicium. Facultas vnde agnoscitur, vnde languor quidē per vniuersum corpus. Quæ in vna parte accidit.

Orbis morbi, cum excretionem, qui pulsus indicat.

Facultatis vitalis opus. Facultatis nutritiva opus.

Facultas vitalis in quibus vegeta. Et quæ vehementissimam dāta sit animalibus.

Contractio autem arteriarum excernit extrēmum fuliginosum. Dilectat autem arteriarum autem huius instrumenti. Facultas nutritiva, conveniens attrahit alimentum, excernitq; incommo- dum. Distinguit igitur facultatum principia sunt, ipse tē mutuo in singulis instrumentis inter se confunduntur.

Expulsiorem faciliorem efficit, quæ cōcoctis fuerit.

Alius pulsus quando excretionem significat. Excretionem naturalem semper faciliorem cōcoctionem.

Excrementorum copia vnde deprehendatur.

Excretionis
prima quæ.

tionem prenotatur, ob quæ ipsi calorem pulsus magni videntur & alti. Quare p[ri]mum omnium sunt excretiones, in quibus pulsus est minimè magnus: at celer in contractione. Porro autem si etiam se plus intro recipiat, humidus excrementi affluentia in primis est nuncius, similis morbi crudi. Si præterea sit pulsus languidus, syncope periculum imminet. Si verò purior sit morbus, cum ab inæqualibus pulsibus mutatio fiat in plures vehementes & magnos, iudicatio fiet per abscessum. 10

GALENI PERGAMENI

de diebus decretoriis, lib. I.

Solutio morborum sua, quæ adesse debent.



Recidiva morbi quando recidit.

Vò solutiones morborum qui non paucissimi, sed subito finierit, certas esse cognoscimus, aliqua excretion copiosa, vel insignis abscessus defideratur. Nam qui morbi citra hæc finiantur, in eis recidiva timenda est. Quare tunc ægri modis omnibus observare oportet, ne quæ 20 omnino sanis vel in cibo, vel in potu, vel balneis, vel motu, vel denique in aliis quibuslibet concedi mus, æger ipsum permittamus. Si namque cõquiescente morbus exiguus fuerit, forsitan ob tam ætatem victus rationem prorsus subsederit, ut postea nunquam revertatur. At si malignior existat, etiam tunc, cum hoc victu modo visus fueris, redabit, sed tamen non cum summo discrimine. Si verò tanquam plane solutus flegleris, evadet multo grauior quam antè. Firmi itaque solutione vehementis morbi, oportet solutoria signa præcedere. Præcedunt autem ipsæ excretionis abscessus, fausta, quædam symptomata, ac non medio 30 cras in ægri corpore perturbatio: adeo ut nihil aliud ab eis distare videatur, qui in foro de capite iudicatur. Quam sanè turbatione subitam, nos appellamus crisin: eamque finire interdum quidem ad salutem, interdum autem ad exitum, asserimus. At verò ipsæ crises finitibus diebus accidunt, sed neque pares numero, neque æquali fide. Hoc intercedit crisi discriminis inter illas, quod alix salubres, alix perniciose accedunt. Quædam enim cum pluribus & difficilioribus symptomatibus, & maiori certamine, nonnulla statim ab initio tutissime eveniunt. Quinque in hoc plurimum differunt, quod hæc deficientes, illæ perfectæ sunt: nec minus, quod alix certis statim diebus iudicantur prius, siut alix repente, & ex improviso eveniunt. Tot autem iudiciorum, quorum dierum decretoriis, differentia existunt. Cæterum in duodecimo & decimo sexto, nullum unquam iudicium vidi. In septimo, ne vel numerare omnes adhuc possum. In sexto iudicatur, sed cum difficilioribus symptomatis, & periculo non mediocri: ad hæc, absque fide, imperfectè, obscurè, sine odore, & ad perniciem. Etenim multi morbi iudicantur septimo die absolute pariter & securè, aperte, & cum signis salubribus: duodecimo autem rari adeo, ut nobis nondum sint visi. Porro imperfectè indicationem vocamus, ubi ex morbo quippiam relinquitur: in 60 dam siue incerta, quam morbi sequuntur recidiva: periculosa, quæ cum grauib[us] symptomatibus accidit: obscura, quæ citra excretionem, vel evidentem abscessum evenit: sine signis evenire dicitur, quæ à nullo priore die indicata est: mala,

quod in ægri perniciem omnino destinat. Rursus absolutam eam dico, quæ ex morbo nihil facit reliqui: fidam, firmam, securam, certam, quæ tendit nunquam: tutam, quæ sine periculosis symptomatibus accidit: manifestam, cui excretio quædam, aut abscessus insignis, aut cõspicuum adest, cum bonas accidit signis, quæ ab undecimo die præmonstrata iam fuerit: bona denique illa, quæ in sanitatem definit. Cæterum non facit, eas vidisse diem aliquem iudicantem morbos, ut de decretoriis dicatur, sed oportere illis crebro iudicia fieri: præterea ut cõsuetudo bona, perfectæ, securæ, manifestæ, tuta, nec non præmonstrata. Quæ igitur vel septimum, vel undecimum, vel decimum quartum, vel alios quosdam dies similes, non dixerit decretoriorum: nemo, opinor, tam omnes note iudicationis in illis addit. Est enim decretoriorum dierum natura quedam propria & eximia. Quare cognitio ipsorum, ad curationem morborum non leve momentum adfert: ne videlicet eis timeamus, qui fidis diebus sunt iudicari: aut teneamus victum eis iniungamus: neve peris iudicatos diebus, parè accuratè observemus. Primum igitur omnium dierum decretoriorum septimum dicimus, idque non numero, aut ordine, sed dignitate & potentia: omnes quippe decretoriorum notas sortitur. Nam plurimos iudicat, & absolute item cum manifesta excretionem, vel abscessu, & sine periculo vehementi: citque vel plurimum quartum index illius. Nam si vixit, vel spuit, vel deiectionibus, vel appetentia, vel cogitationis, vel sensus mutatio manifesta in quarto die cõtingerit, rationi consonum est, ut similis iudicatio cõsequatur illam in septimo: bona videlicet, si ad salutem: mala, si ad mortem mutatio illa asperaverit. Plernumque itaque bona iudicia eveniunt in septimo: quoniam nonnulli etiam in eodem moriantur, alii evidenti conversione ad peiora vergentes, in sequenti quodam decretorio intereant. Sextum verò diem, quidam pauciores in eo iudicantur, quam in septimo, tanto eum maligniorem invenio, ut qui ferè ex adverso natura septimo oppositus sit. Quin etiam qui in quarto ad peiorè statum recidunt, plerique sexto moriuntur. E cõtrario rursus si bona conversio cõtingat, septimum expectabit. Quod si raro interim ad meliora conversione in quarto die factæ excipiens, sextus, eam iudicaverit, dici non potest quanta cõ perturbatione, periculo, & metu id fiat, quasi æger statim adeo fato sit funditurus. Nam si quæ excretio accidat, omnino cõstentantur, pulsus ipsorum cõcidunt, color abiit, tremor & collabuntur. At septimus dies, pro excretionis portione reficit semper ipsos magis ac recreat. Præterea sexto die maligna, acris, fœtidissima: maiori ex parte tum deiciunt, tum vomuntur: autem sudores æquales, toto manentes corpore, calidius visuntur: quales si quæ oboriuntur, intercipiuntur. Interdum paroides malignæ, vel arcuatus morbus, vel alius quidam abscessus, alteri certamen, quod discutiuntur requirit, emergit. Sed neque in vniis boni quicquam inveniri. Etenim crudus, decoloris, tenuis, boni nihil, quod subsideat, habentes, sed copia tantum conduces, in die sexto visuntur. Atque hæc moderatissima levisiimaque sunt, quæ illo die in colami futuro contingunt. Nam plurimos

Decretorio die quo existant.

Decretorio die quo existant. Decretorio die quo existant. Decretorio die quo existant.

Septimi quartum est index.

Sextus dies quando morbi sunt signa.

Indicium totum diffinitum quod dicitur decretorium existit.

Indicium dicitur esse opacum decretorium. Sextum dies est decretorium profectum.

Indicium totum diffinitum quod dicitur decretorium existit.

alios syncope statim corripuit, vel sanguinis larga effusione, aut evacuatione immmodica exanimavit, vel in carochem aut infanti perduxit. alius denique perniciē in sanabilem conciliavit. Mihi sanē frequenter in mentē venit septimi diei naturam regi cupiam asimulare, sexti vērō tyranno. Ille siquidē longē clementior, ceu benignus aliquis princeps, hic quos iudicat, vel supplicij partē admittit, vel illustrat victoriā: hic ē contrario, vel perniciē illius, quem iudicandū suscipit, gaudet, vel salutē dolet, quęritque vbi animū expleat, & malē ægrum, qui in ipsum incidit, tractet, & longa punctione exerceat. Est itaque sextus dies decretorius quidē, sed malus: quēdammodum septimus, bonus. Ceterū sexti diei vel septimi quartus etiā est index. At verū naturā septimi, maximē imitatur decimusquartus. Proximi huius sunt nonus, vnde decimus & vigesimus: prope hos verō septimusdecimus & quinquas: post hos quartas: hunc sequuntur tertius & decimus octauus. Sexti autē naturā nullus exactē aliorū diērum imitatur. Si aliquid quando in octauū diem, vel decimū, subita morbi solutio incidat, similis fore ē ei, quę sexto accidat. Verū rarō in his soluitur, nec quę fide, nec bene, nec perfectē, sed obscurē simul & citra notas: quare alterius esse nature cum supradictis apparēt. Quemadmodū autē in his subitō morbus nō soluitur, ita neq; in duodecimo, sextodecimo & nonodecimo. Medius autē inter eos qui subitō morbū nō solvant, & eos qui subitam iudicationē faciunt, videtur mihi esse decimus tertius. Atque huiusmodi quidē dictōrū diērum, ad vigesimū vsq; differētia est. Ceterū cū exactū morbi principij statuerē semper sit laboriosum: morbis his, in quibus obscura principia sunt, omnisque, decretorius dies in manifestissimis experiamur: initij morbi tempus illud in vniuersum existimantes, cū ægri manifestē incipientes febrile decubuerint: id ēdē cœnariæ, & exercitiar, & lotis, facilius subitōque pleriq; cōtingit. In quē sane modum Hippocrates iudicationes ipsas, a primo die quo febricitauit homo, nō ab illo quo doluit capite, vel eiūsmodi aliud quippiā est passus, accuratē explorauit: q; in principis huiusmodi experientia diērum decretoriorū sit medicis sita. Porro quēdammodū vndecimus quatuordecimus est index, tra septimi quartus. Si igitur vel quartus vel vndecimo facto indice, crisis quolibet modo attigerit vel septimū, vel decimumquartū, illorū ipsam crīsim esse, arbitrari est opus. At si iudiciū extra illos dies cadat, vt neq; in illis incipiat neq; compleatur, constat non adiacē esse dicendum, morbum in septimo aut decimoquarto iudicatum fuisse: verum in alio quopiam die, qui totū crīsim in se comprehendat. Quod si nullo indice prius habito, crisis cōtingat subitō, duos attingens dies, vtriusq; sit distinguē, proportionē accessionis, natura diērum, numero decretoriorū temporū, ac tempore iudicij exploratis. Sic autē exploratur accessiois pportio. Nam si eger decimus imparibus laborauit magis, diei imparis erit magis propriū iudiciū: quemadmodū paris, si paribus: quādoquidē in accessionibus iudicia maiori ex parte cōtingunt. Diērum autē naturā obseruatur hoc pacto: Si ambigas vtrum noni diei,

vel decimi sit iudiciū, si quidē salubre, perfectū, atq; sine periculo sit, noni est magis: si imperfectū, malū atq; periculosū, decimi. Quod verō ad numerū decretoriorū temporū pertinet (sunt enim tria: nepe decretoria accessionis initium, decretoria morionis principij, ac deniq; ipse iudicij finis) qui dies sibi tempora duo vendicauerit, magis sibi iudiciū assumit. Sic & ipsum tempus iudicij, vtra die longius fuerit, illi magis iudiciū attribui debet. Si itaque quatuor hęc note vno die introducantur, huic ru quoq; iudiciū attribuetur. At si vna ex his relinquatur, at ascribitur similiter, sic tamē vtrā iam alterum etiā diem existimē ipsius crisis esse participem. Si verō æquales sint portæ, iudiciū vtriusque diei putabitur esse cōmune. Interim non duos modō, sed tres etiā dies iudiciū attingit. Ac tūc sanē, quantū ad temporis longitudinē attinet, medius est præterduos: nō tamē vniuersum ei iudiciū tribuendū. At verō si præterea ac subita in ægrotantis corpore perturbatio, morbi solutio nē præcedat, crisis sit appellanda, vtriusq; nec primū, nec secundum diem, decretorius esse censēbimus. Sin autē solutio simpliciter appellanda est crisis, hi quoq; erunt decretorii. Quare omnes febres diarie solutionē partim primo itam die, partim secundo nascuntur. Ad hęc perturbatio illa, quę fit ante exactā solutionē morbi, abfoluto sermone dici crisis meretur: aliarum autē nulla abfolutē: verū quę ad perniciē tendat, mala crisis: quę autē in signis quidem momentū amittit, morbū verō exactē nō soluit, deficient crisis dicatur. Alia quę insigniter ad peiora declinat, imperfecta simul & mala. In vniuersum autē, quę omnī crīsim notas sortitur, crisis abfolutē vocatur: alie autē, cum appositione nominis appellabūtur. Quę pertinet ad decretorios dies post vigesimū, equidem vigesimo vigesimūprimū postpono, licet cum illi præposuerit Archigenes. Similiter vigesimūseptimū vigesimū octauo antepono. Habet præterea & trigesimalquartus vni neq; negligēdum: atq; hoc maiore quadagesimus. His minus decernūt vigesimalquartus & vigesimalprimas, & multo adhuc minus trigesimalseptimus: ita vt in diērum decernentiū, & eorū qui non decernunt, medio collocatus esse videatur, magisq; ex nō decernentibus esse. Reliqua multitudine diērum inter vigesimū & quadagesimū, prorsus facultatis decernendi est experti. S. sunt duodecim numero: nempe vigesimalsecundus, vigesimaltertius, vigesimalquintus, vigesimalsextus, vigesimalnonus, trigecimus, trigesimalsecūdus, trigesimaltertius, trigesimalquintus, trigesimalsextus, trigesimaloctauus, ac trigesimalnonus. Atq; vsq; ad quartumdecimū quidē, magnę sunt perturbationes in morbis: proximo loco succedunt, quę vsq; ad vigesimū habentur: quę post hunc ad quadagesimū pergūt, paulatim vehementia remittūt. Dies autē omēs post quadagesimū, prorsus languēt, cōcoctione potius morbos & abscissibus, q; crīsimbus, terminantes. Accidūt in his quoq; per excretionē iudicia interdum, sed rarō, nec magnā habentia efficacit. Et frequenter iudicia ipsa pluribus dieb. cōplentur, maxime cū in abscissum defuerint. Ac ceteros quidē post quadagesimū dies

Decretoria tem
pora tria.

Iudicia quę in
accessis sunt,
quibus duobus
sunt tribuēda.

Crisis quid.

Dies primus ea
que scilicet ap
piliari crīsim
quomodo pos
sit.
Ephemerę quā
da soluantur.

Diērum ordo post
vigesimal.

Diē facultatis
decernendi cum
vno expertus
que sint.

Diē omēs post
quadagesimū
concoctione potius
morbos &
abscissibus, quā
crīsimbus, termina
ntes.

Septimus diei
asimulatus re
tinetur
Sextus diei ty
ranno similis.

Quartus diei
re septimi, sic
sexti etiam est
index.

Septimus quo
diei imitatur
Sextum diem
quo referat.

Dies qui subitō
morbus non sol
uant.

Principij morbi
in vniuerso la
boriosum ex
istit,
tertium morbi
quod sit.

Vndecimus
quatuordecimus
est index.
Quartus septi
mus est index.

Accessionē pro
prie quomodo
exploranda
sit.
Iudicia maiori
ex parte in ac
cessionibus sunt

dies, continere videtur Hippocrates: sexagesimi tamē, octogesimali, centesimali ratio ē haberi. Ab his alios quēdam septē mensibus, alios septē annis finiri ait, alios verō in binis annorū hebdomadibus, vel in ternis. Vbi igitur morbus acutus nullum signū periculosum portendat, & quarto die evidens quædā cōcoctionis nota apparuerit, septimo crisis futura est. Quare signa periculosa futuraria in primis sunt cognoscēda, vñ cum cōcoctionis indicia, vt hæc præfigere valeamus. Porro si periculosa symptomata quarto die adsint, vñ cum nota cōcoctionis, iudiciū, si parib. diebus accessio fiat, sexto expectandū est: q̃ si hunc ex-
cesserit, octauo: si imparib. diebus, septimo. Bonis signis apparebit. Septimo die discerneretur morbus: at letalia signa, cum cōcoctionis nota cōi-
bunt nunq̃. Hęc autē nō minus q̃ periculosa & fa-
lutaria inspicūda sunt: q̃ si quarto apparuerint, septimo aderit mors: quæ crisis est mala. Ceterū animum advertere necesse est letaliū signorū ma-
gnitudinē & copiam. Si namq̃ multa & magna die quarto evenierint, accessio nūq̃. distinguendū erit de morte futura, cognoscendūq̃ hominē sexto die moriturum, si diebus parib. ipsa accessio sit
facta: quemadmodū si imparib. septimo. Interdū
fœtus hominem iugulari, vel si accessio cōgerit in imparibus, idq̃ propter morbi celeritatē, ma-
gnitudinē, & symptomatum in quarto die eve-
nientium copiam. Est itaq̃ quartus dies suapie na-
tura index septimi: hoc est, si nihil extrinsecus ac-
cidat, quod in clinationē illius intercepti. Ete-
nim vbi malum aliqd̃ extrinsecus præter spem e-
venierit, morbusq̃ peracutus fuerit, & vires ægri
imbecillæ, signū malum, quod quarto die se ostē-
dit, septimum diem non expectat: verū sexto mo-
rietur æger, præsertim si paribus diebus accessio
nes invalens. Quod si nihil extrinsecus sit er-
ratum, & morbi motus haud ita præceps & veloci,
egregiū validus sit, si quēdam manifestum in quarto
die malum iudiciū fuerit, septimo interitū die: si
verō obscurum, excedet hunc quoq̃. Iam verō si
accessiones paribus diebus cōtingerint, octauo: si
imparibus, nono æger decedet. At si quarto die
bonum iudiciū videatur, in nullo autem æger
versetur discrimine, si fieri non potest, quin septi-
mo die iudicetur morbus, si nihil extrinsecus sit
peccatum. Committuntur autem quædā peccata,
interdum q̃dē ab ægro, interdū ab ipso me-
dico: est cū assensum culpa, & ob ea quæ ex-
trinsecus accidunt, similiter delinquatur circa
grum, vnde virtus diei obscuratur. id quod per-
pendens Hippocrates ait: Natura quidem sufficit,
peccatur tamen in hac extrinsecus caraplas-
maie, vñctōne, totiūsq̃ & partis fomentis. Præ-
terea rursus in ipso stant aphorismorū initio, id
exactius cōfirmans, ait: Oportet autem non so-
lum ipsum, medicum scilicet, quæ res postulari fa-
cere, sed & ægrum, & assensientes, & extēiora.
Quo in loco extēiora intelligit omnia illa, quæ
extrinsecus accidētia possunt aut obesse, aut pro-
desse ægrotanti. Hęc igitur quatuor genera, quæ
plures habent differentias particulares, si natu-
re motus præpediant, ordinē circuituum sub-
vertunt. * At vbi quartus dies evidens indicij si-
gnum attulerit, si nec medicus quid peccaverit,

nec æger, nec ministrorum quisquam, ad hæc et-
iam nec extrinsecus error admissus sit, necessari-
us morbus die septimo iudicabitur. Cū autem
omnis crisis vicius rationem error, iudiciū ip-
sum impediat, nec vicius ratio proba sine præ-
cognitione vigora & crisis morbi vñquam in-
stitui possit, vñque non alius quispiam medicus
recte curaverit, alius præfigit exactē: sed qui-
cunq̃ præstantissimus fuerit, is simul præfigit
quæ & medebitur. Porro si levis error quarto die
vñ cum bonis indicij cōtingerit, eveniet sanē
etiam die septimo crisis, non tamen exactē incul-
pabilis: sin magnus, vt a septimo in sequentium
aliquem differatur, magnitudo ipsius noxæ in-
dicabit, an nono vel vndecimo die, morbus sit
iudicandus. Itaq̃ morbi qui omnino sine peri-
culo sunt, diuturni esse ob delicta solent: qui in-
columitatem promittunt, nō tamen vacāt peri-
culis symptomatis, ob errata letales sunt. Imo
verō qui minimē existit periculosi, multis ma-
gnisq̃ deinceps cōmissis erroribus, in letalium
naturam degenerant: id quod mirum esse non
debet. Nam si in rectē valentibus delicta graui-
a, morborum letalium fiunt causæ, quid in ægro-
tis est expectandū? At verō si in letali morbo
dies quartus signum letale habuerit, septimo die
mala expectanda est crisis. Ceterum si peccatum
aliquod non o ita exiguum interea temporis ac-
cidat, septimum diem crisis nō expectat: sed si ac-
cessiones quidem ipse fiat diebus imparibus,
morbus autem sit peracutus, & peccata non ad-
modum levia in ipso quarto cōtingerint, mira-
culum nō est in quanto hominem interire. Sin au-
tem accessiones fiant paribus diebus, nec mor-
bus sit peracutus, nec magna læsio errorum, se-
xtum diem expectabit. Vbi verō diem mortis co-
gnoveris, considerandū est inde, in qua positi-
sum cuiusque accessiois parte æger grauetur
maximē, grauiorq̃ adsint symptomata. Quippe
non ignorandū est, in pessimo accessiois
tempore hominem moriturum. Ac proinde non
magis negoq̃ fuerit, vñ diem, sic etiam crisis ho-
ram prædicere. * Si igitur secundus dies (exem-
pli gratia) & quartus, longē vehemēniorem ac-
cessionem, quā primus, tertius & quintus, asse-
rant, ad sextum diem mors prædicenda est. Quod
si etiam cuiusq̃ accessiois pars (gratia exempli)
sit circa sextam horā gravissima, non fuerit di-
ficile præfigere, in die iudicationis, illa eadē ho-
ra hominem moriturum. Nam tametsi specula-
tione hac interdum falli possumus, maiori ratio-
ne ex parte hoc verum esse deprehendimus. Ceterū
in omni principio non licet futura cognos-
cere, nisi quis morbi speciem admaiusim per-
sprētum habet. Porro si quis primo die acuta fe-
bris infestetur, nullum autem ei adsit signum pe-
riculosum, sed in vñis aliqua cōcoctionis no-
ta apparuerit, intra quartum diem soluetur mor-
bus. Si verō multa letalia signa primo statim die
deprehendantur, æger intra quartum morietur.
At si acutē febriat: nullum verō adsit signū le-
tale, sed nec aliqua cōcoctionis nota, fieri nō po-
test, vt hic quartanus decedat. Quod si nec cōco-
ctionis, nec lōgitudinis morbi indicia adsuerint
in secundo quaternione morbus statim accipiet.

Septimo qua-
do crisis futura
sit.

Letalia signa
esse nunquā
cum cōcoctio-
nis signis.
Letalia signa
discernenda.
Duum paria
triū imparia
tem: ex parte
reperit.

Quartus natu-
ra sua est in-
dex septimi.

Erroribus circa
ægrum causis,
notatū de re
torij dies obis
pari.

Vicius ratio
proba sine præ-
cognitione vo-
ga & crisi
morbi, nunquā
infirma possit.

Morbi facili-
bus de delicta pro-
ducuntur, atq̃
interdum letali-
bus.

Moribus lega-
libus in prin-
cipio letali ac-
cessionis tempo-
re.

Horam crisi-
sē etiam præ-
dicere.

Si longitudinis indicia adfint, secundum quater-
nionem excedet, hoc est, die septimū: ex qua qui-
dem præcognitione, qualis debeat esse nutrien-
di modus, perdiscis. Siquidem quo longius ab-
fuerit status morbi, ac morbus ipse clementior
fuerit, eo nutries vberius. At morbi qui ad deci-
mum quartum omnino sunt crudi, tardiusq; mo-
uentur quodāmodo, nō sinuntur ante quadra-
gesimū diem. Quare signorum vires maxime co-
gnoscere oportet. Vt igitur quartus septimū, sic
vndecimus decimiquartū est index. At vigesimi
& vigesimiprimi, index est decimuseptimus: ma-
gis tamē vigesimi, vt decimoseptimus. Solius vi-
gesimiprimi. Cōsiderare aut in vniuersum oportet,
totius morbi morū, omniūq; indicia & sym-
ptomata, vt ritē crīsim præfigere valeamus.

GALENI PERGAMENI
de diebus decretoriis, lib. II.

Quanta sit providentia nature, quātus or-
do & ornatus in motionibus suis anima-
liū generationes, ortus, & incrementa in-
dicant. Siquidem cuiusq; animantis conceptus,
sūū tempus est statutū, natura scilicet ordiatur
semper motus seruante. Post partū enā anima-
ntia singula incrementū, perficiunt atq; fatiscūt,
idq; præfinitis temporibus. Cæterū si recorderis
quantopere providentia & ordine superetur ca-
dūca hæc. Atq; inferior natura, ab ætherea illa &
caelesti, vtiq; huius nostræ substantiæ motui non
ordinē, sed illius perturbationē tribuunt: necdū
quicquid in ea pulchrum ordinatūq; est & arti-
ficiosum, omne id ā superna illa natura omnino
emanare putabim: sicuti inordinatū omne & er-
raticum, ā nostra proficiat natura. Est autē na-
tura in nobis quedam res ordinata. Quæ quidē
vbi superari materia proportionis quibusdā
certis, ordinatisq; periodis, suas motiones perfici-
cit. At quæ aliquando præter rationē & veniunt,
ordinemq; cōfundunt, tunc ipsi obveniunt, cum
nō planē materia vicierit, sed impeditur ab ea,
prohibentq; moueri proportionib; suis. Si igitur
cæcites substantia, necdū quæ terrenis ani-
mantibus insunt, certa quodā proportione ma-
nifestē mouētur, nemini sanē debet videri mirū,
si decretoriū dies numerū ordinatum sortiantur.

Constat autē vniquāque septimanā esse perfectā
periodum. Quippe medium ipsius ab vtroq; ex-
tremo æqualiter distat, ob idq; ad ambo similem
cōmunionem foris. Et enim quartus dies mor-
bos qui primo die non cessauerunt, soluit: vndeci-
mus rursus, quos septimus nō dissolvit. Quod
si morbus maior sit, q; vt iudicari quarto die pos-
sit, solutio quidem ipsius in eodem. Præparabi-
tur, finis autem septimo die adicietur. Pari mo-
do qui septimo nō desierunt, eos natura solvere
vndecimo die molitur: quare aut in ipso eos iu-
dicat, aut decimo quarto disponit. Verū septima-
næ præcipuas sibi vendicant vires, dein quater-
niones. Nec negligere tamen oportet dies inter-
calares, tertium puta, quintum, sextum & nonū.
Porro si in vigesimo diem tres septimanæ finium
tur (vt Hippocrates arbitrat) oportet haud dubi-
e decimuseptimū diem esse vigesimū induci:
excidere autem ē primo dierum decretoriū

ordinē, decimoseptimū & vigesimū primum. At
si integræ hebdomades connumerandæ sint, de-
cimoseptimū vigesimiprimi erit index: rationē
verō nullam decretoriū habebunt, decimusep-
timus, & vigesimus dies. Cum autem nō solū
iudicari morbos decimoseptimo die, sed firmi-
ter iudicari & absq; residuo timore, proficatur
Hippocrates, sanē inter validos & primos decre-
torios debet annumerari. Quare si cōstituerimus
decimū quartū diem vt finem secunde, sic mi-
nium tertie septimanæ existere (quod Hippocra-
tes doctrinæ est consentiens) vtiq; decimusepti-
mus primi quaternionis in tertie septimanæ erit
finis, atq; index vigesimi, tertiam hebdomadam
terminanti. Quippe vigesimo die plures abso-
lutē fuisse factas morborū iudicationes, experien-
tia iudicat etiam Hippocrates: id quod naturam
decimiprimi satis abvnde cōprobat. Quin etiam
in permixtis aliis diebus, qui ex ordine decimi-
primi sunt post vigesimum, fuisse morbos inte-
grē ac feliciter iudicatos meminit: vt in vige-
simo quarto, vigesimo septimo, trigesimo quarto,
quadragesimo, & octogesimo: in nullo autē eo-
rum, qui ā decimoseptimo procedunt, facta su-
putatione per septimanas integras, tale quid cō-
gnisse prodidit: excepto vigesimoprimo, in quo
aliquando morbi facti sunt crīsis. Constat itaq;
decimiprimi ordinem altero longē fortiores
existere: ipsūq; decimuseptimū decimoseptimo
& vigesimū vigesimoprimo, quod pertinet
ad iudicandū vim, multis numeris antecellere.

Porro quantū vitæ morbi processerint, diu-
tiusq; evaserint, perturbatio quæ præcipi-
tem immutationem præcedit, tantū magis con-
quiescit: iudiciūq; ipsa tunc paulatim venientia,
duos aut tres dies in totum occupant. Vnde me-
dicorum nōnulli diuturnos morbos minimē iu-
dicari pronunciant. Quonq; certē nihil aliud esse
iudiciū, q; solutionē morbi, vel testimonio Dio-
scoridis, liquet. Non tamen putandum est, diuturno-
res morbos necessariō absq; vlla conspicua iudi-
canti excretionē: aut eorum crīsim plures semper
dies occupare. Aliquando siquidē morbi diutur-
ni fuerūt iudicari de vnicō, idq; per excretionē.
Differūt autē huiusmodi omnes inter se dies,
vni natura, vni vsu. Natura sanē, quia omni-
bus pulchre evenientibus ad quaternionis circūitus
iudicia omnino perveniūt: erratis autē quibusdā
diebus, in coincidentibus recidunt. Vsa verō, nam ad
fuerit crīsis cognitiōne quaternionis circūitus
sufficit. Cæterum ad iam factā crīsim iudicandā,
omnibus semper opus est cognitiō. Est autē iōge-
tior crīsis quæ nono die accidit, quā quæ o-
ctavo. Porro certitudo iudicii, ad bonā victus ra-
tionem iudicari morbo præsentendam condu-
cit. Prænotescere autem quando crīsis adveniat, ad
nondum iudicandū est necessarium. Dierum igitur
differēntias haud ignoras. Hippocrates, me-
ritō eorū tantū in prognosticis atq; apriorisimis
meminit, qui secūdum quaterniones inter se cō-
plicantur. At quippe in prognostico: Febres, si-
ue sanas ab iis quos evadat, siue pereat, æquali
dierum numero finiuntur. Verū vt saluberrime
febres, quæ videbēt tutissimis fulcuntur notis,
quæ quarto vel antea quiescere solent: ita pesti-

Decimus quar-
tus vt finis secun-
da, sic vniuersa
tertia septima-
na existit.
Vigesimo die
plures absoluti
fuisse saltem
morborum iu-
dicationes.

Decimuseptimi
ordinem, altero
quo quā decimosep-
timū se, longē fortiores
existere.

Crīsim nihil
aliud esse quā
solutionem
morbi.

Dierum decre-
toriorum differ-
rentia duplex.

Iudiciū in factis
& secūdis co-
gnitis, ad quod
conferat.

Hippocrati de
diebus decretoriis
sententia.

Nutriendi mor-
bus vnde colligi
possit.
Cibus vberior
est debet
quo longius ab-
fuerit status, et
morbus clementior
fuerit.

Decimus, septi-
mus est index
viginti & vni
gesimiprimi,
magis tamen
viginti.

Natura in sin-
gulis providen-
tia.

Naturam hæc
inferiorem ā
caelesti magni-
tudo superari,
ab eaq; quæ-
quid habet ho-
mo, superari.

Natura quid.

Septimanam
esse perfectam
periodum.

Septimam diē
absolvere quod
quarto non
potuit.

Intercalares
dies.
Vigesimū diem
esse finem tri-
septimanarū.
Decimum septi-
mum diem esse
viginti iudi-
cium.

mx queq; & quibus periculofissima signa ad-
 suat, die quarto, vel citius interficiunt. Primus
 itaq; eorum insultus sic finitur. Secundus quater-
 nio in septimū diem producit. Tertius in vn-
 decimū. Quartus in decimumquartū. Quintus
 in decimūseptimū. Sextus in vigesimū. In apho-
 rismis etiam sic am Septimorū quartus est index.
 Alterius septimanæ octauus ininū. Contempla-
 torius autē rursus vndecimus. Hic enim est quar-
 tus secundæ septimanæ. Cōtemplatorius iterū de-
 cimūseptimus. Hic enim quartus est à decimo-
 quarto, vt septimus ab vndecimo. At in primo
 Epidemion, omnū dierum mentionē fecit, sic di-
 cens: Est autē primus decretorius circuitus, qui
 paribus diebus decernit, quartus, sextus, deci-
 mus, decimūquartus, decimūoctauus, vige-
 simus, vigesimūquartus, vigesimūoctauus, trige-
 simus, trigessimūquartus, quadragessimus, sexa-
 gesimus, octogessimus, centesimus, centesimus vi-
 gesimus. Eorum quæ imparibus circuitibus iudi-
 cant, primus est tertius, dein quintus, septimus,
 nonus, vndecimus, decimūseptimus, vigesimus
 primus, vigesimūseptimus, trigessimus primus,
 Decretorius itaq; fortissimus omnū est dies se-
 ptimus: quē dies quartus prænnanciat, hæc duo
 habetis, vt & decretorius sit minor, & index se-
 ptimi. Deinde vndecimus & decimūquartus,
 eandem naturā & proportionē invicē cōferentes,
 quā cum septimo quartus. Post hos frequen-
 ter quidē decimūseptimus ad vigesimū, rarō au-
 tem decimūoctauus ad vigesimūprimū, eadem
 rationē habet, quā cum septimo quartus, & vn-
 decimus cum decimoquarto. Hi igitur quaterni
 o aucti, ad virginē perveniūt. Coincidit eis no-
 nus, quintus, & tertius. Ac plurimos quidem no-
 nus iudicat, secundam vim quintus obinet, &
 post hunc tertius. Sextus malus est decretorius.
 Decimūtertius omnū imbecillimus decretorio-
 rum, ceterum omnū qui nō decernunt fortissim-
 us, in medio quodā virtutis vtrorūq; est situs.
 Vehemētissimæ itaq; sunt crises, quæ ad decimū
 quartū diē veniūt: minus his, quæ ad vigesimū
 quātū pertingunt: inde ad quadragessimū produ-
 cte, adhuc imbecilliores evadunt, sed in illo ab-
 solutē excluduntur. Proportio autē dierum de-
 cretoriorū ppetuū servatur. Vt enim decimūquar-
 tus & secundæ septimanæ finis est, & tertie prin-
 cipium, ita trigessimūquartus quatuor terminus
 est simul, & sextæ ininū. Quare tres septimanæ
 viginti diebus semper describuntur: ideoq; sexa-
 gesimus, nō sexagesimūtertius, decretorius exis-
 tet. Pari modo octogessimus, & centesimus, &
 centesimus vigesimus. Respondebit ergo trige-
 simūquartus decimoquarto circuitus, cum ex
 duobus septimanis disiunctis fiat: & quadragesi-
 mus vigesimo, vt qui tertiam hebdomadam cō-
 iunctā expleat. Dicuntur autē minores circuitus
 illi, qui diebus quaternis fiunt. Secundas partes
 obinent, qui diebus septem cōpleantur. Hos ac-
 cedunt qui septimanis duabus constant, licet im-
 perfecti quodammodo. Omnium perfectissimi
 sunt, qui ex trinis septimanis constant. Morbi
 ramen ipsi, partim quidem diebus, partim men-
 sibus, partim annis fortissur suas iudicationes.
 Atq; in horū singulis, differentie quedam parti-

culares existunt. Proponatur igitur adolefcē va-
 lido morbo correptus, qui in primo quaternio-
 ne sit discutiendus, in eo certe est aphorismus il-
 le imitandus: Vbi morbus est peracutus, statim
 etiā extremi dolores adfunt, remissimōq; victu
 est vitendum. Quare nihil ei alimēti exhibueris:
 imō etiā ab aqua, quantum potest, ipsum abstinere
 iubeto. Si vero septimo die crifim sit habiturus,
 paululū hāc victus rationē immuta, vel mulsam
 ei exhibens, vel aliā quamplū potione morbi na-
 turæ familiarē. Quōd si pger facile dissoluatur in
 edia, eiūsq; offendatur vētriculus, prisanæ cremo-
 rē exactē percolatū quotidie modicē, ppinabis,
 memor illius præcepti. Sed aliquid tum cōsuetu-
 dinis grana, tum ne vasorū magna fiat inanitas,
 ingerere oportet. At si iam septimus dies inisset,
 nequaquā regnū nutrire cōvenit, sed pridie, vel ante-
 tea, minus est exhibendum. Rursus, si tertio vel
 quarto die morbū finitū in spes adit, nec mali-
 gnitatē stomachi, nec fulpiteris inanitionē habi-
 tus, ipsēq; etiā pger validissimis virib. sit faciliq;
 longi inedia toleret, nec morbus aut oxymeli,
 aut mulsam requirat, is certe ad septimū vīq; diē
 à cibis poterit abstinere. Quōd si ad tertium vel
 quartū quaternionē crifis futura videatur, nō ita
 abstinere poterit, nec sola potione servari. At ve-
 rō peracutus morbus vocatur, qui rārū ad septi-
 mū vīq; diē extenditur. Qui lōgus procedit, sim-
 pliciter acutus. Ceterū exactē peracutus in est, q;
 vīq; ad diē quartum progreditur: nō exactē, qui
 ad septimū vīq; producit. Similiter qui vīq; ad
 decimūquartū extenditur, exactē acutus vocatur:
 nō exactē verō, q; durat vīq; ad vigesimū: quā-
 tiū est & ipse etiā acutus. Est & aliud morborū ge-
 nus, ad quadragessimū vīq; diē pveniens, qd ab
 acuto nō integrē iudicaro ducit originē. Nōnuli
 præterea statim ab initio tanquā prohibiti, ad
 quadragessimū pducūtur: quorū duplex natu-
 ra est. Aut enim remissionis paroxysmorū in ex-
 actā integratē desinunt, aut semper cōtinua fe-
 bris perdurat. Noui enī cōplures ad quadragesi-
 mum vīq; diē cōtinua febre cōstictatos esse: ec-
 nim voco illā, quæ nunq; remittit: de quib. sermo
 nem videtur fecisse Hippocrates in prognostico,
 vbi ait: Exultare autem oportet, q; facili spiratio
 in omnib. acutis morbis, quibus febris copu-
 latur, quip; intra quadraginta dies iudicantur,
 magnum ad salutem habet momentum. Atque
 hoc sanē vltimū prædictū genus, acutum ex
 decidenna vocari debet. Nullus autem morbus
 à primo acutus in vigesimū diem illabitur, qui
 nō prius iudicium expertus sit. Qui verō ab in-
 initio submersi lentius apparent, & inde ad quadra-
 gesimum perueverant tales, sed rursus intendi vi-
 dentur, hos iure diuturnos appellaveris.

GALENI PERGAMENI de diebus decretoriis, lib. III.

Igitur non omnes dies de morbis decernere,
 experimento cōstat: sicvū & q; septimani cir-
 cuitus & validissima sunt virtute præditi: post
 hos quaternarij, quidam vero extra hos coinci-
 dant. Imō quōd nec omnes septimanæ in vicem
 separentur, sed aliquæ ipsarum etiā cōiungan-
 tur: nec omnes quaternarij, sed horum aliqui

Curatio adole-
 scenti valde
 morbo carce-
 phi.

Constatidini
 esse aliquod cō-
 donam lam.

Peracutus est
 morbus qui
 tantum ad se-
 ptimū vīq;
 extenditur.
 Peracutus ex-
 actū morbi
 quai.

Morbos qui
 ad quadragesi-
 mū vīq; perve-
 niunt diem ha-
 bent duplex.
 Cōtinua febris
 decernit quæ nō
 quam remittit.
 Sprato facili
 in quibus acu-
 tu morbus ad
 salutē magnū
 habet momen-
 tum.

Acutus ex
 decidenna morbi
 bi qui.

Septimus est
 omnium de-
 cretorum for-
 tissimus.

Quarto dicitur
 quia adfuit.

Coincidens
 dicitur.

Sextus malus
 est decretorius.
 Decimus ter-
 tius dicitur me-
 dio decretorio-
 rum in cymena-
 tum consistit.

Decretorius
 dicitur semper
 proportionem
 servare.

Circuitus mi-
 norum qui.

*Acu in morbo
impetum ducunt
numeros, lingua
per soluta
admiratur.*

*Inferiora hoc
omnia recipere
ornamentum
a superioribus,
Sol autem tripa-
ram animalia
etiam gignit.*

*Luna opera in
se effluat in
feriora.*

*Luna mensis
atque dies non
disiungit.*

*Non lunium
quando fiat,
Lunam quādo
desinit lunem.*

*Lunam a sola
recessu sua om-
nes mutationes
recipere.*

*Lunares for-
mae.*

*Luna opera in
males terra, quā
ipsa est plena.*

*Luna ei quā
sub lumine in-
fusus immorari
in dantur for-
mae, pallorē,
et capiti gra-
uitatem con-
ducit.*

*Luna Solu au-
tūno erit.*

*Sol veluti rex
quāvis ma-
iorem est.*

*Luna ei velu-
ti princeps in-
ter solē atque
noctem.*

*Mutationem
quā a familia
re luna pro-
ficiatur diffi-
cilius a multi-
plici.*

separentur, aliqui cōiunguntur. Insuper, quod acu-
ti morbis impari diērum numero, longis pari, iu-
dicia omnino accidunt. Porro causas horū ratio-
ne nobis indagantibus, duo prima omnium quae
sunt primordiale esse statuendū videtur: inordi-
natum videlicet, quod ex hac mūdī materie pro-
ficiuntur: ordine verō omnium procedē, quod
caelestibus originē fert acceptū. Omnia siquidē
haec inferiora ab illis veniunt & ornamentum
suscipiunt. Fruimur namque superiorum omnium,
astrorū virtute. Verū Sol maxime hunc orbē ex-
ornat, & cōtinē disponit. Quippe veris, citatis,
autumni, & hyemis autor nemo alius extat: nec
alius tam manifestū vel ex terrae frigē animalia
gignere potest, vel maturare fruges, vel ad costū
& generis propagationē animalia incitare. Ma-
gna sanē & Lunae opera in hac rerū substantia ap-
parent, verū Solis effectibus inferiora. Etenim
mensēs hīc perpetuū, atque omnes eius dies dispo-
nit, idēq; evidenter adeo in marinis belluis: quan-
& hoc ipsum Solis beneficio debet. Nouū enim
lumen sortitur, cū Sole primū fruatur: itaque
semper eius portio illuciscit, quātam Sol aspicit.
Propterea autē deficit, lucidūq; expers redditur, vbi
terra suo intervētu ipsam obtinebrat. Quapro-
pter autē Solis recessu omnes sustinet mutationes.
Etenim plena est, cū diametra apparet. Aequa
portione diuisa, cū ei ad quadrangula. Gibbosa,
cū triūgula. Falcata speciei refert, sexangularis.
Ac tū primū recens est, cū post Solis congressū
ostenditur. Obscuratur omnino, cū sub ipso
Sole coruscat. Ignitur fructus auget, incrementūq;
animantia implet, mēstruorū statū tempus cō-
feruat mulieribus: comitabilitē circuitus gignit,
quatenus Solus plus, vel minus participat. Om-
nia siquidē quod facere nata est, vbi falsis figuram
repraesentat, languida sunt: in valefcent, cū pla-
na fuerit. Quapropter & fruges interea adauget
& maturat celerrimē: ferarū occidit corpora in ta-
bem visū suo resoluit: somnōq; sopitis sub eius
lumine, vel alter immoratis duntius, pallorē, &
capitis grauitatē cōducit. Ceterū vt Luna Solis
auxilio in omnibus indiget, ita Sol nihil vel ma-
ximū alterius cuiusdā astra, vel ipsius Lunae opem
desiderat. A nullo enim impeditur, quo minus
virescat faciat, cū in vertice nostro cōstitit: aut
frigus adducat, si humilis eius cursus fuerit: aut
aquinocitiū vtrūq; cōstituat: cū modicē obli-
quus videtur. Sed ipse veluti rex quispiam maxi-
mus est: Luna vero, vt princeps nō medio cris in
ter illū & nos medius cōstituitur, merito terre-
stem hanc regionē gubernat: nō potentia exte-
riorū planetarū, sed vnicitate exuperans. Porro ve-
liementiores mutationes eveniūt, vbi ipsa cum
Sole cont: dein autem, in apparitionibus plenitū-
tij: minores hīs cōtingunt, dum medio orbe ap-
paret: obscurē, dum curuata in cornua, & falcata
videtur. Etenim diametra Lunae statio, ceu di-
stinguentis dispensationē, maximē cōtrarias ipsius
Lunae dispositiones (maximē enim Lunae incre-
mentū, eiusdem immutationi aduersatur) eā
omniū est validissima. Deū vero dug dispositio-
nes duchoroni, in quibus Luna per mediū vide-
tur secta, vtrāque ipsius differentiam, dico au-
gmentū & decrementū, ad aequilibrium fecant:

prior quidem augmentū, decrementū secundā.
At omniū extremē obscurissimūq; aeris nos am-
bientis permutationes in falcatis, in curuatis ap-
parationibus sunt: magis autē, in ipso incuruis.
Iam vero plenitudines Lunae, celeritatis muta-
tiones efficiunt: novilunium verō, inaequale, diu-
turnūq;. Nam quid ante Lunam apparentē in-
nifestē pronūciēs, nō est. Longam autē hoc tem-
pus occultationis est, integrē ferē signū cursum
explens. At mutationē ex incrementō ad immi-
nutionē, punctum ex se distinguit: quod pun-
ctum a Luna quasi momento absoluitur. Quo-
breues plenilunij cōiunctiones existunt, dia-
turnae cōiunctiones ales. Tuta igitur crisis eva-
det, quid in toto mense stans secūdo die fiet,
quo primo & manifesto Luna, & longo satis ve-
pore super terrā iam apparet, & lumen sensibile
de se mittit, ad haec vmbrae evidenter ostendit.
Primus autē dies radiū Lunae supra terrā vagan-
tem habet, quādiū adhuc Solis etiā lumen post
occusum retinet. Quare in hoc Luna simul cum
Sole occidit: subinde verō & prior est occidua, &
secunda die prius elucescit: nunc minus, nūc ma-
gis apparet. Atq; hoc ei accidit longitudine a So-
le recessu. Plenūq; autē Luna triūdo in coitu So-
lis morata, planē invisibilis est: quo nōdum haec
terrena imutare potest. Cuius circuitus vice-
nis diebus septemsiq;, & terna ferē diei parte per-
agitur. In tan to enim tempore totū signiferi cir-
culum percurrit. At quod is circuitus, quo nobis
lucet, eidē quoque numero cōveniat, perspicue
intelliges, si occultationis tempus ex toto men-
struo tempore eximas. Quod autē mēstruū tē-
pus nō omnino triginta diebus constat, sed etiā
vnius diei ferē dimidio: quodq; mēstrum a-
lius quasi mutū & imperfectū, dies vigin-
tio enim sortitur: alius verō, nepe absolutus, trigin-
ta, liquidd constat. Quem admodū igitur annū
integrū Sol absoluit, ita Luna mensem, immuta-
tione per septimanas ei accidente. Nam vtrūq;
tempus, & quo post primā apparitionē in mediū
orbem accersit, & quo inde plenū efficit, septem
diebus absoluitur, ambo quaruordecim. Simili
modo, si inde, cū aequali portione est diuisa, ad
secundam diuisionē eiusmodi rationē subduxe-
ris, & hos dies, reliquosque, cū planē ab oculis
Luna declinata est, septē inuenies. Quod autem
aeris nō cōstitans, maximas mutationes sortia-
tur, dum Luna primū occultatur, ac dein rursus
se ostendit, nemo mortalitū ignorat. Itaq; mensem
a Luna immolari secundū septimanas, ac proin-
de cetera omnia, admodū est perspicuum. Iam ve-
rō quae omnib. substantiis accidunt, horum
causam Luna habere obseruata est, maximē in te-
tragonis & diametris stationibus ea immutatur.
Nam si Luna in rastro existente semen concepit
fuerit, vel etiā partus cōtigerit, magnas eius mu-
tationes inueniam, cū in leone, scorpio, & aqua-
rio signiferū ambet. Verū in leone tetragonos se-
primanarū vnius existit in scorpio diametra duas
septimanarū habet. Itaque quo in aquario, secunda
quadrangulans statio necessārio in tertiā se-
ptimanam procedit: quod Luna vicenis diebus,
septenisq;, & particula quadam adiecta, maximē
tertia diei parte, vniuersū signiferi ambitum
peragat.

*Luna oculis
tuo tempore
quā longum
est.*

*Plenilunij con-
iunctiones bre-
ues existunt, di-
urna a comā
stionalis.*

*Crisis tuta quā
de accidat.*

*Luna circuitus
viginis septem
diebus ex ter-
tia feri diei
parte peragitur.*

*Mensem non om-
nino constat
triginta dieb.*

*Sol annum
absoluit.*

*Mensem a luna
immolari per
septimanas, vt
alia omnia.*

*Luna motū esse
causam animi
permutationū,
quā in corpori-
bus accidit.*

Luna indicere
placem aut in-
feliciam progre-
ssum exiit, ut
male agat, sed
sanu sita pas-
se.

Circulus dis-
cretoria.

Diuturnorum
morborum in-
dicationem con-
sistunt tem-
poris, ut autem.

peragat. Nec verò ægris tantum luna, sed etiã sa-
nis, dies quales tandem futuri sint, prænuñciare po-
test. Etenim Luna, si planetas salutaris ac rēpera-
tos aspexerit, faustus ac bonos, pducet dies: mo-
lestos autē, si imtemporatos. Ad hæc, alterationes
magnas, quas in tetragonis & diametris perfe-
ctissimas fieri diximus, in letalibus quidē mor-
bis, letales & ipsas in salubribus, bonas evenire
est necesse. Luna igitur tetragonæ, diametralis
stationes, in principis bonis, bonas faciunt alte-
rationes: in malis, malas. Circuli autē alij nu-
mero quoddā dierū consistit, alij mensibus. Cete-
rum qui diebus cōstant, septimani sunt, & Lunæ
modo incedit. Qui mensibus, ad Solē referuntur,
eodem modo eveniunt. Ac sic illud intelligen-
dum est, qd ait Hippoc. æstivos morbos hyeme,
hyemales æstate solui. Hoc enim diuturnorū an-
nalinum ve morborū indicationis tempus statum
est, quæ admodū auctoris decemulquarum. Cum
enim à mensis principio ad viginti plenilunij tem-
pus, totus lunaris circuitus dimidiū exstat, ean-
dem rationē habet cum intervallo, qd ab hyeme
ad æstatē viginti intercidit. Quin etiam plenilunio
ad occultationē tempus, spacio qd ab æstate ad
hyemē viginti porrigitur, proportionē respōdet. Sed
horū utroq; bifariū sectio, in acutis morbis est se-
ptimana diuturnus, clausuram syderum exor-
tus: quorū ratione ver, æstas, hyems, & autum-
nus, describuntur. Quem admodū autē septimana
acutiorū morborū est decretoria, sic temporis an-
nui mutatio, diuturnos morbos discunt. Vt hye-
me qdem cōstitutum morbi ver dissolvatur in ve-
re cōstatum, æstas. Simili ratione per statum cō-
tractum, autūnus: in hoc paratū, hyems. Ceterū
anni tempora singulis partib. bifariū divisa, me-
sis quaternariis, proportionē respōdent. Ea quæ
admodum anni temporis cuiusq; & unum & si-
nus, syderum manifestorum ortu & occasu descri-
bitur: ita etiā medicis singulis, alterius rursus sy-
deris exortu distinguunt. Itaq; vniuersas particu-
lares morborū mutationes, vel tanq; ad propriū
ipsorū principij, vel ambiētis hos aëris con-
versionē, evenire est necesse. Qui igitur ex proprio
principio mutatur, Lunā sequuntur qui verò ceu
ab aëre nobis circumsilio immutatur, in toto qui
dem anno, Solem in singulis mensibus, Lunam.
Hinc iam accidit, mutationes validissimas esse,
quæ utq; per septimanos dies propriè cōtingūt:
quis ipsis ferè cōmiserit, quas aër excitat. Atq;
in acutis quidem morbis coincidentē decretoriū
sunt plures: quoniam & corpus mutationi accō-
modum, in motu & perturbatione vehementi cō-
stitutum est: in longioribus, via & ordine magis
septimariū circuitus procedit. Principij igitur
dierū qui acutē decernunt, & cum quadā pertur-
batione morbos immutāt, tertij diē ab ipso prin-
cipio statuerē oportet: quippe qui nullā sã cum
prima septimana cōmunionē habeat, sed ex cō-
incidentib. sit. Jani verò perturbationis violentia,
naturā ea quæ molestant, etiā ante tempus prop-
ulsare cōpeltit: id quod aliquo nervi factura
insultu aut cōtione perfectā: qua, interdum iā
absoluta, sæpius tardā solet, propter facultatis
(que aliena exernit, & crises in morbis efficit)
infirmatē. Fuit itaq; iudicationes optimæ, cum

id omnia in animantis corpore fuerint accipere
eodem. Periculosam autē est, si quando ipsa cri-
sis præveniat. Nam idonea simul cum iis que le-
dunt, excedunt: id qd sit natura incitata, vel ab
exteriore quodam, vel ab iis quæ in ipso corpore
detinentur. Atq; vnum qdem ex illis que naturā
stimulant, & veluti provocant, accessio est, nullā
quidem, nec moram cōcedens, verum incitans,
mouensq; & ceu pugna indicēs. Unde acutiorum
morborum in diebus imparibus iudicium con-
tingit. In his enim & accessiones sunt. Nā secun-
da accessio ab initio ad tertium diem delabatur,
tertia ad quintum, quarta ad septimum, quinta
ad nonum, omnes deniq; in imparibus fiunt. At
die ipsi primarij decernendi virtutē nō habent,
sed per accidēs id cōsequuntur: quod videlicet in ac-
cessionib. iudicentur morbi, illi autē in dies im-
pares incident. Neg enim septimi, vel quarti nu-
merus, crisis est auctor. sed quid Luna innouat,
et, et terra immutante, motu quoq; circuitus
ad hos principis numeros venire cōtingit, me-
rito in ipsis tanq; ita alterationum tempora in-
veniuntur. Quippe mutationes nō numeri, sed
Lunæ terrena debent. At cum iudicium mutat in
motu cōsistat, tempus mutationis, necessariū cō-
iunctū est: quare necessariū & numerus. Luna i-
taq; omnia terrena immutat, atq; in septimanis
præcipue magnas mutationes inducit: dein autē
parvas in quaternariis. Porro tertius & quin-
tus dies decernant, non ex lunari circuitu talem
facultatē sortiti, sed quod tertius violenta acce-
ssione crisi quarto die futuram prævertat: nara
autem quarto die defatigata, minimeq; irrita
conquiescat, ac postea in quinto ad iudicium
mouetur. Jam verò & nonus, inter duos decre-
torios septimum & vndecimū medius, vel nō fa-
ctum in septimo die iudicium, vel vndecimo fu-
torum: ipse sibi viderat: at rariis quidem septi-
mi, sæpius vndecimi assunt crisi. Porro in diu-
tioribus morbis, vñ accessiones vehementia, sic nu-
merus coincidentū dierū minuitur. In omnibus
autem ferè diē. peracutos morbos iudicari con-
tingit, quoniam vltimus decretorius ipsorum est
septimus: & ante hunc nō quartus morbus, sed ter-
tius, quintus & sextus aliquando decernunt. At
peracuti omnes morbi vel cōtinuum febrem, vñ
autoremq; à principio vñq; ad crisi sibi habet
conuicem: vel autē, quæ crisi morbi citius habet de-
clinant operē & accessiones, nō tamen tertio quo-
que diē manifestas rationes habet, verum in ipso
rursus quoq; dierum mediis, quem admodū & se-
miserantia. Proinde prima peracutorū differe-
tia, vñ ita qua dā accessio est. Quam obrem
nihil (quantum ad accessione emperunt) im-
pares partibus præstant, cum febris singulis diebus
æqualis exstat. At in altera differentia, cū quidē
dem veluti ad septimum diem festinat, & secun-
dum ipsius rationem in eodem finiturs est. me-
dijs verò accessiones magnitudo, naturā ante suā
tempus venire ad crisi compellat, vel si extrin-
secus aliquid eueniens ipsam irriter, crisi hūd-
dubie sexto die præterunt. Etenim in secun-
do die natura aliquo modo est valida: item in
quarto magis quam in sexto: sed nondum in cer-
tamen venire audeat: in sexto autem accessio

Crisis optima
quid sit.

Accessio morbi
naturam con-
uertit.

Anterior mor-
borum iudicia
in diebus impa-
ribus sua, quæ
crisis sunt.

Diebus prima-
rijs, sed ex ac-
cessione decernit.

Diebus tertius &
quintus qua ra-
tione decernit.

Noni diei facit
Lun.

Peracutos mor-
bos, quorū vlti-
mus decretori-
us est septimus
in cōtinuo fe-
bre diebus iuda-
cari cōtingit.

Peracutiorum
morborum ip-
sorum differe-
tia.

Aliaque

Mutationes
validissimæ
sepe a tempore
septimani de-
ci propriè con-
stant.

Tertius diem ef-
fic principij de-
cretoriū dicitur.

Externi car-
nis etiam
interdum lan-
guis, quam o-
portet a natu-
ra expellitur.
Expulsi sunt
crisis in morbis
facere.

vehementia frequenter eam ad certamen provocat: quare vel in eo deiciatur prius, quā quæ inest acriter excreuerit, exinguitur: vel eorum magnā partē propulsa: reliquā verò adhuc nō potest sed imbecilla & defangara prorsus cadit, & victa iacet. Deinde si postero tempore recreari ac refici possit, morbus paulatim concoquit. At si morbi reliquæ robore illius maiores sint, tandū eger superviuer, quā diu natura sufficere poterit morietur tamen postea. Decernit autem vigesimus, & vigesimus primus, sed multo magis vigesimus: quoniam huiusmodi morbus duraturnus iam est, & paribus diebus accessiones habet: dein, quia septimana nō integris septem diebus constat. Etenim vni annus ad trecentos sexagintaquing. dies particulam diei maiorē quarta adiectam habet: ac mensis ad triginta dies absolvendos, vnius di midium desiderat: sic & septimana, sexta maximē diei parte, ut septē integros habeat, indiget. Quā obrem tres septimane nō vni & viginti diebus integros, sed minus ferē vnius tota dimidia parte consequuntur. Ob quod etiā, numerū huiusmodi nō magis viginti, quā vni & viginti diebus vicinum, vtriusq. pāssim cōvenire videas. Quoniam igitur vigesimus exactē periodum propinquū sibi vendicat, tales iam morbi inveterascūt, & accessiones paribus diebus accipiūt. Quorū autē accessiones in imparibus. accidit, horū & iudicia ad vigesimū primū delabūtur. Non solū autē Lunæ circuitus, sed mensū etiam tempus apparitionis, virtutē quandā in nos possidet. Quod quidem tēpus, septē & viginti dies propemodū necessariō cōtinet: idēq. septimana eius minor ad huc prius dicta merito evadit. Sine em̄ a triginta, tres illos coinoctio dies, in quibus nihil de aere decernitur, pāssim cogites, siue & viginti novē cum dimidio, reliquū tempus, quo Luna manifestum de se ipsum præbet, priore modo septē & viginti dies, altero viginifex & dimidiū habebit. Cum ergo apparitionis manifestē efficacitē tēpus sit dies vigesimifex & dimidiū: significari verò circuitus explantē viginifex dies cum tertia vnius parte, liquet medium ipsorū fore vigesimum sextū diem, ad hęc dimidiū, & tertiā maximē & duodecimū vnius diei partē. Horū itaq. nihil supputari potest per dies integros: extra frācturam, nec septimana, nec quaterntio, nec mensis, nec annus, nec aliud quicquid omnīq. Quoniam verò inter septimane ipsas duæ solū primæ separantur, tertia copulatur: perspicuū est quaterniones quoq. nōnullos necessariō cōiungi, alios separari. Itaq. secundū tertio & primo coniunguntur, quod vnius septimane primæ bīstridivise particula utroq. sit. Tertius a secundo disjungitur, quoniam & septimana secunda a priore distincta est. Tertius autē quarto copulatur, quoniam secunda septimane utroq. particula est. Hic itaq. rursus quartus propter tertiā septimanā secundū cōiunctū, quinto copulabitur. Adtingetur etiā sextus quaterntio quinto, in decimo septimo die, tēquā tertiā septimane pars utroq. existens. Porro salutaris nōnulli medici, omnē morbus breuem esse acutū existimantes: sic ut & omnē tardū, dururnū. Si quidē omnī acutus (qui ex morus celeritate hunc in modū vocatur) planē exigui est tē-

poris: & omnis dururnus, necessariō tardus. Nō tamen si brevis temporis sit, acutus statim fuerit (cū multæ ephemeræ lōgē duravissimæ sint, omnīq. periculo vacent) nec si tardus, longi tēporis.

GALENI PERGAMENI de crisibus, lib. I.

Tempus morbi temporis sunt quatuor in vniuersum: principium videlicet, augmentum, status, & declinatio. Quædam verò ægritudines ob earum malignitatem, atq. ægritantis imbecillitatem, in ipso statim augmentum tempore liominem iugulant: sicuti & quædam aliæ in vigore. Desinunt autē ea tempora minimē diu numero. Porro an ipse morbus augeatur, non ex eo tantum cōstitutur oportet, quod accessiones anticipent (sæpe enim talis anticipatio, morbi proprietatē consequitur, potius quā incrementum, cūm & quartanæ, & tertianæ, & quonidianæ febres quidam circuitus vix ad integrā solutionē ira anticipare sint visæ) sed quod etiā longiores & maligniores existit: id quod similiter est in intermissione & declinatione considerandū. Voco enim intermissionē, quādo febris in quietem desinit: declinationē, quānnē eius partem, quæ vigorem ipsū subsequitur, vix ad secundā accessiois principium. Etenim si accessio (exempli gratia) consue tam anticipet horam, longior etiam fiat, & vehementior, maligniorq., & cū multis præviis symptomatis accidat: ad hæc, ipsū declinationis tēpus fiat breve, nec omnino facile, nec a symptomatum accessiois omnino exars, la certē morbus ad magnitudinem crescit. Si verò accessiois initium tardet, longitudo autem eius ac magnitudo minor existat, cessetq. etiā malignitas, necnon intermisso vel declinatio sit facilis tolerari, longiuscula, omnīq. accessiois delens a symptomata, haud dubiē declinationis morbi hæc fuerint aperta indicia. Vbi verò quæ ad accessiones duas pertinent, æqualia fuerint, morbum demonstrant cōsistere. Quare Hippocrates ait, ad morbi incrementū noscendum, esse accessiones invicē confendas. Iam verò sæpe quidē in morbis nullum reperitur inflexio ipsius vigoris tēpus: sed habent adhuc quarta (si ira cōtingit) accessioe indicia augmenti, quinta super veniet accessio, & declinationis habens principium. Simile quiddam accidit in morborū augmentis. Nam sæpe prior accessio principii simul habuit, ascensumq. & vigore: dein secunda videtur manifestē declinare. Generosi autē medici est munus, futurum statū prognoscere, cū omnē victus rationē ad ipsum inspicere instituat. Eadē ratione principii itaq. augmentū morbi, nō vbi iam perfecta sunt, sed multo antea præstare cognoscere. At accessiones & constitutiones (quemadmodū inquit Hippoc.) morbi indicant & anni temporis, & circuitū successus incrementa, siue quoniam die, siue alternis diebus, siue in longioris temporis spatio. Præterea si in laterali morbo spiritum statim appareat, incipientē morbus facit breuiorē, si ferè posterius, longiorē. Porro quæ propria sunt morbi accidentia, simul cum morbo invadunt, incipiūtq. reliqua verò omnia mox apparent,

Vigesimus morbi
decernit magis
quam vigesimus
maioris.

Annus.

Mensis.
Septimana.

Vigesimus dies
quod morbus in
dies.

Apparitionis
tempus
quantum.

Quaterntio
qui separatur.
Et qui morbi
intermittuntur.

Annus morbi
omni sunt tempus
exigui, magis
autem omnes
breves morbi
continui existunt
acuti.

Tempus totius
morbi sunt quatuor.

Tempus morbi
non desinunt
diu numero.
Anticipatio accessiois
non semper morbi
incrementum
arguit.
Incrementum
morbi vnde est
intermittit.

Intermissio.
Declinatio.

Morbi crescentia
ad magnitudinem
ducunt.

Declinationis
morbi argumenta.

Morbi viginti
inducunt.

Status morbi
docet qualis est
quantitas vni
ratio esse de
beat.

*Placitum pro
pna symptomata*

*Sputum nihil,
quoniam est cr-
dum plerumque
Sputum non bonum,
duplex.*

*Sputum conco-
ctum, morbum
facit breuius,
Sputum prae-
malignum,
periculum atq;
periculum indi-
cat.*

*Expurcationes
quae periculis
erisunt,
Sputum facile,
bonum.*

*Vrina nigra,
pericula ut spu-
tum nigrum,
morbum pra-
nunciat.*

*Principium fi-
candum lati-
tudinem conti-
neri in prima
accessione.*

Vrina bona

Vrina bona

Vrina bona

Vrina bona

Vrina bona

Vrina bona

Vrina bona

Vrina bona

Vrina bona

Vrina bona

ret. Inuadunt igitur vna cum laterali morbo febris acuta, latens dolor pugnati simili, tussis, & difficilis respiratio. Mox autem apparet quaedam, ut ipsi morbo, propria nonnulla, ut communia omnibus febri crant. Propria sane ipsius morbi, primum quidem, si nihil cum sputo educatur: quod sufficiens crudi morbi est indicium. Secundo autem, si educatur quidem, sed non bonum. Est autem hoc duplex: vnum quidem, quod solum caret coctione: alterum vero, quod etiam prauum exiit. Ab his omnibus, id quod coctum est, separatur, quod etiam proprie sputum appellatur. Si igitur hoc statim appareat, morbum facit breuiorem: cum vero nullo modo educitur, aut crudum, longitudo morbi ostenditur. Si quod autem prauum expulitur, periculum imminere significat: mortem vero, si prorsus malignum fuerit. At quae proprie expurcationes vocantur, ex his, quae cumq; subleuatur, & subruatur, & subpallescat, & subplurimum sit, & tenues exiunt, sola cruditate significant: nulla vero insignis mali praenunciatur. Quae vero sine alia coctione sunt flauae, rufae, crassae, spumosae, viridae, viscoxae, rotundae, atque his etiam magis nigrae, sunt perniciosae. Praeterea facilitas expurcationis, bona est: ut difficultas, mala. Id pulchre in prognosticis docuit Hippocrates, dicens: Sputum oportet in omnibus doloribus, qui pulmonem & latera infestant, celeriter expui ac facile, coctumque vehementer videri statim sputo. Eadem autem & in vritis, & in alui excrementis facienda distinetur, quia in ipsis sputa fecimus. Si quidem nonnulla eorum, coctionis sunt signa: nonnulla vero cruditas: quaedam mortis indicia exiunt. Etenim ut nigrum sputum, praeter id quod crudum est, etiam mortem portendit: sic & vrina nigra, non cruda solius, sed etiam letalis exiit. Est autem simpliciter crudum, quod album est ac tenue: quod aquosum vocamus. Porro quoties de principio morbi fecit morboem Hippocrates, non de indubitabili illo primae accessionis insultu, in quo nihil possumus obseruare, sed de alio quodam principio, quod sensibile habet latitudinem, nobis summentis exposuit. At vero principium secundum latitudinem, communis quaedam imaginatione, absque vilo artificio, continetur in prima accessione. Atque idcirco quaedam statim cum incipiunt, statim accessisse dicuntur, quemadmodum in primo Epidemiarum, ubi ait idem Hippoc. Statim enim continua est, quae incipit florescit ac viget. Nam verbum illud, incipit, non dicitur hoc loco de vero morbi tempore, sed de eo quod subsequitur exquisitum principium, quod ut plurimum ad terminum debet extenditur. Cuiusvis itaque partis in peribituras, cum quae illi inest dispositione ostendit: si cocta quidem fuerit, salubriter cruda autem, agram. Alui excrementa (Hippocrate auctore) optima sunt quae molliora & coherrentia exiunt: & quae eandem exitus horum seruatur, quia in sanitatem habuerunt. Quis itaque vero esse debet pro ratione et cibi, qui assumitur. Nam si excrementa talia fuerint, ventrem inferiorem sanescere indicant. Et sputum quoque cum fuerit exquisitissime simile illi quod sanis aduenit, integritate instrumentorum respiratorum in significat. Si quo modo autem et naturalis modum recesserit, tantummodo ita esse demonstratur, quod tantum ipsam formam naturalem amisit. Quod vero illi

quod secundum naturam est, maxime contrarium videtur, existit crudum, magnamque patientium mentem imbecillitatem in ducat. Quod vitiosae causae aliquod signum habuerit, quaedam modum nigri, est perniciosum. Ita etiam in vritis res habet. Nam & hic, quae sanis similes sunt, venosum instrumentorum genus satis robustum esse indicat. Quae vero crudiores sunt, eiusdem imbecillitatem significant. Rursus quae maxime sunt sanis contrariae, haec quidem omnino sunt crudae, & maximam vniuersi venosum imbecillitatem declarat. Quae cumque vero & superantis causae prauitate ostendunt, veluti nigrae, haec sunt penitus exinales. Haec itaque tria signorum genera, singula quaeque coctionis praebent indicium: vrina quidem, eius quae fit in venis: deiectiones autem, eius quae in ventre: sputa vero, eius quae in respirandi instrumentis. Sanguis autem profluens a nobis, sudores, & tumores qui iuxta aures sunt, reliquique deluxus, si in tempore quidem fiat oportuno, prodesse possunt: interpetia autem, nihil iuuat. Non sunt autem eadem decretoria, & quae coctionis indicia dicuntur. Si quidem fieri non potest, cum ista omnino vel bene, vel male habeat. At coctionis signa, saltem quod hominis: non tam per crism omnino, futurum uobis ostendunt. Porro in febribus, vniuersis, quoniam venosus generis sunt passionis (nam & artenas in hoc genere comprehendimus) ad vrinam praecipue attendere oportet. In his autem qui laterali morbo afficiuntur, primum quidem sputa, secundo loco vrinam: quoniam ista morbus omnino cum febribus, iungitur. Ut in passionibus, ventris, si sine febre fuerint, sola excrementa inspicere oportet: si autem cum febre, etiam vrinam. Proprium igitur vniuersumque morbi principium, coctionis signis determinatur: potestque usque ad multos quaterniones extendi. Ceterum tunc finietur, cum primum coctionis signa apparuerint. Reliquum vero deinceps tempus usque ad statum, iam alterum tempus est, quod augmentum & ascensum vocatur. Dein postea, statum: qui est vehementissima rotas morbi pars. Vltima vero omnium est declinatio. Coctionis igitur signa (sepius enim quae vntia sunt, repetere conuenit) nunquam male apparent: decretoria autem, est ubi male: neque enim in augmentis, neque in principis, sed in statibus illa apparere conuenit. Quippe nec sudores, nec vomitus, nec alui excrementa, nec tumores posteaures, nec profluus sanguinis, ante coctionem morbi venientia, quae per crism finietur morbos. Haec igitur iam velui causae, morbos creduntur solvere: quae vero veluti horum indicia sunt signa, delinunt exiunt, virgiliae, graues sopores, dolores, lacrymae, respirandi difficultates, oculi tenebrae oborne, & quae cumque similia: quae omnia si habere coeque signis in morbi principio appareant, pessimorum sunt dispositionum in dicitur. At reliqua tria quae coctionis ostendunt signa, etiam si in prima pronus accessione hora apparuerint, ad bonum apparent. Sicuti igitur non habetur exquisita principii cognitio, antequam incipiat ascensum: neque ascensum, antequam statum invadat. Exercitandum itaque hoc in loco est, ut ingruent cognoscamus statum: deinde, ut praecognoscamus. Quod vero principii morbi intellexerit Hippocrates esse, totum illud

*Vrina indicat
concoctionem
quae fit in ve-
nis.*

*Decretoria si-
gna a signis co-
ctionis quae
indicia differunt.*

*Febres esse efflu-
cias venosi ge-
neris.*

*Vrina esse spec-
tandam in fe-
bribus.*

*Sputa esse in-
spicienda in
passionibus.*

*Principium pro-
prium, cuiusque
morbi, collatum
ad signa deter-
minat.*

*Augmentum tem-
pus quod fit.
Statum est vbi
morbus in statu
est.*

Declinatio.

*Decretoria si-
gna ante con-
coctionem ven-
ientia, non
quae per crism
finietur morbos.*

*Concoctissima
indicia, quae
quae tempore ap-
parent, ad bonum
apparent.*

*Statum morbi
esse cognoscendum
est per principium
quod praecognoscimus.*

Inflammatione non esse statim in principio solent.

Incrementum totum vnde potius designat.

Vigoris latitudo in morbo, quanta esse solet.

Excrementum alui laudabile quale nam esse debeat.

Excrementorum color, non magis vni habet ad inferiorem vni indicandam dispositionem.

Excrementum interitum alui, quale nam esse solet.

Excrementorum alui speciei copiosiores praeferuntur.

Excrementum velociter factum, velociter potius solentem indicat.

tempus quo ipse morbus est crudus, colligere ex hac eius dictione licet: Cōcocta medicari & mouere, nō cruda, nec in principiis, modō non gliſcant. Eodē illa peritur. Quicquid inflammatione statim in principio morborū ſoluere tentant, ex eo quidem qđ diſtenti eſt atq; inflammatum, nihil adimittēg enim cedit cruda adhuc paſſio: quę verō morbo reſiſtant, & ſana ſunt, colliqueſcere faciūt. Præſentia autē manifeſtū aliquē terminū vitimę parti aſcenſus, quemadmodū ſint, ſi ſtatuſ iudicia inſpexeris, meministi Hippocrati carū admonitiōnā, quibus ait: In principis quidē omnia ſunt imbecilliora, in ſtatu verō, fortiora. Ad hęc: Vbi morbus peracutus eſt, ſtatim extremos habet labores. Cōtingit autē nōnunq; duas acceſſiones, vbi maxime aliarū factę fuerint, inuicem verō æquales, circūſcribere ipſius vigoris tempus: nōnunq; verō vni omnī aliarū præcedentiū reliquarūq; ſequentiū, eſſe maximum. Ad tres autē extendi acceſſiones vigoris tempus, in morbis acutis nō admodum accidit: in diuturnis verō, nō modō ad tondē, ſed ad longę plurimas. Alui igitur excrementū optimū (ait Hippocrates) eſt molle atq; coniuſctū, quod ea hora exierit, qua tempore ſanitati conſueuerat. Quantitas verō eius, ſi pro ratione cibi aſſumpti. Tale enim vim cōcoquendū in inferiori ventre validū liquidū oſtendit, ac digeſtionē optimē fieri, nullāq; ventris partibus inflammationem inſeſſe. Nō meminit autē coloris ipſius excrementi, quoniā nō magnā vim habet ad inferiōris ventris indicandam diſpoſitionē. Iam verō tale excrementū cōiuſctum cūm ſit, neceſſariō etiā erit & læue. Quod ſi præter dicta, etiā ſubruſum fuerit, & nō admodū ſetidum, ex quōſitē ſecundum naturā ſe habebit: ac neq; in vīre, neq; in circūſtantiis organi, aliquid erratū eſſe ſignificabit. At ſi vel ruſum purū, vel nullo modo ſubruſum exiterit, ſed etiā ſecundum ciborum colorem, alterū duorū ſignificat, ſcilicet plus ruſi bi-
lis in ventrem deſuere, aut nihil omnino. Horū verō primū quidem ſi circa inina ſiat, bilioſiorē in orbem oſtendit: ſi verō declinationis tempore, corpus expurgari integrē. Incoctum autē alui excrementū eſt album, tenue, aſperū, humoris experte, ac ciborū retinentis qualiſatē. Secundum præter hęc eſt excrementorū genus, quod nō ex ciborū ſit diſpoſitione, ſed ex cōſtuentibus & toto corpore ad ventrē ſuperfluantiis qđ aliquid etiā indicare poſſeſt. Et enim ſi ſit viride, indicium bilis æruginoſe exiſtit: ſi autē nigrū, vel atrę bilis, vel ſanguinis eo in loco peruiſi. Si autē velvī humidū quoddā in excremento apparuerit, vbi non fuerit tale aliquid intra corpus aſſumptū (id quod ſemper ſubintelligere oportet) partiū intemariū validū frigus, ac velvī mortificationem oſtendit. Si verō pingue, pinguiſ colligatiōnis eſt ſignum: quemadmodū etiam ſi glutinoſum, colligatiōnē ſolidarū partium portendit, quę longē periculorū exiſtit. Præterea qđ vehementer ſætet, vehementem putrefactionem indicat. Excrementū ſtridētē, ſtatu quidem ſibi cum tenui humiditate permiſſū eſſe declarat: organa autem in vni coacta, atq; in anguſti reſtricta. Spumofum verō ſit, vel re aliqua feruente, vel cū aliqua

ſtulentus ſpiritus colluſtatur cum humiditate. Ac primum ſanē immoderate caliditatis corpus colligatiōnis ſecundū verō, eſt in æqualis perturbationis effectus. Variū autē, varius corpus aſſectibus eſſe obnoxiiū oſtendit: & ob hoc ipſum, & diuturnū & malignū exiſtit. Etenim ſimplex aſſectus facilius cōcoquitur, & minus eſt, qđ multiformis, periculorū. Vrinarū autem illa optima eſt, quę vrinę ſanorū ſimillima. Quęcūq; verō nō eſt talis, ſimpliciter eſt incocta, vel præter hoc, etiā pernicioſa. Vrinā igitur optimē coctam, in iis quę ſupremū ſanitati obtinent gradum explorare oportet. Talis enim eſt ſubruſa, vel ſubſtāua: magis ſubruſa qđ ſubſtāua: ſtatim enim & hæc mediocrē aſſimulandem poſſidet. Nam quę hæc ipſa craſſior eſt, aut tenuior, cōſtutionem imperſectam ſignificat. Si quidem altera nondum in humorem cōverſa eſt, altera verō adhuc cōturbata exiſtit. Ceterū cum triplex ſit vrinarū turbidarū diſſerentia: qā vel cum tales miſtæ fuerint, paulō poſt reſident, vel ſemper ſimiles permanēt, vel purę quidem minguntur, poſtea verō cōturbantur: praua quidem ex diſtis tertia, bona autē prima, media verō inter vtrāq; eſt ſecunda. Si quidem quę ſtatim reſidet, parū aliquid in æqualis turbulentie ſuperſe eſſe oſtendit: quę verō ſemper manet ſimilis, vigere adhuc quę cōturbat in agitationē oſtendit. At quę extrā cōturbatur, debet incipere cōcoqui: quare & merito deterri-
ma eſt: nam longiori tēpore, & virtute forti, indi-
get ad cōctionē. Porro quę ad ſummū incocta eſt, has omnes malignitate ſuperat: eſt enim aquoſa ex quōſitē: ac pinde velvī deſperate cōctionis accidens, affectūq; venoſe nature exiſtit: & quē admodū ventris, cruditas. Vbi verō vrina ipſa celeriter mingitur (hęc enim paſſio huius & dia-
bete vocatur: eſtq; talis, cuius circa aluum inteſtinorū læuitas: nempe extinſtio vtriuſq; virtutis, tetricitricis ſimul & alteratricis) tunc ſanē inter omnes vrinæ crudas ea peſſima exiſtit. Sed poſt ipſam eſt aquoſa, quę quidē ſolius facultatis alteratricis imbecillitatē demōſtrat. Huic proxima eſt altera vrina, quę in multis apparet mor-
bis, vt videatur multā habere formā vini tenuis & albi. Gignitur autem ex ipſa alba & aquoſa, vt quę pauca liquorē ex bilis ruſa ſuſceperit. Atq; hæc ſanē vrina proximē accedit ad crudam. Poſt hanc eſt ſuppallida. Pallida verō iura & ſubruſa eſt. Optima autem omniū vrinā, ſi ſubruſa & ſubſtāua exiſtit. Etenim cū adhuc coquitur ſanguis, vrina quę mingitur, leuem, æquale, albi ac mul-
tam facit hypotaſiam. Perfecta cōctione, color quidem vrinę intenditur, minus autē ſubſidet. Quod ſi diutius homo a cibo abſtineat, vrina magis ruſa reddetur: ſi quidem quicquid alimentū ſupra ruſum caſſit, præſertim ſi dulce fuerit & pingue, in amaram bilem conuerſitur. Porro eo longꝝ ruſus ad ſtatuſ proximē accedit: in hoc autem diſſertit, quod ruſus quidem magis ad albi, ſtatuſ autem ad ſplendidum vergit. Quantū verō ſtāuo ruſum eſt albius, tantū illō pallidū. Quan-
tū rurius minus album eſt ſtāuum qđ ruſum, tan-
tū ſtāuo rubicundū. Iam verō in paucis ſerē om-
nibus, & perfectam ætatē habentibus, qui oſo-
ſam vitam degunt, aut quouis alio modo ſuę
pleni,

Excrementum variū variū corpus effectibus eſſe obnoxium oſtendit. Vrinarū quę ſi optima.

Vrinarū turbidarū diſſerentia triplex.

Vrina cruda.

Diſſerta.

*Vrinarū cruda rum quę ex-
ſit peſſima.
Vrina aquoſa.*

*Vrina ſuppalli-
da.*

*Vrina pallida.
Vrina ſubruſa,
& ſubſtāua, o-
mnium opti-
ma eſt.*

*Caloris ruſi ſta-
tūſ diſſerentia.*

*Calor ruſus.
Calor rubicun-
dus.*

*Vrina in qui-
bus habetur
subfidentiam
plurimam.*

pleni, faris multā habent vrinæ subfidentis: quia in his omnib. plurimū crudi humoris colligunt. Quare us qui ex ocio & repletionē fecerunt, si sanitati restitui debeant, in vrina plurimū necessā subfident. Contra us, qui ex inedia & labore rubida simul & biliosa vrinæ excreantur. Soli-
tū rpe morbus plerūq. priusquā subfideat aliqd. sufficiens in his & nebula, & suspensio opri-
ma, qualis est alba, læuis, æqualis. Nec verō vrin-
æ rufæ, simpliciter vituperant Hippocrates, 10
sed quam diu rufa simul atq. subtilis esset: qudd tunc cruditatem significaret. Cæterū quæ farinæ hordeaceæ crassiori in vrina subfidentis similes, grandis colligationis & ardensissimi incen-
dij sunt signa. At quæ folia representant, sunt vasorum partes superficialē, quæ scilicet contra-
buerunt. Ira & fureur: nisi quod illi crassiores atq. minores sunt. Nigræ verō subfidentis, vel
excedentē caliditatem, atq. igneam ostendunt: vel ex
frigidity vehementē, extinctionē. Pesi-
ma igitur est omnis denigrata vrina, adeo vt nemi-
nem vnquam seruatum viderint, ex his qui ta-
lem minxerunt. Minus verō perniciofa est, si sola
sithypostasis nigra: atq. adhuc minus, si solū
id quod in medio pendet, ac multo minus etiam
si nebula: Color verō viridis fit in transitu ad ni-
grum, & est vt quoddam inritū nigri. Nam si
morbus malignus fuerit, & vomitibus, & alui
excrementis, & vrinis viridibus, postmodum ni-
græ superveniūt. Color autē luidus, est tantū fri-
giditatis effectus: odor grauis, putrefactionis.
Quod si veluti oleū mingatur, colligationis est
signū: tales quidem vrinæ prave sunt. Quæ au-
tem bono colore sunt præditæ, & subfidentias
habent albas, & læves, & æquales, aut nebulas
quasdam, aut suspensia similia, omnes vrinas bo-
nitate præcellunt: & præsertim in quibus sub-
fidentia lævis fuerit. Secundū bonitatis obtinent
locum, in quibus suspensa sunt talia. Tertium, in
quibus nebulæ. Hæc igitur coctionis sunt signa.
Reliquæ verō omnes partim cruditatem, partim
perniciem portendunt. Nam quæ alba, & quæ te-
nuis, & quæ turbulenta, cruditatem. At quæ farin-
æ hordei crassiori, aut foliis, aut fursuribus si-
milia habet: quæq. nigra, aut viridis, aut luida,
aut oleaginea, aut fœda est, perniciem signifi-
cat. Subrufa & subflava, si tenuis sit, mediis est
inter exactē coctam & crudas: sic vt i
qua alba quedam & lævis suprà effertur, aut
subfident: divulsæ verō, minimèq. sibi conniua,
siquidem morbum semicōctū ostendunt. At sub-
rubæ vrinæ, habentēq. statim subrubam atq.
lævem hypostasim, sunt quidem laticiores, farin-
æ, sed semicōctis his diurniores. Iam verō in vi-
ris qui dē atq. mulieribus, vrinæ nigre sunt pesi-
mæ: in pueris autem aquæ similes. Quoniam igitur
nigræ signum vilum ira fidele est, vt exquisitè
ostendat singula ex futuris temporibus: nec quæ
secundum concursus signa sunt complicata, sola
possunt iudicari experientia: idcirco necesse est
signi cuiusq. naturæ accurate considerare, si quis
vult rectè præcognoscere, vt ex vi vniuscuiusque
præcognitionē faciat. Etenim sæpe vnum signū,
forte, multis debilibus fidelius existit. Omnino
autē malè quis victū iudicet, nisi per fida signa,

*Subfidentia fa-
rina hordeaceæ
crassioris simi-
li quæ signifi-
cant.*

*Vrina luidius
representans,
fureur atq.
quod medicent.*

*Vrina nigra
car omnium
pessima.*

*Viridis color
quomodo fiat.*

*Vrina luida,
vrina fœda.
Vrina oleagi-
nosa.
Vrina optima.*

*Coctionis si-
gna.*

*Subrufa vrina.
Subflava vrina.*

*Subrubæ vrinæ
signa.*

*Vrina que in
venasq. melle-
ribus, & que
nem potius ex
natis existunt.*

*Vultu iustitui
nō poteri, nisi
præstatur fla-
vis morbi.*

statū futurū præcognoscere. Triplex in vniuersis
signorū omnium est discretio. Nōnulla siquidem
cruditatis & coctionis sunt signa: nōnulla salu-
tis & mortis: tertii autē signorū genus est, quod
crisibus adiacet. Coctionis igitur cruditatisq. si-
gna, alui excrementa, & vrinæ, & spūta, statuerē
oportet. Mortē autē atq. salutē nunciantia sunt,
quæ vni cum his excreantur, & quæ per totum
apparent corpus. Quāntū ad crises arriuerit, aliqd.
quidem valent nōnulla ex his: est tamen propriū
atq. præcipuū eorū signorū genus. At cruditatis
atq. coctionis signa, propriū vim habent semper
stabilē, siue statim in primo die, siue in sequētib.
apparuerint. Quædam itaq. horū signorū in vrin-
is, & alui excrementis, & spūtis apparent: quæ dā
in dispositione totius corporis inveniuntur: quæ
dam in naturalib. & animalib. cōspiciuntur ope-
rationib. Hæc tamen nō omnia fidelia sunt, in om-
nib. morbi tēporib. Etenim criticorū sympto-
matū duplex natura est. Siquidē eorū aliqua sunt
tanq. causæ & signa: aliqua tanq. signa duntaxat.
Infida verō est vniuersa eorū natura, & contraria
significans in diversis morbi temporib. In his au-
tem totum est præcognitionis studium. Nam in
alio quidē tempore secundum aliam dispositionē
crisis fit: secundū verō aliā dispositionē, sym-
ptomata, vel signa prava sunt: critica autē nō
item omnino. Coctio igitur celeritatē crisis, & la-
lubrem securitatē significat: cruda autē & inco-
cta, & in maiorē cōverfa abcessus, crisiū defectū,
aut vehementes labores, aut mortes, aut corun-
dem malorū reversiones. Porro si quis primo sta-
tim die, nullū habens signū periculofum, sed po-
tius salutaria omnia, acutē quidem febrecit. Vri-
næ autem mingat bene coloratā, ac medio critere
crassam: is certē in primis quatuor diebus crism
est habiturus: & eo magis, si nebula aliqua vel sa-
spensio optima in vrina videatur: magisq. adhuc,
si hypostasis bona se ostendat. Cuius rei nō igna-
rus Hippocrates, ait. Multisimè febres, quæ cum
signis securissimis sunt, quarto solūtur die, vel
prius. Atque malignitate excellūt, & cum signis
grauissimis accidunt, quarto die vel citius occi-
dunt. Sic vt igitur quæ omnia habet signa tutissī-
ma febris acuta, in primo periodo decretionis
dierū solutio nō habet: sic quæ isti proximè dia-
cet, diē septimū nō transcendit. Similiter etiā ma-
ligna, & cum grauib. facta signis, quāntū abicit
a malignissima, & cum grauisimis accedente si-
gnis, tantē tardiorē mortē inducet. Sit itaq. primo
die vrina quidē exquisitè aquea, febris verō
debilis, hæc sane in longū protrahetur tēpus. Sed
quāntū lioc erit, in primis diebus cognoscere non
potest, nec cognoscere est vtile. At præsens principij
tēpus nō solū internoscere datur, sed etiā sapius
præcognoscere quo finietur. Atq. in his quæ
adeo diuturnis, sufficenter est tempus principij
longiū peracutus extremē angustū. Nam si sta-
tim in prima die, in vrinis appareat aliqd. signū
coctionis, iam hic principij transgressum est. Si-
militer etiā acuti principij, ne præcognitionē quid-
dem firma inquirere oportet: sed satis putare, si
dum adest, cogno scī possit: & cum q. primum ad
accessū cōvertitur, manifestē deprehendatur. Si
taq. aliqd. manifestū appareat coctionis signum,

*Signorum d. se
rentia triplex.*

*Coctionis si-
gna.*

*Signa mortem
& salutem nū-
tiantia.*

*Dicretionum
signorū genus
habere propriū.*

*Criticorū sym-
ptomata duplex
natura.
Criticorū sym-
ptomatum natu-
ram esse seph
dem.*

*Crisis colorata
tem concilio
inducit.
Cruditatē quod
convalescent,
Crisiū prius
quatuor diebus
accidisse,
exemplum.*

*Principij in a-
cutis morbi co-
gnoscere ratio.*

quicquid interiacet temporis, crisi principium morbi. Quantum autem deat ad peripicuū illud cōcoctionis indicium, & à morbi motu, & natura, & anni tempore, & regione, & ætate, & tempera-
tura ipsius laborantis, inuenies. Nam si morbus natura longus existerit, quemadmodum febris amplumenna, & videatur tardē in hoc ægrotante moueri: tempusq; anni sit hyems, & regio frigida, & talisq; & natura laborantis ad frigidū declinat, multū interim temporis ad manifestū signi generationē desiderabitur: quod totū tēpus principio erit contribuendū. At verō perfecta cōctio est, quādo in vrinis subferretur aliquid album, læue, æquale, & continuū: debilis autē est, quando ex aquosa mediocriter suppalidā facta fuerit: aut etiā turbulenta existens, talis permaneat. Rursum etiam & tenuis ad idem genus spectat. Sed nihil horum iam principium esse finitum ostendit. Hoc enim manifestus indicium semper expetit, vel solam nebulam albā, vel suspensionem æqua-
lem, cōnuū atq; albam. Præterea rubens nebulula, & subfidentia talis, & absq; subfidentia probē colorata vrina, & crassitudine mediocri, principij finem declarat. Sic & in laterum & pulmonū passionibus, ea que propriē spūta vocantur, vrinarum subfidentia assimilatur. Nihil verō omnino ex puerē, sed rursus tantūmodo os sicca habere, tale quiddam est, quale in vrinis extremē crudum, qd nominamus aquo sum. Quod si ab eo quod est nihil expuerit, s ad expuendū quidem, verū liquida, & omnino cruda, fiat trāsmutato, debilis & occulta ea permutatio erit: nec absolutum erit tunc ipsum principij tēpus. At vbi æger cepit expuere pauca cōcocta, ac reliqua omni tempore hinc vsq; ad statū, plura & meliora, & facilius excreuerit, tūc sanē expirabit principij, augmētūq; morbi inuascet. Cūm verō exquisitē cōcocta fuerint & multa, educatq; sine difficultate, tunc status est tempus. Quādo verō similiter exquisitē cocta, & sine molestia educta, sed eorū copia imminuta fuerit, dolorq; nō amplius adfit, tunc cessare statū oportet, subsequi autē declinationem. Sciendum autē est, secundum ipsas præcognitiones temporum, vnde decimū diem esse indicem decimi quarti: sicuti & vigesimū decimū septimū. Cōtingit autem laborantem plurimē, die quidem decimo septimo pauca quedā concocta expuere: sequi autem crīsim, sed imperfectā vigesimo: ac postea tandem iudicari absolute morbi trigesimo quarto: quemadmodū
contigit in Anaxione, cuius Hippocrates meminit tertio Epidemiorum libro. Porro primi dies tum indices, tum decretorij, valentiores quidem sunt vltimis, vbi morbus est breuis: eo tamē producto, iōgē imbecilliores redduntur. Igitur perfecti ac iam finiti principij manifestum & firmū, est signum manifesta cōcoctio. Finieturi autem, & morbi natura, & tempus anni, & ætas laborantis: ex abvndantiā verō, & regio in qua ægrotat, & modus eius qui antecesserit victus, cūm non dum qualem morbo correptus esset. Specialiora vero in dica futuri finis primo ægritudinis tempore, cōtūonis indicia sunt. Cæterum si integræ cruditas indicia in primis quatuor diebus morbi permanant, longū erit huic morbo principij tem-

pus: si verō debilis mediocriter in ipso apparuerit, iōgum quidē & hoc erit, sed nō priorī similiter. Si autē parua fuerint cruditatis signa, futurū etiā principij tempus erit exigū. Meminisse autē cōuenit illius aphorismi: Frigidi sudores cum acuta quidem febre, mortē significant: cum mīori verō, morbi prolixitate. Quæ sanē prolixitas vniuersis ipsius morbi temporibus cōmunicabitur. Iam verō post summi vigoris tēpus scpe qd nulla sit crisi, sed paulatim solutur morbus, longo tempore cōcoctionē recipies: at hu iuscemodō solutionem absolute crisi non uoim. Si quā verō confertum fiat permutatio, & multo magis adhuc: agitationē que illam præcedit, ita appellare conlueui.

GALENI PERGAMENTI de crisi, lib. II.

DEincept autē, quo pacto quis primo statim die possit morbi naturā cognoscere, est adiciendum. Cæterū diem per totum hunc sermonē nostrum, in ea significatione accipiemus, vt nō solum lucem, sed etī noctem complectatur. Sicuti & mensē ex triginta diebus cōstare dicimus: nō id tempus tantum, quo Sol supra terram fertur appellantes diem, sed noctem etiā ei copulantes. Arg in hunc cōmū annum quodammodo dicimus trecentos & sexaginta quinq; dies cōtinere. Morbus est dispositio quedam functione ex iisdemque quidē duplex sepe consistit. Simpliciter tamen dispositionē, nemo qui perspicaci sit ingenio, in primo die ignorabit: habet enim propria indicia. Eam verō que cōmissa est, nō omnibus per minia cōtingit agnoscere. Oportet autē in omnib; simplicibus dispositionibus sic exerceri, vt earū singulas sciorum, & iam perfectas promptē noscamus. Simplicem itaq; morborum singulorum dispositionē, ante omnia ipsi per se ipsam cognoscere expedit: primum quidem ac maxime, ex iis que secundum propriā ipsi insunt substantiā: deinde iam ex iis que sepius ei accidunt. Veluti in ea febre que tertiana dicitur, non hoc tantum aduertat, si tertio quoq; die fiant accessiones desinentes integre. Nam si due tertianæ fierent, aut due quantanæ: due quidem tertianæ quolibet die, per tertium autē due quantanæ accederēt. Quare vel duas tertianas vnam que quodāmodo putares, vel duas quantanas vnam tertianā. Forma itaq; accessionum maxime inspicienda est. Porro exquisitē tertianæ longissimus terminus, septem absolutur circūb. sunt autē tertianæ plurimæ, vt etiā cōtinuæ & ardentes, æstiuo tempore, vbi secundum naturā se habet. Etiam quemadmodum hyems præ omnibus anni temporibus humidissima, & frigidissima existit: sic æstas, siccissima simul & calidissima, dummodo propriā naturā retineat. Nec enim debes existimare, qd propter anni temporū appellationes, singule ægritudines accide-
tales scilicet vel tales: sed propter ambiētes ætras temperaturā. Nam qualem hic naturā sortitur, ita etiam nos afficit. Similiter etiam regio & tempus hominis calida & sicca, plurimarū febriū feracior est, us que tēperamentum cōtineat possident. Quod si etiam victu calidiora & sicciora
vīs

*Amphimeria
febris dicitur
na.*

*Concoctio
absoluta imbe-
cillā signa.*

*Principij finis
que indicent.*

*Spūta in pluri-
tate, vrinarum
subfidentia
sunt pericula.*

*Status tempus
in pleuritide
quando it ad-
effi significabi-
tur.*

*Declinatio in
pleuritide quā
do adfit.*

*Vndecimam of-
se indicem de-
cimiquarte.*

*Vigesimū et
decimū septimū
in diuini pūti de
trigimo quarto.*

*Primi dies in
morbo breui-
bus valentio-
res sunt vlti-
mo contra in
longo.*

*Sedorei frigidi
quod indicant.*

*Crisis absoluta
est agnatio præ-
cedens morbi
permutationē.*

Diem.

Mensem.

*Anni quatuor
ex trecentis sex-
aginta quinq;
diebus.*

Morbus quid.

*Simpliciter dispo-
sitione est per
se inspicenda.*

*Tertianæ due
copulatae vnam
die singula
dicuntur.*

*Quantanæ do
ex apulatae, et
tertio quoq; die
accessiones fac-
iunt.*

*Tertianæ re-
quisita longis-
simus terminus
septem absolutur
circūb. sunt.*

*Hyems tempo-
ris æstiuū.*

*Hyems tempo-
ris æstiuū.*

vfus aliquis fuerit, hoc est, laboribus, vigiliis, curis, & anxietatibus, cibisq; paucioribus & biliosioribus, ac proinde calidior & ficcior. Atq; hæc sanè quæ diximus, cõmunia sunt ardentium febrium & tertianarũ generationi. Etenim tertiana accessio ab acutissimis maximèq; aduentibus febribus in nullo modo relinquatur: sed hoc discernimen inter, quod in hac, per totum corpus bilis defertur, atq; ideo vehementer fit rigor, bilisque supervenit vomitus, atq; vring & sudores biliosi adfunt: in aliis verò aduentibus febribus, quæ nullam habent intermissione, flava bilis in vas vna cum sanguine cõtinetur: id quod certè est in causâ, vt tertiana febris per sudores vomitusq; finiatur: in aduentibus autè, singule accessiones ad infebriticatõe nõ perveniunt: quoniam quæ earum est causâ humor, non expurgatur. Sed quòd in his bilis agitur vehementius, ac veluti effusio, à naturâq; invalescente impellitur, tunc rigor supervenit, & febris soluitur. Nã ardens febris, si superveniat ei rigor (vt inquit Hippocrates) soluitur. Quòd verò non modò causâ frigida, sed acris etiam & calida, rigorem faciat, in libro de symptomatum causis ostendimus. Etenim acris & mordaces humores vehementius emouentur, & per sententia corpora violentè delant, stimulant, puniunt & feriunt: atq; hinc sensum inæqualem, rigorem, cõcussioneq; invehit. Tertiana itaq; febris, quæ ex flava bile mora ortu habet, rationabiliter statim ab initio rigor affert nõ mediocrè: hoc ipso primò à quartanæ rigore differente, quoniam in illa quidem pungi videtur ac percussio talis enim est in tertianis febribus (sentio rigor) in quartana autè febre similem frigiditatem habet, qualis per gelu, tempore hyberno sentitur. Quippe in quartana febre artus bilis redundat: sicut in quotidiana, pituita. Tertiana igitur febrem cõmunimè quidem licet absq; rigore vehementi, puniunt atq; feriente carere, oriri. At quartana febris nõ primo statim cum rigore invadit vehementi, sed progrediente ipsa, atq; aucta, vna etiam rigor quidam grauis, ac veluti ossa cõmouens, augetur. Quotidianas autè nõ comitatur rigor, nec in initio, nec in progressu, sed frigiditas dõtaxat. Præterea quartanæ febres paruos, debiles, tardos & rarus ad pulsus efficiunt in invasionibus, vt nulla altera dispositio: tertianis verò parui quidè ac debiles, tardiq; acris, cum invadunt, pulsus necessariò adfunt. Verù tarditas ac raritas nõ parvò ab his intervallo relinquuntur, quæ in quartanis accidunt. Napis in quartanæ morbi prius videbitur tibi ardens quodam modo ad interiora retracta, impeditaq; in tertiana verò, nec aliqd tale percipitur, nudatq; prope accedit ad eum qui secundum naturam est motus: ac præterea certus ordo æqualitatis pulsibus inest. Habet etiam tertiana febres per incrementa, qualem hybernæ celentate est: itaq; magnitudinè atq; vehementi excitatur, huiusq; cõmibus frequentia cõterspõdente: neq; ipsi villi adest in inflammationis signũ. Iam igitur si siem invehit, & hominè exurit, & paulò post in vigore consistit: calor æqualiter quaque versus extendi-

tur nihilq; plus thorax extremitatibus calet: & si manum imponeris, in primo occurssu quidem percipitur calor multus & acris, quiq; veluti quodam cum vapore effertur: paulò post verò superatur à manu: non vt in febribus malis & aduentibus accidit. Ac iam sanè bibenda tempus atq; roboranti instat. Statimq; post potũ plurimũ vapor calens per cutem exhalat, sudores nuncius, bilisq; supervenit vomitus, ventresq; solvuntur, & biliosum mingunt. Incipit itaq; sudor vapidosus calidissq; veluti in balneo: totum verò ipsis corpore æqualiter sudat, talisq; est pulsus, qualis in qui rectè valentes exercitantur & balneantur: velox scilicet, magnus, vehemens & creber. Sed præter hæc omnia statim ad infebriticatõe nõ desinit, vniuersum accessioneis tẽpus ultra duodecim horas nõ pronthè: Septies autè septẽ horas accessio cõnet. Nõnunq; citius aut tardius, sed non multò, finitur. Descripsimus itaq; veram & exquisitè tertianam. Quòd si vrina reddatur rufa, aut subflava, appareatq; crassitudo mediocri: ac paulò post, vel albam nebulam, vel suspensioem optimam fecerit, febris ipsa ultra quartũ circuitum non progredietur. Rufiore verò vrina existente, neq; suspensione aliqua, nec nebula in primo circuitu apparente, ad septimum extenditur. Quòd si præter alia signa, in vrinis appareat subdennata lævis, æqualisq; circa primũ iterum diem, ultra tertium circuitum ipsa febris nõ divagabitur. Ingreuat autem accessione quartana, eximia quædam ad tarditatem ac raritatem fit pulsuum conversio. Solet porò quartana febris maxime oriri in autumno, præcipue si tempus ipsum frigidum & ficcam, & inæqualem fortitatur temperatam. Quòd si etiam regio talis febrium sit generatrix, & ægotatis natura atræ bili obnoxia, talisque victus ratio ante cesserit, quæ huiusmodi aggregat humorè: & si eo tempore quartanæ febres populariter fiant, hominèq; benolus fuerit, vel febres erraticas passus: si augmentum & status plurimũ contraria fuerint, tenuisq; & albe & aquosæ vrinæ reddantur: in quâ hæc omnia indicia in prima accessione adfunt, quartanam esse febrem non dubites. Sed quotidianam à tertiana distinguere facilius est. Neq; enim primo statim die cum rigore invadit, sed progredite temporis refrigerationes potius quàm rigores ipsis adveniunt: neq; vllus ordo aut æqualitas pulsibus adfuit, cum primũ accessiones sunt. Sed nec de vrinæ laborantes, nec de nudate corpora, & pallia iactare cogit: nec multum ac frequenter respirare, ac veluti flammam ex ore efflare, frigidumq; potum expetere. Verũ itũ cum febricitant, minime sinitur vrinaq; ipsis in primis diebus tales sunt, quales quartana incipientibus adfuit. Atq; in primis diebus minime sudat: sed progrediente tempore hoc etiam illis advenit. Eget autem hæc febris natura humidior, vitioq; ociosa, & plena crapulis. Quare in pueris adfuit: ac perrarum est, quin & os ventriculi, & hepatis in ipsis male afficiatur. Sed et eruditates antecedunt plurimæ, & coqueq; moræ, & acidi ructus: & cum primũ febris incipit, præcordia ultra naturalem habitũ intumescunt. Color his cum pallore albus: talisq; morborũ

Febris ardens
et sequens
quæ gignat.

Tertianarũ ad
arcentium fe-
bris dicitur.

Ardens febris si
superueniat ei
rigor, soluitur.
Rigor enim si
frigidus & à ca-
lida causa

Tertianam fe-
brem enim à
flava bile per
corpus maius.
Rigor tertianæ
et quartanæ
quomodo dif-
ferant.

Quartanã gignit
quarta aut
febris quoti-
diana si a pi-
tuita.

Quotidianæ autem
cum rigore, sed
cum refrigeratione
quodam
modum.

Tertianarum
quartanarq;
secundum pul-
sus discernunt.

Tertianarum
signa et sym-
ptomata.

Tertiana corre-
ptio quæ acci-
dit tempore
et potu dilata.

Tertiana acci-
dit ultra duode-
cim non protra-
hitur longè.

Tertiana ex-
quisita descri-
bitur.
Tertiana bre-
vis soluitur
quæ vrina ad-
ducit.

Quartanarum
febris signa
et symptomata.

Quotidiana et
tertiana febris
discernuntur.

Quotidianæ
febris indicia.

Quotidianæ
et quartanæ
febris inveni-
untur.

Quod an
quo prae
signatio tem
poris.

Ardentem ex
quisitam ex
tertiana febrem
describit.
Causa quo
diana desce
dit.

Circa qua
tertiana descriptio

Continuam
et intermittentem
tertiana febrem
describit, iacu
dam modum
generatorem.

Febres citius
esse, quae a d
infestationem
propter quam
naturae non de
sunt.

De ventis fe
bribus.

Tertiana pura
intra septimum
circulum ab
soluitur.
Febres duode
cimae quae
febrium simpli
cium tria gra
da.

Febrium generi
compositum
constituit dupli
catum.

Febres quomodo
inter se im
miscantur.

hybernus tempus est ferax, & status temporis
humidus, & eiusdem naturae locus: itaque accessio
num principium circa vespertim. Ita quidem quo
tidiana, tertiana, & quartana, prima die invicem
discernuntur. Continuus autem febris, quae idem
genus cum us quas diximus habet, similiter pri
mo die vir exercitatus cognoscitur. Etenim exqui
sita ardens, cum omnia alia servat exquisitae ter
tiana iudicia, eo solo differt, quod neque cum ri
gore invadit, neque ad infestationem desinit.
Quae verò quondam accessionem facit, quando
temporis statum, & aetatem, & naturam corporis,
& victus rationem antecedentem, ac praeter
ea pulsuum formam, colorumque eundem habue
rit cum exquisitis quotidianis, non pervenerit
autem ad infestationem, idem genus cum il
lis obtrinet. Eodem modo & quae quarto quoque
die accessione facit sine ulla intermissione, nulla
interposita febris quiete, eiusdem est generis
cum quartana. Et palam est, quod nec rigor in ea
accessiones antecedit, neque sequitur sudor. Quae
igitur in sola staua bile febris accenditur, sine ali
quo affectu viscerum, si quidem manente adhuc
intra vasa bile accendatur, exquisita febris ardens
dicitur: si vero per totum corpus deferatur, ter
tiana. Sic & si ab atra bile fiat febris, cum per to
tum corpus delata fuerit, quartana efficitur: cum
immobilis, illa quae quarto quoque die excrescit:
quodammodo si ex pituita ortu habet, vel quodi
diana sunt, vel quae accedunt singulis diebus.
In vniuersum autem voco continuam febrem, quae
ad infestationem, antequam ex toto solvatur, non
desinit: etiam declinatio aliqua sensibilis in ea de
prehendatur. Cum vero nec declinatio aliqua sen
sibilis fiat, semper vero à primo principio febris
visus ad crismum similis perseueraverit, erit haec ex
genere febrium deventium, ab iisdem vero acutae
differt. Sed nec in primo die, nec in secundo est
huiusmodi febrem praecognoscere, nec aliter vti
le. Sat enim est genus agnoscere, quod scilicet bilio
sa sit, deversa, & peracuta. Atque huius generis fe
bres omnes in prima septimana diiudicantur: si
vero tertiana pura fuerit, intra septimum circulum.
Omnino autem diuturnae sunt, & quodi
diana intermittens, & illa discreta continua, sive tri
& quartana, & quae per quartum excrescit. Quae
re tria erunt vniuersa simplici febrium genera.
Singulari vero ipsorum in duas primas differen
tias sciuntur: vel enim intermittentes, vel fe
bres continuae erunt. At si morbus compositus
fuerit, nonneque facile cognoscitur. Dupliciter
vero genus febris compositum constituitur: in pri
ma quidem sectione, vel quia ex quas diximus
febres circa aliosque membri affectus miscentur:
vel quia ex membris cuiuspiam infestatione ac
cenduntur. Quae igitur circa membri affectum
constitunt, dupliciter commiscuntur: aliquando im
plicate, nonnunquam vero per se totas confusae. Sic
quoque membra infestata: nam ex ipsis quaedam
ferè veluti complicantur tantummodo, quaedam
vero veluti confusione quandam habent dispo
sitionem. Ac febres sane, quaedam complicantur
vnius generis cum aliis eiusdem generis, vel vnius
speciei cum aliis eiusdem speciei. Cōtingit verò
nonnunquam, ut etiam differentes miscantur. Nam

quotidianae tertianae, & huius quartanae, & quae
idem speciem servant, in vicem plerumque impleantur.
Quo fit, ut idem homo tres interdum habeat
quartanas circitus: sed hoc quidem non est diffi
cile agnoscere. Quandoque verò aliqua ex inter
mittentium genere cum continua, diffusam à vixit
explorabilem facit missionem. Porro quomodo
quodam febris, ita & panem in loca missionem reci
piunt: vel quia differentia membra propria singu
la febrim accendunt, vel hinc & secus: vel quia dis
positio mixta, veluti inflammatio cum erysipela
te, aut erysipelas cum inflammatione miscetur. Pro
differentia enim affectuum paricularum, atque eni
am affectuum, solent enim ipsae febres varia
ri. Vbi igitur singula accurate distinxeris, tunc fa
ce facile missionem deprehendes. Nulla autem est
nec species, nec genus, quod circa tertiam vel quart
am diem, cuius naturae sit, innoscere nequeat.
In vadit igitur febres aliqua horrida, atque omni
no inaequalis in pulsibus, & in eo qui per totum
corpus sentitur calore, vel sepius propius statum
esse existimetur, vel medium augmen obtrine
re. Rursus vero horrida fiat, & pulsus minores, de
biliores, tardiores, atque rariores habeat: & calorem
quidem ab extremis partibus recedentem,
circa vero ventrem atque thoracem, copiosum. Hanc
non absque ratione quispian hemipterum fore spe
rauerit, vel potius iam esse: à multis autem tertio
die noscitur. Sed haec quidem mixta esse, ex bilio
sa pituita sique febre, non invicem complicata,
sed per se totas confusis. Quae autem ex complica
tione fit, quadrupliciter constitit. Vel enim ter
tiana quondam commixta: vel ea quae quondam
accessionem habet continua, illi quae per tertium
continuata est: vel tertiana ex quae singulis diebus
accessionem facit continua: vel quondiana ei
quae per tertium continua est. Si quae vero febris
in primo die exquisita tertiana deprehensa, deinde
sequenti die similes priorum omnino fecerit ac
cessionem, haec duplex tertiana existit. Saepe autem
& duae & tres quartanae sepius invicem compli
cantur, quas accessionum forma à quotidianis di
stinguit. Tria igitur sunt omnia quae ex humoru
pure dine febrium accenduntur genera: quod
eius ex staua bile (huely plurimae sunt) quaedam
ex atra, quaedam ex pituita constitunt. Aliarum au
tem omnium febrium varietas, ex miscella horu
humorū nascitur. At ephemeræ & haec febris,
alia duo constituunt genera, ab istis, quae dicuntur
acutae febres, distinctae. Porro febris acuta, vel ali
quo distictum humorū cōpulercente, vel mem
bro phlegmone obfeso, gignitur. Mirantur autem
nonnulli, quod possit intermittens febris et
continua misceri, quod quia nulla intermissione ac
cedente miseri, inter illa solae intermittentes mix
tae inter se miscantur: id quod accidit non in tertiana
tantum, aut quondiana intermittens febribus, sed
etiam in ipsis quartanis. Cum enim plures invicem
cōplicantur, siue eiusdem generis, siue diversae, acci
dat ut febris secunda plurimum anticipet adven
ire, antequam prima in exactam integritatem definiat.
Deinde rursus tertia eidem succedit, antequam
perfecte solvatur. Hoc verò maxime accidit in
longioribus accessionibus. Etenim trium tertiana
rum complicatio, in secundo statim die nobis
mani

Quartana
circitus
propter
quod
vni
dem
fuit
implicat.

Potentia
loca
quomodo
efficitur
fuit
imple
cent.

Hemipter
fuit
descriptio

Hemipter
fuit
ex bilio
sa pituita
sique
febre
per se
totas
confusis,
vel ex
system
inter se
complicata
quod
fuit
quadrupliciter
pau
tuit.

Tertiana
duplex
quomodo
disticta
dicitur.

Febres
putridae
in tria
genera.

Febres
acutae
quibus
fuit
ex
necesse
fuit
pauca.

Febriū quæ ex
loco patienibus
accidunt fir-
mam esse com-
positam.
Pleuritidis ge-
neratæ signa.
& Symptoma-
ta.

manifeste est conspecta. Earū verò febrium quæ
ex loco patienibus accidunt, forma composita
est. Quædam enim loci indicia præ se ferūt: quæ-
dam autem eius, ob quam consistunt, causæ. Vel
viri in morbo laterali locus quidem patiens est,
costas succingēs membrana. Quæ quidem cum
inflammata sit, necessariò dolore invehit, quo-
uiam eructosa est: sed hunc pungentem, & longè
extensum, quoniam pars affecta, est membrana.
Quæ quidem cum vnum sit ex spirandi instrumē-
tis necessariò difficilem habebit respiratio-
nem animal. Quia verò & cordi & pulmōni pro-
xima est, necessariò & febricitabit, & statim infe-
stabitur tussis: nō tamen statim expuet. Sed si qui-
dem multū ac crassum ab inflammatione deluxerit,
tunc tussi expuet: si verò paucū & tenue, irri-
tabitur quidē necessariò, ita vt tussis moueatur:
nō tamen expuet, anteq̃ collectum simul atq̃ cō-
coctum ad multitudinē crassitudinēq̃ perue-
nerit. Nunquid verò magis pituitosus sit, vel bi-
liosus humor, is qui in inflammatione facit, ex for-
ma sputorū cognosces. Nam si sputa sint spumo-
sa, fluxum maximè pituitosum ostendunt: fluxum
autem, biliosum impermissū: quæ verò rufa sunt,
amarā quidem & ista referunt bilem, sed non
paucam serosam humiditatem cum bile misceri
significant: & multo ampliore, quando palli-
da quis expuerit. Sic & nigra, atra bilis fluxum
ostendunt: sicvi quæ magis rubida sunt, plurimū
quidem sanguinis: minimū autē amaræ bilis, in eo
qui inflammationem facit, contineri significat.

Sputorum colo-
res ostendunt
differentias fir-
mæ, nam pueri
etiam pleuritida
dem.

Sputa minora
quandū sunt in
pleuritide, &
quæ crassiuscula
magis.
Pleuriticorum
pulvis qualis.

Febrium diuina
sua.

Febrium longi-
tudinis ex bre-
uitatem depre-
hendi posse ex
notitia huma-
num ex quibus
grauitatem, vel
dissolutionem
partium & quibus
proculant.

Crisis repetita
voluntatis: cali-
dum febriū
sunt propria.

Atq̃ ideo inter omnia sputa hæc sunt minora: sic
viri nigra, magis exitialia. Pulsus igitur pleuritico-
rum, quā quidem duam præ se fert tensionē,
nervum esse loco affectum ostendit: quæ ve-
rò serræ similia est, inflammationis affectum. Quā
velox simul & frequens, ac magnus, ad inflama-
tionem consequi febre. Quā singula quæ
diximus, maiora aut minora sunt, vel magnam
esse, vel paruum ostendit dispositionem. Igitur
aut simplex est febris, aut cōposita: vel cum loco
patiente, vel ephemera, vel hecica. Si simplex
nino fuerit, humoris indicia afferit, ex quo geni-
ta est. Si verò composita, ex quot simplicibus feb-
ribus composita est, totidem numero humorū
multitudinem indicabit. At si hoc indicet, illud
etiam significabit, nūquid morbus diu durabit,
an citò finietur. Nam si humor pituitosus exte-
rit, necessariò diuturnus erit: longè verò magis,
si atra bilis naturam referat. Quod si ad fluxum
bilem inclinet, minimè quidem diuturnus erit.
Sic & locus patiens, qui quidem motu multo ex-
ercetur, calidior est, ac rarus, & principatum ge-
rit, acutiore fore morbum portendit. Qui verò
neq̃ in motu continuo est, frigidior est ac densus,
& sine principatu exsistit, ad longius tempus de-
bere extendi significat. Eodem modo & dispositio-
rio, si quidem difficilem motum habuerit, frigi-
diorq̃ fuerit ac densior, diu duraturum: si autē
facile moueatur, calidiorq̃ fuerit, & rarior, citò
solutum iri. Similiter & de causis est iudiciū.
Eas igitur quæ cum magno ac repentino certami-
ne sunt solutionis morborum (quæ precipuè
crises vocantur) febrium earum quæ ex calidis
humoribus accenduntur, proprias esse et puril-

dum. Post hæc, earum, quæcunq̃ membrorum
sunt principatum habentium, facile mobiles ca-
lidiorq̃ dispositiones. Ephemeræ verò & hecicæ
febres, sine magna perturbatione, & minimè subita
sunt acutæ permutationes. Ergo in omnibus in-
flammatis particulis consipato ipsa, quæ locum
probe distanti prohibet, statim quidem putrefacit
humores, similes quendam calorem excitat,
qualis & in reliquis omnibus putrescentibus gi-
gnitur. Cuius calor is modus, cum simplex fue-
rit, necessariò alicui earum, quas diximus, febriū
assimilatur: vel potius vna ex illis est, vel ad a-
marā bilem, vel ad atram, vel ad pituitam atti-
nens. Omnino enim humor qui inflammationem
efficit, vel fluxus bilis est, vel atra, vel pitui-
ta. Si igitur impermixta multaq̃ fluxus bilis fue-
rit, tum facit erysipelata, & eos qui herpes no-
minantur: si cuncti si nigra, cancores, & phagedæ-
nas, aut elephantos, aut aliquem ex his adeo in-
curabilibus morbis. Quæcunq̃ verò ingruente
pituita in tumorem atrolluntur, hæc ordinata
nuncupantur. At qui sanguis atra bilis est permi-
stus, duras gignit inflammationes: erysipelatis
vero similes, qui amaræ: inflatas, qui pitui-
ta. Cum verò ipse secundum naturam se habens
sanguis, trusus in locum fluxionis obnoxium pu-
truerit, hic quidem affectus inflammatio est. Sim-
plex verò ex ipsa febris accenditur, maximè ep-
hemeris similis, quæ ex inflammationibus in-
guinum accidit: nam & ipsa inguinis inflama-
tio ex optimo sanguine fit. Liqueat autem, quæ
cum hic putrefcere ceperit, non amplius bonus
remanet, sed iam ad amaræ bilis naturam tran-
sit. Atq̃ in hoc illud seruatur, triplex esse genus
vniuersi humoris febrium. Quæ enim ex
sanguinis putredine fit, iam quodammodo bi-
liosa est. Etenim sanguis ex moderato calore gi-
gnitur: fluxus autē bilis, ex maiore: atra verò
ex impense immo dico. Quicquid igitur pingue ac
tenue in sanguine est, sit illa bilis: crassum ve-
rò, ac veluti sæx, quando immodicè exaruerit est
calfactum, atra. Fluxus etiam bilis quandoq̃ in a-
tram cōvertitur, cum assata fuerit. Omnes igitur
quæ in particula aliqua accenduntur febres;
vnum aliquem ex dictis, vel simplicem, vel com-
positum characterem habebunt. Qui verò singu-
las per se febres exquisitè cognorūt, earum in
mutationem nō ignorabit. Ephemeræ febres so-
lius spiritus sunt passionēs, absq̃ humorū putre-
dine, aut membri inflammatione, nisi inflama-
tio inguinibus accidat. Earum autem genera-
tionis sunt occasiones cōmunes, vigilie, crudi-
tudo, tristitia, timor, curæ, iracundia, deuitio, re-
frigeratio, lassitudo, ebrietas, & quæcunq̃ simi-
les. Cōmunitur omnino pulsus promouetur ad par-
uitatē atq̃ frequentiam, & nonnullūq̃ ad magni-
tudinē. Exquisitè autē seruatur eam quæ secundum
naturā est, æqualitatem, mollitiem, & ordinem.
Sic & vixit, nōnullæ quidem, suspensiones, nō
nullæ verò subditiæ bonas habent, quædam
autē nebulas. Omnes verò probe colorate sunt,
sicvi & in omnibus calor vapidus est: atq̃ ab o-
mnibus ipsis absunt maligna accidentia. Cōmunes
autē sunt omnib. & vixit rufiores. Cæterū
illis qui ob tristitiam febricitat, acrimonia potius

Conspiciat fe-
brem quæ ratio
est æqualis.

Inflammationi
quæ vel fla-
uiscit, vel atra,
vel pitui-
ta.
Bili quæ erat
tumens.
Atra bilis quæ
in numero gignit
quæ.
Vixit rufiores
indemata.

Sanguis produ-
cit propriæ dis-
tinctionis in-
flammationem.

Sanguinem pu-
trientem ad
amarā bilis
naturam transire.

Humorū ge-
nerationis atq̃
transformationis.

Sanguis multus
non nō ignora-
bit, qui singu-
las febres
generat.

Ephemeræ fe-
bres, solus spu-
ritus sunt passi-
ones.

Ephemerarum
febrium causæ.
Ephemerarum
febrium indicia.

*Tristitia que
signa arguant.*

*Oculorum ex
guas in sanis
oiam animi ef
fectum arguent.
Vigilum inacer
rationum signa,
tracudorum
signa,
Ephemeris ex
lassitudine si
gna.
Ephemeris ex
densata cito.*

*Ephemeris an
buione etiam
qua arguant.*

*Helliarum fe
brim nulla fe
stat in pro
mo dubio, sed
in progressu.*

*Crisis per excel
lentia dicitur
subita perma
tatio morbi ad
solutum.
Crisis mala.
Crisis imperfecta.*

*Crisis optima
fit cum subito
excretionibus
aut effluuiis di
gna abscessu.
Crisis praeu
nitioe sym
ptomata.*

adeit, q̄ multitudo caloris: sicuti iis qui ob iram,
contrario modo. Sed & tenuitas corporis in iis
qui tristitia, q̄ in iis qui curis vexati sunt, manife
stus apparet, & oculorum cōcauitas, & insolita
quædā decoloratio. Et hæc quidem cōmuna o
mnium etiā aliorū, qui quocumq; modo cogitatio
nibus impliciti fuerint, iudicia sunt. Sed præci
puè ex oculis sunt discernendi: licet enim ex his
etiā in sanis animi affectum cōciter. Eos qui mi
niū vigilauerunt, distinguat decolorationis mo
dos: subtridua præterea ipsis est facies, palpe
brasq; nō facile atrollūt, oculosq; habent præhu
midos. Iracundis neg o colorū cōcauitas, nec man
ifesta inest decoloratio. Sed nec magnitudo pul
sui aufertur. Eorū verō qui febriūt ex lassitudi
ne, cutis est sicciō, q̄ in aliqua alia febriū eph
emerū. Quæ ex densata cute febres oriūtur, so
le inter omnes ephemeris in passione astricta
cōsistunt, faciliq; dignoscuntur exactu: sicuti &
aride febres quæ ex lassitudine fiūt. Caliditatis
aut motus in iis quodāmodo aufertur. Earū ve
rō febriū ephemerarū, quæ ex bubone accendun
tur, pulsus maximi sunt, veloces atq; frequentes,
caloris plurimus, qui post itarum statim ex pro
fundo atrollitur, sed suauis. Præterea rubra fa
cies magna ex parte ipsis inest, & maior tumor,
& vrinx subalby. Cōmunis autē his febribus in
est æqualitas pulsui. Quia verō nulla hestitārū
febrim in primis diebus, sed in progressu tēpo
ris fit, de illis non agemus impræsentiarum.

GALENI PERGAMENI de crisibz, lib. III.

Vbi morbus iubar ad sanitatem pervenit,
ea permutoio omniū optima est, atque i
deo ipsam per excellentiam crism voca
mus. Ex aliis autē permutationibus, quæ quidē
ad subitam mortē fit, mala crisis exiit. Quæ ye
rō aliquam effluui dignam mutationē efficiunt,
non tamen integram solutionē, imperfectæ cri
ses vocantur: sicuti & quæ sensim emoriente vel
virtute, vel morbo contingunt: quæ solutiones
simpliciter, non crises vocari debent. Sola igitur
subita ad sanitatē conversio, simpliciter crisis vo
catur: quæ fit subitis quibuscumq; excretionibus,
aut effluuiis dignis abscessibus. Quicunq; enim al
ter quicuerint, retrocedunt malignius. Antec
dia autē huiusmodi excretiones abscessusq; non
mediocri perturbatio in ægotantis corpore.
Nam anxietates, vigilie, dementiæ graues som
ni: respiraciones difficiles, vertigines, sensuum
difficultates, dolores capitis, colli, stomachi, &
maiorum aliorum membrorū: nonnullis verō
aurium sonitus, & vane ante oculos apparent
imagines, & lachrymæ in voluntariæ effluunt, &
vrina repletur, & labrū agitant, & aliquid tre
mulum sit: obliuio præterea, & præsentis igno
rantia, & vehemens rigor accidit, & plurimum
accessio consuetam accipiat horam, & multus
æstus, siquis in expugnabilis sequitur: clamant
& saliant, sicuti furientes, nec possunt in eodem
situ recumbere. Deinde repente multus sudor e
rumpit, aut vomitus nō exiguus insequitur, aut
venit subitū soluitur, aut abvndans fit fluxus
sanguinis, aut hæc omnia simul contingunt, vn

de non parvus invadit timor adstantes. Vigila
tur qualē sit habitura exitū præsens crisis, agno
scas, prævideas autem futurū, primū ac maxime
omniū expendendæ cōctiones sunt ex vrinis, al
ui excrementis, atq; ex ipsis spuris. Quippe nem
inem vidi intereuntē, qui præcedentibus cōctio
nibus, crism ipsam habuisset. Non tamen æquā
omniū signorū dignitas existimanda est: sed in
morbis quidem thoracis atq; pulmōis, præci
puè spura sunt exploranda: non tamen vrinarū
contemplatio explodenda: sed & excrementa
sunt inspiciunda. Si verō tantūm febriūt absq;
alicius visceris affectione, aut si etiā aliquid
eorum quæ circa hepar, renes, vesicam, atq; sple
nem habentur, phlegmone obfessum sit, maxi
mè vrinis est intendendus animus. Sicuti si cir
ca ventriculum passio consistat, primū excre
menta alui inspiciunda: sed neque interim sunt
negligendæ vrinæ. Primū itaq; & maximum in
stantis bonæ crisis indicium, sunt cōctiones.
Secundum autem, quoddā aliqua die indicato
riā, indicata prius fuerit, cui annexa sit disci ipsius
iudicantis facultas. Deinceps verō inspicere o
portet, & speciem morbi, & morem: ac postea, si
forma morbi, ipsa excretio respondeat. Etenim
si febris exrens sit, vel sanguis est naribus pro
fluit, vel post vehementem ignorem sudor multus
& calidus per totum corpus manabit: atq; per
vomitum, aut per alnum, biliosum aliquid excre
netur. Ita & tertiana vomitibus & excrementis
biliosis, & sudoribus toto corpore fluētibus,
finis debet. Plurimum autem pituitū in febribus
excreatur quotidianis, & multi per totum cor
pus sudores fiunt. Finis autem & phrenitidem si
dor multus, præcipue si calidus & capite fluxerit,
fadante simul reliquo corpore. Contingit etiā
interdum, vt per sanguinem fluentem & naribus
phrenitis etiam soluitur. Non tamen lethargas,
aut peripneumonia fluxū sanguinis amittit. Inter
ipsas autem pleuritidis medium obinet locū. Lie
nis etiam hepatis soluit inflammationes, si si
mul adsit acuta febris, sanguis est naribus pro
fluens: sicuti & reliquæ omnes, quæ sub præcor
dis sunt, feruentes & acutis inflammationes.
Oportet autem per directum fluere sanguinem,
ex dextra quidem nare, patiente hepate, vel lo
cis sub dextris præcordiis positis: ex sinistra autē,
liene, & locis vicinis. Tuat etiā & sudor bonus
omnes quæ sunt iuxta præcordia inflammationes
calidas & acutas. Hepatis verō cōvexa quidem
partes patientes, fluxibus sanguinis est nare dex
tra, sudoribus bonis, copiosis vrinis soluitur.
Cautæ autem partes excrementis biliosis atq; fu
doribus nōnūq; verō & vomitibus. Sudores ta
men omnibus febribus proprii sunt, & præcipu
excrebunt. Finiunt autem quartanas febres, si
atra simul cum eis atq; varia excreantur: semi
tertianas verō, si biliosæ simul & pituitosæ. Sol
uitur etiam parotides, lethargos, reliquosq; om
nes affectus capitis. Porro ceteri abscessus, feb
res omnes diuturnas secure solvere consueu
runt. At verō ægotantis ætas atq; natura, præte
rea victus ratio antecedit, locus in quo ægro
tar, anni tempus, præfensq; itatus tempus, ve
niunt cōsideranda. Atq; ex his quæ diximus licet

*Crisis bona
est expendenda,
ad vigas
similam præ
sentem crism,
ac prævidenda
futuram,
interdum ali
quæ quæ ex
his post cōctio
nes præceden
tes habuisse, non
videt Galenus
respondens.
Excretionem ear
porū, quæ in
quibus morbi
præcipui sunt
expendenda.*

*Crisis bona Cr
isistans mola
cia.*

*Ardenis febri
soluitur cō quib
us certissim
bus fit.*

*Tertiana solu
tionē excre
tibus testatur.
Quædam morbi
soluitur quæ
ceteris diffi
ciles.
Morbus quib
us certissim
bus soluitur.*

*Sanguis nari
bus atq; dexte
ra profluens,
quæ soluit
inflammationes.*

*Hepatis par
tes quibus cer
tis soluitur
soluitur.
Sudores omnes
sunt febribus
proprii.*

*Sudores, quæ
dissoluant efflu
via.*

EXCR

*Crisis futura
praecognoscitur
qua requiritur
tempus.*

*Synocha febris
nullum habere
circumitum.*

*Cochleum per-
turbationem
qua indicat.*

*Accessiones sin-
gulae quoniam
portantur tem-
pora: rationem,
augmentum sta-
tum, & decli-
nationem.*

*Intermittens fe-
bris est, quae ad
integritatem de-
finit.*

*Synocha febris
totum viri sta-
tum occupat.*

*Crisim saluta-
rem aut perni-
ciosam cognos-
cit, ad finem
morbis, motum,
& magnitudi-
nem si respici-
tur.*

*Salutis morbi,
sic ut futura
per crism, au-
tem, unde co-
gnoscitur pos-
sit.*

*Accessiones fa-
uper venientibus,
sartam diuini.*

exercitatus vltis praesentem crism cognoscere. Ad praecognoscendam vero futuram, illa quae nuper diximus, vna cum natura morbi similiter expendenda sunt. Post haec autem & accessio circum-
venerunt considerandi, an per tertium, vel per quartum, vel per singulos dies eveniant, vel nullo modo eveniant, sicut in synochis accidit. Si enim properaverint, ac semper proportionabiliter anticipaverint horis, aut multo vehementius infestaverint, & per tertium accessio, circa crism subsecutura denunciatur. Si vero lente moueatur, atque eadem invaserint hora, & singulis diebus fiat, post longius tempus crism futura portendunt. Praeterea coctionem inspicere oportet: quoniam insignes permutationes, si in diebus indicatoria accidant, indicia sunt, quod sequentes iudicatorij dies aegrorum absolvent morbo. Minime autem contingit, febrem omnia signa securissima habentem, nec illam, in qua sunt omnia maxime perniciosa, alteram quidem non liberare, alteram vero non occidere in primo quaternario aegrotantem. Cum autem vnaquaque accessio quatuor habeat partes, principium, augmentum, statum, & declinationem: vel has omnes breui tempore accessio percurrit, vel tardius vel nonnullas quidem citius, nonnullas pergit serius. Si omnes igitur celeriter peragat, manifestum inde fit, quod ad crism properat: omninoque huiusmodi febris est de numero intermittens. Neque enim contin-
git, ut illa quae omnes celeriter peragat, amplius continua permaneat: sicut neque ut quae in omnibus partibus prolixitatem seruat, sit intermit-
tens. Voco febrem intermittentem, quae ad infirmitatem non pervenit. Porro febris synocha longius est status: imo vero tota haec febris status est. Cuius igitur morbi species, & magnitudo, & in ortu, & in motu, inter se distinguantur: & species quidem sit ex propriis accidentibus cognita: magnitudo vero, ex eorumdem quantitate: motus, ex tempore accessiois partium: motus, ex acciden-
tibus superveniuntibus: his quoque adiuncta con-
sideratione temporis anni, & naturae, & regio-
nis, & similibus: nunquid morietur aeger, aut servabitur, ad haec tria respiciens invemiet, ad speciem, & motum, & magnitudinem: sed praecipue mortem expendere oportet. Vtrum vero per crism terminabitur morbus, an non, primum quidem ex motu ac magnitudine perspicies: deinceps autem ex ipsius specie: postea ex anni tempore, & ex aliis quae eiusdem sunt ordinis, & ex superveniuntibus accidentibus, quae vel vna cum crisi ab initio invadunt, vel paululum anticipant. Nam cum supervenientia accidentia dividuntur in fariam, ea scilicet quae ante morbi naturam ostendunt aperta sunt: & in ea quae adiuturam proximam crism denunciant: & in ea quae non solum signa, sed etiam causae crisis existunt: primum quidem ex his simplex est genus: secundum vero & tertium non semper, nec idem facere nec ostendere est aptum, sed variatur secundum tempora. Si aeger igitur primo debeat habere signa salutis manifestissima, huiusmodi quaternio solvet morbum. Vtrum vero per solutionem vel crism, magnitudine & partem distinguat. Magna siquidem, iudicantur omnino: parva autem duntaxat

solvitur. At dies crisis ex ipso motu invenitur. Nam si febris synocha fuerit, nulliusque acciderit error, sperandum est crism quarto futuram die. Si vero continua fuerit, magnitudinem ac motum inspicere oportet. Convenit namque in tertio vel quinto die crism fieri: in tertio quidem, si morbus sit magnus, ac motum libere vellemus: in quinto autem, si nec valde magnus sit, nec moveatur velociter. Oportet enim crism in idem tempus incidere cum accessione. Id ob id quartum accidit, ut in quarto die continuatur crism videatur. Continuat itaque febris, quae in accessione crism habent, tertio die, vel quinto, rationabiliter finitur. Adiuvat motus celeritatem morbi magnitudo, & anni tempus, & regio, & aetas, & quae cumque alia amare belli conveniunt. Tardius autem moras infert contraria. Ceterum principij signa, si diutius perseverant, diuturnum fore morbum significant. Augmentum vero, si in quarta vel septima die apparuerint, sperandum aliquid in quarto decimo est: id tamē vndecimo designabitur. Nam si haec tria in eo die coniuncta fuerint, & motus velocitas, & febris magnitudo, & manifestum coctionis indicium, fiet crism in quarto decimo. Si vero solum manifestum coctionis signum si vndecima appareat, nec tamen morbi magnitudo, aut morbi velocitas festinarint, tunc vltra diem decimum quartum differet crism. At si nec die quarto decimo aliquid innovatum fuerit, quod sit exquisitum, tunc ad diem decimum septimum est respiciendum. Si enim in eo apparuerit aliquid signum, id si dissimile erit, quod vis sit perexiguum, crismus viginti diei praedictabitur. Quae igitur crises post signa optima, & exquisita factae fuerint coctione, ex necessitate erunt optima: quoniam & sola coctio, crism celeritatem salubrem ostendit. Exquisita vero sit coctio tempore status. Cum igitur forma victus ad statum instituat, & crism optima in illo fiat, utique omnium crismus ipse erit regula. Quae enim lucet est proximior, altera magis distans est potior. Quare in nulla re adeo exercitandus est medicus, ut in status praecognitione. Etenim quicquid morbi status tempus praeterierit iniudicet, si sine crisi perseveret, & paulatim solvuntur: nullumque periculum est, statim tempore elapso, quantum iudicio assequi possum. Qui vero perierit in declinationibus, omnes hae aut proprio sunt, aut errore medicorum extincti, nequaquam autem vi morbi. Vbi enim natura superior evasit, resistit vehementiori morbi conatu, & quae infestabant opprimunt (hoc enim est ipsa coctio) si erit non potest, ut deinceps succumbat. Quod si a morbo non vincatur natura, mortem subsequi nullo modo contingit. Si quidem nihil aliud mors est, quam omnimoda naturae prostratio. Igitur an mortuus sit aeger, nec ne, praecognoscet nemo, nisi status tempus praecierit. Vt autem scire non possumus, an portando oneri quispian sufficiens erit, hominis robore, oneris magnitudine, ac viae longitudine ante non exploratis: sic nihil de aegrotantis salute prius pronunciaré licebit, quam magnitudinem morbi, naturae robur, ac futurum statum investigaverimus. At verum si ex tribus his cognoverimus, nunquid liberabitur aut morietur aeger, colligere ita poterimus aliquid.

*Synocha diuina
saepe ad evanescen-
tiam fibritur.*

*Crisis in idem
tempus
debet cum ac-
cessione.
Continua fe-
bris, quae ter-
tio vel quinto
die solvantur.
Moras celerita-
tem tardius
facit adven-
tiam.*

*Crisis optima
qua.*

*Vultus rationis
natura status
natura.
Status morbi,
omnis crism
est regula.*

*Status praeco-
gnitio maxime
cura est medi-
ci debet.*

*Status tempore
elapso, si solus
periculis mor-
bos, autem ab-
esse periculis.*

*Mors est evan-
escencia naturae
prostrata.*

*Pradictum si
dies vel morbi,
debet prius non
evanescere mor-
bi, natura ro-
bur ac futurum
statum investigare.*

de crisi tempore & modo. Nam si morbus inve-
niatur falabrata, & neq; eius acumen, nec magni-
tudo festinet, nec error aliquis cōmittatur cir-
ca ægrū, status tempus crisi expectat: quæ sanè
optima erit, vt quæ morbo cōcōcto sit. Si verò
vel propter morbi magnitudinē, vel motus cele-
ritatem, ante statū crisi venire cogatur, tūto hæc
deterior optima erit, quantū statum anticipave-
rit. Quod si neq; vīq; ad statum sufficere posuit,
necesse est ægrum ex hoc morbo interire, nec
tamen omnino propter statū. Crisi enim vel in
statu, vel parum ante ipsum fit: mors autē, in tri-
bus temporibus, principio, augmento, & statu.
Porro vbi quis subito liberatur a morbo, omni-
no huic aliqua evacuatio estatu digna, aut ab-
scissio cōtingit, præcedente tamen insigni qua-
dam perturbatioe. Arque hunc sanè solutiois
modum vocamus crism. Est & alius solutiois
modus, vbi scilicet nō omnino absolutur æger:
quæ crisi dicitur imperfecta. Vbi verò morbi
paulatim & circa perturbatioē soluitur, solutio
illa per abscissū crisi vocatur. Ac tres quidem hi
sunt modi * permutationis morborū, cum ægro-
tus est evasurus: tres verò alij istis proportiona-
les, cum videlicet est moriturus. Vel enim subito
moriitur, cum perturbatioibus, evacuatioib; vel
abscissibus momentaneis: vel mortem non
subit quidem ex istis, sed multo deterius evadit.
Vocatur autē hæc, dux crises nō bonæ: quarum
prima quidem perfecta, secunda imperfecta ex-
istit. At tertia species malæ permutationis, quæ
homīnē paulatim ducit ad mortē, arefactio dica-
tur. Est & quartus modus subite permutationis
ad peius, sine magnis excretionibus, vel materię
in aliquē locū affusibus, quam nec crisi appe-
llo. Statens igitur aliquis esse vitalem poten-
tiam, tūte vt agnoscat, * ipsum ita in robore, vt
in imbecillitate, dispositiōē. Vbi verò in his ex-
ercitatus iam fueris, cura deinceps, vt omnes
morborū tamen in magnitudine, q̄j in proce-
dentes, & post hæc, futuri status promissione,
perdiscas. Quæ vbi accuratè didiceris, tūte te ex-
erceas oportet in cōprehendendo per exquisitā
coniecturā, tam morbi magnitudinē, q̄ agrotan-
ti robore: & quanto hæc tempore possint per-
durare. Sicvī enim qui signa omnia bona præ-
fert, in primo quaternione integrè liberabitur:
ita qui omnia mala, intra primū quaternarium
moriatur. Cæterū qui quidem liberatur, omnia
morbi tempora vniuersalia pertransit. Moriturus
verò ad declinationē tempus pertingere mi-
nimè potest: imò nec necessariò ad statū. Con-
tingit quippe ipsum in augmenti & principij etiā
tempore mori. Crisim verò subire nō est necessa-
rium, & maxime si in principio morbi moriatur.
Hoc autē accidit, vbi natura a morbo plurimum
perdurat. Tunc siquidem nec certare ad verus
ipsum aggreditur: atqui sine certamine non fit
crisi. Hæc igitur est quartus modus mortis, qui
nulli salutaris affimilatur. Nemo siquidē subito
morbi evasit sine crisi. Multi verò sine hæc sub-
ito intereūt, plurimūq; in accessioē nū principis, alij
præferti qui propter materię multitudinē &
crasienam, aut inflammationis magnitudinē, ex-
altatim laborant. In accessioē etiam particula-

rim declinationibus, ob virum imbecillitatem moritur. In totius aut morbi declinatione, nullus vnq̃ extinguitur propra morbi ratione, sed ob errore cōmissum. Quandoquidē vi morbi status præterit, natura evasit superior: aliqui nō declinat morbus. Fit aut̃ semper vehementior pulsus, equaliorq̃ & ordinatior, in optima declinatione. Debilior vero, inordinatior, & inæqualior, in extitit. Tres itaq̃ vitæ omnes mortis modi, his qui sine crisi moriuntur. Primus quidē in accessione principiū, q̃ in magnis inflammationibus principalē membrorum contingit plurimum, vel ob humorū multitudinē, crassitudinē, & tenacitatē. Secundus in tempore status, si morbi vi natura superata. Tertius in declinationibus, qui rarissime accidit, vigore foluto vitali. Horū verō nullus cōtingit qui crisi. Neq̃ enim morbum depellere in humiliori mortis modis ab initio natura tentavit. Itaq̃ verō tentarent, sed succubunt, malam crīfam talem eventū appellō: fit omnino cum excretionibus, aut abfcessibus momentaneis. Sicvī autē in malis crīsis est plurima incertitudo cōiecturæ, ita in bonis scientia, & firmitas prævaleat. Determinati siquidem sunt, arg̃ ordinem naturæ motus, si & valida sit, & dominetur materię, p̃priasq̃ perficiat operationes. Indeterminati verō, inordinanturq̃ & incogniti, si quando succubunt. Porro si morbo pernicioso existente, quarto die letalia signa se ostendant: si quidem imparibus diebus accessio fiat, septimo accedit crisi: si verō pluribus, sexto. Certior tamen expectatio nō faciet ipsius morbi mortem. Nam his acutē mouetur, crīsa sexto die venturā significat. Sin verō tardē, ad se primā differet. Cum verō dies indicatus nullum de mala crīsa futura signū ostendat, p̃cognitio eius minime facilis erit. Est autem primū & maximū morbis mortalibus signū, quod sine crisi mors sit subsecutura, vñ imbecillitas. Secundum vero, si nullum adfit signum cōditionis: & præter hęc, si magnus sit morbus malignusq̃, & mouetur celeriter. Cum enim hæc affuerint, omnino absq̃ crisi mors subsequeitur. Mortis autem dies p̃cognoscitur, quando super morbum naturam considerando, & grauiores accessiones inspicendo. Si enim affat dignus fuerit excessus, & parū resisteret adhuc vi naturę videtur, mors citō subsequeitur. Si verō cōtraria affuerint, tardius. Si igitur, gratia exēpli, multus excessus, nō tamen manifestus: an ad vnum diem, vel duos extendi poterit, hoc certē distinguatur accessione circūm. Quo enim die debet accessio fieri, in illo morietur. Constat rursus morbum esse exitalem, q̃ multam prostrationē virium adesse: liquet primū ex hoc, mortē nō esse propinquā. Deinde inquirendū est, an crīsa fieri possit. Si igitur virtus robusta fuerit, & morbus mouetur velociter, & aliquod signū cōditionis affuerit, nō extra rationē est, quod natura tentabit crīsam. Ar̃ si virtus quodammodo succubuerit, ac morbus tardū habuerit mortē, nullitū adferat cōditionis signū, in hoc subsequi haud crīsa cōtinget. Itaq̃ optime crīsa in statibus sibi in augmentis verō, si salus sit subsecutura, vel imperfecte, vel nō secuta. Ar̃ in moriuntur, vel in-

rimunt

*blood car mema
 passat in totum
 morbo dictiona-
 tione, nisi ob re-
 tenti cōmāssum.*

Martin offre tre
modi, in que-
st'abito, creò una
passione.

Natura motus
quādo determini
nati, ordinat
que sunt, et quā
do ad cūctarij.

മിന്നത്തു ചെട്ടി
നാളി അയ്യോമ
നാളി ചെട്ടി.

Martin die qua
na cognoscit
tur.

Crabot matura

*Drift specimens
from North.*

Crisu quo mor-
bi si pere fiat,
Mors quo mor-
bi tempore ac-
cidat.

Permutationes
verborum tran-
sformationes.
Crisis perfecta
quid.

Crisi imperfetta.
Crisi per abbreviamento quando di notte.

Permatationis
verberis, cum
agor est inter-
turus, duo mo-
di.

Cryer was be-
hind.

Approved: _____

Enaferus mor-
bum, ne; offerre
debet evadere al-
lam vniuersa-
lia tempera.

Marturum ad
declinationem id
pau perlongere
minime potest.

Quoniam in me-
riore quatuor,
non esse necessa-
rium.

Cups are of
solid ceram-
ic.

Nemo absq; cri
si subitā morbu
evalit.

More a b/c type
qualitative content
analysis is a confusion
with a b/c type

rimunt subito, vel magnam ad peius mutationē efficiunt. In principio autem morbi, crises non sunt. Quando igitur futura crisis ostenditur, & nox præcedens molestia fuerit, & post ipsam accessio citius invaserit, cum quibuscumque in solis accidentibus, necesse est in eadem accessione fieri crisin. Qualis autem futura sit crisis, vtrum per sanguinis fluxum, vel vomitum, vel sudorem, vel per aliquod aliud exis, quæ sepe enumeravimus antea, auctor bonarum disciplinarū Hippocrates accuratissimè exposuit, cum in primo Epidemiarū libro, tum vel maxime in cōmentatio prognosticorū. In vniuersum autem, nihil aliud oportet considerare in modo crisis, præter naturæ ipsius in dinationē. Distinguentium autem est, an calidus & acutus sit morbus, crisisq; in primis fiat periodicis: quippe necesse est tunc post crisin, non abscessum, sed excretionem subsequi. At tardi & diuturni morbi per abscessus quiescere consueverunt: præcipue si vrinæ tænes & crudæ longo tempore exierint. Nam si multam & optimam subidentiam habuerint, rationabile est morbum potius paulatim concotumiri, non per abscessum solvendum esse. Hæc præstans, deinceps considerandum est, si quidem per excretionem debeat terminari morbus, nūquid profutuum sanguinis, vel vomitus, vel sudor, vel alius subductus sequetur: si verò per abscessum, quod nō membrū, & quis articulus abscessum suscipiet. Cæterū in iis qui per excretionem debent terminari, dupliciter distinguere oportet: & futuræ excretionis signa, si attulerint: & aliorum, si minime adsint. Si igitur præter rationem alius supprimitur, vel vrinæ, iam propè crisi existente, rigorem sperare oportet. A qui si acciderit, distinguendum tunc est, nunquid sudor post ipsum sequatur, vel vomitus, vel subductio ventris, vel aliqua horum, vel omnia. Et primū quidem ad morbi speciem est inspicendum. Si enim exquisitè fuerit incensdens, itam certior erit rigoris ipsius præcognitio. Quod enim incendit, biliosum est. Atqui biliosus humor, vbi vehementius mouetur, rigorem facit. Post hæc autē & illud considerandum est, nunquid vrinis tantum, vel etiam alio cōpressa, riguit. Si enim ambobus, necessario rigor plurimus subsequetur. Si vrinis solis, considerare oportet, nunquid alii excrementa plura quàm priora, vel pauciora ante crisin exierint. Si enim plura, manifestus motus nature ad hunc locum est agnoscendus: si pauciora, ad sudores. Si verò & vomitus signa adfuerint, per has ambas crises iudicabitur. At si vomitus signa non adsint, solos sudores expectare oportet, & magis quando ægrorantes deliraverint incrementis accessione, & partes exterioris calidiores ac rubidiores extiterint, & vapore quidam calidus exeat, qualis antea nō aderat. Quod si pulsus etiam vndosus fiat, & insigni termentibus, adiunct etiam amplius sudores expectare oportet. Durus autē pulsus, vomitus magis q̃ sudores prænotendit. At alius, omnimodæ excretionis est index, perinde ac vehementis. Si verò magis extiterit, morus ad exteriora potius, quàm ad interiora, signū existit. Cum verò vterq; fiat modo duplici, hic quidē qui ad exteriora, per flu-

xum sanguinis & naribus, atq; sudores: aliter autem qui ad interiora, per alium atq; stomachū: vndosus quidem pulsus, sudores: magnus autē, simpliciter sanguinis fluxus prænotendit. At motu superante ad interna, cum non adierint signa vomitus, per ventris excrementa fiet crisis: si verò affuerint, & venter insigniter subducatur, per vtrique perfrictur. Itaque qualis autē pulsus in plurimis quidem crilibus sit, & præcipue cum non sunt sine periculo & pugna. Vomitus signa sunt, oris ventriculi morbus, vñ cum dolore capitis, obortu vertiginis, agitatio labri inferioris, magnitudo spūtu tenuis deluxus. Propria verò signa profutui sanguinis, quidam fulgoris morus oculis apparens, quoniam humor est fluxus. Obralesiones autē, quoniam multus, & totus simul elatus ad superiora, spirituum meatus obserrat. Ira autē & oculi lachrymantur, ob multitudinē fluxus. Eodem modo rubidi aliquid videntur in malis: nonnunq; & naribus. Proprium verò signum sanguinis fluxus & naribus est, etiam præcordiorū tensio sine dolore. Nam & hoc nō parum iudicium est sanguinis ad superiora tendentis, si vti etiam difficultas respirationis, quæ cōtinuit sanguine transeunte in thoracē. Si verò præcordia cum dolore extendantur, non modo fluxum sanguinis nunciant, sed etiam aliquam ibi adesse inflammationē significant. Sed & dolores capitis, qui quidem veluti mordaces sunt, vomitum: qui verò quodammodo graues atq; extendentes, pulsantēq; & calidi, sanguinis fluxū propriè significant. Sic etiam viscerum sub præcordiis existentium inflammationes, cause sunt ac signa sanguinis fluxus, quando morbus per excretionem est iudicandus. * Cæterū si ex contraria parte fluat sanguis, malum est bonū autem, si secundum rectitudinē visceris, vt inquit Hippocrates. Quare præcordia dextra per dextrā harem bonā asserit crisin: per sinistram autē, sinistra. Si verò per excrementa alii sit crisis subsistitura, manifestum quidem nullum est signum: sed ex eo quod adsunt quidē crisi signa, desunt autē vomitus, & fluxus sanguinis, & sudorum, colligere licet. Quancūq; vel si nullum horū signorū adsit, non hoc tantū modo, sed etiam per hæmorrhoidas, fieri crises contingit, & mulieribus per purgationes menstruas. Non tamen impossibile omnino est talia distinguere. Grauitas quippe lumborū effatu digna, & tensio, & dolor, menstrua hic antecedit. Hæmorrhoides verò, nō omnibus sunt consuectæ. Quibus autē sunt consuectæ, in his quidē fuerit distinguere. Igitur alia oñibus, quando adfuerint signa cōsistentia & crisi, vomitus verò nō adfuerint, vel fluxus sanguinis, vel sudorum, omnino verteretur habitus. Si verò morbi ad abscessus conuertere videntur, cōmunia quidem omnia indicia sunt, vbi ægri salus deplorata non est, quod neq; morbus soluitur, neq; vrinæ multa, & multam habens subidentiam, sed cruda & tenuis appareat. Propria verò non additum diuturnum morborū, si æger in difficiliorem respirationem repente incidens, breui quidem liberetur à tali respirandi difficultate: sed excipiat ipsum statim dolor, capitis grauitas, inexpugnabilis dormiendi necessitas,

Natura ipsius inclinationem tantum esse considerandam, ad crisin modum intelligendum. Item morbi per excretionem, vt dicitur per alios, vt aqua seiniatur

Rigor quando expectandus sit.

Biliosus humor vehementer mouetur, rigorem facit.

Su de rei crisin, quid sit, et quid sit, et quid sit.

Vnde pulsus nunciat sudores. Pulsus crines excretionis significante. Pulsus magis prænotendit sanguinis fluxum & naribus.

Inequality pulsus quando per crisin fiat. Vomitus signa quæ sunt.

Sanguinem fluxum per naribus quæ prænotendit.

Præcordiorū dolor, si multus, sanguinis fluxus & naribus, inflammationem indicat.

Sanguis profusus secundum rectitudinem visceris, vt inquit Hippocrates.

Menstrua purgationes, quæ signa procedunt febri aut.

Crisis per abscessum, seu futura sit, quæ sunt signa.

furditafq. Huic liquidem in glandulofis poft au-
res paritibus, neceffum eſt abſceſſum oriri. At ſi
morbus fuerit inueteratus, neq. vllum ex his ſi-
gnis aſſuerit, ſed ſu agrotto ex locis inferioribus
vel grauitas, vel tenſio, vel & incendum, vel dor-
lor aliquis apparuit, huic abſceſſus ad partes
inferiores eſt expectandus.

GALENI PERGAMENI
de præcognitione lib. vñus.

CAPVT. I.



Vôd fieri nequeat, vt quæ in ſingulis
morbis ſunt euentura ægra, præ-
coſtituant, quamplurimi medici
exiſtunt, ô chariſtime Epigenes.

Poſtquam enim multos reperire eſt
nô in Medicina modò, ſed etiam in ceteris arti-
bus, qui apparere, quim eſſe, maluiſſi quid in di-
ſciplinis in eſt optimù, negligi cepit: edrà ex qui-
ri ea, quibus vulgo plurimi ſiant: dicere inq. &
& agere in alienâ gramam, adulari, diuites & pri-
marios ciues mane officiôſiſſimè ſalutare, comi-
tari poſtmodù, domũq. reducere: cœnantibus
inſuper ſarellum inſtar aſtare, ſcurrâſq. agere.

Atq. hunc eſt orta cômuniſſa illa omniũ artũ in-
ſciãtia, quæ noſtra ætate irrepſit. Nam quod qui-
dem ad medicam profeſſionẽ pertinet, ſi quan-
do aliqua medicorũ qui eſſe, pſiteatur artem,
aliquod ſymptoma agrotto aſſere prædixerit, ra-
rum quiddam & mōſtroſum ipſi vulgo videtur:
tanrũq. abeſt, vt admiratioſiſſi ſit, qui hoc præ-
dicat, vt etiã bene ſecũ in agi putet, ni veluti im-
poſſit eſt aliquem avertentur, iam verò aliorũ me-
dicorũ inuidiam adeo grandem in ſe concitabit,

vt ab eis tandem circũueniantur veneno (quo il-
li præcipue inſidiari ſolent) aut pro ſplendide e-
ruditionis ſuæ præmio, cogatur in exilium abi-
re: id quod olim ſuit Quinias paſſus, qui cùm

Romanis medicis, multis nominibus antecelle-
ret, Roma tamẽ eſt pulſus, idq. falſo quodã præ-
texui, quod ægros perderet. Quare multi ſyncer-
iſſimi viri, prauitatẽ, qua hec noſtra ætas detur-
ra eſt, exploratẽ habentes, à turba & frequenta
hominũ, cœu à valida quadam tempeſtate & pro-
cella, in ſolitudinis ſalutarẽ portũ ſeſe recipiunt,

Atq. erunt profeſſo li multitudini ignoti: ceteri
noti & amici primũ & maxime diis immor-
talibus, deinde viris quoq. optimis. * Quinetiã
vitzam tranquilam agent, ſinenter verſutis illos

* eſſe apud vulgus admirationi. Porro diuitũ &
præpotentium mollities, malorum omniũ eſſe
cauſa videtur: qui voluptatem præferentes virtu-
tem, eos quoq. nihili faciunt, qui quæ verè bona
ſunt, norunt, & alios docere poſſunt: ſed potius
rotos ſeſe iis dedunt, qui voluptatem cõſiliant,

hos dicunt, hos admirantur, hos euehunt ſubli-
mes, adeo vt ſalatorũ & augarũ imagines inter
deorum ſimulacra erectas videas. Vires autẽ
eruditos ceteros ſuſpicit, quatenus eorũ opera
indigent. Geometria igitur & arithmetica, ea
duntaxat ratione in præcõ ſunt, quod ad ſuppu-
tandas ſumpſitũ ranũculas, aut domos extruen-
das, vñum ſerunt. Aſtronomia verò & diuinato-
ria, ad præſciãdas hereditates vtuntur. Muſica,
quatenus oblectare poteſt auditũ. Philoſophiã

antẽ harũ omniũ dominã, & demonſtratiã di-
ſciplinã, omnino negligũt: niſi quando rhetori-
bus ſophiſtica arte, inſtrumento ſanè maligno,
vti in oratione eſt animus. Hi etiã in medica di-
ſciplina neceſſariũ illam vñum tantummodo ſpe-
ſtant, neq. hunc ſanis exactẽ ſed, vt Plato quan-
doq. air, ſi quidem pueri & inſipientes, de medici-
& coqus ferre iudicium debeant, nô parum
proculdubio coqus medico præferetur.

CAPVT. II.

Cum igitur primũ Romam veni, horum om-
nium ignarus, nihilq. eiufmodi ſuſpicatus, ſtu-
dũ nô equidem ex ſolis verbis, ſed ex operibus
ipſis, & morbos curando, & futura præcogno-
ſcendo, omnibus innotefcere, quoq. ſq. mihi tan-
dem eueniret quæ paulo ante dicebam. Etenim
tunc in Eudemo Peripatetico mure quartanam
febrem ab alia ignoratam prædiximus: quæ qui-
dem vbi ſe manifeſte correptum ſenſit, me miris
laudibus exultit, cœu in contractandò pulſu ad-
modum conſummarum. Nam antea in ſola philo-
ſophia me credebat præcellere, medicinam ve-
rò obiter attingiſſe: tamen ſi nõ ignoraret patrem
meum apertis inſomniis admonitũ, ex profeſſo
me ipſum medicinam do cuiſſe. Cum igitur ceteris
medicis videretur, vt ſummo mane eius diei,
in quo febris in valura erat, Eudemus Theriacẽ
bibere, & pſe, vbi illi abierunt, rogauit me, eorũ
mihi ſpei in pharmaci vñũ foret. At ego nihil
cunctans, reſpondi, pharmacum non modò ni-
hil prædixi allaturũ, ſed potius ex ſimplici qua-
rantia duplicem effectũ. Eam quippe illius me-
dicamentũ vñ eſſe, vt viſioſiſſi ſuccos ad hunc
modum mouere, & ad perturbationẽ perducere va-
leat: conſequere autem, aut per halitum digere-
re, nequeat, præſertim inueniente iam hyme. Nec
verò aliter contigit, q. ego ei aſſirmaram. Nam
poſt idem ſummo mane accedentes medici, pro-
pinarunt illi Theriacem, & ex vna & ſimplici, nõ
modò duplici, ſed triplicem reddiderũt quarta-
nam. Cum igitur omnia, vt prædixeram, eueniſ-
ſent, obſtupuit Eudemus, cunctiſq. aſtanti-
bus, ordine ſingula expoſuit. Aderat enim forte qua-
dam, ſi qui in vrbe Roma dignitate & erudi-
tione celebres: vtpote Sergius, & Paulus, qui
paulo poſt prætor creatur: Flavius quoq. & ipſe
vir conſularis, & Ariſtotelice diſciplinæ auditori-
ſſus: præter ea Boëtius, & Barbarus (erat em̃ luc
Lucii Imperatoris auunculus, qui tũ Meſopora
max prætoris gerat) cum ipſiſq. Seuerus etiam
vir cõſularis, & Ariſtotelice diſciplinæ addiſtus.

Dein verò, poteſtãẽ ex tribus illis quartanis, qua-
nam diſtinguere ſoluerẽt eſſent, prædicerem,
quemadmodũ etiam earum ortus prædixerã, nõ
modò ex prædictione ipſa (quæ ad votũ ſucceſ-
ſit) ſed ex curatione etiã inſignẽ gloriã ſum con-
ſecutus. Atq. inde prima mihi inuidie origo ex-
titit, cum iam & ob æris opera, & ob vite in-
tegritatem, eſſe admirationi ceſſiſſem. Porro An-
tigeneſ medicus, vnus ex Quinti diſcipulis, qui
minutim modum me inſeruat, quod Eudemum
tres & ſexaginta annos natum, triplici aſſictum
quartana, hymeẽq. media, curandũ ſuſcipere, pa-
rum abſuit quon poſtea, vbi vidit eventum rei,
obruetur terra. At Marthianus calũjniari cepit

Caput medicum
preferatur ſi de
viro: ſperum
pari & inſi-
perant ferre in
dicum debet.

Galenus Eudemum
Peripatetico
mure quartanam
febrem prædixit.

Galenus inſom-
nia patris ad-
leſum, manũ
ſe arti medicina
aperiam.

Theriacẽ poſſe
erodere ſuccos
mouere, conco-
quere autem,
aut diſcutere
per halitũ, in-
uicui.

Barbarus lucii
Imperatoris au-
unculus.

Galenus librum
de Eudemo &
tribus quarta-
nis.

Galenus la-
tenteia,
Auguſtus me-
dicus.

Martianus
meas

Diſcipline om-
niũ vnde neg-
gi incipimus.

Artium omniũ
inſciãtiaſſiſſa
de ematũ.

Romanorũ me-
dicorũ inſidia.

Quinias medi-
ci ab invidia
ſum ſunt pul-
ſus Roma.
Viri optimi cur
ſubducant ſe in
ſolitudinem.

Præpotentium
mollities malo-
rum omniũ offe-
caſa videtur.

Geometria igitur & arithmetica, ea duntaxat ratione in præcõ ſunt, quod ad ſupputandas ſumpſitũ ranũculas, aut domos extruendas, vñum ſerunt.

meas prædictiones, seu non ex Medica disciplina, sed ex diuinatoria quamquam arte profectas.

CAPVT III.

Cognoui autem atque prædixi Eudemum, crissim illius quartanæ triplicis certa quadâ nocte futuri, ex pulsu ipso. Siquidem arteriarum motus plurimû se efferebat in alia, secundum vtriusque dimensionem: quod nimirum cõtingere solet, cum natura in instantans succos & corpore excernere nititur. Recensens igitur illi omnia ea, quæ ceteras excretiones prænuunt: excretionis verò eius quæ per deiectionem fit alui, nullas neque proprias, neque efficaces esse notas asserens: tandem quia nullius ex ceteris excretionibus signa tunc apparebant, dixi alui profluuium esse expectandû. Cuius rei successum vbi vidit philosophus, iam nõ solita moderantior, sed clamans dicebat omnibus. En amici, Pythius Apollo per os Galeni vult, nõ sanitatè modò ægris, sed diem etiã variari, in qua omnino sint liberandi. Ipse enim opportunum vñ Theriacis me tribus quartanis afflicti sum, in sanitatè asseruit, quas ex intempestiua illius exhibitione incideram: nec quicquid præterit, quin omnia vñ prædixerat, evenirent.

CAPVT IIII.

Cum verò apud Eudemum conquereret de illa animi pravitate, quam medicis inesse videbam, qui in vrbe Roma clari habebantur: Nolim, inquit ille, persuasum sit tibi, viros naturæ probos, cum in hanc urbem venerint, malos aliqua ex parte fieri: ceteri qui iam antea prauo animo extiterant, cum hic & negotiorum materia abvident, mercedis multo amplior, quam in aliis vrbibus, vndeque allicitos eos, certantque quotidie multos fibiditari similes, multiplices actiones eorum accuratè imitari contendunt: itaque multis de causis ad summam illam improbitatem deveniunt. Quod si forte improbi ab aliquo deprehendantur, habent alios in tanta vrbe quos adorianus tuto, vt potè suorum morum ignaros. Vnde maxime fit, vt eadem semper perpetrare flagitia possint. Qui verò paruas ciuitates incolunt, capulucris magnitudinis nequeunt: tum quales sint, facilius a suis concubibus discernuntur: nec si quid delinquit vel minimum, crimen ipsum ita callide operire norunt. Contrà evenit ut qui hic degunt. Nam quæ improbi agunt, plurimò latent, vnde innata illa malitia facili augebit. Etenim ignotis atque imparatis imponere est facile. His auditis, me breui Roma discedere iam constituisse respondi, vt quam citissime fieri posset, illorum declinare improbitatem. Ad hæc ille: Non recusare, inquit, hoc decreuisset. Quamquam si recusent, cum ipsi auidius mentiri soleant, eadem de te quoque suspicarentur. Quare, admodum enim ipsi, indocti panter atque impet, idcirco urbem hanc petunt, quod in patria vitam agere nequeant (neque enim quæ committunt quoties, illic diu latere possent) alios etiam eadem de causa huc cõfluere existimant, nec nisi pecunia onustos, abituros sperant. Cùm hanc & alia multa dixisset, a dicitur postremo, venero quoque mihi molinorosis insidiis, vbi ad nocendi alia via deesset. Sic quippe iuuenem quemdam in arte maxime exercitatum, vñ cum duobus fa-

mulis, fuisse ab ipsis extinctum. Ad hæc ego: Gratias tibi ego præceptor longè charissime, quod mihi adeo exquisitè, cuncta quæ ad eorû improbitatè pertinent, enarraueris. Ego enim post hæc milu cauebo sedulo, tum ipsis cedens, tum inscitiam ipsorû diffumulan: atque ex hac vrbe maxima, populis frequentia admirabili, in parua & paucorû ciuium cõcedam, in qua omnes invicem nominus, genus, eruditionè, mores, rem familiarem, ac demum omnem vite rationè cius vniuicuiusque. Hæc cum ita facere decreuissem, inscitiam eorû & improbitatè redarguere desisti. Restitui tamè interim præter cõpures alios, tum Charilampis familiarè, tum Diomedem rhetorè in Sandalario, morbo diuinum afflictum. Quæ omnia, digna magna laude sunt vñ. Quare me omnes magnopere suspiciebat atque venerabatur: magnitudoque vbiq; erat Galeni nomen. At veluti indies gloria, sic pari quoque passu angebatur inuidia.

CAPVT V.

Eo tempore Flavius Boethius, vir consularis, summus virtutis amator, atque discendi audius, penitit a me, vt nõnulla ex dissectionibus, hoc est, quæ ratione vox cõformetur, animantiq; respiciant, exponerem. In quem vñ hædos atque porcellos nõ paucos iam comparauerat. Siquidem non hæc modò animalia, sed & pedestria ferè vniuersa, eandem earum partium structuram formantur. Ad illud igitur spectaculum omnes sunt conuocati quicunque Romæ vel in Medicinâ, vel in Philosophia clari habebantur. Inter ceteros autem aderat Adrianus rhetor, qui nondum causas agitabat, sed adhuc cum Boethio familiariter vivebat. Aderat & Demetrius Fauorini amicus, necnon Alexander Damascenus, Boethii præceptor, ad cõtradicendum promptus. Cùm itaque multis diebus haberetur conventus, monstravi primû, inspirationem thoracis eleuatione fieri: depressio nem verò, expirationè. Dein musculos quibus atollitur, & nervos qui expirant me dulla procedunt, ostendi. Præterea, quod spiritus, si absque violentia foras feratur, tacitam facit expirationè: cùm verò vi multa, strepitentem atque sonoram, quam etiam efflationè vocamus. Monstravi insuper, aërem solum, dum efflatur, ac circa gutturi exitu à cartilagineis corporibus repercutitur, vocem efficere. Cartilagines verò ipsas à musculis, musculos à nervis moueri: qui si abscondantur, aut expiati vinculo, animal mutum redditur. Quæ omnia Boethius per notas: cursum cõsenti iussit, eorum cõmentaria apud se habere percipiens.

CAPVT VI.

Iam verò rogatus interea sum, vt mulierem quandam inuiderem, quæ noctes integras insonnes ducebat, ac subinde de cubitus formam permutans, sese in lectulo huc & illuc iacebat. Quæ quidem cùm febre omnique effectu corporis vacante perspicere, hinc illa Pyladis cuiusdam amorem depravum cognovissè, quod eius nomine audito, non vulnus illi modò permittabatur, sed pulsus eius strahabant sibi omnimodam iniquitatem, vt quæ seos perturbantibus inuideretur. Eludens itaq; pulvis in iis inuenias, quib. rem arduam aggressus fluctuat animus. Nec dissimili-

Galeni postea
nominat.

Galeni degen-
ti Româ, cum
gloria ex agro
angebatur in-
uidia.
Flavius Boe-
thius.

Adrianus Rho-
tor.
Demetrius.

Inspirationem
ferri dilatato
thorace.
Expirationis sit
thoracis depre-
ssio.
Expiratio talis
est, si uisioque,
quæ modo fuit.
Efflatio quid
aut solum efficit
vocem.
Nervi mouent
laryngem muscu-
los, si abscondi-
tur, non excipi-
antur musculo,
mutum animal
reddunt.

Galienus quæ
relatent quædam
de matris
Romani et li-
bidiu agitata
et corrupta.
Inequalem pos-
sunt iussu sui,
qui facinus ali-
quid magnum
sunt aggressi.

Galenus quæ
relatent quædam
de matris
Romani et li-
bidiu agitata
et corrupta.

Galenus oppor-
tuno Theriacis
uso, à quartana
triplici libe-
rante Eudemum.

Roma olim Me-
dici, quæ huc
nostra disposi-
tio infusio, mal-
ti maior mer-
cen atque sperio
diuè propo-
batur.

Imponere impa-
ratis est facile.

quoque ratione diuinis cuiusdam æconomum, nō morbo, sed merore cōfici deprehendi, quod vniuerſe admiſtrationis, ad quam cogebatur, rationē reddere pro dignitate nō poſſet. Ex animi enim cōſultatione & timore, pulſus ſtatim evanuit.

CAPVT VII.

Haud abſimili induſtria Boëthi filium, qui ſepius recidebat in morbum, animadverſi, ob edulia, quibus clām explebatur, id iſtum perpeti.

CAPVT VIII.

Cū autē Boëthi vxor laboraret muliebri profluuiō, cui ſuperuenit poſtea grandis in vētre tumor, tractareturq; ab obſtetricibus, perinde ac ſi pſſigens eſſet, cōgit vt in prima balnei domo, grauiſſimus dolor ſubito eam invaderet. Ab eo verō aquoſe humiditatis vii adeo grandem exereuit, vt animo proinus linqueretur. Igitur clā more mulierculā auditō, inſilio actū, eamq; in vinas excipiens, nardino vnguento os ventris perfricuit: iuſſiq; aſtantibus, vt partus officiis, licet manus cōſcalſaceret, illa pedes, alie bene olentia naribus admoueret. Atq; ita ſanē iocellimē illam reſtitui. Erāt autē interfiricandum quæ ſpectabāt ad ventris regionem, admodum mollia & præhumida. Fuit porrō viſum medicis vniuerſis: qui illuc cōſuſum, opmū fore, ſi immoſcū illam humidū aſſectus fobolem exticaremus, ita tamē vt curatio nō per ſiccantia tantum, ſed quæ excaſcere ſimul poſſent, procederet. In maris itaq; arena, & quidē excaſta, eam reclinauimus. Talem autem ipſe illi victum inſtituit, vt q̄mimo potu vteretur: friſtionēſq; & vñctiones vniuerſo admoueret corpori, quæ ſolo melle cōſtarent: primū quidem elato q̄optimē, dein taſtar fontanę per ætatem aquę, tēdigerato. Sicvī verō ſuperfluas humiditates per eum cōmodiſimē digeri iudicauit: ſic & ad veſicam, per eā quæ vrinę proripiat, deducit, & per alium deici. Atq; hæc quidem diebus ſeptem a vacatione illa magna, ſumus experti. Poſtea verō, vbi mihi ſoli Boëthius vxorem ſuam permiſſit pro arbitrio meo tractandam: primū quidem a quo am ducere medicamentū illam curauit. Dein propinqua illi, aſani, aping decoctū. Haſ duobus diebus peractis, cū nihil iam profluuij appareret, rursus die tertia modicū quippiā ex medicamento alui purgante exhibui. Poſt hæc diebus ſingulis melle illuci, corpūſq; perfricui, ex molliſſimo primū linteō, poſtmodū ex aſpernimo, victus interius, vel ex carnisbus montanarū amū erat, vel ex ſaxanibus piſcibus. Quibus per dies quindecim peractis, cum ne minima quidem aſſectus nota exararet, præcauendi modū poſtulauit Boëthius. Menſe demū exacto, cū adeo bene colorata foret, vt diſtaret nihil a naturali habitu, quadringentos aureos mihi dono dedit.

CAPVT IX.

Cæterū iuvidiā apud illos inſignes medicos nō parum Boëthius auxit, magnificē de me prædicant. Iamq; ſibi in animo erat, de me loqm apud Imperatōrē M. Aureliū Antoninū, qui tunc Romę agebat. Nam Lucius vrbe aberat, ad Parthiū bellum cōſeſcendum. Dum hæc ſuę bellūcos tumultus in patria ſedatos audio: quare ſtatim Roma digredior, ſimulans me proficiſci in Campaniā. Primū itaq; Capuī peti, dein Brundisium, vt ibi nauim quæ Durachium, mox in Græciam tranſiret, exſpectarem: metuens ne quis ex vrbs primatibus, aut ipſe quoq; Imperator, vbi diſceſſum reſciſcent meū, miſſus qui me proſequerentur milibus, Romā qualiſ fugitiuū reducerent. Poſtero deniq; die, Caſiopolim apuli. Non multo poſt, cū Lucius Romā reuerſus eſſet, alterū bellum, quod cum Germanis eſt geſtum, inſinu habuit. Cum itaq; mox vrbe exiſſent, bellum aggrefſuri, Aquileiæ, vt deſectus haberent, & copias cōgerent, hyemare placuit. Interim ad me mititur, qui imperiū, vt illo me cōferam. Cū verō Lucius hyme media migraſſet ad ſuperos, frater caduere Romam alportatō, & iuſtus mortuorū peractis, apparatū in Germanos ſolcepit, meq; inſeqs iuſit. Quōd autē vii probus & benignus foret, facili perſuaderi potuit, vt me Romæ dimitteret, cū præſertim breui rediturus videretur. Igitur toto expeditionis illius tempore, ſans memor inſire prauitatis rum medicorū, tum philoſophorum, qui Romę agebant, opmū iudicauit ab eis ſecedere, modō in hunc, modō in illū locum: idē Cōmodum ipſius filium ſecutus, qui ſibi Pitholao educabatur. Nam huic Imperator Antoninus iuſſerat, vt ſi quando puer ægrotaret, curam mihi illius cōmitteret. Cū verō vitra opinionem protraheretur bellum Germanicū, ſcripti interim multa, partim ad rem medicā ſpectantia, partim ad philoſophicam. Quæ omnia poſt Imperatoris reditum, amicis eſſagitantibus tradidi, perſuaſus ne mihi alteri ea eſſe legenda. Nam ſi vel minimum ſuſpicatus fuiſſem in manus Indignorū ea peruentura, proſectō nec ſiſ dedidiſſem.

CAPVT X.

At verō Sextus Antonini filius, acutiſſima febre dennebatur, adeo vt ſeptimum diem citra iudicationem pertranſire nō poſſet. Sæpe nanq; irritata criſis eam diem prævenit, quæ tūtō morbum erat iudicatura: id quod Sexto venire poſſet, quarta die cognorā: rōmq; omniē Pitholao prædixeram, affirmans morbum ſeptimū diem pertranſire nō poſſe, ſed ſexta vel ſeptima die aſſuturam criſim. Quōd ſi ſexta, morbum omnino reuerſurum prædixi: ſi ſeptima, criſim habiturū firmiſſimam, eamq; omniū per ſudores. Poſtquam igitur ſexta die, quo prædixeram modō, morbus iudicatus eſt, rursus decima quarta illum febris inuaſit. Interrogante verō Claudio Seuero, ecquid de recidenda illa ſperarem: reſpondi (quod & Sexto & Pitholao paulo antē dixeram) acceſſionem illam poſt triduum labiturū ſum ſinem, aſſuturūſq; ſudorem poſt decimū ſeptimū diem, ad ſecundā noctis horam: quod præſagium ne tañtūm quidem fecellit.

CAPVT XI.

Credidit etiam aliquis id ipſe Imperator, nec minus Medici qui peregrinationis ſuę comites huerant, inſinū febrilis acceſſionis ſibi adeſſe. Aſſorū ſui itaque & ego, atq; in palatio cubare iuſſus. Venit autem primis factibus quidam miſſus ab Imperatore, qui nos vocauit. Igitur cū ex tribus iudicis qui manē ipſum inſiſſerant, duo

Galeni in partem rediit.

Largi interitus.

Merci Aurelij elementis Galeni tollitur. Cimonem ſequitur in h. Galeni, de Marc. Aurelij inſeruit in h. Galeni.

Criſis, dum in iri tatur, præuenit ducitōrē dū.

Galeni Sexto Antonini ſine prædixi modum, horam, et recidendam morbi.

Pulſus variatur in perſuadendo.

Boëthi vxorem laborantē inſiſſione viti, qua ratione reſtituit Galen.

Boëthi vxori qualem veſtutatem inſiſſione Galen.

Boëthi vxorem qua ratione curauit Galen. laborantē profluuiū muliebri.

Boëthius ad reſuſcitandū vxorē quadringentos aureos Galenū dedit.

duo pulsus tetigissent, ambobus pariter visum est febrem iam adventare. Vbi verò me quoque pulsus cōtereare iussisset, equidem bona quadam fortuna ratiā natura exquisitissimum natū, perfititatio omnibus, habitare tum ætatis, tum naturæ ipsius ratione, ac semotum pulsū sentiens, qui a celsionū principia significare solet, me nil tale suspicari dixi: sed potius ab æsum pro cibo stomachum angorem quandam sentire. Ille verò quanti agnitionem hanc faceret significavit, ter statim repetēs, ita est vt dicit: Profecto id ipsum: Vt dixisset res habet. Nam si frigidiori alimento grauius me sentio. Quid igitur (subiunxit) oportet me facere? Cui sic respondit: Si quando in quemvis alium ita affectum incido, vinum iniecto pipere propinare consueui.

Quia verò medicus in regibus, securissimis medicamentis vtuntur, satis erit lanam calido nardino imbutam, ori venteris apponere. Consueuerat & ipse, si quando & venter malè haberet, ex purpurea lana vnguentum nardinū calidum applicare. Quare Pitholao, vt hoc faceret, imperauit, nosq; dimittere. Dum autē vnguentū ventri applicuisset, pedesq; in calauissent, calidā manib; perficuit, Sabinum vinum cum pipere bibit: dixitq; Pitholao, eo epoto, Singularem sanè medicum natū sumus, cūmq; valde ingenuum. Nec de me loqui cessabat, & medicum præstantissimū esse affirmās, & singularē philosophum,

CAPVT XII.

Commodus morbus.

At Commodus aliquando ē palæstra reuersus, octaua hora prius quam cibum caperet, febre admodum calida correptus est. Cū igitur pulsus tetigissent, particulam ipsius quampiā phlegmone laborare sensi: neque id iniuria: quippe fauces habebat maximè rubrās & asperas, quas etiam gargasinate ex thoē & melle magis exasperauerat. Iussit itaq; vt pro eo, multā sumeret, rosas incoctas: qua per noctem, & insequentem diem, & quæ huic successit noctem, crebrō vteretur. Tercio die manē phlegmone omnis sedata erat, & puer quāsi febre libe. Suasi itaq; Pitholao, vt ipsū in balneū duccret, ac postea eum vitē consueto reficeret. Quod consilium tamen Ania, Faustine cognatione coniuncta, non vsq; adeo probauit: vt quæ diatribo methodicorū faueret. Porro Faustina me ipsum prehensum manu dicebat, irridens quandam methodicū, vsq; dicens: Quātopere præstet doctrina huius Galeni, vestre, modō satis apparuit. Nam cū puer regius, absente patre, vehemēti febre per biduum denneretur, non vtiq; passus est (vt vobis placet) octauam horam inuenio ipsum & fardum expectare, sed & manē laui, & cibū dedi. Cui quidem insensibilem curam, ipse valedicens, subiunxit. Multo magis exosum reddidisti me apud hosce medicos, o Imperatrix. Igitur affectum corporis agnitio, speculatione inuestigatur: ex cognitione verò exquisita affectionū, futurorum præcognitio colligitur.

CAPVT XIII.

Iam verò, cū semel in quodam ægrō, qui quintum morbi diem agebat, vniuersi medici fecere venam, & rectē quidem, deliberarent: ipse præsent submonui, si paululum cunctaremur, na-

turam ipsam per se moliturā sanguinis evacuationē, idq; per dextrā narem. Etenim æger ipse, cū perinde ac si fugere vellet exulter ē lecto, in interrogatus qua de causā id faceret, respondit, videre se rubrū anguē proferpentē ē lecto. Ad hæc dextrā narem ad genū vsq; cernebam. esse rubore magno persulfam, qd satis firmū esse solet indicium, quod illac sit erupturus sanguis. Vbi igitur ægrum vidi, quasi nares scalpere, digrū in ipsas immittere, ac postea sanguinolentum extrahere, iussit vt vas subderetur (iam enim effluēbat sanguis) subiunxitq; vacationē eam fore vehemētē. Vires siquidē validæ erant, necnō morbus crudus: quibus sanè canis immodice vacationes solēt succedere. Cū itaq; ad quatuor libras & dimidie pondus, sanguis iam effluxisset, tunc resupinum ægrū statuens, iussit vt frigidam poscam naribus exueret: frontēq; spongiam frigidā posca madentem apposui, artusq; deuini. Verū cū necq; his profluentis impetum possem suppressere, affixa demum dextro hypochondrio cucurbitula, fluorem statim compescui.

CAPVT XIII.

Cū verò æconomus quidam incidisset in morbum, forisq; eius cura aliis quibuscūdam medicis demandata, crism in septima per sudores habuit. Postridie autē cū pulsū eius tetigissent, vbi intermitteret sentire, malignū quēpiā affectum delitescere suspicari, magnopere sunt decepti. Nam cū me ob eam rem cōsultuissent, perduxissentq; ad ægrum, ipse pulsū eius cū trectāns, monui vt ad refectōrium victum traducerent: esse enim tutō & integrē iudicatum. Quippe illam pulsū intermissione, naturalem ipsi, non ex maligno quopiam affectu, existere: id quod postea sic esseprehendit. Vbi enim pulsus vel in vnica tantummodo pulsatione, vel pluribus sibi inuicem subsequētib; vnā comprehēnsus, nil aliud, intermissione illa excepta, præter naturam habere videatur, scire licet, affectū illum ab ortu ipso exiisse.

GALENI PERGAMENI
de præfatio ex insomniis sumenda, liber.

St etiam ex insomniis, corpōris dispositionem coniecturis quibuscūdam deprehendere. St igitur incendium quæ per somnum videat, cum flaua quidem bile infestati significatur. Si verò summum, aut caliginem, aut profundas tenebras, atra bile granatur. Rursus si imbres somniet, in eo frigidam humiditatem redvndare indicatur. Sic qui niuem, qui glaciem, qui grandinem, phlegmatis* frigida est plenus. In his autem & tempus, & consuetudo viuendi ratio obseruanda venit. Etenim si tuius aliqua conspiciat, si videatur, si quidem id post in vasionē paroxysmi cum horrore, rigore, frigoreq; venietis, somniet, tum plus est temporis, q; corpōris affectioni tribuendū. Sin verò remittente iam paroxysmo, huiusmodi somnium sese oserat, si maiorem nobis præbet significationem, frigidus in eo humor prævalere. Quæ ceterior fuerit, si præterea

Galeni qua ratione præteritis eulam affectum fessum quoniam faciam per nari.

Variationi inuicem quibus causis fletus aut succedere.

Galeni sanguis fluxum vehemētem & nare dextra, affixa cucurbitula hypochondrio dextro, compescuit.

Intermissio in pulsū, si in natura in præter naturam, quomodo distinguenda.

Insomniis multum lucis adferre ad coniecturas dispositionis corporeas, exemplis variis Galeni comprobatur.

Galeni fuit prædixit cuius fuisse iussu.

Menci Antioq; desposuisti nō fuisse febrem, contra quam ceteri medicos, deprehēdit, Galen.

Vinum cui iussu illam fuit pipere, vniuersi accedunt, & frigidiori alimentum vniuersi refrigerant, laudat, nardino imbutam, atq; ore cum applicatione.

Galeni de Marce Imperatore magnifico commendat.

Gargasinate ex melle, in qua rosa decōcta fuit, laudat Galen. Commodus fuit cui iussu exasperat.

Paulina Galeni præfatio manu ducit.

Præcognitio futurorum ex affectu cognoscitur per nari.

cibus pituitosis vīsa non fuerit: quibus sumptis, huiusmodi solent evenire phasīas, vel si per vniuersum corpus talis dispositio nō addit. Cūm igitur in somnis quidam crus sibi alterū factū lapideum cerneret, pręter omniū opinione eo crure factus est paralyticus. Palæstini autē qui in ciuiteria quadam fanginis plena stare sibi erat visus, sanguine abvndare cōcēimus, vacuationēq; indigere. Quidā crīsi instante sudaturi, lauare, calidarium q; aquarū lacus se natare somniabāt. Sic inexplēbilitē bibere, visio est subundorū hominum frequens: quem admodū infātia biliter edere, facili corū: & veneri indulgere, eorū quibus semen abvndat. Videtur namq; in somnis anima corporis, p̄fundū ingressā, externis relictis sensibus, eas quę corporis sunt, dispositiones sentire: & omnibus quę ipsa copit, tanq̄ iam presentibus, per hanc imaginē persui. Quę quidē animalis vis inerdū adeo multitudine humorū grauatur, vt vix mouere se possit, aut grauius quēdā ferre onera, nōnulli sibi videantur. Eodē versō quoq; accidit, vt adeo sit leuis temperatq; cōplexio corporis, vt nunc volare, nunc velocissimē currere, per insomniū se possit. Sic etiā in cecno stercoreq; agere quidā se somniāt, q; eos nimilum, corruptos, faciēdos, putridosq; humores habere, aut intestina stercore opletā, est indicium. Cōtrā aliq; in odoratis locis versari se putāt, propter diuersā ab illa dispositionē. Quapropter quę in somnis se facere putant aegri, gl̄x p̄ssimē nobis & ad defectus, & ad excessus, & qualitates densq; humorum cognoscendā, conducat.

GALENI PERGAMENI

quomodo morbum simulantē sint
coarguendi, lib. vīnus.



Vm multę sint causę, quas propter egrotare se homines simulant, videtur & in istiusmodi omnibus veritatē p̄vntē ad medicū spectare. Etenim phlegmonem, erysipelas, & tumores laxos, per pharmaca apposita extrinsecus, ex indultu in excipiatos, medico ab illis quę ex ipso corpore p̄p̄icuntur, licet discernere: sicuti & sanguinē ex oris partib; profluētē, ab eo qui ex stomacho, ventre, organisve spiritalibus provenit. Nam deprehēdunt quidā, qui sub finē rasis, quonē vellent, sanguinē excreare: venula quādā in hoc p̄bus circa gingivas aperta, sicq; cōparata, vt qñ videretur, lingua illā sugētes, statimq; post tulsētes, sanguinē, quasi ex inferioribus reddūt, ex patientē. Sic & delirare nōnulli, desperēq; se & alios, simulauerunt. Fir autē spē, vt dolor quispiā ita simulatur, vt in gēis, serēq; intolerabilis esse videatur. Equidē ipse quēdā nō ui, in cōfessionē vocatū a cibus, qui postq; id sibi minimē ex vīso fore vidisset, propterq; interesse nollet, colica se passione torqueri fingebat: id qđ certis cōiecturis deprehēdit. Nam & remedia respuebat, quibus fuerat aliis eodem in morbo adiutus: & cōcōne dimissā, extremis conquēre desit. Quin & ipsa viuendi ratio quę p̄cesserāt, talis erat, vt colicā in eo dispositionē generare nō posset: quandoquidē ex cruditate refrigerationēq; huiusmodi gigni solent affe-

ctus: quom̄ neutrū in illo p̄cesserāt. Hoc igitur, qđ ratione antea cū vīctus, ortus morbus ille esset, potuisse cognoscere, medicū erat experientia opus. Alterū verō istud, qđ ob cōcōnem simulare hęc illum suspicatus eram, medicinę p̄p̄riū non fuerat, sed captus, & rationis eius, quę communis dicitur: quā, licet omnibus sit communis, pauci tamen exacti, perfectiūq; habent, vt in venire in quoq; negotio possint, qđ faciundū, dicendū ve sit. Experientia igitur medicę sic coniungatur hęc externa facultas, aliā quoq; similia fingentes, validiōs dolores simulates, deprehendere licet. Quem admodum ipse nuper, cūm vtroq; vna vehementissimē dolore se pedissē: quidā diceret, statim dolores eius fictiōnem deprehēdi: ex eo partim suspiciōne sumēs, qđ ad illam fortē diem dominus ex vrbe profecturus erat: partim ex adolecentis moribus, qui talis esset, vt facile in huiusmodi mēteretur, qđq; amore mulierculę cuiusdā flagraret, ob quam in vrbe cōitare cupiebat. Quocirca per thapsiam admodū, sibi in genu tumore maximum excitauerat. Ego verō, cūm p̄fecto domino pharmacum imposuissē, qđ dolorem quidē nihil leniebat, verūm thapsiā solum qualitatē in frigidatē poterat, post horā vñ illū cōtēntē habuī, nihil amplius se doloris sentire. Quod si ex phlegmonē doloris natus fuisset, nō solum per id infrigidatē non recedisset, sed etiā redditus fuisset vehementior. Potest verō quis ex eo, qđ leuius morbum se rāt, indicium ficti doloris sumere. Accidit enim istud omnino spē (non ad vertentibus illis qđ morbi vehementis simular) quod in alium se, aliūq; habitum, illi qui verē laborant, magnitudine videlicet doloris agitari, trāsiciunt. Præterea si vera morbo vehemēti premittat, qđ via p̄p̄etū auxilium parati sunt, accersunt ipsi vtrō medicos, vt agant qđ illis lubeat, quod affectus ipse canetur. Sin verō leuiter, penitus non dolent, huiusmodi auxilia refugiat: neq; longiora ieiunia, neq; mordaciū pharmacorū oblationē serentes. Quę sola quidē, cūm grauiter se laborare dicūt, huiusmodi dispositionib; cōferre, nō illis affirmare oportet: quę admodū & sectiones, & vñones, & omnis cibi potisq; cui videmus eos esse obuios, absinentis. Morbū igitur simulates, & magnitudo doloris arguet, & nō sipsi deprehēdemus, cūm ex aliis multis, tum ex medicina lis experientia notionibus: in quibus sunt languere, infrigidatē extrema, pallere, interdū quod frigidi sudare, pulsus inæquales (qui quidē eis etiā accidit, qui medio crīter dolent) plurisq; muorū, qđ magnorū: & obscurorū, qđ vehemētiū, habere: præterea interrogatī de morbi specie, se calidē affectū nēcri dispositionē explicare possent. Quędā namq; dolores longelatēq; se diffundentes habēt: quodam verō tanq̄ fixos, vñq; tantūm parti inherentes. Sic alię pangunt, pulsantq; mulx quasi diuellunt: alię quodammodo obstupescere, alię grauare videmur: nōnullę deniq; vomitus, quēdā ventris perturbationes, quędam caligines inferunt.

Ratiō communis.

Thapsia facultas.

Doloris ficti vñ de p̄p̄o modo cum sum.

Simulates dolores quę ratione deprehēdi possunt.

Morborum speciem diuerse.

Anima in somniis, corpore profundum ingressa, videtur solum corporis dispositiones sentire.

Formę, quędam vñ de p̄p̄o modo cum sum.

Colici affectus ex cruditate refrigerationēq; huiusmodi gigni solent affe-

EPITOMES OMNIUM GALENI

OPERVN SECTIO TERTIA.

ILLVSTRISSIMO ET CLEMENTISS. PRINCIPI, COSMO MEDICES, TVSCORVM DVCI OPTIMO ET MAXIMO, ANDREAS Lacuna Secobiensis, Doctoe Medicus, miles Sancti Petri, S. D.



*P*rimari corporis fabricam civitatis optimè institutæ esse similem, divinus ille Plato professus est, clementissime Princeps: neq; id iniuria. Nam si constitutionem vtriusq; dissensionemq; accuratè expendamus, nihil planè reperiemus in civitate, quod longè cumulatius absolutiusq; humano etiam non insit corpori. Etenim fortissima quæq; civitas, solet esse valido cinctâ muro, quo incursiones hostium atq; insultus arceantur. Vice muri cuiusdam est corpori etiam extrema cutis, quæ tuetur ipsum ab iniuriis extrinsecis. Civitatem qui voluit inexpugnabilem reddere, minimèq; insidus obnoxiam, solent semper optimi duces unam tantum illi portam amplam relinquere, excipiendis comæatibus peruiam: plures autem veluti canales & aquæ ductus, ad illius expurganda excrementa. Similiter etiam natura os vnicuique corpori humano indidit, per quod nimirum ingrederentur quidem omnia quæ ad partes eius alendas pertinent: sermo autem elideretur, instrueretur animi hominum pietate & doctrina, maxime necessarius. ac præterea varios meatus, per quos excernerentur quæ non erant futura ex usu. Optima quæq; civitas, præsertim si duratura sit, vnica tantum, sed prudentissimo, inflexibilisimo, & clementissimo debet esse Principi subdita: quandoquidem Polyarchia semper fuit seditioni opportuna. Princeps autem ipse à civium commercio abstractus, à fidiq; stipratoribus custoditus, in sublimiori fortioriq; vrbis parte se continere, ut illinc, veluti ex quadam specula, universos ciues suos contueri, & si qua coniuratio oriatur, eam facile resistere possit. Non aliter, dubio procul, ratio ipsa in homine, quæ reliquarum omnium facultatem est imperatrix, in cerebro, sublimiori corporis parte, veluti in arce quadam consistens, membris universis sibi subditis imperat, eisq; vivendi leges imponit. Eius autem stipratores, ac veluti incorrupti quidam satellites, sensus exteriores existunt: qui nunquam non facientes excubias, explorantesque singula, quæ aut rationi ipsi, aut cuiuspiam subiectorum illi membrorum, obesse aliqua ex parte possint, quicquid tandem perceperint, ætatum sensui cõmuni renunciant: qui cum dux quidam, ipsi rationi coniunctus, illis præfectus est. Iam verò ut Principibus adsunt nonnulli viri à secretis, quies in expediendis negotiis magna sollicitudine liberant: sic adgit rationi memoria, universa quæ illi occurrunt, si aliquid ponderis sint, quam fidelissimè asseruans: eaq; dum occasio postulat, subito, veluti ex promptuario quodam, suppeditans. Solent habere Principes & pace & bello, milites quosdam sacramentarios, tum ad repellendas iniurias extrinsecas, tum ad continendos in obsequio & fide ipsos animos civium. Non secus profectò divinus ille architectus noster, rationi vim irascibilem, à Platone divusdum vocatam, adiunxit: ut si quando ratio immeritò ab aliquo infestaretur, confestim hæc excandescens, illi ferret manus auxiliatrices, omnemq; vim propulset. Collocavit autè natura hanc ipsam, quæ irascimur facultatè, in corde: ut mediæ exquisitè esset inter rationem atq; cupiditates, quæ in iccore sitæ, atq; illinc varias excursions facientes, admodum seditiose existunt, rationisq; plurimum negocij facessunt. Quocirca inter ipsas & vim irascibilem, natura etiam vallam quoddam firmissimum, diaphragma nempe, interiecit, ne videlicet imparatam illæ iracundiam opprimerent, insurgentesq; postea contra rationem, arcem illius expugnarent. Reperiuntur in civitate opificia hominum varia: cum alij, gratia exempli, conficiant panes: alij culinaria exerceant: alij retrimenta omnia expurgent: alij deniq; diversas merces per totam urbem in cõmunem usum traducant. An non etiam in corpore humano ventriculus cibos concoquit, hepar sanguinem gremio, melancholicum succum expurgat lien, vesica urinam, vena per universum corpus habuit, veluti bauli quidam sanguinem copiosissimum versant, arteriæ vitalem spiritum, ac breviter, nervi animalem, qui autorem est motus & sensus? Corporis itaq; nostri harmonia civitatis optimam refert constitutione: imò verò respublice, civitatisq; universæ, ad exemplum corporis humani sunt conditæ, cum arti natura ipsa tempore & dignitate antecellat. Quemadmodum igitur si in aliqua civitate princeps quidem, ut par est, dominetur: ciues autè omnes, militesq; eius decretis audiant: atq; unusquisq; opifex suo rectè fungatur munere, salus respublice constat: labefactatur verò, si cõtraria accidant: sic etiam quando in nostro corpore vicio ratio ipsa gesserit habenas imperij, affectus autè omnes atq; cupiditates obtemperaverint: sin-

gulaq; particula pro dignitate sua munia exercuerint, nec interim prava alimēta ingerantur: tandū certe integra sanitate corporis animiq; perfruamur. Si verò aut ratio ipsa in consiliū admittat cupiditates, aut irascibilis facultas in vniū cum his aduersus rationē conspiret: aut ex organis quæ vsui cōmuni inferunt, vniū, plura, vel omnia, prauē suis obeāt functiones: vel deniq; materia vnde particulae aluntur sint cacochymæ: pro cōcursu harū causarū necessum est aut mētis, aut corporis, aut vtriusq; morbū contrahamus. Atq; ita sanē varia in corpore morborū genera oriuntur, dissoluta videlicet alteratq; variis modis habitudine illa & temperie, quā inter se mutuū vniuersa mēbra, dum naturali ordini responderent, tuebantur. Quorū vniuersa curatio eadē adhibetur methodo, quæ curari solēt etiā morbi Reipub. Quippe vt in hac peccata leniora nūc vinculus, nūc virgū, nūc exilio, nunc successis amnicula cōiungantur: in grauiora autē, laqueo, securi flamma, atq; seruētū oleo, acerbissimē animaduertiunt sic exitum quidē affectus corporis, leuiusculis quibusdā præsidiū, vti puta purgatione, atq; interdū sola tenuis victus ratione, curamus: cōtumaces verò immedicabilēsq; (cuiusmodi tum sphaceli, tum cācri existūt) ferro, cauterioq;, ne in sanas partes grassentur, exterminamus. Ceterū quemadmodū ad ista bibulendā Reipub. plec ledōsq; facinorosos homines, leges fuerūt inuēta: sic ad cōseruandā temperiē corporis, rescindendōsq; morbos, ē cælo delapsa nobis eī Mediciua. Quo munere nullū hac lenius mortaliū generi ā Deo ipso datum est maius, nec (si Galeno credendū sit) dabitur vnquā. At vērō quam hanc ipsam artem atq; industriā medendi, olim sola experitiā constantē, Hippocrates primus omnium methodo tradidisset, reliquisset tamē incultam, imperfectāq;: postea superueniens Galenus, multū illam modis excoluit, eiq; extremū ornatum addidit. Qui cum ob illam quidē admirandā doctrinā ac sermonis facundiatē, quæ planē refertus est, magno exciperetur omnī ferē studiorum applausu: ob prolixitatē autē immensam (quæ in tanta vite breuitate est exosa) nonnulli ā lectione illius abhorrent: equidem vt ad votum omnes cōfruerentur, vniuersa vni illius opera in breuiusculam quandam periochen, vērū admodum succulentā, ea fide & diligentia contraxi, vt ex in qua inuare lectores poterāt, nihil prorsus omiserim. multa autē quæ deprauata & peruersa in codicibus tam Latinū, quā Græci erant, accuratissimē restituerim. Ex quibus nostrū luculationibū placuit sub splendore Excellentie tue, illustrissimū Princeps, partem maximā adere, nempe quæ adraginā commentarios Galeni, qui in se omnes differentias morborū, atq; eorū curandorū generales methodos cōtinent: vtiq; sperans fore, vt cum ipse inter omnes Italia Principes optimorū in geniorū sis promotor & altor, eiq; semper ceu propriū quoddam sydus affulceas, vel ex sola tui nominis præsatione, studiosi omnes ad eorū lectionē inflammarentur. Adeo siquidem tuam Celsitudinē, cum ob alias plāne reias virtutes, tum vel maximē ob ardentissimū istum sapientiæ amorem, quo semper accensa est, ducti omnes vniq; locorū suspiciūt, colunt, & venerantur, vt se nō minus debere tibi, quā ipsi Musis, vniuersi vno ore pronuncient: quæ (vt ego reor) opinione minimi hallucinantur. Siquidem nō modō studiosi, sed artes etiam, atq; scientiæ vniuersæ, si nō maiorē, at certē non minorē iis gratiam debent, qui sua munificentia fouendo ipsas, vt subinde crescerent, summūq; suæ dignitatis fastigiū attingeret, effecerūt: quā illis, quorū industria primū inueniā, ac in vsus hominū aditæ sunt. In maximam itaq; sibi felicitatē ascribūt omnia bonarū literarū studia, quod hisce turbulentis calamitosiq; temporibus, dum Italia penē vniuersa variū affluat dysidus, versatūq; in assiduo strepitu armorum: dum optima quæq; instituta infirmis titubant pedibus: dum virtus pudōrque, exulat omnis, nacta sine clementissimū & serenissimū Principē, qui explosa vndiq; ea in suos sinus excipiat, exceptaq; aduersus iniurias omnes tueatur. Haud ab re igitur illustrissimus & reuerendiss. D. D. Franciscus ā Bonadilla & Mendozza, sanctæ Romanæ ecclesiæ Senator virilantissimus, meusq; patronus vnicus, nec non illustrissimus & sapientiss. D. D. Ioannes Furtadus ā Mendozza, apud Venetos Orator Cæsareus, vterq; Celsitudinē I. additissimū, nunquā desinunt heroicis istis tui animi dotes magnifici encomiū efferre: Florentiamq;, tuam istam florentissimā urbē, nimum felicem vocare, quod obigerit illi Princeps iustissimus, clementissimus, sapientiā, simul & pietatē integerrimus. Ergo si, illustrissimē me Heros, hæcē nostrā vniū tuo patrocinio dignaberis, ego quidem videbor haud luisse meā operam. Galenus autē, ad pristinā dignitatē quā erebat olim, dum in summa esset autoritate apud principes Imperatores, decesse sibi nihil prorsus existimabit: quin potius hærens apud C. T. auctam plurimū modū beaurudinē suā arbitrabitur. Vale. Venetus, ex adibus illustriss. viri, D. D. Ioannis Furtadi ā Mendozza, in hac Reipub. Cæsari Oratori lōgē dignissimū. IIII. Idus April. M. D. XLVIII.

GALENI

PERGAMENTI DE DIFFE-

rentiis morborum, liber.



VERSARI tunc se sanos existimant, cum opinentur ad vitæ functiones ministerio particulari vtuntur. At eam partem ægrotæ arbitrat, cuius operatio sit laeta. Cum igitur sanitas inuestiganda sit, aut in ipsis operationibus, aut in fabrica instrumentorū: inaccessū vtiq; est, morbū esse vel operationis, vel structuræ oblesionē. Ceterū sanitas non operationis actū, sed aptitudinem potius est definienda. Sanitas itaq; moderatio quædam exilitis morbus autē, vt potius sanitati cōtrarius, in immoderatione eorū consistit, quorū sanitas est moderatio. At verō cum animalium corpora magis & minus suscipiant, pariq; & aliter & aliter & possunt (id quod fieri non possit, si ex elemento cōstarent vincto, aut ex atomis nulla alteratione obnoxia) tot nimirū genera morborum simpliciū cōtrahant, quot sunt elementa ex quibus cōstantur. Etenim cōpositio & formatio triplex reperitur in corpore. Prima quidem simplicium particulariū est: vt arterie, venæ, ossis, nerui, cartilaginis, ligamenti, membrane & carnis: secunda autē, instrumentalium: vt cerebrū, cordis, & cōsimiliū: tertia deniq; totius corporis. Corpus siquidem ex instrumentalibus cōstat, instrumentales autē partes, ex simplicibus: illæ deniq; ex simplicissimis elementis cōstituunt. Porro si elementa cōstitutiuam impaſsibilia esse, vt nonnulli auctores putant, duoobus tantū morbis particularibus similes prement: meatuū videlicet astrictiōne, & eorundem relaxatione. Fruentur autē sanitati absolutæ, dum eorū elementis p. constructio fuerit cōmoderata. At si nostri corporis elementa mutuo inter se patiunt, & tota per totū implicentur (id quod incōcussē est tenendū) totidem simplices morbi discēdi sunt, quot primaria elementa censent. Primaria autē elementa sunt quatuor, calidum scilicet, frigidum, humidum, siccum: ex quibus moderatē, confusū, oriunt sanitas: immoderatē verō, ægritudo. Erunt itaq; similium particulariū simplices morbi quatuor numero: caliditas videlicet, frigiditas, humiditas atq; siccitas, vbi eorum qualitatū singulæ, naturę modū exceſſerunt. At morbi partiū instrumentalium, tum illis qui ex impaſsibilibus cōstare corpora dicuntur, tum nobis, qui ex elementis affectibus subiectis, ea cōstāri arbitramur, profus existunt cōmunes. Sunt autē eorū genera quatuor. Primum enim est, vbi forma cōueniens membro fuerit vitata: secundum, vbi in numero reperitur vitium: vt si qd deſit, qd haberi eare oportuū sit: aut tedvdat aliquid tamen necessest. Tertium genus consistit in organi magnitudine, vbi aliquid impēſus aduultum sit, aut simpliciter diminutū. At quartū genus refertur de prauitate cōpositionis quæ fieri solet aut naturalis positiū variato, aut mutata partis copula. Porro prima instrumenta dicuntur, quæ cum consistit ex particulis similibus, vnus operatiōis gratia sunt cōstitutū: vt musculus, at-

que vena. At quæ variis ex his cōstantur, vt digitus, atq; hoc magis per instrumenta secunda dicuntur. Verū vtriusq; instrumenti erūt ipsi morbi cōmunes. Aliud autem genus morbi, præter iam dicta, nullū eū reperire, quod sit propriū vel simplicibus, vel cōpositis partibus. Est tamen vnus morbus cōmuni corporibus similibus iuxta & dissimilibus, nempe vitatus diuorūm. Ad reliquas tamē simpliciū morborū in partib. similibus differentias examinandas, nos cōuertamus. Igitur impaſsibilis elementorū auctores, duas, in similibus corporib. ægritudines statuebant: nempe aut astrictiōne, aut relaxationē meatuū: quarū singulæ, in alias rursus differētiæ scaturit. Astrictiō liquet fieri, cum p. vitatū, ægritudo simul cōtrahitur, aut soli obstruuntur meatus: relaxatio autē, vbi vniuersū corpus simul, in omnē partem laxatur, aut soli aperitur meatus. Similiter iuxta opinionē secundā, morborū partiū similium duplex differentia nobis oritur. Nam inter eadem quidem solis qualitatib. alterantur: interdū autē, cum humorū affluxu: qui sanē secundū modum, tumorem conspicuū excitat. Ceterū vna & item altera harum differentiarū, varias differentias forūtur. At vt ad partium instrumentalium (quarum sanē imbecillitas vel ob meatuū aeternam, vel ob imtemperiem nascitur) discutiendos morbos nos conuertamus. Totius instrumenti functio tunc præcipue vitabitur, vbi pars ipsa, quæ functionis est causa, ægrotat. Quareq; & reliquarū partiū, illi inferuentiū, vel elementares affectus, actionem ipsam impediunt. Oblesiones igitur, quæ omnino propria ratione, immediateq; operationē totius organi offendent, aut saltem impediūt, ægritudines sunt putandæ. At si minime id p. seipsas moliantur, sed ea solum ratione, quod primi instrumenti officiūt operationi, causæ morbi sunt, non item morbi. Duplīter autē solet vnusquisq; morbus cōtingere in partibus instrumentalibus. Nam aut sequitur alios morbos & affectus, aut cōtrahitur. à prima generatione. Porro vbi pars aliqua in tumore atollitur, atq; idcirco meatus illius occluditur, si qd talis particula, nullā habeat propriā operationē, obstruētiō ipsa meatuū dicitur morbus duntaxat: tumor verō nequaquā, sed obstruētiōis causa. Ceterū si affectus pars aliquid munus propriū obtineat, hac ratione tum obstruētiō ipsa, tum particula tumor, morbus est appellandus. Quæ admodū (exempli gratia) si tunica aluius venæ quæ in gibbis hepatis est: ad intumescat, vt eius causas obstruat: tumor quidē ipse, morbus, dicitur, & sanguificationem oblatat: obstruētiō autē similiter, quod impedit distributionē. Si quidem qui affectus primū labat operationē, illi & sunt, & verē dici morbi merentur. At operationis oblatio, passio aut symptoma, non morbus, est appellanda. Quæ verō ipsam induxit affectus, morbus absolute vocatur: sicut & causa morbi causæ, quæ quid ipsum morbū pepercit, si aliā læsionem non adferat. Attulimus itaq; exemplū morbi, qd in genere formationis consistit. At in numero, duas differentias morborū assiggnaueramus: cum scilicet aliqua portio laa crescit, aut superabundat. Quarū differentiarū vtræq; rursus in bi-

Instrumenta secunda quæ,

Solutio citius est morbus communis tam simplicibus, quam dissimilibus partibus, similis aut partium morbi, secundum eandem considerationem consideratur in partibus elementis, astrictio ex laxatione.

Similiter particularium simplicium morbi sunt duplices, quatenus aut solis qualitatibus, aut accidentibus humorum affluunt.

Instrumenti functionis quædam vitatur.

Affectus primus non latius functionem, sunt morbi. Causæ morborum quæ dicuntur de instrumentis morbus dupliciter accidit.

Morbus in formatione.

Functionis læsio, non morbus, sed passio aut symptoma vocatur.

Causa morbi quæ sit dicitur. Morbus in numero duplex, cum vtræq; differentia bifariam funditur.

Sanitas in quibus inuestiganda. Morbus est vel operationis, vel structuræ oblesio.

Sanitas definitur aptitudine quatuor, moderatio, cōstitutio.

Morbus quatuor immoderatione dicitur.

Morborum simplicium genera sunt quatuor simplices elementa.

Compositio corporis multo est triplex.

Elementa corporis nostri mutuo inter se implicantur, at tota per totū implicentur.

Elementa primaria sunt quatuor. Sanitas ex morbis vnde conueniunt. Similium particularium simplicium morbi quatuor.

Dissimilium particularium morbi, quatuor generibus continentur.

Instrumenta prima sunt quæ ex simplicibus partibus vniuersæ functionis gratia sunt cōstitutæ.

30

40

50

60

nas alias fecantur. Siquidem eorū quæ superfluit, nōnulla planē sunt ex genere naturali: vt si cui se-
xtus aduascatur dignus: nōnulla verō toto ge-
re præter naturam: veluti si in ventre gignantur
vermes, aut in vesica lapis. Similiter deficiētiū
particularum, nōnullæ quidem penitus abolitæ
sunt, nōnullæ verō ex dimidio præcisæ: vt rursus
autē, aut natura, aut morbo. Ex his tamen, quæ-
cumq; functionem impediunt, eadem ratione in
morborū genere cōtinentur. Quæcūq; verō par-
tem aliquam operationi dicatam, vel refrigerat, vel
non sate et alimēti transmittit, causæ mor-
borum dicuntur. Quædam tamen & morbi, &
morborū causæ censentur: vt si gurgulio radicle-
sus præcidatur. Nam & vocem perturbat, & pe-
ctus & pulmonem refrigerat. Et pulmonem
refrigerat.
Morbus in ma-
gitudine.

Quædam præci-
sus pertinet
voca, petibz
& pulmonem
refrigerat.
Morbus in ma-
gitudine.

Morbi in depre-
ssione.

Varietas solu-
tio vtriusq;
partibus existit
morbus commu-
nis.

Relationis ces-
sationis species
duo sunt, diffi-
cultas partium
lesionum.

Similari mor-
borum dispo-
sitione differē-
tias, licet
differētias pa-
rtium elemen-
ta.

Affluens humo-
ris vtriusq;
quatuor diffi-
cultas morborum
compositorum.

Solutio cōtinui
basilomata si-
milis & reple-
ta particula,
quæ morbus si-
milis patitur.
Inflammatio
quædam.

mores, mutuo inter se cōmiserunt, rarosq; repe-
rire aliquē ipsorū purū atq; syncerū licet, necessa-
riū ducendum est, erysipelas, herpetem, carbun-
culum, cancrum, atq; alios id genus tumores, esse
compositos & egrotudines. E quibus carbuncu-
lus quidem semper cum vlcere invadit, cætera ve-
rō interdum citra vlcus infestant. Gignitur autē
erysipelas à rosa bile, ab atra cancer, inflammatio
à sanguine, à pituita deniq; ordema, existens tu-
mor laxus & cedens. Qui humores tamen spe-
cie sint humidus, potentia tamen nō omnes humi-
di sunt. Quippe atra bilis sicca est & frigida: fla-
ua, calida & sicca: vt pituita, frigida & humida: ac
sanguis deniq; humidus simul & calidus. Igitur
de morbis cōpositis similariū particularū desit
nobis cū sit, ad eos qui instrumentis differētiis
sermonē iam conuertamus. Proprii dissimilariū
partium dicentur morbi cōpositi, qm plures atq;
diuersas partes simul affluunt: ex accidenti au-
tem, qui vnicam tantum instrumentorum particu-
lam occupauerint. Etenim si lippitudinem obse-
deat tunica incumbens corneæ, cū lippitudo
quidem sit inflammatio ipsius partis, inflammatio
autem omnis existit cōpositus morbus, nemini
dubii est, lippitudinē futurā etiā morbum com-
positum, tunice quidē ipsi proprium, ex acciden-
tē verō vniuerso instrumenti. Cæterum si pterygii,
suffusio, ac deniq; angularum coarctatio simul
ipsum oculum presserint, constituto talis totius
oculi dicitur egrotudo composita, cū nimirum
vno eodēq; tempore diuersæ particule contri-
stentur. Nihil autem refert si diximus, vnicam esse
compositam egrotudinem, an plures, sed in di-
uersis partibus constitutas.

Carbunculus
invadit semper
cum vlcere.
Tumor præ-
ter naturā si-
milis, ut huius-
modi tribuuntur.

Instrumenti
quædam, quæ
quæ tempore sit
particularis.

Dissimilariū
partium morbi
compositi, quæ
sunt dissimilariū.

Lippitudo est
inflammatio
tunicæ incumbens
corneæ.

GAL. DE DIFFERENTIIS MORBORVM LIB. II.

Vnc verō ad morborum qui secundum
genera cōfiterentur partes simila-
res invadit, causas dicuntur nos
cōvertamus, idq; à calore immoderato
auspicari. Vniuēsa corpora
plus æquo incallescere solēt, vel ex motu impro-
bo, vel ex putredine, vel ex cōsuetudine alterius cor-
poris feruidioris, vel ex astrictione, vel ex ali-
mēto ad accendendā caliditate accōmodo. Cæte-
rum vbi q; immodica exercitacione visus fuerit,
si calor inde ortus non occupauerit totum cor-
pus, lassitudinē tantum inducit, videlicet articu-
lorum & muscularum, ad q; præcipue mouendi
munus spectat. Si verō extēdatur per vniuēsum
corpus, febrem accendit. Ex ira etiā, quæ caloris iu-
stra cor, est velv quidā feruor, vbi is per totum
corpus dispergitur, solent febres succēdi. In tumo-
rib. etiā præter naturā, vbi humores putrescent,
calor interdum cōtra sensum communicat, ac de-
niq; excitat febrem. Quare hic venit intelligēda se-
cunda & tertia causa caloris præter naturā. Nam
ob putredinē, & ob vicinē partis cōrabescētia,
in iis tumorb. febrilis calor accendit. Quarta spe-
cies causæ consistebat in astrictione, & quidem
merito. Nam si ob astrictam cutem cohibeantur
diffusi ea, quæ prius diffusi cōfuerant, si qdem
fuliginosa fuerint, in specus cordis conuerſa, eos
exvunt, protinusq; febrem accendunt. Calido-
rum

Calor immodi-
cus à quibz, ac-
cendo accendit
hunc potest.

Morbus mor-
bus ad articu-
los ex motu
potest.
Ira est caloris
qui motu cor-
pore velv qui-
dam feruor.

Febri ex astricti-
one quædam
causa.

num etiam alimētorum vīus (in eo enim quintū genus constituitur) interdum febrem accendit: sicut & acria medicamēta, siue remedia sint, siue deleteria & contraria. Non autem ex æquo omnes hæc ob causas febricitat: quod nec semper illis cōtingat par quantitas aut æquitas causæ: quodq; animantium corpora plurimū alterum ab altero differant. Et enim ad hoc vt accendatur febris in corpore, oportet vt corpus ipsum sit accommodatū & habile ad excipiendam febrem caliditatis: causa autē efficiens existat valida, tempusq; & patientis proximitas fortior, vt vt delictis in actione etiam moris diutius, & passivo corpore superior evadat. Porro causæ quæ in corpore humano præter naturā oriuntur, causæ antecedentes vocantur: præcæriticæ verō, siue evidentes, quæ extrinsecus advenientes occurrunt. Frigiditas etiā plurimū ex illius causis vel: vti frigidiorū propinquitas, alimentorū quantitas atq; qualitas, adstrictio etiā atq; laxatio, oculi deniq; & motus immoderatus, quibus ex occasione constat etiā ipsum ignē extinguī. Prima igitur species causæ occurrentis extrinsecus, siue contactu ipso, siue etiā potentia, solet frigiditatis morbum inducere. Ob secundam verō, nempe ob frigidiora alimenta, nonnullos correptos vidimus attonito aut epileptico morbo, aut alio quopiam modo refrigeratos: id qd ex ebrietate vel maxime accidere solet. Quamq; vinū modicū hauriū, cum familiare alimentū sit, mirè calorem auget. In vniuersum autē omnes optimi cibi, qui animali plurimū nutrimentū adferūt, si supra modum sumantur, frigidos morbos generant: sicut & cetera, quæ natura refrigeratoria cum sint, similiter ingeruntur. Iuxta tertium genus causæ, nempe adstrictiōe, sapissimè corporis habitus etiam refrigeratur: vt quæ interdū sopores graues, vterumq; & apoplexiam inducat. Adstrictiōe autem tunc præcipuè torquetur corpus, dum venæ ipse & arteriæ adque turgent & intumescunt sanguine, vt nullus relinquatur locus in aëre, in quem, vbi dilatantur, ambientem aërem possint excipere. Quo quidem dum defraudantur, natiuus calor subito ferè extinguitur. Proinde qui sic sunt affecti, actum illi defuturum morbum simul & sensu: id qd Hippocrates significasse videtur, dicens, Venarum (hoc est, artinarū) interceptiones hanc vocem eripere. Igitur cordis calor, per meatū gastricus cum ambiente nos adter commercium habet. Quam viam si præclusis, illico præcaueris animal. Calor autē qui in omnibus est arteriis, per cor quidem, quatenus vīa habet ad fances, & per vniuersam cutem, in circumfūū aërem transpirat: ac venientiar quidem, dum atolluntur arteriæ: purgatur verō à fulgine, dum contrahuntur. Atq; vtriusq; horum, naturalis ipso modos seruatur. Si igitur tali motu viciis iudine ob adstrictiōe destruantur arteriæ, necessum est calorem extingui, cuiusq; omnino refrigeratū emori. Ceterū si corpus ceterū fuliginoso excremento attingatur, aut excita bitur febris, aut extinguatur calor natus in vīa: rō halituoso vapore sanguinis, aut fiet corpus ipsum plethoricum, aut eius calor increset. Sed quemadmodū attractio sapius refrigerationis est

causa: sic etiam & rarefactio, vbi plus q̄ ex vīa sit disipatū dispergitur natum calorem, frigiditas efficit corpus. At verò perinde ac attractio ipsa interdum vniuerso corpori, nonnāq; alicui eius parti accidere solet: eodem etiam modo habet & rarefactio. Porro quæ extrinsecus admoventur, partem ipsam raram vel conspissatū reddere possunt. At vincula arctissima, & vīa membrū priuant, & ipsum impense refrigerant. Sed iam de ficiis affectibus opportunitas est vt dicamus. Si quis multo magis distulerit, q̄ pro modo alimētū assumpti, vtaratq; cibis siccioribus, facile in ficiam & gritudine delabatur: præsertim si curis & anxietatibus, necnō vigiliis torqueatur. Sicca etiā terpes aëris, balneæ quæ deficiū vīm obtinent, necnō medicamenta, quæ intus & foris administrantur, exiccamā possident facultatē, similiter corpora extēgant. Humidorū morborū omnes sunt causæ cōtrariæ: nempe maxima ciborū humectantiū collantes, molliscula viuendi ratio, animi summa tranquillitas, ac deniq; balnearum dulciū vīus immoderatus; maximèq; post cibū. Ad idem facit deficiō vīa, pluiarum copia, humida temporis constitutio, ac breuius, humectantia medicamēta. Iam verò causæ cōpositorum morborum, similiter cōpositæ sunt. Si. n. calida simul & sicca in vnum aliquando cōspirēt, calidus simul & siccus sequetur morbus. Idē est cogitandum & in aliis combinationib; . At sapies causæ naturæ similes, corpus ipsum immutat. Ple

tunq; tamen viribus pugnant cōtrariis, ita vt aliquando cōtingat corpus simul fieri calidum atq; frigidum, sicuti & siccum & humidum, plus quā naturæ cōueniat, etiāq; minimè id fieri posse vīdeatur: quoniam inqualis intēpes vocatur. Adverendum autē est rursus, corpora ipsa interdum id solis qualitatib; alterari, quandoq; etiā ab illis qd, sed accedere aliquo affluxu, humido qdē specie, facultate verò non item. Flaua siquidem bilis potestate est calida & sicca: atra, sicca & frigida: sanguis, humidus atq; calidus: pituita deniq; frigida & humida. Quorum humorum singuli, interdum synceri & puri, interdum inuicē mixti, solent in imbecilliorē partē cōfluere: ob idq; tumores partium variatur. Et enim cum quatuor sint facultates, quib; quælibet pars tum animalis, tum plantæ, prædita est: attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix: excrementūq; omne aut qualitate, aut quantitate offendat: nec sit par robur oīm particularum: semper quæ fortior est, excrementum ipsum ad imbecilliorē, ppellit. Omnium autē imbecillima est cutis, totius corporis excrementa recipiens. Afsignatur iam causæ morborum similitudo particularum, ad organicos deinceps nos conuertamus, exordium à formatione vīnati sumētes. Euarat enim interdum naturalis figura, dum ob maximā materiæ colluuiē, aut ob qualitatem incommōdā, impeditur feminis motus, in vtero deprauatur ipsius fetus formatio. Secundō autē potest vīnari alicuius particulæ forma, dum instantes nō rectē ad obstrictibus excipiuntur (facile siquidē pervertuntur, molles flexilib; sunt) aut ruderis in voluuntur fasciæ, aut lac tæ factum surgunt, aut perperam eductur, siue incepta vīctus ratione, siue exercitius intemperantia.

Ee ij

Febri per nos contrahit ex æquo omnibus.

Febri gignenda quæ requiratur.

Causæ antecedentes dicit, quæ in corpore moriuntur: vt præcæriticæ, quæ adveniant extrinsecus. Frigiditatis in modica, causa.

Apoplexia vnde interdum cōtrahitur. Epilepsiam vnde fieri contingit. Vniuersum modicū sumunt, mirè calorem augent. Cibi omnes alit plurimū, iuxta modum sumpti frigidi morbos gignunt.

Arteriarum interceptiones hanc vocem eripiunt. Sufficiens quæ ad accidit. Calorem cordis vniuersam dilatatione arteriarum purgari contrahitur, eorum viderem.

Attractio sapius frigoris causa.

Corfectio quæ ratione & frigore.

Admotæ extrinsecus. Vincula arctissima, vīa membrū priuant.

Sicca intemperantia causa.

Humida intemperantia causa.

Compositorum morborum causa cōposita sunt.

Cōtrariis inter se pugnant corpus autem calidum simul esse potest. Inaequalis inter se potest, quia in se diuisa.

Humorū singuli inter se pugnant.

Tumores partium variatur pro humorū differtis in fluctibus. Facilitati naturalis sunt quatuor.

Excrementum omne qualitate aut quantitate infestatur: semper, à fortiori autem imbecillima est pars imbecillioris partem.

Forma morbi contrahitur à quibus causis potest vīnari.

Crura quippe, ob incumbentiū eis corporū poo-
dis, interdum in exteriorem, nōnūq̃ in interio-
rem partē torquerunt: idq̃ pro natia ipsorū in-
clinatione. Nam quibus rectiora sunt, q̃ ordo
naturę postuler, magna ex parte sunt vatī: vari
autē, quibus magis curuata. Voco enim vatium,
cui in exteriorem partem crura vertitur: variū,
cui cōverso. At posteaq̃ adoleuerit, saepe ob re-
pletionem immo dicam, aut ob alimēti penuriā,
figuram naturalem permittit, idq̃ primaria ra-
tione. Illud enim in elephantiasi, hoc in tabe per-
spicū est. At ob resolutionem neruorū, dūten-
tionem, inflammationē, aut scierhum, naturalia
membrī figura ex accidenti vitantur. Siquidem

In his qui altera parte sunt resoluti, membrū tra-
hitur a musculus actionem facientibus: at in his
quos in altera parte convulsio exercet, aut phle-
gmonē, aut scierhum, aut dura cicatrix, pars sana
trahit ab affectu musculus. Cavitates parnū atq̃
meatus percunt, vel offenduntur, q̃ nimirū coa-
lescant, aut confitentur, aut obstruantur, au. cō-
fringantur, aut in sese cōcidant. At facultates re-
tentitice morus immoderatus, soler esse causa
cōstipationis: quādammodū laxitatis, operatio ex
pultricia immodica, reteriticiq̃ languorū. Exa-
sperantur leuia, & leuigantur aspera (nam hec
ad formā vitiatū permittit) illa quidem ob acres
humores, aut medicamēta abstergentia: hac vero
ob pinguitudinē succi, viscositatemq̃. Secun-
da generis, hoc est, vitiatū numeri causę sunt,
si quidem numerus sit diminutus, sectio, aut pu-
trefactio, aut immodica refrigeratio: sin autē ali-
quid supercreuerit, quod nō sit ē numero partiū
natura constantium, formāq̃ que naturalem for-
natur, abvndantia optimę materie erit causa.

Quod si id ipsum prę se formā nō naturalem fer-
rat, materie qualitas non naturalis etiam erit in
causa. Vtrobique tamē vires validas esse oportet:
alioqui nec conformari poterit qd est vile, nec
extrahi qd vitiosum exiit: natura enim vtrūq̃
colit. Magnitudo parnū augetur (in ea enim
oblecta tertium genus constituebamus) a copia
materie benignę, necnō a potione robore: im-
minuitur autem a hac cōtrariis, vel ob sectio-
nem, vel exvitionem, vel putrefactionem, vel de-
nig ob frigationē ingeotem. Quatū verō
morborū instrumentalem genus quod io prę-
ua compositione consistit, interdum ob repenti-
nam improbiq̃ agitationem contingit: inter-
dum ob articulorū humiditatē immodicā: quan-
doq̃ ob eversionem superciliorū in ipsis articu-
lis: est cūm ob relaxationē compositio vitietur,
quemadmodū in intestinorū lapsū, quę laxato
peritoneo in fororum descendūt. Ex his itaq̃ &
aliis plurimis occasionibus, organorū composi-
tio pervertit. Nunc verō alterius generis cau-
sas examinemus, quod vtrūq̃, tam corporibus
similantibus, q̃ instrumentatibus, cōmunitur acci-
dit: id enim est vniuersis solutio. Quę quidem si
carni accidar, vicus aut vulnus vocatur: sin autē

osā, dicitur vel fractura, vel caries, quæ ab ero-
dentibus oritur humorib. Ad capitis ossa, cō-
plura instituta sunt nomina. Collisio magna ex
parte accidit carni: quantū & in ossa nōnūq̃ etiā
contingit, idq̃ maxime in pueris, subirent ex-

vincularaliquo violento, valido at duro corpo-
re. Ad solutionē etiam continui pertinent & rup-
tio & cōvulsio, hac in neruis, illa in carne consi-
stentēque causam suę generationis habet, repen-
tinum, validum atq̃ inæqualem mortū. Vtigitur
paucis expediā, omnium huiusce generis ægritu-
dinum causę, nōnullę quidem occurrūt extrin-
secus, nōnullę ab ipso corpore emanant. Porro
extrinsecę sunt, et omnia quę percutere, collidere
reque sunt apta. Quę verō a corpore emergunt,
sunt immodice inordinatę animalis motio-
nes, ac preterea humores vitiosi, erodēdus vim-
pōsidentes. Hę itaq̃ sunt simplices ægritudines
similapib. partibus organicis cōmunes: ac præ-
terea ipsarū simplices causę. Compositas autem
ægritudinū causas, nō est admodū invenire diffi-
cile, cūm nimis ex his quas diximus, cōstituantur.

GALENI PERGAMENTI de symptomatum differentis, liber

VI.



Mnis præter naturam affectus, aut
morbus est, aut morbi causa, aut il-
lus symptomata. Est autē morbus, af-
fectus quidam præter naturam, fun-
ctionē lardens. Cæterū differt affec-
tus a morbo: nam ille quidem exstēdit etiam
ad sanos & neutros: hic verō solum circa ægro-
tantes versat, cūm nimirū sanitati cōtrarius cal-
lat. At ab vtriusq̃ dissidet, quod Greci pathos,
Latini passionē appellant. Est enim passio, motus
qui ab altero sit in alterū: ita v agentis motus di-
catur actio: motus verō, eius quod affectum est,
passio. In summa, ipsum affectū, quodammodo
idem quod pan est. Dissert itaq̃ ab affectu pas-
sio, ipsius tantū mononis ratione. Quandoquē-
dem in ipso verti & mutari, preterea alterari &
moueri, passio habet generationē: in eo verō qd
maoet, prorsus affectus consistit. Proprii igitur
affectus dicitur passio iam facta, nō autē que
etiā nū sit. Sed quemadmodū a sanos & ægro-
tis ipse affectus exstēdit, sic etiā & passio: quo qui-
dem nomine a morbo similiter differt. Rursus
affectus ipse, alius quidē naturalē actionem effi-
cit, alius verō evertit & labefactat. Est igitur sa-
nitas, naturalis quidē affectus functionis aurore
morbus autē, affectus præter naturā, oblecta fun-
ctionis causa. At passio, motus est in materia,
qui ab agente sit: actio verō, ipse motus agentis.

Quod autē suapte natura aliquid cōfert ad eius
quod sit generationē, causa vocat: quę quidē &
ipsa multiplex est. Nam materia, vnitatis, scopus,
instrumentū, initū deniq̃ vnde pificitur mo-
tus, hęc omnia causę dicunt. Quę verō nihil cō-
ferunt, sed tamen ab iis quę cōferunt se iungit nō
possiūt, hęc eius sine quo nō, rationē obtinent.
Adverte autē, aliquid fieri per se, idem esse quod
primō ex accidenti verō, qd secundō. Vt, si quis
digito vnū calculū moueat, id quo moueat & a-
bus, per se quidē dicitur mouere primū, ex acci-
dentē autē secundū. Ad eundē igitur modum,
qui affectus præter naturā suapte ratione actionē
nō labefactant, sed per morbos a se produ-
ctos, q̃ non morbi, sed morborū causę, sunt ap-
pellandi. Morbi enim sunt, qui primō lardunt
actio.

Rupia.
Convulsio.

Affectus præter
naturā est tri-
plex.
Morbus est af-
fectus præter na-
turam functionē
lardens.
Affectus et mor-
bus se differt.

Passio quid.
Actio quid.

Affectus quodam-
modo est idem
quod pan.
Passio versatur
in materia.
Affectus consti-
sit in materia
natura.

Passio, ut affec-
tus, ad sanos
extēditur.

Sanitas quid.

Causa quid.
Causa multi-
plex dicitur.

Causa rationū
non sine qua
non, obtinent.
Vnde per se, &
ex accidenti,
quid sit.

Morborum cau-
sa.
Morbi primō la-
dunt functionē

Vatū quī sit,
& qui dicitur.

Vari quī.

Elephantiasis.
Tabes.

Resolutio alter-
re parte muscu-
li, membrū tra-
hitur a reli-
quis, qui in a-
ctione versan-
tur.

Convulsio alter-
re parte muscu-
li, ad si partem
valenti al-
teram trahit.
Cōstipatio
causa.
Laxitatis cau-
sa.

Numeri depa-
natio causa.

Magnitudo par-
tiū quę cau-
sa passio aut
morbus.

Compositio par-
tiū vtriusq̃
vnde accidit.

Enterocolitis ge-
neratio.

Soluta vnitatis
causa.

Caries vnde ge-
neratur.
Collisio causa
causa.

Symptoma est
quod sequitur
morbum.
Symptoma, legi
si sequitur
quod sit.

Symptoms &
passiones mor-
bo quo diffu-
rat.

Symptoma pro
probat distincta,
nil arduum.

*Affectionum la-
sus est duplex,
altera ad ani-
malium, altera
ad naturalem
functionem per-
tinet.*
*Actio animalis
est triplex,
Sensibilis ani-
ma functione est
quadruplex.*

Matris foetibus
variante pro
instrumentorum
diversitate.
Gubernatrix
animo foetus
est triplex.
Sensitiva actus
namque laetitia
et timor et pa-
nor et letitia.

Talium quædam
religiosi sensus,
multis gravibus
afficitur.
Sensus religiosi
à castis, ab ex-
teris contristati
sunt dominati,
adq; ratione ex-
clusi quæ pos-
sident.

Sighe clonati
Simplicia di
voglio vider-
mi.

Talibus est om-
nibus sensibus
communibus sen-
sus.

Matricis facies
lata sympto-
ma est simplex,

a tñionem. Porrò quod morbù veluti vmbra se-
 quitur, id morbi symptoma vocatur: quàm d-
 mum functionis lesio. Est autè symptoma largè
 sumptū, omni & a naturali statu mutatio: ob idq;
 quicquid animalis præter naturā accidit, ea signi-
 ficatio nē est symptoma. Quamobrem morbus
 quādamtenus etiā symptoma dicitur, sicuti &
 causā præter naturā. Differt autè a passionē sym-
 ptoma (ramēsi inuērd in idem coāct) a passio-
 quidem omnino in motu versetur, sitq; interim
 secundum naturam: symptoma verò nō in motu
 tantū, sed in habitu etiā & permanentia est
 possē, omnino præter naturā. A morbo verò
 differt, quoniā nēq; affectus nec cessariū est, nec
 tñionem ex necessitate ledit: quæ sanē ad con-
 sistendum morbū desideratur. Porrò sympto-
 mata propriè stricteq; sumpta (de quibus agere
 est animus) differentia triplici conueniunt. Alia
 siquidem nostri corporis sunt affectus, alia fun-
 ctionū lēsiones, alia ambo hæc comitantur: vt
 sunt excrementorū immo dicitur vt excretiones,
 tum suppressiones. Cæteri sub actionis lēsione,
 priuatio quoq; mihi inadiutur, quemadmodū
 immobilitas, insensibilitas, atq; cruditas: quæ
 quidem actionū lēsiones sunt. Hæc igitur sympto-
 matū differentias deinceps examinamus, ab ac-
 tionis lēsione auspiciat. Actionū lēsio duplex
 est: altera enim ad animalem, altera verò ad na-
 turalem functionē pertinet. Actiones siquidem
 duplices possumus numerat, naturalis videli-
 cet & animalis. Rursus animalis diuiditur in sen-
 sibilem, motuū atq; gubernatricē. Quorū mem-
 brorum singula rursus in alia scilicet. Sensibilis
 quippe animæ functio, quinq; differentias sorti-
 tur, visum scilicet, olfactoriam, gustatoriā, au-
 ditoriam, atq; tacticem. Motuū autē facultas,
 cūm vnicui iustrumētū habeat, vnum tantū
 habet motuionis modū: variatur tamen pōt
 particulariū in strumētū diuersitate. Vltima fun-
 ctio animæ, quam diximus esse gubernatricem,
 in imaginariā, ratiocinatricē, ac deniq; me-
 moratricē diuiditur. Igitur noxæ omniū actio-
 num sēnēdi, communes quidem vniuersalesq;
 sunt, insensibilitas, & difficultas sensus: particu-
 lares autem, quæ in singula sensibus repetuntur:
 quemadmodum in oculis cæcitas: & Caligo:
 in auribus surditas & hebetatio: atq; in aliis
 similes, vbi videlicet aliquid abolitur, aut depra-
 uatur, aut diminuitur. Cæteri tactus in actione sua,
 quā reliqui sensus, multo grauius symptoma,
 cūm ab extrinsecus occurrantibus, tum vel maxi-
 mē ab affectibus interioribus, solet recipere.
 Etenim alij sensus non ab internis, sed ab externis
 affectibus, in functionibus suis consistuntur:
 ac ne id quidem per se, sed ex accidenti, quod vi-
 delicet in se habeat facultatē tangendi. Est enim
 tactus omnibus sensoris sensus quidē communis:
 reliqui verò quatuor, sū quilibet tantum est pro-
 prius. Quamobrem oculi quæsiuū graui dolore
 cruciantur: committat sensu tangendi. At verò vigi-
 lia & veteremus, sunt ipsius communis sensus sym-
 ptoma. Moticia facultatis triplex reperitur sym-
 ptoma: immobilitas, diminutus motus, ac deniq;
 deprauatus. Cæteri deprauatus motus, ali-
 bus tremulus est, aliis conuulsus, aliis palpi-

tari, alius deniq. vibrā. Porro si cōvellerur vnt
terum corpus, animēq. princeps potētia simul
fit ipe durā; id symptoma epīlepsia vocatur: ap
plexia autē, dum totius corporis perit omnio
motus, simily princeps scōiones cohuit.
Hæc itaq. monuā actionē sunt vitia. Proximē
ē, vt gubernatricū functionem illi offensas tra
damus, ac primū imaginatricia. Hæc enim inter
dum tota corrumpitur exoluiturq. quæ modo
dū in catalepsi interdū aut vitatur, vt in delirio
ē cūm deficit atq. debilitatur, qd in lethargo
tingit. Sic etiā ratiocinatio, nunc exoluitur per
tus, ipsūq. symptoma ē et mentis: nunc deficit
totū remittitur, vbi arq. id symptoma fatuū ē
nunc leditur ac deprauatur, qd symptoma vocāt
delirium. Plerūq. siquidm in vniq. simul cōsit
tur delirium, tum parum probē imaginatio, tum
parum aptē ratiocinatio. Est quidō durax et in
alero. Interdum quippe ratio vitatur, imaginatio
enim simul atq. memoria illa. Quæ modo
etiā ratione integrā, cōtingit tum imaginatiōē,
tum memoriā vitari. Quod autē in memorandi
potentia consistit vitiā, nemini opinor obscu
rum. De animalium itaq. actionum symptoma
dictum nobis cūm sit, ad naturalium sympto
mata examināda nos convertamus. Methodus
autem eorum inveniendorum ē, ad naturalium fa
cultatum cognitio: in quarum singulis duplex re
peritur symptoma, alterum abolitæ functionis,
alterum nō ritē obire: quod quidem hoc ē du
plex: alterum quod in diminuta, alterum quod
in vitia actione cōsistit. Exemplum autem po
nā in cōcoctione ventriculi: quæ interdum
quidem tota corrumpitur, interdum remittitur
ob imbecillitatem, interdum vitatur. Quorum
primū symptoma dicitur cruditas: secundum, cō
coctio nīs raritas: tertium præuitas & vinū vo
catur. Porro appetitiuæ functionis symptoma
sunt, abolita appetentia, & immodica cibi
cupiditas. Cuius nutritionis actionem, si scopum
minimē attingit, atrophia & phthisis accidit.
Vitiatam verō nutritionē sequuntur, leuce, o
phiasis, alopecia, & reliqua id genus symptoma.
Cūm igitur naturalis facultas sint quatuor
attrahitrix, retentrix, aliteratix, expultrix, sanē in
singulis naturalibus organis, quatenus natu
ralia sunt, duodecim oriri possunt symptomata: tri
bus videlicet in vniq.que facultate & animalis: in
animalibus verō, quodcūq. Quod si cōueniē
instrumentum simul & mouendi & sentiendi vi
res obineat, duodeviginti symptomata for
mas habere poterit. Ventriculus igitur duode
cim fortiter symptomata, quatenus est cōcoctio
nis organū: totidēq. quatenus pars similis,
quæ nutriti desiderat. Siquid omnes particule
quæ nutrimentū succipiunt, duodecim recipiunt
symptomata: nēpe tria (vt diximus) secundū sin
gulas facultates, vbi videlicet aut nihil trahunt,
aut languide, aut vitiose: vbi id qd attrahit ē
aut nō retinet, aut languide, aut vitiose: vbi qd
iam retinuerunt, aut penitus crudum relinquunt,
aut dimittit concoquunt, aut in alienam quali
tatem cōvertunt: vbi excrementa ipsa expellere
nequeunt, aut languide, aut perperam: hoc ē
dixi, aut tardius, & animalis exordit. Ex animalis

Morus depra-
mati specios.
Euphorbia yuccif.
Aprolanta.

Imaginative
faculties sym-
ptomata.

Rafinescinatri-
 cu facit ad
 fymptomata.
 Ammonia quid.
 Patulac.
 Devisum.

Ratione inter-
di vitari, una
gradatim, ali-
mentis ali-
mentis ali-

Naturalium
facultates sin-
gula duplex tri-
buitur Simplici-
ma, nempe &
abolita fun-
damentum, & non
rursus obita.

Ventriculi afflic-
ti symptoma-
ta sunt, crudi-
tas, conculio-
nis tarditas
praeterea.
Appetitus fa-
cilius sym-
ptomata.

Nutritiois de
Eorum Jypro
mata.
Facilitate ad
nirale fund

quatuor.
Naturalium in-
strumentorum
singula, duode-
cim attribui
symplicia.
Animalis in-
strumentis quin-
decim esse
posse sym-
plicia.

Similiter par-
ticularis singu-
lis quæ nostris
mentum infici-
pant. Unde
cum attribuitur
tur Symptoma-
ta.

*Spiritus anima-
lem a cerebro
demitti ad o-
cul.*

liquidò cõstat, spiritum aliquẽ animalẽ accerebro-
demitti ad oculos. Si igitur pupilla amplior fue-
rit, spiritus implere illã nõ potest: quare disundi
ipsam, dissolu, dissipariq; est necesse. Si verò an-
gustior, cogitur, & cõstringitur, ac densior fit spi-
ritus. At coactus spiritus cõstringit, ad facilitate
sensu conductit plurimũ. E diverso dissolutus
dissipatusq; sensu diffcultatẽ inducunt. Est aut
albugineus humor velvni pugnaculum crystal-
linu, cuius etiã nonnullũ essentia suat. Quobõrẽ
si imminuat quodammodo, ipse crystallinus a-
refcit, ac super ipsum rhagoides tunica corruga-
tur, & cõcidit, sic vti visio oblectatur: nimirũ
externo lumine q; exiguit mediũ humor crys-
tallino occurrente. Iã verò instrumentum visus, si
extra tactu toleratẽ splendor nõ potest: ob idq;
rhagoides tunica illi est obiecta, nigra existens
simul atq; cereulea, quibus colorib; oculis potis-
simum creatur, quẽ in festinat splendor. Verũ
coarctario pupillẽ, quẽadmodum amplitudo, ita
quidem ab humiditate superflua trahat oriũ, faci-
le sit: fin verò a siccitate quãdã inexpugnabili, de-
speratã cõratione fortitur. Porro si rhagoides tu-
nica ita sua cõmunitate soluitur, vt tenuis ille hu-
mor probatular ad exteriora, maxime visio labẽ
faciatur. Ad hæc, si humor ille albugineus scipso
crassior fit redditus, exactẽ cernendi, aciem mul-
tò obtusiorẽ reddit. Quod si plurimum aucta sit
crassitudo, visum omnino prohibebit. At si non
totum foramen a cõtento ibi crasso corpore ob-
tinebretur, sed relinquatur eius aliqua particula
pura, videre licebit, per illã externas res, idq; ni-
hilo deterius q; antea: sed vnam quamlibet et solã.
At si in pupilla cõtento exiguũ consistat suffusio,
mãbeant partes quẽ in circuitu sunt, purã: qui
sic sunt affecti, quicquid aspiciunt, id velvni scie-
stratum putant. Vbi verò humor inter crystalloi-
dem atq; rhagoidem medius, propriũ colorẽ
mutat, si quidem ad sũsum declinet, arbitrarẽ
ẽt quis se per nebulã, vel per fumum etiã vide-
re. Sin alio quo vis colore inficiatur, huius quoq;
imaginem, ea quẽ spectantur, referent. Præterea,
quibus adeo absoluta est cernendi facultas, vni
minimũ quidem visibiles eos latere possit, si va-
pores a ventriculo sursum ferantur, sed et sympto-
mata suffusioni similia infestabũt. In vniuersũ
autem, vel parua, vel magna symptomata accē-
dunt, pro ipsius magnitudine aciem. Cui spiritus
animalis simul & multus fuerit, & æthereus,
res quẽ porro distant, & videre, & discernere
potest. Cui verò paucius quẽd fuerit, sed purus,
ita vt res propinquas planẽ discernit, sic distantes
haudquãq; videt. Quod si humidior simul fuerit
& multus, res distantes videt quidem, sed nõ ad
vnguem discernit: quẽadmodum cui humidior
simul fuerit & exiguus, is neq; exactẽ, neq; porro
videre põt. Ceratoides tunica pars illa quẽ pup-
illẽ est obiecta, si crassior densiorq; sit, aciem he-
betem reddit. Si verò humidior densiorq; fuerit,
non modo reddit visum obtusũ, sed etiam effi-
cit, vt quisq; est affectus, putet se tenebras, aut
nebulã, aut vaporem, aliquem, aut per fumum,
res ipsas cernere. At si humores nõ multitudine,
sed colore peccauerint, secundum eiusdem colo-
ris naturam ipsa circũspectantia oboneatur. Proinde

qui morbo regio laborant, quicquid vident, id
pallere aut imitantur. Quibus autem ea ceratoidis
pars infestior vicerata est, aut vulnẽtara visque-
adeo, vt ipsũ vulnũ ad interiora pertingat, si
magna ex parte ob cecantur. Vdi tamen quicquid
puerum, cum iuxta pupillam punctus fuisse sit,
lo, sic vt aquosus humor efflueret, ac tota omni-
no cornea corrugeretur, visum (incredibile ap-
piã) te cuperalẽ, instaurato scilicet paulatim hu-
more qui per vulnũ effluerat. Solutũ etiam cor-
neẽ ipsius corrugatio. (qualis scilicet cõse-
cũs solet semper accidere) simul est visum offen-
dit. Cæterum si pupilla simul sit infumata, scire
licet, aquosũ quoq; humorẽ imminutum exi-
stere: sin verò aqualis permansent, ad solã cere-
toide affectus pertinet. Corneẽ igitur morbi,
si fuerint magni, in totũ visum impediunt:
maximẽ si vel phlegmone, vel suppuratione, vel
scarcho (quatenus instrumentũ est) infestetur, in
hærens verò membrana phlegmone obiecta, ex
accidenti quoq; impedire potest visionẽ. At chy-
mosis, vnguisq; nõ ex accidenti, sed prima ra-
tione pupillã ipsam obscurat: quemadmodũ ge-
narum ingentes tumores exten-
natum auditu surditatq; animũ æteriter solent, aut
ob auris partẽ aliquã, aut ob nervũ a cerebro de-
scendentẽ, aut ob cerebrum ipsũ, si ea in parte,
vnde nervus oritur, affectum fuerit. Igitur nervi
cerebriq; offensa in his, haud aliter quã in o-
culum affectus, accidit. Reliquarum verò par-
tium noxã, illis ad portonem respondentẽ: ve-
rũ non omnino similis læsio exiit. Partes ita;
sunt ad auditum pertinentes, quatenus similes res
oculo, nõ ut temperatus vexantur, ac præterea
soluone cõtinuũ: quatenus autem instrumen-
tales, tum hæc, tum obstruccionibus invadun-
tur, ob tumorem aliquem præter naturam, aut
ob sordem obturantem auditorium mearum.

Cum autem lingua sit duplici facultate prædi-
ta, ac per vnam quidem sentiat, per alteram vo-
luntate moueat: contingit samẽ ipsam aut mi-
nimẽ sapores percipere, aut depravate: idq; ob
tunc, quẽ illam involuit, vel corporis ipsius,
vel mollium nervorum, vel eius cerebri parts,
vnde illi exoritur, affectum aliquem præter
naturam. Etenim depravata saporum digno-
tio, vbi lingua alieno quopiam humore fuerit imbu-
ta, evenire consuevit. Nam quemadmodum per
suffusionẽ ipsa visoria facultas foris videntur ea
cernere, quẽ in oculo apparent: ita & gustan-
di vis, internam linguẽ affectuẽdum rebus sen-
sibus tribuit: quemadmodum etiã, vbi sonum
aures percipiunt, nulla re extrinsecus obstrepen-
te, sed ipsa circa membranas motione, phantasia
transmittente. Quod verò spectat ad ol-
facticam potentiam, odorandi sensoriũ est prin-
cipium anteriori cerebri ventriculorũ: inferius
autẽ a nasũ odoratũ simul & respirationi. Si igitur
vel cõstutur ipse, vel eius obstruat me-
tus, idq; vel ab humore aliquo, vel a tumore præ-
ter naturam, olfactendi facultas vel minus pro-
bẽ odore percipiet, vel eos omnino nõ sentiet.
Obstrucciones enim osium colatoriorũ, præ-
terea, cerebri membranas, atque adeo illẽ
quẽ in processibus anteriorum cerebri venti-

*Illis patet
omnis obiecta
pallere.*

*Visum recipi-
tate potest,
cum albugine
humor infestus
si sit, vnde quid
omnino corne
gubatur. Cũ
nũ visũ
obstruat*

*Chymosi.
Vnguis oculi
infestus
Auditu sym-
ptomata vnde
proficiantur.*

*Lingua in
duplex facultas
tatem, cõstimen-
tem atque in-
strum.*

*Castidi vbi
quarum partium
affectus
corrupti, aut
mutati possit.*

*Odorandi fac-
toris esse prin-
cipium anteriori
cerebri ven-
triculorũ.
Nasum inferius
re a nasum
respirationem.*

*Obstruendi vbi
a quibus solent
labefieri.*

*Rhagoides tu-
nica vni.*

*Pupilla coar-
ctata quãdã
facilitat quãdã
de opor cerat-
toide, magis.
Rhagoides solu-
tio quãdã vi-
sum emittit.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

*Obiecta quãdã
de frustrata
videantur.*

culorū oriuntur, ac deniq; insignes dictarū partium
tum contrusiones, tum sectiones, olfactricē
vim maximē labefaciūt. Ob intemperiem etiam
ipsarū partium, solum fieri olfactus vitiosus. Por-
rō tactus (qui sensus cōmunis est omnibus pat-
riculis sensibilibus) varia symptomata recipit: in
ter quæ annūmeratur tū hēmodia, tum torpor.
Est enim hēmodia densū stupor, qui ob acidus
acerbōsq; cibos magna ex parte oboritur. Tor-
por autē in toto corpore cōtingere solet, ex sen-
tendi mouendiq; difficultate affectus quidam
cōpositis. Qui quidē manifestē videtur tum a re
frigeratione, tum a compressione corporū ner-
uosoꝝ, ac deniq; a torpidius marini animalis
contactu, procedere. Vbi verō citra aliquam hu-
iuscemodi causam vitrō torpor accident, tūc vel
vitæ ignauiam, vel ciborum multitudinē, crassi-
tatem, lentitudinē, aut soline secretionis suppres-
sionem intercesse necesse est. Igitur eius causā
cōmūta, affectus nerui est talis, vt facultatē illi
a nūncipie parte missam impedire possit. Atqui
impedietur, si neruus meatu aliquo peditus, vel
obstructus sit, vel compressus. Si verō meatū nō
habeat, sed vti Solis radij per aquam, aërem ve
transueant, eodem modo facultas a principio per
neruorum corporā permittit, ipsa in transitu præ-
pedietur; si ad immo dicam crassitudinē neruus
ipsē pervenerit: id quod illi cōtingit, aut trāsus
viciditq; succus nutritio, vel violēto frigore per-
frigerato. Torpescunt enim nerui, vbi vel la-
queo, vel manibus constringuntur: aut extrinse-
cus a vicinē partis phlegmone, vel scirrho com-
primuntur: aut vbi luxurie fractivæ osibus sunt
archores. Principio igitur stupidi fiunt, deinde
omnino & sensum & motum amittunt: quod vi-
tium ipsorū, dicitur paralysis, a torpore sola
magnitudine differens. Quod si omnes occupave-
rit neruus, repente vniuersum corpus sensu &
motu priuabitur, succedēte citissimā morte, q̃
prohibita sit respiratio. Si spinæ principia læda-
tur, solæ partes capitū, quoad vixerit animā, &
sentire & moueri possunt. Si tamē cerebro quoq;
noxa ipsa acciderit, qui sic afficiuntur, iis omniū
partū perire simul & motus & sensus. Viuere au-
tem possunt vtriq; tanto tempore, quanto viuūt
ij qui p̃xocati strangulātur. Spina verō in in-
feriori loco affecta, nempe sub ea neruorū pro-
pagine, a quibus thorax atollitur, si quidem in-
gens fuerit affectus, partes inferiores omnes sub
iō & sentiendi & mouendi facultate priuantur.
Si verō nō ita vehemēs affectus videatur, stupor
vem in ducet. Angi hūc morē effugiūt, quando
quidē in ipsis respiratio seruatur. At quibus quin
ta spinæ vertebra affecta est, eorū manus omni-
no & sensum & motū amittunt. Vox autē omni-
bus illis perit, quibus ea spinæ pars que in cerui-
ce est, fuerit insigniter læsa. Porro qui nerui, dum
rectē valent, facultatē sentiendi suppeditāt, iidē
lædi ipsam si affectu fuerint. Cæteri cū partes
aliquæ per quem neruū volūtariē mouentur, per
eundē sentiendi quoq; vim habeant, duplex ne-
cessariō noxa orietur ex ipsius nerui affectu: qua
rū altera quidē sensum, altera motū impedit. In-
terdū tamē quarundā partū motus voluntarius
exoluitur, sensu prorsus illico sicviti ē cōverso e-

tiā contingit sensum perire: in oculis functione
mouēdi: vt in lingua & oculis planē videre licet,
ac breuiter in omnibus partibus, quæ per diuersos
neruos, hoc est, molles & duros, illas facultates
recipiūt. At in quibus mēbris duri duntaxat
nerui inveniuntur, per quos vtraq; facultas de-
ferretur: ex ipsorum vehemēti laxione functiones
āmbie labefaciūt. Nam si ablata cutē subiectus
musculus, qui nudus est, videatur immobilis, sen-
tiat tamē rigentes, exiguū est accidisse noxā putā-
dū est: nempe q̃ tantā animalis facultatis partē
fuisse perit, quāta ad sensum excitādū sufficit: ad
musculi verō motū, nō itēm: quippe tangēdi sen-
sus, partē aliquā, potius agere, deprehenditur:
promde ab exigua facultate sancho eius perfici
potest. At musculorū motus in agendo, nō in pa-
tendo, actiōnis efficacitā possidet. Is enim totū
corpus transerre debet: quibōem plurima in-
diget facultate animalis. Delectatio autē & dolor
omnibus accidit sensibus: sed in oculis minus q̃
in cæteris euidētē perspicitur: in tactu & gustu,
luculentissimē: ab iis dēncēps in odoratu: atq;
hūc tandem auditus sequitur. Ii verō affectu
præter naturā violentē a sanāq; incidens, dolo-
ris (vt Plato inquit) est causa. Vbi verō corpus
ad naturalem habitum redit, idgratius affatim,
oboritur voluptas. Porro vehementes eueniūt
in tactu a naturali habitu transformationes, et
violentem calidū frigus occurrit: atq; ob eas
res, quæ cōtundere, laxare, extendere, aut erode-
re possunt. Nam facilitas humorū, nisi calori
frigoriue iungatur, occurru suo inferre vim mi-
nimē cōsueuerunt. Cæteri scitio & rapio dolo-
rē inferi, nō vbi facta est (vbi forte ex accidentē
aliquo) sed vbi etiam num sit. Iam instrumentū ga-
standi, quatenus habet facultatē tangendi iam
dictis causis diuellitur: quatenus verō ad gustū
propnē pertinet, ab amara, acida, acerbis atq;
acribus: quandoquidem horū singula connū-
diere possunt. At a humoribus acerbis resolu-
ti vapores, vim olfactricem infestant: nam &
ipsi connūdi diuellant. Auditū vox turbat aspe-
ra, grauis, maximiq; & celerrima: quæ admodū
omnis violentus strepitus. Vñum autē, illustrissi-
mi splendoris offendit corruptūq; ed quod
nimis disgregat. Passio itaq; molesta quatenus
dictū est, omni in omnibus sensibus solet: delecta-
tio autem illi aduersa, a cōtrariis nascitur causa.
Eremim vt coruleus color iucundissimū est oculo-
lis spectaculum, ita splendor candidus, qualis in
sole cernitur, maximū ipsi dolore inferre posse-
rit. Post hos secundo loco molestus quidem est
color albus, delectat verō fuscus: nam ille visui-
cam essentā dissoluit, hic eam cogit citra violē-
tiam. Color siquidē niger hoc nomine visum
essentia aduersatur, q̃ cogat ipsam violentius,
quā vt eam reducat ad naturalem habitū. Cæte-
rum id quod nigerrimū est, splendissimū mi-
nus visum offendit, quia crassior cōstat substantia,
ob idq; minus efficaciter agit: cū nimirum
omnis res tenuis crassam achnitue superet. Sic
igitur sol valde tenuis cū sit, protinus visum
dispar. Quare si quis diu in dissimissimis tenebris
versatus fuerit, postea luci restitutus, occipiat
tur is quodāmodo. Meritū itaq; coruleus color,
vt visio-

Tactus inquit
omnibus sensibi-
lissimus.
Hemodia vero
de projecta-
tur.
Torpor afficitur
compressio, &
quibus causis
oriatur.

Nerui ipsi sine
no foraminibus
prolati, ac mi-
nime, Galenus
habet.

Paralysis est tor-
por sola mag-
nitudine diffe-
rens.

Id est
vbi

Spina quædam
vertebra affec-
ta, res illi ma-
nus.

Vbi quibus pe-
rit.
Motum quædam
partes priu-
antur, quibus
sensum illi
vixit, id quod
accidit in omni-
bus partibus
que per diuer-
sus neruos
vtriusq; facultas
tam recipiunt.

Tactus partem
debetur potius
quam agere.
Tangendi fun-
ctio est ab exi-
gua facultate
sancho potius
potest.
Delectatio &
dolor quibus
sensibus tamē
adfectu.
Voluptas quæ
habet.

Dolorum nec sit
citius, nec homi-
nibus infert pro-
pria ratione.

Costandi susce-
ptum a quibus
nō afficiuntur.
Olfactum au-
tem vapores in-
festant.
Auditum quæ
obstant.
Visum quæ of-
fendunt.

Coruleus color
est optatissi-
mus oculis.

Niger color
quæ ratione
sui aduersatur.

Tenuis res om-
ni, crassam a-
chnitue superet.
Sic igitur sol
valde tenuis
dispar.

vt vifioni lucundiffimus eft, ita maximè quoq; præbet vilitatē: fed nō illi, quæ à folè difculfa fuerit. Huic enim vitiope iam ægrotanti, cōtrarium remedium (videlicet color niger) eſt adhibendū: ei verò quæ fenu, fed fatigata eſt, color cœruleus, fuſcuſq; ſaluberrima ſpectacula cuſtunt. Porro fuſca color, ex albo nigroq; contemperatis uacitur: cœrulea verò, vbi candor ſplendori iun- ſcitur, non ita parum in nigrum degenerat. Mediū quidēmod moderatūq; colores (vt inquit Plato)

ex contrariis invicem confuſis oriuntur. In audi- tu verò nō malè affecto, vt iucūdiſſima vox cen- ſetur quæ & leniſſima & tardiſſima eſt: ita aſper- rima, citiſſimiq; maximā inferre ſolet moleſtiā. Vbi autem fatigatus auditus fuerit, præter lenē ad tardam, exigua quoq; eſt amica. At cū ægro- tati, leniſſima ſimul & tardiſſima, atq; per quā ex- giga, iſſiq; multo magis abſolutum ſilentium.

In hoc ſenſu manifeſtus conſpicitur delectatio, quia craſſior conſtat eſſentia: manifeſtiſq; ad- huc quā in hoc, voluptas percipitur à ſenſu ol- faſtus, quod ipſius quoq; eſſentia ſit craſſior. Et enim vt aër ſplendorem craſſitudine viuic, ita vapor (qui extenuatus eſt humor) aër craſſior cuſtit. Atqui ſplendor ad videndi, aër ad audiē- di, vapor ad odorandi ſenſum perſinet: quem admodum ad guſtum, natura humidā: ad tactū verò, ſolidū corpus. Guſtus igitur, cū à natura- li haberi nō declinat, maximā voluptatē adferūt omnia ſucci dulces, pinguiſq; ceu corporis eſ-

ſſentia familiaris viſi. Si verò ab aliquo ipſum in- feſtante nuper vitii cōtraxerit, pingui. Nam q̃ exaſperatas partes maximè lenire conſuevit. At vbi iam morbo afficitur, tunc ſucci contrarij iſi qui morbū excitarit, delectare videntur. Venti- culus etenim viſceribus & venis inſeruit, huius- modi ſuccos appetens, quales illis ſunt necesse- ri. Pececat tamē iudiciū lingue, quæ iſ poſſi- mum delectatur ſuccis, quibus ventriculus indigere videtur. Cōſenſus aut huiusmodi poſſima

cauſa eſt, veſtiens ipſam membrana. Porro odo- randi vis, q̃ ad ea pertinet quæ extrinſecus vel voluptatē, vel moleſtiā adferūt, guſtandi ſacul- tati proportionē reſpondet. At vapores qui in- trinſecus continentur, ſi moleſti fuerint, poſſunt ſenſu percipi: ſuaves verò & omnino delectabi- les, ſenſum latent: quādamodō in viſu quoq; & auditu, qui in ſe nullam paſſunt vehementem affectū. Delectamur in id genus ſenſibus, ad natu- ralē habitū redeuntis: hoc natē ſit per idonea cō- traria. Idem autē voco id, quod primariū & per ſe, nō per mediū alterius rei interuentū, fue- rit effectus cauſa. Quare procatarijſq; cauſe im- præſentatū ſpectandæ nō ſunt. Iam verò genita- les partes proprio quodam & eximio ſenſu aſſi- ciuntur, vnde & valiſſiſſima prædita ſunt ſacul- tate, expulſitque quidem ſemina genitalis, in ma- ſculis: in feminis autem tum hæc, in teſtibus & ſeminaris vaſis, tum attrahitque per totam vte- rum. At genitalis ſemina tum excretionem, tum

comprehentionē, ingens comitatur & cupiditas & voluptas. Moleſtia autem quæ ex eundem- de atq; intra recto ſemine oritur, paulatim & lon- go temporis tractu increſcit. Nulla autē eſt pars quæ vel adeo excitat ſentiat, vel principium par-

tium vitæque pro ſuarū affectū nō modo perinde afficiat, atq; ordiſum ventriculi, qui ſtom- achus appellatur. Siquidem ſyncope, cardialgia, dyspnœa, apnœa, morſus, epileſia, delirium, in- ſania, huius partes occasione evenire ſolent, idq; conſortiq; lege. Abolitam verò, diſſilem, & de- prauatam appetentiam, ipſa per ſe ſuſtinet. Abol- itam voco appetentiam, dum quis nihil omnino appetit: diſſilem, eam quæ eſt imbecilla. At deprauata, partum ad immoderatam cibi potio- nisq; exhibitionē vertitur, partum ad alienæ qua- litatis deſideriū. Etenim cum nutritio nā ſuſcitio uō vitalis, ſed naturalis ſit: haud aliter in anima- libus q̃ in plantis perſicitur. Idcirco animalibus vice terræ ſubſecit natura ventriculū, vel vt promptuarium cibi. Addidit inſuper facultatem quæ penuriam ſenſuret: vt animalia ad cibum po- tionēque excitata, eodem impleantur tempore: vocaturq; huiusmodi plenitudinis deſideriū app- etentia. Hæc ortum habet à penuriæ ſenſu, cum venæ ex ipſo ventriculo trahunt, vel vni mulgen- tes, ſugentēq; igitur ſuctu ſonis ſenſus eſt fames.

Primū itaq; ſymptoma omnium eſt inanitiſ. Se- cundum eſt inanitiſ partū naturalis appeten- tia. Hanc ſequitur per venas, quæ porriguntur in ventriculū, ſuctio. Deinde ſuctioſis ſenſus. Po- ſtremo ipſa animalis appetentia omniū vltima. Quam ſane funciō nē aboleri conuagat, ſi vel ſi ſuctioſis ſenſus pereat, vel ſuctus non fiat, vel cor- pus non inanitur. Imbecilla verò erit, ſi tam di- ſtēſ affectuones accedere proximè ad abolitiōē videantur. At deprauata ſit appetentia, ſi vhe- menter modum excedat: vocaturq; à nonnullis canina, vbi vel ob acidi humoris vinum ventri- culus mordicus inſeſtat: vel dum totū corpus exhauiſtum, aſtūda nutritione indiget. Quip- pe frigidi humoris vinum, roſiou em quæ ſuctū proportionē reſpondet, inducit: ac appetentiā, non aliter q̃ naturale paſſiema, excitat: magis ta- men cibi q̃ potioſis deſiderium aſſert, idq; pro- pter refrigerationem. Si verò ſali aut bilioſi hu- moris vino ventriculus mordicationē ſenſerit, potio nem magis quā cibum deſiderabit. Itaq; ad excitandam famem frigus in ventriculo non parū conſert. Inter poſſiſſimas autem cauſas, qui bus fames impeditur, calor ànumeratur, vi qui ſolida quidē corpora laxando diſſoluat, atq; ad attrahētiſ functionē reddat imbecilliora: ha- mūdā verò fundendo, ſupra modū extendat. Pra- uas autem qualitates appetunt q̃, quibus ventri- culi tunc ſunt prauo aliquo excremento imbu- tē. Qui affectus eſta, ſeu pica dicitur, & mulieres vitiſſis ſuccis reſertas inſeſtare cōſuevit, præci- piè vbi vterus geſtat: quāq; vins etiā cōſue- quū accidit, vbi ipſi quoque vitiatū humorē ad oſculū ventriculi cōſuunt. Similiter circa potū accidit quā priuatio appetitē, vbi corpus nul- la omnino eget potione, ob frigoris atq; humo- ris exceſſum: vel ventriculus propriū affectū nō

non ſentit. Deficiens verò appetentia apparet, vbi hæc eadem fuerint imbecilliora. At deprau- ta potioſis cupiditas, deprauatæ appeten- tiæ ciborum proportionē reſpēdet. Siquidem immo- derata potio appetitur, quando contenti in ven- triculi tunc vitioſi humores, aut ſali ſunt, aut

On ventriculi quorū affectū conſortiq; lege & propria nature ſit cauſa.

Nutritioſam functionem ad aliter perſeſ in animalibus quā in plantis. Ventriculi promptuarium cibi. Appetentia quid.

Fames quid.

Appetentia quando aboli- to vel imbecil- lant reddo, vel vitiatū contin- gat.

Cauſa app- etitū à quibus cauſis perſi- ſtat.

Vergit ſucci appetentiā cau- ſant.

Sitū ſaliſi hu- mori atq; bi- liſi genant.

Fames cur à ca- lori impedia- tur.

Cista morbum quæ maxime inſeſtat.

Appetentia potio- ſis quibus decaſſi aut perat, aut ad- minatur, aut de- prauatur.

Color niger, ſe- ſum, cœruleusq; diſſerentia: nō- bus ipſiſi re- ſu conſeruat.

Calores medi- ſ, ex diuerſis in- uicem conſuſis oriuntur.

Anditus bene affectus, & agra- te, quæ vocat ſunt inſeſta, & quæ geſta.

Senſum qui manum volu- ptate fruſtat, & quæ craſſi- ora obſeſta poſ- ſident.

Vapor eſt exte- nuatus humor.

Quāto quo- ſuſto delectat.

Triquet ſucci, ex aſperata ſe- ſionat.

Ventriculus in ſenſu viſcerib.

Oderendo vi- ſ, vapores quid- ſubſtant, ubi- ſunt granet; ſimiliterque vero delectabiles ſunt, ad lactem. Senſus iſta ſe- nſum aſſeſſi- ſtumentem paſſantur.

Genitalis in- ſeruitur vire. Senſum excre- tionem compre- henſionemq; re- ſtatutur ingreſ- ſu capiditas, volo- ptas.

Moleſtia ex re- ſtione ſemine. On vitriculus ex quodammodo eſt ſenſu præditi.

biliosis interdum etiā, cum veluti feruet in eo natura ipsius humiditas. At prauis potiones nonnulli appetunt, pro vitio humoris, qui in ipsis vinct, ratione. Est præterea & aliud symptoma nonnunquam osculum ventriculi infestis, nempe cardialgia vocata, quæ à mordacibus saccos oritur. Bulimos etiā, siue inexpleribiles fames, symptoma est eiusdem particule, ubi penuria, imbecillitate, atq; refrigeratione afficitur. Murandum autē nō est, si ob oris ventriculi affectus, animalia maxime videntur vehementissimis affectibus assigilatur, cum namque pars illa per nervos quidem cerebro, per arterias autē cordi, vicino sibi, suas offensiones cōmunicet. At verō singuli sensus in singulis particulatim instrumentis à sensibus alterati, perficiuntur. Hanc verō alterationē pars alterata sentit, quod à cerebro suscipit facultatem, quæ ad ipsam per nervū derivatur. Quippe cerebrum nō vti sit sentiendi instrumentū, sed vi sensum in instrumentis vim sentiendi largiatur, ut natura instrumentū est. Nam quod singulis animalis partibus per nervos sentiendi facultatē transmittit, liquidō patet, ubi nervus aliquis est dissectus. Si quidem pars ea in qua nervus ille distributus est, protinus sensum amittit. Taceo sensus inter dormiendum, aut ociosis omnino esse, aut debilitari agere: quod tunc exigua facultas à cerebro in reliquis partes destinat. Quærit itaque per somnum animalis facultas, naturalis autem validius operari videtur: cum tunc cibum multo melius coquantur nō in ventriculo modō, sed etiam per vniuersum corporis habitū. Est etiā ratio consona, illud animalis membrū, in quo anima rationalis, veluti arca habitat, aliquando quiescere. Cor siquidem exigua admodū habere quiescere videtur, quod longiori nō magnopere indiget. At res aliter se habet in cerebro: quod quidem per vigiliis officio suo semper fungitur, per somnū vero senatur. Quamobrem profundius videtur dormire si, qui sanguinem multa exercitatione fuerit: vt pote quibus inter exercitandū plurimū facultatis à principio destituitur: quocirca cerebrū & reque & vnum instrumentum indiget, tum ob facultatis, quam transmittit, manū non est: tū ob labores, quibus per multas functiones defatigatū est. Quæ admodū autē exercitati & promiores sunt ad somnū, & grauius dormitanti illi quoy qui cibum ingererunt. Atq; hi ob grauiori detinentur somno, quō ingessis cibis humidior si apte natura fuerit. Irise & n qu plurimo se vino transgesserunt, aut balneis multo, calidius liberaliter circa caput sunt vsi. Quippe huiusmodi omnia implere cerebrū suo maiore videtur: qui aliqui nō est vnus ille quem multa exercitatio & lassum & aridum reddit. Etiam q; repletio capitis somnū conciliet, satis Aristoteles demonstrat. At verō si à frigida multatq; opprimatur humiditas ipsius cerebrū, vternosum lethargicūq; somnū inducit. Igitur ea que dūtaxat humectat, nō ab re somnifera nominantur: que verō refrigerat, ea nec somnū conciliare, nec indolentia inducere verē dicitur: sed pro somno veterā, grauiūq; soporē: pro indolentia autē, vel abolitioe, vel difficultate sensus efficientiūq; ob frigoris excessum. Rursus si

citas immoderatio, & calor, veluti in phrenitide, vigiliis infert, quæ neq; merita, neq; solitudo peperit. Sed apoplexia etiā & morbus comitalis affecto cerebro fiunt. Verū vt profusus somnus sentiens functiones: ita apoplexia eas actiones que pendunt à voluntatis imperio, offendit. Ad hæc, qualis est infirmitas sentiens functionibus, talis est cōvulsio per morbū comitalem moribus voluntatis. Porro cōvulsio que per totum corpus fit circa delirium, aut soporem, à spinali medulla, que in ceruice continetur, morbo dependet. Si verō vel manus, vel crus, vel musculus distendatur, aut conuellatur violentè, ad illum semper nervum, qui partem mouet, referenda est noxa.

GALENI PERGAMENTI de Symptomatum causis, lib. II.

Quandoquidē iam exposuimus symptoma que circa sensum versantur, operę precium fuerit deinceps illa etiam examinare, quæ sub deprauato moro, seu cōmuni genere continentur. causamodis sunt, cōvulsio, tre mor, palpiratio, singultus, rufus, ructus, stertitatio, pandiculatio, & stridor dentium. Quorū sane nōnulla quidem naturæ sunt opera, sed corāte ab aliqua causā præter naturam: alia morbos sequuntur affectus, nihil ad ipsorū generationem cōferente natura: alia deniq; à natura & morbo simul cōiunctis ducunt originem. Porro naturæ opera sunt, stertitatio, rufus, oscitatio, pandiculatio, & singultus. Solius morbi, palpiratio, cōvulsio, resolutio. Si vni a morbo cōiuncti, omnis torpor & tremor. Ad quorū sane omnia particulares proprias differētiā investigandas, sciendum est, quatuor esse facultates, quibus omnia que aluntur corpora gubernantur: attractricem videlicet, retentricem, attractricem & expultricem. Cū igitur iuxta naturæ leges animal gubernatur, nullus ipsarū motus esse symptoma censetur. Quod si quippii in corpore præter naturā cōstituit, insurgatq; ad ipsū desocietū expultricis facultatis aliqua, sit interim vt ipsarū motus sensu minime percipiatur, interim vt nō lateat sensum, vtrū tamē in naturam symptomaticam transierit. Igitur functiones à voluntatis imperio procedentes noxa est, nervorum resolutio, cōvulsio, tremor, ilupor. Extremis si instrumentorū quibus respiratio perficitur, resoluti sint nervi, apnæa, hoc est, abolita spiratio: si verō vocales nervi, aphonia, id est, vocis priuatio, vocatur. At lingue paralysis, est sermone, voluntatis opus, omnino tollat, nullū tamen proprium obtinuit nomen. Rursus ichthusa, hoc est, vtriusque suppressio, haud absimile quiddam apnææ significare videtur: quivis per ipsam functionē, à natura, nō à voluntatis imperio pendens, tollatur. Sed si quis inuitus cogatur meire, voluntatis functionis offensā est. Hæc aliter alui excrementa, si suppurantur, ad naturalem sin decedunt, idq; homine inuito, ad voluntariam functionē noxa referri debet. At si paralysis totum corpus invadat, symptoma ipsū apoplexia vocatur. Cōvulsio etiam ipsa pro varietate particularū, variis appellationibus formatur. Nam

Vigiliis insensibilis fit, ut si fuerit cōvulsio comitalem.

Apoplexia que la affectus sit.

Epilepsia que la cōvulsio sit.

Symptomatica que ad motum deprauatū sit, sunt, alia que dem naturā, alia morbo suo opera, huius alicuius vtriusque.

Facultates naturales sunt quatuor.

Motus voluntarii sunt.

Apnæa quid, Aphonia quid, Lingue paralysis sit.

Ichthusa naturalis frustillationem cohibet.

Extremities in volentia que referenda sunt.

Apoplexia est paralysis vniuersi corporis.

Cardialgia seu de curvatura. Bulimos quæ de accidet.

Oris ventriculi de am principis huius membrum si necesse.

Sensationis quomodo sit.

Cerebrū quomodo conductum. Cerebrum vniuersum functionis partibus per nervos largitur.

Facultas animalis per totum motum quiescit naturalis operatur vehementius.

Exercitati vniuersum, vniuersum dormit.

Cibo ingesto cur prom ad ius motum reddunt.

Cerebrum que potius implere.

Capitulum quomodo concitat ius motum.

Veniens causa. Lethargia causa.

Sinistra sunt humilitas. Suppurata dematur que ceterum refrigerant.

si mandibularū musculi cōvellantur, stridor dentium: si vero oculorū, tum perversio, tum strabismus, symptoma dicitur. Jam vero si rigido penes semem effluat, veluti cōvulsio quædā ipsa gonorrhœa exiit: si nō rigeat penis, referri debet ad cōtenticis facultatis imbecillitatem. Non desunt & quibus videtur tum singulus, tum duplex inspirandi actus refectio, aliquando ex cōvulsione muscularū qui inspirationi iuferuiūt, procedere. Epilepsia autē cit cōvulsio vniuersi corporis. At stupor imperfecta quædam est resolutio nervorū: citq̃ scē multum symptoma, cōvulsibus in vnu pugnantibusq̃ morbo simul & facultate. Omnes autē affectus qui nervos intendere possunt, in duo capita reduciūt: plenitudinem scilicet, atq̃ etiā inanitionē. Ac phlegmonem quidem plenitudinē parit: ardensimū autē & aridissimā febres, inanitionē. Quod verō ad motum immobilitatēq̃ pertinet naturalem, si manū extendere, extēditq̃ immobilem ferre valeamus, animalis facultas hæc functio est: qui status, & motus & immobilitas dici potest. Sin autem supra rem aliquam solidam, recte valentē manū deponamus, omnes muscularū actiones laxaverit, hanc manū quietē neq̃ ad morbum, neq̃ ad facultatē, sed ad inartam animalibus gravitatem referre oportet. Quemadmodum autē extēta manus duobus æquē valentibus regitur moribus: sursum quidem ferente facultate, trahente verō deorsum insita gravitate, sic etiā et mori perficuntur duobus moribus: vna, qua cogitur membrū ob gravitatem ad inferiora debilitare: altera, qua sursum fertur ad facultatē. Pugnat itaq̃ per tremorē manifestē facultas cum gravitate: vicissimq̃ facultas nunc vincit, nunc imbecilla vincitur. Quisobrem contrariū semper inter se motū successione, tremor fieri videtur, cum sit morus cōpositus, quemadmodum arteriarū pulsatio. Patet ergo luvius quoq̃ symptomatis generatio, & quod omnino cum conatu sit mouendi, secundūq̃ voluntatis impetū, cum facultatis tamē infirmitate. Porro maximū onus validam deicit facultatē: invalidam verō, nō solum hoc, sed parua quoq̃ profectus sarcina. Quod si ad multā imbecillitatem venerit, vel soli proprio opprimetur corpore. Quemadmodū autē animi affectus, qui motricem facultatē imbecilliorē reddūt, tremulas functiones efficiūt (vt in timore videre licet) sic morbi corporis in cōmodatē viribus, tremoris symptomata inducunt. In primis itaq̃ & omniū maxime officit facultatē, quicquid in intemperie cōsistit. At senectus quoq̃ in temperies quædā est, ad frigus & siccitatē procliuio. Quamobrem senes facile tremore vexantur. Ex iuuenibus verō corrigiuntur, qui vchementer fuerunt refrigerati, & qui multo merca cō vino se replevere, aut multas subinde cruditates congesserunt, aut qui diu multis cibis ingestis, nullo vti sunt exercitio, sed ignavi in ocio vixerūt, aut qui intempestivē frigidam a quam bibeūt. Præterea crassi, leniūq̃ succi, facultatis meatus obstruētes, tremorem efficiere possunt. Palpitatio autē est dilataciō præter naturam, omni partē, quæ dilataciōē suapte natura admittit, accidere potens, aliarū verō nul-

li. At dilataciō sunt nara, omnia quæ naturaliter mollia existunt. Palpitatiōē itaq̃ nonnūq̃ cuti, subiectisq̃ illi musculis, & venteribus accidere cernimus: quemadmodū ipsi cordi & arteriis, alio in eis præter pulsū (qui ab insita facultate fit) deprehensio motu. Cum autē palpitatio ipsa celeriter oriatur & evanescat, necessum est illius causam esse ætream essentia. Quæ quidem si paucā fuerit & tenuis, illicō a corpore deluet. Proinde videtur esse vapor crassus ac multus, idq̃ pro capra spaciū in quo cōtinetur. Dilatat igitur, attollit, atq̃ inflat partem, donec violenter explosus, in cognatū sibi ætrem expiret. Verisimile autem est, refrigeratis quomodo libet partibus, atque interdū etiā obstruētis, palpitatiōes accidere. Porro vniuersus palpitatiōis motus, quo in vtrinq̃ partē agi videtur membrū, existit præter naturam: quæ ratione a tremore distinguitur, & quæ etiam maiora intervalla, quā tremor ipsē, sortitur. At verō, vt in membrorū palpitatiōe fit morus paucus, parvus, & rarus: ita in rigore fit multus, citus, & frequens. Atqui multū, voco ex ipso motuq̃ numero: citum, ex motiōis impetu, frequentē, ex breui tempore quietis. Ceterū motus luc nō est vniuersus præter naturā, vt palpitatio & cōvulsio: sed potius totus ad expultricem facultatē est referendus: etsi ipsam irritans causa, cogēsq̃ vt violenter moueat, præter naturam esse cēniscatur. Est itaq̃ rigor motus quidam cōpositus ex causā præter naturam, & facultate animantis, sed in quo virtus, quā in tremore, est vegetior. Vt autē exempla facultatis expultricis proponam, vterus nō alio pacto ad fertur additiōē insurgit, quā vt retentiam expellar molem. Cum enim nouē mensibus sustinetur fetus gravitate, tum suam ipsius extensio-nem, atq̃ toto hoc tempore osculum ipsius adeo exactē claudatur, vt ne specilli quidem aculeum admittat: absolute factū, ad ipsius secretionē accedit, diuersa omnino cōsistitiōne affectus. Nā fauces quidem ipsius antea clausæ, adeo patent, vt facile per ipsas totus fetus erumpat. Tunicæ verō plurimū antea extēnt, & cōtrahuntur vndiq̃, & factum explodunt, vt celeriter ab vteri cervice decidat. Corruptū verō factum eicit illa facultas expultrix, aut tertio, aut quarto, aut alio quolibet mense, haud aliter q̃ insitante pariendi tempore, matricis fauces aperient. Similiter etiā, ventriculus, ingestis cibis, claudat inferius osculum, ac nihil egredi finit, priusq̃ accuratē concoctum fuerit: si modo nihil aliud interdicere ipsam cogat functionē: quemadmodū corruptela factus in vtero. Sic liquidem totū ventriculus natantes cibos vomere: ad inferiora verō tendentes, per inferiora deicere. Sine cibis etiā insurgit (sæpe vetriculi facultas ad vomitū: idq̃ ob prauam aut bilem, aut pituitā, aut alii huiusmodi succū, aut saniem. Iam verō qualis est per vomitiones in vetriculo expultricis actio, eiusmodi etiā per tussē, est in pectore, & in pulmōib. beneficio spiritus qui ad exteriora vehementer mouetur. Nullū autē animal aut nauigare, aut vomere, aut tussire didicit. Verū si causa præter naturam, aut vetriculi osculum, aut respiratiōnis meatū obfeditis, protinus animal vel vomitiōe,

Palpitatiōem esse diuersum motū a pulso.

Palpitatiōem fieri a vapore crasso simul et multo insito in palpitante partē.

Palpitatiōis motus ex se præter naturā. Palpitatio a tremore quo differt.

Rigor adesse motum multū, citum atq̃ frequentem.

Rigor est resolutio vniuersi corporis.

Rigor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Vteri cōtractio et relaxatio opportuna.

Ventriculi contractio, expultrix facultas.

Dentium stridor.

Singulus, duplex inspiratio.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Tremor est motus cōpositus ex causā præter naturam, et facultate animantis.

Sternutatio.
Nares sunt me-
atus respirato-
rii.

Tussis quid sit.

*Humores qui a
pectore educan-
tur facile.*

*Sternutatio, quoniam tussis, valde hinc a pe-
ctore impactu
humoris ereli-
bani.*

*Tussis nihil co-
ducit capiti.*
*Sternutatio in
nisi plerumque
caput, nisi ob
distillationem
accidat.*

*Nausea præcedit
vomitionem.*
*Cerebrum præcedit
tussim.*
*Tussis remota
effluat, spiri-
tam calidam
propterea.*

*Tussis ob respi-
ratorum organa,
spiritum cohibi-
tione prohibetur.*
*Spiritus cohibi-
tio calorem in or-
ganum respira-
tionis adauget.*

*Aequalis inter-
peries cum nullo
afficit dolorem.*

*Dolor quando
accidit.*

*Inaequalis inter-
peries dolorem
cum adauget.*

vel tussis vexabitur. Ad horum genus refertur eni
sternutatio, qua expelluntur quæ retenta in na-
ribus hærent: quæ & ipsæ, meatus respirationis
existit. Spiritus igitur vehementer motus, carū
meatus expurgat, ribicinium exemplo, tibus si-
stulibus expurgantium. Itaq; huiusmodi motus,
naturæ opera existunt: annuntiat tamen sym-
ptomatis præter naturā, ob causas naturā ipsam
vitic moueatur cogentes. Tussis porro nihil est
aliud, q̃ vehementissima efflatio, qua plurimus
spiritus celeritate foras erumpit, impetu suo ex-
trahit explositque excrementa, meatus ipsius
obstruentia. Expelluntur autem facili, quorum
neonimus aquosa, nec lenta essentia fuerit. Cæ-
terum illos humores qui in arteria consummāter
hærent, & qui difficulter expectorantur, magis
evellunt sternutamenta: vtpote quæ validiorē,
q̃ tussis, habent spiritus impetu, licet aliam ge-
nerationis suæ causam fortitūtur. Quippe nō ob ea
quæ asperis arteriis, sed nariibus molesta sunt, spi-
ritus violentem emittunt, cum quo ex prioribus
ventriculis cerebri explodi nō nisi solet. Proinde
de tussis capiti nihil cōducit. Sternutatio verō,
nisi ob distillationem acciderit, hanc mediocrem
præsidium affert capiti repleto vaporib; Nec mi-
rum videri debet, spiritū unico impetu & expul-
sione & ex capite emitti: nā cum principiū insur-
git, vt expellat quæ insistant nares, vtroq; vitur
expirationis meatu. Hæc igitur sunt facultatis
voluntate pendentes symptomata. Vomitus vo-
ro, q̃vis illis proportionē quadā respondeat, ad
facilitatē naturalem refertur. Vt autē vomitum
nausea præcedit, sic tussim cernchos, exiguis ad
tussim dum impetus. Porro quicquid spiritū in-
tercepit, ad tussim reiciere oportet: siue humo-
ritā capite defluā, siue illapla portio cibi vel po-
tus, siue aliquid in asperis arteriis collectū, vt in
peripneumonia, pleuritide, & in convezarū ieci-
nonis partium phlegmone, aut in gutturis ipsius
asperitibus. Est & aliud tussis genus, quod ac-
cidit respirationis organis refrigeratis. Sed ita
affectū nihil inter tussiendū expuunt: adeoq; est
exigua ea tussis, vt spiritus cohibitionē sup-
primi, & ne veniat, prohiberi possit. Quippe auge-
tur in indutmentis respirationis calor, ob cohibi-
tā animi: spiritūq; sub thorace violētē oppres-
sus, in omnes artēos meatus penetrat. Hæc autē
vtrāq; dum sunt, omnia leuigant, ad tempera-
mentū æqualitatē perducūt. Iam verō interperies
ipsa, interdū simplici qualitate, interdum
duplici cōstat: nonnūq; eiusmodi qualitates co-
mitatur id quod interperies est, veluti ros quidam.
Sed enim æqualis interperies nullo dolo-
re affligit, cum nimirum particulæ affectæ addit
iam veluti acquiescentia quædam natura. Nullum
autē corpus à sua ipsius natura infestatur. Nāq;
quorum natura mutatur, corruptipitūrit, dolore
afficiantur: nō quod id mutata aut corrupta est.
Vbi verō in corpore quopiam sentiendi vi præ-
ditō, inæqualis suboritur interperies: quan-
tā fuerit interperies magnitudo, tanta enī erit
molestia. Quare per tales interperianas in-
equalitatē quādam sentire se aiunt ægri, & pan-
dilatū, omnēq; partes distendūt, sese miendi
gratia. Distenduntur autē maxime à somno expen-

recti, vtpote carnibus vaporosa excrementa sen-
tientes, tum ob cōgesti cibi coctionē, tum ob hu-
iufmodi morionū quietē. Triplex autē in lasitu-
dine potest oriri sensus: cōmūdens scilicet, tensi-
uus, & vlcerosus: idq; à causis præter naturā om-
nes corporis partes quasiannib; distēdētib;,
exviceratib; . Ignor vbi itē videtur corporis mo-
les citra quāvis exercitacionē, affectus in lasi-
tudo tensionis spōntanea vocatur: quemadmodū
vlcerosa, vbi vlcis sensus transcurrere per cor-
pus apparet: id qd moris magis accidit, q̃ quic-
sententibus, nisi admodū magna sit lasitudo. Per-
ternū verō lasitudinis genus, quo aut sibi quas-
si esse ossa, ne minimū quidem mori tolerare æ-
gri possunt: si vbi nec per lasitudinē vlcerosam,
vbi nihil inuenerit. Cæterū quemadmodū vbi
vlcerosus sit sensus horrent ægri, si cōmouētur:
ita horris affectus, si aliquis moris accesserit,
in rigore transit. Atqui hæc omnia oriūtur ab ex-
crementis mordacib; . Differt verō inter se excre-
mentorū multitudine & motu: propterea quod
alia magis, alia minus erodant: quodq; ex cor-
poribus ipsis alia sunt imbecilia, alia facilia, alia æ-
grius & afficiantur & sentiūt. Facili enī discrimē
causa, vbi citius vel tardius mouetur. Ad hæc idē
etiā homo, dum quiescit, solū inter dum sentit in-
æqualitatē: dum mouetur, horrore: dū verō exer-
citur, rigore. Quis obrem si affectus consulant
medici, vt ab omni motu se abstinēt. Q̃ntē
sol, balneū, exercitatio, ad mori excitant excre-
menta, alioqui quiescentia: quemadmodū & ex
ahim affectibus ira. Porro à seipsis ad mori ex-
crementa insurgit, si vel calidū, vel extenuatū,
vel in spiritū dissoluitur. Causa itaq; emora lon-
ge est molestior quiescente, præsertim vbi defec-
tur per corpora sensibilia. Cum enim quippiam
per hæc mansens, violenter ad cutem ferret, in i-
pso per carnem cutēq; transire necesse est vt sti-
mulet, pungat, diuidat, vulneretq; eas partes o-
mnes, quib; obuiū fuerit. Omnis autē causa mor-
dax morique, siue frigidissima, siue calidissima
fuerit, & horrore & rigorem animanti inducere
potest. Cæterū febres tertianæ, vt omnium maxi-
mè hilofæ calidæ sunt, ita præ cæteris maxime
horrore possunt efflicere: & quod fuerint syncerio-
res, eo in ipsis vehemēior sit rigor. Porro arden-
tem febrem rigor supervenit solui, q̃ bilis quæ
interim in venis cōtinebatur, à natura p carnes
ad cutem decretorie excutitur. Quare morio-
nis eius, rigor & symptoma est & signū. Nam hu-
iufmodi rigore affecti, postea sudat, & liberatur
à febre, nimirū eicta bile. Quæ interdum etiam
nō ad cutem, sed ad internas partes impetum fa-
ciēs, vel vomitionē, vel alui solutionē delictur.
Sæpenumero & intro & foras eadē die defertur,
vtriusq; & sudore & vomitū & alui deflectionē
bilis vacuetur. Vbi igitur erodēs appi in parti-
culis cōmetur, contrahuntur sanē, præcipue si il-
lud mouetur: quare maxime ad eius expulsiōnē
festinant. Cōtrahunt itaq; atq; cōstringunt sese;
mox quilibet impellit eam quam cōtinet excre-
menti portione. Atq; in hunc finem modū moris
vniuērsi particulars, totum corpus concussione
quassationeq; vexatur: qualis videtur in iis, qui
sunt rigore correpti. Similiter etiā concutitur
thoracia

*Exprelli à
mano, vt si de-
stendunt.*
*Lasitudinis tri-
plex potest oriri
sensu.*
*Lasitudo ten-
siva spontanea
qua.*
*Lasitudo vlc-
erosa motu qua-
si accidit, quā
quiescentibus.*
*Lasitudo can-
tandum.*

*Horris transi-
it in rigorem, si
motus affligit.*

*Excrementa à
quibus causis
mouentur.*

*Causa motus
longi est mola-
ris quiescente.*

*Mordax motus
quo omni cau-
sa sine frigida
sine calida, sine
rit, horrorem
rigoremq; inde
cre parit.*

*Rigor ardens
formam si su-
peruenit, car-
nalem.*

*Concussio quo-
modo corpus
concussit.*

*Stomatia ori-
tur à frigore.
Oblitus a frigore
regreditur.*

*Apoplexia cau-
sa.
Apoplexia cau-
sa.*

*Delirium quid.
E vadit ortum
habens.
Eboratio quid.
Mama.
Melancholica
aliquando.
Phrenitidis ge-
nerat. Regre-
ditur phlegma
in cerebrum.
Aut in mēbra
alia.*

*Atra bilis fidi-
tatem acci-
pat timorem.
Mugitum, ac
moris expella-
tione inducit.
Tenebrae perit
refractione.*

*Hypochondria
cum afflicto.*

Coctio quid.

*Alterationis
error est causa
dionis sympto-
ma.
Cruditatis quid.*

*Coctio dionis
vitium contin-
gu bifariam.*

*Facile bifar-
iam ladit.*

*Effluvia facul-
tatu lesione
proprie sunt
intemperies.*

lēditur. Tertio, quādo in alienā speciem dege-
nerat. At perit quidem functio in istulina, obliuio-
nequeque affectus à frigore oriuntur. Quippe me-
dichementis quae huiusmodi symptomata facere
possunt, refrigeratū facultas inest. Hae itaq sym-
ptomata cerebri corpus esse refrigeratum decla-
rāt. Apoplexia verò epilepsiaq; ex subitanea col-
lusione pinit, replentis ventriculū cerebri, in a-
sci videtur. Proinde huiusmodi symptomata subita
est generatio & discussio, qualis esse per corpō-
is intemperies nō posset. At modica offendicu-
la, ac veluti torpores tum rationis, tum memo-
riae, ob minore refrigerationē eveniūt. Porro de-
lirium omne, deprauatus est principis facultatis
morus, à prauis succis, aut cerebri intemperie or-
tum habens. Ceterum phrenitis dicitur, si febris
adit: ut mania, si absq; febris accidat. Solae autem
melancholicę alienationes, à frigidiore succo pdu-
ci solēt. Nā phrenitis non simpliciter ob calidos
succos accidit, sed cōm phlegmonem vel in cere-
bro, vel in ipsius membranis produciunt. At quę
deliria in acutissimarū febriu vigore oriuntur,
mordacem calidūq; vaporē habent, cerebrum
occupantē. In omnib. autem animi alienationi-
bus, si timor atq; tristitia diu perseverent, atra bi-
lem in causa esse est indicium. Quod verò atra bi-
li rationalem animę arcem occupat, timorem,
mestitiam, ac mortis expectationem in ducat, nō
hū mirandum est, cū videamus in rebus exter-
nis nihil magis nos, q̃ tenebras ipsas, perterrita-
cere. Si igitur quippiam tenebris similitudinali
parti animę circumfundatur, hominem semper
timere est necesse, vt qui timoris causam semper
in corpore fecerit: vt in statulento illo mor-
bo, quę hypochondriacum nominant, indices
videre licet.

GALENI PERGAMENI de symptomatum causis, lib. III.

D Eincept autē de symptomatis quę circa
tum actiones, tū facultates naturales ver-
santur, dicēdū est. Quādoquidē igitur cō-
coctio nihil est aliud q̃ alteratio secundū quātra
tem, quā ventriculus nimirū molitur, dum sibi ci-
bos assimilat: nemo sinē negauerit alterationis
errore fore cōcoctionis symptoma. Ceterū si nul-
la penitus alteratio fiat, hoc symptoma absolūtū
vocatur cruditas. Si verò fiat qđem alteratio, sed
nō qualem fieri expedit, vocabitur & hęc crudi-
tas, nō qđem tanq̃ priuatio, sed ceu vitium cōco-
ctionis existens. At vitii ipsū, bifariā accide-
re solet. Aut enim tardē alterat cibū, vt vix pro-
priam transmutationē suscipit: aut corruptum
tur omnino, vt nullā cōcoctionē admittire pos-
sint: atq; huiusmodi sunt cōcoctionis noxę. Qua-
rum causa cōmunis quodē est alteratricis po-
tentie ab scopo aberratio. Cuius aberrationis
duo prima sunt genera. Vnū, quod in portia le-
sa: alterum, quod in externo aliquo errore cōsi-
stet. Ceterum portia bifariā laxidit: aut per suū
ipsius essentia, aut per aliquē morbū instrumen-
torū. Error autem externus tripliciter accidit. Nā
aut ab extremis vētriculū, aut à cibis, aut à som-
ni tempore oritur. Id in propria essentia noxę,
in temperies quędā agentium qualitatū existit.

Ad morbos instrumentorum pertinent tumores
præter naturā, abscessusq; & alij affectus cōsimi-
les, quib. si cruciatur vētriculus, impeditur facul-
tas eius cōcoctrix. Quod si cum intēpere corāte
ipsi instrumentorū affectus, viroq; modo facul-
tas illa panetur noxā. Atq; ob hæc omnes cau-
sas ventriculus malē cōcoquit, vel nullo extrin-
seco errore incidente. E cōverso autē ventriculo
nō malē affecto, intē dum nō coquit animal, aut
propter ciborū pononemq; immodicā quantita-
tem, aut qualitatē alienā, aut quia in tempe-
sticē, aut nō recto ingeruntur ordine, aut ppter ex-
cremenorū vocē, vbi q; aut cydouria, aut punica ma-
la in primis ingesserit, mox cholera sumat ex oleo
& garo. Intēpestius autē dicitur, vt si in aurora
autēq; hesternus cibus defecderit, aut corpus fue-
rit modicē exercitatum, prædium sumatur. Por-
ro corruptelæ ipsę, quę qđem fumosę sunt, ex ca-
lidioribus, magisq; fumosis oriuntur cibis: a ci-
dę verò, ex iis qui frigidiore natura sunt, magis-
q; que pituitosi. Similiter etiā & in extremitatib. cō-
tingit. Aciditas siquidem creat, que pituitosa sunt
& frigida: fumosę, que biliosa & calida. Nec se-
cus vēter, sub frigidiore. quidē morbis accidit:
sub calidioribus, fumosas mutantes efficit. Tar-
da cōcoctio fit, q̃ cibi difficulter corruptiuntur
vel quia illos facultas nō superat: vel quia som-
nus fuit breuior, q̃ vt eos vincere posset. Vbi ve-
rò circa corruptelam cibus omnino cōcoctionē
priuatur, sciendum est ventriculum planē esse vi-
ctū, vel ab immodica multitudine, vel ab ingēti
frigore. Ad eodē reducuntur modos quę in
vasis cruditates cōtingunt. Illę etiā quę in ter-
tia cōcoctione gignuntur. Atq; hęc omnia indica-
ni nobis præcongnita cōcoctionis ratio. Cūm
enim temperies huiusmodi, quę ex quatuor ele-
mentis cōstat, & quę corpus ventriculi pec-
prietatem cōstituit, sciuerimus esse causam alte-
rationis ciborū, quōdā ad hęc rem nō mediocri-
ter cōstet calidum elementum: facili nobis via
ostendetur, quā cruditates causas quoq; inuenia-
mus. Igitur in vniuersis actionibus tria sympto-
matum genera reperiuntur. Quo tum qđem pri-
mū est, abolita actio. Secundū imperfecta, dimi-
nutiq; tertiu deniq; vitiosa seu deprauata. Vētri-
culus itaq; actionē priuatur, vbi ne micamū quī-
dem immutat cibus. Imperfectē concoquit, vbi
tardē concoquit. Deprauatē verò, vbi cibos cor-
rumpit. Eadē etiā habenda est ratio, & in coctio-
ne quę fit in venis, & in vniuerso corpore. Por-
ro ex vitiosis succis gignuntur erysipelata, cācri,
gangrę, phagedęn, carbonēs, herpes, alijq;
id genus affectus. Circa nutritoriā autem actionē,
priuatio quidem actionis, atrophia est: de-
ficiens nutritio, gracilitas, ac vitiosa, im leuitas, &
elephantiazi cōstituit. Quorum sinē causę, alię ad
potentia imbecillitatem: alię ad errore quę cir-
ca cibos cōmittitur: alię ad stidia siue exercitia,
& ea quę extrinsecus animal accidunt, referuntur.
At verò imbecillitatis potentia, quę quidē
proprie sunt, similitari intemperie: quę verò nō
pprie, instrumentale: sequuntur morbos. Erro-
rē autē circa cibos exhibitos, ad multitudinē, succo-
rumq; qualitatem refertur. Quemadmodū & stu-
dia,

*Instrumentorū
morbū.*

*Cruditatis aut
cōcoctionis vi-
tiosa causa illa
se ventriculo.*

*Cydouria nō
edenda in vni-
uerso.
Intēpestuositas
ciborum refus.*

*Corruptelæ fu-
mosę accidunt
q̃ quib. cibis
priuatur.*

*Causa dionis
laxidit vnde.*

*Alterationis ei-
borum causa
q̃ temperies
ventriculi.*

*Symptomatum
genera tria re-
periunt in vni-
uersis actioni-
bus, nempe ab-
soluta, imperfecta
vitiosa seu deprauata.*

*Sicca vitiosa
quę afflicto
potentia.
Atrophia.
Gracilitas.
Leuitas.
Elephantiazi.*

*Imbecillitatis
facultas quę
morbū signat.*

dia, & ea quæ extrinsecus occurrunt, ad ordinem præpositum, & intemperie vñum pertinere videntur. Oportet autem nō modò symptoma nosse, verū eius semper causam inuestigare. Nam si ventriculus ciborū causa nihil omnino cōcoxit, facili id symptoma corrigitur. Si verò ob extre-
mum potens lapsum, in lenteria, aut vñum panitem mutabitur. Similis etiā & in sanguifica-
tione, & in cōcoctione illa quæ per totū corporis

Intemperies potens vehementer deicit vñum.

Ventriculus affluens, cibos in vapore nō duratos contrahit pot.

Acidi ad quibus additur rutilus.

*Retentio potens in vapore sym-
ptoma contrahit.*

Ventriculi morbi duplices.

*Singulis in causa.
Singulis repel-
lis illa, quæ im-
bibita sunt in
ipsum ventricu-
li corpus.*

*Piper si tenuis
fuerit, post-
modum biba-
tor calida po-
tio, singulum
excitat.*

*Nausea, expul-
tricis facultatis
est deprauatus
motus.
Lenteria cau-
sa.*

si in vñum repit, vt in cholera morbo, vñum orificiū a cōmpdat. Attractrix etiā facultas, aut omnino nequit cibos attrahere, (quod symptoma dicitur gula paralyticā) aut distulter trahit, vbi incipit gula esolui: aut deprauat trahit: de quo motu iam sæpe diximus. Est cūm ob innatā carunculam tota gula aut eius pars obstruitur: qui morbus instrumentalis vocatur. Cūm igitur ventriculus naturaliter habet, superius partibus ad sese trahit, atq; per inferiores deicit. Vbi verò præter naturā affectus est, etiam ab infernis assu-
mit aliquid. Siquidem nōnullis clymī vomitio-
ne sunt redditi: sicut & steruus, per letales volu-
culos. Satiū tamen est dicere, ventriculū per id genus affectus, nō trahere, sed recipere ab inte-
stinis excrementa violentē cōpressa. Id quod so-
let connegere illis, quibus ob negotia non licuit,
quādo expedire erat, deicere. Nonnūq; etiā
est voluulus, vbi intestina suo illo naturali cōsti-
tutionis motu priuatur. Quin etiā indurati ste-
cus tumoresq; præter naturā, obstant aliquādo,
vt vel nihil excrementorū feratur deorsum, vel
nō satis copiose deiciantur. In summa verò, om-
nia symptomata intestinorū, ad ea quæ de vtri-
culi diximus, referuntur. Alimenn per corpus di-
gestio (quæ & ipsa naturalē opus existit) tunc ad
amūm perficitur, vbi quilibet pars peculiarit
sibi allicit cibum. Accidit autē illa tria sympto-
marum genera. Nam vel imbecilla est, vel depraua-
ta vel omnino cessat. Quorū sanē symptoma-
rum causæ dicantur, aut trahenti partū intem-
peries, aut instrumentorū morbi, aut digerendi
alimentū prauitas. Ac per intemperies quidem,
facultas redditur imbecilla. Instrumentorū verò
morbi, alimēti meatus cōstringunt. Prauitas au-
tem dicitur, si vel crassior, vel glutinosior sit ci-
bus similiter impeditæ expulsiōnis excremento-
rum, triplices causæ inueniuntur. Vnā, cū partes
quæ excrementa expurgant, sunt imbecillæ: alte-
ra, viarū angustia. Postrema est excrementū mali-
tia. Imbecillitas intemperies parit, angustia verò,
vel obstruano, vel aliquis instrumentorū tumor.
Atqui tumorū causæ est humorū affluxus.
Obstruatiō facit humorum vel crassitudinem, vel
lentorem, vel innatū tuberculū. Excrementorum autē
malitia, est multitudo, crassitudo, & viscositas.
Per cōcoctionem in venis factā, tria redvndit
excrementorum genera. Vnum bilis amara, quæ
ab hepatis vesica expurgatur: alterum atra bilis,
quæ a liene: tertium velviserum, quod attrahi-
tur a renibus. Cū autem viarū duo sunt ge-
nera: vnum per quod excrementū trahitur, alte-
rum per quod expellitur: vtriuslibet angustia ex-
cretionem lædere potest. Nonnūq; etiā horū
nullum est læsum, sed excrementū multitudo cūm
immodica est, vt tota expurgari non possit, vnā
cum sanguine per totum corpus deferatur. Huius
verò immoderationis duplex affertur causa: nē-
pe attractrix potentia male affecta, & alimentorū
prauitas. Iam verò pallida bilis, si redundet
per vniuersum corporis habitū, regium morbi
finē ante in vna tantum parte cōstitit, erysipelata
& herpes excitat. Attram bilem, si in vniuerso
ad sit corpore, elephas: si in vna aliqua parte, can-
cer sequitur. Pituita, si per vniuersum corpus in-

*Cholera mor-
bus.
Attractrix fa-
cultas sym-
ptomata.*

*Voluulus morbo
affligente, ven-
triculus ab in-
testinis excre-
menta violentē
facit recipi.
Voluulus vnde
sileat vñum.*

*Digestio ciborum sympto-
mata, atq; ipso-
rum symptoma-
rum causa.*

*Expulsiōnis ex-
crementorū nō
respondens, &
causa triplex.*

*Excrementorum
portugantium
vñum cum san-
guine, tria gene-
ra.
Excrementorū
tria duplices.*

*Bilis pallida
quæ morbi
esset, per cer-
piti fossa.
Attra bilis quæ
morbi parat.
Pituita quæ
morbi parat.*

creuerit, leucophlegmatia comitatur. Sin aut in vna parte, oedema. Serosa excrementa si redundent, ascite aqua inter cutem inducitur. Quae si vnam aliquam partem invaserint, in ea pustulas gi-gnunt. Pro miscella autem ipsorum excrementorum, variant solent & morbi, & symptomata. Porro nu-tritico, vt naturalium actionum est prima, sic perque necessaria exiit: quippe quae species alteratricis facultatis censetur. Assimilatio siquidem alteratio est: quae quidem, licet nomen diuersum a nu-tritione fortitur, idem tamen vtriusque est opus.

Nutritio autem a scopo aberrat, si vel nihil om-nino agit, vel ab actione perfecta deficit, vel vi-nose agit: idque ob altitatem facultatis, quae sub alte-rationis genere continetur, vel ob materiae tum defectum, tum prauitatem. Ob defectum quidem, vt in atrophis, siue lax ex defectu, siue ex priuatione dicitur. Hic aut in atrophis defectus, non pro-prie ad cibum qui ingeritur, sed ad materiam mem-bratam, est referendus. At prauitas cibi, leu-

cas & elephanasim, eiusque generis alios affectus gignit. Verum vbi caro nigra pallidumque fuerit, ele-phas nominatur. Nec aliter affectus hic gigni so-let, quam leuce. Iam alphi haud diuersam a praedictis habent generationem. Ceteri per hos non caro vniuersa afficitur, sed corporis superficies duntaxat, vel vti siquamvis quibusdam inspergitur. Atque alibi quidem ex pituita, nigra vero ex melan-cholico humore prodeunt. Si quidem alimenta carnem maxime permutare ad suam ipsorum na-turam possunt (etenim Persica planta, cum in Persia fuisse letalis, postea in Aegyptum trans-lata, quod inerat noxium amittit) quamquam carne etiam, alimeta ipsa immutatur. Omnis siquidem res, vel si longe potentior sit, ab illa cum qua ver-satur, afficitur. At non solum ob alteratricis facultatis imbecillitatem, pars aliqua alimentum priuatur: sed etiam vbi attrahendi vis imbecillior fuerit, aut expultrix immodece moueri. Atque tunc immodece mouet expellendi vis, vbi retentrix potentia grauat, vel ob excrementorum multitudinem, vel acrimoniam, vel ob propriam imbecillitatem. Tunc siquidem necesse est, vt cum eo quod redit dat, simul etiam id quod utile est, excernatur: vt in leuenteria, dysenteria, cholericisque fieri contingit.

Quod si expultrix facultas sit imbecilla, necesse est carnem tunc humidorem fieri, pluribusque excrementis impleri. At redundantia multorum excrementorum, ob alteratricis facultatis imbecillitatem accidit. Pro ipsorum autem excrementorum tum quantitate, tum qualitate, alia alter-carum immutatur. Quod vero ad sanguinis excre-tiones pertinet, si expicias eam quae feminis per singulos menses accidit, reliquae omnes toto genere praeter naturam existunt. Profluvia autem vteri, vbi modum in quantitate excesserint, tunc solum praeter naturam censentur. Omnium au-tem sanguinis fluorum causa, trifariam potest ac-cidere. Quippe vel facultas ora vasorum aperit, vt in sanguinis fluore e naribus. est videre: vel san-guis est male affectus, vel vasorum aliquod esse male affectum, vel ruptum. Etenim vasa rum-pi contingit, aut ob plagam acceptam extrinsecus, aut ob salum, aut ob casum ab alto, aut ob vociferationem vehementem. Sanguinem male affectum

dico, vel cum adeo viscosus est, vt vasa quibus con-tinetur, erodant: vel adeo auctus, vt iam conne-ri non possint. Vasa male affecta dicuntur, si vel mol-liora, vel duriora, vel tenuiora fuerint. Si quidem quod immodice molle est, facile ob imbecillita-tem rumpitur: sicut et alde durum, quia non fa-cile multum extendi potest. At tenue, ob huius-modi has vtrasque affectiones, non solum ab inter-nis causis, verumtamen ab externis vt rumpatur facile, est habile. Verum non omnia vasa erodi si-militer possunt. Nam durum crassumque, erosum est contumax. Similiter de refractione est dicendum. Nam vasa imbecilla, mollia & tenuia, prona sunt vt oscula ipsorum pateant: robusta vero, & cras-sa & dura, sunt ad talem refractionem inepta. Ce-terum refractione accidit ab his quae ora vasorum irritant, & a plenitudine grauant: sicut quan-doque a natura, cum excernit ea quae sibi molesta sunt. Sed iam de his quae vomitu reiciuntur dica-mus. Excernuntur igitur haec interdu, quae quanti-tate & mole sua ventriculi grauent: vt cum plu-rimum cibi est ingestum: interdum, quae sua mor-dacitate contrahunt: vt si nutrimentum assum-ptum vel acidum, vel nidorosum, vel amarum, vel acre, ob vitium concoctionis euaserit. Eodem ge-nere continentur & biliosa, & pituitosa, & serosa excrementa, vel inibi nata, vel ex vniuerso cor-pore illuc confluentia. Tertium causarum genus ventriculum ad vomitum incitant, est quod haudquaquam irritant, in illo continetur praeter naturam: vt videlicet sanguis. Communiter autem dicitur esse praeter naturam, quae etiam si sint concocta, mi-nime possunt alere. Iam vero excrementorum ad infernas partes expulsio, nonnunquam solum tem-pus praenit, vel quia venter copia multum cibi grauat, vel pungitur, vel citiusque vt a re mor-dente, quam vt alienam expellere nituntur. At di-cimus multum cibum, vel quia facultas sorpsa im-becillior est reddita, vel quia exiit assumptum ali-mentum immodece: vel ob vitium causam. Pre-teriam dictas causas, alimenta tum humidiora, tum viscosiora ingesta, ipsam concoctionem accele-rant. Quae tum celerius delabuntur, cum leuiter possint eorum assumptione decambulaueris. Cum autem complura sint intestinorum volumina, per quae deferti alimenta est necesse, cibi sane ipsi ob grauitatem diu immorari non possunt: quod si eo-rum quippiam in ipsis circumvoluntionibus fixum inhaereat, id subitum ab actione intestinorum (quibus inest vis expellendi infestantia, propelli-tur. Tardiusque pro consuetudine excernit ven-ter, aut ob intestinorum vel imbecillitatem, vel obtu-sum sensum: aut ob alimentorum tum paucita-tem, tum qualiteratem. Sed musculorum abdomi-nis imbecillitas etiam deiectiones retardat, presertim si duriora sint excrementa: quo tempore thoracis musculi etiam ad auxilium sunt. Pauciora quae pro ratione assumptionis excrementa excernuntur, vbi plus ex cibis per corpus digeritur. E con-trario plura deiciuntur quam pro portione inges-torum, interdum ob defectum digestionis per corpus, interdum ob excrementi quidam eleu-mentum ad regionem venteris defluxa. Porro assidue excretionem, vel ob imbecillitatem, vel ob mortuum eveniunt. Imbecillitatem intemperies inducit.

At mor-

Sanguis autem quatuor, aut quatuordecim modis.

Vasa quatuordecim modis affligi dicuntur.

Refractione refertur vnde accidit.

Venter autem qui huius causis morbi possit.

Sanguis in venterulo continetur praeter naturam.

Deiectionem diuersas causas.

Cibus multum quatuordecim modis.

Alimentum tardius deiectione quae praesent.

Excrementa autem sunt plura, quae pauciora, quae pro ratione sibi assumptionis, excreantur.

Excrementa autem sunt plura, quae pauciora, quae pro ratione sibi assumptionis, excreantur.

Excrementa autem sunt plura, quae pauciora, quae pro ratione sibi assumptionis, excreantur.

Excrementa autem sunt plura, quae pauciora, quae pro ratione sibi assumptionis, excreantur.

Excrementa autem sunt plura, quae pauciora, quae pro ratione sibi assumptionis, excreantur.

Excrementa autem sunt plura, quae pauciora, quae pro ratione sibi assumptionis, excreantur.

Excrementa autem sunt plura, quae pauciora, quae pro ratione sibi assumptionis, excreantur.

Excrementa autem sunt plura, quae pauciora, quae pro ratione sibi assumptionis, excreantur.

Serum sanguinis quod affligit producat.

Nutritio est naturalium actionum prima. Assimilatio alteratio est. Nutritio facul-tas est. Nutritio facul-tas est.

Atrophia.

Elephas quod.

Alphi.

Alimeta ad suam naturam immutantur.

Alimeta priuatur vis.

Expultrix vis quae inmodum excernit.

Expultrix facul-tas est.

Expultrix facul-tas est.

Expultrix facul-tas est.

Expultrix facul-tas est.

Expultrix facul-tas est.

Expultrix facul-tas est.

Expultrix facul-tas est.

Expultrix facul-tas est.

Expultrix facul-tas est.

Expultrix facul-tas est.

At mordicant humores contenti. Est & alius asidus deiectionis modus, quæ sit ob sedis muscularum resolutos. Quippe huiusmodi deiectiones à voluntatis imperio nõ pendit: proinde & intemperatius, & inordinatæ, & asidus sunt. Iam vero solet status in ventriculi spaciis oriri, cum vel humores pituitosi illi cõteniti, vel cibi, in vapores ab imbecillo calore soluant. Etenim vt ab solutum frigus vaporem haudquaquam excirat, sic vehemens calor exactius magna ex parte cibum ipsum cõminuit, quæ vaporis generationi conueniat: nisi forte in suapte natura sit stultulentus.

Quemadmodum enim frigidissima cõstruunt, maxime spirante borea, ætære sereneioris reddit: ac rursus calidissima cõstruunt æstatis, efficit ætærem nos ambiens purissimū: mediæ vero constitutiones nebulas pariunt: sic in animalium corporibus, à solo moderato, imbecilloque calore, a stultentū gigni excrementū consingit. Hoc igitur si per os excarnatur, ructum efficit: sin autem per sedem, flatu molitur, interitum streptem, interitum sine strepitu. Cum vero per neutrum deferatur partem, insanonē, symptoma ventriculi imbecilli, producit: quæ etiam mota per vacua intestina, in illis variis gignit strepitus: qui quidem ob acutius atque tenuius resonant, quo purior spiritus fuerit, magis per intestina tenuiora & superiora delatus: eo autē minor, sed grauior resonatio fennetur, quo spiritus magis ad inferiora intestina descendit. Quod si intestina ipsa aliqua humiditate cõtineat, strepitus murmurillus dictus gignetur, qui humidis excrementis deiectionē nunciabit. Si vero strepitus ædus, purus & clarus resonet, aut intestini ipsius inanitionē, aut in superioribus eius parte excrementa dura cõnneri significabit. Qui strepitus est stridore sit, is ab instrumentorum angustia, & insensente spiritu, atque pauca humiditate procedit. Desluxus à supernis partibus in ventriculū sit, ubi facultas prevalida, redvndantia excrementa expellit: interdum ubi adeo imbecillia exsistit, vt ne id quidem quod vrile est, ferre possit. Excernit id quod redvndat, tum per crises, tum per integrā valetudinē: vt in mulieribus singulis mensibus, & in his quibus aliqd membrū est mutilatū: id quod etiam per definitos circuitus cõtingere in aliis multis videmus, qui prioris vitæ exercitiis, cum ignauo ocio mutarunt. Atque excrementū huiusmodi sola quantitate est alienū. Alterū qualitate aberrat, magnāque ex parte in acutis morbis solet excerni per crises.

Inter hæc duo excrementorum genera, est aliud tertium genus mediū: vt in ventriculo semicoctus cibus. Hoc autem per hepaticas affectiones maxime excernitur. Cæteri nominant hepatici, quos ob iecinoris imbecillitatem infestat morbus, enā si nulla adfit phlegmonē. Hepar igitur, si quando alimentū, quod per mesentericas venas attraxerat, nequeat conficere, per easdem rursus id semicoctū ac simile aque in qua fuerunt ablate carnes nuper mactæ, respuit. Quod si alimentū in hepate accuratè concoctum fuerit, ob aliquod autē impedimentum distribui in corpus non possit, vt ad ventrem redeat est necessariū. Quo tẽpore excretus sanguis apparet nigrior, splendidior illo, qui naturalis exsistit: vtpote ex

sanguine & atra bile cõmixtus. Etenim sanguis solus per se ob refrigerationē nigricans, tantum abest vt splendorē vllum acquirat, vt etiam eum quem ab initio habuit amittat. Atra autem bilis eo splendidior exsistit: quale maris mortui birmen iudaicū. Siquidem id ex refrigerato sanguine, vt grumus, sed ex immo dicte astra, ferundūque, veluti quidam cinis, gignitur atra bilis. Ceterum ipsa est frigida, quia terrestris: nõ tamē caloris expertis: quemadmodū nec cinis, nec etiam acetum. Igitur cruentorum excrementorum quatuor sunt differentie. Prima est, ubi sanguis quantitate dictū est, per circuitus quosdam emanat. Secunda, cum ob imbecillitatem iecinoris, haud ab similibus lauacro abluatur earnum sanguis deicitur. Tertia (quæ nuper diximus) ex melancholico splendeneque sanguine constat. Ac per hæc tres differentias, & molitum est excrementum, & assam excernitur. Per quartam verò (quæ ex vlcere intestinorum oritur, præcipueque dysenteria vocatur) paulatim & breuibis intervallis deiectionem fieri cõtingit, nonnunquam tyncri sanguinis, nonnunquam grumosi: cum quo interdū puris quoque nõnihil externi solet: quemadmodum & ramenata, & partes quædam membranis intestinorum cõfirmiles. Sæpenumero densum quoque stercus excernitur, cruentis guttis respersum. Eiusdē generis cum prædicta dysenteria est sine finis vocatus, ob recti intestini vlcus eueniens: qui quidem cætera symptomata dysentericæ similia habet: tentionis verò vehementia, dysenteria longē superat. Vrinæ tum suppressiones, tum depravate expulsionēs, excrementis quæ vel in ventre retinentur, vel præter morem naturæ eiciuntur, proportionē respiciunt. Supprimunt igitur, vel ob vesicæ imbecillitatē excernere nõ potentes, vel ob osioli ipsius angustiam. Quorū duorum morborū ischuria est vnum cõmune symptoma. Est & aliud symptoma, cum nihil penitus vrinæ in vesicam delabatur, abolita nimirum renū actione. Alius itaque affectus censendus est, cum oppleta vesica, alius cum vacua, nihil vrinæ redditur. Nam in ea affectione qua vesica est plena, oportet aut orificium eius angustum, aut naturam imbecillam existere. Os igitur sit angustū, quia obstruitur & cõniet. Atque obstruitur quidem à grumo, vel crasso pure, vel lapide, vel callo, vel tuberculo, quod in meatu creuit: cuiusmodi in externis paribus omnibus accidere cernimus. Coniuet autē, aut obturorem præter naturam, cuiusmodi est phlegmonē: aurob siccitate tingentē, qualis per febres ardentissimas gignitur. Sunt verò deprehensi quidam vesicæ oppletam habentes, qui veluti surgerē à cerna, vbi ille exonerat, postea melere inequunt: qualis etiam affectus ventri & intestinis solet interdum accidere: igitur iam dicti affectus, vim excernendi vrinæ, sua functione defraudat. Qui vè ob his magnitudine relinquunt, actiones efficiunt obfuscas, rospidiat. Reliquos affectus tertium genus symptomatū (quod in morbis depravatis cõsistit) comitari cõsuevit: cuius multæ species habentur. Primam franguriam appellant, quæ vel ob imbecillitatem vesicæ, vel ob actiōis fieri videtur. Secunda species profusio

Atram bile si excreto sanguine splendorem. Atram bile plene ex sanguine effuso, affligit, sed edam, non tam calorem expertum. Cruentum excrementum diffinita quantitate.

Dysenteria signa.

Tingunt vrinæ ab vlcere intestini recti.

Vrinæ autem vnde soporū accedat.

Ischuria, quorū symptoma est.

Vrinæ meatum ex quo obstrui potestibus possit. Vesicae vlcus, quæ ex causa amittat.

Stranguria sit vel ob imbecillitatem casti, vesicæ, vel ob longam acrimoniam.

Dei. hanc in-
temporaria sit
perit voluta
re imperium.
Flatu in vtre
genu i pntia
lis hominibz
Et calore imbe-
cillo.

Serena simus
velis aeterni
ma stantia.

Flatu in vtri-
culo genant,
qua sequitur
compietata.

Streptum à fla-
tu proficuum
accutorem ali,
quo statim ipse
remouere iate-
funa magis p-
redit: grauior
autem, qui ma-
gis ille ex astra
vris deflexio-
deris.

Streptus mur-
murillus parum
stridens, quid
indicat.

Desluxus vnde
in ventriculo
accidat.

Excretionis
flatus modus.

Excrementum
sola quantitate
est alienū, quod
sit.

Hepatici qui
deciatur.

Alimentum ab
hepate in ven-
tre regit, quod
de vtriq. sit.

Crura quippe, ob incumbentiū eis corporū pondus, interdum in exteriorē, nōn autē in interiorē partē torquentur: idēq; pro natura ipsorū inclināone. Nam quibus rethora sunt, q̄ ordo nature postulet, magna ex parte sunt vari autē, quibus magis curuata. Voco enim varum, cui in exteriorē partem cura vertitur: varū, cui ē conversio. At postea q̄ adoleuerint, sepe ob repletionem immodicā, aut ob alimēti penuriā, figurā naturalem permutant, idēq; primaria ratione. Illud enim in elephantia, hoc in tabe perspicuū est. At ob resolutionem nervorū, distentionem, inflammationē, aut scierhum, naturalis membri figura ex accidenti vitatur. Siquidem in his qui altera parte sunt resoluti, membrū trahitur muscula actionem facientibus: at in his quos in altera parte conuulsio exerceat, aut phlegmone, aut scorbutus, aut dura cicatrix, pars sanātrahit ab affectu musculis. Cavitates partiū atq; meatus pereunt, vel offenduntur, q̄ nimirū coalescant, aut constringantur, aut obstruantur, aut cōstringantur, aut in sese cōcidant. At facultates retentricis motus immoderatus, solet esse causa cōstipationis: quēdammodū laxitas, operatio ex pultrici immodica, retentricisq; languor. Exasperantur leuia, & leuigantur aspera (nam hæc ad formā vitariū pertinent): illa quidem ob acres humores, aut medicamēta ab stergerint: hæc verō ob pinguitudinē succi, viscositatemve. Secundi generis, hoc est, vitariū numeri cause sunt, si quidem numerus sit diminutus, sectio, aut putrefactio, aut immodica refrigeratio: sin autē aliquod supercreuerit, quod nō sit ē numero partiū natura constantia, formāque naturalem sortitur, abyndantia optimæ materie erit causa. Quod si id ipsum præ se formā nō naturalem ferat, materie qualitas non naturalis etiam erit in causa. Vtrobique tamē vires validas esse oportet: alioquin nec conformari poterit q̄d est vile, nec extrahi q̄d vinosum exiit: natura enim vtrūq; molitur. Magnitudinē partiū augetur (in ea enim oblatā tertium genus constituebamus) à copia materie benignæ, necnō à potentia robore: imminuitur autem à causis cōtrariis, vel ob sectionem, vel exsiccationem, vel putrefactionem, vel deniq; ob frigidationē in gentem. Quartū verō morborū instrumentalium genus quod in praua compositione consistit, interdum ob repentinā improbiāq; agitationem contingit: interdum ob articularū humiditatē immodicā: quādoq; ob eversionem superciliorū in ipsis articulis: est enim ob relaxationē compositionis vitetur, quēdammodū in intestinorū lapsu, quæ laxato peritonæo in scrotum descendit. Ex his itaq; & aliis plurimis occasionibus, organorū compositionem pervertit. Nunc verō alterius generis causas examinemus, quod vtrūq; tam corporibus similioribus, q̄ instrumentalibus, cōmuniter accidit: id enim est vitariū solutio. Quæ quidem si carni accidat, vicus aut vulnus vocatur: sin autē

trinfecus aliquo violento, valido ac duro corpore. Ad solutionē etiam continui pertinent & ruptio & cōuulsio, hæc in nervis, illa in carne consistens: quæ causam suæ generationis habet, repentinum, validum atq; inæqualem motū. Virgite paucis expediām, omnū huiusce generis ægritudinum causas, nōnnullæ quidem occurrūt extrinsecas, nōnnullæ ab ipso corpore emanant. Porro exaristose sunt, ea omnia quæ percutere, collidere, requēre sunt a pe. Quæ verō à corpore emergunt, sunt immodice inordinatæ animalis motiones, ac præterea humores vinosi, erodendi vim possidentes. Hæc itaq; sunt simplices ægritudines similisq; partibus organicis cōmunes: ac præterea ipsarū simplices cause. Compositas autem ægritudinū causas, nō est admodū iuvenire diffi-

GALENI PERGAMENI de symptomatum differentiis, liber

VI.

Minis præter naturam affectus, aut morbus est, aut morbi causa, aut alius symptoma. Est autē morbus, affectus quidam præter naturam, functionē lædens. Cæteri differt affectus à morbo: nam ille quidem exiit etiam ad sanos & neutros: hic verō solū circa ægrotantes versat, cum nimirū sanitati cōtrarius existat. At ab vtriusq; differt, quod Græci pathos, Latini passio appellāt. Est enim passio, motus qui ab altero fit in alterū: ita vt agentis motus dicatur actio: motus verō, eius quod affectum est, passio. In summa, ipsum affici, quodammodo idem quod pati est. Differt itaq; ab affectu passio, ipsius tantū motiois ratione. Quandoquidē in ipso verti & mutari, præterea alterari & moveri, passio habet generationē: in eo verō q̄d manet, prout affectus consistit. Proprie itaq; affectus dicitur passio iam facta, nō autē quæ extinguitur sit. Sed quēdammodū ad sanos & ægros ipse affectus extendi, sic etiā & passio: quo quidem nomine à morbo similiter differt. Rursus affectus ipse, alius quidē naturalē actionem efficit, alius verō evertit & labefactat. Est igitur sanitas, naturalis quidē affectus functionis autem morbus autē, affectus præter naturā, oblatæ functionis causa. At passio, motus est in materia, qui ab agente fit: actio verō, ipse motus agentis. Quod autē suapte natura aliquid cōfert ad eius quod sit generationē, causa vocat: quæ quidē & ipsa multiplex est. Nam materia, vilitas, copus, instrumentū, inuēniē deniq; vnde, p̄ficiatur motus, hæc omnia cause dicunt. Quæ verō nihil cōferunt, sed tamen ab his quæ cōferunt seinggi nō possunt, hæc eius siue quo nō, rationē obtinent. Adverte autē, aliquid fieri per se, idem esse quod primō: ex accidenti verō, q̄d secundō. Vt, si quis digito vnū calculū moueat, à quo moueat & alius, per se quidē dicitur mouere primū, ex accidenti autē secundū. Ad eundē igitur modum, qui affectus præter naturā suapte ratione actionem nō labefactant, sed per morbos à se producos, non morbi, sed morborū cause, sunt appellandi. Morbi enim sunt, qui primō lædunt

Vari qui fit, & qui dicitur.

Vari qui.

Elephantiasis Tabes.

Resolutio altera parte musculi, membrū trahitur à relictis, qui in alia parte resoluti.

Conuulsio altera parte musculi, ad se partem valentē aliter trahit. Conspicua causa, Læsiō causa.

Numeri depravati causa.

Magnitudinem partem quæ causa potest augere aut minuire.

Compositio partem vitia accidenti.

Enterocolica generatio.

Solutio vitariū causa.

Caris unde gignatur. Collisio causa.

Ruptio. Conuulsio.

Affectus præter naturā est triplex. Morbus est affectus præter naturam, functionē lædens.

Affectus et morbi sunt differt.

Passio quid. Actio quid.

Affici quid. modo est idem quod pati.

Passio variatur in motu.

Affectus consistit in permanetia.

Materia, vt affectus, ad sanos extenditur.

Sanitas quid.

Causa quid. Causa multiplex dicitur.

Causa rationis eius siue quo non, obtinent. Fieri per se, & ex accidenti, quid sit.

Morborum causa. Morbi primō lædunt functionē

Symptoma est quod signum morbum.
Symptoma latet si signum quid sit.

Symptoma est passio et morbus quo differat.

Symptoma propter distictum, ut simplex.

Altitudo laesa est duplex, altera ad animam, altera ad naturalem functionem pertinet.

Altitudo animalis est simplex. Scilicet anima functionis est quadruplex.

Matrix functionis variatur pro instrumentorum diversitate. Gubernatrix anima functionis est triplex. Scilicet altitudo nem infirmis cernitur et pariter.

Tactus quem rationis sensus, motus grauius afficitur. Sensus reliqui a tactu, ab exteriori contrahitur, unde dicitur, ad quod rationis sensus non potest.

Sensus communis symptoma est regius veterum. Tactus est omnium sensuum communis sensus.

Matrix facultatum symptoma est triplex.

actionem. Porro quod morbum veluti umbra sequitur, id morbi symptoma vocatur: quemadmodum functionis lesio. Est autem symptoma largè sumptum, omnis a naturali statu mutatio: ob id quicquid animalis præter naturam accidit, ea significatione est symptoma. Quamobrem morbus quoadtenus etiam symptoma dicitur, siue & causa præter naturam. Dissert autem a passione symptoma (tamen interdu in idem coarctat) a passione quidem omnino in motu versetur, sitque interm secundum naturam: symptoma verò nō in motu tantum, sed iu habitu etiam & permanentia esse potest, omnino præter naturam. A morbo verò differt, quoniam neque affectus necessarius est, neque actionem ex necessitate lædit: quæ sanè ad constituendum morbum desideratur. Porro symptoma proprie strictèque sumpta (de quibus agere est animus) differentiæ triplici continentur. Alia siquidem nostri corporis sunt affectus, alia functionis lisiones, alia ambo hæc comitantur: vt sunt excrementorum immo dicuntur excretionem, tum suppressiones. Cæterum sub actionis lisione, priuatio quoque mihi inuaditur, quemadmodum immobilitas, insensibilitas, atque cruditas: quæ quidem actionis lisiones sunt. Hæ igitur symptomatum differentiæ deinceps examinemus, ab actionis lisione auspicam. Altitudo læsio duplex est: altera enim ad animalem, altera verò ad naturalem functionem pertinet. Actiones siquidem duplices potissimum numerantur, naturales videlicet & animalis. Rursus animalia diuiditur in sensibilem, motuam atque gubernatricem. Quorum membrorum singula rursus in alia scilicet. Sensibile quippe animæ functio, quinque differentiæ sortitur, viuum scilicet, olfactoriam, gustatoriam, auditoriam, atque tacticam. Motuæ autem facultas, cum vnicui instrumentum habeat, vnum tantum habet motionis modum: variatur tamen pro particularibus instrumentorum diversitate. Vltima functio animæ, quam diximus esse gubernatricem, in imaginatricem, ratiocinatricem, ac denique memoratricem diuiditur. Igitur novæ omnium actionum sententiæ, communes quidem vniuersaliter sunt, insensibilitas, & difficilis sensus: parciales autem, quæ in singulis sensibus reperiuntur: quemadmodum in oculis cæcitas: & caligo: in auribus surditas & hebetatio: atque in alia similitur, vbi videlicet actio abolita est, aut deprauata, aut diminuta. Cæterum tactus in actione sua, quam reliqui sensus, multo grauius symptoma, cum ab extrinsecis occurrantibus, tum vel maxime ab affectibus interioribus, solet recipere. Etenim alij sensus non ab interioribus, sed ab exterioribus affectibus, in functionibus suis consistunt: ac ne id quidem per se, sed ex accidenti, quod videlicet in eis habet facultas tangendi. Est enim tactus omnibus sensoriis sensus quidam communis: reliqui verò quatuor, suo quisque tantum esse proprius. Quamobrem oculi sepius me graui dolore cruciatur: committato sensu tangendi. At verò vigilia & venterius, sunt ipsius communis sensus symptoma. Motricis facultatis triplex reperitur symptoma: immobilitas, diminutus motus, ac denique deprauatus. Cæterum deprauatus motus, & alius tremulus est, alius convulsivus, alius palpi-

rans, alius denique vibrans. Porro si cœuallatur vniuersum corpus, animæque princeps potentia simul sit impedita, id symptoma epilepsia vocatur: apoplexia autem, dum totius corporis perit omnino motus, simulque principis actiones cohibentur. Hæc itaque monuimus actionum sunt vitiata. Proximè est, vt gubernatricium functionum illi offensas tradamus, ac primò imaginatricis. Hæc enim interdum tota corrumpitur exoluturque, quemadmodum in catalepsi: interdum autem vitatur, vt in delirio: est cum deficit atque debilitatur, quod in lethargo contingit. Sic etiam ratiocinatio, nunc exolutur penitus, ipsiusque symptoma est amena: nunc deficit atque remittitur, vndeque id symptoma fatuitas: nunc scilicet ac deprauatur, quod symptoma vocatur delirium. Plerumque siquidem in vtriusque simul casu sit delirium, tum parum probe imaginando, tum parum aptè ratiocinando. Est quædam durax in altero. Interdum quippe ratio vitatur, imaginatione simul atque memoria illæsa. Quemadmodum etiam ratio integra, contingit tum imaginatione, tum memoria vitari. Quod autem in memorandi potentia consistant vitiæ, nemini opinor obscurum. De animalium itaque actionum symptomatum dictum nobis cum sit, ad naturalium symptoma examinanda nos conuertamus. Methodus autem eorum inueniendorum est, naturalium facultatum cognitio: in quarum singulis duplex reperitur symptoma, alterum abolitæ functionis, alterum non itè obire: quod quidem hoc est duplex: alterum quod in diminuta, alterum quod in vitata actione consistit. Exemplum autem ponamus in cœctione ventriculi: quæ interdum quidem tota corrumpitur, interdum remittitur ob imbecillitatem, interdum vitatur. Quorum primò symptoma dicitur cruditas: secundum, cœctionis tarditas: tertium prauitas & vitio vocatur. Porro appetitricis functionis symptomata sunt, abolita appetentia, & immo dicuntur cibi cupiditas. Circa nutritionis actionem, si scopum minimè attingit, atrophia & phthisis accidunt. Vitatur verò nutritione sequuntur, leuce, ophiatis, alopecia, & reliqua id genus symptomata. Cum igitur naturales facultates sint quatuor, attractrix, retentrix, alteratrix, expultrix, sanè in singulis naturalibus organibus, quatenus naturalia sunt, duodecim oriri possunt symptomata: vbi videlicet in vniuersaque facultate cœgesit: in animalibus verò, quindecim. Quod si animalis instrumentum simul & mouendi & sentiendi vires obineat, duodeviginti symptomatum formas habere poterit. Ventriculus igitur duodecim sortitur symptomata, quatenus est cœctionis organum: totidemque quatenus pars similis, quæ nutrire desiderat. Si quidem omnines particule quæ nutrimentum suscipiunt, duodecim recipiunt symptomata: nescè tria (vt diximus) secundum singulas facultates, vbi videlicet aut nihil trahunt, aut languide, aut vitiöse: vbi id quod attractu est, aut non retinent, aut languide, aut vitiöse: vbi id iam retinuerunt, aut penitus crudum relinquunt, aut diminutè concoquunt, aut in alienam qualitatem cœuertunt: vbi excrementa ipsa expellere nequeunt, aut languide, aut perperam: hoc est, ætius aut tardius, quam animalis expeditur. Ex quibus

Motus deprauatus, epilepsia, apoplexia.

Imaginatricis facultatis symptoma.

Ratiocinatricis facultatis symptoma.

Rationis interdu vitatur, quatenus memoria illa sepius vitatur.

Naturalium facultatum singula duplex reperitur symptoma, nescè abolitæ functionis, nescè vitæ.

Ventriculi actio in symptomata sunt, cruditas, tarditas, cœctionis tarditas, prauitas.

Appetitricis facultatis symptomata.

Nutritoria animalis symptoma.

Facilitas naturalis, fund quatuor.

Naturalium instrumentorum singula, duodecim autem attribuitur symptomata.

Animalis instrumentum quindecim esse possit symptomata.

Sensibilis particularis, in qua nostro merito attribuitur symptomata.

vtiq; accidit, particulas non nutriti, aut imbecilliter, aut perperam & vinose. Quod verò in facul-
tandibus familiaris particulari dicimus, id etiam
intelligendū est in iis quæ ad instrumentales spe-
ctant. Porro alterarum facultatis in ventre tunc
abolita censetur, vbi cibus talis relinquatur, qua
lis assumptus est. Imbecilla autē dicitur, quæ rari-
de concoctionē absoluit: sicuti deprauata, quæ
in malignam qualitatē cibos ipsos permutat. At
abolita concoctio dicitur, vbi cibus in qualita-
tem animi familiarē mutatur. Animadvertendum
tamen hoc loco magnopere est, alteri sym-
ptomati alterū nōn unq; succedere. Siquidē in in-
stūm cōplectendū tēpus, cōtinuū sequitur dimi-
nuta cōcoctio. Præterea celeris diēctionis cibo
rum inseparabilia symptomata sunt, excremento-
rum humiditas, alimentiq; per corpus immu-
nata digestio. Corruptelā cibī sequitur necessariū
quidem excrementorū furor, nō necessariū verò,
mordicario & infillatio. Atq; horū sanē omnīū
iam dictorū symptomatū, quæ in actione obla-
ta consueunt, sicuti & aliorū duorum generum,
sciēdum est morbos causas existerē. Symptoma-
tum quæ in corporum cōstitutiō affēctibus, pri-
mæ differētiæ sunt quatuor. Siquidem alia ad
visum, alia ad odoratū, alia ad gustū, alia deniq;
ad tactum pertinent. Etenim quæ ad visum spe-
ctant, ea sunt quæ cōsistunt in colore præter natu-
ram, siue in vniuersum corpus occupet, vt in
arcuatis: siue aliquā eius partem, vt in carbuncu-
lis. At quæ pertinent ad odoratū, ea in respiratū
ac perspiratū deprehenduntur: vt si (gratia ex-
empli) quod diuities expirat ē corpore, siue per arte-
riam asperā, siue per vniuersum cutim, grauole-
nse ac putre sentiantur. In gustu autē symptoma-
ta sunt, omnes saporē qui rēgiæ præter solitū ac-
cidant: vt si alienas qualitatē percipere sibi vi-
deantur. T angibiles differētiæ sunt, vbi ea quæ
subiiciuntur tactui, genūm autē mutarunt constitu-
tione: vt si cutis quæ antea erat mollis, deperit
datur dura, rigidaq; aut ē conuerso. Cū igitur
omne quod naturāle est, ex cōmoda temperatu-
ra nascatur: vtiq; id quod præter naturā existit,
ex aliqua intēperie oritur. Quibōtem cū hac
omnia quæ diximus, prorsus præter naturā sint,
merito intēperie feruntur accepta. Atqui in-
tēperies omnis est morbus: ergo liquido con-
stat, has quatuor symptomatū differētiās, a mor-
bis generationē cōtrahere. Quæ verò vel exer-
cuntur a corpore, vel retinentur in eo præter natu-
rā (hæc enim ad tertiū pertinēbant genus sym-
ptomatū) aut tota quidem substantia, aut quali-
tatis tantū, aut deniq; quantitatis, a natu-
re ordine digreduntur. Atq; ipsa enī vel immed-
iatē sequuntur morbos, vel mediātē: intercidē-
tibus scilicet symptomatibus aliis. Iam verò hæ-
morrhagia, quod ad excrementa substantiā perti-
net, toto est genere præter naturā, sitiq; aut ap-
erto vasis osculo, aut rupto vase, aut erosio. Etenim
vulnus, ruptura, erosio, propriū familiarū partium
sunt morbi: at apertio osculorū, ad instrumenta
pertinet. Accidit enim interdum ipse sanguinis
fluor ob retenticiis facultatis infirmitatē: inter-
dum quia ex pultrix immodicē mouet: nōn unq;
ob vniuersę functionis noxam. Sic fit autē mulie-

bte profusiū, aut ob dictarū functionē iū sympto-
mata, aut quia sanguis est nimis serosus atq; sub-
tilis redditus. Sciendū tamen est, nihil eorū quæ
tempētū ē, hoc est, ad animalis cōmodum, circa
corpus cōtingunt, etiā si toto genere præter natu-
ram sint, verē dici symptomata (quale vtiq; est id
quod sequitur morbum, in lesione actionis
consistit) cū nimirū vniū quodq; eorū sit elegans
& absolutū opus naturæ, ramentū ad alterū
symptomati genus, nempe ad affectum præter
naturā, reduci possit: vt si sanguis per nares, aut
hæmorrhoidas, commodē erumpat.

GALENI PERGAMENI

de symptomatum causis, lib. 2.



Nō sensū actionē triplex symptomati-
genus deprehenditur. Vniū, cū
primū sensus instrumentum quippiā
perpeffum est: alterū, cū sentiendū
potentia: tertiū, cū ministrantū in

primo sensus instrumentum partium aliqua fuerit
affecta. vt, in oculo primū sentiendū instrumen-
tum est crystalloides humor, qui a coloribus al-
teratur. Vis sentiendū est quæ a cerebro per ner-
uum opticum, qui solus manifestum habet for-
matum, in ipsum descendens, procedit. Illius verò
gratia creantur sensus reliquæ omnes oculi partes.
Quicquid igitur ex enumeratis sit sensum, animal
vel male vel nihil omnino videt. Solet crystalli-

nus humor octo intēperaturis a naturæ modo
discedere. At facultas visoria offenditur, vel ner-
uo affecto vel cerebro. Hæc autē, quatenus similia
sunt, octo morborū generib. cōsistēt: quæ
tenus instrumentalia, rū obstructione, tum aliarū
rerū innixā, atq; adeo diuortio cōtinuū, qd quidē
tam familiaribus, q̃ ipsis instrumentibus semper
adeit cōmune. Iam verò si crystalloides humor
pervertatur ad alterū angulorū, haud ita notatū
digna succedē: nota: si verò vel ad superiora,
vel ad inferiora declinet, itaq; quicq; dē cernitur, do-
plum esse videtur. Illa porro quæ ex vīu sunt pri-
mo instrumentū, variis modis etiā cōtingit hæ-
di: vt puta si albuginē eius humor, spiritūque, q̃ in
te crystalloidē locatur, vsque deo copiosus sit,
vt visoriam facultatē impediatur: aut similiter si
foramen rhagoidis vel relaxetur, vel cōtractetur,
magis q̃ expediat visionē: aut si in aliquā diuella-
tur partē, aut deniq; si rumparur. Cæterum rela-
xatio illius, siue ab ortu sit, siue postea præter na-
turam accesserit, semper visui in cōmodatā distri-
ctio autē & immunitio, si quidē a naturā con-
tracta fuerit, a cutisimæ visionis est causa: si ve-
rō ex morbo ralis coarctatio cōtingerit, visionē
impedit manifestē: idq; nō quatenus coarctatio
est, sed quatenus a pēssimis causis induta. At re-
liquorū neutriū, siue a primo ortu, siue posteaq;
quis genitus est, acciderit, visioni, in cōmodū no-
ratū dignū adferre potest. Etenim vbi alterū ocu-
lum claudimus, dilatatur alterius pupilla: q̃ spi-
ritus antea ambobus particulatim distribuitur,
vniuersus in vniū cōfluat. Idcirco quibus suffusus
altero oculo clauso pupilla clarior apparet, iū spe-
rare debent fore aliquidō, vt visum, punctione
facta, recuperent. Quibus autem non dilatatur,
iū omni spē recuperādī visus sunt destituti. Vnde
liquidō

Symptomata
dici non debent
atq; ad animalis
in cōmodū circa
corpus cōtingunt,
vel si tota sunt ge-
neris præter natu-
ram.

Sentiendū alia
triplex sympto-
ma genus in
sopra adnota-
tu.

Crystallinus
humor est pri-
mum sentiendū
instrumentum.
Opticus nervus
solus manifestum
habet foramen.

Crystallinus
humor octo of-
fendit: scilicet
visoria facultas
vel nervo affe-
cto, vel cerebro.
Solent enim octo
morborum si-
militer crystalli-
næ particulæ.
Crystallinus hu-
mor semper
visui in cōmodū
districte immu-
nitio, si quidē
a naturā con-
tracta fuerit, a
cutisimæ visionis
est causa.

Pupilla forami-
ni relaxata
semper visui in
cōmodū distri-
ctio autē & im-
munitio, si quidē
a naturā con-
tracta fuerit, a
cutisimæ visionis
est causa: si ve-
rō ex morbo ralis
coarctatio cōtingerit,
visionē impedit
manifestē: idcirco
quibus suffusus
altero oculo clauso
pupilla clarior
apparet, iū spe-
rare debent fore
aliquidō, vt visum,
punctione facta,
recuperent.

Quibus autem non
dilatatur, iū omni
spē recuperādī
visus sunt destituti.
Vnde liquidō

Altera facul-
tas ventriculi
quando abo-
lita ē, imbecilla
dicitur, quæ rari-
de concoctio-
nem absoluit.

Symptomata
que in corporum
constitutione affe-
ctibus, primæ
differentiæ sunt
quatuor.

Symptomata
que in corporum
constitutione affe-
ctibus, primæ
differentiæ sunt
quatuor.

Symptomata
que in corporum
constitutione affe-
ctibus, primæ
differentiæ sunt
quatuor.

Symptomata
que in corporum
constitutione affe-
ctibus, primæ
differentiæ sunt
quatuor.

Symptomata
que in corporum
constitutione affe-
ctibus, primæ
differentiæ sunt
quatuor.

Symptomata
que in corporum
constitutione affe-
ctibus, primæ
differentiæ sunt
quatuor.

Symptomata
que in corporum
constitutione affe-
ctibus, primæ
differentiæ sunt
quatuor.

Symptomata
que in corporum
constitutione affe-
ctibus, primæ
differentiæ sunt
quatuor.

*Spiritus animi
lem a cerebro
demitti ad oca-
lu.*

*Spiritus distri-
ctus coactio-
nem plurimam
ad sensum fa-
ciunt: at distri-
ctus contri-
bit.*

*Rhagade tan-
tica vsum.*

*Popula con-
tractio quon-
dam facili-
ter agi con-
tinet: quon-
dam vero
Rhagade, seu
res quon-
dam con-
tractio.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

*Obiecta quon-
dam sensu-
m videntur.*

liquidò cōstitit, spiritum aliquē animalē accerebro-
demitti ad oculos. Si igitur pupilla amplius fue-
rit, spiritus implere illā nō potest: quare diffusū
ipsum, diffusū, dissipariq; est necesse. Si verò an-
gustior, cōgruit & cōstringitur, ac densior fit spi-
ritus. At coactus spiritus cōstringitūq; ad fa-
cilitatē sensus conducit plurimū. E diverso diffusus
dissipatusq; sensū difficiatē inducit: Est autē
albugineus humor velvni pugnaculum crystal-
lini, cuius etiā nonnihil essentis iuuat. Quis bre-
si immineatur quodsmodo, ipse crystallinus an-
reficit, ac super ipsum thaloides tūica corruga-
tur & cōcistit, sic vti visio ipsa oblate datur: nimirū
externo lumine p exigui mediū humoris crystalli-
lino occurrente. Si verò instrumentum visus ip-
sū, citra radiū tolerare splendorē nō potest: ob idq;
thaloides tunica illa est: obiecta, nigra existens
simul atq; cereulea, quibus colorib. oculis potis-
simum recreatur, quē infestant splendor. Vt cum
coarctatio pupillae, quē admodum amplitudo, si
quidem ab humiditate superflua trahat oriū, faci-
lem fin verò a siccitate, quā illi expugnabili, de-
spiciat cōrationē fortitur. Porro si thaloides tu-
nica ita sua cōtortitate soluat, vt tenuis ille hu-
mor prolabatur ad exteriorem, maximē visio labe-
factior. Ad hanc, si humor ille albugineus seipso
transfusio sitredditus, exacti cernendi, aciem mul-
to obtusiorē reddit. Quod si plurimum aucta sit
eratitudo, vsum omnino prohibebit. At si non
totum foramen a cōtento ibi crasso corpore ob-
tenuetur, sed relinquatur eius aliqua particula
pura, videre licebit, per illā exteriā res, idq; ni-
hilò deterius q; aut: sed vnam quamlibet solidā.
At si in pupillā centro exigua coarctata sustinuit,
manentēq; partes quē in circuitu sunt, purae: qui-
si sunt affecti, quicquid aspiciunt, id vel vni sene-
stracum putant. Vbi verò humor inter crystalloi-
dem atq; thaloidem mediū, propriū colorē
mutant, si quidem ad fuscum declinet, arbitratū-
tur quae se per nebula, vel per fumum etiā vide-
re. Sin alio quo vis colore inficiatur, huius quoq;
imaginem, ea quae spectantur, referent. Preterea,
quibus adeo absoluta est cernendi facultas, vni-
cuique quidem visibile eos latere possit, si va-
pores a ventriculo sursum ferantur, hos sympto-
mata sustinuit similia infestabit. In vniuersum
autem, vel parua, vel magna symptomata acce-
dent, pro ipsius magnitudine affectus. Cui spi-
ritus animalis simul & multus fuerit, & adherens,
si res quae porro distant, & videre, & discernere
potest. Cui verò paucius quidem fuerit, sed purus,
in res propinquas planē distinet, sic distantes
hauquaquā videt. Quod si humidior simul fuerit
& multus, res distantes videt quidem, sed nō ad-
vnguem discernit: quādammodum qui humidior
simul fuerit & exiguus, si neq; exacte, neq; porro
videre pōt. Ceratoides tunicae para illa quae pupi-
llae est obiecta, si crassior densiorq; sit, aciem le-
betem reddit. Si verò humidior densiorq; fuerit,
nō modo reddit vsum obfusum, sed etiam effi-
cit, vt quisq; est affectus, putet se per tenebra, aut
nebula, aut vaporem, aliquem, aut per fumum,
res ipsas cernere. At si humoris nō multitudine,
sed colore precauerint, secundum eiusdem colo-
ris naturam ipsa excutientia oborietur. Proinde

qui morbo regio laborant, quicquid vident, id
pallere arbitrantur. Quibus autem ea ceratoides
pars insigniter vicerata est, aut vulnerata vique-
adeo, vt ipsam vulnus ad interiora perungat, &
magna ex parte obrecantur. Vidi tamen equidē
puerum, cum iuxta pupillam puncta fuisset ity-
lo, sic vt aquosus humor efflueret, ac tota omni-
no cornea corrugaretur, visum (incredibile ap-
pū) recuperare, iustitaurio solute paulatim lum-
more qui per, velous efflueret. Solius etiam cor-
neae ipsius corrugatio (qualia senectute conse-
ctus solet semper accidere) simul est, visum ostēdit.
Ceterum si pupilla simul sit immutata, scire
licet, aquosum quoq; humoris immixtum exi-
stere: sin verò equalia permanent, ad istā cer-
toidem affectus pertinet. Corneae igitur morbi,
si fuerint magni, in totum visionem impediunt;
maximē si vel pliegmacone, vel suppuratione, vel
scurbio (quatenus instrumentū est) infestetur. In
hacres vbi membrana pliegmacone obiecta, ac
accidenti quoq; impedire potest visionē. At chy-
mosis, vnguisq; nō ex accidenti, sed primaria ra-
tione pupillā ipsam obcurat: quemadmodū gen-
narum ingentes tumores pester nae sunt. Gra-
uis audino surditas animā venire solet, aut
ob auris partē aliquā, aut ob nervū a cerebro de-
scendentē, aut ob cerebrum ipsum, si ea in parte,
vnde nervus oritur, affectum fuerit. Igitur nervi
cerebrū offensa in las, haud aliter quā in oca-
lorum affectibus, accidit. Reliquum verò par-
tium noxae, illis ad portionem respondentē: ve-
rū non omnino similis laesio exiit. Partes ita-
que ad auditum pertinentes, quatenus similares
sunt, oculo intemperatari videntur, ac praeterea
solutione continui: quatenus autem in firmimen-
tales, tum hac, tum obstruccionibus invadun-
tur, ob tumorem aliquem praeter naturam, aut
ob formem obturamentum auditorium meatum.

Cum autem lingua sit duplici facultate praedi-
ta, ac per vnam quidem sentiat, per alteram vo-
luntariē moueat: contingit sane ipsam aut mi-
nimē sapore percipere, aut deprauatē: idq; ob
tunicā, quae illam involuit, vel corporis ipsius,
vel mollium neruorum, vel eius cerebri parts,
vnde illi exoritur, affectum aliquem praeter
naturam. Etenim deprauata saporum dignitio,
vbi lingua alieno quopiam humore fuerit imbu-
ta, venire consuevit. Nam quemadmodum per
sususiones, ipsa visoria facultas foris videtur ea
cernere, quae in oculo apparent: ita & gustan-
do vis, internam linguae affectionem rebus sen-
sibilibus tribuit: quemadmodum etiā, vbi sonum
aures percipiunt, nulla res extrinsecus obstrepen-
tes, sed ipsa circa membranas, motione, & phanta-
mata transmittente. Quod vero spectat ad ol-
factricem potentiam, odorandi sensorii est prin-
cipium anteriori cerebri ventriculū: inferius
autē natus odoratus simul & respiratoris. Si igitur
vel rotundatur ipse, vel eius obstruatur me-
tus, idq; vel ab humore aliquo, vel a tumore prae-
ter naturam, olfactricis facultas vel minus pro-
bē odores percipiet, vel eos omnino nō sentiet.
Obstruccionem etiam osium caloloriorū, prae-
terea cerebri membranarum, atque adeo illae
quae in processibus anteriorum cerebri ventri-

*liferici patet
omnia obiecta
patere.*

*Visionem rece-
perat, ut puerum,
aut alios, ut
hominem, ut
b. it. utrumque
omnino corneae
gubium, dicit
non videri.*

*Chymosis.
Vnguis oculi.
Auditus sym-
ptomata vnde
proficiunt.*

*Linguae inesse
duplicem facul-
tatem, sensiti-
uam atque volun-
tariam.*

*Constat vis ob
quatenus partem
affectum
corpus, aut
nervus possit.*

*Odorandi sen-
soria esse prin-
cipium anteriori
cerebri ventri-
culū inferius
natus odoratus
respiratoris.*

*Obstruendi vi-
a quibus sicut
labios, ita.*

calorū oriuntur, ac denique insignes dictarū partium tum confusiones, tum sectiones, olfactricē vim maximē labefaciūt. Ob intertemperiem etiam ipsarū partium, soler fieri olfactus vitiosus. Porro tactus (qui sensus cōmunis est omnibus particulis sensibilibus) varia symptōmata recipit: inter quæ annūmeratur rū hæmodia, tum torpor. Est enim hæmodia denriū stupor, qui ob acidōs acerbōsque cibos magna ex parte oboritur. Torpor autē in toto corpore cōtingere solet, ex sentiendi mouendiq; difficultate affectus quidam cōposuit. Qui quidē manifestē videtur tum à te frigeratione, tum à compressione corporū neruolorū, ac denique à torpēdini marini animalis contactu, procedere. Vbi verō citra aliquam huiusmodi causam vltro torpor acciderit, rūc vel vitæ Ignaniam, vel ciborum multitudinē, crassitiem, sentitudinē, aut solitæ secretionis suppressionem antecessisse necesse est. Igitur eius causa cōiuncta, affectus nerui est talis, vt facultatē illi à principē parte missam impedire possit. Atqui impeditur, si neruus meatu aliquo pręditus, vel obstructus sit, vel compressus. Si verō meatū nō habeat, sed vti Solis radij per aquam, aerēque transire, eodem modo facultas à principio per neruorum corpora permittit, ipsa in transitu præpeditur; si à immodicā crassitudine neruus ipse penerit, quod illi cōtingit, aut trāsitis vtriusq; succis nutritio, vbi vltro frigore perfrigerato. Torpescunt etiam nerui, vbi vel la-

*Tallus inest a-
nimus sensibi-
libus.
Hæmodia rō-
de proficiat-
tor.
Torpor afficit
corpulentum, à
quibus causis
oriuntur.*

*Nerui ipsi sunt
in formam
præditam mi-
nime, Galenus
habet.*

*Paralytici à tor-
pore sola ma-
gnitudine des-
sunt.*

Laus.

*Spina quatuor
vertebra affe-
cta, resiliis ma-
nus.*

*Veniunt per
rōde.*

*Placuit quatuor
dent partem
lanciam, et
de proposita il-
la causa, sic
videtur, id quod
accidit in omni-
bus partibus
que per diuer-
sus neruos
transire, facili-
ter recipiunt.*

tis contingit sensum perire: incoluius functione mouēdi: vt in lingua & oculis planē videtur licet, ac breuius in omnibus partibus, quæ per diuer-
sos neruos, hoc est, molles & duros, illas facultates recipiūt. At in quibus mēbris duri duntaxat nerui inveniuntur, per quos vtrāq; facultas des-
ferret: ex ipsorum vellemtē laxatione functiones ambre labefacti tur. Nam si ablata cute subiectus muscularis, qui nudus est, videatur immobilis, sen-
tiar tamē rēgentes, exigui si accidisse noxā putā-
dū est: nempe q; tantā animalis facultatis partē suscepit, quāta ad sensum excitandū sufficiat: ad musculi verō mori, nō irem: quippe tangēdi sen-
sus, pari aliquo, porius agere, deprehenditur: promde ab exigua facultate sanctorū eius perfici potest. At musculorū morus in agendo, nō in pa-
tiendo, actiōnis efficacitā possidet. Is enim totū corpus transire debet: quod obrem plurima in-
diger facultate animalis. Delectatio autē & dolor omnibus accidit sensibus: sed in oculis minus q; in ceteris videtē perspicitur: in tactu & gustu, luculentissimē: ad ius dōmēps in odoratu: atq; hanc rēndem auditus sequitur. Id verō affectū præter naturā violentia statim in cidentis, doloris (vt Plato inquit) est causa. Vbi verō corpus ad naturalem habitum redit, idq; rursus assan-
oboritur voluptas. Porro vehementes eveniūt in tactu à naturali habitu transmutationes, ob violentem calidi frigidiq; occursum: atq; ob eas, quæ cōtundere, scicare, extendere, aut erodere repossunt. Nam si citra humōrē, nisi calori frigoriue ingatur, occurū sū inferre vim mi-
nimē cōsueverant. Ceterū fictio & rupio dolorē inferit, nō vbi facta est (quis forte ex accidētis aliquo) sed vbi etiam nūm sit. Iam instrumentū gu-
standi, quatenus habet facultatē tangendi, iam dictis causis diuelliur: quatenus verō ad gustū propriē pertinet, ab amaris, acidis, acerbis atque acerbis: quando quidem horū singula continnū didere possunt. At ab humoribus acribus reser-
luti vapores, vim olfactricem infestant: nam & ipsi continnū diuelliunt. Auditū vox turbat aspe-
ra, grauis, maximāq; & celerrima: quæmadmodū omnis violentus strepitus. Vsum atq; illustris-
mi splendores offendūt corruptūque, eō quod nimis disgregent. Passio itaq; molesta quatenus dictū est, oriri in omnibus sensibus solet: delectatio autem illi aduersa, à cōtrariis nascitur causis. Etenim vt cæruleus color incandescens est occu-
lis spectaculum, ita splendor candicis, qualis in sole cernitur, maximū ipsis dolorem inferre potest. Post hos secundo loco molestus quidem est color albus, delectat verō fuscus: nam ille visum effennā dissoluit, hic eam cogit citra violē-
tiam. Color siquidē niger hoc nomine visum effennā aduersatur, q; cogat ipsam violentiam, quā vt eam reducat ad naturā habitū. Ceterū id quod nigrissimū est, splendidi ssimū minus visum offendit, quia crassior cōstit substantia, ob iddy minus efficaciter agit: cām nimirum omnis res tenuis crassam actumtate superet. Sic igitur sol valde tenuis cū sit, pronus visum diffusur. Quare si quis diu in diffusis tenebris versatus fuerit, postea luci reuertatur, occubatur is quodāmodo. Merito itaq; cæruleus color,

*Tallus pari vi
detur potius
quā agere.
Tangendi fun-
ctio car ab exi-
gua facultate
perici possit.
Placuit eae pla-
rimum facultate
indignas.
Delectatio &
dolor quibus
sensibus maxime
ex quibus
nerui adit.
Doloris causa.
Voluptas quon-
dam.*

*Dolorem nec sit
citae, nec huius
datur inferre pro-
pria ratione.*

*Constat sensu
rum à quibus
nō afficiatur.
Olfactum au-
tem vapores in-
festant.*

*Auditum quo-
que turbant.
Visum quoq;
offendunt.*

*Cæruleus color
est optati-
ssimus oculis.*

*Niger color
quæ ratione
sui aduersatur.*

*Tenuis rei om-
nia, crassam a-
ctumtate superet.*

*Sol cui visum
diffuset.*

vt visio-

vt visioni iucundissimus est, ita maximā quoque præbet utilitatē: sed nō illi, quæ a sole disculsa fuerit. Huic enim vapore iam ægrotanti, cōtrarium remedium (videbitur color niger) est adhibendū: ei verō quæ sana, sed fangara est, color cæruleus, fuscusque, saluberrima spectacula exhibent. Porro fuscus color, ex albo nigroque contempertis nascitur: cæruleus verō, vbi candor splendori iunctus, non ita parum in nigrum degenerat. Mediū siquidem moderate colorēs (vt inquit Plato) ex contrariis inuicem confusis oriuntur. In auditu verō nō malē affectū, vt iucundissima vox censetur quæ & lenissima & rarisissima est: ita asperissima, confusissima, maximū inferre solet molestiā. Vbi autem fatigatus auditus fuerit, præter lenē ac tardam, exigua quoque est amica. At cū ægrotat, lenissima simul & tardissima, atque perquam exigua, illis multo magis absolutum silentium. In hoc sensu manifestior conspicitur defectio, quia crassior constat essentia: manifestior ad-

huc quā in hoc, voluptas percipitur a sensu olfactus, quod ipsius quoque essentia sit crassior. Est enim vt ær splendorem crassitudine vincit, ita vapor (qui extenuatus est humor) ære crassior existit. Atqui splendor ad videndū, ær ad audiendū, vapor ad odorandū sensum pertinet: quem admodum ad gustum, natura humida: ad tactū verō, solidū corpus. Gustus igitur, cū a naturali habitu uō declinat, maximā voluptatē adferunt omnes succi dulces, pinguesque, cū corporis ess-

sentie familiarissimi. Si verō ab aliquo ipsum insensitante nuper vitio cōtraxerit, pingues. Nam si excipietas partes maximē lenire consuevit. At vbi iam morbo afficitur, tunc succi contrarij sunt qui morbi exortatū, deflectare videntur. Ventriculus etenim visceribus & venis inseruit, huiusmodi succos appetens, quales illi sunt necessarii. Præcedit tamē iudiciū benignæ, quæ iis potissimum deflectatur succis, quibus ventriculus indigere videtur. Cōsensum aut huiusmodi potissimum causa est, vticiens ipsam membrana. Porro odorandū vis, qd ad ea pertinet quæ extrinsecus vel voluptatē, vel molestiam adferunt, gustandi facultati proportionē respondet. At vapores qui intrinsecus continentur, si molesti fuerint, possunt sensu percipi: suauis verō & omnino delectabilis, sensum latent: quædam modū inuasi quoque, & audire, qui in se nullum patiuntur vehemētem affectū. Delectamur in id genus sensibus, ad naturale habitū redeuntibus: hoc autē fit per idonea cōtraria. Idoneū autē voco id, quod primariō & per se, nō per mediū alterius rei interuentū, fuerit effectus causa. Quare procacitatis causæ im-

presentiarū spectandæ nō sunt. Iam verō gemites partes proprio quodam & eximio sensu afficiuntur, vnde & validissima prædura sunt facultate, exultant quædam seminis genitalis, in masculis: in femininis autem tum hæc, in rebus & seminis vas, tum attractrice per totum vterum. At genitalis seminis tum excretionem, tum comprehensionē, ingens comitatur & cupiditas & voluptas. Molestia autem quæ ex redundante atque intus retento semine oritur, paulatim & longæ temporis tractu incrementū. Nulla autē est pars quæ vel aded exactē sentiat, vel principum par-

tium vitæque pro suarū affectionū modo peninde afficiat, atque officium ventriculi, qui stomachus appellatur. Siquidem syncope, cardialgia, dyspnœa, apnœa, morbus, epilepsia, debnum infania, huius partis occasione evincere solent, idque consortij lege. Abolitam verō, difficilem, & deprauatam appetentiam, ipsa per se sustinet. Abolitam voco appetentiam, dum quæ nihil omnino appetit: difficilem, eam quæ est imbecilla. At deprauata, partim ad immoderatam cibi portionis exhibitionē vertitur, partim ad alienæ quæ litans desiderij. Etenim cum nutritoria functio nō vitiosa, sed naturalis sit, haud aliter in animalibus quæ in plantis perficitur. Idcirco animalibus vice tertæ fabrefecit natura ventriculum, vel vt promptuarium cibi. Ad dedit insuper facultatem quæ penuriam fecturet: vt animalia ad cibum ponentem excitaret, eodem impletur tempore: vocatū huiusmodi plenitudinis desiderij appetentia. Hæc ortum habet à penuriz sensu, cum venæ ex ipso ventriculo trahunt, vel vt mulgentes, suggerunt. Igitur suctionis sensus est fames. Primū itaque symptoma omnium est inanitas. Secundum est inanitarū partū naturalis appetentia. Hanc sequitur per venas, quæ porriguntur in ventriculum, ductio. Deinde suctionis sensus. Postremū ipsa animalis appetentia omnium vltima. Quam sanē functionē aboleri contingit, si vel suctionis sensus pereat, vel succus non fiat, vel corpus oon inanitur. Imbecilla verō erit, si iam ductæ affectiones accedere proximæ ad abolitōnem videntur. At deprauata sit appetentia, si velle mentis modum excedat: vocaturque à nonnullis canina, vbi vel ob acidi humoris vitium ventriculus mordicus infestatur: vel dum totū corpus exhaustum, aliudua nutritione indiget. Quippe frigidi humoris virum, rationem eam quæ fustij proportionē respondeat, inducit: ac appetentia, non aliter quæ naturale pathema, excitat: magis tamē cibū quæ potius desiderium affert, idque propter refrigerationem. Si verō salis aut bilioli humoris vitio ventriculus mordicationē senserit, potione magis quàm cibum desiderabit. Itaque ad excitandam famem frigus in ventriculo non parū confert. Inter potissimas autem causas, quibus fames impeditur, calor annumeratur, vt qui solida quidē corpora laxando dissoluat, atque ad attractionis functionē reddat imbecilliora: humida verō fundendo, supra modū extendat. Præuas autem qualitates appetunt h. quibus ventriculus rixitque sunt prauo aliquo excremento imbutæ. Qui affectus citta, seu pica dicitur, & mulieres vitiolis succis refectas insectæ obineunt, præcipuè vbi vtero gestant: quanquā etiam nonnulla accidit, vbi ipsæ quoque videntur humores ad osculū ventriculi confluunt. Similiter circa portū accidit quasi prius appetentia, vbi corpus nulla omnino eget potione, ob frigoris atque humoris excessum: vel ventriculus propriis affectionibus non sentit. Deficiens verō appetentia apparet, vbi hæc eadem faciunt imbecilliora. At deprauata intentionis cupiditas, deprauatæ appetentia ciborum proportionē respiciet. Siquidem immoderata potio appetitur, quando contenti in ventriculo tumis vitioli humores, aut salis sunt, aut

On ventriculi quæ affectu consensu lege et propria ratione sit causa.

Nutritoria functione non aliter per se in animalibus quæ in plantis. Ventriculus promptuarium cibi. Appetentia quid.

Fames quid.

Appetentia quando aboleri vel imbecillam reddi, vel vitiosam causam.

Causa appetentia quibus causis perficitur. Frigidus succi appetentia excitant.

Sicut salis humoris atque bili consensu.

Fames cur à calore impeditur.

Citta morbum quæ maximè infest.

Appetentia potione quibus decaus aut perit, aut inuoluitur, aut deprimatur.

Color niger. In fine, color niger, de quibus in libro de morbis.

Calores magis. Ex citatam inuicem confusis oriuntur. Audiam bene affectu, et ægrotat, quæ vices sunt infestæ, et quæ grata.

Sensum qui maiori voluntate fruatur, et qui crassiora ab illa possident. Vapor est extenuatus humor.

Gustum qui facit delectationem.

Pingues sunt, et affertur lenitas.

Ventriculus in formæ visceribus.

Odorandū vis, vapores quidē subterit, vbi sunt granit, iuncti, qui videri sunt, et latet. Semine intra se nullum affectū vehemētem patiuntur. Genitalis mibrosam vterum. Semine excretionem in corpore habentemque comitatur, atque capiditas, vel pica. Molestia est vterum semine. On ventriculi ex quibusdam est infestus proditi.

biliosum interdum etiā, cum veluti feruet in eo natura ipsius humiditas. At prauas potiones nonnulli appetunt, pro vino humoris, qui in ipsis vincit, ratione. Est præterea & aliud symptoma nonnullū oculum ventriculi infestās, nempe cardialgia vo catur, quæ à mordacibus succis oritur. Bulmos etiā, siue inextinguibiles fames, symptoma est eiusdem partibus, ubi penuria, imbecillitate, atq; refrigeratione afficitur. Mirandum autē nō est, si ob oris ventriculi affectus, animalia maximis isēdēq; vehemētissimis affectibus affigantur, cum nimirum pars illa per nervos quidem cerebro, per arterias autē cordi, vicino sibi, suas offensiones cōmunicet. At verō singuli sensus in singulis particularum instrumentis à sensibus alterati, perficiuntur. Hanc verō alterationē pars alterata sentit, eo quod à cerebro suscipit facultatem, quæ ad ipsam per nervū derivatur. Quippe cerebrum nō vti fit sentiendū instrumentū, sed vti sensuum instrumentū vim sentiendū largiatur, à natura institutū est. Nam quod singulis animalibus partibus per nervos sentiendū facultatē transmittat, liquidū parer, ubi nervus aliquis est diffectus. Si quidem pars ea in quam nervus ille distributus est, protinus sensum amittit. Taceo sensus inter dormiendū, aut oculos omnino esse, aut debilitate agere: quod tunc exigua facultas à cerebro in reliquis partibus defluit. Quiescit itaque per somnum animalis facultas, naturalis autem validius operari videtur: cum tunc cibum multo melius coquatur nō in ventriculo modo, sed tēnū per vniuersum corporis habitū. Est etiā ratio nō consonū, illud animalis membrū, in quo animala rationalia, velut in arce habitant, aliquando quiescere. Cor si quidem exigua admodū habere quierē videtur, quod longiori nō magnopere indiget. Arteries alter se habet in cerebro: quod quidem per vigiliā officio suo semper fungitur, per somnū verō senatur. Quamobrem profundius videtur dormire illi, qui fatigati multa exercitatione fuerūt: utpote quibus inter exercitandū plurimū facultas à principio defluat: quocirca cerebrū & requie & virium instauratione indiget, tum ob facultatem, quam transmisit, inanitionē: tū ob labores, quibus per multas functiones defatigatū est. Quemadmodū autē exercitati & promiores sunt ad somnum, & grauius dormiūt: ita illi quoq; qui cibum ingesserūt. Atq; hi eo grantiori detinentur somno, quō ingestus cibus humidior suapte natura fuerit. Idē & qui cum plurimo se vino ingurgitarunt, aut balneis multis, calidissimis liberaliter circa caput sum vti. Quippe huiusmodi omnia implere cerebrū suo maiore videtur: qui alioquin nō est in viliis ei quē multa exercitatio & lassum & aridum reddit. Etenim q; repleto capitis somnū conciliet, satis Aristoteles demonstrat. At verō si à frigida multatq; opprimatur humiditas ipsius cerebrū, venteris lethargicūq; somnū inducit. Ignitur ea quæ duxit hæmectat, nō ab resomniosa nominatur: quæ verō refrigerat, ea nec somnū conciliare, nec indolentiū inducere verē dicitur: sed pro somno veteris, grauiūq; soporē pro indolentiā autē, vel abolitionē, vel difficultatē sensus efficienti: idq; ob frigiditatis excessum. Rursus si-

citas immoderatio, & calor, veluti in phrenitide, vigiliās infert: quas neq; medicina, neq; solitudo peperit. Sed apoplexia etiā & morbus committit affecto cerebro fuit. Verū ut profundus somnus sentiendū functiones: ita apoplexia eas actiones quæ pendunt à voluntatis imperio, offendit. Ad hæc, qualis est infomnitas sentiendū functionibus, talis est cōvulsio per morbū cōmittalem morbus voluntatis. Porro cōvulsio quæ per totum corpus fit circa delirium, aut soporem, à spinalis medullæ, quæ in ceruice continetur, morbo dependet. Si verō vel manus, vel crur, vel musculus distendatur, aut convellatur violenter, ad illum semper neruum, qui partem mouet, referenda est noxa.

GALENI PERGAMENI de symptomatum causis, lib. II.

Quandoquidē iam exposuimus symptomata quæ circa sensum versantur, operē præcerea fuerit deinceps illa etiam examinare, quæ sub deprauato motu, cum cōmuni genere continentur: cuiusmodi sunt, cōvulsio, tremor, palpitatio, singultus, tussis, ructus, sternutatio, pandiculario, & stridor dentium. Quorū sane nōnulla quidem naturæ sunt opera, sed cōstet ab aliqua causā præter naturam: alia morbos sequuntur affectus, nihil ad ipsorū generationem cōferente natura: alia deniq; à natura & morbo simul cōiunxibiles ducunt originem. Porro naturæ opera sunt, sternutatio, tussis, oscitatio, pandiculario, & singultus. Solius morbi, palpitatio, cōvulsio, resolutioq;. Si vni amorum cōiunctū, omnis torpor & tremor. Ad quorū sane omnium particularis propriāq; differētia investigandas, sciendum est, quatuor esse facultates, quibus omnia quæ aluntur corpora gubernantur: attracticem videlicet, retentricem, alteratricem & expultricem. Cū igitur iuxta naturæ leges à animal gubernatur, nullus ipsarum motus esse symptoma censetur. Quod si quipiam in corpore præter naturā cōstitat, insurgatq; ad ipsum denicēdum expultricis facultatū aliqua, fit interim ut ipsarū motus sensu minimè percipiatur, interim vt nō lateat sensum, vtrū tamē in naturam symptomatis transeat. Igitur functionis à voluntatis imperio productus noxa est, neruorum resolutio, cōvulsio, tremor, stupor. Cæterum si instrumentorū quibus respiratio perficitur, resoluti sint nerui, apnea, hoc est, abolita spiratio: si verō vocales nerui, aphonia, id est, vox priuata, vocatur. At linguis paralysis, estis sermonem, voluntatis opus, omnino tollat, nullā tamen propriū obnuit nomen. Rursus isclia, hoc est, vniq; suppressio, haud ab hismodi quiddam apnea significare videtur: quæ per ipsam functionē, à natura, nō à voluntatis imperio pendens, tollatur. Sed si qui inuitus cogatur micere, voluntatis functionis offensa est. Haud aliter alid excrementū, si suppressum, ad naturalem finem deiciatur, idq; homine inuito, ad voluntariā functionē noxa referri debet. At si paralysis totum corpus invadat, symptoma ipsum apoplexia vocatur. Cōvulsio etiam ipsa pro variate particularū, variis appellationes fortitur. Nam si man-

Vigiliās inducit fœcitas & calor immoderatus.

Apoplexia quæ la afficitur fit.

Epilepsia quæ la cōvulsio fit.

Sensus deprauati symptomata.

Symptomatum quæ ad motum deprauatū spectant, alia quædam naturæ, alia morbi sunt opera. Si vti alia vtriusq;.

Facultates naturales sunt quatuor.

Motus voluntatis noxa.

Apnea quid. Aphonia quid. Linguis paralysis fit.

Isclia naturalis functionem tollit.

Excretionis in voluntatem quæ referenda fit.

Apoplexia est paralysis vniuersi corporis.

Cardialgia vocatur excoriat. Bulmos quædam excoriat.

Oris ventriculi cum principibus membris cōnecta.

Sensationes quomodo fiunt.

Cerebrū quomodo conditum. Cerebrum vim sentiendū partibus per nervos largitur.

Facultas animalis per somnum quiescit: naturalis operatur vehementius.

Exercitati vehementius, cor alium dormiūt.

Cibus ingesto corpus ad somnum reddunt.

Cerebrum quæ polius implere.

Capitis repleto conciliat somnum.

Veteris causa. Lethargi causa.

Sensitiva sunt humores. Superflua demittit quæ refrigerant.

Denique stridit.
Stridit hinc.

Conuulsio.

Stridit.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

Stridit hinc.

si mandibulari muscoli cōuellantur, stridor den-
tium si verò quolorū, tum perversio, tum strabi-
lismus, symptoma dicitur. Iam verò si rigido pe-
netremen exsistat, veluti cōuulsio que dā ipsa go-
norrhœa exsistat: si nō rigeat penā, refertur debet
ad eccentricit facultatē imbecillitatem. Non de-
signat & quibus videtur tum singularis, tum du-
plex infirmitas acris refractio, aliquādo ex cōuul-
sione musculari quā inspirationis infirmitas, proce-
dit. Epilepsia autē est cōuulsio vniuersi cor-
poris. At stupor imperfecta quædam est resolutio
peruorū: estq; ferē mistum symptoma, cōcun-
tibus in vni pugnantiūq; morbo simul & fa-
cultate. Omnes autē affectus qui neruos inten-
dere possunt, in duo capita reducuntur: plenitudi-
nem scilicet, atq; etiam inanitionē. Ac phlegmo-
nem quidem plenitudinē parit: ardentissimæ au-
tem & aridissimæ febres, inanitionē. Quod ve-
rò ad motum immobilitatemq; pertinet natura
lem, si manū extendere, extensamq; immobilem
seruare valeamus, animalis facultatis hæc fun-
ctio est: quistatus, & motus & immobilitas dici
potest. Sin autē supra rem aliquam solidam, re-
cte valentē manū deo penas, omnes muscularū
actiones laxauerit, hanc manū quæ neq; ad
morbum, neq; ad facultatē, sed ad innatam ani-
malibus grauitatem referre oportet. Quemad-
modum autē extensa manū duobus quæ va-
lentibus regitur motibus: sursum quidem ferentē
facultatē, trahentē verò deorsum infirmitas graui-
tatis, sic etiam tremor perficitur duabus motio-
nibus: vna, qua cogitur membrū ob grauitatem
ad inferiora dehibere: altera, qua sursum fertur
ad facultatē. Pugnāt itaq; per tremorē manifestē
facultas cum grauitate, vicissimq; facultas nunc
vincit, nunc imbecillia vincitur. Quoties con-
trahitur semper inter se motū successione, tre-
mor fieri videtur, cum sit motus cōpositus, quæ-
dammodum arteriarū pulsatio. Patet ergo huius
quodq; symptomatici generatio, & quod omnino
cum conatu sit impendi, secundumq; voluntati-
as impemū, cum facultatis tamē infirmitate. Por-
rò maximū onus validam deicit facultatē: in va-
lidam verò, nō solum hoc, sed parua quoq; pro-
steruat sarcina. Quod si ad multā imbecillitatem
deuenerit, vel sub proprio opprimetur corpore.
Quemadmodū autē animi affectus, qui moti-
cem facultatē imbecillitē reddidit, tremulus fun-
ctiones efficiūt: vt in nimore videre licet: sic mor-
bi, corporis in cōmōdiores viribus, tremoris sym-
ptomata inducunt. In primis itaq; & omnū ma-
ximē officit facultati, quicquid in intemperie cō-
sistit. At senectus quoq; intemperies quæ dā est,
ad frigis & siccitatē procliuor. Quamobrem se-
nes facile tremore vexantur. Ex iuuenibus verò
corripunturq; illi, qui yelociter fuerunt refrige-
rati, & qui multo merca vino se repleuerit, aut
multas ubinde candidates congeruerint, aut qui
diu multis cibis ingedis, nullo vñ sunt exercitio,
sed ignari in ocio xixerūt, aut qui intempestiue
frigidam aquam biberūt. Præterea crassitēnis
succi, facultatis meatus obstruentes, tremorem
efficere possunt. Palpitatio autē est dilataatio præ-
ter naturam, omni parti, quæ dilataationē sapientē
natura admittit, accipere potens, aliarū verò nul-

la. At dilari sunt nara, omnia quæ naturaliter
molliā exsistunt. Palpitatio itaq; nonnunq; cuti,
subiectisq; illi muscularis, & visceribus accide-
re cernimus: quemadmodū ipsi cordi & arteriis,
alio in eis præter pulsum (qui ab infirmitate fa-
cultatis) deprehensio motu. Cum autē palpitatio ipsa
ecliter oriatur & evanescat, necessum est illius
causam esse æream essentia. Quæ quidem si pau-
ca fuerit & tenuis, illico a corpore elueit. Proinde
videtur esse vapor crassius ac multus, idipso
capto spaciū in quo cōtinetur. Dilatat igitur, at-
tollit, atq; inflat partem, donec violenter explo-
sus, in cognatū sibi ærem expiret. Verissimè au-
tem est, refrigeratis quomodolibet partibus, at-
que interdū enā oblitus, palpitaciones acci-
dere. Porro vniuersus palpitatiois motus, quo
in vtrāq; partē agi videtur membrū, exsistit præ-
ter naturam: qua ratione & a tremore distinguitur,
& etiam maiora intervalla, quā tremor ip-
se, sortitur. At verò, vt in membrorū palpitatio-
ne sit motus paucis, paruis, & rarus: ita in rigo-
re sit multus, circū, & frequens. Atqui multū, vo-
co ex ipso monitū numero: citum, ex motiois im-
petu: frequentē, ex breui tempore quietis. Cæ-
terum motus luc nō est vniuersus præter naturā,
vt palpitatio & cōuulsio: sed potius totus ad ex-
pulsivam facultatē est referendus: est ipsam ir-
ritans causa, cogentēq; vt violenter moueat, præ-
ter naturam esse cenicatur. Est itaq; rigor motus
quidam cōpositus ex causa præter naturam, & fa-
cultate animalis, sed in quo virtus, quā in tre-
more, est vegetior. Vt autē exempla facultatis ex-
pulsivæ proponam, vterus nō alio pacto ad se-
tus additionē insurgit, quā vt retentam expel-
lat molem. Cum enim nouē mensibus sustineat
tum fortis grauitatē, tum suam ipsius extensio-
nem, atq; toto hoc tempore osculum ipsius ad ex-
actē claudatur, vt ne ipsius quidem aculeum
admittat: absoluto facta, ad ipsius secretionē ac-
cedit, diuersa omnino cōstitutione affectus. Nā
fauces quidem ipsius antea clausæ, adeo patent,
vt facile per ipsas totus fortis erumpat. Tunc
verò plurimū antea extensæ, & cōtrahuntur vin-
digi, & factum explodunt, vt ecliter ab vteri
ceruice decidat. Corruptū verò factum eicit illa
facultas expulsivæ, aut tertio, aut quarto, aut alio
quolibet mense, haud aliter q; initante parienti
tempore, matricis fauces aperiens. Similiter enā
ventriculus, ingedis cibis, claudat inferius oscu-
lum, ac nihil egredi finit, priusq; accuratē con-
coctum fuerit: si modo nihil aliud intercedere ip-
sam cogat functionē: quemadmodū corrupte-
la fortis in vtero. Sic liquidem solet ventriculus
narantes cibos vomere: ad inferiora verò ten-
dentes, per inferiora deicere. Sine cibis etiā in-
surgit sæpe vetriculus facultas ad vomitū: idip-
so prauam aut bilem, aut pituitā, aut alū huiusmo-
di succū, aut saniem. Iam verò qualis est per vo-
mitiones in vetriculo expulsivæ actio, eiusmodi
enā per tussis, est in pectore, & in pulmonib.
beneficio spiritus qui ad exteriora vehementer
mouetur. Nullū aut animal aut naufragi, aut vo-
mere, aut tussire didicit. Verū si causa præter na-
turam, aut vetriculi osculum, aut respiratiois
meatū obfuderit, pronus animal vel vomitōe,

*Palpitatioem
fieri a vapore
crasso simul et
multo incluso
in palpitante
particula.*

*Palpitatioem
fieri a vapore
crasso simul et
multo incluso
in palpitante
particula.*

*Palpitatioem
fieri a vapore
crasso simul et
multo incluso
in palpitante
particula.*

*Rigor adesse
motum multū,
citum atq; fre-
quentem. Rigor
est respo-
nsus ad ym-
expulsivam.
Rigor est motus
cōpositus ex
causa præter
naturam, &
facultate ani-
malis.*

*Vteri cōmō-
ditas & relaxa-
tio oportuna.*

*Ventriculi re-
tentio, expul-
sio, facultas.*

*Palpitatio
quid est quibus
partibus acci-
dat.*

Et

Sternutatio.
Mores sunt mor-
taliu respiratio-
num.

Tussis quid sit.

*Humores qui a
pectore educan-
tur facile.*

*Sternutatio, quoniam
tussis, talium a pec-
tore impati-
bus nari ex-
citant.*

*Tussis nihil co-
ducit capiti.*
*Sternutatio in
nat plurimum
caput, nisi ob
distillationem
accidat.*

*Nausea proce-
dit vomitum.*
*Cerebrum proce-
dit tussim.*
*Tussis revivida
affert spiritum
inacri-
piunt.*

*Tussis ob respi-
ratoris organa,
spiritum tribu-
tione prohibe-
tur.*
*Spiritus cohibi-
tus calidus in or-
ganu respira-
tionis astringit.*

*Aequalis intem-
peries cur nullo
afficiat dolore.*

*Dolor quando
accidit.*

*Inaequalis intem-
peries dolorem
cum inducit.*

vel tussis vexabitur. Ad horum genus refertur etiam
sternutatio, qua expelluntur quae retenta in na-
ribus haerent: quae & ipsae, meatus respirationis
excitant. Spiritus igitur vehementer motus, earum
meatus expurgat, hincinum exemplo, tibias si-
stulasque expurgantur. Itaque huiusmodi motus,
naturae opera existunt: annuuntur tamen sym-
ptomatis praeter naturam, ob causas naturae ipsam
vel sic moveatur cogentes. Tussis porro nihil est
aliud, quam vehementissima effusio, qua plurimum
spiritus celerrime foras erumpens, impetu suo ex-
trahit exploditque excrementa, meatus ipsius
obstruentia. Expelluntur autem facili, quorum
neonimis aquosa, nec lenta essentia fuerit. Cate-
rim illos humores qui in arteria contumaciter
haerent, & qui difficulter expectorantur, magis
evellunt sternutamenta: ut pote quae validiores,
quam tussis, habent spiritus impetu, licet aliam ge-
nerationis suae causam formentur. Quippe non ob ea
quae asperis arteriis, sed naribus molesta sunt, spi-
ritus violenter emittitur, cum quo ex prioribus
ventriculis cerebri explodi non nihil solet. Proinde
tussis capiti nihil conducit. Sternutatio vero,
nisi ob distillationem acciderit, haud mediocriter
praesidium affert capiti repleto vaporibus. Nec mi-
rum videri debet, spiritum vincto impetu & ex pul-
mone & ex capite emitti: nam cum principibus insur-
git, ut expellat quae infestant nares, utroque vitur
expirationis meatu. Haec igitur ratio facultatis ad
voluntate pendens symptomata. Vomitus vero,
vis illis proportionem quidem respondeat, ad
facilitatem naturalem refertur. Ut autem vomitum
nausea praecedat, sic tussim cerchinos, exiguas ad
tussendum impetus. Porro quicquid spiritum in-
tercepit, id tussis reilcere oportet: siue humor
sit in capite deflatus, siue illapsa portio cibi vel po-
tis, siue aliquid in asperis arteriis collectum, ut in
peripneumonia, pleuritide, & in convexa iec-
tionis partium phlegmone, aut in gutturis ipsius
asperantibus. Est & aliud tussis genus, quod ac-
cidit respirationis organa refrigeratis. Sed ita
affectus nihil inter tussendum expiunt: adeoque est
exigua ea tussis, ut spiritus cohibitione suppri-
mi, & ne eveniat, prohiberi possit. Quippe auge-
tur in institutis respirationis calor, ob cohibi-
tum animi: spiritusque sub thorace violenter oppres-
sus, in omnes arctos meatus penetrat. Haec autem
vtraque dum fuerit, omnia laevigant, ad tempera-
mentis aequabilitatem perducit. Iam vero intem-
peries ipsa, interdum simpliciter qualitate, interdum
duplici constat: nonnunquam eiusmodi qualitates co-
mitatur id quod intemperatum est, vel utriusque
quidam. Sedenim aequalis intemperies nullo dolo-
re affligit, cum nimirum particulae affectae ad se
iam veluti acquisivissent quae dam natura. Nullum
autem corpus a sua ipsius natura infestatur. Nam si
quorum natura mutatur, corruptiturque, dolore
afficiuntur: non quod illa mutata aut corrupta est.
Vbi vero in corpore quopiam sentiendi vi praer-
ogativa, inaequalis suboritur intemperantia: quan-
ta fuerit intemperies magnitudo, tanta etiam erit
molestia. Quare per tales intemperantias inae-
qualitatem quandam sentire se aiunt aegri, & in-
dignatur, omnesque partes distendit, sese revendi
gratia. Distenduntur autem maxime a somno expe-

recti, utpote carnibus vaporantia excrementa sen-
sientes, tum ob coacti cibi coctionem, tum ob hu-
iusmodi morionem quietem. Triplex autem in lasitu-
dine potest oriri sensus: corroborans scilicet, terrens,
unus, & ulcerosus: quia a causis praeter naturam om-
nes corporis partes quassantibus, distenduntur,
excitantur. Igitur ubi recti videtur corporis mo-
les citra quamvis exercitationem, a secessu lasitu-
tudo sentiens in sporaeva vocatur: quemadmodum
ulcerosa, ubi viciat sensus transcurrere per cor-
pus apparet: id quod motus magis accidit, quam
scentibus, nisi admodum magna sit lasitudo. Per-
teritis vero lasitudinis genus, quo a secessu quas-
la esse ossa, ne nimium quidem motu tolerare ex-
gri possunt: sicut nec per lasitudinem ulcerosam,
ubi nimium in creverit. Ceterum quemadmodum ubi
ulcerosus sit sensus horrent aegri, si corroborantur:
ita horrores affectus, si aliquis motus accesserit,
in rigorem transit. Atque hoc omnia oriuntur ab ex-
crementis mordacibus. Dissertur vero inter se excre-
mentorum multitudine & motu: propterea quod
alia magis, alia minus erodant: quodque ex corpo-
ribus ipsis alia sunt imbecilla, alia facilia, alia vi-
grius & afficiantur & sentiant. Facile etiam discrim-
causa, ubi citius vel tardius moveatur. Ad hoc idem
etiam homo, dum quiescit, solus interdum sentit in-
aequalitatem: dum movetur, horrores dum exer-
citur, rigores. Quobrem sic affectus consulunt
medici, ut ab omni motu se abstinant. Quinetiam
sol, balneum, exercitatio, ad motum excitant excre-
menta, alioquin quiescentia: quemadmodum & ex
alium affectibus iam. Porro a secessu ad motum ex-
crementa insurgit, si vel calidit, vel extenuetur,
vel in spiritum dissolvatur. Causa itaque emota lon-
ge est molestior quiescente, praesertim ubi defer-
tur per corpora sensibilia. Cum enim quippiam
per haec transiens, violenter ad cutem ferrit, in im-
pulsu per carnem cutemque transitur necesse est ut sit
miles, pungat, diuidat, vulneretque eas partes o-
mnes, quae obvia fuerit. Omnis autem causa mor-
dax morique, siue frigidissima, siue calidissima
fuerit, & horrore & rigorem animanti inducere
potest. Ceterum febres tertianae, ut omnium maxi-
me biliosae caliditate sunt, ita praeter cetera maxime
horrore possunt efficere: quod facit syncro-
res, eo in ipsis vehementior sit rigor. Porro arden-
tem febrem rigor superveniens soluit, quibusque
interim in venis cohaerebat, a natura per carnes
ad cutem decretorie excitatur. Quare morio-
nis eius, rigor & symptoma est & signum. Nam hu-
iusmodi rigore affecti, postea sudat, & liberatur
a febre, nimirum electa bile. Quare interdum etiam
non ad cutem, sed ad internas partes impetum fa-
cile, vel vomitione, vel alui solutione delicitur.
Saepe numero & intro & foras eadem die defertur,
ut simul & sudore & vomitu & alui defensione
bille vacuetur. Vbi igitur erodit apparet in parti-
culis cohaeretur, contrahuntur sanie, praecipue si il-
lud moveatur: quare maxime ad eius expulsionem
festinant. Coherant itaque atque cohaerunt sese,
mox quolibet impellit eam quam cohaerent excre-
menti portionem. Atque in hunc finem motus
universis particulis, totum corpus confusione
quassationeque vexatur: qualis videtur in eis, qui
sunt rigore correpti. Similiter etiam concurritur
thoracis

*Expositi a se-
cessu, ut si de-
stendant.*

*Lasitudinis tri-
plex potest oriri
sensus.*

*Lasitudo tem-
poranea, quae
quiescentibus
sentiens.*

*Lasitudo vici-
at, quae motu
quiescentibus
sentiens.*

*Lasitudo vici-
at, quae motu
quiescentibus
sentiens.*

*Horror transi-
it in rigorem, si
motus accesserit.*

*Excrementa a
quibus causis
moverentur.*

*Causa motus
longius mole-
stius quiescente.*

*Morborum mor-
dax, quae omni
causa sine frigida
siue calida fue-
rit, horrorem
rigoremque in de-
creta potest.*

*Rigor ardens
subest, ut si
per carnes, cutem
pungat, diuidat
vulneretque eas
partes omnes.*

*Rigor ardens
subest, ut si
per carnes, cutem
pungat, diuidat
vulneretque eas
partes omnes.*

*Rigor ardens
subest, ut si
per carnes, cutem
pungat, diuidat
vulneretque eas
partes omnes.*

*Rigor ardens
subest, ut si
per carnes, cutem
pungat, diuidat
vulneretque eas
partes omnes.*

*Rigor ardens
subest, ut si
per carnes, cutem
pungat, diuidat
vulneretque eas
partes omnes.*

*Rigor ardens
subest, ut si
per carnes, cutem
pungat, diuidat
vulneretque eas
partes omnes.*

*Rigor ardens
subest, ut si
per carnes, cutem
pungat, diuidat
vulneretque eas
partes omnes.*

thoracis musculi, ea quæ carnisbus ipsorum molestæ sunt, per pulmonum arterias expellere properantes. At verò nonnulli ægri cum egeant resectione sputi per regionē pulmonis, nec eam ob imbecillam thoracē moliri queant, sibi sternutationem provocant, naribus irritatis: vt ob violentum motionis impetum, ea expulsi, quæ rursus antea recidere haudquaquā poterant. Illa autē rursus, quæ ob intemperie organorum respirationis accidunt, ad horridis rigoribus genus pertinere videtur.

Vbi verò quæ corpus inieciat, humida suapte natura fuerint, per rursus ac rigore ab expulsiōne facultate impulsæ, vltro citroque feruntur, donec applicuerint ad conuenientē evacuationis locū. Sin autē solus spiritus sine humore, inmodicē vel calidus vel frigidus per corpus trācat, in tunc horrorem excitat, ac nonnunquam rigore: nulla tamen sequitur cōspicua evacuatio. Cum igitur & frigida & calida causa possint excitare rigore: calidæ quidē, si ætrea fuerint, refrigeratio satis efficaciter auxiliatur. Si verò sit humor, eam febris necessariō sequetur. Curatur autē evacuatione. At frigidæ, si ætrea fuerint, remediū est calidissimū. Sin verò sit humor, interdū sola cōcōctio sufficit, interdum vacuatio, nonnunquam amba cōueniunt. Etenim citra febrim nonnunquam oriuntur rigores ob pessimam victus rationē, vbi quis per oculū se impleuit, et subinde à cibo laeuat. Quæ rigoris species vete res ignoratunt medici, q̃ homines superiori illo seculo, nec tam intemperatē viuerent, nec tã crebro lauaret. Attamen rigor ille quoque partes vehemētē quantuntur & cōcutiuntur, ob frigidus succos nonnā excitari videtur: q̃ nō ob crassitudinē vehementer moueri nō possunt. Il verò si rigor per febrē nō intermittit accidit, idq̃ ergo imbecillo, est letalis, vt inquit Hippoc. Siquides in eiusmodi rigoribus, insurgit uariæ cōtra res noxias, quō eas expellat, sed victa cadit, extinguendūq̃, atq̃ hāc ob rem redditur perniciosum symptomā. Porro in quantānis febribus succus ex calido frigidūq̃ mixtus, rigorem excitat quippe atra bilis suapte natura frigidus succus censetur. Vbi verò adeo puris effusa est, vt febrim inducat, quāta adfuerit illi putredo, rātus & calor ingrat. Cum autē rigor à calidissimū & rodentibus succis fiat, mixta haudquaquā oportet, si partes extremæ omnes refrigerantur, declinante animali facultate vnā cum sanguine ad interiora: qualem motum videre licet in cōplurib. animæ affcibus.

Quod verò ad animæ essentiam pertinet, quæcūq̃ illa fuerit, est duobus alterum fieri oportet: aut q̃ ad omnes functiones vt primis instrumentis vntur & spiritu & sanguine, ac vel alterius, vel vtriusq̃ calorem: aut q̃ in his ipsis cōsistit. Per timorem etiam & spiritus & sanguis intus se recipiunt: quo fit vt algēt partes in superficie possint: idq̃ adeo interdum vehementer, vt nonnulli rigore quoque arripiantur. Per iram verò soluntur ac disperguntur, proindeq̃ exteriora incallescunt. At ægonia, affectus ex vtriusq̃ cōtutus, inæquales habermotiones. Jam & cordis & arteriarū pulsationes, & minimæ, & perq̃ debiles in trepidationibus esse videntur: sicut in irans maximæ & validissimæ. At in ægonia sunt inæquales. Per verecundissimā, animalis facultas in primis

quidē ad interiora mouetur, sed rursus æstatis reddit ad exteriora. Nam si nō redierit, iū verēcundia, sed timor censeri debet. Vt autē in timore cōsistit, sic in tristitia paulatim ad interiora fit motus: magnitudine duntaxat ac vellemetia, nō toto genere differentibus inter se pathematibus. Atque nonnulli ob subitum timorē pterunt: id idē solet cōtingere, vbi debilis suapte natura animula, sub valida perturbatio ne cōsternit & extinguitur & suffocatur. Etenim extinctio, affectum ex refrigeratione ortum consequitur: suffocatio autem, concursum sanguinis vniuersi ad ipsum principium. At ex iratis nemo mortuus est vnquā: vtpote quibus nery calor refrigeratur, neque robore dissoluitur. Præ gaudio autē nonnulli supra modū pusillanimes animi exaltantur, quemadmodum & timentes. Jam dolor ē diuerso cognominis animā, laud leuiora symptomata, q̃ maximus timor, inducit. Quippe laborantes decolores fiunt, refrigerantur, cōcutiuntur rigore, tremunt, pulsus habet minores, exolutioq̃, ac tandem similitur iis qui pterterentur, moriuntur. Nā & in his fugit insitus calor ad suum principium: animāq̃ simul & soluitur, & extinguitur. Per rigorem itaq̃ frigus non internarum, sed exteriorū partium sentitur. Quamobrē tunc nonnulli vehementi siti cruciantur, nimirū ipsis interno calore seruato. Consideratur igitur, pugnatq̃ per rigores cōtra ea que insensibilis, faculas, donec radicatus evallantur, excitanturq̃. Ob incursum autē vehementem, & quia etiā in intimo corpore cogitur, rursus magna vi caloris reuertitur, febribusq̃ rigore accendit, in eo certamine materiam habens auxiliari cōtendit: vnde & febris evadit vehementior. Quod si aliquando in pugna defatigetur anteaq̃ dimouere res noxias possit, necessariō mors subsequetur. At prinitus, qui excrementorū leuiter mordicantū est sensus, eos vexare solet, qui aut balneum negligunt, aut strigentes redunt, aut cruciantibus sunt refecti, aut prauis succis cibis vescuntur: sed præcipuē affligit infectos pfora vel lepra. Vt autē prædictorum symptomatū causas accuratius exponis, exigua quidē est, tenuis, falsa, & immota in pruritū. Exigua, tenuis, erodens, immotaq̃, in laesitudinē vlcerosā. Multa, falsa, crassa & immota in lepra, pforāq̃. Pauca, tenuis, mordax, ac breuē motum possidens, in horrore. Si verò aut vehementius moueatur, aut multū ab vnde, aut sit mordacior, iam nō horrore, sed excitare rigorem est natura. Pro intentione autē ut remissione ipsius cause, interdūtur aut remittuntur symptomata. Jam rursus causa in pulmonē, gurgure ac thorace consistit: sternutamentū, in naribus: singultus verò, in ventriculo & gula. Atq̃ in his omnibus expultrix faculas, quō excitat molesta, sed ad motus vellemetissimos excitat. Porro sternutamentū ipsum nonnunquam ex accidenti, humorū in pedice dehiscentiō, remediū existit, licet eius rei gratia excitatū nō fuerit. Similiter purgat ventrē & gulam: quare etiam singultus auxiliatur. Sed iam opportunū est vt de his dicamus symptomatibus, quæ circa principes functiones versantur. Quorū iā tria genera deprehenduntur. Primū, vbi perit omnino functio. Secundū, vbi illa ob-

Tristitia quæ
mortalis fore
tatur.

Timor subitum
quando per
mat.
Extinctio
quid.
Suffocatio
quid.
Tremor cum
pulso obortu.
Gaudis iussu
nonnulli ex
nominat.

Dolor qualis
dicitur sym
ptomata.

Rigori exten
sio refrigerat
tur, & internū
incalcescit.

Rigori febris
cur superuen
iat.

Prinitus quid,
et quæ insula
se solent.

Prinitus cau
sa.
Vlcerositas
inducit cau
sa.
Lepra pfora
causa.
Horror cau
sa.
Rigoris causa.

Sternutatio nō
nunquam ex
accidenti con
ducit sternut
mentū: sed
ventrē & gu
lam.

Sternutatio
interdū ex
pulsi, quæ
per insulam
possunt.

Rigor oriri
causa calida
et frigida possit.

Rigor mod
la.

Rigor citra
febrim quando
excurrit.

Intemperantia
vixit nunc,
quæ super
fecula.

Rigor quando
sit letalis.

Atra bilis in
quantānis quæ
ratione rigore
rem pportet.

Rigore homi
nis sola partes
extrema refri
gerantur, rursus
sanguine ad
interiora.
Anima sub
stantia Galeni
desinit non au
det.

Timore pro
frigerari retro
mo, calorem ad
interius res
ponere.

Ira calidissimā
partes extremas
ægonia quid.

Verecundia,
et mouetur.

Stultitia ori-
tur a frigore.
Obliuio a frige
regregatur.

Apoplexia cau-
sa.
apoplexia cau-
sa.

Deliriu quid,
et vnde ortum
habeat.
Phrenitis quid.
Phrenitis quid.
Phrenitis quid.
Phrenitis quid.
Phrenitis quid.
Phrenitis quid.
Phrenitis quid.
Phrenitis quid.
Phrenitis quid.

Atra bilis fidei
rationem omni-
bus amittit.
Mortuus a frige
mortuus a frige
mortuus a frige
mortuus a frige
mortuus a frige
mortuus a frige
mortuus a frige
mortuus a frige
mortuus a frige
mortuus a frige.

Hypochondria
causa efficiunt.

Cholici quid.

Alterationem
erroris est causa
Cholici sympto-
ma.
Candit quid.

Cochleolum
vitiu conu-
ge bifurcatum.

Facultas bifa-
rum ladiu.

Effusa facul-
tatu ladiu
propria sunt
intemper.

lyditur. Tertio, quando in aliena speciem degenerat. At perit quidem functio in stultitia, obliuio-
nemque affectus a frigore oriuntur. Quippe me-
dicamentis quae huiusmodi symptomata facere
possunt, refrigerandi facultas inest. Haec itaque sym-
ptomata cerebri corpus esse refrigeratum declar-
at. Apoplexia vero epilepsiaque, ex subitanea col-
lusione pinitur, replentis ventriculos cerebri, na-
sti videntur. Proinde horum symptomatum subita
e generatio & discussio, qualis esse per corpo-
ris intemperies non possit. At modica offendicu-
la, ac veluti torpores tum rationis, tum memo-
riae, ob minoris refrigerationem eveniunt. Porro de
linum omne, deprauatus est principis facultatis
motus, a prauis succis, aut cerebri intemperie or-
tum habens. Ceterum phrenitis dicitur, si febris
addit: ut mania, si absque febre accidat. Solae autem
melancholice alienationes, si frigidiori succo, pedit
colleat. Na phrenitis non simpliciter ob calidos
succos accidit, sed cum phlegmone vel in cere-
bro, vel in ipsius membranis producant. Atque
delirium a cutissimarum febrium vigore oriuntur,
mordacem calidumque vaporem habent, cerebrum
occupant. In omnibus autem animi alienationi-
bus, si timor atque tristitia diu persequerent, atra bi-
lem in causa esse est indicium. Quod vero atra bi-
lis rationale animae arcem occupat, timorem,
mestitiam, ac mortis expectationem inducat, ut
huc mirandum est, cum videamus in rebus exter-
nis nihil magis nos, quam tenebras ipsas, perterrita-
re. Si igitur quippiam tenebris simile rationa-
li parti animae circumfundatur, hominem semper
timere est necesse, ut qui timoris causam semper
in corpore secum ferat: ut in stultitioso illo mor-
bo, quem hypochondriacum nominant, indices
videre licet.

GALENI PERGAMENI de symptomatum causis, lib. III.

D Einceps autem de symptomatum causa circa
tum actiones, tum facultates naturales ver-
santur, dicendum est. Quod quidem igitur co-
coctio nihil est aliud quam alteratio secundum qualita-
tem, quae ventriculus nimirum molitur, dum sibi ci-
bos assimilat: nemo sane negauerit alterationis
erroris fore concoctionis symptoma. Ceterum si nul-
la penitus alteratio fiat, hoc symptoma absolute
vocatur cruditas. Si vero fiat quidem alteratio, sed
non qualem fieri expedit, vocabitur & haec cruditas,
non quidem tantum priuatio, sed etiam vitium conco-
ctionis existens. At vinum ipsum, bifariam accide-
re solet. Aut enim tarde alteratur cibi, ut vix pro-
pria transmutatione suscipiat: aut corruptum
tur omnino, ut nulla concoctione admittere pos-
sit: atque huiusmodi sunt concoctionis noxae. Qua-
rum causa communis quidem est alteratricis po-
tentiae ab scopo aberratio. Cuius aberrationis
duo prima sunt genera. Vnum, quod in portio le-
sa: alterum, quod in externo aliquo errore co-
sistit. Ceterum portio bifariam laeditur: aut per sui
ipsius essentiam, aut per aliquem morbum instrumen-
torum. Error autem externus tripliciter accidit. Nam
aut ab extremis ventriculi, aut ab cibis, aut a som-
ni tempore oritur. In in propria essentia noxae, in
temperies quaedam agentium qualitatium existit,

Ad morbos instrumentorum pertinet tumores
praeter naturam, abscessusque, & alij affectus simili-
es, quibus si cruciatur ventriculus, impeditur facul-
tas eius concoctrix. Quod si cum intemperie co-
acti ipsi instrumentorum affectus, viroque modo facul-
tas illa patietur noxam. Atque ob haec omnes causae
ventriculus male concoquit, vel nullo extrin-
seco errore incidente. E converso autem ventriculo
non male affecto, interea dum non coquit animal, aut
propter ciborum portionumque immodicam quantita-
tem, aut qualiter alienam, aut quia intemperie
ne, aut non recto ingeruntur ordine, aut propter ex-
crementum inuile, aut somnum breuem. Ordine pra-
posterum voco, ubi quis aut cydonia, aut punica ma-
la in primis ingessit, mox olera sumat ex oleo
& goro. Intemperie autem dicitur, ut si in aurora
antequam haerens cibis descendit, aut corpus fue-
rit modice exercitatum, praedum sumatur. Porro
corruptelae ipse, quae quidem fumosa sunt, ex ca-
lidioribus, magisque humidis oriuntur cibis: a ci-
dis vero, ex iis qui frigidiores natura sunt, magis-
que putrosi. Similiter etiam & in excrementis co-
tingit. Aciditas siquidem cret, quae putrosiora sunt
& frigida: fumosaque, quae biliosa & calida. Nec se-
cus veter, sub frigidioribus, quod morbis aciditas:
sub calidioribus, fumosa mutantur efficiunt. Tar-
da concoctio fit, quia cibi difficultate corrumpuntur,
vel quia illos facultas non superat: vel quia som-
nus huiusmodi, qui eos vincere possit. Vbi ve-
ro circa corruptelam cibos omnino concoctione
priuatur, sciendum est ventriculum plane esse vi-
ditum, vel ab immodica multitudine, vel ab ingenti
frigore. Ad eosdem reducantur modos quae in
vallis cruditates contingunt, atque etiam quae in ter-
ticia concoctione contingunt. Atque haec omnia indica-
uit nobis praecognita concoctionis ratio. Cum enim
temperiem huiusmodi, quae ex quatuor ele-
mentis consistit, & quae corporis ventriculi pro-
prietatem constituit, sciemus esse causam altera-
tionis ciborum, quod quidem ad hanc rem non mediocri-
ter ceteri calidum elementum: facile nobis via
ostenditur, quae cruditatis causas quoque inuenta
sunt. Igitur in vniuersis actionibus ista sympto-
matum genera reperiuntur. Quorum quidem primi
est, ab olia actio. Secundum, imperfecta, dimi-
nutaque: tertium denique, vitiosa seu deprauata. Venti-
culus itaque actione priuatur, ubi ne minimam qui-
dem immutat cibos. Imperfecte concoquit, ubi
tarde concoquit. Deprauate vero, ubi cibos cor-
rumpit. Eadem etiam habenda est ratio, & in coctio-
ne quae fit in venis, & in vniuerso corpore. Porro
ex vitiosis fucis giunguntur erysipela, cicatrices,
gangraene, phagedaenae, carbones, herpes, alijque
id genus affectus. Circa nutritionem autem actio-
nem, priuatio quidem actionis, atrophica est: ef-
ficiens nutritio, gracilitas, at vitiosa, in lentia, &
elephantiasi consistit. Quorum finis causa, alijque
ad potentiam imbecillitatem: aliae ad erroris quae circa
cibos committuntur: aliae ad studia huius exercitia,
& ea quae extrinsecus animalia accidunt, referuntur.
At vero imbecillitatis potentia, quae quidem
proprie laet, similis intemperie: quae vero non
proprie, instrumentales sequuntur morbos. Error
autem circa cibos exhibitos, ad multitudinem, succo-
rumque qualitate refertur. Quemadmodum & stu-
dia,

Instrumentorum
morbi.

Cruditatis aut
concoctionis vi-
tiosa causa sunt
in ventriculo.

Cydonia est
cibum in viti-
osum.
Intemperie
ciborum viti-
osum.

Corruptela
humosa acida
dicitur ubi
excrementum
est.

Coccolus
ladiu quid.

Alterationis ci-
borum causa
est temperie
ventriculi.

Symptomatum
genera tria re-
periuntur in ven-
triculis: imperfecta
diminutaque ab-
oluta sunt. Pri-
ma non vitiosa
est, & deprauata.

Sacri viti-
osus est effectus
productionis.
Atrophica.
Gracilitas.
Lentia.
Elephantiasis.

Imbecillitatis
facultas quae
morbo sequen-
tur.

dia, & ea quæ extrinsecus occurrunt, ad ordinem præpositurū, & interpeſtū vſum pertinere videntur. Oportet autē nō modō ſymptoma noſſe, verū eius ſemper cauſam inueſtigare. Nam ſi ventriculus ciborū cauſa, ſcilicet omnino cōcoctio, facile id ſymptoma cōſpigitur. Si verō ob extremum potentie lapſus, ſi in lenteria, aut ſymptomaticam mutabitur. Similis etiā & in ſanguifica-
tione, & in cōcoctione illa quæ per totū corporis habitū ſit, eſt in quaſiſio faciendā. Omnis autē in temperie, ſi vellemeſ fuerit, vires deicit. Quod ſi ſingus vicerit, frigidos affectus efficiet: contra, ſi calor: nec ſecus in reliqua oppoſitione. Si itaq; ventriculus calore immo dico æſtuet, illic cōrū pentur. Quæ quidem corruptela nidorē cōmuniter reſert: priuatim verō quilibet cibus id nidoris genus reddit, qd nature ſue propriū eſt. Nullus autē cibus, ſi immodice fuerit exal-
factus, putredinē eſſugere poteſt. At qui ſic ſunt affecti, ſit cruciatur, atq; interdum parui tenui-
bulq; leſiculis corripuitur. Si ob frigoris velle-
mentem interpeſtem cibus omnino crudus per-
manſerit, ita affecti nec ſiunt, nec febricit: ſed ci-
borū qualitate percipiūt, ſiue ad ruſtum, ſiue ad vomitū provocūt. Quod ſi leue aliquid cibus
imprimatur cōcoctionis veſtigium, fueritq; ciborum
natura aut modice temperata, aut frigidior, aci-
di ruſtus in ciuitabitur. Si verō calidiorē interpeſie
fuerint, aut ſuaſpente natura ſtātū excitare poſſint,
vapore ſpiritus ventriculi replent. Atq; in hu-
iſmodi interpeſtem facile ventriculus labitur.
Ad tantā autē vel ſiccitatis, vel humiditatis in-
terpeſiem, vt actio eius aboleatur, ventriculus niſi
in malo tempore, peruenire nō poteſt. In retenti-
ce potentia, triplex etiā reſpexit ſymptoma.
Nam aut nihil omnino complectitur, aut debili-
ter, aut deprauat. Cū igitur vel nihil penitus,
vel debilitate retinet, tū inſitationes, tum fluctua-
tiones ſequūtur. Porro vltimū imbecillitatis vē-
triculi cauſa aliquis morbus exiſtit. Morborum
autē qui accidunt illi, aliq; vel vni ſimilare, aliq; tan-
q; instrumentalem partē, ipſum ſolent affligere.
Mūltentur autem interdum & morbi, & ſympto-
mata tum retentitricis, tum expulſitricis potentie,
vt in ea ventriculi cōmōtione, quæ vel vti cōvul-
ſio illius eſt, eiꝝ per ſingulū accidit. Vētriculus
ſiquidem per ſingulū, prænē cibos amplectitur:
conatꝝq; deprauato illo cōvulſioꝝq; motu, etiā
moſteſta expellere. Etenim quem admodum per
vomitiones expelluntur ea quæ in capacitate ſu-
ſtuant: ſic per ſingulū illa, quæ imbuert ipſius
ventriculi corpus. Quāobrem piper, ſi in tenui-
ſſima cōminuitur (vt poſſit penetrare ipſius ventri-
culi corpus) ſumatur, bibatꝝq; poſtmodū calida
potio, ſingulū vel maximē excitat. In vniuerſum
autē, ſiue calida ſint, ſiue frigida, quæ permeant
ventriculi corpus, excitabūt ſingulū: qui pri-
mum quidem expulſitricis, dein retentitricis ſacul-
tatis eſt motus. Nauſea quoq; expulſitricis ſacul-
tatis eſt deprauatus motus, quō per gulam celer-
rimē vacuetur, qd os ventriculi inſeſtat. Inter hęc
numeratur lenteria: vbi de re quāpiā ſic irritatur
ventriculus, vt eam per inferius oſculū expelle-
re cupiat. Illo quidē ad expulſionē vitur oſſicio,
in qd humores cōſiſtantes inſiſtant. Quod

ſi in vtrunq; repāt, vt in cholera morbo, vtrunq;
oſſicū aꝝ cōmōdat. Attractiō etiā ſacultas, aut
omnino nequit cibos attrahere, (quod ſympto-
ma dicitur gulæ paralyſis) aut diſticultate trahit,
vbi incipit gula reſoluſ: aut deprauatē trahit: de
quo motu iam ſæpe diximus. Eſt cū ob innatā
carunculam tota gula aut eius pars obſtruitur:
qui morbus inſtrumentalis vocatur. Cū igitur
ventriculus naturaliter habet, ſuperius paribus
ad ſeſe trahit, atq; per inferiores deicit. Vbi verō
præter naturā affectus eſt, etiā ab inferius aſſu-
mit aliquid. Si quidem nōnullis clyſmi vomitio-
ne ſunt redditi: ſicvri & ſtercus, per letales volu-
culos. Sanius tamen eſt dicere, ventriculū per id
genus affectus, nō trahere, ſed recipere ab inteſ-
tinis excrementa violenter cōpreſſa. Id quod ſol-
let conningere iis, quibus ob negocia nō licuit,
quādo expediens erat, deicere. Nonnunq; etiā
ſit voluulus, vbi inſteſina ſuo illo naturali cōſi-
ſtitioꝝq; motu priuatur. Quin etiā indurātū ſter-
cus tumorēq; præter naturā, obſtant aliquid, vt
vel nihil excrementorū ſeratur deorſum, vel
nō ſatis copioſe deiciantur. In ſumma verō, om-
nia ſymptomata inteſtinorū, ad ea quæ de vētri-
culo diximus, reſeruntur. Alimenti per corpus di-
geſtiō (quæ & ipſa naturale opus exiſtit) tunc ad
amulſam perſicitur, vbi quælibet pars peculiare
ſibi allicit cibum. Accidunt autē illi tria ſympto-
matum genera. Nam vel imbecilla eſt, vel depraua-
ta vel omnino ceſſat. Quorū ſanē ſymptomata
cauſe dicuntur, aut trahentiū partiū interpeſ-
tem, aut inſtrumentorū morbi, aut digerendi
alimenti prauitas. Ac per interpeſtem quidem,
ſacultas redditur imbecilla. Inſtrumentorū verō
morbi, alimētū meatꝝ cōſtringunt. Prauitas au-
tem dicitur, ſi vel craſſior, vel glutinoſior ſit ci-
bus ſimiliter impedit expulſionē excremento-
rum, triplex cauſa inueniūt. Vnā, cū partes
quæ excrementa expurgant, ſunt imbecillē: alte-
ra, viarū anguſtia. Poſtrema eſt excrementi mali-
tia. Imbecillitate interpeſtem parit, anguſtia ve-
rō, vel obturatio, vel aliquis inſtrumentorū tu-
mor. Atqui tumorū cauſa eſt humorū aſſuſus.
Obturationē facit humorum vel craſſitudo, vel
lentor, vel innatū tuberculū. Excrementorum autē
malitia, eſt multitudo, craſſitudo, & viſcoſitas.
Per cōcoctionem in venis factā, tria redvndūt
excrementorum genera. Vnum bilis amara, quæ
ad hepatis veſicā expurgatur: alterum atra bilis,
quæ a liene: tertium velvī ſerum, quod attrahit-
tur a renibus. Cū autem viarū duo ſunt ge-
nera: vnum per quod excrementū trahitur, alte-
rum per quod expellitur: vtriuſq; labet anguſtia ex-
crementoſe lædēte poteſt. Nonnunq; etiā horū
nullum eſt læſum, ſed excrementū multitudine cū
immodica eſt, vt tota expurgari nō poſſit, vñ
cum ſanguine per totum corpus deſcendit. Huius
verō immo deſerionis duplex aſſertur cauſa: nē-
pe alteratrit potentia malē affecta, & alimentorū
prauitas. Iam verō pallida bilis, ſi redundet
per vniuerſum corporis habitū, regium morbi:
ſi autē in vna tantum parte cōſiſtat, eryſipelara
& herpetes excitat. Atram bilem, ſi in vniuerſo
adſit corpore, elephas: ſi in vna aliqua parte, can-
cer ſequitur. Pituita, ſi per vniuerſum corpus in-

Cholera mor-
bus.
Attractio ſa-
culi ſym-
ptomata.

Voluulus morbo
digerenti, ven-
triculus ad in-
teſtina excre-
menta expulſi-
ſa vitia.
Voluulus vnde
ſolent viti.

Digeſtionis ci-
borum ſympto-
mata, atq; ipſa
tum ſymptoma-
tum cauſa.

Expulſionis ex-
crementorū nō
reſpiciendum,
cauſa triplex.

Excrementorum
per anguſtiam
vtriuſq; cum ſan-
guine, tria gene-
ra.
Excrementorū
tria duplici.

Bilis pallida
quæ morbus
regii, per cor-
pus ſola.
Atra bilis quæ
morbus parat.
Pituita quæ
morbus gignat.

Intemperie
omni reſeruit
diſticta viti.

Ventriculus
ſuſcitans, cibus
in vapore nō
deſuſcitans
pū.

Acidi a quibus
adſit ruſtus.

Retentitricis
potētia triplex ſym-
ptomata tribuitur.

Ventriculi mor-
bi duplices.

Singulū cauſa.
Singulū reſpici-
ti illa, quæ ſim-
ilitudine ſunt in
ipſum ventricu-
li corpore.

Piper ſi tenui-
ſſime ſumatur, poſt-
modū calida po-
tio, ſingulū
excitat.

Nauſea, expul-
ſitricis ſacul-
tatis eſt deprauatus
motus.
Lenteria cau-
ſa.

creuerit, leucophlegmana comitatur. Sin aut in vna parte, oedema. Serosa excrementa si redundant, ascite aqua inter cœna inducitur. Quæ si vnam aliquam partem invaserint, in ea pustulas gignunt. Pro miscella autem ipsorum excrementorum, variari solent & morbi, & symptomata. Porro nutrimento, vt naturalis actio non est prima, licet per quæ necessaria existit: quippe quæ species alteratricis facultatis censetur. Assimilatio liquidum altera-

no est: quæ quidem, licet nomen diuersum à nutritione sortiatur, idem tamē vtriusque est opus. Nutricatio autem à scopo aberrat, si vel nihil omnino agat, vel ab actione perfecta deficit, vel vi

tuose agendi quod alitercum facultatē, quæ sub alteramionis genere continetur, vel ob materiam tum defectū, tum prauitatem. Ob defectū quidem, vt in atrophis, siue hæc ex defectu, siue ex priuatione dicatur. Hic aut in atrophis defectus, non proprie ad cibū qui ingeritur, sed ad materiam mem-

bro dicatū, est referendus. At prauitas cibi, leucos & elephantiā, eiusque generis alios affectus gignit. Verū vbi caro nigra pallidæque fuerint, elephas nominatur. Nec aliter affectus hic gigni so-

let, quā leuce. Iam alphi hæc diuersam à prædictis habent generationem. Cæteri per hos non caro vniuersa alitur, sed corporis superficies duntaxat, vel vti siquāvis quibusdā inspergitur. Atque albi quidem ex pituita, nigri verò ex melan-

cholico humore prodeunt. Si quidem alimenta carnem maximè permutare ad suam ipsorum naturam possunt (etenim Perlica plana, cum in Perlia fuisset letalis, postea in Aegyptum trans-

lata, quod inerat noxium amittit) quantū à carne etiam, alimēta ipsa immutatur. Omnis siquidem res, vel si longè potentior sit, ab illa cum qua ver-

sanatur, afficitur. At non solum ob alteratricis facultatis imbecillitatem, pars aliqua alimēto priuatur: sed etiā vbi attrahendæ vis imbecillior fuerit, aut expultricis immodicè mouetur. Atque tūc immodicè mouet expellendæ vis, vbi retentrix potentia grauat, vel ob excrementorum multitudinem,

vel acrimoniam, vel ob propriam imbecillitatē. Tunc siquidem necesse est, vt cum eo quod redūdar, simul etiā id quod vtile est, excernatur: vt in lenteria, dysenteria, choleraque fieri coningit. Quod si expultricis facultas fit imbecilla, necesse est carnem tunc humidiorē fieri, pluribusque excrementis impleri. At redundanti multorum excrementorum, ob alteratricis facultatis imbecillitatem accidit. Pro ipsorum autem excrementorum tum quantitate, tum qualitate, aliis alter-

caro immutatur. Quod verò ad sanguinis excrescitionem pertinet, si excipias cam quæ feminis per singulos menses accidit, reliquæ omnes toto genere præter naturam existunt. Profluua autē vtri, vbi modum in quantitate excesserint, tunc solum præter naturam censentur. Omnium autem sanguinis flutorum causa, tristitiam potest ac-

cidere. Quippe vel facultas ora vasorum aperit, vt in sanguinis fluore & narib. est videre: vel sanguis est male affectus, vel vasorum aliquod est male affectum, vel ruptum. Etenim vasa rumpi cōtingit, aut ob plagā acceptam extrinsecus, aut ob saltum, aut ob casum ab alto, aut ob vociferationem vehementem. Sanguinem malè affectum

duco, vel cum adeo viriosus est, vt vasa quib. continetur, erodant: vel adeo auctus, vt à vasis cōn-

trahi non possit. Vasa malè affecta dicuntur, si vel molliora, vel duriora, vel tenuiora fuerint. Si quidē quod immodicè molle est, facile ob imbecillitatem ruptum: si viciū, quod adeo durum, quia non facile multum extendi potest. At tenue, ob huius-

modi has vtriusque affectiones, non solum ab internis causis, verum etiam ab externis vt rumpatur facile, est habile. Verum non omnia vasa erodi similiter possunt. Nam durum crassiusque, erodū est contumax. Similiter de reseratione est dicendū.

Nam vasa imbecilla, mollia & tenuia, pro na sunt vt oscula ipsorum pateant: robusta verò, & crassa & dura, sunt ad talem reserationem inepta. Ceterū reseratio accidit ab iis quæ ora vasorum iritant, & à plenitudine grauante: si vti quandoque à natura, cum excernit ea quæ sibi molesta sunt. Sed iam de iis quæ vomitu reiciuntur dica-

mus. Excernuntur igitur hæc interdum, quæ quantitate & mole sua ventriculū grauatur: vt cum plurimum cibi est ingestum: interdum, quæ sua mordacitate continent: vt si nutrimentum assumptum vel acidum, vel nidiosum, vel amarū, vel acre, ob vitium cōcoctionis euaserit. Eodem genere continentur & biliosa, & pituitosa, & serosa excrementa, vel inibi nata, vel ex vniuerso corpore illuc confluentia. Tertium causam genus ventriculū ad vomitū incitans, est quod haudquaquā iritans, in illo cōtinetur præter naturam vt videlicet sanguis. Cōmunitur autē dicatur esse præter naturam, quæ etiam si sint concocta, mirum non possunt alere. Iam verò excrementa ad infernas partes expulsi, non nunquā solum tempus præuenit, vel quia venter copia multo cibi grauat, vel pungitur, vel citatiusque vt à remordente, quam vt alienam expellere nititur. At dicimus multum cibum, vel quia facultas seipsa imbecillior est reddita, vel quia existit assumptū alimentum immodicū: vel ob vtriusque causam. Præter iam dictas causas, alimenta tum humidiora, tum viscosiora ingesta, ipsam defectionē accelerant. Quæ tum celerius delabuntur, cum leuiter post eorum assumptionē decambulauerint. Cum autem complura sint intestinorū volumina, per quæ deferti alimentis est necesse, ubi sanè ipsi ob grauitatē diu immorari non possunt: quod si eorum iniquitatem in ipsius circumvolutionibus fixum inhæreat, id si vbiro ab actione intestinorum (quibus inest vis expellendi instantia, propellitur. Tardius quæ pro consuetudine excernit venter, aut ob intestinorū vel imbecillitatē, vel obitu-

senfium: aut ob alimentorum tum paucitatem, tum qualitatem. Sed musculorum abdominis imbecillitas etiam defectiones retardat, præsertim si duriora sint excrementa: quo tempore rhora & musculi etiam auxilio sunt. Pauciora quæ pro ratione assumptorū excrementa excernuntur, vbi plus ex cibis per corpus digeritur. E con-

trario plura deiiciuntur quā pro portione ingestorum, interdum ob defectum digestionis per corpus, interdum ob excrementi quædam est superflua ad regionē venter defluxa. Porro a frigidis excrescitiones, vel ob imbecillitatē, vel ob morbum eveniunt. Imbecillitatem intemperies inducit.

At mor-

Sanguis aut quāritate, aut qualitate immutatur. Vasa quousque excernit male affecta dicuntur.

Reseratio vase non vnde accidit.

Vomitum à qui bus causis moueri possit.

Sanguis in ventriculo continetur præter naturam.

Defectio citantis causa.

Cibus multus quousque digeritur.

Alimentum tardius deieci quæ causa est.

Excrementa erant plura, namque pauciora, quā pro ratione cibi assumpti, excreuantur. Huiusmodi causa.

Serum sanguinis quousque afficitur producat.

Nutritio est ad naturam aliam nam prima. Assimilatio alteratio est. Nutritio facultatis symperata.

Atrophia.

Elephas quid.

Alphi.

Alimenta ad suam naturam immutantur carni, & immutatur ab illa. Perlica plana. Causam aliam afficitur. Alimēta priuatur vnde accidunt. Expultricis vis quousque immodicè mouetur.

Expultricis facultas excrescit in imbecillitatem, quousque accidit.

Signis excrescitionis, menses, menstrua excrescit, præter naturam existunt.

Sanguis quousque excrescit in imbecillitatem, quousque accidit.

Vasa quousque morbo afficiuntur.

At mordicant humores contenti. Est & alius asidua detectio: modus, quæ sit ob sedis musculos resolutos. Quippe huiusmodi deiectiones à voluntatis imperio non pendit: proinde & intempestius, & inordinatæ, & asidua sunt. Iam vero soler status in ventriculi spaciis oritur, cum vel humores pituitosi illic cõtentis, vel cibi, in vaporibus ab imbecillo calore solantur. Etenim vt ab solutur frigus vaporem haudquaquam excitat, sic vehemens calor exactissima magna ex parte cibum ipsum cõminuit, quæ vaporis generationi conueniat: nisi forte in sua pte natura sit statulentus. Quæmodum enim frigidissima constitutio, maxime spirite borea, ætrem ferentorem reddit: ac rursus calidissima constitutio æstatis, efficit ætrem nos ambientem purissimum: medix verò constitutiones nebulas parunt: sic in animalis corporibus, à solo moderato, imbecilloque calore, statulentus gigni excrementa contingit. Hoc igitur si per os excutatur, ructum efficit: sin autem per sedem, flatu molitur, interitum strepitum, interitum fœditur. Cum vero per neutrum defertur partem, inflatione, symptoma ventriculi imbecilli, producit: quæ etiam mora per vacua intestina, in illis variis gignit strepitus: qui quidem eo acutius atque tenuius resonant, quo purior spiritus fuerit, magisque per intestina tenuiora & superiora delatus: eo autem minor, sed grauior resonant sentitur, quo spiritus magis ad inferiora intestina descendit. Quod si intestina ipsa aliqua humiditate cõtineant, strepitus murmurillus dictus gignitur, qui humidi excrementi deiectione nuntiabit. Si vero strepitus ædatus, purus & clarus resonet, aut intestini ipsius inanitione, aut in superioribus eius parte excrementa dura cõtineri significabit. Si strepitus cum ardore sit, is ab instrumentorum angustia, & instanti spiritu, atque pauca humiditate procedit. Defluxus à superioribus partibus in ventriculū sit, vbi facultas prævalida, reuoluantia excrementa expellit: interdum vbi adeo imbecilla existit, vt ne id quidem quod vile est, ferre possit. Excrementum quod redvndat, tum per crises, tum per integrā valetudinē: vt in mulieribus singulis mensibus, & in his quibus aliqd membrū est mutilatū: id quod etiam per definitos circuitus contingere in aliis mulieribus videmus, qui prioris vitæ exercitia, cum ignauo ocio mutantur. Atque excrementum huiusmodi solis quantitate est alienū. Altera qualitate aberrat, magnaque ex parte in acutis morbis solet excerni per crissim. Inter hæc duo excrementorum genera, est aliud tertium quæ modum: vt in ventriculo semicoctus cibum. Hoc autem per hepaticas affectiones maxime excremitur. Cæteri nominant hepaticæ, quæ ob ictericos imbecillitatem insistant morbus, etiā si nulla ad sit phlegmone. Hepar igitur, si quando alimentū, quod per menses venas attraxerat, nequeat cõficere, per easdem rursus id semicoctū ac simile aque in qua fuerunt abluæ carnes nuper mactate, respuit. Quod si alimentū in hepate accuratè cõcoctum fuerit, ob aliquod autē impedimentum distribui in corpus non possit, vt ad venter redeat est necessarium. Quo tẽpore excretus sanguis apparere nigrior, splendoris quoque illo, qui naturalis existit, vapore ex

sanguine & atra bile cõmisit. Etenim sanguis solus per se ob refrigeratione nigricans, tantum abest vt splendore villum acquirat, vt etiam cum quem ab inmo habuit amittat. Atra autem bilis eo splendidiore existit: quæ maris mortui birmen ludaci. Si quidem non ex refrigerato sanguine, vt grumum, sed ex immodicè allato, feruidoque, veluti quidam cinis, gignitur atra bilis. Cæterum ipsa est frigida, quia reserctis: non tamē caloris expertis: quæmodum nec cinis, nec etiam acetum. Igitur cruentorum excrementorum quatuor sunt differentie. Prima est, vbi sanguis quantenus dictū est, per circuitus quosdam emanat. Secunda, cum ob imbecillitatem ictericos, haud ab similibus lauro ablutari carnium sanguis dei citur. Tertia (quæ nuper diximus) ex melancholico splendente quæ sanguine constat. Ac per has tres differentias, & multum est excrementum, & affatum excremitur. Per quartam verò quæ ex vlcere intestinorum oritur, præcipueque dysenteria vocatur) paulatim & breuibus intervallis deiectionem fieri cõtigit, nonnunquam tynceri sanguinis, nonnunquam grumosi: cum quo interdū puris quoque nonnulli exenti solent: quæmodum & rametia, & partes quedam membranæ intestinorum cõsimiles. Sæpenumero densum quoque stercus excremitur, cruentis guttis respersum. Eiusdẽ generis cum prædicta dysenteria est tineximus vocatus, ob rectū intestini vlcus eventiens: qui quidem cætera symptomata dysentericæ similia habet: teufionis verò vehementia, dysentens longè superat. Vixit tum suppresiones, tum deprauate expulsiões, excrementis quæ vel in ventre retinentur, vel præter morem naturæ eliciuntur, proportionē respõdent. Supprimuntur igitur, vel ob vlcere imbecillitate excernere nō potens, vel ob ostioli ipsius angustiam. Quorū duorum morborū ischuria est vnum commune symptoma. Est & aliud symptoma, cum nihil penitus vrinæ in vesicam delabatur, abolita nimirum renū actione. Alius itaque affectus censendus est, cum oppleta vesica, alius cum vacua, nihil vrinæ redditur. Nam in ea affectione quæ vesica est plena, oportet aut ostificium eius angustum, aut naturam imbecillam existere. Os igitur sit angustum, quia obstruitur & cõnietur. Atque obstruitur quidem à grumo, vel crasso pure, vel lapide, vel callo, vel tuberculo, quod in meatu creuit: cuiusmodi in externis partibus omnibus accidere certissimum. Cõnietur autē, aut ob tumorem præter naturam, cuiusmodi est phlegmone: aut ob siccitatem ingentē, quæ per febres ardentissimas gignitur. Sunt verò deprehensi quidam vesicæ oppletam habentes, qui veniti surgere à curia, vt illam exonerare, postea meiere nequeunt: quæ etiam affectus ventri & intestinis solet interdum accidere. Igitur iam dicti affectus, vim excremendū vrinæ, sua functione destrandū. Qui verò ab his magnitudine relinquant, actiones efficiunt obtrusas, tepidissimæ. Reliquos affectus tertium genus symptomati (quod in morbis deprauatis cõstitit) comitari cõsuevit: cuius multæ species habentur. Primam stranguriam appellant, quæ vel ob imbecillitatem vesicæ, vel ob acretiorum fieri videtur. Secunda species profluuio

Atram hile si excreta sanguine splendorum. Atram hile gigni ex sanguine immodice effusa effig. Si gigni, non tamen calorem excremitur. Cruentum excrementum dysenteria quatuor.

Dysenteria signa.

Tineximus oritur ab vlcere intestini recti.

Vrinam vnde suppresum accidit. Ischuria, quod est symptoma ischuricæ.

Vrinæ meatum ex quo obstruitur accumbit. Vesicae ostioli, quod est causa ischuricæ.

Stranguria fit vel ob imbecillitatem, vel ob leuē acretiorum.

Dei. Nam in tempestiua, si perat voluntas in imperium, flatu in vitro pectus a pituitosis humoribus, & calore imbecillo.

Serenissimum reddi aërem, si res sit serena.

Flatu in vitroculo grauium, quæ frigiditas symptomata.

Streptum à flatu profectum eo acutorem alicuius flatu ipso transiit. Iste flatu magis per vlcere grauium autem, quo magis ille excreta vlcere defluunt.

Streptum murmurillus parum sit de quo, quod indicent.

Defluxus vnde in ventriculo accidit.

Excretis quid, siat modum.

Excrementum sola quantitate alienum, quod sit.

Hepaticæ qui dicantur.

Alimentum ab hepate in venter regredi, quod necessum sit.

ventris est similis. Soler autem fieri quædam veluti resolutio, colliquatiove, interum vniuersi corporis, interum succorū tantū, quos venæ continent. Deinde quod ita liquantur, modō iuuentrem, modō cum vrina delinunt, nōnūq̃ in sudorem degenerat. Igitur venarū succos in serofam saniem solutos, reues ad sese trahūt, vbi integrē valent, continētēq̃ ad vesicam transmittunt. Si verō invalidi fuerint, vt ipsos trahere nequeant tunc venæ eiusmodi serum aut in ventrē

demittunt, nimirum si crassius sit: aut in vniuersum corpus pelientes illud, vbi est tenuius, subito totum liabitur ad aquam inter cutem transmutant. Quod si caro liquata sit, tum vel venter suscipit ipsam fluxionē, si sit crassiuscula: vel sudores profusent, si in vapores soluant. Reliquorū loim symptomata, alia quidem vesicæ aut renū quosdam affectus indicant: alia quantū vel cruditas vel cōcoctionis accesserit sanguini, ostendunt. Vt verō ad sudores transicamus, vbi in resolutio corporis haberi veniunt, affectus vocatur syncope: cuius sanē rei contrarium, per sudores ceticos accidit, quippe qui robustas vires annuntiat. Eas autē sudores sunt similes, quos modica exercitatio, & balneū, & calor æstiuus evocat. Per exercitationes autē immodicas, nōnihil vtilis humoris excernitur. Odorem verō & colorem excrementi quod expurgant, sudores obtinent. Cæterū multus sudor eluitur, aut ob corporis raritatem, aut excrementi tenuitatem, aut abvndantiam. At denitur, si paucū, viscidum, crassiusq̃ excrementū fuerit, aut cōspicitur meatus: id quod accidit ipsis, quia vel obstruantur, vel conuiuent. Ac obstruantur quidem a facie crassie & viscidæ. Conuiuent ob nutritionē pleniorē, vel ob refrigerationem, vel ob mollitiem. Ad hæc, sudorū tum excrementum suppressio, vel vtrius in carne imbecillitatem interdum accidere solet. Porro nullius partis functio, manente ipsius essentia illa, impediri potest. Nulla autem qualitatū agentium, res vicinas peninde alterare videtur, ac calor. Quare corpus calidum simul & humidum, quicquidē propriū sibi alimentū cōcoquet, assimilabitq̃. Quod verō ita sit durū vt & flectatur facili, & firmiter innitatur, id & trahere vehementer quodlibet, & impellere violenter, & detinere fortiter potent. Optime itaq̃ nutrienda calida & humida corpora, vt quæ & celerrimē immittunt, aliantēq̃ ad se, respondentq̃ & assimilant alimentū. Per simē omnium frigida, & sicca, vt quæ nec alterare, nec suscipere, nec apponere, & assimilare sint apta.

Quod verō humidiora corpora tum facilius, tum celerius adhærent, coalescantq̃, duriorum autē alia nequaquā, alia nō facili id perpetiuntur, nemini obscurū existimo. Cæterū cōcoctio & nutritio, alterationes esse censetur. Appositio sit, cum cibis in roris specē redactus, a nutritio suscipitur. Ad hæc, est alimentum cum alio conglutinatū quædam, dum in vnum coalescunt.

Atq̃ in his omnibus pueri, aliiq̃, quorū temperamentum calidius est & humidius, optime degunt nec infelicitur in illis distributio perficitur. Retentricem tamen facultatem pueri habent imbecilliorē, ob idq̃ excernunt celeriter. Similiter

etiam expellendi facultas, vt retentrix, modicē illis est imbecilla. Eget autem longiori tempore facultas retentrix, quō suo fungatur munere: expultrix verō breuior. Pueri igitur, vt alteratrica facultas robore iuuenes superant, sic attrahenda vi sunt ipsis longē inferiores: atq̃ ab eis etiam in duabus reliquis facultatibus superantur. Quamquam expultrix imbecillitas in eis minime deprehenditur, idq̃ ob temporis breuitatem, quō suo fungitur munere. Quippe crebrius & delinunt & vomūt, q̃ iuuenes, nō ob expultricis potentia robur, sed ob retentricis imbecillitatem. Atq̃ in cōcoctionibus quæ ad ventriculum pertinent, si humida molliq̃ sumperint, ea peninde ac iuuenes concoquunt: dura verō deterius conficiunt. Siquidem puerorū calor, ad vaporis naturam: iuuenum, ad siccitatem magis accedit. Atq̃ humidiora corpora humidioribus indigent alimentis: sicciora, siccioribus. Senes ad omnes ferē actiones corpus malē affectū fortituntur: quippe qui iuuenibus aridiores sint, præterea etiam frigidi. Quare nec probē concoquunt, ob caloris penuriam: nec ritē nutriuntur, partim ob siccitatem, partim ob imbecillitatem alteratricis potentia. Iam digestio per corpus ipsis & tarda, & imbecilla est, nimirum instrumentis veluti torpentiū ob frigiditatem. Porro ad functiones actus calidum instrumentū & siccum, magis idoneum est: frigidum verō & humidum, imbecillius. Reliquæ dux conuagationes medium inter has locum obtinent. At verō si xiatas ipsas species, naturaliter frigidum & humidum corpus minime deprehendit: quanq̃ ob affectum præter naturam, italia reperiri contingat. In vniuersum igitur, frigidum vbiq̃ est debilius & torpidum, siue humori, siue siccitati innegatur. Haud alter inter naturales potentias, retentrix robuitor quidem videtur in aridioribus calidioribq̃ instrumentis: imbecillior verō, in humidioribus frigidioribq̃. Similiter nervi, tendones, syndesmi, & musculi, quantō sicciores tanto robustiores evadent: nisi adeo modum excefferint, vt ob duritiem vix flecti possint. Nam si sic sint affecti, corrumpuntur spatio. Contrā naturalia instrumenta, quō sunt humidiora, eō sunt ad nutritionem magis idonea, vel si ad extremam humiditatem pervenerint: ad cōcoctionem verō nō sunt aptiora, nec se ipsis, nec andioribus, quibus similes adsit calor: nisi sicque aliquando cibū exhibeat instrumentū siccū & squallidū, nō liberaliter ei tribuens humiditatem. Cæterū & ad digestionē per corpus, & ad excretionem corpora admodum dura, ineptissima existunt: quod laud facili vel dilatantur, vel cōstrahuntur: quorū alterū attractionē, alterū excretionem molitur. In summa verō, calor æstus ad omnem alterationē efficacissimus est, nisi ad tantum, vt colligat, vehementer increuerit. Siccitas ad robur & firmitudinem cōfert, nisi adeo sit cruda, vt corpora rigida, immobilia, ac friabilia efficiat. Humiditas ad nutritionem quidem ministrat: cæteri verō functionibus omnibus adversatur, excepta qua corpus augē. Deinceps autem de fluxionibus a cerebro oriundis aliquid etiam dicemus. Destillationis igitur & grauedinis

Pueri quibus facultatibus superant iuuenes, et quibus ab eis superantur.

Potentia iuuenis hq̃ calorem dēferens.

Necesse est omnia similia. Senes cor ferē ad vniuersas facultates corporis male effectum ferunt.

Altius facultas vbi qua instrumenta sunt commoda.

Frigidum et humidum naturaliter mollius corpus reperiri in matribus. Frigidum vbiq̃ est debilius, torpidum q̃.

Naturalia instrumenta, quō sunt humidiora, eō sunt ad nutritionem magis idonea, vel si ad extremam humiditatem pervenerint: ad cōcoctionem verō nō sunt aptiora, nec se ipsis, nec andioribus, quibus similes adsit calor: nisi sicque aliquando cibū exhibeat instrumentū siccū & squallidū, nō liberaliter ei tribuens humiditatem. Cæterū & ad digestionē per corpus, & ad excretionem corpora admodum dura, ineptissima existunt: quod laud facili vel dilatantur, vel cōstrahuntur: quorū alterū attractionē, alterū excretionem molitur. In summa verō, calor æstus ad omnem alterationē efficacissimus est, nisi ad tantum, vt colligat, vehementer increuerit. Siccitas ad robur & firmitudinem cōfert, nisi adeo sit cruda, vt corpora rigida, immobilia, ac friabilia efficiat. Humiditas ad nutritionem quidem ministrat: cæteri verō functionibus omnibus adversatur, excepta qua corpus augē. Deinceps autem de fluxionibus a cerebro oriundis aliquid etiam dicemus. Destillationis igitur & grauedinis

Qualitatem qua in quibus sunt effectus functionibus, & qua in vniuersis.

Colliquationes partium quibus modis solvantur. Rari facilius.

Aqua inter cutem quomodo generatur.

Syncope quid. Sudores ceticos robustas vires annuntiant.

Sudores retinent odorem & colorem vniuersi, quem percutant, immittunt. Sudorū tum etiam paucū, viscidum, crassiusq̃ excrementū fuerit, aut cōspicitur meatus.

Essentia partium illarum, functiones impediri non potest. Calor vicinas res omnino maxime alterare potest.

Calidū & humidum corpus quicquidē propriū sibi alimentū cōcoquet, assimilabitq̃.

Frigida et sicca corpora eorū non triantur infelicitissimi. Concoctio. Nutritio. Appositio. Adhæsiō.

Pueri vniuersis tribuunt imbecilliores, expultrixq̃ non adeo durum forem.

Coryza,
Catarrhus,

Difflatio est
desolutio in se,
Cicando est de-
flatus ad na-
res.
Ranando est ad
frenum deflatus.
Vasa:
Arteriales.
Parietibus.

Vires corpus
quod causi du-
ram possit.

Menses vnde
venit crassus
gros.

Menses quibus
ex causis plas-
mus fluant.
Menses pro-
fluunt.

Classis malis-
ma.
Intrapsum est
involuntarium
tumor vultus
pendens a fla-
tulentis spiritibus
vitiis.
Conversio efflu-
ens.
Sicutum vnde
fluctum vnde
impetum.

Vires partu
a quibus causi
venit.
Symptomata
quod causi non
tuo ac natura
symptomata
a quibus causi
venit.

grauedine (hæc coryza, illa Græcis catarrhus di-
citur) cerebrum causa exitit: vt pars quidam
miliaris vel a frigore, vel a solis ardore in inter-
nariam adactis: vt instrumentum verò, quatenus
infestatur a plenitudine. Ceteri desinatio fit, si
ad os excrementi defluxerit: grauedo, si a d'na-
res: quædam modis & cauedo, si ad fauces decu-
bat. Quod si fluxus gurgallone in vadat, aut vultu
pariet, aut ipsum in tumorē attollet. In glandis
hæc aut sine oris vtriusque adiacet, si decumbat,
amida: procreat: sicuti & paristhima, in vadens
ea quæ illis proxima sunt. Ac desferat quidē fluxus
a capite nonnunq̃ in ventrē, nonnunq̃ in aspe-
ram arteriā, vtriusque maxime nocens. Quod ve-
rò ad vteri corpus spectat, si solidū fuerit aut du-
rum, causa est, cur supprimatur menses. Duratur
autē vel illud a primo ortu, aut tractu temporis
post ipsam generationē: videlicet ob intemperie
aut affectus alios præter naturā. At intemperie
vteri interdū a natura oritur, interdū sequitur
morbus, perinde ac densitas. Detinentur etiam
nonnunq̃ menses, ob materiā ipsam vacuandā,
vbi vel crassa est, vel viscidā: necnon vbi a crassis
humoribus vasa, quæ ad vterum descendunt, ob-
struuntur. Ad hæc, vterus nihil omnino exernit,
ob multas excitationes, & viciū tenet, & cum
ad alias partes repunt humores. Minus exernit
æquo, ob eandem causā, sed remissiores. Plurā
tem, ob distensionē oclum, & viciū ocliparū. Carē-
runt deprauatæ vteri fluxiones (quod sympto-
ma fluxus mellebris dicitur) sicut expurgatō
per hanc partem vniuerso corpore. Ac ralem semper
speciē refert id quod exernitur, quale est quod
in animali redvndat. Est & aliud ex vtero deprau-
atum profluū, ob affectum aliquē ipsū in se
stantem eveniens. Insuper interdum colliditur
menses sanguine, ob robustas vires in alias par-
tes ierente. Ad hunc autē sermonē pertinet me-
misse mulierum minime foratari, quibus vte-
ri meatus coarctat. Iam præcipuus est, cum in v-
tero intumesce insistant masculinū pudendum:
cuius symptomatis causa existit flatulentus spiri-
tus. Porro gonorrhœa si pendens non intentō
acciderit, retentici facularis in seminatib: va-
sis imbecillitatem sequitur. Si verō intentō pu-
dendo eveniat, cōvulsionē quodammodo erit affe-
ctus similis. Coloratū viciū studinem (vt summa-
tim dicam) faciunt fucci a sua naturali specie ab-
errantes, aut in profundum subeūtes, aut cutem
vel vti illuces. Particulatim verō causæ, ob quā
siccus ad huiusmodi tumoris, tam affectum
pervenire oportet, sunt affectiones animi: ad
non ambienis vel ad calorem, vel ad frigus m-
no: corporis affectus vel calidiores, vel fr-
res: item sanguis vel paucus, vel plurimū
foras elatus, tum interō revulsus. Hæc acce-
tuodlibet humorū vitium, ad suam ipsū, vel
vniuersi corporis colorem permutare potens. A
naturalī autem figurā desectum patens, omnino
dūcē vel replere, vel inanire, vel a propriis sedi-
bus deturbare, aut revulsa. Vt autē hunc iam cō-
mutatum claudamus, operæ precium mihi vi-
detur ad Jere, quoniam symptomata sibi mutuū
& necessariū succedant, & quæ item non neces-
sariū. Igitur id quod sit, vitæne ex causa fiat, an

ex plaribus, considerandum. Nam si ab vnica
rannim fiat, necessariū causæ efficiēti succedere:
si a pluribus, non necessariū. Symptomata itaque
quod ab vno alio dephēder, necessariū cōsequi-
tur illud. Vbi verō alie quædam causæ ad secun-
di symptomatis generatioem accedunt, ipsū
non necessariū ad primū cōsequitur. Negi enim
crudritatem (gratia exēplis) insano ex necessitate
te sequitur, vel mordicatio, vel ita ita: quæquā
tum liorum, rem reliquorū symptomati: ser o-
minum nullūm est, quod non aliquando crudri-
tates sequi videtur. Verū & crudritatis magnitū-
do, & differentia, tum hominis natura, tum sen-
sus vel acutus, vel obtusus, item singularum cor-
poris partū & robur & imbecillitas facit, vt a-
hæc aliud symptoma crudritatē sequatur. In sum-
ma verō, quæcūq̃ pars crudritatē fecerit, illa no-
xam percipiet, quæ maxime imbecilla fuerit. Pro-
inde nullū symptoma necessariū sequi crudritatē
tem, possūm asseruare. Vbi autem alimentum
minime per corpus digeritur, sine prius, sine
imbecillitas facit actionis, atrophiam necessi-
riū inducet, quædam modū in singulis partibus
alteratitricis potentie hōia. Præterea expultricis
facilitatis circa excrementa, aut sanguineæ po-
tentie aberratio, necessariū productū prauū colo-
ris symptoma.

GALENI PERGAMENI de causis procatarcticas, lib. vnus.



Vas procatarcticas, sine externas,
sue præincipientes appellat, vt ma-
gnus calor, frigūve ambientis, aut
etiā aliquis animi affectus, in velli-
da solū corpora cōmouent: ac pro-
inde a nonnullis nō causæ, sed morborū occasio-
nes vocant. Videmus etenim mille simul in thea-
tro sedentes, e quorum numero quatuor duntaxat
exerant, & in eis a febre vnus solus arripitur
quod nuper familiari nostro Menandro contig-
it: quē nos secunda de Invisites, iulissimus
caput rosaceo foveri, mox dormire, postmodū
impensē lauare ac sic tandem esse repositum. Alios
etiā cōmplares, ob æstus & labores febrientes,
reclinantibus ceteris medicis, plurimis bal-
neis ac viciū humidiorū viciū, similiter perfusa-
ul. Non desunt tamen, qui varia cōnectentes
sophismata, quæ nuper causas procatarcticas
diximus, eas morborū causas esse inficiantur: &
videlicet nec semper, nec omnia corpora ipsantē.
Qui quidem nō secus habendi sunt odio, ac illi,
qui scimas & hamos in viis, per quas sunt transi-
turi homines, seminant. Nos itaq̃ horum impe-
dimentorum nonnulla iam rescindamus, aliquā
emendemus, alia coneramus, vt antiquum viciū
quæ non ad ciuitatem, sed ad artem omnibus ci-
uitatibus viciūm ducit, purgemus. Quod igitur
tum frigus, tum immoderatus calor, & cōtri-
stia, & morbus gignere solent, id indicis natu-
ra rerum nos docet: cōtē nimirum vel ipsa ani-
malia bruta, soleant loca & regiones mutare, vt
æstare quidē calorem, frigus verō hyemē de-
clinet. Quod si hæc noxia quidem, nō tamē mor-
borū esse causas fateatur, q̃ nec semper, nec om-
nibus noceant, tum nō de re, sed de nominibus

Crudritas nat-
lem necessariū
symptoma se-
quitur.
Sanguis signi-
ficat morborū
alimenti desec-
tum.

Procatarcticas
causæ in vbi da-
tentium corpo-
re inuolant.

Menandrum eo
insulata proben-
tem, quæ rati-
ne sanant Gal.

Bruta quæcūq̃
perueni, vt a-
lium & frigus
viciū.

disputat: quanquid effugere poterit
 quin convincant, saltem illas esse causas nocumen-
 ti illi, quibus nocent corporib. Sunt porro dux
 primæ causæ ac maximæ principales in vniuer-
 sum, scopus videlicet, siue finis, cuius gratia fiunt
 omnia quæ fiunt: ac præterea id, à quo ea fiunt.
 Has dignitate sequuntur tertia & quarta, instru-
 menta nimirum quibus, & materia ex qua. Etenim
 in humanis artibus, nisi causæ omnes cõspicantur,
 nullus vnq̃ effectus ab illis poterit. Nam nisi ali-
 qua esset lecturæ vtilitas, nunquid faber illa cõstrue-
 ret. Sed si aliqua sit illius vtilitas, careat autē do-
 labra, ferræ, tete bello, aliæque suppellectili instru-
 mentorū, nec sic lecticā coagmentabit. Et si hæc
 illi omnia præstare sint, & mox ligula deficiat, neq̃
 illa componetur lecticæ. Sed nec si instrumenta &
 materia parata sint, & vtilitas vigeat, absit autē
 artifex, quicquid vnquam compingi possit. In ista
 men artibus quæ casu fiunt, interdum finalis
 causa desideratur, cum ea nullus gratia fiant. Est
 etiā vbi id per quod fiunt, absit. At nihil inveni-
 re licebit, quod materia nõ egeat, ex qua cõstet:
 & efficiente, à quo fiat. Semper siquidem est ne-
 cessesse, vt sit cõueniens alicuius patientis, quod vi-
 cem materiz subeat. & alterius quod circa ipsum
 agat, & efficiens rationem obineat. Hoc autē
 nonnunquid instrumentum eget, si alicuius gratia o-
 peretur. Interdum sine instrumento agit, vbi nul-
 lus gratia, neq̃ ex proposito agit. Vbi igitur ex
 frigore vel æstu aëris ambicuitus aliquis læditur,
 ær ambiens dicitur causa effectrix: materia, cor-
 pus affectum. Nullus itaq̃ effectus oriri poterit,
 nisi efficiens & materia iungantur. Vnde oportet
 vt hæc vtræque aliquid ad generationē rei con-
 ferat. Quæ autem ad rei generationē cõducunt,
 merito causæ appellandæ sunt. Repetere autem
 licet præter iam dictas, etiam alias causas, acci-
 dentales tamen: veluti intermedium spacium mi-
 nimè impediens, quo faber indiget, vt circa li-
 gnum agere possit: idque non qui artifex est, sed
 quia corpus, quod alium ab eo qui continet ma-
 teriam circa quam operatur, occupat locū. Hæc
 siquidem ex accidenti discuntur, & tanq̃ ea line
 quibus nõ. Solidum quippe corpus interiectum
 inter fabrum & lignū, impedimento est, quo mi-
 nus operari artifex possit. Quod si de medio tol-
 latur, ex accidenti consequitur, vt ær in illius lo-
 cum succedat, cum nusquam in hoc orbe vacuū
 possit consistere. Proinde cõstat fabrum ære ex ac-
 cidenti indigere. Similiter ambulationis causæ
 sunt, ipsius vtilitas, vis animalis, atq̃ etiā cura:
 at causæ sine quibus id fieri nequit, ær circumfus-
 us cedens, paumentūq̃ requisit. Quod autē
 aut Erasistratus, si refrigerari febricitandæ causa
 est, qui magis refrigerari, ille magis febricitabit:
 maxime absurdū videtur. Nam si effectrix causa
 ipsa id absq̃ patiente apto efficere possit, qui ma-
 gis refrigeraretur, magis quoq̃ febricitaret. At si
 frigus non omni, corpori febrē adferre potest,
 sed illi tantū, quod ad eam excipiendam est habi-
 le. Alciadē tempore sunt correpti, dum in
 Cydno, Ciliciæ
 flumine, se la-
 uant.

*Causa prima
 & maxime
 principales in
 vniuersum,
 siue finis cuius
 gratia fiunt om-
 nia, ac præterea
 id a quo ea fiunt:
 quæ postea sequuntur
 tertia, nempe
 instrumenta &
 materia atq̃ mate-
 ria.*

*Effectus nullus
 ab illis poterit
 in humanis ar-
 tibus, nisi can-
 sa in vniuersum
 aut cõspiciantur
 id quod in eis
 quæ fortissimè ob-
 tanguntur mun-
 di necessarium
 videtur.*

*Causa appellan-
 da sunt, quæ ad
 rei generationē
 cõducunt.*

*Causa acciden-
 taria siue quib.
 operari non li-
 cet.*

*Vacuū nō
 quæ datur.*

*Frigus ibi tan-
 tum corpori fe-
 brem adferre
 potest quod ad
 eam excipien-
 dam est habile.*

uo tempore in Cydno, Ciliciæ flumine, se laua-
 ret. At verò nec illud etiā reuera cõfici potest, vt
 qui magis frigeret, magis quoq̃ lædatur: sicvtri
 neq̃ hoc etiā, vt si magis lædatur, magis febrici-
 tet: cum aliquando cõtingat aliquē magis lædi,
 qui tamen nõ modo non magis, sed nec omnino
 febricitet. Idem etiā dicendū est de labore plen-
 tudinēq̃, & aliis id genus causis, quas eodem
 paralogismo, ab ordine procatarcticarum febriu
 causarū exterminabat. Sed cur interim operā lu-
 dimus, dum hæresim Erasistratorū cõuelimus,
 qui asserunt patriam potius prodendam esse, q̃
 propriū dogma. Ad eam enim stupidi simul & per-
 unaces sunt, vt etiam omnes febres à phlegmo-
 ne exoriri contendant: ob idq̃ nec potius frigiditas,
 iis qui ardens febre tenentur, cõcedant: cum ta-
 men ea opportunè exhibita, nisi obest viscerum
 usumatio, ægri cõfessum fudent, liberiq̃ à mor-
 bo reddantur. At si in discernenda hypostasi pu-
 luerit, ab ea quæ in sanis, & post solutas febres
 conspiciuntur, essent exercitati, convincerentur.
 Quippe in sanis, vbi febres solutæ fuerint, id
 quod residet, album est, nec feztorem habet, nec
 colorem, nec lentorem, qualis cernitur vbi phle-
 gmonē in suppurationem cõverta soluitur. Sed
 hæc enī est summa impudentia Erasistrati, quod
 cum faceret repletionē plethoræ efficere: hæc
 verò, sanguinis paremptio sin ad arterias: atque
 hanc deniq̃ phlegmonem: noluit tamen concedere
 repletionē phlegmonis causam existeret. Nam
 & nos pari modo dicemus, quod qui plaga ho-
 mini illata venas colla secuit, non exurit illi cau-
 sa mortis: quoniam causa proxima fuit, non ille
 qui percussus, sed potius effusio sanguinis.

10

20

30

40

50

60

*Erasistratū cen-
 sobane, patet
 potius prodan-
 dam esse, quæ
 proprium do-
 gma.*

*Frigida oppor-
 tunè exhibita
 iis, qui ardens
 febre tenentur,
 nisi viscerū im-
 flammatio ob-
 stet, ab efflu-
 io liberat.*

*Peru hypostasi-
 sing. diuidentur.*

GAL. DE CAUSIS PROCATARCTICIS LIB.

de plenitudine, liber vnus.



Icyri nullū est quod nostra tempe-
 state in ore ferē omnium medicorum
 crebrius verset, q̃ plenitudinis vo-
 cabulū: ita nec alud facile inuenias,
 quod magis ab eis ignoretur. Vt autē
 eos qui ignorantē tenebis occipiat, quip̃ ab-
 surda tuerentur dogmata, impræsentiarū multos fa-
 ciamus, cum ingenuis verò ac veritatē amore
 flagrantibus. cõfabulemur: duas in vniuersis no-
 tionibus, relationēque plenitudinis proponamus:
 vnam quidem, secundū robur viscēp illius qui
 talē plenitudinē deserit: alterā, secundū excipien-
 tem vas capax. Deia verò sedulo perstrute-
 mur, quæ sint vniuersæ animatū vitæ: & quo
 odo plenitudo, quæ secundū earū vniūquēque
 libere potest, sit & agnoscenda, & curanda.

odū, quorū sint eorū humorū species, qui
 es aggrauent, vel à vasis cõtineri non pos-
 sent. & alia quæ per nervos diffunduntur. Vbi etiam
 docuimus, cor & facultatis arteriarū fontem atq̃
 originē esse: neruorū autē cerebrum, sicvtri iecur
 venarū. Arre libris de Elementis ostēdimus, sub-
 stantiā eorū omnium quæ generationi & interitui
 obnoxia sunt, à quatuor primis qualitatibus im-
 mutari: & ex earum certa quadam temperatūra,
 omnium

*Plenitudo est
 duplex, vna in
 ita vniuersa,
 quæcumq̃ desit
 altera in m-
 vasis illam con-
 tinere capaci-
 tatem.*

*Cor est anima
 mensura.
 Cerebrum est
 fons nervorum.
 Iecur est va-
 sarū principium
 omnium*

quandoq; motionibus gigni. Si igitur particula quæ descenditur, particeps sensus fuerit, necessum est, ut quæcunq; fuerit ea res, quæ eò ipsam distendit, ut capri nequeat, tensionis sensum in animante exciter. Atq; si affectus qui tunc mēbra occupat, tensio appellatur. Quæ si plurimum augetur, erit etiam necesse, ut quod tendi distum patitur. Ceterū nō tantū ex ipso sanguine, sed ex quacunq; substantia humida & barulenta, possunt parca tensio affectu occupari. In vniuersum autem, id quod grauat, multum: quod verò pungit, aut mordet, molestum esse dicemus. At plures repenti humores mordaces, qui partim in nobis gignantur, partim accedūt extrinsecus, omnibus est compertū. Quorū quatuor penes magis & minus differentie extant. Etenim qui modicè mordet, pruritū inferunt, uti scilla: qui verò magis, rodunt, ut cypa. Sed si aliqua præterea adhuc his fuerint actiora, horrorem excitabunt: præcipuè quidem, si particulari admoveantur ex vicerat: prorogato verò, atq; aucto horrore, symptoma illud rigor vocatur. In nobis quoq; mordaces gignuntur succi eadem ratione, per has quatuor ideas distincti. Quorū sanè pruriginosi illi sunt, qui modicè exsiliunt acres: vicerosi verò sensum pariunt, qui his sunt mordaciores: qui autē hos quoq; mordacitate superāt, horrorem: sicuti qui præterea iam mordacissimi sunt, hi rigorem inducūt. Affectus igitur vicerosus, ex succis mordacibus gignitur. Grauitas autē à multitudine, pro viri copatione. Attensio-nia affecto, & ipsa quidem humorū multitudinem sequitur, non tamen per collationē ad vires corporū continēnum, sed tantū ad capacitatem quæ continēt illi. Ad hanc ergo affectionē viti mam, tensio tantūmodo pertinet: ut ad secundā grauitas. Vicerofus verò sensus, neutrius est propria nota, nec plenitudinis nuper dictæ, nec secundæ, quæ vires respicit. Ex symptomatis itaq; alia ad plenitudinē pertinent, quæ respicit vires: alia ad eam quæ in infusione consistit: nonnulla præterea nō sunt simpliciter plenitudinis notæ, sed huiusce plenitudinis. Quædam verò nullius quidem plenitudinis, sed humorū potius prauitatis & corruptionis sunt signa, aut virium imbecillium, aut humoris solidiorū corporū. Ergo affectio tensiua, nisi exacerationis sit comes, plurimam omnino substantiā in corpore quod sensu præditū est, contineri infirmat: nō tamen qualis sit ipsa substantia, ostendit: nisi alia etiam indicia accedant. Actiō nūq; imbecillitas, vires invalidiores ostendit: quod mo uens causa impeditur: quemadmodum accidit in languidiorū manuum motione: id quod plures constitutiones consequi potest. Nam si in aliquo carneū ac adiposum particularū genus, viribus tamē eosdem finem seruauitibus, adaugatur, necesse fuerit motiones imbecilliores fieri, moto nimirum aucto, mouente verò equali permanente. Sed si aut v-nus quispam ex humoribus, aut omnes etiā simul excrecant, nec vires alioquin simul vni augeantur, sic quoq; necesse erit actiones invalidas reddi: nec secus si humores simul & effusiones creuerint, nullo autem in viribus incremento factio: quemadmodū & si pares illi se habuerint, vi-

res verò imbecilliores evadant. Fieri etiā potest, ut & dematur de viri robore, & humores vni, cum parenchymate, seu transusione (quæ im-pressionarū moxē carnis, pinguitudinisq; signū cat) vel plures fiant, vel pauciores. Horum itaq; vtrumvis eveniat, necessariō evadent & functiones imbecilliores. Arbitrari autē quādiu solida corpora optimè nutricantur, posse nonnunquā edū imbecilliores morum, hominū planē est minime perpendentiū, facultates per vniuersa solidiora corpora permeare: sed perinde ac fistulas, aut canales quosdā, sic spiritui venas & arterias constituentiū. Hallucinantur etiam, qui inter plethorica indicia, corporis tumorem reponunt: quippe venarū tumor poterit, forsitan esse plethorici signum, inseparabilēq; vbi corpus ita se habuerit, ut neq; interna externis, neq; hac illis caleant magis, nec præterea calor immodicus vniuersum corpus detineat. Carnis autē & adipis moles, eorundem multitudinē indicabit: nō tamen plethorice plenitudinis quæ desiderat evacuationem, signum exsiliit. Cum autē syncerus sanguis nunq; ita reperitur in venis, quin illi aliq; aut bilis, aut pituitæ, aut ferosi excrementi permixtum sit: perinde sanè erit dicere, sanguinem ipsum augeri, ac si etiā humoris dixeris. Venarū itaq; tumor, sanguinis plenitudinē indicat, si tamen is à nulla gignatur externa constitutione prius invalenscente, aut ex fusione, aut ex ebullitione. Cauendum præterea erit, ne particula illa de cuius fuerit, ne vè paulō antè cetera vehementius mora. In summa verò, plenitudo à venarum tumore indicabitur, si omnes corpora partes eandem constitutionē seruarint, idq; cum medio cū calore. Ceterum tum humor ipse, tum tensio, cum à singulis humoribus, necnon à flatu excitari possint, plenitudinis quantitatē, potius quā ipse cū differētiis declarat. Siue igitur sanguis cū incrementi peruenit, ut citra tumarū tensionē, naturæ modum excedat, corporis grauis videatur: siue ita sit auctus, ut vasa continēna distendat: vtrumq; certē & muliū, & plenitudo dicitur: sed prior illa, secundū vires, hæc penes vasa vocetur. Iam rubor, si nec ex sole, nec ex balneo, nec ex immoderato exercitio, neq; ex calore, nec ex ira verecundiat, neque ex alia deniq; occasione extrinseca oritur, sed vnde quaq; corpus æqualiter fuerit affectū, sanguine plenitudinis nobis indicio exsiliit. Omnem autem plenitudinē, quæ in venis congesta est, facile morus arteriarū ostendit, ob mutuum vasorum consuetudinem: nisi vbi humoris contenti in venis, quāmaximè sunt crassi & tenaces. Plenitudinia autem species, vbi in vniuersum illa corpora dispergitur, his notia sunt distinguendæ. Rubor plenitudinis sanguineæ attestatur: color verò sup pallidus, fluxus bilis. Cum autē pituita nimis excreuerit, in album magis q̃ pro naturæ modo, color ipse mutatur: quemadmodū in atrii, si bilis atra. Opus tamen est, ut cum singulis horum humorum simul sanguis augeatur: alioq; nō plenitudo aut plethora, sed cacochymia potius dicenda veni-t. Ceterū si grauitas vel tumor præter naturæ modum accrescit, auctio talis, plethora appellabitur: ipsiūq; humoris vincens species, ex co-

Tendit passio
particula à
quævis substan-
tia humida &
barulenta.

Mordacitatem
humorū quæ
tumor, secundum
magis et minus
differentia ha-
bentur.
Acres humor
particula erit
cerato admodum
horrore atq; ri-
gorem excitat.

Vicerofus sensus
necnon pluri-
tudinis est pro-
pria nota.
Symptomatum
differentia va-
rie.

Tensio affe-
ctus quid indi-
cat.

Actiōne lan-
guor, vires in-
validiores ostē-
dit.

Facilitas per
vniuersa solida
corpora permeare.

Tumor corporis non omnino est plenitudinis indicium.

Venarū tumor, quando sanguis non plenitudinē indicat.

Plenitudo secundum vires.

Plenitudo secundum vasa.

Rubor insitus, sanguinis plenitudinis indicat.

Arteriarum motus, venarū plenitudinis indicat.

Plenitudo species, vbi in vniuersum illa corpora dispergitur, his notia sunt distinguendæ.

Cacochymia quid.

*Pleuradini per
petuū adfictu
morum & pon-
dus.*

*Pituita in leu-
cophlegmatia
dicitur a se
pervenerit
per vniuerfum
corpus exuberare.*

Super vade.

*Vigilanti cau-
sa.*
*Melancholici
fons difficilis,
et praeceps
rationis infirmitas.*

*Pituita in ore
vixit collata,
appetitum facit.*
*Bile vixit, fa-
cultatem.*

*Melancholicum
fecerunt.*
*Vitium collata,
appetitum facit.*
*Bile vixit, fa-
cultatem.*

*Sanguinis tem-
peris a diuer-
si causis varia-
tur.*

lore diiudicabitur. Sola tamen bilis nec tumorem, nec pondus (quae a plenitudine se iungit nequeunt) inferre potest. Nam antequam ita accrescat, alia illi superventura est affectio. At si sola pituita angeatur (inter cuius species annumeratur humor qui crudus dicitur, fabamque imitatur elixam, quae alia pinita, crassior, ac minus statulenta existens) dirutur in leucophlegmatia solet per vniuersum corpus exuberare. Sunt enim & aliae pituitae species: dulcis nempe, acida & salina. Verum ex dulci sunt somnolentia: ex acida cum redyndat, famelicus: quemadmodum si niculosis, ex salina. A cruda autem deicitur appetentia, somnolentia etiam sunt. Si quidem si humefcat, refrigeratque cerebrum, quod est fennendi principium, ita in soporosa affectio oboritur: quemadmodum si siccefcatur, atque incalcfcat, in vigilas illabitur. Proinde omnes qui vitraque bile redyndant, infomnes degunt. Id tamen peculiare habent, qui atra bile cruciatur, quod difficiles sunt, atque praeter omnem rationem tristes. Vigiliis itaque & somni causa, in cerebro ipso constitit: appetentia autem & illius defectus, ad os ventriculi pertinet. In quo quidem si colligat pituita, appetitiones excitat: si flaua bilis, tum finem, tum cibi fastidium parit, obsequit amarulenta. At si atra, morosi, tristes & atque formidabiles sunt, & sine fiti: saluamque plurimam illis scaturit: atque nonnulli eorum satis videtur famelici, in quibus nimirum atra bilis, acida qualitate fuerit affecta: id quod sane contingit, ubi ipsa malignior est reddita. Porro ubi ea veluti flex sanguinis permanet, neque exacte est acida, satius fuerit illam appellare melancholicam succum: non autem melancholiam, siue atram bilem. Quod vero ad pulsum pertinet, si in plenitudine flaua bilis redyndat, tales necesse est reddi pulsum, qualis vbi cor calit simul & exiccatur. Si atra bilis, quales quum frigefcit & exiccatur. Si pituita, quales equi solent in humida frigidaque constitutione. Vbi vero sanguis se omnino secundum naturam habuerit, nulla fieri in pulsu ab antiquo statu mutatio: alterantur autem, secundum ipsius sanguinis mutationem. At vero ex ocio & humido victu sanguis humidior seipso redditur: ex ira autem, exercitatione, frictione, medicamento alimentorum calfaeitur, necnon meraciori antiquiorique vino, calidior efficitur: quemadmodum frigidior, ex recenti frigore. Quod si quispiam alimentum temperaturae ficiois diutius vitatur, quae tamen alia nulla intemperie teneantur, sanguis ficiores evadit. Sed secundum etiam varias complicationes causarum, in diuersas incidit sanguis compositiones intemperies: idque circa miscellam aliam in eo superantis humoris. Quod si ob aliorum quorum humorum misuram, illabatur in intemperiem, certe absque cacochymia consistat talis dyscrasia non poterit: alia tamen octo differentias sortitur, sed diuerso modo, quam ubi ille solus & per se fuerit talis. Verum an intemperies ad solum pertinet sanguinem, an ad aliquem alium illi humorem permixtum, ex his quae diximus, & ex aliis multis signis, facile deprehendi potest. Fingamus igitur homini quiescere et vacuus, venas in tumorē atrolli, ac totum corpus rubicundius evadere. Statim enim est expendendum, num

& causae aliquae occurrerint, ex illis quae vim calefaciendi habent: & si hoc forte videatur, praeterit huius rei dignotionem transire differre, donec monito ab illis in corpore vniuerso excitata coqueuerit. Tunc autem, si qualem diximus, talis appareat, sanguinem sane in eo abvndare, indicium erit. Mox vero grauitate, tensionem, pigritiam ad mortem, pulsum, vigiliam, somnum, appetentiam, fastidium, praecedentem vitae rationem, expedit revocare ad examinem, expendere an aliqua excreto solita, illi suppressa sit, aut exercitatio neglecta: & an alimentis pluribus, aut plurimi nutrimenti sit usus: vel si post cibum se praeter morem lauerit solitum, sit plethoricis morbis corripit. Quibus addenda est temporis & regionis consideratio. Nam hyeme & vere, locis tam frigidis, tum temperatis, maior colligitur plenitudo: minor vero locis & temporibus calidis arguuntur. Sic enim qui densa sunt cuti, frequenter plenitudinem colligunt: sicut rarius, qui rara.

GALENI PERGAMENTI de atra bile liber unus.



Anguis (qui humor omnibus hominibus est notissimus) ubi vel arteria, vel vena fuerit conuulsa, illico effunditur ventur: rubens sane magis et venis, flauior autem ex arteriis manans. Vnde cumque autem exeat, subito crescit in grumum: idque non solum extra corpus, sed intra illud etiam, in quo via ipsius loco praeter naturam continetur. Igitur magna ex parte in hoc humor rubens color exspectat: & talis exacte optimus sanguis existit. Apparet etiam nonnunquam hoc ignis flauior & nigrior: sicut etiam ex consuetudine crassior atque tenuior. Quin & videtur quandoque in coepto sanguine tenuis quaedam humiditas, contracta a ponit, innatare. Interdum & pituitosus humor cum sanguine per venas defertur. Ceterum haec differentiae humorum non mutant sanguinis appellationem. Est & alius quidam humor sanguini crasso & nigro per similes, qui tum per vomitum, tum per deiectionem excreantur: non tamen, etiam diutius acri ambienti expositus fuerit, omnino densatur. Atque hic ipse humor aliquando a vomitibus acida simul & acerbis sentitur: quandoque vero nullam qualitatē manifestam praeseferre. Cum autem sanguis maiori ex parte dulcis esse videatur: pituita autem insipida, veluti aqua: certe si quando hi humores sentiantur salii, morbofi erunt. Evadit autem interdum ipsa pituita dulcis. Porro pituita omnis esse debet colore albo, minimamque coeferere. Est & alius humor, qui dum vomitur, semper amarus apparet: non semper tamen flauus, sed quidam pallidus. At semper qui flauus est, pallido crassior videtur. Iam vero, ut flaua bilis tenuis seorsum humiditatem comixta, & pallidior, & aquosior evadit: sic ubi resoluta plurimum, vitellus crudorum ovorum apparet similis: ob idque vitellina appellatur. Igitur haec bilis, siue pallida sit, siue flaua, sine vitellina, in vasis habet suam generationem. At in ventriculo quaedam alia gignit bilis, quae porri colore refert: alia quae ab argumini similitudine, arguminea vocatur: alia, quae iaspidis imitatur colorē. Quibus omnibus est commune, fa-

*Plenitudo maior
colligitur
hyeme & vere.*

*Sanguis, magis
flauus, salu-
si in grumum
conuulsa.*

*Serum sangui-
nis.*

Atra bilis.

*Sanguis humores
esse morbofi-
cos, vitellina omnis
esse debet colore
albo, minimamque
coeferere.*

*Porri colore
refertur, vitellina
similitudine,
arguminea.*

ut quales sunt, tales permancant. Ut verò ad atram bilem redeamus, ea, quia non concrevit, id sanguine nigro distinguitur: nō tamē ab his quæ propriè excrementa nigra appellantur, eo nomine differit. Hæc siquidem, cum salia sæpius vomantur ac decuciantur, ab atra bile plurimū & faculrate & qualitatibus differūt. Nam neq; acerbum saporem, neq; acidum manifestè participat: cum atra bilis tum gustui, tum olfactui talis esse videatur. Ad hæc, excrementa uigra minimè terrā fermentant, ut atra bilis. Quæ quidem * hac in re cum sit aceto quæcetero similis, partū tamen crassitie ab eo quæmaximè dissidet. Quamobrem, quibus corporis partibus pura & impermixta adhæret, eas excedendo exvicerat. Acerū etenim quod tenuium sit partū, permiscet: at bilis atræ crassities, cum illa sedem firmam exhibeat, corrosivus sit causa. Taceo quod nullū animal atram bilem gustare sustinet: sicut nec meram salustinem, in qua nullū animal degere potest. Cuius rei mare mortuū firmum indicū præbet. Perniciosa itaq; illius generatio censetur, cum ex humore atro supra modum affaro edingat. Ceterū ea bilis atra, quæ ex flava bile immodicè affata ortum habet, tantò hæc perniciosior est restimanda, quōtū flava bilis efficacior est sanguinis sedimento, quod amurcæ aut facis instat generari est proditum. Igitur ut exacte bilis atra humor semper excreat ad perneciem animadverſi, sic eorum quæ nigra appellantur evacuationē,

nō raro salubrem extensile cōpen. Porro sanguis qui vena secta mittitur, uigrior esse videtur in siccis calidissq; temperantissq; corporib;: sicuti & in huiusmodi anni temporibus, & regionibus, constitutionibus, vitæ studiis, victus ratione, ac deniq; cibis crassius & ficcis: quales sunt, lens, coctile, & carnes taurinæ hircinæq;, præsertim sale asseruatæ. Conſimilis etiam naturæ est vinum nigrum, crassiusq; & austerū. Pari etiā ratione, quæcumq; ægrotudines sunt ex calida cicciq; intemperie, cuiusmodi sunt febres ardentes, crassum & nigrum sanguinē gignunt. Vbi igitur per febres ardentes melancholicus humor in cutem ipsam propellitur, carbunculus appellatus producit. Si verò ad cam, citra febrem, decumbat, fueritq; permixtus sanguini, elephantiem gignere est aptus. Sun autē solus exiſtat, ab initio quidem nigrū humorē gignit, qui procedente tempore terminatur in cancrum. Rursus, vbi acrior & contumaciior hic humor fuerit, cancrum exviceratur: vbi autem mitior, latentem & citra vlcus producit. Quippe omnes huiusmodi affectus, & præsertim cancer, ab humore melancholico oriuntur: cæterū vt à calidiori carbunculus, ita ab eo qui minus calidus est, oriri cancer consuevit. At vbi is humor niger, qualitates obtinuerit minores, nimirum permixtus sanguini, subrebecos elephantes proginat: qui tamen processu temporis longè nigrioribus evadunt. Sæpius autē natura, vaſorum quæ ad sedem sunt, referens ve-

nam, huiusmodi humorem exernit commixtum sanguini: ob idq; excreto ipsa hemorrhoidis appellatur. Sæpius enim etiā eundem humorē ad crurium venas transmittit, id quo dilatare & distenſæ, varicosæ redduntur, & cutis quæ huius-

femodi venas attingit, temporis processu nigrescit. Quod si venas illas turgentes melancholico humore quis molarat excidere, periculum imminet, ut homo corripitur melancholia: id quod fieri sæpius est visum, nō in variisbus modis, verumē in hæmorrhoidibus, quæ ex huiusmodi humore consistunt. Quod igitur in venis & arteriis humor omnes vni cum sanguine cōtinentur, ostendit ipsius varietas, tum in colore, tum in consistenna: id quod etiā ex his quæ diximus, & quæ in libro de Natura humana, ab Hippocrate prodita sunt, liquidd cōstat. Qui humores quandiu temperamenti obtinuerint modicioratē, animal erit sanum: aggrorabit autē, vbi vel in omnibus vaſis, vel in parte aliqua, corū aliquis à naturæ modo recesserit. Rationi autē est cōsistentancum, similes affectus oriri in partibus quæ profundo in corpore deliteſcūt, his qui in cute consistunt. Cum itaq; flava quidem bilis in vnam quampiam decumbens partem, generet eryſipelas: atra verò, carbunculum atq; cancrum: mirū sanè esse nō debet, si vitæq; in intestina descendens (quandoquidem internæ partes non ſortiuntur constitutionē adamantinā) aliis aliud ſporum erodant, ac nonnunq; prorsus inſanabilem dyſenteriam efficiant. Omnes siquid exvicerationes ab atra bile sunt inſanabiles: nisi quis curationē appellet, vbi affecta pars tota circumquaq; ad partem sanam viq; diſſecta, abſcindatur. Quemadmodū igitur intestina citra alicuius auxilij ſpem viceratū ab atra bile: à flava autem, diſſiciliter curationem admittunt: sic in profundo ſitis accidit cæteris partibus, atq; iſis præcipuè, quæ in testinīs sunt nobiliores. Adde quod intestinorū cura nō faciliſt est, eo quod medicamenta quæ iniiciuntur per ſedem, ſtamm locis affectis occurrūt: quod sanè in cæteris partibus fieri facile nequit. Porro lien malè affectus, vel ex inflammatione, vel ſcirrho, vel imbecillitate, ad nigrius cōverſus, colorē vinoſum in toto corpore efficit. Quin & ipſe ſemper icore nigrior exiſtit: & præſertim in animalibus calidioribus & ficcioribus, qualia sunt ſerratæ dentes habenna. Hoc viſcus etiā vel elixū, gustui quippiam acerbū refert, ut iecori nullū ſimile appareat. Vnde liquet iecur expurgari à liene: qui nimirū attrahit quicquid in ipſo ſanguine ſeculentum exiſtit: quale vtiq; eſt ſax in vino, & in oleo amurcæ. Ex hoc verò quod medicamenta flauū bilem trahenna, auxiliantur eiſ qui regio morbo laborant: quæ autem aquam educunt, hydropes aſcitæ evacuant: ſicuti & quæ nigra expurgāt, elephātos &

canthos augeri prohibent in conſeſſo eſt etiā, vnumquodq; purgantū medicamentorū familiam ſibi humorē attrahere. Ut autē ad lienem revertar: quan doquidē vniſquaq; corporis partē proprius à liſe humor: anim aliq; ſerratos habentium dentes lien acerbam aciditq; exulber qualitatē: manifeſtū eſt, humorē qui illū nutrit, talem etiā exiſtere: non igitur erit aliam particulam excogitare, quæ melancholicus humor excipiendi fit deſtinata. Jam verò, per quas venas à ventriculo in hepar alimentū ſuggerit, per eaſdē à toto corpore in illum etiā humor demittitur, ſum in purgationibus quas moliantur medica-

Varities humor
rheudifit, si quis
colabere con-
ter, percutit eſt
ut homo corri-
piatur melan-
cholia.

Eryſipelas.
Carbunculus.
Cancer.

Dyſenteria.
Exviceratio
omniū ab atra
bile eſt inſana-
bilis.

Intestinarum
entratia, cur faciliſt
ſit, quā
aliam: ceterarum
partium
læum.

Lien malè af-
fectus, colorē
vinoſum ca-
pit corpora vi-
tiat.

Lien aliis vaſi-
bus quippiā
acribus reſert.
Hepar à liene
expurgatur.

Purgantū me-
dicamentorum
ſingula ſibi fa-
miliarem ſpeciem
attrahunt.

Lienem nutrit
ab acida humo-
re, quā recipit.
Venentia de-
mittit aliquod
humorem, per
cuius venas, per
quas ſolus ſer-
re in alimentū
pau.

Nigra excremen-
ta quomodo ab
atra differant
bile.

Atra bilis quæ
acida, terram
fermentat.
Atra bilis dif-
ferit crassitie ab
aceto.

Atra bilis cor-
rodat, corro-
ditq;
Atram bilem
gustare nullum
animal ſuſti-
net.

Mare mortuū
nullum in ſe
ſpicit abſt.
Atra bilis qua
flava præſaſa-
ta oritur, eſt o-
mnis pernicio-
ſiſſima.
Atra bilis ſem-
per ad perneciem
exornatur.

Sanguis niger
quib; ſicla ve-
na vacuatur.

Melancholicum
ſuccum gignit.
ga

Tumores ab a-
tra bile.
Carbunculus.
Elephantiaſis.

Cancer.
Cancer exvici-
tatur.

Hæmorrhoidis.

Varices.

menta,

menta, tum in iis quas natura in morborū crisi-
bus efficit. Quinetiam in recte valentibus, non-
numq̃ optimis sanguis ad ventriculū cōmetur,
ipsum videlicet nutriturus: id qd̃ in longis in-
edus accidit. Porro cū natura quæ factū format
& augeat, prægnationis tempore optimū sangui-
nem attrahat, in venis relinquatur vitiosissimus,
qui post parū tandem excremitur: quemadmo-
dum singulis mensibus, qui nō solum quantitate,

*Medicamentum san-
guinem qualitate et
quantitate efficit in-
venit.*

*Pituitam in ven-
triculo cogit, at
pulsa crēta a
vire, in san-
guinem vertit.
Pituita purgan-
da cur nullum
dātū ingruat:
tum sit a natu-
ra, ut reliqua
excrementa.*

*Melancholicū af-
fectū quemad-
modum dicitur.*

*Medicamenta
purcilia, sicut
lucis sibi suc-
cus attrahere.*

*Columba autē
sella vesica.*

sed qualitate etiam superfluous atq̃ in vitis est. 10
At pituitosus humor, ex pituitosis cibariis, in pri-
ma cōcoctione, quæ in ventriculo fit, generatio-
nem obducit. Vbi vis biliosus melancholicūq̃, in
iecore. In cuius quidem cōcoctione pituitosus hu-
mor etiam in sanguinem vertitur. Quam ob cau-
sam nullum ipsi propriū instrumentum mobili-
ta est natura, ad sanguinis expurgationē, quem-
admodum est vtraq̃ vesica & lien. Siquidem hie
sanguis à bilioso humore & seroso expurgant:
lien verò à melancholico humore. Itaq̃ pituito- 30
sus humor, qui in ventriculo gignitur, cum de-
feratur in iecur simul cum humoribus genitis ex
cōmetis & bibitis, vna cum illis concoquitur,
in sanguinemq̃ mutatur. In vniuersum igitur, om-
nes qui ab humore melancholico prodeunt
affectus, itam inter initia medicamētia eam hu-
morem vacuantibus valde purgās, quo minus
augeantur prohibebis, vsq̃ue etiam ad cancro-
sā. Nō est autē eadem bilis atra in iis qui integra
sanitate fruuntur, & in nōnullis eorū, qui olim na-
turalem habitū sunt egredi. Porro medicamen-
ta singula propriū quendam similitēq̃ sibi suc-
cum eliciūt: non autem in naturam suam corpo-
ris humores permittunt. Nam si medicamenta
morbo regio laborantibus propinqueris: quæ
verò bilem educunt, his qui infestantur aqua in-
teritum: quiminum propriū humoris videlicet
vtriusq̃ vacuari: atque inde non solum nihil tu-
ueris ægrotantes, verum etiam q̃maximē lēgeris:
hanc aliter, quā si ipsi venas incideres. Ad- 40
verte autem columbas, atq̃ alia animalia plera-
que, destituta esse vesica scilicet.

GALENI PERGAMENI de tumoribus præter naturam, liber vnus.



Nter ea corpora quæ naturaliter, &
quæ præter naturā se habent, tertia
quædam est constitutio eorū corpo-
rum, quæ nō secundum naturā asse- 50
cta sunt. Siquidem qui calidior vel
gracilior est factus, nō adhuc naturalis habitus
fines egreditur: sed tantū aliter supra naturæ mo-
dum, aliter verò infra inuenitur: vterq̃ autē secun-
dum naturā est minimē affectus: quanq̃ certē ho-
rum affectuū nō naturalis, excessus quidē, præ-
ter naturā existunt: terminus autē eorum excel-
sum, est actionis oblatio. At qui tumorē ex a-
qua inter curem contraxit, & qui ex tabe evasit
gracilior, præter naturā sanē vterq̃ est affectus. 60
Igitur in præfati libro, de tumoribus præter na-
turam, qui tum corpus vniuersum, tum quilibet
illius partē occupat, nobis discere est animus,
sumpto ip̃ phlegmone in iuo. Phlegmone dicitur
tumor carnosarum particularū, vbi cum tensio-

*Phlegmonem ac-
curatā deseri-
pio.*

ne, remittentiq̃, necnon dolore pulsantē & calido,
ruborēq̃, maiorem sibi tumorē contrahunt.

Ex quibus quidem signis sanguinem redvndare
in inflammationē ipsā, existimandū est. Cuius fa-
ne defluxus, priusq̃ sit impactus, facillimē hie
se refrigerat atq̃ astringit, repellit, præsertim
si tumor fuerit exiguus. Vbi autē fluxio impo-
sita tenaciter hæserit, nullum ab astringentibus
& refrigerantibus auxilium admittit: indiget au-
tem vacuum. Iam verò pars phlegmone obiecta,
nō itatim ab initio fit immodicē calida, sed pro-
cedente tempore, pristinā nimirū perspirationē
impedita, ex obstrucone omniū meatū. Idcirco
si inibi sanguis diu immoretur, necessum est
vt omnino putrescat. Siquidem omnia corpora
simul calida & humidā, in calidum locū totāq̃,
putrescunt promptē, si nec evacuentur, neq̃ re-
frigerentur. Quare & quæ ex ipsius putredine ca-
lidiōs nascitur, ex sapienter, quam antē habebat.
In vniuersum autē, nihil in inflammata par-
ticula permanere potest exactē secundum natu-
ram se habens, inflammationē perfenerante diutius,
nec omnia simul cum carne, tunc videlicet,
nerui, tendones, membrane, atq̃ vasorū tuniciq̃,
fluxione ipsā succipiunt. Quare & ossa interdū
fluxio ipsā invadit: sicut & ab ipsis primō affe-
ctis, nōnumq̃ oritur: quemadmodū etiam a ner-
uis, vbi scilicet valuerant. Catis igitur, vbi secun-
dum naturā se habet, laxa est, in iis qui crassi nō
admodum sunt: & locus medius, cui ipsa incum-
bit, existit vacuum, nec secus ea quæ in carne sunt
spacia, cōspiciuntur inania. Omnia autē hæc per
inflammationes replentur sanguine, ex vasīs qui
autem per eorum tunicas refundant: in quancūq̃
dēt carnis particula, ad modum rois permissio.

Vbi verò procedente tempore vicerit quidē na-
tura: fluxio autē omnis cōcocta fuerit, ac geni-
tum pus: extra carnē id pellitur à facultate, quæ
in ea est, expultrice. Quod si vel meatus natura-
lis conspicuus sit, vel locus raris exiit, pus san-
tem partem perspirat, partem sensibilibiter effluit. At
si incombens cutis densa durāq̃ extiterit, ibi pus
detinetur, atq̃ cum à subiecta ipsi carne dirigitur:
deinceps & sul acrimonia corrodit, & foras egre-
ditur, nisi quis eam prævertat (scarificare. Cæte-
rum natura à fluxione victa, nō amplius ad pus,
sed ad alienam quampiam mutationē, aliā di-
uersā, perficitur sanguis. Porro dum pus cor-
pora exornat, continentiq̃ à subiectis diducit:
ac deinceps eo vtrūq̃ vacuato, quæ diducit in-
ter se, pristina constitutio nequeunt recuperare,
is affectus vocat sinus. Qui nimirū nisi cœ-
lerimē percurrat, callum contrahit, proceden-
tēque tempore durus evadit, nec amplius subie-
ctus ipsi partibus agglutinari potest. Astringitur
tamen medicamentis, & victus ratione excicat,
ita vt particula integrē esse sana videatur. Nō so-
lum tamen ex inflammatione gignuntur absces-
sus, hoc est, diductiones particularum: sed & ita-
tim à principio interdū proveniunt, propter hu-
morem aliquē, qui temporis processu excoarctat,
atq̃ à cōtēntis cōtinentia dissepiscit. Proinde & in
cisi omnimodam speciem humorū ac solidiorū
corporum intus habere apparent: & non raro
etiam animalia in ipsis reperta sunt, omnibus

*Phlegmonem cu-
ratur.*

*Putrescere cali-
da et humida,
vbi in calidum
locū impacta,
nec vacuata,
nec refrigeran-
tur.*

*Ossa interdum
fluxione ipsam
invasit.*

*Phlegmonem
generatio.*

*Abscessus quo-
modo hanc.*

Sinus quid.

*Animalcula
morsu reperta
in abscessu.*

Fistula quid. ferē quæ ex putredine ortū habent, simillima. Fistula, siuus est angustus & longus, alius finibus similis: qui sanē attingit, & rursum deducitur enī ob excrementorū effluxum. Iam in atheromans reperitur quiddam pulsi cōsimile: in meliceridibus, mellī: ut seuo, in iteratioribus. Perung autem quædam tunica membranosa singula hæc continet. At gangræna carbunculorū excitatur, cum sanguis tanquam feruens & inflammatio- ni propinquus, exurit cutim. Proinde & cum cru- sta sunt, & bullæ vicus præcedunt, quemadmodum in ambustis. Quin & acutissima febrim in- ferunt, atq; in discrimen vitam trahūt. Nigra au- tem prius, ac ciuerulenta, apparet cruita car- bunculorū vicus: nec tamen inflammationis cir- cumstantis color, sicuti in aliis, rubet cōspicitur: sed ad nigrius vergit, alio sanē modo quā in suppuratis, vel à gelu perfrigera. Non enim ve- lienter linet, vcluti in illis, tumor: verū habet quippiam splendidiū, quemadmodū binum ludacū. Huiusmodi siquidem ex exquisita atra bilis: vnde & malignitas viciorum quæ in carbon- culis sunt, accidit. Siquidē sanguis, vel statim ab initio, vel in ipso febre superaffatus, melācholicus fieri videtur. Verūm citra febreū atrā bilis cancer constituit: atq; eos cum vlcere, vbi a- criorē illam esse conigerit. Quamobrem & ni- griorē sunt colore omnibus quæ inflammatio- ne infestantur, & minus calidi. Venæ autē in his replentur & tenduntur magis, q̃ in ipsa inflā- tionibus. Ad hæc gangræna maximā succedit in- flammatio: quæ sanē mortificatio quædā affectus partis existit: & nisi curetur celerrimē, vs- que adeo pars affecta extabescit, ut invadat alias cōtinuas, atq; sic hominē perimat. Porro in natu- rali statu, insensibilis nobis est arteriarū mortui: in inflātionibus autē, is cum dolore sentitur. Arteria siquidem dum dilatatā, corpora circū- iacentia percutitur atq; ex eorū plaga ob inflā- tionē dolemus. Quod si arterie tunica inflā- tione vrgetur, tunc ratione percutientia simul & percussū, geminatur dolor. Si fluxio biliosa in aliquam partē decumbat, idq; ex exquisita bile profecta, cutē exulcerat: si verō saues aquosus, vel etiam sanguinē habeat, minus erit acris, sed particula magna in tumorē attollit, q̃ exulceret. Hoc igitur erysipelas nominatur, alteram verō herpes. Humor autem à quo vnumquodq; ho- rum gignit, tum ex colore, tum ex caliditate par- tis affectæ, faciliē dignoscel. Rursus, cum fluxio acris, hæc quodam minus, hæc verō magis, talis existat. sciendum est, ab actioni fieri herpetē ex- dentem, ab altera verō miliarem. Atq; hæc sanē fluxio piritum habere mistam mihi planē vide- tur: ut illa proficiat à meracissima bile: quare & cum erosione onit, affectū semper proximam invadente cutem. Verūm si ex æquo sanguis & bilis cōmixta fuerint, huius affectus forma & na- tura, in medio erysipelatis & inflammationis con- sistet. Quod si alter ex humoribus longē exvpe- ret, ab exuperante affectus nomē fortietur, cum adiectione tamen humoris admixta. Dicitur itaq; erysipelas inflammationis particeps, flava bile superante: inflammatio verō erysipelatosa, vincente sanguine. Similis quoq; erit allarū mi-

tionum interpretatio. Quatuor enim sunt affe- ctiones, quæ assidue ex humorū fluxione oriun- tur: erysipelas, oedema, inflammatio, & scirrhus. Erysipelas igitur, ut dictum est, biliosa fluxione exuperante oritur: inflammatio, sanguinea: oede- ma verō, tenui pituita: quemadmodum & crassa & lenta, altera quædam scirrhorum species con- sistit: namq; altera fax sanguinis efficit: quæ ipsa rursus sanguinis fax, est duplex: altera enim spe- ciem Hippocrates nigram nominat: altera verō & ipsa quidem est nigra, propnē tamen atra bi- lia vocatur. Istus itaq; cancer soboles sunt: alte- rius verō uigræ, vna quædam scirrhorū species: quæ sanē ab altera quæ ex pituita consistit, colo- re distinguitur. Atq; vniq; cōmuna sunt, maior quā sit pro naturæ ratione tumor, tum dolore vacans, tum durus: & quod utraq; species quan- doq; ab immo gignat, quādoq; ex permutatione aliquis tumoris immoderatus refrigerari. Scir- rhus propinqua sunt tum echymomata, hoc est transfusiones, tum melasmaria, siue demigra- tiones. Quis affectus hūi sanguine exipissus venis ef- fluo, tunc tunica earum costus, nunc ipsarū fi- bulus referant. Quod si arteria ad aperta fuerit, affectus hūc aneurisina vocatur. Fit autē, ea vul- nerata, cum ad cicatricē superposita cutis de- venerit, arteriæ verō vicus permāserit, ipsa nequa- q̃ cohesuerit, neq; ad cicatricē producta, neq; carne obturata. Carterū tumor ille compressus digi- to cedit. Cum igitur sanguis quem arteriæ conti- nent, tenuis & flauus existat, ac præterea mistus subtili spiritui & multo, promidēq; fit etiam cali- dior eo qui continetur in venis, adeo sanē is ef- fluat, vbi vulnerat arteria, ut tēgē supprimi pos- sit. Cedit etiam in ordematibus matena premen- tibus digna, & pars ipsa fouere modo exarsit. At in hoc affectu pulsus non adeit, vt percipitur in aneurismate: & color albicior existit. Ad hæc oedema lōgē latius & maius est aneurisinate: nisi quod grumus adnatus, coactus est aneurismi- te, sphacelum, hoc est, syderationē efficiat. Sic e- nim vniuersam solidorū corporū corruptionem appello, ita vt osibus quoq; insit. Gangræna au- tem, solidorū corporum mortificatio est: & ipsa, verū ossa nequa- q̃ corripit, maximāq; sequitur inflammationes. Repetendum autē rursus hoc est: atram bilem, siquidem mordax decubuerit in carnē, circumpositam cutem exulcerare: si verō minor exiterit, cancerō citra vicus inducere. Iam verō, qui affectus ex vicere & tumore cir- cumambiente constat, phagedæna vocatur. De- pascitur enī & herpes circumvicinas partes: so- lius tamen cutis exulceratio existit: phagedæna verō, vni cum cute, attingit etiam subiecta. Quæ vicerā omnia, cacothē, hoc est, maligna vocant. Porro scabies & lepra, melancholicus affectus, ad solam cutem spectant: quemadmodū si in folis venis & carne fiant, nomen obinēt canceri. Præ- terea elephas affectus melancholicus est, si sangui- ne quidem melancholico primam habens gene- rationē: tempore verō præcedente, atrā bilis co- pia sanguinē ipsum exuperat: quo tempore cor- pus iam & grauitur oler, turpēq; & deformatum videtur, atq; interdū etiam exulceratur. Iam pu- dendorum tensiones præter naturam, quæ non

Oedema.

Scirrhorum spe-
cies dua.
Rursus sangui-
nea duplex (spe-
cies).Echymomata.
Melasmaria.

Aneurisina.

Aneurisina san-
guis qualis ex-
stat.Oedema quo-
modo ab aneu-
rysmate diffi-
ret.Sphacelus.
Syderatus.

Gangræna.

Phagedæna.
Herpes depa-
scens.Canceris pla-
na.
Scabies.
Lepra.Cancer.
Elephas.Erysipelas phle-
gmonosum.
Inflammatio ery-
sipelatosa.

Serpylla.
Priapismus.
Achor.

definit, quidam satyrasmiū, quidam priapismiū
appellant. Achor autem vlcus est in capitis cute,
quod connerices pituitæ salzæ, & nitrosæ esse so-
bolem. Ac defluit quidem ab eo sanies quædam
nec aquosa simpliciter, nec ita, vt mel, crassa. Ce-
ria (quos fauos nominant) cum tumore quodā
exiguō & plurimis foraminibus. Quin & aliū tu-
mores præter naturam his minores per cutem
fiunt, nimirū myrmecis, acrochordones, psydra-

Myrmecia.
Acrochordones.
Psydracon.

ces, & epynychides: qui sanæ affectus omnibus
cogniti sunt. Non minus autē est notus furuncu-
lus: qui quidem mitis existit, si solum cutem ob-
sederit: malignus autem, si descendit alius. Sic
etiam tuberculo est similis, ab eo sola duritie dif-
ferens. Vterq; autē affectus mixtæ cum inflama-
tione esse speciat videtur. His tertio loco succe-
dit bubo, quarto is quem nonnulli vocant phy-
getilid, caliditate simul & generationis celeritate

Tuberculum.

Rube.
Phygetilid.

aut ab aliis tuberculis distinguentes. Qui affectus
glandulosarū partū est inflammatio. Hæ autem
partes vbi ad scirrhū devenierint, is affectus
firmitas & chæras vocatur: quemadmodū etiam
vbi induratur testis, *carapissus*, vt mel, carnosus
dicitur. Cum autē in eorū tunica humor aquo-
sus colligitur, hydrocele nominatur: à quo affe-
ctus, epiplocele, & enterocèle differunt: quod al-
terum omenti, alterū intestini cuiuspiam descen-
sum in tunica testium significet. Quemadmodū
autē vnumquodq; dictorū nominū partis mor-
bum in dicat, à qua affectus cognominatur: sic &

Serena.
Chæras.
Sarcocèle.
Rameæ carno-
sus.
Hydrocele.
Epiplocele.

imperiū recens nomē, hoc est, varicosus ramex,
in parte iam dicta declarat ipsū affectum con-
sistere. Quamq; veteres, & alias etiam rurgentes
venas *nepes*, hoc est, varices nominant. Fuit quip-
pe in cruribus etiam varices, ob imbecillitatē ve-
narum quæ inibi existūt: & tunc præsertim, cum
sanguine corpus crasso redditur. Peritonæo vul-
nerato, vel rupto, nec postea conglutinato, tu-
mor quidā molliis eam regione occupat. Quod

Rubromole.

si id in inguine eveniat, tumor talis bubonocèle
nominatur. Si verō circa vmbilicum, is affectus
Uropia quidam appellat. Cæterū peritonæi so-
lus nulla harum affectionū existit: sed & neruū
propaginem musculō affici prorsus est neces-
sarium. In hydropicis etiam copia quidem mate-
riæ eadem in regione aggregatur: aquosæ sanæ,
in acite: ita ut os, per tympanitatem: pituitosæ de-
niq; in affectu analaræ, & eo quem leucopileg-
matiam appellant. Porro epulides, parulides,

Epulides.
Parulides.
Thymi.
Væ.
Tenilla.
Parulidemia.

thymi, & alia id genus, carnes suppurulationes
existunt. At vix, gurgulionis, tonsillæ, earum
glandularū quæ in uicem in faucibus inito oppo-
nuntur: paritillima deniq; eorū corporū quæ
in ipsi faucibus sunt, inflammationes existunt.

Polypodes.

Polypodes autē, aut inflammatione, aut tuber-
culo, aut alia quapiam suppurulatione in nabi-
bus consistente, gignuntur. Encaudus verō, in
magnis oculorū angulis sit, tumor non toto ge-
nere præter naturam, sed sola magnitudine. Vin-
gues autem adnalcæ quædam sunt membra
næ externæ adnæ oculis, quæ ab ossē circūam-
biente delata, vsq; ad indur. coronā extēduntur. At

Encanbur.

quæ vocatur staphylomata, hæc quidē solo siru,
hæc verō dispositione ipsa, præter naturā existūt,

Staphylomata.

GALENI PERGAMENI de tremore, palpitatione, convulsione, & rigore, libet vms.



Entiles motus in sanis animalium
corporibus, duplices genere existūt.
Aliq; siquidem sunt secundū volun-
tatis imperiū: quos sanæ à neruis &
musculis editos, libere voluntatis

Motus subtilis
duplex. vñ vo-
luntarius, qui ad
nerui & muscu-
los, qui ad
voluntatis
pertinet.

actiones mos est medicis appellare. Aliq; autem
à corde & arteriis profecti, functiones appella-
tur vitales. Est & tertia in venis insensilis motus
species, de qua impræsentiarū differere nō vide-
tur expedire. Sed tertius motus à neruis & muscu-
lis editus, quo manus atque crura mouemus, in
tremore & convulsione, morbofoso rigore, ac
nonnūq; palpitatione, apparet. Etenim si quis mo-
di affectus, incompoliti exorbitantēq; sunt mo-
tus instrumentorū, quæ dum integrē valent, mo-
tus voluntarios perficiunt. Tremor igitur, imbeci-
litate facultatis quæ vehit atq; motus nerui corpus;
cillatur. Etenim animalium partes graves cum
sint, deorsūq; ferri natæ, ex se vsquequaq; mo-
ueri nequeunt: sed facultas à principio musculari
per neruos delata, quasi veliculum quoddam
atq; ala, motus ipsarū est. Quæ si exacte defece-
rit, partes vti relaxatæ resolutæq; deorsū ver-
gunt, atq; in statū aut exilite cōducunt. Vnde
membra hoc pacto affecta, omni motu priuan-
tur. Verū si facultas ad musculos per neruos
sua, exigua tamē & debilis, vt quantū oportet,
membra corporis vehere, librareq; aut veluti
pondus aliquid terre, non possit: membrum sic
dispositū, cum tremore debilitate necessariō con-
spicimus. Si quidem motus coacti violentiq; qui
vires debiliū superant, sunt haud dubie tremu-
li: vt constat in onera grauiā gerantibus. Pari-
quoy modo si quis timore correptus fuerit, man-
ibūq; sine quid agere, siue librare vulerit, tre-
mulæ quidē manus agendo, tremula quoq; crura
incedendo ei obnoxiū sunt. Timor quippe
facultatē robur, nihil minus q̃ onus, immi-
nuit. Confimili modo senes imbecillitatis causa
tremuli evadunt: & quibus ob ægritudinē labo-
rauit ipsius corporis robur, his haud sine tremore
perficuntur motus. Tremor itaq; est compolitus
motus, sitq; vbi corpus propria gravitate deorsū
vergit, sed rursus à facultate eleuat sursum,
particula nimirum ipsi vicissim loca mutantib;
differunt autem invicem palpitatio & tremor,
cum nimirum non eodem loco quo tremu-
li, palpitatio correpti afficiantur, nec eadē cau-
sa, nec præterea idem sit vtriusq; symptoma. Nul-
lus enim tremor vtiq; nisi membrū aliquid mo-
uere præcegerit. At membra palpitantia, etsi re-
posita iaceant, nulliq; exigentur motu, palpi-
tant: id quod mirum esse non debet. Alia siquid-
em multa, licet immobilia videantur esse, vtpo-
te in eodem permanentia loco, mouentur mili-
lominis tamen. Aus quippe in sublimi regio-
ne æris suspensa, dum sese, quo minus ruat, susti-
net, aliquo vti motu videt. Is igitur motus (quæ
immobilitas fortasse tibi apparuerit) ex duobus
certis motibus, qui in contraria loca deducere
corpus queunt, est mixtus. Quorū sanē si alterū,

Tremor quomo-
do fiat.

Motus violenti,
qui vires superant
fuerit, sunt
tremuli.

Partes animi
admodum
tremulas.

Timor facultate
robore immo-
nuit.

Senes cur tre-
muli.

Tremor est motus
compolitus.

Palpitatio à tre-
more quo diffi-
ret.

Motus multa
quæ per se in
motu videntur:
vt aus quæ sub
in sublimi æri-
regione susti-
net.

nempe motum sursum, sustuleris, à reliquo deor-
sum deduci corpus minimo negotio videbis.
Ob id etiam stare quàm incedere, us qui viribus
sunt imbecillibus, haud minus est laboriosum:
cum statio sit quoque motus. Sublata namq[ue] ani-
ma, quæ & mouet, & corpus erigit: corpus prius
rectum, mox firatum facili videremus. Quare
non immerito monuit Hippocrates: Si æger se-
ipsum continere non possit, & ex lectica in pe-
des corruat, grauius est. Nam iacentem ad pe-
des delabi, facultatis extremæ laborantis firmis-
simum est indicium. Etenim stare, aut sedere, aut
surgere non posse, graue certè est, sed eo sanè mi-
nus graue. At more viuens decumbere non
posse, sed ceu demortui inanimatimq[ue] corpus
deorūm irrepere, extremū est malum. Quod au-
tem ubi quis manum extendam aliquandiu in il-
la figura conseruat, aliquo motu moueatur, ar-
gumento sunt utraq[ue] genera musculorum simul
& ex æquo tuuc operantia. Liquei itaque, ei qui
nullo se mouere motu conatur, tremorem mini-
mè accidere posse. Palpitatio autem, partibus
etiam motu carentibus venit. Etenim superci-
lium, palpebrarūq[ue] & oculus, sæpenumero, nulla
concurrente voluntate, attolluntur. Præterea in
partibus palpitante motus, elevationes de-
pressioneq[ue] apparentes, corporum quasi reple-
torum, moxq[ue] evacuatorū, extensiones & con-
tractiones existunt: in tremoribus autem nec dis-
tenditur quicquid, nec enam contrahitur. Ceterū
non omnia palpitant. Neruum siquidem,
aut os, aut cartilaginem, palpitare non videas,
cum cauitate careant, quæ nunc distenta, nunc
contracta, attolli cūm distenduntur, cadere cūm
contrahuntur, suis partibus possint. Est itaq[ue] pal-
pitatio, dilataio quædam atq[ue] contractio, præ-
ter naturæ ordinem. Tremor verò, patium quæ
vicissim sursum deorsumq[ue] feruntur, motus in-
voluntarius. Vnde perspicuum est, membra quæ-
dam tremula priore mutare locū: palpitantes au-
tem particulas, perpetuò eundem tueri. At verò
spiritus crassius & vaporosus in aliqua cauitate
collectum, exitūq[ue] prohiberi, palpitatioem esse
causam pronuncio. Nam quod palpitatio à spi-
ritu oriatur, celeritas ortus & solutionis illius in-
dicat. Etenim corpus nostrū consistat (vt nos
Hippocrates docuit) continenti, & contenta, &
quæ feruntur impetu. Continentia siquidem ap-
pellantur solida: continent enim, ac liquida clau-
dunt. Contenta autem, liquida: nam liquida so-
lida cōnferunt. Quæ verò impetu sempiternū se-
runtur, spiritus: namq[ue] hi per vniuersas corporis
partes facile permeant. Erit igitur spiritus quidē,
sed crassus & vaporosus, palpitatioem causa. Nā
si ille clarus, tenuis, purusq[ue] fuerit, citra vllū im-
pedimentū transiit: ac proinde partes nec reple-
bit, nec evacuat. Porro vt solus arteriis in-
esse palpitatioem minime verum est (quod pro-
fitebatur Praxagoras) sic repeteri posse arteriam
non dubito, quæ & palpitatioem & cōvulsionis

corpus absolute refrigerat, palpitatioem sunt ge-
nerandæ idonea. Sicuti illorum contraria, ean-
dem submouere possunt. Calfactio namq[ue] at-
tenuat spiritum, corporiq[ue] mollia simul & rara
efficiunt, vt ille expiret possit. Verum refrige-
rantia condensant, congregantq[ue], ac corporis
meatus arctiores reddunt. Insuper etiam, den-
sumq[ue], ac turbidum efficiunt spiritum, qui sua
crassie, corporūq[ue] ipsū continendi densi-
tudine, retinetur, vt minime exhalare possit. Me-
ritò igitur veteres, us contra palpitatioem sunt
vbi medicamentis, quæ attenuare & excalfacere
possunt: cuiusmodi sunt quæ ex pyrethro, adar-
ce & pipere consistant. Aquas quoq[ue] calidas ex ter-
ra procedentes, & præcipue nitrosas, sulphureas,
bituminosissq[ue] cōmendant. Ex aqua marina actū
calida, murrig, maris vice vtuntur, si mare ab-
sit. Porro calore, nō solū bibiti, sed etiam
admotum extrinsecus, ad id optimū est medica-
men. Ceterū palpitatioem generatio ex frigido
duntaxat procreat: tremorē verò ob multas &
alias causas fieri cōtingit. Nam dispositio hæc, fa-
cultas quæ corpus mouet est imbecillitas: sed
causa quæ hanc ipsam imbecillitatem inducere po-
test, specie variat. Aut enim alimenti defectu, aut
exoluto virali robore, aut violenta vehementiq[ue]
refrigeratione virtutem occupante, aut repletio-
ne ipsam insitit ponderis aggrauate, adinmodum
imbecillis ad motū facultas redditur. Vnde non
sicut palpitantes, ita & tremenibus vna dū
taxat medicamentorū species congruit, sed va-
ria. Ac pro differentia ipsius causæ, oportet per
contraria semper medendi rationē variare. Ete-
nim mulierē quæ post partum nec secundas ex-
pellere, nec sanguinē expurgare poterat, indeq[ue]
tremore correpta est, lecta in malloco vena, cu-
rauit Hippocrates. Quod autē sanguine exuberante,
venam incidere oporteat, omnibus notū
esse arbitror, cūm sanguis continetur in venis.

Quod verò laborante matrice, in malloco aut
poplite incidere expediat, id docet cōmercium
venarū. Siquidem per venas cōmunicantes sem-
per vacuare est opus. Nam si venas, quæ particu-
larē affectū non consentiunt, pertundas, minime
affectum locum curabis, sed potius sanū offen-
des. In animalibus itaque motus voluntarij opif-
icæ fabricarūq[ue] facultas est, quæ vniuersas ani-
malium partes gubernat. Huius autem instru-
menta, nerui & musculi existunt. Igitur motu pri-
uari, aut non pro dignitate moueri contingit
membra, vel ob instrumentorū, vel ob facultatis
affectus. Palpitatioem itaq[ue] & cōvulsionem
& membrorum resolutionem, instrumentorū via:
tremores verò, virtutis imbecillē affectus
existunt. A rigore autem distinguitur tremor,
quod tremor quidem non sine cōsilio mouen-
di partem, cōtingat: quassario verò, quæ vehemē-
ter ingentibus insidet, adeo violentè valdeq[ue]
concurrit corpora, vt quietem agere mini-
mè queant, vel si quis viriliter illis resistat. Insuper
tremor, vnius duntaxat particule, rigor vni-
uersi corporis est affectus. Ad hæc, tremere qui-
dem nonnullos, absq[ue] vlla refrigeratione sensibi-
li, compertū est. At rigere, absq[ue] hoc vt videatur
corpus refrigeratum, est impossibile. Non tamē

Calfactioem
viri.
Refrigeratioem
facilitas.

Palpitatioem
quæ solū me-
dicamentis.

Palpitatio
re
frigitur tantum
pro vni.
Tremor casus
diuersus.

Tremorē
matricis
ob purgamen-
tum post par-
tum retenti, se-
ctæ in malloco
vena curauit
Hippoc.

Matrice labo-
rante, vena se-
canda est in
malloco, aut
poplite.

Palpitatio est
organorum vi-
tium.
Tremor, viti-
um imbecillæ est
affectus.

Tremor non fit
sine cōsilio mo-
uendi partem.
Rigor fit vni-
uersi.
Rigor à tremore
quæ differt.

Statio est mo-
tus.

Iacentem in pe-
di delabi, fa-
cultatis extre-
mæ laborantis
est signum.

Extensam ma-
nem habentem,
mouentur.

Palpitatio qui-
bus partibus ac-
cidat, & quib[us]
minime.

Palpitatio est
dilataio & cō-
tractio præter
naturæ ordinem.
Tremor est mo-
tus in voluntate-
rio.

Palpitatioem
causa.

Consistentia
corpus nostrum
sunt, continen-
tia, contenta. At
quæ feruntur
impetu.

Palpitatio qui-
bus fit familia-
rior.

refrige-

refrigeratū esse, & videri, idem esse fatearis. Motus præterea in rigentibus, involuntarius omnino est: in tremenibus autem, non absq̃ imperio voluntatis consistit. Porro vt motus aliquis dici rigor mereatur, opus est vt cum refrigeratione sensibili, inæqualis involuntariusq̃ totius corporis motus accedat. Quæ sanè quæsiō, si in nōnullis accessibus solum superficialiter concutatur, nec vniuersum corpus commoueat, is affectus horror vocatur. Horror itaq̃ talis duraxat cutem,

Horror talis affectus est cuti, qualis totius corporis, rigor quod.

Calidum innatum non est animalis generatione posterior, nec animalis generatione posterior, nec animalis generatione posterior, nec animalis generatione posterior.

Natura ex anima nihil aliud quam calidum eff.

Calidum innatum non est animalis generatione posterior, nec animalis generatione posterior, nec animalis generatione posterior, nec animalis generatione posterior.

Animal quoddam quod calidum, & agere de calore.

Affectus calidi.

Affectus frigidi.

Rigor quod situm dum scilicet refrigeratur.

affligens, ac violenta secundum sensum refrigeratio. Iam verò quemadmodū quod in natura, haud latenter reuertitur, est iucundum: ita quod à natura pari modo recedit, dolorificum fuerit. Quare vnum idemq̃ frigus, aliis quidem delectasse, aliis verò tristitia affectus credamus. Nam si frigus corpori extra modum calidius, admodum fuerit, id prorsus delectat. At si corpus suam naturā renuens, cōsertim abvnde refrigeretur, dolebit vniq̃ & tristitia afficietur. Igitur nec dum alimentū defectū innatū calidum obscuratur, nec dum pabuli copia obruitur, nec dum ob imbecillitatem collabatur, rigorem fieri coniungit: sed quoties ipsum validum existens, intenditur, ac dein coercetur, reprimitur: quod solet flamma vbi cōsertim aqua illi instillatur. Calor itaq̃ per rigores, nec substantia nec robore laesus, ad vniuersas corporis partes extendi ferrigū propter: impeditus autē, versus principium proprie confurgit, inibiq̃ permanere non valens (substantię enim semper mobili quies motu est) seipsūque congregans, ac veluti in spirā contrahens, aqua liter quidem, nō amplius tamen citra violentiā, extenditur. Vbi verò exalens inestantibus relictis, annibisq̃ rebus occurrit, ac nunc pellit illas, nunc pellitur, idq̃ impulsibus & cōflictibus variis, tunc sanè corpus mira quassatione ob duplicem illum atq̃ inæqualem motū, haud citra dolorem cōcutitur, quādiu molestia aduerant. Cōflictio igitur, quassatioq̃, necnon omnium membrorum fremitus, omnisq̃ irregularis, inordinatus, involuntariusq̃ motus, ob caloris inatū, factiq̃ iam vaporosi, inæquales, validos, violentosq̃ occurrit atq̃ resulationes, rigoris tempore perficiuntur. Quamobrem corpus in rigoribus, rursus incallescit exactius, q̃ cum naturaliter se ipsum habebat. Sudores quoq̃ effunditur & corpore. Etenim vbi post multos cōflictus molestia fuerint explosa, exactiq̃ iam perpirauerit corpus, tribus de causis illi calidius est necesse: nempe quod calidum vndiq̃ spiratione priuatum, in profundo collectū fuerit: quodq̃ postea vellementer ad exteriora se extendit: ac tertio denique, quod per occursum illos, cōflictus, atq̃ violentos motus, natura calor reaccenditur. Itaq̃ sapienter in huiusmodi reducto de profundo calidū quasi ebulliens, cōsertim humidū quoddā effundit, quod sudorē vocamus. Ob idq̃ in rigore refrigerari, nec rursus cal fieri, prauū est, calidamq̃ succubuisse portendit. Est autē rigor in diciū maximū exquisitē tertianæ, quæ ab ingenti oritur ardore: tertianæq̃ ab ardente continua deficit, quatenus in ea in cendū ipsum facit intermissio nem. Nam & fit in expugnabilis, & refrigerationis cupiditas, & bilis syncera vomitus, vomitūq̃ peractio quies (quæ omnia signa sunt caloris exuberantis) comitantur exquisitē tertianā. Febribus etiā ex ingenti ardore cōtinuis, solet rigor superuenire, easq̃ soluerē. Præterea ac calidūq̃ medicamentū vici ad mortū, primō dolorem, mox horrorem, ac demum rigorem inducit. Inflammationē etiam in abscessum conuertit, rigorem horroremq̃ necessariū accidere nominis. Ad hæc, res aditu visiq̃ formidabilis, interdum horrorem, rigoremq̃ inducit. Ex quibus

incidit quid. Dolorificum quod.

Rigor quando obscuratur.

Instabilis substantia quæ motu est.

Incallescit corpus à rigore ut hinc, ut inde, quæ animæ, tribus de causis.

Rigor quod situm dum scilicet refrigeratur.

Rigor quod situm dum scilicet refrigeratur.

Rigor quod situm dum scilicet refrigeratur.

Referta causa.

bis vtiq; liquet, non frigori duntaxat rigorē tribuendum ēſſe, cum ab aliis cauſis, & p̄cipuē ab acn̄ & calido humore delato per ſenſibilia corpora, interdum proficiat. Ceterū neq; frigidum humore, neq; acri, ad rigoris generationem ſimpliciter excellere, ſed propinquo modū ipſorū vtriq; neceſſario in eſſe oportet. Modus autem fuerit aut copie menſura, aut humoris qualitas, aut aliquis corporis locus, in quo illum aggregari conueniat. In quiete quoq; motūq; at-

Referta vbiſſa na bilis fertur per membra ſenſibilia. Ardorem febres quomodo à ter- rianis differūt. Frigorē extre- mū per acci- ſionem vnde ac- cidat.

Rigor ſi à cau- ſa non quieſcit, eſt ſed mota.

Pituita vitrea induit inter- dum rigorem.

Rigentiū ex frigido humo- re curantur.

Quartanis ex acerbatione, bui medicamē ex ſucco Cyrenalico & caſſi- ro auxiliatur.

Tertianū ri- gor quāto.

Motus voluntarij à muſculis ſunt.

Cōuulſio quid.

cipium, ſecumq; illam corporis partem, cui eſt ſertus reuolere, bene valentibus conuulſiſq; cōmune proſectū eſt. At ſi in vitō id agatur, præter naturæ ordinē diſpoſiti, miſumq; ſanis cōtingit. Tenduntur autem teruē: penne ac cithararum chordæ, interdum quidem plurimo humore imbuti, interdum à cauſis exaccitantibus areſcūt. Euenire etiam poteſt, aliquam corporis partem aut ob inflammationem, aut aliqua alia de cauſa, vehementer affectam, neruos ſibi vicinos ynā ſecum reuolere. Porro in febribus ab ingenti ardore contractis, conuulſiones accidunt, ob ſolam ſiccitatem inſignē vniuerſi neruoli generis in phrenitide autem, ob principij neruorum inflammationē. Ceterum cum corporis partes attenuis tenduntur, ſymptoma dicitur emproſithotonos: cum verō poſterius, opſithotonos: & cum in vtrunq; latus ex ſequo inclinant, tetanus. Igitur conuulſiones à ſiccitate ortas, miſimē curandas ſuſceperis. Nam qui iis ſunt affecti, citiſſimē intereunt. Quæ verō vel ab humorum copia, vel ab inflammatione traluit ortum, ſua, ſi plenitudinem vacues, aut inflammationi cōmodo remedijs ſuccurras, mederi potens.

GALENI PERGAMENI de morborum temporibus, lib.



Vod in animalibus ætas, idem tempus in morbis ſignificat. Etenim quemadmodū ipſi nos geniti ad vigore vſq; augetur: inde iam cōtabereſcere incipientes, ad extremam vſq; corruptionem declinamus, ſi omnes ætates pertranſiſſuri ſimus: ita ſinguli morbi à prima iſporum conſtitutione ad ſtatum vſq; increſcunt, donec pro augmenti prioris portione decreſcentes, in totū diſſoluantur. Hoc tamen diſcrimen intereſt, quod animalibus quidem, cum ſint corpora, proprium generationis tempus præſcriptum eſt, quo omnes ad vitam neceſſariæ partes figurantur, formanturq; morborū autem, cum ſint accidentia corporū, nullū huiuſcemodi tempus eſt præſinitū, ſed à prima ſtatis generatione augetur. Figuratio itaq; generationemq; proprietas corporū poſtular: accidentia autem ipſorum, cum nullam figuratiōē deſiderent, ſtatum vbi genera ſunt, ad incrementū ſeſtinant. Si quidem pblegmonē (exempli gratia) cum primū inceperat eſſe, huiuſcemodi ſpecie habere videretur, qualem habebit vbi erit maxima: ſola autem magnitudine diſſert. Porro pars pblegmonē obſeſſa, calidior ſeiſpā evadit, cum tremore maior, item dolore & tenſione. Sed hæc parua primo dicta ſunt: inde autem ad magnitudinem quandam nō omnibus æqualem increſcunt. Poſtea verō aut diſcuntur remedijs tumor ipſe præter naturā, ſimilēq; illius dolore atq; calor reſoluitur, aut certē in pus convertitur. Tempus itaq; nullū inflammationis generationi ſingulariter proprium tribuitur, ab eo, quod augmenti eſt, diuerſum. Febris etiam (qui caloe præter naturam eſt) propriū diſtinctūq; generationis tempus non habet. Sed vbi corpus primū calidius quā ante febrile calore fieri coepit, inde aliud atq; aliud tēpus affectionis incrementū excipit, vſq; ad per-

Tenſio nervorum interdum ab humilicibus, interdum à ſiccitate cauſis oritur.

Emproſithotonos, Opſithotonos, Tetanus, Cōuulſio à ſiccitate non teruē pot curari.

Tempus morbi ſignificat etiam animalium.

Tēpora morborum ab ætate animalis quomodo diſſert. Morborū generationis nō eſt tēpus quoddam præſcriptum.

Pblegmonē accendit.

Febris quid.

Vigor in singu-
la rebus, est ma-
gnitudo sum-
ma.
Iussu morbi,

Incrementum,
status.
Declinatio,

Circuitus quo-
tidianus.
Circuitus ter-
tiana.
Circuitus qua-
rtana.

Tertiana fe-
bris descriptio.

Tertiana an
cuiusque tem-
poris sui descri-
bandi qua-
libet reperitur
& in aliam
intermitten-
tem convertitur.

ad perfectum vigorem, quem in singulis rebus
summam esse magnitudinem intelligimus. At vero
principium specie quadam ab incremento post
ipsum, diversum esse demonstrare conabimur.
Etenim initium vniuersum morbi esse censuerunt
veteres, non primum illum simplicemque insulsum
duntaxat, sed temporis longitudinem latitudi-
nemque notari dignam ipsi tribuerunt. Post prin-
cipium ipsum, collocarunt, ascensum: dein, statum;
ab hoc, declinationem. Ex quibus sane tempori-
bus circuitus morborum constat. Ipsorum autem
circuituum nonnulli describuntur horis vigin-
tiquatuor, quonidiani vocantur: alij quadra-
ginta octo, hoc est, duabus diebus & noctibus,
vocantur tertiana. Alios (quos appellant quar-
tanos) septuaginta duarum horarum tempus de-
scribit. At hi circuitus omnes, aliquando ad inte-
gritatem perveniunt, ut in quonidiana, tertiana,
& quartana febris: interdum ad declinationem so-
lam, vel propius ad integritatem, vel longius ab
illa, accedunt. Igitur in auspiciis tertianae febris
(quam exempli gratia propono) horror medio-
cris oritur. Dein cum maiori horrore extrema
omnia refrigerantur. Postea vero & rigore & fri-
gore cōducuntur pluraque corporis partes. Quo
tempore pulsus durior, minorque & prius, reddi-
tur, necnon in contractione velocior. Preterea
quies post contractionem ferè maior contingit:
post dilationem, eodem cum illa modo: saepe
priori æqualis, est aliquando inæqualis. Atque
haec sanè in quibusdam tertianis, curricula dua-
rum horarum æquinoctiali solè saepe cōn-
ge-
re: in aliis autè longiori vel breviori intervallo.
Inde pulsus maior humil & celerior, densiorque
fieri incipiens, sensum singulis cōmemoratis incre-
scit: statimque seget calidiores quam antea reddi-
tur. In summa, inæqualitas quæpiam non medio-
cris in corpore per hoc tempus exuperat. Atque
hoc sanè est secundum tempus à primo illo, in
quo ex priori statu fuit vniuersum corpus refri-
geratum, pulsusque in contrariam constitutio-
nem mutatus. Vbi verò febris ad integritatem de-
finit, rursus pulsus ad naturalem statum revertitur,
si qua fides habenda est sensibus. Primum itaque tem-
pus tonus periodi est, quo corpus cum prædi-
ctis mutationibus pulsus inalterat. Aliud ab hoc
secundum est, quod pulsus & calorem in con-
trariam mutat, donec tota corporis moles æqua-
biliter concalescat. Post hoc tertium, quo calor
etiamnum augebitur, pulsus magnitudine, cele-
ritate & frequentia ei respondens. Quartum
constitutio post tres cōmemoratas conspicitur,
omnibus iam dictis æqualem sibi magnitudi-
nem pro sensu nostri iudicio sentiant. Ad hæc
quinta alia, cum id calor manifestè decreverit: ha-
rura autem per cutem excernitur, pulsusque ad na-
turalem habitum redit, reiciens omnia, quæ præ-
ter naturam in magnitudine, celeritate, frequen-
tia, duritieque conquisierat. Hoc tempore pluri-
mè ipsorum sudor oritur. Post hoc autem, inter-
missionis, siue intervalli tempus succedit. Igitur
primum tempus integritati coherens, quod frigi-
dis sensum præbet, principii vocetur. Secundum
verò, quod frigus paulatim deponit, tempus in-
æqualitatis dicatur. Ab hoc tertium, æqualis in-

crementi. At quartum post hoc, consistentis. Quintum
imminutionis. Sextum denique integritatis.
Quod igitur sex hæ temporū differentie in ter-
tiana ærum aliarumque intermittentiū febrium cir-
cuitibus reperiantur, id sensu vel multitudo im-
perita iudicat. Nihil tamen obstat & alium quo-
dammodo febris circuitum in duas, sed maiores
partes dividere: vnam, primæ accessionis à pri-
mo insultu ad extremam viſy remissionem: alterā,
quæ in declinationis & insultus secundæ accessio-
nis medio consistit. Quod igitur ab Hippocrate
dictum est, in accessionibus abstinendum esse, pro
accessione intelligendum existimo tempus à pri-
mo insultu, viſy ad ipsam declinationem. Porro
clarioris doctrinæ grana, omne id quod accessio-
nem sequitur, remissionem vocabimus: quævis
in intermittentibus febribus, remissio ipsa ablatio
etiam dici meretur. Diuisimus itaque febres de
suentes ad integritatem, quonidianam, tertianam,
quartam: quarum singulæ sex distinctæ sortiuntur
tempora. At verò quæ non intermittunt integrè
in quibus tantum solvuntur, ab eis nimirum sola
integritate remota. Quarum sanè nonnullæ quoti-
die accessionem habent: quædam tertio quoque
die. Quæ verò quarto habent, non frequenter,
sed raro evenire videntur, vtpote quæ magna ex
parte ad integritatem desinant. Ad hæc, febrium
quonidianarum, tertianarum, & quartanarum, quæ ad
integritatem non desinant, duplex species est. Quæ-
dam namque magnitudinem, celeritatem, frequen-
tiam, atque duritiem pulsus deponunt: quædam
autem reliqua tria ad naturalem statum deducunt:
at cōseruant celeritatem, hæc magis, illæ mi-
nus. Verum in quibus febribus citra sensibilem
syntolem, accessionis insultus accidit, tria tempora
in vnum recidere est necessarium, totumque id
viſy ad statum fieri incrementum. Nam ubi non ad-
fuit conspicuus syntole, ibi nec inæqualitas adesse
potuit. Statum vero nunquam desuisse memini: sed
semper sensibus æqualitate in omnibus febribus
aliquandiu permansisse. Insultu etiam milles sine
dictis conspexi symptomatis. Quibus febri-
bus nullus circuitus adeit, ut iis quas synochas
vocant: nec accessio quævis omnino est, neque
prædictæ partes. Anamen hæc quoque secundum di-
uersa tempora totius morbi particulas obtinet,
aliis modis innotescentes, & per accessionum tem-
pora. Sed nunc tantum de febrium circuitibus,
iis non complicatis, sed simplicibus, nobis habe-
tur sermo. Adverte autè, aliud esse miseri, aliud
inter se complicari. Semitertiana quippe, ex mi-
scella & temperamento quotidiana & tertiana
febris oritur. Potest tamen ipsi semitertiane co-
pulari alia simplex febris, vel tertiana, vel quonidiana.
At huiusmodi varietas minimè ad hunc li-
brum pertinet. Cæterum cognitæ singularum feb-
rium temporibus, facile complicatarum tempo-
ra cognoscemus. Igitur de simplicibus dictum ab-
vnde cum sit, de commissis deinceps differam: in
quibus interdum horridus insultus quidam cōn-
g-
git, omnes principij peculiaries notas habens,
præter rigorem: & viſy interdum & huius quan-
dam imaginem representans. Siquidem vehemens
horror, vel aliquod rigoris initium, vel parvus ri-
gor videri potest. At exactū rigorē, qualis in ter-

Febrim nō in-
termittentem
reperit tempus
ad quatuor
fiebrium se re-
mittentis spaci-
ari.
Quartana nō
intermittens,
per se vniuersa
est.

Synocha febris
est, nullam cir-
cuitum adesse
at prædictæ ne-
que accessiones.

Missionem fe-
bris differre
à complicatio-
ne tantum.
Semitertiana
ex quibus con-
stat.

Rogor vobem
non adesse in-
ferianam febri-
bus.

Semiteriana
febris accessus
nonquam in-
tegre definit.

Semiteriana
febris ovale
fere maxime
Roma.

tianis quartanisq; est, febris miscellanea, cuius-
modi semiteriana existit, non recipit. Vbi igitur
signa quædam secundum temporis, febris hæc præ-
monstrat, initium rursus alterius invasionis hor-
rificum efficit, quod nonnulli repetitione appel-
lant. Aliquando hoc secundo molitur: quibus-
dam tertio facit. Deinde vix æquabiliter simplex
redditur, ad vñq; statum increfcentia. Hæc febris ad
integritate nunq; definit. Nā permulturn tempo-
ris viq; ad vigorem habet, declinationemq; sine
perspiratu sensibili: tantū abest, vt integræ cum
fudore solvatur. Quædam modū igitur à primo
insultu accessio ad vigorem vsq; multo tempo-
re pervenit, sic à vigore paulatim minuitur: id eo
que postredie altera accessio advenit, horrida
quidē illa, sed que non item cum priori repe-
tiones habet. Porro hæc accessio ad vigorem etiā
longo tempore ascendit, nec exiguo inclinatur: at-
que ob hoc ipsum tertio die, eadem que primo
accessio invadit: postea rursus quarto, similis ei
que secundo habita est, idque perpetuo ordine.
Hanc igitur febrem, que maxime invalefcit Ro-
ma, voco semiterianā. Sunt & aliæ differentiæ
particulares febrium, multiq; alq; circuituum mo-
di differentiæ particularibus variantes, quos ex
industria omitto, ceu nihil referentes ad præ-
sentem commentationem. Atq; hæc tunc de par-
ticularibus morborum temporibus.

GALENI PERGAMENI de totius morbi temporibus liber vñus.

Totius morbi
tempus à qua-
tuor.



Otius etiam morbi tempora, simili-
ter ac æmulantium ætates, conside-
ramus. Quorum vñum quidem &
• primum, generationi ipsorum tri-
buuntur, incremento secundum, tertium vigori,
quarum demq; declinationi, si ægri salvi furi
sint. Nam si vel in ascensu, vel statu decederent,
liquet talem morbum non omnia tempora per-
transiisse. Ridiculum autem fuerit, pri-
mum tempus primæ accessionis, totius morbi
principium existitare: cum nimirum principii
morbi ad prædicta ferenda, viles prælicat indi-
cationes. Ad id principium respiciens Hippo-
crates, ait: Incipientibus morbi, si quid mo-
uendum videtur moue: cōsistētibz verō, præ-
stat conquiescere. Præterea nō minus absurdum
fuerit, morbis qui intra diem solvuntur septimū,
& in qui prorogantur in annum, æquale princi-
pium tribuere. Ostendimus autem primo libro
de Crisibz, totius morbi principium, ipsius cru-
ditatem existere. Porro inflammationis princi-
pium, totum illud tempus existit, quo sanguinea
substantia pars affecta repletur. Cum autem in-
fluxus cessauerit, & quod in particula continetur,
putrefieri inceperit, calor quidam ob putre-
dinem nascitur, & fusio magis propter calorem:
videt etiam spiritus generatur, atq; ob hæc am-
bo, particula magis quàm antea distenditur,
etiam si nihil inflatur. Hoc igitur secundum tem-
pus, est inflammationis augmentū. At cum hu-
mor in pus iam vertitur, maximi tunc dolores
partem ipsam corripuit. Nam in puris genera-

natione dolores, febrisq; magis quàm prius, infe-
stant. Vocatur autem hoc tempus ægritudinis
vigor. Quod si humor in pus mutetur, vel dige-
ratur, minorem tumorem atque tensionem effi-
ciat: huiusmodi est declinationis principium.
Sic itaq; in inflammatione tempora diuiduntur:
nec secus in febris, quæ ab illa trahit oriū. At quæ
ab humore citra inflammationem oritur, mole-
stantiū humorum cruditate pro initio habet.
Huiusmodi concipiuntur, initium finitur, atq;
ascensus siue incrementum advenit. Vbi vero
maximè cōcoctio perficitur, vigor adest. Quam
declinatio ē vestigiū sequitur, dum symptoma-
rum magnitudo, & humorum copia est repres-
sa: restat autem humorū modicum, adhuc cō-
coctionem desiderans. Vicerum quoq; eadem
habentur tempora. Primum namq; sanies aquo-
sa, in coctæ & tenues ab ipsis destillant. Dein pau-
ciores atq; crassiores. Postea iam pus tenue. Pos-
tremo minus quidem copia, sed ærafusa, & al-
bidum magis redditur: quemadmodum appa-
ret eam in plenitudine & lippitudine. Quare nul-
lus morborum solutorum existit, qui non hæc
quatuor percurrat tempora. Non tamen ex quo-
dam alio quàm cruditate & cōcoctionis indi-
ciis, que ex recementis deprehenduntur, cogni-
tio ipsorum constat. Etenim flexionum quæ ex
cerebro per palatum & nates fiunt, non secus
quàm lippitudinis, initium quidem est, cum a-
quet, tennesciq; necnō copiosi & ætæ, qui fluunt
humores apparent: nam extremam hæc cru-
ditatem significant. At cōcoctionem portendit,
crassior & minus acris, modicūq; humor descen-
dens. Iam verò quemadmodum in ætatibus, nō
ipsum vigorem modō, sed omnia quatuor tem-
pora latitudinem habere compertimus: sic etiam
particularium accessionum, æ totius morbi vñ
uersa tempora, latitudinem momentaneam for-
nuntur. Vigor itaq; tum accessionis, tum totius
morbi, sensibilis tempore absoluitur. Igitur vñ-
uscuīq; morbi proprium quoddam tempus ge-
nerationis existit, interim sensui manifestum, in-
terim minus. Post quod rursus augmentum tem-
pus advenit, nec id æquè manifestum in omni-
bus. • Post hæc vigorū sequitur tempus, omni-
no sensibile. Quod si salus futura sit, declinationis
enim tempus sequetur, & hoc sensui subie-
ctum, cum nimirum amplam latitudinem la-
beat. At verò morborum qui non solvuntur, du-
plex natura est. Nonnulli enim ipsorum præpa-
rationem habent, vbi exactè illam absolutam
sint consequuti: alij ex eorum natura sunt, qui
solvuntur: id quod eis in ægri perniciem accidit.
• Hoc autem connegit tripliciter. Nam aut pro-
pter ægotantium imbecillitatem, vel propter
proprium vehementiam, vel propter vtranque;
prius perimunt, quæ solvantur. In vniuersum
autem, nemo feruari potest, nisi natura superau-
erit morbum: nec perire, nisi illam morbus pro-
straverit. Igitur morbi singuli ex sua quidē natu-
ra magnitudinē quandam possident, quæ vel su-
pra vires est, vt eas opprimat: vel viribus ægri im-
becillior, vt ab eas superetur, omnibz probè eve-
nietibus. Proinde cum supra vires fuerit, homō
proprius morietur. At morbi tēpora tunc partim
similia

Febrim ab hu-
morum patrida
ne ostendit et
pora distendit
tor.

Vicerum in-
pora.

Tempora mor-
borum non de
longe cognos-
ci, quoniam ex
cruditate &
cōcoctione in-
dicant.

Tempora vñ-
uscuīq; morbi
latitudinē mo-
mentaneam for-
nuntur. Morbi cuiusq;
generativus
proprium quod-
dam est tempus.
Tipora totius
morbi qua-
tuor.

Morborum qui
non solvantur,
natura duplex.

Servari poto-
est, nisi natu-
ra superaverit
morbum, nec
perire, nisi illa
morbum postro-
averit.

Principiū mor-
bi ad prædicta
ferenda, viles
prælicat indica-
tiones.

Principiū mor-
bi totius, est
omne cruditas,
inflammationis
quatuor tempo-
ra deservit.

50

50

40

30

20

10

similia

simili modo cum predictis sumuntur, partim dissimili. Si quidem initium similiter in morbi generatione constituitur. Ascensus autem, haud in cunctis confectionis, sicuti in iis qui superstitis sunt futuri, sed in cruditaris signis, letalibusque consistit. Ergo bene colorata urina, & mediocriter crassa, omnino optima existit, quantum ad coloris & consistentiam pertinet. Conveniet autem praeterea, vel encephala, vel oebula, vel hypostasim salubrem adesse, ut necque morbi natura postulat. At cruda urina est illa, quae oec suspensum quicquam, nec subsidens, nec nebula habet: imo quae nec crassitiem aliquam, nec pallorem assumpsit, sed alba est, & consistentia tenuis, a quae speciem refertur. Quod si aut nubecula, aut encephala, aut hypostasim nigricare videatur, talis urina est letalis: quemadmodum si quidam similia fursuri, vel lamis, in ea videantur. Iam vero si aut foetida sit, aut pinguiudine oleaceam in se continet, mortem minatur. Hec igitur sunt urinae, magnum morbum 10 oort. Magna etiam esse morbum cognoscere, si spiritum pleuritide & peripneumonia laborantibus, vel nigrum, vel solum vchementer, vel spumans, vel impense foetidum fuerit: vel nihil omnino expuat: idque ingenti dolore, vel spirandi difficultate hominem affligent. Respondent his & alij morbi, qui iecur, ventriculumque exercent, eodem letalium signorum genere comprehensum. Vnde in huiusmodi morbis vigorem similiter cum eo qui salubritatem est, determinare non licet. 30 Nam illic maxime accessiones statum definit: hic vero non licet maximas accessiones similiter determinare, cum morbus quidem ipse a principio incoctus perfluit: verum intellectu maximum capere oportet. Porro in inflammatione quoque terminatur, parvis generatio, vigoris terminus est: in ea vero quae non finit, homo etiam in eius ascensum morbi potest. Ceteri vires validissimae usque ad extremam phlegmones magnitudinem sufficere possunt: quae magnitudo extrema, vel in gangraenam, vel in putredinem terminatur. Iam vero uno eodemque tempore duobus tribusve morbis hominem infestari potest: quorum alius iam incipit, alius principii tempus adhuc, vel augmenti primordia occupat: tertius plurimum auctus est. Deinde hominem mori contingit, non propter inclinantem, vel nunc incipientem, sed ob vehementer auctum. Qua de causa, tria facultatum nostrorum corpus regentium principia, summe consideranda, quoniam statim sunt praedicta. Dico autem haec, 50 cerebrum, cor & hepar. Deinde alias quoque vniuersas particulas, ex singulis principijs ortas, nunc periculis, venas, arterias: ad haec illas, quae naturam quidem propriam habent, sed ab omnibus principijs requirunt. Nam ex hac speculatione, primum, siue vnus, siue plures, in homine morbi sunt, inuenies. Proximum est, cuiusque propria tempora ad praefidiorum inventionem necessaria inspicere. Etenim circa initium & fines, omnia imbecilliora sunt: in vigore fortiora: quae haec intercedunt, medio consistunt ordine. Igitur in vigore, quod mirandi vim possidet, in curatione praepollere debet: in principio & fine, quod vellemiam habet. At media tempora, pro summorum proportionum capiantur. Neque enim quam

quis victus rationem instituit, invenire poterit, oec vniq. nutrire, sine certa temporum distinctione. Etenim si vigoris tempore, etiam sine alimentum exhibitione sufficere possit ager, optimi sane fuerit, donec morbus inclinet, a cibo abstinere. Si vero sufficere citra cibum non possit, protinus ab initio in quolibet tempore, quod alimentum admittit, alendus est. Atque hoc remissionis est tempus. Quocumque remissione, secundam pariter totius circulo in duo vniuersa diuisi, nempe accessionem & remissionem.

GALENI PERGAMENI de locis affectu, lib. I.



Ro differentia partium humani corporis, variis affectuum curatioem contingit. Partes igitur quae in superficie corporis sitae sunt: vni cum affectibus quibus vexantur, facile sensibus deprehenduntur. At vero in imo corpore delitebant, exercitae cogitationis viam desiderant, cum in partium actione & usu, tum vel maxime in arte secandi corpora, quae nimium nos docet accuratissime proprietatem essentiae vniuscuiusque partis. * Si igitur inter tussientem, bronchum aliquod expuat (est enim id natura cartilagineum) maximo sane vlcere affligi pulmonem existimemus. Nam tamen si aspera arteria similibus sit ex bronchiis coepacta, tam grandis tamen exlucet, sine praematura morte in illa gigni non poterit. Nec vero tantum ex proprietate essentiae, sed ex magnitudine etiam excrementi reiecti, affectus locus discernitur. ut, si vni cui tussit excreetur aliqua portio vasculi grandiscula (quod aliquando contingit) tunc certe credendum est illam educi a pulmone. Quandoquidem vena quae in asperam arteriam disseminatur, minus in se fuit, & capillorum instar. Similiter si per dysenteriam tunicae aliquam corpulentioris alius aliquando reddiderit, non ab re coniucies 30 crassiuscula intestina torqueri. Necnon ex rebus naturaliter in particulis quibusdam contentis, creberrime sedes affectus cognoscitur. ut, si vni per vulnus reddatur, vescam: si vero iterum, intestinum aliquod: si cibum, ventriculum laquet esse convulseratur. Similiter etiam si vulnus erat thorace, spiritus per vulnus efflatur, indicat membranam cingentem costas, solutam esse. Praeterea sanguis eiectionis sciendo, arteriam esse vulneratam denunciat. Qui quidem arteria rum sanguis, eo qui a venis effluit, calidior, tenuior atque fluidior apparet. Ex adherentibus etiam rebus, affectus sedis nota peritur, cum nimium & ipse etiam essentiae proprietatem obdineant. Huius generis est remedium: quod quidem ostendit illius partis vlcus, a quo reicitur. Nam si id cum lotio excernatur, vni meatum si tussiendo, spiritalium in numerum: si per vomitum, gule aut ventriculi: si cum alui excrementis, intestinum vlcere aione significat. Est praeterea & alius diuersi morbi sumptus a rebus alicubi contentis praeter naturam. ut, si in vesica aut renib. 60 conneatur lapis, in thorace pus: aut denique aliquis humor molestus in animalis corpore, illic genitus, vel adueniens extrinsecus. Fingamus igitur

Vulnus & re-
medy ratione
infectis in
ipsum morbi
tempore.

Curatio aff-
fectionum varia-
tur pro differe-
ntia affectionum
particularum.

Art. secandi cor-
pora, docet nos
proprietatem
essentiae vni-
uscuiusque parti-
culae.

Magnitudo ex-
crementi

Rebus naturali-
ter in particu-
lis quibusdam
contentis.

Sanguis arte-
riarum calidior
est venarum.

Rebus contentis
praeter naturam.

Urina optima
qualis.

Urina cruda
indica.

Urina letalis
mala.

Spasmi passivi
signa.

Principia facul-
tatum nostrorum
corpus regen-
tium, tria.

(gratia exempli) aliquē tribus diebus non reddi disse vrinā. Ad hæc, evidēs quidā tumor circa pu-
bem emineat, evidētē repletionem vesicæ indica-
ns. In primis em̄ cōsiderandū est, num resolutū
excrementis potētiē nomine id accidat, an ob ob-
struclū vrinariū meatum: nā vtrumq; potest acci-
dere. Prus tamen revocare in memoriā oportet,
musculū qui claudit collū vesicæ, ad actiōne ge-
scere, dum fungitur vesica suo munere. Cuius qd
dem musculi actiō, parēt voluntatis imperio. At
vesica ipsa, vt potē naturaliter agens, minimē vo-
luntati obsecūdat. Inest etenim illi, quādamodū
ceteris ferē omnib; partibus, facultas quādam ex-
pulsivā, qua vnitur, dum cōtrahitur ab excrementis.
Quæ sanē excremendū vis, si aliquando fuerit
affecta, fieri potest vt supprimatur vrina. Proinde
si hominem sic figuraveris, vt declivius sit collū
vesicæ positas, ac manibus pubis tumore preste-
ris, tandem redderet lorum. Quod si sic facien-
do nihil omnino promoveris, non resolutā eam
vim, sed vrinæ fistulā constipatā esse, suspicari o-
portet. Quippe musculus ei circumdatus, si resolu-
atur, nō cohibet, sed præter voluntatem emissū
lorū, est causā. Trisariū autē cōtingit obstrui col-
lum vesicæ. Aut enim corpus ipsius in tantum tu-
morem attollitur, vt meatus inde occupetur: aut
aliquid ei præter naturā, vt caruncula vel callus,
innascitur: aut deniq; re quāpiā adveniente, me-
atus ipse obstruitur. Porro corpus eius ad mag-
nitudinem insignem attollitur, si vel inflāmano-
ne, vel scirrho, vel abcessu, vel alio quovis tu-
more fuerit affectum. In meatu earo quidem o-
ritur, si præcesserit vlcus. Obstruitur meatus, vel
a lapide, vel grumo, vel pure, vel crasso lentōq;
humore: quæ omnia distinguere oportet, ex præ-
sentibus præteritisq; accidentibus. Sit igitur ali-
quis puer, qui per perū pudendum scalpat. Eius
autē vrina sit aque similis, in qua sabulosa quæ-
dam subsideant: deū verō repēte supprimatur
vrina: nunquid optima ratione coniectens, hanc
lapidem incluisse in collum vesicæ? Itaq; si in
collocato puero, vt crura reliquo corpore sint
sublimiora, multisariū ipsam concuties: sic enim
feceris, vt lapis a meatu recedat. Quibus pera-
ctis, iube vt puer vrinā conetur reddere. Quod
si profuxerit, nōitiā causā, ac simul curationis
modum te invenisse, ne dubitaveris. Sin autem
nihilominus supprimatur vrina, tunc demissa ge-
nea fistula, simul lapidē a vesicæ collo repelles,
& evocabis vrinam. At nulla lapidis nota præce-
dente retentum lorum, si sanguis simul cum vri-
na profuxerit, arguēntū est grumū aliquē exi-
tisse ipsius obstruclionis causam. Quāq; fieri
potest, vt ob vlcus vesicæ, citra sanguinis profu-
sionem, paulatim grumus concreascit. Potest etiā
cōtingere, vt sanguis ex renibus per vtreteras in
vesicam delibens, grumū efficiat. Ad hæc igitur
omnia, si vti etiā vbi pus, vel aliquis lentus hu-
mor meatū vrinæ obstruxit, haud inutilis est æ-
nea fistula immissa. Sic etiam vbi ob carunculam
vel vlcere innazam, vesicæ orificium obstruclum
esse putamus, & ex præcedentibus vlcetis notis,
& ex eo quod immissa ænea fistula vrina vacua-
tur, id intelligere possumus. Quippe demissa fi-
stula, dolorē movet in ea meatus parte, vbi vi-

cus esse coniucimus: fractūq; sub fistula carne, se-
quantur cum vrinæ excretionē, & cruor & car-
nis fragmenta. In omnibus igitur his artificiosa
coniectura nobis perq; utilis est, vt quæ inter ex-
actam nominam, & omnimodam ignorantiam,
media quodāmodo existimetur. Ceterū cuiuslibet
parris vltus, magnificē ad affectorū locorum
cognitionē conducit. Etenim actiō, motus par-
tum factusque est: ar vltus, omnibus inest, vel ni-
hil tam aliq; agnens. Fit igitur excretionis vrinæ
actiō, a compressionē vesicæ, opitulantisque etiam
abdominis musculis, vbi vrinam admodum cui-
quam conner, aut vesica ipsa est infirma. Reli-
quæ autē partes omnes, ad actiōne sunt utiles.
Porro si vesica minimē in tumore extensa, vrina
reddi nō possit, necessum est vel vtreteras, vel re-
nes obstruclōs esse. Quapropter licet rursus in-
tueri oportet, num anteq; supprimeretur vrina,
aut lapidis, aut inflammationis, aut alterius ca-
usipiam mali accidentia præcesserint. Neq; inter-
im negligendū est vniuersū corporis dispositiō:
vt possimus planē discernere, num in ipsis reni-
bus, a lapide, vel crasis humoribus, fuerit ob-
struclū oborta, an in vocatis vtreteris. Cū igitur
singulæ actiōnes corporis, peculiariter fortia-
tur organa, quibus obeuntur, sanē actiōne lædi
est necesse, instrumentum efficiēte ipsam, quomo-
do libet læso. Verū interdum facile affectus pro-
ductus soluitur, ita vt simulatq; opifex causā se-
mota fuerit, prius ipse conqueascit. Interdum
verō vique adeo perinatior heret, vt perma-
neat diutissimē, etiam ablata causā. Accidit autē
nonnāq; vt efficiens causā pertransiens, nō fir-
mum faciat affectū: vel vti cū suffusio simi-
lia oculi imaginantur, collecto in ore ventriculi
aliquo tenui excremento, vnde vapores sublati
ad oculos, similes imagines movent, quales per
suffusiones cernuntur. Oportet siquidem oculos
participes fieri eius dispositionis, quæ inestat vē-
triculo, si videndo debeant hallucinari. Itaque
necessum est ordini semper ab instrumentū actiō-
nis oblatæ. Dein autē investigare, quānam sit
ipsius noxæ modus: num videlicet dispositiō ipsa
sit permanens, an adhuc in generatione cōstiteris,
nec nata perseverare. Quod si non quoq; fiat,
vtrum causā quæ effectum producit, continēa-
tur in ipsa parte, an per ipsam transeat, investi-
gandum. Etenim arefacto inmodicē humore, quem
crystalloidem vocant, perseverans erit oblatiō,
& essentia ipsius proprius affectus. Si verō cras-
sus humor in pupilla cōstiterit, essentia quidem
nō eundem est læsā, verum accidens causā in ocu-
lo ipso consistit. Tunc utem per ipsum transire
dicitur, cū evaporans humor in ventriculo
continetur. Non autem necesse est ad hoc, vt
pars aliqua esse affecta dicatur, in essentia ip-
sius permanentem esse dispositionem. Nam vbi
vehemens dolor aliquod intestinum inest, in-
firmo in vna quāpiā parte dolore, vt quasi per
forari videatur, quo pacto quis vel nequaq; in-
testinum affici dixerit, vel in eo affectum nō con-
sistere? Quis huicmodi dolores interdum ex-
certo quodam humore vitreo, vel temporis mo-
mento solvantur. Is igitur humor vitreus, causa
illius doloris exitit. Id siquidem quo tangeat
afficitur,

Coniectura est
artificiosa.

Vrina excreta
a quibus fit.

Alimentum labi
est necesse, in-
strumento effi-
cienti ipsam
quodamlibet
læsa.

Oculus caliginem
habet quæ fuit
consideranda.

Humor vi-
treus.

Vrina suppres-
sa quæ sit con-
sideranda.

Musculus vesicæ
collū cōtrahens,
apertū vrinariū.
Vesica non pa-
ret voluntatis
imperio.

Vrinam sup-
pressam ob res-
olūtā vim excreta
quodamlibet
expelletur.

Obstruitur col-
lum vesicæ tri-
sarian.

Lapidem in me-
atū collū vesicæ
includit.

Ænea fistula
ad quod vrina.

Caruncula collū
vesicæ innazam
argumenta.

*Causa est id,
quo tangente
quidem affec-
tus, ablati au-
tem, affectus
solatur.*

*Dysenteria cau-
sa morbus ex-
tus humor.*

*Morbis omni-
bus propter ab-
sorptionem si-
milibi naturā
atque effusum
feruntur, nec dif-
feri nisi magis
tandem et iam
abiolato et ma-
nente.*

*Morbis exiguus
solatur viis et
naturā.*

Id est

*Dysenteria est
viciis intestini-
rum.*

*Actio munda la-
dicat, nisi per
que nō efficit
afficiuntur.*

*Actio quid di-
catur.*

*Affectio quid di-
catur.*

*Morbis genera-
dos.*

Morbis quid.

*Affectio quando
dicatur caput.
Affectio quid
dicatur caput.*

*Corruptionem
abomum et
dysenteria.*

afficiuntur, & quo separato quiescit affectus, cau-
sam esse, omnibus in cōfesso est. At verò ipse af-
fectus, nonnunquam a causa aliqua oritur: sed ita or-
nitur, ut sublata causa effectus, haudquaquam per-
manente habeat dispositionē. Interdum autem
partim iam factus est, partim etiam nō sit. Sæpe-
numero etiam si fieri definat, utpote ablata cau-
sa, perseverans tamen permanet dispositio. Velut
in dysenteria, cuius affectus, mordax humor
existit: utpote qui ab iniuncto extergat, abra-
ditque, ac dein temporis tractu viceret intestinū.
Quod si anteaq̃ produxerit vicius, & persequere is
humor definat, affectus ipse nōdum dysenteria
vocabitur. Sin verò vicius in intestinū exercent,
etiam humor finitur, non ob id finitur affectus.
Hoc autem humore venit considerandū, om-
nem morbum protinus ab initio, ubi primū cor-
pus ipsum limites temperatur, quæ sanitati de-
betur, excesserit, eandem si ubi nāturam atque
essentiam fortit, nec differre, nisi magnitudine,
et iam absoluto & maximo. Siquidem res simila-
res, cum nullam figuram naturalem desiderent,
protinus ab initio eadem essentia constant. Dis-
similares verò, & quibus varia est forma, ut do-
mus, essentiam generatione et postmorem habere
poterunt. Quoniam itaque causæ agunt in cor-
pus, ipsa species affectus ab initio est eadem, ta-
men ob exiguitatē nō planē cernitur: sicuti neq̃
in fixo cōcavitatis, quā unica stulla produxit. Cæ-
terum id genus affectus exigui, separatis efficien-
tibus causis, illis a natura vincuntur. Illi quippe
duntaxat externo egent auxilio, quos ob magni-
tudinē vincere natura nō potest. Igitur ubi
primū mordax humor aliquod intestinū ero-
ferit, quicquid quo iam factum est, nondum aperte
videatur, nihilominus dispositio ipsa sub dysen-
teriz specie cōprehendatur. Sit aut hoc initium, vi-
ae ad inveniendos affectus sedes, nullam actionem
lædi, nisi pars que illam efficit, afficiatur. Verū
ut affectio & actio diversæ sint voces, ita diversus
quoque earum est vicius. Id siquidem agere di-
citur, quod ex seipso morū obtinet. Affici verò,
quod motum habet ab alio. Cum itaq̃ duo sint
motus genera, alterationis & lationis: ubi ad
permanentem dispositionem alteratio pervene-
rit, fuerit dispositio præter naturam, morbus
vocatū: quæ per abvionem nō nullam eam dispo-
sitionem affectum nominant. Distinguentur ta-
men et inter se propria & primaria affectio, ab
ea que per cōsensum accidit. Ut autē recta pro-
priaque nominā appellatio utar, afficiatur quidē
caput, quando cōdolefecit ventriculo: ægrotat
verò, cum proprio morbo laborat. Similiter ven-
triculū affici quidem dicemus, ubi a viscoso mo-
lestatur humoribus: ægrotat verò, aut per inter-
ruptionem propriā, aut cum infirmatione, vel vi-
cius, vel abscessum habet præter naturam. Porro
corruptionem abomum tres primæ ac veluti gene-
ralissime sunt differentie. Una quidem per pro-
prios ventriculi morbos, altera a viscoso humo-
ribus in ipso collectis, tertia ab alimentorum qua-
litate inducitur. Licet itaq̃ viscosam ædi cōstiu-
tionem, ventriculo nō primariam, sed secundariam ra-
tione affectio, minimè circa sedem propriam
hallucinante: quemadmodum ubi viscosi cibi &

corruptioni obnoxii ingeritur. Si igitur quispiam
fumosum ructum emittat, igneo quodam calo-
re ventriculū eius esse dicemus prædictū. At dein-
de rursus distinguendo investigabimus, virū ad
intemperie corporis ipsius ventriculū, is calor ori-
atur: aut a fluxu bile, calidū vel in ipsius spacio cō-
tenta, aut in tunica ita, ut vix ab illi ergi possit, de-
missa. At ne hic quidē cessabimus. Nam rursus
querere oportet, an iecinore male suo officio
fungente, huiusmodi humor accumularetur: an ex
vniuerso defluat corpore. an etiam in ipsomet
gignatur ventriculo. Ergo si in ventriculo cibi in
humosam qualitatem mutantur, idq̃ non ex sua
ipsorum natura, causam calidā: si verò accēsit, eam
frigidam esse et necesse. Ut discernas autē, num
intemperies aliqua, an viscosus quispiam humor
ventriculi corpus infestet, ostendere oportet cibos
qui sapientia natura quæ maxime corruptivus modo
ad ventrem: ut panē et chondrum alius, qui in
fumū transmutare cibum consueverit: mel autē
his, qui a cibo acidum saporem percipiunt. Dein
considerare excrementa, tum ea quæ vomitur,
tum quæ deiciuntur per alium: num humor ali-
quis cum illis quidē biliosus & calidus, cum his
verò pituitosus ac frigidus exornatur: an nullo
vacuato humore, ipsa exiguum quandam ma-
tationem obineat. Quippe ubi a citra humoris
affluxum igneo calore ventriculus infestatur, pa-
nem aut chondrū absq̃ humore videbis deici,
perq̃ exigua in ipsis facta transmutatiōe. Quod
si humor quoque pravius in ipso ventre consistens
corrumperet cibos, videtur hū, ubi deiecit fuerint,
in huiusmodi humore submersi, & ab ipsis ac-
tione manifestius alterati. Id quod a vomitione
etiam clarius discernatur, si laborans sit pro-
dinus ad vomitū. Nam cogere eum qui nequeat
vomere, absurdū est. Atque circa deprehendun-
dum, si in spacio ventriculi noxiū cōtineatur hu-
mor. Si verò in tunica sit imbibitus, ut ad calidum
nausea quædam inanitis hoc est, citra vomitu-
m sitisq̃ vehementer cōsequatur, ita a frigido ci-
borum cupiditas excitatur. Porro calida dispo-
sitiō, ubi quicquid fuerit, semper refrigeranda est. At
quoque, aut quo modo, aut qua materia refrige-
rare conveniat, locus affectus cōmonstrat. Iam
verò is qui a cidi ructū ædunt, auxiliatur medi-
camē diatrion pepererō, aut aliud simile ex aqua
vel vino epotū. Alius autē qui indorosiū, tum
ab synthriū, tum hiera picra est ex viciis. Quo qui-
dem medicamine (hiera videlicet, quæ ex aloē
cōstat) in potu exhibitō, quosdam olim colicos
persensui, quibus mordaciū humorū defluxus
in intestinū, conciliauerat affectionē. Cæterū in-
testinorū proximæ ventriculo partes, exhibita
tum cibis, tum ponibus: quæ verò nō ita multū
a sede distant, dysimilis promptius curantur. Fun-
gamus rursus per ventrē deici excrementa que-
dam, aliquando quidē ramenta, aliquando cruen-
tum aliquid, similis aliquando hæc ambō: tunc
nam intestinū vicerat affectum esse, dicitur acriter
nemo. At verò utrum in exallibus intestinis, an
crasis, ipsum vicius consistat, id ex natura, & ex
tempore, & ex missione cum thermore, distin-
guere oportet. Siquidem infirmam parvū vicerat,
nullas omnino vicerum habet notas alui excre-

*Ructus fumo-
sus igneus in-
guem calorem
ventriculi.*

*Affectio in ven-
triculo cibis, ob
tandem frigi-
dam.*

*Ructus alio fa-
mo vel acido,
quod excrementum
considerandum
est, ad viciis
causam per vici-
tationem.*

*Vomere nemo
cogendus est,
nisi sit ad vom-
endum potus
datus.*

*Nausea munda
inducit colicū
fucum munda
nam ructus in
tunc.*

*Capiditas cibi
vide excitatur.*

*Locus affectus
quid indicat.
Dianque populi
nam ructus in
de confort.*

*Hiera picra
quod condit
est affectibus,
hæc ructus in
ma cito quæ
tunc, munda
pneus viciis
causam.*

*Excrementa
quæ deiciuntur
per alium.*

*Excrementa
quæ vomuntur
per alium.*

*Viciis infirmam
parvū vicerat,
nullas omnino
vicerum habet
notas alui excre-*

mentis admittas: earum verò partium, quæ paulo altius sunt sitæ, vlcera, miftas quidæm intercore notas habent, fed id leniter duntaxat. Quæ admodum fi multo funt fublimiores, vehementior erit miftura. Præcipue verò in fupremo interftitio vlcens notæ intercore accuratè mifeetur. Po-
teft ex vno quodog indicio fimul & locus & difpofitio deprehèdèrè aut locus vñ cum caufa. Cæ-
terum lo cori notæ, & ab aétione lafa, & excre-
mentis, & polita, & doloris proprietate, & prop-
rijs accidentibus defumuntur. Affeétu verò, &
ab excrementorij fpecie, & loci natura, & dolo-
ris proprietate, & proprijs accidentibus. Affeétio ita-
que lafa, affeétam partè indicare poteft, hoc mo-
do. Si enim accidens aliquod circa cernendi ofi-
um evenit, oculi affici cõitit. Excrementorij
fpeciem partè affeétu indicat, vel quod funt ex ef-
fenna illius, vel quod ab ea cõneantur. Politus
etiã affeétu partè committit. Durus quippe in
dextra præcordiorij parte tumor, nõ lienis, fed ie-
coris affeétu eñ nota: in finiftra autè, nõ hepatis,
fed fplenis affeétu indicat. Ad hæc, fi membrano-
fa tunica fruftuã vomendo fuerit reieétum, aut
gulæ, aut ventriculi: fi tufiendõ, gutturis, aut a-
fperæ arteriæ: fi excreando, faucium: fi cum vni-
na, eius fiftulæ: fi à fede, alieuius inteftinorum: fi
per mulieris pudenda, vteri affeétum pottendit.
Singuli etiã dolores, pro politis varietate, pos-
funt affeétam fedem oftendèrè. Nam fi apparens
per vomitù vlcis notis, in anterioribus
partibus circa præcordia fentiatùr dolor, ventri-
culum: fi verò in potterioribus circa dorfum, gu-
lam exviceratam effe eñ indicu. Ex proprijs ac-
cidentibus etiã innoteſcit affeétus locus. Nam
ore ventriculi affeétu, faftidium infeftat. Per he-
patis verò imbecillitatè, excrementa alni, aque
in qua carnes nuper maceratae abluta fueruñt, afci-
milantur. At in peripneumonici, maxilla viden-
tur ruberæ. Quin etiã proprijs ifporij affeétuum
notæ, in excrementis deprehenduntur: fi quidem
ramentù, vlcis: fi in vna fabuloſum retidet, fi
pidis: cucurbitæ verò ſeminibus excrementa fi-
mulia, latoru vermium indicia funt. A locus etiã
ipſius, morboru indicia ſumuntur, eò quod qui-
buſdam ſolis morbus ille accidat, quibuſdam ve-
rò ſolis nunq̃ eveniat. Quippe ſoli oculi ſuffuſio-
ne laborant. Lapis in vefica & renibus duntaxat
naſcitur: atq; vñ nonnullis placet, etiã in colo-
Lumbri in inteftinis gignuñtur. Rurſus inſeſi-
bile eñ, vt cor abſceſſum ſuſtineat: aut pulmo,
aut ligamenta, dolorè. Ab accidentu quoq; prop-
rietate affeétum indicia oriuntur. Nam qui-
buſdam per rabioſos morbos, vngues ad vna e-
vadunt. Intempetiſſimus horror cum febre, infla-
mationis ad ſuppurationè tranſeuntis indicium
eñ. Lingua nigrificans ardentè febrim pottendit.
Paucæ tamen affeétu ſunt notæ, quæ nõ ſimul
affeétam fedem oftendunt. Cæteru vt aétio num
noxæ affeétu duntaxat particulæ, fic diſſerens ea-
rum, ipſius affeétu declarat. Ea igitur ſola funt
affeétu propria ſigna, quæ per accidens ipſos ſe-
quuntur. Pottè cum ob vapores vel etiã humo-
res ipſos aſcendentes ad cerebrù, mens leditur,
nemo ſanè dixerit cerebrum tunc laborare pri-
mogonio affeétu: quanq̃ omni affeétu carere,

ipſum hauquaq; defendi poteſt. Quare dicen-
dum eñ, illud per conſenſum, ſive cõſortij lege af-
fici: hoc eñ, ab altera parte talem affeétione reci-
pere. Sunt præterea nonnullæ aétiones, quæ ido-
neæ indigentes materia, ipſam ab alijs partibus
preparatam accipiunt. Qua de re interdù optima ra-
tione cõtingit, nulla exiſtente in aétione cuiuspi-
am proprijs inſtrumentis noxa, aétione ipſam
perire, defectu ſcilicet eius materiæ, ex qua fieri
cõſuevit: vel in voce accidit, cuius quidæm ma-
teria effluo exiſtit. * Hæc autè ſit cõtraétio tho-
race ab intercoſtaliſbus muſculis. Hiſ igitur ni-
hil agennibus, animal voe amittit, & quidè nullo
interdù in proprijs vocis particulis apparen-
te affeétu. Sunt verò hæ partes, tres cartilagineæ
à tribus cõmorte muſculis, in quos inferitur ner-
ui demifſi à cerebro. Eſt præterea in gutture liga-
la, ſive epiglottis, maximè proprijs vocis ipſius
inſtrumentu. Et enim cecidit quidam ab alto, ita
vt dorſi inuñt aſſigeretur. In tertio die exigua
admodum vocem emiſit. Quarto deinde die o-
mnino obmutuit: reſolutaq; ſimul fueruñt & cru-
ra, manibus proſus illaſia. Sed nec ſpirano nem
amiſit, nec diſſiculter ſpirabat. Nam cum tota
ſub ceruice ſpina eſſet ei reſoluta, accidit thora-
ci, vt & ſeptum tranſuerſum, & muſculi ſuper-
ni, numero quidem ſex, mouerentur. Quippe ner-
us ſpinali medulla, quæ in ceruice eſt, in ipſos de-
ſcendunt. At nerui muſculoru intercoſtaliu, qui
effluunt efficiunt, omnes affeétu erũt. Vbi igitur
ſedata ſuit ſpina inflammatio, à ſeptimo die vox
reſtituta eſt iuueni, & crura monuiſſe ſaculratè,
antea interceptè, recuperavit. Huſmodi ergo
noxæ ſpeciem, magis propriè per conſenſum a-
venire dixeris, q̃ vbi ab humoribus in ventricu-
lo contentis, exhalantibusq; caput dolore tenet-
tur. Iam verò, vt ad crura facultas quædam, ſed
citra eſſentiã ſubitanimè defendere ob phle-
gmonem prohibita eſt: ſic ad oculos, cum eſſenti-
a, vbi obſtructi fuerint viſorij meatus. Ad gut-
tur autem, q̃ vbi materia perveniat per illam ipſe
dori reſolutionem, ſufficiens tamen ipſius
quantitas nequaq; accedit. Qui verò ab interco-
ſtaliu muſculoru perforatione obmutuit, iſ totè
vocis materiam amiſit. Pottè quemadmodum
crura reſolvuntur ob inflammationè ipſarũ, ita
etiã guttur, vocalibus ſive recurrentibus ner-
vis (quos ipſe inveni) aut inciſis, aut laqueo in-
terceptis. Atq; idem eñ modus quo læduntur gut-
tura muſculi, ſive recurrentes nerui, ſive q̃ iux-
ta artenas ſunt, videntur. Vtrinq; enim anima-
lis facultas deſideratur, ſive qua moneri nemo
poteſt pro voluntatis imperio. Inciſis præterea
muſculis qui epi glottida mouet, animal etiã eva-
dit mutũ. At laqueus collo circumdatus nõ ſolũ
reddidit animal mutũ, ſed etiã ſuffocavit, ipſum
reſpiratione priuando. Aſpera autem arteria, ſi
diſſecetur, voca quidem nocet, ſed animal non
priuat reſpiratione. Angina verò, cum ſit inter-
natus gutturis partiũ inflammatio, ſtrangulatio-
ni propone reſpondens, reſpirationè tollere
poteſt, ipſius meatum obſtrudendo. Idcirco voca-
lis inſtrumentu maximè proprijs affeétu eñ.
Qui autè eñ affeétu loci notitia ipſe curationè in-
veniri, ex hoc eñ pto pendiſſe. Occurrit mihi
olum

Locus nota
videtur ſumitur.

Affio laſa per
tem affeétam
inducit.

Excrementu
ſpeciem partem
affeétam indi-
cat.

Politus indicat
partem laſam.

Doloris ſinguli
affeétu poſſunt
partem ſuſpen-
dere.

Accidentia pro-
pria indicia lo-
cum affeétum.

Peripneumoni-
ca vultus ma-
xilla rubra.
Affeétum mo-
do vnde depre-
henduntur.

Lapis in quib;
gignuntur parti-
bus.

Affioſum cor
ſuſtinere non
poteſt.

Dolori nec poi-
mo nec lequæ
tam poſſunt.

Horror inten-
ſiſſimus cum fe-
bre ſuppuratione
vni inflammato-
rius indicat.

Affioſum non
poteſt ſigna qua
ſunt.

Affio per con-
ſenſum quæ-
dam dicatur ore
brom.

Veni materia
eñ effluo,
quæ ſit contra-
ctio thoracis ab
intercoſtaliſbus
muſculis.

Voca propria
inſtrumenta
ſunt tres carti-
lagines quæ ad
ſpirano laſam
gutturis præſentia
epiglottis.

Affioſum po-
tenteſſimum ſpi-
noſa duo.

Recurrentes
nervos in vno
Galemo.

Moneri pro
voluntatis impe-
rio a quo po-
teſt, ſine ſolus
tati animal.

Angina eñ in-
flammatio in-
ternarum gut-
turis partiũ.
Locu affeétu no-
titia quaſi ra-
tione Galemo
ipſum curatio-
nem oftendit.

olim quidam, cui sensus trān digitorū manus, tam triginta diebus perierat, prius illeſa motione: nec iuuabatur quicq; a medicamentis ipſi manui admons. Cum igitur intellexiſſem ex illo, cum proficiſceretur Romam, ſe deſiſſe a vehiculo, ac initium doſi tunc ſibi coſumum fuiſſe, nec multo poſt acciſſe digitorū affectū: cōſeci inde, * in primo itaſſe exortu nerui poſt ſeptimam vertebra, partē aliquam ob iccū fuiſſe inflammari, cāmq; iam induruiſſe in ſciritu. Quippe neruorū qui a ceruice prodeunt, vltimi pars * humilior, quæ deſcendit per cubitū, in eam minori digitorū diſſeminatur, ac præterea per mediū digiti mediā partē diſpergitur. Quam obrem illi ſpinæ parti, * quæ affectū particule principii in ſe continebat, congruenti medicamento cum ſuccorum, digiti ſui ſenſum reſtitui, cum maxima ſpectantū omnium admiratione. Quo autem modo ſenſus digitorū perierit, motu priuſ illeſo, iam audies. Senſire enim, vel vni quiddam pati eſt: moueri autem, ceu quoddam eſt agere. Quam obrem vt quis moueatur, opus eſt robore: ac vt ſentiat, vel minima facultas eſt ſatis. Ob idq; neceſſum eſt, vt ſenſu ipſo deperdo, ſimul exoluatur & motus, vbi per vnum eundēque neruum ambæ perficiuntur actiones. Porro omnis voluntarius motus, ad muſculorum officium pertinet. Quippe nullus neruorū per ſe, ſine muſculo, vllam huiusmodi in animatis particulis actionem efficiere poſſit. Cæterū ad partes mouēdas muſculi ipſi aliquando quidem & immediatē perueniunt: aliquando vero per medios tendones: quales ſunt illi qui mouent digitos. Si igitur affici muſculorum neruos contingat, digitorum motus peribit: ſi vero eos qui ad eum pertinent, tangendi ſenſus corumpitur. At vbi tota reſoluitur membra, cum videlicet cōmune principium eſt laſum, ſimul & motus & ſenſus percutit. Ac tunc locum primariū affectum, ex leſorum neruorum multitudine duntaxat inuenire poteris. Accidit autē interdu, vt dextra tantū pars ipſius ſpinæ afficiatur, altera omnino illeſa: aut ē contrario, vt illa manente integra, ſiniſtra affectum ſuſtineat: atq; bac ratione nonnunq; tota pars ſiniſtra reſoluit, dextra illeſa manente: nonnunq; cōtrā, dextra pars duntaxat & afficitur & reſoluitur. Vbi verō non affecta ſpina, tantū vnus nerui proceſſus eſt laſus, eas duntaxat partes reſolutio occupat, in quas ille neruus eſt diſtributus. Itaque ſi ſpina fuerit affecta, aut aliquod neruorū principii, cōvertenda illuc tota medendi ratio eſt: alioqui ſi ſpina circa reſoluta membra occupaberis. Nam verō ob frigida immoderata, interdū ſedus muſculus reſolui ſolet: quæ maxime, ſiue ſederit quæ ſuper lapidē frigida, ſiue in aqua frigida ſupra modū fuerit verſatus. Quā ſanē reſolutionē ſequitur in voluntaria exercitio deſectio. Qui igitur in aſtutia exercitatus fuerit, accuratē præcedentia & præſentia accidentia norit, ac ſic ad curandorum morborum experientiā methodo & ratione perueniet, in inueniet & locum affectū, & ipſam diſpoſitionē. Vt autem affectū muſculi, voluntarias ſic veſtiat, necnon inteſtinā oblaſa, naturales actiones lædere poſſant: eō quod ipſi

cōtractis excernantur ea quæ cōtinent. Ac diſſerunt certē plurimū naturalia ab animalibus inſtrumentis: quod naturalibus quidem, cognata actionis vis inſit: animalibus verō inſtrumentis a principio, veluti lumē a ſole, ipſa deſtina. Quā obrem ſolis partibus quæ & ſentiri & moueri vim habet, accidit, vt ipſis interdū haudquaquæ affectū, nililominus eorum actio exolatur: id quod naturalibus inſtrumentis minimi ſolent accidere. Quoniam enim horū actio læduntur, ſemper ipſa primō afficiuntur. Cæterū animalibus inſtrumentis omnibus, * naturalis quoq; diſpenſatio adeſt, cum nimium & arteriarū & venarū adminiculo indigeat, ad eſſentiā propriam ſeruandā. Proinde alterari a vicinis, ipſis vt naturalibus: alterationem verō ſentire, vt animatis evenit.

GALENI PERGAMENI de locis affectis, lib. II.

CAPVT I.

Res ſunt exercitationis modis circa affectum locorum notitia. Quorum vnus circa ſingulas corporis partes, alter circa cauſas & diſpoſitiones, tertius circa differentiam accidentium verſatur. Igitur a locis ſumitur modus, vbi dicimus: Affectio cerebro huiusmodi accidentia ſequuntur. A diſpoſitionibus & cauſis ſumptus, exiſtit talis: vt ſi dixerimus: Inflammationis feſtum, aut refrigerationis, huiusmodi ſunt accidentia. Ab accidentibus, vt cum dicimus: Hoc doloris genus hæc diſpoſitiones aut hoc locos portendit.

CAPVT II.

Hallucinatur autē Archigenes, vbi dolorum ſtupor neruis tantū evenire ait. Quippe ſtupor a frigida diſpoſitione oritur, non neruorum duntaxat, ſed etiam venarū, arteriarum, carnis, membranarū, muſcularum, & cutis. Quod ſi ob id quod hæc omnia per neruos ſenſum habent, ad neruos illam diſpoſitionem refert, cur non reliquas omnes dolorum differentias, proprias eſſe neruorū ait? Etenim dolor, triſtis eſt ſenſus: quæ ad modum ipſa volupias, blandus. Quod ſi rem accuratiuſ inſpexeris, haudquaquæ doloris ſpeciei docendus eſt * ſtupidus dolor: ſicvti neq; ſpecies vlcis inflammatarū vlcis: ſed vtrobiq; duarū diſpoſitionū concurſus adeſt. Etenim ſtupor refrigeratio eſt inſignis: idcirco corporibus ira diſpoſitis & ſenſus & motus diſſicultatē inducit: quæ admodum cōpleta refrigeratio, & ſenſum & motum omnino tollit. Quod autē ſtupor diſpoſitionis, nō doloris aut ſenſus ſit nomen, Hippocrates docet, vbi ait: Stupor enim medicis dolorum ſoluere poteſt. Porro cōtractis vehementer particulis, atque eos qui torpedine animal dum adluu cūvit, teneant, inſeſtare ſolet etia ſtupor. At quibus membrū aliquid ſtupidum fuerit, ſi quicquid tetigerint, obſcuro & lebeti ſenſu percipiunt, neq; moueri poſſunt. Si verō moueri cogantur, dolent. Cæterū circa hoc quod moueri tenēt, affectū ipſum ſtuporis haud obſcure perſentit, ſed tunc minimē doloris. Stupor itaq; nō particula cuiuſpiam proprius affectus eſt, ſed diſpoſitio, quæ accidere quidem omnibus poteſt partibus, ab iſs tamen duntaxat manifeſtē ſenti-

Inſtrumentis naturalibus, cognata actio inſit vni.

Inſtrumentis animalibus, veluti lumē a ſole, a principio ſeſtalis deſtina.

Exercitationis modis circa affectum locorum notitia, tres modi.

Archigenes opinio reſoluitur. Stupor a frigida oritur diſpoſitione.

Dolor, triſtis eſt ſenſus. Volupias eſt blandus ſenſus.

Refrigeratio cōpleta ſenſum et motum tollit. Stupor medicis, dolori ſoluere poteſt. Stupor quoniam inſeſtare ſolet.

Stupor accidentis cuiuſpiam proprius eſt.

Sentire, eſt velle, quiddam pati.

Moueri, eſt velle, quiddam agere.

Sensu amissum, cur motus per se, vbi per vnum eundemq; neruum veratq; actus perficitur.

Nerui nulli absq; musculo posse motu praestare.

Spina interdu dextram, interdum sinistram partē reſoluit.

Medendi ratio non eſt cōvertenda illuc tota medendi ratio eſt: alioqui ſi ſpina circa reſoluta membra occupaberis.

Medendi ratio non eſt cōvertenda illuc tota medendi ratio eſt: alioqui ſi ſpina circa reſoluta membra occupaberis.

Medendi ratio non eſt cōvertenda illuc tota medendi ratio eſt: alioqui ſi ſpina circa reſoluta membra occupaberis.

Medendi ratio non eſt cōvertenda illuc tota medendi ratio eſt: alioqui ſi ſpina circa reſoluta membra occupaberis.

Medendi ratio non eſt cōvertenda illuc tota medendi ratio eſt: alioqui ſi ſpina circa reſoluta membra occupaberis.

Medendi ratio non eſt cōvertenda illuc tota medendi ratio eſt: alioqui ſi ſpina circa reſoluta membra occupaberis.

Medendi ratio non eſt cōvertenda illuc tota medendi ratio eſt: alioqui ſi ſpina circa reſoluta membra occupaberis.

Medendi ratio non eſt cōvertenda illuc tota medendi ratio eſt: alioqui ſi ſpina circa reſoluta membra occupaberis.

ri, quæ & suos affectus percipere, & moveri pro volunratis imperio sunt natura. Iam verò ex carne (quæ nūquā sola ac per se reperitur) ligamentisq; & tendinibus per ipsam disseminatus, musculorum essentia cōstat: quæ ut permanere possit, venis indigebat, arteriisq;. Verum citra dolorē pulsare, ad solas arterias pertinet, animalis etiamnū rectē valente. Vbi verò ingens inflammatio est oborta, vel erysipelas, vel alveiculus, arteriarū pulsus cum dolore sentitur: cum per bonam valetudinē, nec cum dolore, nec sine dolore ipsum discernere. Etenim duabus præcipue occasio-

Causa per se reperitur musculorum, intestini compo sunt.

Pulsus doloris cum quatuor finitior.

Dolor inflatus in musculis vnde accidat.

Strapex est diffinitio magis inter resolutionem et integritatem valitudinem. Pulsatus dolor nec in peripneumonia, nec in plenitudine oritur. Pulvis caret sensu. Flammis quod.

Pulsatus dolor quæ inflammatio signatur, quibus non accidat partibus.

Extinctio doloris quæ affectus partem. Doloris species prima sunt duæ.

Intemperies doloris inferior.

menter refrigerant, ad ignem manus affatim calfacere tentant. Quippe intolerabilem sentiunt dolorem, præcipueq; iuxta vnguium radices. Similiter etiā per dolores vocatos colicos, vbi frigidissimus aliquis humor (qualis ille est quē vitreum Praxagoras nominat) in quopiam intestini crassiori est impactus, adeo torquetur ægri, ut videantur sibi circa venteratū regionem terebro peritorari: id quod olim multi etiam cōgigni ceterū injecto oleo rutaceo, cum id paulo post cerneret excernere, excreui humorem vitro hūso persimilem. Sunt & alij dolores, per quos palus infixus videtur, q; & ipsi corpus affectū crassum esse significāt. Differūt autē inter se, aut multitudine, aut crassitudine, aut rei dolorē faciētis potentia siue ea humor fuerit, siue spiritus flatulentus. Siquidem paucus plurimo, & tenuis crasso, & permanens moto, ac denique minus refrigerans, eo qui vehementissimum refrigerandi vim obtinet, minorem solet excitare dolorem. Igitur siue clauo transfixus esse, siue terebro peritorari locus videatur, is dolor ad crassum intestinū est referendus. Atque huiusmodi dolores, ab eo quo lapis impactus est, discerni nō possunt, nisi quæ accidētia quæ postea cōsequuntur, expectauerit. Vt utiq; tamen doloris sunt cōmunia prædicta, & quidē calorifica in primis, siue ea extrinsecus adhibeantur, siue ea innascantur. Deinde, nisi mingatur dolor fuerit, eorum medicamentorū quæ dolorem obtundere possunt, aliquod adhibendū est: cuiusmodi existūt, quod à Philone instituitur. Verū si lapis dolorē excitauerit, ipse interdum solas, interdū vni cū cruore excernitur, in vrinisq; subfident fabulosæ quædā. At si in collo affectus cōstituerit, nihil horū videtur: sed protinus inflatio quædam & extensio, & flatus cōm plures, & tormina, & excrementa flatibus plena cernuntur. Ea autē licet discernere, si & sup aly narent, & bubulo stercorei simulentur. Quinetū cibum cupiditas, tum concoctio, deterior evadit, & præcisus, & præcedens, & quæ sequitur. Vt ericula namq; malè affecta accidit, ut qui parti primario affectu cōtinenter adhæreat. Insuper colicos nominatos affectus magna ex parte præcedit cruditas, & spiritus flatulentus, & vomitus, & nausea, quæ multo tempore inanis permanet, & in præcordiis mordacitas, & fastidii, & indigentia plurima. Igitur id genus dolores vehementissimi, consistere in crasso intestinis putantur. Qui verò mitiores sunt, ex duobus alterū necessariū est: aut quod in his ipsis sunt, sed à leuiori causa orti: aut quod in tenuibus intestinis consistant. Porro qui mordaces dolores sunt, hī à mordaci humore intestinū erodēte fiūt. Vnde dysenteriam semper huiusmodi dolores præcedūt, vitpote per quā intestina vlcētur. Ceterū dysenteria illa, quæ velvni feculentū sanguinē excreuit abvndantissimē, icterio affectu cōiuncta esse symptoma. Ea verò per quā syncerus multūq; sanguis excernitur, plerūq; vniuersum corpus evacuat, haud secus q̃ hæmorrhoides, aut miliebre profusū. Vt verò ad dolorū differentias reverterar, punctorius dolor potissimū circa membranas cōsistit. Quobrem lateralis dolor, punctorius esse censetur. Iā verò hæmodia, siue densū stupor,

Colici dolores: orti ab humore vitreum, quæda sunt aliquo intestino cōgigni.

Oleum rutaceum, cum colici dolores est remediū.

Doloris qui boni meriti, & avari, & qui avari infirmitas.

Crassi intestini dolor, ut dicitur.

Doloris colici, & avari qui ab impactu lapidis oritur, sunt communia prædicta calidissima.

Philonium, Colici dolores, & avari à lapide, & avari dicitur.

Colici dolores quædam sunt sympotoma.

Dysenteria dolores mordaces præcedunt. Dysenteria boni pauci.

Dolor punctorius. Hæmodia.

stupor, solis dentibus & gingivis accidere solet, ubi quisquam & aures & acidos cibos ingesse rit. Ceterum complura alia dolorū genera sunt ab Archigene prodita, sed quae prius intelligi nequeant: qui sanē vir, ira omnium affectuum proprietates descripsit, ac si omnes ipse fuisset perceptor: quod non verissimile est. Præterea ubi aut, hemicranes sphaelodes circumferibit, hoc est, submoveri à dissectione vasorum, minimè declaravit quidnam sphaelodes esset: de cuius vocis significato varij variè opinantur. Dein dolorē pulliatum & turgidum inferri ab arteriis cōtendit, ubi ipse per hemicranes sphaelodes primogenia affectionē laborat. Est autē turgidus dolor, qui à parte primario affecta, veluti à radice incipiens, celeriter in partes adiacentes transfertur, id quod non solum in hemicrania, sed in cephalæa etiam soler accidere. Sed nequē illud etiā est verū, affectos nervos protinus intersequi, in durariq; cum repentiū nōnulli affectus, per quos laxiores evadūt nervi, quemadmodū per atrophiam conspicuum est. In inflammationibus autem & tumoribus præter naturam, manifestè intenditur nervi.

sphaelodes

Dolor turgidus.

Nervi in quibus laesunt afflicti sunt, quibus tenduntur.

Altemin laeso est affecta pars symptomata. Convulsiones emanant à pleuritide, & ab inanitione.

Citharista citharistas instrumentum laesum.

Nervi sublaesunt arteria & vena. Tendones sunt nervosa corpora.

Dolor nervosus non est afflicti. Membranae dolores sunt laesi equaliter.

Virescentia infesta respiratio ipsa per se facit à solo spiritu laeso.

leni, ac minimè violenta utuntur respiratione. Igitur cum in internis partibus lateris missio aliqua oritur, septum transversum intentum impensus dolor. Cum verò in superioribus, tunc iugulum potius dolor infestat. Vbi ingens in hepate inflammatio oritur, aut vbi ipsum est induratum, dolor qui tunc iugulum in dextra parte infestat, causæ venæ magis, & membranarum tensionem sequitur. Quod autem membranae quæ oesibus adiacent, dolores profundi sint, & veluti dolentum osui quandoquidam imaginè referant, haud quidem mirandum est. Proprius autē arteriæ venæq; dolor, extensæ secundum longitudinē corporis, veluti chordæ cuiusdam speciem refert, nullam gravitatē inducens. Porro vicerofus dolor non solum ad cutem, sed ad imas quoque partes, ut ossa extendatur. Pruriginosus autē ad solam pertinet superficiem: nō tamen primario, pro ratione ipsius propria, sed per accidens, quod nimirum cutis omnes sibi subiectas partes spiritus dūte su peret. Horum ergo dolorū uterq; propriæ dispositionis est accidens. Funt autē ob quosdam humores acres: tantūq; ipsi inter se, quantū dispositiones à quibus oriuntur, dissident. Verū quia crebrò dispositio pruriginosa, vicerofam antecedit necnon soluta quælibetq; vicerofa in pruriginosam fieri transmutatio assolet, inde est quod de ipsius scriptis indistinctè atq; confusè Archigenes. Qui quidem ubi citharistam pruriginē do lorem in profundo esse, perpetuam hallucinatur: quandoquidem ad membranas is, non ad imas partes propriè pertinere videtur. Similiter ubi in fixum dolorem vocat, cum sinus accesserit, sermo illius absurditate nō caret. Quippe sinus cavitas quædam est, cum partem antea cōiuncturum, alia distat ab altera. Vbi igitur flexione impletur, ita vbi adiacentes partes tenduntur, tunc tensum dolorem sentiunt laborantes, non quidem longo spacio porrectum, sed propriis limitibus circumscriptum. Præterea dum ait, hepatitis dolorē inhaerentē, hoc est, eodem in loco permanentem, existere, an nō etiam veris cōtraria profert? Siqui dem hepatitis dolor, si quispian alius, vicina corpora ad consensum perducit. Nam & ad iugulum usq; porrigitur, & spirandi difficultatem creberrimè infert: atq; interdū tussim quoque, & dysenteriam excitat: nec rarò nothas costas infestat. Porro inter vehementer respirandū nonnunq; gravitatē in dextra præcordiorū parte sentimus. Ceterum si id citra febrem eveniat, aut obstructiōne, aut dura dispositione hepatis botore conicito. Nam vbi inflammatio infestat, tunc febrem adesse est necesse.

Dolor ab infesta hepate. Dolor membranae ambrosii ossa. Dolor arteria & vena.

Dolor vicerofus & pruriginosus.

Cutis superat omnes subiectas sibi partes spiritus dūte.

Dolor pruriginosus.

Sicut quod.

Dolor transiens quādo accidit.

Dolor hepatitis vicina corpora ad consensum adducit.

Hepatis infesta materia necesse fuit adesse febrem.

Pulmonis infesta materia symptomata.

CAPUT III.

Igitur ad inventiendas affectus sedes, in primis quætere oportet, an singulorum locorum, quomodo quoque afficiantur, propria signa inventiri possint: an pro affectu ratione alterentur. Deinde, verum singulorum affectuum propria sint signa: an circa quamlibet partem varientur. Postea verò expedit, loca simul & affectus memores, signa ipsa perstringere. Veluti si ita acciderit, ut pulmo inflammatione labore, tanta spirandi difficultas orietur, tātq; angustia, ut suffocatio laborantes videatur, ac rectè sedere cōtendit: quæ affectus.

Hh ij

Orthopnea.

Etum vocat orthopneam. Quinetiam calidam sentiant & expirationē, idq; maxime si erysipelatis particeps ipsa inflammatio fuerit: quamobrem vbi plurimū efflant, iussuunt, respirareq; abundanter frigidum aerem desiderant. Sputū verō ipsum modo hoc, modo alio expunt colore nātum. Insuper grauitatis cuiusdā thoracis incumbens sensum ingentem agri percipiunt, ac dolorem ex imo ad ipsum pervenire, & ad pedes, & ad spinam. Præterea febris acuta ipsa sibi est. Pulsum verō habent, qualem in libro de Pulsibus diximus. Similiter vbi membrana coctata succingens est inflammata, acuta febris iussit, similisq; dolor punctorius, vna cum spirandi difficultate. Magna etiam ex parte sputi colore infectū apparet, haud secus q; in peripneumonia. Igitur utrunq; affectū, respirandi difficultatem necessarii cōsequuntur, eō quod affecta pectus spirandi instrumentū exurit. Oritur autē febris, & propter affectū ipsum (calidus enim affectus est inflammatio) & propter positi. Nam & pulmo, & succingens coctata membrana, prope cor consistunt. Sic enim tussis ipsa vt spiritalibus conuenit. Sed quod aliquid expuat, id ab affectu accedit. Quippe iam ostendimus, omnē inflammationem ex stilante sanguine fieri. Quapropter si biliosus sanguis fuerit, sputum aut pallidū erit sputum: si pituitosus, spumans & cauidū. Si melancholicus, aut nigrum aut luidum. Si nihil horum iusserit sanguis, rubrū. Quamēnī in laterali morbo sæpenumero magis biliosus: in peripneumonia verō magis pituitosus sequi sputum consuevit. Quod autem inflammatarū thoracis partū excrementa, per asperam expurgentem arteriam, in haud certē est, tum posinus earū, tum formatio, vt quæ per solam hanc viam effluum sortiuntur. At verō ventriculus duos habet meatus: & quod in eo vinosum est, supemare solet, vomitionēq; eicitur: quod autē in intestinis subdēt, deiectione vacuatur: vel vni rene vni

Hæmorrhoides quæ ad hanc importata.

Inflammatio omnis ex affluente si sanguine. Sicut peripneumonia sputum ducit.

Thoracis partem inflammatarū in asperam per spirantem arteriam.

Cerebri excrementa per quæ respirantem arteriam. Sicut effluunt vnde sanguis perit.

dices esse pleuritici. Quod si ratiōdo nihil omnino expuat, fieri potest vt nihilominus pleuriticus sit ille quidem, sed inflammationē habeat in coctam adeo & impactā, vt nihil ab ea foras eici possit. Fieri quoq; potest, vt ob hepatis inflammationē dolor in tam dicta sede excutitur. Ceterū ex differentia pulsus, ex deiectionibus, ex rumore præter naturā, ex grauitate & pondere, ac deniq; ex aliis notis, quæ hepatis inflammationē sæpe solent accidere, iocundū affectū à pleuritico licet nobis discernere. Verū in huiusmodi dispositionibus, solum firmius discernendi indicium, per omne tempus morbi, à pulsu sumendum est: deinde tractu temporis, reliqua erit consideranda. Nam & lingvæ, & vniuersi corporis color alteratur, vbi hepatis vinum est. Sic vt rursus thoracis affectū, in cretū tussis, atq; sputa cernuntur. Distinguendi tamen sunt interm affectus qui primarij dicuntur, ab his qui per cōsensum attingunt. Nā si in pleuritide vel peripneumonia delinunt aliquid incidat, existimandum est principem autem sedem, in qua & scientia, & opinio, & cogitatio consistit, consensit thoracis, atq; ob eam necessitudinem stricti: in aliis autem affectibus, vt in lethargo & phrenitide, mentis continere, sed laborare affectu primarij vndiq; verō affici, vbi propriarij ipsius functionis aliqua oblecta fuerit. Proprijs enim functionibus dico, quæ à nulla alia parte vt instrumentum sunt. Nam reuera & videre animam, & audire, haudquaquā negandum est: sed videre oculis, & audire auribus. Atq; vt cogitare reminiscatur, existimet, eligat, ueq; oculis, nec lingua, nec alia quapiam parte vntur. Verū quod à dux sensus & voluntarij motus sedem habeat in cerebro: quodq; cerebrum cōregatur meningibus, alijs à nobis est declaratū. Si igitur per solum consensum cerebro affecto, illa pars qui primarij affectu laborat, curata fuerit, proutq; cerebro propria aliqua dispositio veniat, nullū in ipso accidens relinquetur. Quod si ex cōsensu permanens aliqua in ipso dispositio remaneat, nō solum parit primarij affectu, sed capiti quoq; remedia adhibenda sunt. Quapropter exacte definire, vtrū cerebrū, in membranis ipsius primitus afficiatur, haud magnam vtilitatem asserere potest, cum in vtriq; dispositione capiti succurratur eadem medendi ratio. Præcipue verō danda opera est, vt morbi effectus deprehendamus: qua cognita, facile nobis licebit per contrariā curationem moliri. Ita q; non tantū affectum locum, sed causam etiam iusserit noxam, cōsiderare oportet. vt, exempli grāia, delirium est eius actionis symptoma, quæ à loco mentis compote prodit: similiter sopor stupor: sed à contrariis causis videntur. Siquidem & vigilijs, & delirium, causa potest esse calida efficit. At quorūq; somnolentia soporosis affectus existunt, omnes à frigida causa proveniunt: id quod ex medicamentorū natura planē discernere licet. Quippe frigida stuporem soporemq; calida verō vigilijs & vanae motiones inducunt. Tenuis enim victus ratio, & vinum meracius, vigilijs parient, præcipue si vinum ipsum fuerit insuapte natura calidū, aut etiā antiquius valde. Etenim calida causa motum ex

Iocundum esse. Quia à pleuritico ex quodam de fieri.

Hepate affecto alteratur totum corpus color. Affectus primarij aut ab ipso per cōsensum attinguntur. Anima principis sedes quādo per se. Quādo per cōsensum attingitur. Proprie functiones cerebrū quā ducuntur.

Origines motus & sensus consistunt in cerebro. Affectus per cōsensum attingitur.

Cerebri & eius membranas affectibus eade sunt motus de ratione. Effluunt morbi in primis ex cōsensu. Causa per contrariā medenda est. Delirium & vigilia à calida causa calida oriuntur. Soporosis affectus astringit à causa frigida.

Vinum meracius inducit vigilijs.

citat

*Calida cur vi-
giliae efficiant.
frigida cur vi-
giliae soporem.*

citatur, ob idque vigiliae affertur frigus autem ociosum,
& ad motiones pigrum reddit animal: quia ratio
ne somnum soporemque conciliat. Igitur qui haec
intelligit, cum per ardentium febrium vigorem,
hominem viderit & vigilare & delirare, deinde
inclinate iam febrem, & dormire & recte sapere,
in capite nullam propriam esse dispositionem, sed
si febris abundanti calore delirium fieri, perpendit.
Quippe tunc affectus proprius putandus
est, cum permanere in parte quamvis conspicitur.
At ubi pars aliqua simul cum alia sic afficitur,
ut irascitur quidem una, altera infestetur vehemē-
tius: remissa vero irritatio, quiescat, eam
per consensum affici putandum est. Sic etiam con-
tingit, ut cum febrim accessiones invadere inci-
piunt, sopore laborantes granentur: quod eo
tempore cerebrum sit vehementer refrigeratum,
alioqui paratissimum, ut noxam eiusmodi lubet,
cum nimirum frigidiori intemperie sit praeditum.
Gignitur autem sopor, vel ab intemperie frigida,
vel a pituita in cerebro exasperante.

GALENI PERGAMENI de loci affectu, lib. III.

*Remediorum in-
venio quae ex
vita demonstratio-
ne paratur,
in his quae rari
examinantur, len-
gi experientia
probat.*

Igitur ad cognoscendam affectuum sedem, curan-
dorum illarum affectuum, accurata inquisitione
est opus. Ceterum per artia exercitationem
comperi, eam remediolorum inventionem, quae ex
vera demonstratione oritur, in his quae raro con-
tingunt, experientia longe praestare. Nam experi-
menta duntaxat sectantes medici, non ea quae
raro, sed quae crebro accidunt, memoria & imi-
tatione assequuntur. Quocirca dispositionum raro
eveniuntium, non solum curacionem, sed prae-
ventionem etiam notiones ipsarum, negligunt.
Ego vero semper investigare studui, quoniam sedes
vel afficeretur ipsa, vel alteri consentiret.
Cumque eam inveniam esse arbitrarer, tunc ad di-
spostionem eius investigandam, atque ex verisq;
tonicis curandi genera inquisitionem fumendam,
atque denique remediolorum qualitatem, quantitatem,
idoneamque materiam comparandam, me accinxi:
haud neglecta interim, aetatis, naturae, tem-
poris, regionis, aliorumque id genus omnium con-
templatione. Deprehendi autem possunt affec-
tus sedes ab excrementis, necnon a functionum no-
xia: quibus connumeratur & color praeter natu-
ram, figurarum. Verum ubi nulla mihi pateret alia
via, sola functionum lesio fuit satis, ad inventionem
affectuum particularium.

CAPUT II.

*Memoriam quo-
modo resistam
noxa, quae sunt
solvenda.*

Cum autem exoleram cuiusdam memoriam
resistere conarer, primum quidem apud meli-
simam investigavi, quoniam pars affectu, cal-
localia adhibere praedia, prius videlicet vul-
neris corpora vacuacione praemisit, quod prae-
ceptum est in morbis omnibus observandum. De-
inde, quae via & ratione invenirem singula reme-
diorum. Ceterum affectum sedem eam ipsam exi-
stimavi, quia princeps animi vis continetur. Medi-
camenta autem ea adhibenda esse, quae luma sed-
is dispositioni relictarentur. Cum igitur huius
inquisitionis gratia consulissem epistolam quan-
dam ad Marsum, ab Archigene scriptam, in qua

luber, depravata memoria, ratio capiti affigi cu-
cubitalis, non iniuria sane inconstantia hominis
sum demiratus: quod nimirum neglecto corde
(cui memoria ipse, seu opus cognatum tribuit) ad
caput remedia transferret. Nam quid per immor-
tales deos ex affectibus locorum notitia (quae ipse
ad medendi rationem ait maxime necessariam exi-
stere) consequemur utilitatem, nisi ab ipsa ad re-
mediorum inventionem ducamur? Ad haec, si affectio
quae oblat dicitur memoriam, existat frigida & sicca,
nullum usum adferret cucubitalis admotus, siue ex
incisa prius cute, siue integra, administrantur. Si
quidem detractio sanguinis, quae fit, ubi scarifi-
cata prius cutis fuerit, ad extremum ducit pericu-
lum. At circa vili scarificationem cucubitalis ad-
hibere, solus excitandi caloris gratia utilis esse
centenarius: quippe attrahunt ad se humorē ex
imo, id quod magnopere aride dispositioni ad-
versatur. Porro rationalem animae vim in cere-
bro videntem, irascibilemque, in corde: appetitoriam
denique in iecore sitam esse, nemini non perusum
existimo: id quod vel ex vulgari sermone indices
discere licet. Fatuū siquidem ajunt carere cerebro:
timido & pusillanimiti, cor deesse. Tityo vero iecur
ab aquila erosum, non solum potest, verum etiam
pictores, sculptoresque fingant. At vero, quoniam
admodum si ratio laedatur, saepe numero contin-
get laedi memoriam: sic si memoria vitietur, ratio
ipsa quodammodo enī labefactatur, utpote actio-
nis virtutis noxa procedente eadem dispositio-
ne: quae vbi vehementius intenditur, simul cum
memoria ratio quoque omnino perditur. At ra-
tio quidem affectio stultitia vocatur. Sic in lethar-
go enī, in omnibusque soporosis affectibus, vitae
quae simul pereunt actiones. Quod autem affectus
hi a frigida intemperie oriuntur, quae animalia a-
ctiones omnino torpidas reddit, sane id vel ex
animalibus ipsis, quae per frigora latere cogitur, sa-
tis liquido constat: necnon ex frigiditatis medi-
camentis, tum cibis. Lactuca quippe graues indu-
cit somnos, si multam quia ipsa suavitatem in-
gesserit. Verum & capitis gravitates, quae sine mor-
daci insectant dolore, somnū soporemque concil-
liant: quibus apophlegmatismi magnifici opita-
lari videntur. Igitur ut capitis ardor vigilas, & re-
frigeratio inducit soporem. Item biliosi calidique
morbi, vigilas, deliria, phrenitides: contra pitui-
tosi frigidique, ignavia soporemque efficiunt. Nam
quod ad vigilas soporemque per morbum perti-
net, calida frigidisque intemperies primum sibi facu-
latem videntur: altera vero ab hac, ad humiditatem
arditatemque refert. Balneis siquidem, et quod ma-
deficiant caput, soporiferum sunt. Haud secus vi-
ni moderata potio, omnemque cibi humectantes.
Ex arctibus etiam, pueritia quidem ob humorē
est somnolenta. Senes vero ob ariditatem, vigilas
vexantur. Omnia igitur haec argumenta esse pos-
sunt, ad animi ignaviam inducendam, humidita-
tem praeter naturam obnoere secundae partes, fri-
giditatem vero priores. Ceterum ut humiditas sol-
vi, si abvnde, longior profundiorque somnus in-
ducitur: ita ariditas sola, vigilas. Quod si frigus cum
humore intendatur vehementer, soporē stupore-
mque constituit: sine hoc vero memoriae nocet,
stultitiamque inducit. Cum itaque non solum in

*Archigenis in
constantia demo-
stratur Galenus.*

*Memoria obla-
ta & sanse pro-
dum & frigida, cu-
cubitalis admo-
tus non efficit
ex 410.
Cucubitalis si-
ne scarificatione
adhibita, sa-
lus curandi
caloris gratia
sunt utiles,
Anima facultas
ita singula quae
sedes invenien-
tur.*

*Tityo erosum ie-
cur ab aquila
singulis par-
tibus laeda,
sape memoria
laedi contingit
vbi curvosa.*

Stultitia quid.

*Frigida intem-
peries, animalis
actiones omni-
no reddit torpi-
das.
Lactuca soporem
ignat.
Apophlegmatismi
quibus affe-
ctibus cōferat.
Vigilias quae
morbo infertur.*

*Balnea ex vi-
poriferis.
Vinum humidum
soporem indu-
cit immensum.
Pueri cur som-
nolenti.
Senes cur vigi-
les.*

*Stultitia unde
oritur.*

frigidaque humiditateque, verumetiam in ariditate & calore, non parum secundum magis & minus, discrimen sit: nihil mirum, si multarum inveniantur cause que animales actiones ledere possint. Impresensurum autem, clamoris doctrinæ gratia, rationales animæ actiones, principales: irrationalis verò, morales vocentur. Cum autem bifariam fieri cōtingat intemperies prædictas, duplex quoque erit vniuersæ dispositionis modus: vñus quidem, in humidis siccisque humoribus: alter in corporibus solidis, si quando in eandem intemperiem cum mollibus, solidæ partes inciderint. Præterea quævis ipsæ intemperies inter se sint contrariæ, si tamen ex ipsis interdum mixtum quoddam temperamentum: vñ in vigilanti sopore, in quo pituitosus biliosusque humor experit. Ita in calidi frigidiq; cōtrarietate, eosdem quoque modos in venire licebit, tum per simplices intemperias, tum per cōpositas ex ambabus. Quod si in solidis corporis partibus mixta ex cōtrariis dispositione si fiat, tamen, tres sic prodibunt in vtraque cōtrarietate intemperies. Igitur huiusmodi affectus omnes capiti ad venire solent, sed inter se differunt, nō solum missionis varietate, aut eo quod magis minusve intenduntur, verumetiam quia interdum afficiuntur ventriculi cerebri id genus intemperantius, interdum vniuersa eius visa, aut humiditas dispersa per corpus cerebri. Accedit ad hæc quartus quoque modus, cum videlicet ipsummet corpus cerebri intemperatū redditur.

CAPVT III.

Quorum igitur vel memoria, vel intellectus perit (intellectus enim amissio, stultitia est) formos observare oportet. Præterea, vtrum excernant quippiam, vel ex naribus, vel ab ore, quod à capite debeat: an arida huiusmodi partes sint. Quippe ex his dispositione ipsam consequi cōiectura poterimus. Vbi igitur vel perit, vel grauitate laesa est memoria, frigida est omnino intemperies cerebri: quocirca calcassere ipsum oportet. At verò exiccare, vel humectare, nō necessarium est: sed si humidatū conplectur, arefacere: si ariditū, madefacere. Ceterum si inter has medicum obtingit, ipsum est cōseruandū. Interdum verò ubi principales actiones sunt laesæ, febres quoque accedunt: vt in phrenitide & lethargo. Interdum sine febre adest vitium: vt in mania, & melancholia: id quod modò per cōsensum, modò primaria affectione cerebro laborante, accidit. Et enim ubi propriis accidentibus exprimitur huiusmodi vitia: permanentiq; sunt, nec aliis præcedentibus superveniunt, primogenia dicitur esse. Vbi verò propriis accidentibus minime limitantur, nec perpetuo permanent, atq; ad alias affectiones sequuntur, per cōsensum ipsa evenire dicimus. Nec enim latere nos debet, ubi quis lege cōsistit afficitur, siatq; ad aliam affectionem, quod deletis efficiētiis eam causis, ipsa quoque simul deletur. Sin autē cōsensientes partes permanent iam habet dispositionem, quævis causa efficiens cōquiescat, ipsa tamen permanebit affectio. Quod autē in cerebro cōsistunt omnes principales animæ vitia affectus, pro confesso habet omnes medici, qui studio veritatis tenentur: sicut & quod omnes nervi qui voluntatis imperio au-

diunt, à cerebro ducant originē. Cōvulsio siquidem vniuerso corpore, omnes profecto autumant, talem quamvis affici partē, que vt in arbore caudex ramorū, sic ipsa sit cōmunis omnium nervorū origo. Si igitur partes omnes que infra faciē sunt laesæ, convulsæ sint, primas ipsalis medullæ partes affectas esse putandū est, ac proinde illis opitulandū. Si verò simul cum vniuerso corpore itaq; quoque cōvulsæ videatur, nō modò ipsalis medullæ exortum, sed etiam cerebrū ipsum, à quo nervi faciei oriuntur, curamus. At vero si crux tantū, aut altera manus cōvulsione tentetur, totius membri convulsio nervorū, qui ad ipsum feruntur, principium affectū esse declarat. Ceterū cum omnis motus à voluntate profectus, attractusque musculus in eas quibus innascitur partes, si fieri videat: nec fieri possit attractio, nisi ad suam originē retrahatur musculus, cōstat cōvulsione in cōvulsis partibus factam, hæc sola ratione à motu naturali differre, quod præ voluntate sit. Porro ipsam cōvulsione nervorū, ob plenitudinē vel inanitionē fieri, quævisimè profectus est nobis Hippocrates: id quod vel ex fiduculis instrumētorum (quæ ob vtriusque intemperiem ambiens aeris, humidam nempe & aridā, adeo tenduntur vt dirumpantur) liquido cōstat. Si igitur convulsio fiat vel à labore, vel vigiliis, vel fame, vel solitudine, vel arida æstuatione brevis, qualē est videre in phrenicis, causam eius ariditatem, inanitionēque, recte putavimus. Sin vero æquale totum corpore, ac omnino pleno homini convulsio accidat, nō ab re ipsam à contraria causa iudicabis ortum habuisse. Atqui inanitioni contraria est repletio. In comitialis morbus convulsio est omniū corporis partium, minime quidem perpetua (vt in emprosthotono, opisthotono & tetano) sed que ex temporū accidit intervallis. Nec solum hæc re, sed mentis quoque & memorie, ascensum oblatione, à iam dictis convulsione generibus differt. Vnde constat in cerebro hunc affectum consistere. Ceterū velox eius discussio, crassum humorem spiritus meatū in cerebri ventriculis obstruente, hunc maxime affectum peperisse declarat: nervorū principio seipsum quanctē, quod excutiat id quod infestat. Itaq; non ab ariditate, inanitione, sed à crasso & viscido humore, impediēte animalem spiritum, quo minus deferatur in corpus, hanc affectionē pignari, argumentum est, quod subito & fiat, & solvatur. Siquidem brevi tempore fieri nō potest, vt vel cerebrum, vel tenuior ipsius membrana, ad tantam ariditatem perveniat, vt conio simile quippiam patiatur. In corpore itaq; cerebri, anima suam sedem sortitur: in quo etiam sit tum ipsa rationinatio, tum recordatio sensibiliū imaginum. Primū autem instrumētū ipsius animæ, tum in sensibilibus actionibus vniuersis, tum in iis quæ à consilio & voluntate proficiuntur, spiritus est animalis, qui in cerebri ventriculis continetur, sed præcipue in postremo: quævis nō contentendus sit medius ventriculus, quæ amplecti multis rationibus cogimur, vt duos anteriores deferere. Satis tamen fuerit ad curationem, nosse sedem affectam esse ipsū cerebrū: atq; in eius ventriculis humore crasso & viscido cō-

Nervus omnis à cerebro ducit originem.

Convulsio quoque differt à motu naturali.

Convulsio fit ob plenitudinē vel inanitionē.

Epilepsia est vitium vniuersi corporis, quæ ex temporum accidet intervallis.

Epilepsia consistit in cerebro. Epilepsia videtur à febre.

Animæ collata cum corpore, in quo ex ratione collata sit, memoria.

Animæ primū organū est animalis spiritus, qui in cerebri ventriculis continetur, sed præcipue in postremo.

Affectiones principales, affectiones morales.

Vigilanti sopore.

Caput quadroplicem afficit.

Multitudo est intellectus amissio.

Memoria cerebri, vel grauitate laesa, vel cōsensum inter perit frigida cerebri, quæ à cōsensu est.

Affectus primogenus sine primario, qui sunt, affectus per cōsensum, qui ducuntur.

Animæ principalis facultas, tum affectus, si sit in cerebro.

aquilibrium carnes, ut thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis, atque cetaceorum omnium. Ex oleribus autem, brassica ferè sola, gignere sanguinè id genus cõfuevit: quemadmodum & arborum germina, ubi vel muria, vel oxyhalme conduntur, præcipuè lentis, terebintili, rubi, canarubi. Leguminum verò omnium maximè lentes inter melancholicos cibos annumerantur: mox fursuraceus panis, & qui ex typha & vitatis feminibus factus est. Præterea vina crassa, nigraque, aptissima sunt, ut ex ipsis humor melancholicus fiat. Veras etiam caleas, si supercalfactus in ipso corpore fuerit, faciliè huiusmodi humorè procreat. Sunt etiam nonnulli, qui per febriles morbos contraxerunt melancholicum succum. Ad efficaciorè autem notitiam, non parùm conferat anni tempus, ac præterita præsensque ipsius cõstitutio: nec non regio, & laborantis ætas. His itaque omnibus præmeditans, si exultans in vniuersi corporis venis contineri sanguinem melancholicum, quò certiorè habeas notitiam, cubiti venam seca, præcipuèque mediam, quæ cõmunis est, & ei quæ humeralis dicitur, & ei quæ per axillam ad manum fertur. Quod si tum fluens sanguis nõ videatur melancholicus esse, supprimatur cõsuetim. Si verò talis appareat, vacua quantum pro laborantis corporis habitu satis esse coniecieris. Est præterea tertium melancholicus genus, morbi comitialis exemplo, ubi ortum à ventriculo suscipit: solentque medicorum nonnulli hanc dispositionem, hypochondriaci, flatulentiusque morbum vocare. Quem sanè (ut Diocles testatur) sumptu cibo concoctu diffidili, statum rusticus acidus comitatur: cum eorum flatus & ætus. Ad hæc fluctuatio in præcordiis, non illic, sed ubi cibos venter complexus fuerit. Interdum etiam ventriculi vehementes dolores, qui nonnulli ad dorsum usque extenduntur. Cæterum ægri cibis concoctis quiescunt: moxque alius ingessit, eadè reuertuntur symptomata, quæ interdum ieiunos, interdum etiam à cena affligunt, ita ut ægri vomant cibos crudos, & pituitam subgaram, calidamque. & adeo nonnunquam acidam, ut dentes torpere videantur. Atque horum plurima statim ab ineunte ætate eveniunt. Vtqueque tamen acciderint, omnibus prorelantur. Cuius morbi causam, calor è immoderate venarum mifericardiarum, obstructionemque earundem, à crasso sanguine ortam, idem Diocles assignat. Videtur autem in ipso ventriculo per huiusmodi affectus, inflammatio quædam consistere: sanguis autem in parte inflammata contentus, & crassior esse, & atra bili similior. Quo quidem exhalante ad cerebrum, melancholica eveniant circa mentis symptomata. Frequentissimè etiam videmus, fluxum in ventriculo bile contentam, caput dolore affici illa verò electa per vomitum, illud dolore compressi. Atque inter optimos medicos convenit, nõ solum huc accidentia, verum etiam epilepsiam, aliquando capiti à ventriculo oriri. Cæterum melancholicos ut nunquam desinit timor: ita eorum phanescimata præter naturam, non semper eodem genere cõtinentur. Siquidè alius se testam factum putavit: atque ideo obviantibus cedebat, ne collideretur. Alius, ne Atlas, qui mundum sustinere dicit, grauius sub tanto onere,

illum à sese excuteret, atque ipse cõminueretur cum eo, pertimescebat. Differunt porro inter se melancholici: nam omnes timent, moerent, vitæ damnant, odio habent homines, sed nõ omnes mori cupiunt. Quippe hoc ipsum nonnulli melancholicæ caput exiit, quod pertimescunt mortem. Sunt qui simul & mortem metuunt, & mortem sibi cõsanciant. Quemadmodum igitur æternæ tenebræ pavorem inducunt, sic atra bilis color, mentis sedem tenebris similem reddens, timorè efficit. Siquidem tum humores, tum ipsa temporales corporis, possunt animæ actiones mutare, id quod à nobis est demonstratū in eo libro cum titulus est, Quod mores animæ corporis temperiem sequantur. Ergo si circa ventriculū prima inceperit ipsius morbi symptomata: quibus, auctis melancholica sequat affectio: deinde alui deiectione, vomitu, probæ ejectione, rubicundisq; lmeturis qui laborat, hypochondriaci flatuosumque ipsum morbum vocabimus. Accidentia verò ipsius dicemus & mortuam, & metū. Vbi verò propria melancholicæ accidentia esse auctiora videntur: circa ventriculum autem aut nulla, aut perexigua cernant: haud ab re existimaveris, præmitiam in cerebro affectionem consistere, ob atram in ipso bilem congestam. Quem morbum minime inveteratū, frequentibus balneis, victuque humido & boni succi, nullo alio præsidio adhibito, ipse alius curavi. Nam ubi diuturnus ipse morbus est factus, fortiori remedia postulat.

CAPYT V.

Morbus comitialis, similiter ut melancholia, tribus claudunt differentiis. Verum omnibus cõmune est, quod afficitur cerebrum, siue primaria affectione, siue cõformi lege. Prima igitur differentia existit, ubi affectus in ipso consistit cerebro: id quod pluribus epilepticis accidit. Secunda, ubi ab ore ventriculi per cõsensum dispositio ascendit ad cerebrum, quemadmodum per suffusiones contingit. Tertia denique fit raro, cum à parte alia quavis ipse affectus incipiens, inde, seniente ægro, ad cerebrum usque perperat. Quale genus morbi ipse adhuc adolescentem primum vidi in puero tertiumdecimum ætatis annum agente: qui sanè narrabat, dispositionem ipsam à crure initium capere: mox illuc restè ascendere per femur & eminentes ei lumbos, ac per latus id, ad cervicem, donec perveniret ad caput: quod cum primum tangeret, ipsum haudquaquam sibi cõstare. Interrogantibus autem medicis, quale esset quod ferebatur ad caput, nihil habuit quod responderet puer. Alius tamen compos mentis dicebat, veluti frigidam quandam autem existere. Vnde ex duobus alterū Pelopius præceptorī placuit: aut quod qualitas quædam, alteratū per continuationem partibus, aut spiritalis substantia transmitteretur. Nec mirandū esse dicebat, tam validam vim esse humori, in ætica particula præternaturæ genito, ut cum perniciosis ferarum venenis componi posset. Etenim ubi phalangiam momordit aliquem, quæ parvū exurit animal, existimare tamen debemus, venenū ex ipsius ore, primò quidem in superficem, dein verò in totū corpus deferri. Præterea maris turturis, sicuti & terreni scorpionis aculeus,

Melancholicus non quam desinit timor.

Atra bilis cur timorem concitat.

Hypochondriaci morbus quo ducimus.

Melancholicus morbus qui a ventriculo incipit.

Epilepsia tres differentia.

Cura huius epilepsie habet singula, vers. 11.

Pelopius Galeni præceptor.

Phalangis morbus.

Turturis morbus aculeus.

Veni medium in cubito periti didici in esse, qui sanguine melancholicus abundat per vniuersum corpus habet.

Hypochondriaci morbus, qui a ventriculo incipit, signa.

Hypochondriaci morbus, qui a ventriculo incipit, signa.

Hypochondriaci morbus, qui a ventriculo incipit, signa.

*Scorpius acci-
lens.*

aculeus, huius in extremam illam acutissimamque partem finiatur, ubi nullum foramen est, per quod venenum deici possit: necessum tamen est, ut excoquemus substantiam quandam inesse illi, aut spiritalem, aut fluidam, quæ vt mole minima, ita facillate est maxima. Siquid cum nuper fuisset quidam iectus à scorpione, videor mihi esse (inquit) percussus grandine: erant omnino frigidus, frigidus fudore perfusus. Quippe ubi ex ista parte per totam ipsam celeriter distributa fuerit veneni vis, coningit eam, eodem rursus contractu, in singulas subiectarum ei partium recipi: mox ex illis continuas, donec in aliquam pervenerit principem: quo tempore, mortis periculum inquit. Ad hanc rem in primis conferunt vincula paribus supereminecta, abscisioque partium venenatarum. Notui equidem rusticum, qui epoto est viperis medicamento, rescisso prius digito, evasit: sicuti et alii quenda, qui sola sectione, citra medicamentum est liberatus. Sed epilepticum illud pueri medici quoque sanarunt, primo quidem uniuersum eius corpus purgantes, dein medicamentum ex thapsia & sinapi, parti primò affectæ adhibentes, ac supra illam medum membrum ligantes. Quod verò ad causam pertinet, ob quam in huiusmodi per consensum affectibus, epileptice convulsiones fiant: probabile sane mihi videtur, quædammodum frequentissime singulorum fieri videmus affectum stomacho, ita hanc oriri dispositionem. Etenim cum ventriculus ciborum mole

*illa à venen-
tu bestia parti-
cula quando
fuit curanda.*

*Epileptica tu-
mescens quod-
dam fiam in
affectibus per
convulsam.*

*Singulum quod-
dam curatur.*

*Convulsiva epi-
leptica causa.*

*Lethargus.
Apoplexia cau-
sa.*

*Apoplexia orta
pante, per totam
magnitudinem ac
magnitudinem res-
pationis calig-
debet.*

*Nervi oriuntur
à cerebro, ma-
gistrum princi-
piu motus lar-
giantur.*

*Soporosis affe-
ctus omnia con-
fiteri in cere-
bro.*

Affectus vertiginosus siue primario, siue lege confortij accidat (quod solet ob consensum ventriculi) ad cerebrum ipsum pertinet. Quo detenti, vel à minima occasione hebetitur, adeo vt interdum cadant, si vel ipsi vnicò duntaxat circui-ri in gyrum agatur, aut quippiam aliud circui-rotari viderint. Est autem rationi consonum, huiusmodi affectionem fieri, elato per magnas illas arterias, quæ plexum teniforme consueunt, vapido calidique spiritu, atque cerebrum ipsum replente. Fieri enim potest, vt inæqualis intemperies cerebri, huiusmodi spiritum gignat.

*Vertigo ad ore
breui partem.*

*Vertiginis cau-
sa.*

CAPVT VII.

Cephalæa (qui affectus ad cerebrum etiam pertinet) est capitis dolor diurnus, difficiliterq; solubilis, qui à parua occasione vehementes possidet accessiones, ita vt qui eo torquetur, neq; strepitum, neq; vocem, neq; luminis splendorem, neq; motum perferre possit: sed tranquillitate, obscurissime cubiculum querat, idq; ob doloris vehementiam. Ad hæc, accessiones huiusmodi, veluti in comitiali morbo, intermissiones habet, inrecedendū tempus, quo perfecte liberari videtur ægri. Dissert autē à cephalalgia, quod in hac notivique adeo imbecillæ reddatur partes affectæ, vt in cephalæa, licet in utroque affectu caput minimò negotio afficiatur. Sunt et nonnulli, quibus caput aptissimum est vt impleatur: atq; uniuersi quoque corporis habitus ad ipsum implendū idoneus. Alii, omnes capitis partes aptas habent, vt afficiatur. Quibus, ubi vitiolo victu vtuntur, accidit vt cephalæa arripiantur. Quo minus mirandum est, si horum alius membrana cerebrum continentes, dolores afficiantur, alius pericranii duntaxat. At quibus intra caluariam est dispositio, iis ad oculorum vsq; radices, ipse dolor extenditur: quod nimirum à cerebro, & ab utraque membrana, necnon à vasis quæ in ipsis sunt, veluti germina quædam illuc deducuntur. Sed & corū quibus dimidia capitis pars dolore infestatur (vocalunt autē hî hemicranici) alij extra caluariam, alij in capitis intimis partibus dolore percipiunt. At verò dextram capitis partem à sinistra distinguunt sutura per longitudinem ipsius exportectæ. Sub qua, intra capitis ossa, linea mediæ cerebræ diuidens manifestè protenditur: ad quam etiam pervenit anteriorum duorum ventriculorum septum. Ea porro corpora suapte natura idonea sunt vt ipsius caput impleatur, in quibus vaporosus calidusq; spiritus gignitur: aut quibus biliosa excrementa cumulari in ore ventriculi. Atque spiritus, dolores tenuios pariunt: biliosa excrementa, dolore mordaci afficiunt. Dolores à plenitudine inducti, gravitatis sensum per se ferunt. Quod si rubor adsit & calor, calidos in causa esse humores est signum. Sunt quibus caput assidue dolet, ubi vel liberalius vinū in gesserint, vel meracius: idq; magis, si suapte natura calidū fuerit. Præterea calidi odores omnes, atq; in vniuersum odorata omnia, capiti dolorem conciliant. Nonnullos autē ob sensus exvperantiam dolor infestat: quædammodum in ore ventriculi accidit.

Cephalæa quid.

*Cephalalgia et
cephalæa distri-
buntur.*

*Caput intra
caluariam do-
letur, dolores
vsq; ad radices
oculorum exten-
duntur.*

*Hemicranici
qui dicuntur.*

*Caput quid. ip-
sianter facit.*

*Odorata omnia
conciliant
dolore capiti.*

CAPVT VIII.

At verò si aliquando per totum corpus, nervorum

actio vitiosa redditur, ipsoꝝ esse affectuꝝ principium constat: id quod ex sola dignoscitur potest anatomice. Cum igitur omnes pariter nervi, tum sentiendi, tum mouendi vim amiserint, affectus is apoplexia appellatur. Vbi vero alteri lateri, aut dextro aut sinistro id accidit, resolutio nominatur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus. Quod si in aliquo membrorum idem evenierit, eiusdem resolutio dicitur. Ceterum omnes animantis partes sub ceruice posite, quæ à consilio & voluntatis imperio moueri possunt, nervos habet qui eas moueant, procedentes ab spinali medulla. Porro nervi qui mouent thoracem, ab ea spinæ parte quæ in ceruice est, exoriuntur. Si itaque tota spina transversim dissecta fuerit, omnes quæ sub ipsa sunt corporis partes, sensu motuque priuantur: quod per eam nimirum facultas sentiendi & mouendi pro arbitrio, deferatur à cerebro. Quod si transversim ad mediū viꝝ secundū longitudinē ipsa spina incidatur, nō omnes suppositæ corporis partes, sed ex duntaxat quæ è regione sectionis sunt, resoluitur: dextra quidem, dextre spinæ parte dissecta: sinistra vero, sinistra. Videntur autē huiusmodi resolutionē aliquæ, faciem quoque infestare: sed rursus resolutum latus ad alteram faciem partem retrahitur. Cum igitur nervi qui in facie partes dispersi sunt, à cerebro oriuntur, sanè si earū aliqua simul cum toto corpore resoluta sit, scire oportet resolutionis dispositionem in cerebro ipso consistere. Vbi vero illæse permanserint, haud dubie spinæ initiū afficitur. Accidit vero nonnullis, ut facie partes solæ afficiantur, ut lingua, oculus, mandibula, & labrum. Quippe nō omnibus ab vno loco principium influit, cū ex diuersis cerebri partibus sunt nervos recipiant. Igitur apoplexia omnibus actionibus animalibus noxam inferens, cerebrū affectum esse manifeste declarat. Discernitur autem magnitudo affectionis, ex noxæ quam spirationi inferit, vehementia. Cum enim naturalem ordinē plurimum egreditur, magnam: cum vero paulū impedimenti est, parum in cerebro noxam esse, conuicere oportet. Sanè omnium pessima spiratio putanda est, quæ & intermittitur, & magna cum violentia trahitur. Siquidem ob id contingit mori apoplecticos, quod spirare non possint. At vero vbi pars aliqua cōvulsa est, nervus ei motioni deputatus, aut musculus, necessariū est affectus. Porro si autē dicitur resolutio nervuorum, vbi motus deperditus est. Vbi vero partium aliquarū sensus perit, eam partē sensus expertem esse: resolutam autē, nō vique adeo dicimus. Quamvis perinde est, ut quicquid eam nominare voluerit, modō sedem affectam, simulque illius dispositionem inueniat.

CAPVT IX.

Vbi olfaciendi vis lædatur, nō eorum meatuū qui in naribus sunt, sed vel anteriorum cerebri ventriculorū, cū aliqua intemperie laborant, est noxa: vel eorum meatuum, qui in ossibus colatorum consistunt, si aliquando obturentur. Siquidem odoratorū sensus, in anterioribus perficitur cerebri sinibus, clatis ad ipsos, per foramina colatorū ossis, vaporibus.

GALENI PERBAMENI
de locis affectis, lib. IIIL.

CAPVT L.

At vero oculorum interdum quidem sensus, interdum motus, ac nonnulli vtraque functione resoluit: idque nunc in altero, nunc in vtroque contingit oculo. Est cū solus palpebræ vel sensus, vel motus lædatur. Vbi igitur nullo malo apparente in oculo, perierit facultas ceruicendi, nervo in ipsum descendenti à cerebro, causam tribuenda est, nimirum vel inflammatio, vel induratio, vel quomodocūque alter ob humorum assilum læso, obstructione secundū propriū foramen. Quæ omnia accidere illi tanquam organici parti, necessarium est. Nam tanquam pars simularum, oculo intemperiebus vexatur. Præter has causas exolutio colorum sensus, est alia, vbi nihil omnino, vel exiguum admodum visibilis spiritus à principio (quod in cerebello consistere putandū est) ad eos descendit. Si vero vitævis oculorū, mori duntaxat amiserit, secundæ copulæ nervum, qui à cerebro oritur, molestrari est necesse, ab aliquo videlicet eorū affectuum, quos alteri nervo, qui à prima coniugatione oritur, & cui soli meatus conspicuus inest, nuper accidere diximus. Quia vero musculi oculum ipsum mouentes senario numero constant, ac præter eos alii quorū adiuncti, qui descendentes in ipsum amplectuntur optici porradicem, ut videlicet oculum retrahant & firmant: nec mollis ille nervus, in processu pervertatur aliqua ex parte: accidit sanè interea, hoc ipsi nervo nequaquam læso, musculorū aliquem, aut in propria essentia, aut in nervo ad ipsum descendente, contrahi ab aliquo distortū affectuum. Siquidem singulis eorū musculorū, pars quedam nervi à secunda coniugatione oriri, transmittitur. Cum itaque sex in veniantur mouentes oculū musculi, si is quidem qui ipsum ad superiora trahit afficiatur, totus oculus delapsus videbitur. Si vero is qui ipsum detrahere solet, affectus sit, oculus sursum tractus cernetur. Sic si vitietur minoris anguli musculus, ad maiorem: si vero latus sit, ad illum inclinatur oculus. At si voluenti musculorum quispiam sit resolutus, obliqua iotius oculi conuersio datur. Externim resolutis musculis circumstantibus mollem nervū, prociadet totus oculus, atque à sua sede movebitur. Porro cū oculi à sede sua derubantur, si ad alterutrum angulum pervertitur fiat, immocua permanebit ceterū vis. Si vero aut sursum, aut deorsum, aut in obliquum quocūque vertatur, qui cūque ipsis obieceris, id omne duplici esse videbitur. Ex musculis supremam mouentibus palpebræ (nam inferior immobilis est) si is qui sursum eam retrahit, resolutus sit, xaviam efficiet illam, adeo ut oculus aperiri non possit. Si vero qui eam detrahunt (gemini enim hi sunt) exoluantur, oculus claudis non poterit. Quorum si alter afficiatur duntaxat, ad oppositum musculum palpebra reflectetur. Hi sunt partū oculi peculiares affectus, qui latentibus locis insident. Ac sunt præterea alii, qui ex aliis partibus ei per consensum adveniunt, nempe aut oris ventriculū, aut cerebri coniugatione. Cuius generis sunt symptomata iussu forum

Vtrum quibus
modis oculi cū
tangant.

Oculorum mo-
tus unde per-
vertat.

Optici nervi
sua iussu cō-
stati mouent.
Oculi mouen-
tes musculi sunt
sex tribus.

Oculi quatuor
aliter per se
pervertit.

Oculi sunt
aut deorsum
pervertit obli-
qua videtur de-
plac.
Palpebra quo-
suppliciter per-
vertatur.

Oculorum affe-
ctus per consen-
sum sunt.

Apoplexia
quid.

Resolutio
quid.

Nervi mouen-
tes thoracem,
à solo spina ex-
oriuntur.
Spina læsionib.
quo pacto sub-
datur illi par-
tes læsiones re-
solvantur.

Apoplexia om-
nibus actio-
nibus animalibus no-
xam inferit.

Spiratio pes-
sima quæ sit.

Apoplectici
mori, quod pri-
marie resolu-
tione.

Resolutio præci-
pue dicitur, vbi
motus perit.

Odoratorū sen-
sus in anteriori-
bus perficitur ex
naribus sinibus.

forum visis similia. Ceterū visa ob humorum in ventriculo contentorum vitium oborta, vitio oculo similiter accidunt. Quæ verò per suffusiones apparent, nec incipiunt simul in vitio, nec similiter. Præterea, si tribus quatuorve mensibus suffusionis accidentia apparuerint, pupilla autē pura splendidāq; cernatur, ab ore ventriculi nasci affectum ne dubites. Si verò non ita multum temporis intercesserit, querendum est in primis, num ex quo incipit affectus, singulis diebus perpetuò hæc apparitio perseverarit. Nam asiduitas suffusionē portendit: intermissio autem, quod malum à ventriculo prodierit, suspicionē excitat: idq; magis, si perfectē quis conquirens, nullū sibi visum apparere fateatur: ac multo magis, si eū apparuerit tales imagines, mordicus in ore ventriculi doluit: maxime verò, si post hæc, vomendo eiecta re mordente, mitigata accidentia fuerint. Quinetiam si à ventriculo symptoma id exoritur, medicamine ex alto potui dato, minimo negotio curatur, accedente simul proba cōctione. Vbi verò altera pupilla tenebrosior, aut turbidior, aut nō exactē pura conspicitur, suffusionis esse iuuicū censendum est. Similia quoque suffusioni accedentia in quibusdā phrenitidis speciebus (affecto scilicet cerebro) suspensumore venire solent. Sunt etenim phrenitici quidā, qui de iis quæ oculis offeruntur, recte (quantū ad sensuum notitiam pertinet) iudicant: cogitando verò, à naturali iudicio aberrant. Alij rursus, cogitatione quidem falluntur minimè, sensibus tamen hallucinantur: id quod mihi olim coniugis videntur, cum ardenti febre laborans, & siccos vellerem, & in vestibus festu casti colligerem, idq; animo cōstans. Sunt præterea qui simul sensus & cogitationis vitio laborant. Porro vbi in cuiuspiā cerebro biliosus succus abundat, accedens febris ardens, ab illo oritur tunc fumus, veluti in lucernis ab oleo: qui, per vasa quæ ad oculum tendunt, delapsus, earū imaginem in ipsis esse causā censetur.

CAPVT II.

In lingua etiam, interdum motū ipsius, interdum sensum, interdum vitari quog; tactum contingit. Non tamē alio gustus, atq; alio tactus nervo utitur. Siquidem nervi à tertia coniugatione orti, qui in linguæ pelliculam disseminantur, nō solum tangendi, sed gustandi etiā vim obtinent. Cerebrius tamen læditur gustandi quā tangendi facultas, cum ad gustum exacto iudicio sit opus. Etenim tangendi sensorium, crassissimū: vt ceruena, tenuissimū est. Auditus verò sensoriū, vt in tenuitate à visu, ita sensoriū gustus in crassitudine, à tactu secundum locū obtinet. Olfactioni verò sensorium, in illorū quatuor medio consistit. Igitur cum posterior cerebri pars tam dextra quā sinistra afficitur, ne apoplexia hominem rapiat, timendum est. Vbi autem altera tantum, in paralyfim finiri solet: quæ interdum alteram solum linguæ partem motu destituit, illa solum ipsius gustu, tum tactu: interdū partes sub capite constitutas, modò hæc, modò illæ. Cum autē à parte anteriore cerebri facies suos nervos recipiat: à posteriore verò omnes partes quæ sub capite sunt: à qua etiam oritur septima coniuga-

tio nervorū, qui inserti in musculos linguæ, voluntarium illius motū perficiunt: non ab re quidem anteriore cerebri parte altera affecta, sola linguæ motio vitio carebit: reliquæ verò faciei partes omnes, in altera parte, dextra aut sinistra, sensu & voluntario motu destituentur. Quemadmodū si afficiat posterior pars cerebri, reliquarū partū faciei incolum simul & motu & sensu, solum linguæ motus vitiat. Quod si aliquādo tota anterior cerebri pars afficiat, supremū ipsius ventri ei cōsentire necesse est: atq; cogitandi quoq; actiones vitari. Proinde qui ita est affectus, nec sentit, neq; mouet: spirandi tamen facultas haud quā in illo læditur: vocatq; hic affectus caros, siue sopor. Qui si vehementer spirationē operari, apoplexia nominatur. At solutæ apoplexiæ creberrimè solet paralyfis succedere. Sopor verò finitio, magna ex parte bona valetudo subsequitur. Fit autem sopor, Hippocrate autore, affectus musculis tempore, atq; in acutis morbis. Inter soporē & apoplexiam, morbus comitialis est medius, convulsio ē vniuerso corpori inducens: sed in paralyfim non definit. Quorū trium morborū, frigidus, crassissq; ad omnino vitiosus humor est causā. Verū & in sopore, & in morbo comitiali, ventres magis, cerebri corpus minus: in apoplexia verò, corpus magis affici solet. Atq; in sopore anterior pars magis, in apoplexia & morbo comitiali vtraq; afficitur. In catalepsi & vigilanti sopore, posteriora cerebri magis læduntur. Quum autem osse aliquo terebra perforato, medius ventriculus fuerit attritus, sopor hominem occupat, sed neq; cōvulsione, nec difficilis spiratione oborta: hæc enim apoplexiæ, illa morbo comitiali est affinis: haud secus q; catalepsi, soporēq; seruata secundum naturam spiratio. Verū vt in sopore clauduntur palpebræ, ita in catalepsi manent apertæ. Iam verò vehementes dolores sopor sequi consuevit, cōcidentē videlicet robore animalis spiritus, quod primum anime instrumentum existit in ventriculis cerebri: indēq; fluens per nervos desert motum & sensum in vniuersa corporis parte. Igitur affectum linguæ, alij quidem illi cōmunes sunt, ob cōmmercium quod habet cum cerebro & nervulis: alij ipsius duntaxat proprij censentur. Quæ admodum ergo consortij lege, per septimā nervorū coniugationē motus ipsius vitari: sic sensus impediri potest per tertiā, quæ & mollis est, & in pelliculā illius, siue septima in musculos, disseminatur. Quod verò ad proprios illius affectus pertinet, siue musculorū eius, vt similariū, intemperantiæ motum impediunt, ita ambientis ipsam extrinsecus membranis intemperies, & tangendi & gustandi simul sensum vitiat. At instrumentalium affectionū species referunt in inflammationes, citrithi, ordemara, erysipelata, supurationes, & alia id generis de quibus, quia à visu & tactu discerni possunt, nihil in hisce cōmentis dicemus. Vt aurem de ipso auditu nō distulseramus sermone, si illa solum apparente auris foras mittit, sola audiendi facultas læditur, nervus propriū esse affectū, licet existimare. Vbi verò reliquæ faciei partes simul cum functione audiendi lædunt, in cerebro esse dispositionē præter na-

suffusionis que modo differant à vapore, ad oculum à ventriculo elatu.

Prima pira cum affectu conueniat.

Phrenitidis variis symptomata.

Lingua recipit ab ipsi nervi per tertia coniugatione, qui in illos descendunt, simul tactu & gustum.

Sensoria, qua quidvis sentit, sunt crassiores, aut tenuiora.

Facies nuda est nervi recipit.

Cari Sopor. Apoplexia sola solet paralyfim succedere.

Sopor si affectu musculi ita peruenit Epilepsia.

Cerebri corpus magis affici in Apoplexia, quā in morbo comitiali & sopore. In his autē non trahitur magis.

Catalepsi destituitur motu apertis palpebris. Sopor consuevit sequi valetudinem talem. Animalis spiritus est primum instrumentum anime.

Idque a propriis nervis quo fit.

Audiendi facultas nuda per se laesum accipit.

turam, est verisimile: ipso vel vt similari, vel vt in
strumentali parte affecto. Neminis aut velum,
temporū maxillariūq; musculus, item labris &
nariū pinnis, sensum & motū: lingua verō, om-
nibusq; oris partibus, sensum duntaxat, à tertia
cerebri coniugatione oriri: à secūda, oculorū mu-
sculis motū, vt à prima, oculis ipfis cernendi sen-
sum suppetitari. Vbi igitur vniuersæ particulæ,
quibus à tertia coniugatione inferitur nervi, obli-
que in altera tantū parte videtur, cōmunem nervū
primariū affectū esse putandū est. Si verō vtrūq;
simul partē lēdi cōtingit, nō nervi proprii, sed
loci cuiuspiā in cerebro, à quo nervi procedunt,
est ipse affectus censendus: ac tunc sanē omnes
vicinæ partes simul affici cōsueverūt: proinde &
quartæ & secundæ coniugationis nervi: vnde se-
quitur, vt oculorū quoq; partes lædūt. Quod si
vnus duntaxat vel musculus, vel nervus, quoquo
modo siue primariā affectione, siue per conten-
tum, affectus fuerit, pars ipsa in aduersum trahe-
tur musculus. Nam resolutū musculo qui dextrā
partem labii mouet, ipsa ad sinistrā flectitur. At
si quis qui sinistram mouet resoluitur, ipsa trahitur
ad dextram. Haud secus & toram mandibulā, &
nariū pinnas, & genas quæ à lato mouentur mu-
sculo, in aduersam partem flecti cōtingit. At la-
tus musculus nō recipit nervos à tertia coniuga-
tione: sed nervi à ceruicis vertebribus prodeunt,
in illā ferē totū disseminantur, ex una ipsius parte,
sublimioriq; excepta, in quā descendunt nervi à
quinta coniugatione. CAP. III.

Porro vbi afficiuntur priores vertebrae spinæ, li-
cet raro, evenire tamen interdum angina potest,
idq; in pueris magis q̃ in adultis, nimis ob ipsas
vertebras ad interiora laxatas: quemadmodum
Hippoc. ait, secundo de popularib. morbis. Cæ-
terum per huiusmodi anginas guttur nullo pro-
prio affectu laborat. Cum autē spinæ partes, quod
fuerint altiores, eō sint præstantiores: sanē quod
affectu fuerit inferior primis duabus vertebribus,
eō inferet motū minorē noxam. At nervi septi
transversi, sub quarta & quinta vertebra oriuntur.
Ab eo autē solo fit spiratio * lenis, accedente in-
ter costalū musculorū actione, vbi vehementior
est opus respiratione: quæ si vehementissima
requiritur, supremos etiam musculos cōcurrere
oportet. Porro vbi vnica duntaxat vertebra, aut
etiam dux, aut tres, sese consequentes invicem,
distrahuntur, ea parte spinā cauari cōtingit. Vbi ve-
rō inter distrahās vertebra, vel vna, vel plures,
illæse manserint, sic affectus gibbus accidere so-
let. At si in altera tantū partē, vel dextram, vel sin-
istram, distrahatur vertebra, ibidē in obliquū spi-
na torquebitur. Cæterū alia sequuntur symptoma-
ta, vbi proprio affectu laborat spinalis medulla:
& alia, vbi vna vel plures vertebrae afficiuntur luxan-
tur. Nam cum proprio affectu spina ipsa affigi-
tur, citra verberarū aliquā luxationē, si quidem
in altera duntaxat parte efficitur, omnium inferiorū
corporis partū, quæ è regione nocenti conti-
stunt, tam sensus q̃ motus læditur. Si verō vtrāq;
pars fit affecta, omnes particulæ tam in dextra,
quam in sinistra regione, ei quæ affecta est subie-
ctæ, similiter resoluuntur. At luxata vel ad gibbū,
vel ad concauū vertebra, fieri potest vt nulla o-

mnino partū inferiorū, vel in sentiendū, vel mo-
uendū functione, aliquid vitii percipiat. Per an-
gulosas tamen luxationes spinæ, subiectas om-
nes particulæ lædi est necesse. Paulatim verō fa-
cta luxatione, atq; in orbem magis, nihil notari
dignum patiuntur partes, quæ cōmotæ vertebrae
subiiciunt. Sed in obliquā luxatio, lēdi omnino
eas partes, ad quas nervi ex luxatis vertebribus
cedentes, perveniunt: idque magis in ceruice, in
thorace minus, sed multo minus in lumbis acci-
dere solet. Siquidem in ceruice, vertebrae inter se
cōnexæ, æqualiter vtrāq; foramini conferūt, vnde
nervus procedit in thoracē autē, superior ma-
gis, inferior minus: sed in lumbis, totus nervus
ex superna excidit vertebra. Quare in eis trans-
versæ vertebrae luxatio, vna secū trahens & me-
dullam, & nervū, illucum servat naturalem orbi-
i ipsius. In ceruice autē, ex loco medio inter duas
vertebras procedentes nervi, per obliquas luxa-
tiones, in ea quidem parte, ad quam spina dele-
scitur, opprimuntur in altera verō tenditur. Rur-
sus tensiones quidem, vbi ingens quoq; inflama
non accessit, cōvulsio comitat. Ad cōpressiones
verō earū partū, ad quas oppressus nervus de-
scendit, sequi resolutio. Igitur per eas quas nu-
per diximus verberarū luxationes, reliquæ faci-
ci partes omnes, neq; in sensū, neq; in motū no-
xam subeūt. Solæ autē genæ læduntur, vt quæ mo-
uentur à lato musculo. At vertebrae solent luxari,
aut ob casum, aut ætūm, aut tumore præter na-
turam, nervosa corpora vertebribus atq; medullæ
cognata extendentē. Vt autē impræsentiarū alia
quid de angina dicamus, Hippocrates affectus
omnes, qui cū inspiratione difficili, guttur aut fau-
ces infestant, quinque, hoc est, anginas appel-
lat. Ac sunt quædā anginæ genera quoq;. Primiū
est, vbi inflamantur fauces: hoc est, internus oris
locus, vbi & gulæ & gutturis partes extreme
cōiunt. Secundū est, vbi nec fauces, nec reliquæ
oris partes, nec etiā externarū partū vlla inflama-
ta videtur: laborantes tamen suffocationis peri-
culum in gutture sentit. Tertiū, vbi extrinsecus
circa fauces inflama non apparet. Quartū, vbi gut-
turi partes tam externæ q̃ internæ, similiter in-
flammatæ vidētur. Quintū deniq; cum ad ante-
riores partes, colla luxantur vertebrae: id quod fa-
cile cōtingit, vel solis musculis qui cum ipsis co-
municant, tumore præter naturā affectus: vnde
ibi tuberculo, vel gula pariter viciata, non nunq;
musculus quoq; qui gulam gutturi iungunt, pro-
priusque aliquando gutturi musculus, qui ipsum
aperiunt, oblectus. Hi igitur affectus omnes diffi-
cilem respirationē efficiunt, minime tamen in di-
scrimen suffocationis adducunt. At ægri & cum
ciculis deglutiūt, & dolēt, nam præcipue, cum eis
potus per nares refilit. Nullo autē spiritalium in-
strumentorū nec primario nec per cōsensum affec-
to, fieri minime potest vt spiratio lædatur. Quo-
circa ex sola spirandi specie, aliqd nōnihil & de affe-
ctæ sede, & de ipsa dispositione, conicere licet.

Quippe si videatur laborans, inter spirandū, to-
tum mouere thoracē, vt in parte quidē anterie-
re, ad iugulum in vtroq; latere, ad ceruicē: in par-
te posteriore ad scapulas vsq; motus ipsius alen-
dat: tres ex huiusmodi spiratione dispositio-
nes

Angulosa luxa-
tiones spinæ
sunt nociviores
in quæ ea orbi-
tis paulatim
fuerit,
Luxationes spinæ
oblique.

Luxatio verte-
brarū vnde pos-
sit accidere.

Angina gene-
ra quinq;.

Nervorum ser-
viti coniugatio
in quæ partes
distribuitur.

Resolutio ali-
cuius partiæ
musculi, pars ip-
sa in cōtrariū
trahitur.

Latus musculus
vnde nervi re-
cipiunt.

Anginæ ali-
quando ob ver-
tebras luxatas
accident.

Spina partes al-
tiores, præstan-
tiores existunt.

Septimū transver-
sum solum per se
cere lentem respi-
rationem.

Gibbus vnde
accidit.

Spina proprio
se laborat affec-
to, quod acci-
dat.

nes significant. Vna est flamma in corde & pulmo-
ne caliditas. Secunda, in altero spiritalium instru-
mentorum angustia. Tertia, facultatis musculorum
mouētis debilitas. Cum igitur huiusmodi spirita-
tionē cōspexeris, in primis arteria pulsationē p-
pendere oportet. Hæc enim quātus sit calor, indi-
cat. Deinde spirationē ipsam expendē, an multa,
an frequens, an exulsiando fiat. Postremō thora-
cem in pectore tange, quem si præter cætera ar-
dentē inveniēris, iam omnes copiosi caloris nota-

Caloris copiosi
nota.

Angustia spiri-
tuum instrum-
entorum quod
inducit.
Spiras vnde ac-
cedere imbecilli-
tas solent.

Harum primar-
um delatari per spi-
ritualium organo-
rum imbecilli-
tatem.

Sanguis qui
paris solent co-
ceni.

tas te habere ne dubita. Quibus ex abundantia
accedit faciei, oculorumq; rubor, capitis ardor,
sitis v eliens, lingua arida, falesbrostiq;. Vbi ve-
rō in cendū signis modū seruantiū, thorax dila-
tatur vehementer, angustiam in spiritalibus in-
strumētis esse potendū. Solut aut imbecillitas
accidere spinæ, interdum cerebri vino, vtpote à
quo & sentiendū, & mouendi facultatem recipit:
interdū ipsa duntaxat spinā primario affectu la-
botante, idq; ob peculiarē intemperiem, vel toti
spinæ, vel diuersis ipsius partibus aduenientem.
Igitur ob ipsius imbecillitatē spinæ, omnib; thora-
cis partibus solet aer inspirari, vel nullo arden-
te calore ægrū ad cogente. Siquidem vbi ani-
mans quiescit, vtriq; valide sunt, liberam respi-
rationē solum septum trāuersum efficere solet.
Vbi verō id ob imbecillitatē, spirā id munus per-
ficere nequit, inter costaliū musculorū tunc con-
currit auxilium. Quod si præterea maior animal
egrat spiratione, tunc superni musculi omnes,
quorū maximi capulas secū manifeste mouent,
ad spirandi actionē desiderant. Cæterū tamen si
per spiritaliū organorū imbecillitatē totus thora-
x moueatur, dilatanturq; narium pinnae, dila-
tatio tamen thoracis est minor, q̃ in ardentibus
febris in quibus, vi vires valeant, & totus thora-
x plurimū dilatari cōsuevit: minorē etiā q̃ in
angina, & dyſpnœa, & peripneumonia. Quippe
hoc morbo affecti, & maxima, & frequentissima
spiratione vtiuntur. At quæmadmodū ob infirmi-
tatem omnium organorum respirationis, sic ob v-
nius quoq; particulæ imbecillitatē, omnes thora-
cis partes dilatari coguntur. In vniuersum au-
tem, vnica percurre actione, solum musculū qui
ipsam efficiere solet, aut nerulū ipsius, esse affectū,
putandū est. At vbi plures actiones vitiare sunt
in diuersis locis, accidit interdum omnes muscu-
los, quibus petriuntur, ab aliqua cōmuni cau-
sa esse obliſos. Fieri etiam potest, vt neruus ali-
quis, qui musculi illius cōmunis est, afficiatur.
Vt si ex anatome, ad quā particulam porrigantur
singuli nerui ab ipsa procedentes, didiceris,
affectas sedes q̃ facillimè inuenies. Sic enim cum
ex refrigeratione primarū vertebrae spinæ, à
quibus quatuor nerui ad caput ascendūt, vt peri-
cranio sensum largiantur, cuiusdam olim caput
afficeretur: affecta sede explorata, illiq; remediis
adhibitis, eum subito perſanauimus.

CAPVT IIII.

At verō sanguinē ē ventriculo gulæq; vomitio-
ne: ex spiritalibus partibus, nusi: ex fancis
& gurgulione, secretu: ex ore, simplici expuratio-
ne expelli, apud omnes medicos in confesso est.
Nos verō sanguinē qui à cerebro affatim descen-
debat ad fauces, rufuendo educi spemumero vi-

dimus: quippe subito gutturi irruēs, rufum mo-
uere potest. Quare diligenter oportet huiusmodi
affectus diſtinguere. Exterū cōtingit plerūq;
vt vel erofa, vel exesa, vel rupta vena, sanguis
rufuendo, affatim cōſertimq; eructatur. At si pu-
mosum aliquid simul eductum fuerit, effluſio
mum est indicium, ipsam educi à pulmone. Haud
fecus, si bronchi pars quæpiā, aut arteria, aut ve-
næ tunica, aut etiam pulmonis ipsius caruncula
reſciat. Quippe nihil horū accidit illi, qui ex tho-
race sanguinē rufuendo producit. Iam verō nul-
lus dolor inſeſtat eos, quib; à pulmone sanguis
erumpit: vtpote qui duos neruos per q̃ tenuēs à
sexta neruorū à cerebro ortorū cōiugatione reci-
pit, extrinsecus per membranam ipsam conti-
nere diſperſos: qui intrinsecus haudquāq; per
viceria profunditate extēduntur. Verū thoraci
multa ab internis, multi etiam ab externis pari-
tibus aduenit nerui, quibus faciliē dolores per-
cipi poſſunt. Præterea thorax quidem est muscu-
loſus & oſſulentus: pulmo verō & laxus, & tutus
à cōſuſione. Proinde thoracis dolores intensio-
res sunt, pulmonis remiſſiores. Cum igitur do-
lente parte quapiā thoracis, sanguinē quis ſpue-
do reſciat, nec multū, nec rubrū, fed nigrican-
tem grumofumq;, huius thorax primaria affectio-
ne inſeſtat. At sanguis affecto thorace per pul-
monē educitur: vt in ſuppuratis affectibus pus,
quod inter thoracē & pulmonē deſcendit: ad
eundemq; modum, quod in pleuritide coloratū
ſputum emitti ſolet, per pulmonē excernit. Por-
rō vlcera quæ sanguinis reſectioni ſolent ſuper-
venire, in pulmone quidem ægre curationē ad-
mittūt. At in thorace diſrupta vaſa, à quibus san-
guis expulſus, magna ex parte conglutinantur.
Inſeſtigandū verō eſt, num ob adhiereſcentē
ſanguisugam, vel in ipſo narū meatu, vel in illa
oris parte, qua ad nares foramen tendit, sanguis
aut emungatur, aut ſecretur. Ex ventriculo enī
cror, epora hiradine, e vomitu. Qui cror ta-
men eſt tenuis, ſanieſq; ſpeciem reſert, ſue is ex
ventriculo, ſue ex naribus, ſue ex ore ſeratur.

CAPVT V.

Quod nō ſit radem res, vix atq; fermo, nemi-
nem ignorare exiſtimo. Vox ſiquidem vocaliū
inſtrumentorū eſt munus: loquela verō, eorum
quæ ſermoni ſunt deputata: inter quæ lingua
principatū obtinet: cui nō parum conſerūt & na-
ſus, & labra, & dentes. Sic etiā vocis inſtrumenta
ſunt guttur, & ipſum mouentes musculi, & ac-
nerui qui à cerebro ipſis mouendi viā deſerunt. Igi-
tur ſi vel claudentes, vel aperiētes guttur muscu-
li, immobiles reddantur, qui ſic afficiuntur obma-
teſcet. Vbi verō vel diſculter mouētur, vel palpi-
tant, vel tremunt, vel aliter afficiuntur, pro affectio-
nis ipsius modo vox ipſa lædatur. Quod ſi
alius quipiam ex mouentibus guttur musculis,
quoquo modo lædatur, vitiabitur quidem vox,
ſed exiguum. Quippe ſic affectus, nec obmutet
ſcet omnino, nec ita parum habebit vocem. Vt
autem ex musculari guttur mouētibus, præcipui
habentur q̃, qui ipſum & aperiunt & claudunt:
ita ex vocalibus neruis, q̃ quos recurrentes vo-
cant: qui & ipſi, ſexto cōiugationis pars ſunt ner-
uorum, qui à cerebro oriuntur: quæmadmodū &

Spiratio à pul-
mone rufuendo
ducit.

Dolor non inſe-
ſtat eos quibus
à pulmone san-
guis erumpit.

Pulmonis dolo-
res cur remiſſio-
res ſunt, quā
thoracis.

Sanguis, affecto
thorace, per pul-
monē educitur.

Pulmonis vlcera
ægre curatio-
nem recipere.

Sermonis organo-
na,
Vox inſtrumen-
ta.

Vox qua re-
cauſa potest
vitiari poſ-
ſit.

ali, qui quidem per ipsum dispersi, differunt ab illis, eo quod à nervis textæ coniugationis, nō in ceruice, sed cūm ad thoracis regionem pervenerint, separantur. Per vulnera igitur recurrentes nervi refrigerant, tantisper vocem impediunt, donec calfacti, naturalem temperiē recuperarint. Præterea vitari vocem * in acumen & magnitudinē haud obscurè contingit, vbi fauces etiā à suis musculis contendī & cōtineri nō possunt. Item gravissimè lædatur vox, cū membrana faucibus

Recurrentes nervi refrigerant, vocem impediunt. Vox in acumen & magnitudinem quādo vitatur.

Vox rade offensa natura.

Angina affricat, vbi vocis simul et respiratio.

Voci qui affricat, vbi respiratio.

Voci materia est offensa.

Efflatio quomodo fiat.

Albiones inter se cōvenientes, sunt quing. et ca respiratio.

Respiratio. Efflatio. Efflatio strepitus.

Vox. Loquela.

Diff. illa respiratio, in qua omnes thoracis musculi moventur, quāvis, à quib. causis vocis posuit, in respiratio.

spiritus angustiam, aut vehementem in corde & pulmone caliditatē. Quamvis interdum dicit, ne tōdum (licet raro) tres quoque ex iam ductis causis concurrere possunt. Atqui tribus quidem simul cōcurrentibus, proximam mortē timere oportet. Vbi verō dux fuerint, difficile est ægrum servare. Sed vna duritaxat infestare, peculiari opus est finitione, vt soletur, servabitur æger, an ipsi malo succumbet. Igitur vbi vires duritaxat fuerint infirmæ, ad tria mouentū musculorū genera venire, eosq; omnes ad motiōē excitare solent, vno genere * vehementer mouere osequuntur. Quippe si septum transversum solum, veluti cūm secundu naturā se habet, sufficiens mouere possit, vtique nec intercostalibus, nec superioribus musculis indigeret. Quoniā verō imbecillum est, omnes sensim commouet: sed nec frequentem, nec admodum raram actionem efficit. At plurimū aucto in spiritalibus instrumentis calore, omnibus quidem thoracis musculis agit animal: sed velox, frequens, & vehemens, est eorum actio, si citra virum imbecillitatē ipse calor infestet. Virum autem imbecillitatē, vbi nō accesserit si linea caliditas, nec velox, nec frequens omnino comitatur motus: proinde non ita multum omnes thoracis partes potest distendere. Præterea vbi ob plurimū calorē spiratio est difficilis, spiritus quidam calidus, feruidusq; efflatur: Vbi verō ob solā imbecillitatē, * nulla facta potest efflatio, spiritus per nares tantū emittitur.

Quod si per inspirationē cuiuspiam narū pinna manifeste * dilatate videantur, id sanè efficax roboris prostran est indicium. Ob spiritali verō instrumentorum angustiam, totus quidem thorax * plurimū, celeriter atq; frequenter distenditur. Cæterū qui sic laborat, * absq; vlla efflatione expirant. Si verō simul conuenerint in spiritalibus instrumentis, & calor, & angustia (quod solet in peripneumonia) tunc sanè nec maxima, nec frequentissima, nec etiā celerissima spiratio sufficere potest: sed surgere tentant ægri, quod si melius eis thorax dilatari videatur. Similiter solè respirare & si, quibus aspera pulmonis arteria, plurima deduxione oppletur: si nec efflatio, nec calidum emittit spiritum. Parulenti enī tantū thorax attollitur: sed neq; ab eis fit efflatio, neq; spiritus emittitur calidus, nisi forte ad vtrūq; felici accesserit. Verū si q̄ celeritissimè suffocantur, tum ob plenitudinē ipsam, tum quod vires oīoibus parulenti necessariū imbecilliores reddantur. Contrā autē per anhelantes affectus, humoribus, crasis & viscidis in ipso pulmone impactis, permanere possunt vires robustæ & constantes. Ad hæc, si rulservulū coctū difficile aliquando fuerit in ipso ortū, thorax maximè dilatabitur, sed non trahet illa multum spiritū, ob idq; crebro spirare cogetur, * verū absq; efflatione, quæ sanè aucta caloris est propria. Magna porro interdū fit respiratio, ob magnitudinē dilatarionis, quā thorax mouetur: interdū verō ob inspirati aeris multam essentiam. Igitur quicunq; sine aliqua spiritali instrumentorum angustia, per felices ardetes difficulter spirant, ita inspirati aeris quantitas, magnitudinē dilatarionis thoracis proportionē respondet. Quibus verō vel tumor vel angustia

Narum pinna manifeste dilatata, robor respiciendum, robor prout brachia indicant.

Respi qui strata resoleant.

Parulenti quod si resoleant.

Parulenti qui quomocumque suffocantur.

Tuberculum in pulmone ortū, quod alium respiratioem efficit.

Aeris inspirati quantitas in quibus uocem respiratioem magnitudinē dilatarionis thoracis, et in quibus notatio quomodo.

CAPVT VI.

Vt autē ad causas dyspnæ explorandas rursus hic sermo redeat, si videris aliquem respirantem ægri, ita vt inter respirandum thoracis omnes moueantur musculi, pectusq; etiā vnā cum scapulis attollatur: certè ex tribus vnum conuere oportet, aut virum imbecillitatē, aut viarum

gustia

gustia sine flamm eo calore in spiritalibus est, in his, thoracis quidem dilatatio sit maxima: id vero quod inspirat, non solum dilatatione proportionem non assequitur, verum etiam minus, quod secundum naturam inspirari solet, attrahitur. Ceterum inspiratio ea quae ob vicium imbecillitatem fit omnibus agentibus muscularibus, descendit est sublimis, non magna. Iam vero multus spiritus, & ex longis intervallis attractus (quemadmodum inquit Hippocrates) delinunt deiciat. Spiratio exigua simul & rara, spiritalium instrumentorum frigiditate frequens vero, non solum spiritalium, sed etiam etiam quae cum ipso moriuntur, ut hepatis, lienis, ventriculi, & gulae, laborum indicat. Est etiam alia dyspnoea species, cum veluti brevis quidam quiete intercipitur opus thoracis: idem modum in inspiratione, modo in expiratione, sine hoc accedat ob convulsionem musculorum thoracis, siue ob caloris copiam, cogentis aegrum concutere vel inspirare vel expirare. Est & alius spirationis affectus, apnoea, hoc est, privatio spirationis: vocatur, qui tamen consistere nequit. Nam videtur esse impossibile, ut animal omni spiratione exatit privatum, in vita servari possit. Quia vis animalia ea quae in cauernis delitescere consueverunt, mouere thoracem videtur minimè. Proinde concutere oportet, aut ad deum exiguum a deo illius respirationem, ut effugiat sensum: aut animalia eiusmodi, tunc non indigere respiratione, sed transpiratione illius sufficere, quae fit arrenari motu per vniuersum corpus. Fieri autem etiam apnoeam, minimè quidem affectus respirationis organum, sed principio à quo illa regatur.

CAPVT. VII.

Pulmo non potest moueri nisi per crura.
Verumenimvero pulmo non potest vehementer de lore cruciari: at grauius sensum, atque aliquando extensionem, vel ad pedus, vel ad ipsam (quando quidem inde suspenditur membrane ipsum ambientes) percipere potest. Spem numero etiam pulmonem affecto, aegri molestantur angustia, atque ob id crebro celeriterque respirant, & thoracem vehementer attollunt, sed non ita multum aerem attrahunt. Haec si citra febrem acciderint, aut tuberculum, aut plenitudinem crassorum humorum in eo consistere ostendunt. Ceterum si inter respirandum aegri minimè videtur stertere, indistinctus augeatur symptoma, crudi tuberculi ortu suspicari oportet. Si vero sterrenum strepitum fecerint, lentorum crassorumque humorum pertinaciter impaetorum multitudinem, pulmonis bronchia molestantur est indicium. Quod si illico ab angustia sensu quis difficulter respicit, fluxum nem vel à cerebro, vel à vicinis fedibus, irrure in pulmonis bronchia significatur. Porro si vbi vehemens putrescit pleuritis, remissa iam febris exacerbat, sentia, in imo thoracis aegri deorsum grauiatatem percipiat, ac per varios decubitus, maximè dum repente ab uno in alterum latum conuertitur, aliquid transfluere sentiat, puris multitudinem ibi contineri, coniectura est certissima: praecipue si nihil penè expuerit laboris. Si vero citra febrem serousus aut purus humor subito in thoracis spaciū delinens, excitauiet spirandam difficultatem, aegri tunc tenentur spiritum, idque ab initio quidem exiguum, sed cum vehementer tuini: vbi ve-

re concoctum est, plus atque crassius, & cum minori tusu expone solet. Quippe bilis accideret potest, ut vehementer tuendo pauca quae expuat: nempe aut ob lentum crassiusue humorem, aut ob impensè tenuis. Si quidem tenuis humor cum subleuatus est, inter tuendum à spiritu diffusius reuertitur: lentus vero, aut omnino crassus, difficulter efficitur, utpote qui non tam facile à corporibus, quibus impactus est, abherget, neque quoniam spiritum, nisi à vehementi & multo, potest impelli. Ignur spiritus quod neque visum, neque aquosum admodum fuerit, neque trahitum commotum aut lentum, ad facile effertur solet, maximè vbi vires validae fuerint: Porro vbi cum spirandi difficultate, cuius angustia & grauius coniuncta est, accedat quoque febris inciderit, is affectus est inflammatio pulmonum. At si intolerebile morens in fuerit, angustia vero, grauitatisque sensum in moris, erysipelas ipsum vexare censendum est. Vencatur etiam pulmo interdum inaequali, sicuti & aequali intemperie, circa humorum affluxum. Igitur inaequalis tuum exatit: aequalis vero, si moderata sit, spirationis concinnitate variat. Si autem vehemens, idque vincens calore, frigidi aëris & positionis cupiditate inducit, ac trahit tempora in febrem definit. Per frigidam autem intemperiem, contraria evenire solent. Quippe si modè seruauerit, calidior aëris, & calidè deflensu portio, nis excitat: si vero modum excedit, perlet viscus ipsum fluxionem. Ob rationem etiam visum, contingit sanguinem in pulmones transfluere, atque excitaretur. Attractiones in eo deprehendes, tum ex multis sanguinis effusione, tum ex magno, notabili aliqua causa, quae subit advenit. Sunt autem causae praegressae, casus ab alto, collisio, iracundia, exclamationis, atque aliae id genus. Contingit quippe interdum vasa disrumpi, vbi non praemissa lenitione pulmonis per praecedentes exclamationes, vehementer aliquis exclamare tendit. Ad haec, nulla externus manifesta adueniente causa, sanguinis abvduum potest in pulmone vas rumpere, si minimè excedi possit aut ob frigus à vicinis contrahum, aut ob innatis temperiem. At vero vbi ostensa resierant venarum, calidè procedunt semper dispositiones. Quae vero erosio vase aliquo assatum accidit sanguinis evacuationes, eas praecedere solet exigua ipsa, ac resque in pulmone fluxiones à capite. Neque enim verò si pulmonis aliqua pars, aut crustula simul effertur videtur. Distinguitur autem vlcus pulmonis ab vlcere asperae arteriae & gastricae, tum ob ea quae cum spiritu exceduntur, tum ob spiritum ipsius quantitate. Si quidem per vlcus pulmonis, plurimum spiritus relinquitur à partibus aut illis exviceratis, admodum parum excernitur. Praeterea pulmonis vlcera non comitat dolor: ea vero quae guttur & asperam arteriam infestant, dolorè quidem inducunt, non tamen nimis vehementem.

GALENI PERGAMENTI

de locis affectis, lib. V.

CAPVT. I.

*D*inceps autem symptomata quae cordi primario affectu, & per consensum accidunt, consideranda. Corrigitur innati caloris ex-

Principia non gubernantur.

Animal mori non potest, nisi prius cor afficiatur. Corde temperatum esse necessarium cerebrum. Cor hepatis non autem horum, alia. Lactis nec uero, nec fletus, nec alii.

Respiratio qua consistit.

Mortem cito non potest ob timorem grauem. Cor hepatis non autem horum, alia. Magna animi perturbatione succubant uigil.

Syncope dicitur.

Repetit mori quod, cito non potest. Palpitatio cordis.

Corde uoluntate non potest mori animal.

stis fons & origo: quemadmodum sensus & motus, cerebrum: ac hepar denique facultatis nutritio: ita quibusdam tribus principibus animal gubernatur. Ceterum animal omnino mori non potest, nisi prius ipsum cor afficiatur: ad cuius intemperantiam immodica mors necessario sequitur. Si quidem cum singule partes peculiari temperie cordis suae actiones perficiant, hac profecto pereunte, actiones quoque ipsarum petire est otiose: ac proinde cerebri etiam & iecoris. Horum uero temperie deperdita, non oportet cordis simul actionem petire. Nam et si sensu & motu uoluntario sit destitutum animal, nec uitiantur; uel in latens non evenit, nihilominus uiuere ipsum posse, quod diu cor illicum permanserit, haud inficiandum est. At uero si quo respiratio prius, huiusmodi illic petire est otiose. Porro ad ipsam respirationem conducunt thoracis musculi, in quos nervi à ceteris uicibus medulla orti, motu principii deferunt. Qua quidem facultate motrice, quae à cerebro insit, musculi si prius (ut uidetur est per vehementes apoplexias) perit opus respirationis. At uero quia ratione homines per somnum spirant, reliqui musculis omnibus, praeter eos qui ad thoracem pertinent, tunc ceteris in partibus, eadem per maiorem apoplexiam, aut alios in vicinis affectibus spirare possunt. Verum per vehementes superni principii lacerationes, tota spiratio resoluitur: unde cordis quoque temperies corrumpitur, peritque necessarium animal. Ex iecoris enim affectum mori aliquando contingit, alia tamen ratione, & atrophia uidelicet. Quare in huiusmodi affectibus, uita potest longius produci. Mori etiam contingit non oculos ob syncopam uigilae stomachi orti, ac uelentem dolorem, & timorem grauem, ac denique uoluptate immensam. Etenim quibus vitalibus infirmis est, animi uero affectiones, ob impetum, fortes, & facile animae substantia resoluitur. Atque horum aliqui etiam ob morositatem perierunt: sed non illic. At uir magnanimus, ob nulum animi perturbationem uigil succubuit. Proprio autem affectu laborare contingit cor, uel ob simplicem intemperiem, siue inaequalem, siue aequalem ea fuerit: uel ob inflammationem, uel erythras, idque dum fieri incipit. Nam illic, antequam augeretur huiusmodi affectus, animal ipsum corrumptur. Quos sane affectus cardiaca sequitur syncope: quemadmodum stomacha eos, qui os ventriculi afficiunt. Haec tamen etiam consentiente corde accidunt. Igitur exiguae quidem cordis intemperantiae, pulsus arteriarum, pro sua quoque natura, variantur: maiores uero, per proprias quidem simularum partium intemperies, subito mortem non inducunt: per eas autem quae ad partes instrumentales pertinent, subito enecare possunt, sed praecedentibus signis quibusdam, quorum unum ab Hippocrate est dictum: Quis sepe & multum exoluitur sine causa manifesta, si repente moriuntur. Est praeterea & alius affectus, palpitatio uidelicet cordis, aut per se eveniens, aut cum

nas, protinus cum multo sanguine vitam exhalabit animal. Si uero non ad ventrem usque perueniat, sed in cordis substantia consistat, uulnus, ex ista affectus aliqui, non solum ea die qua uulnerati fuerunt, sed sequenti quoque nocte potuerunt uiuere: qui oborta deinde inflammatione fuerunt extincti. Ceterum quando uixerit, mentis compositione iuuenti sunt. Unde evidens testimonium sumere potest ea secta, quae negat rationalem animam vim, in corde consistere. Palpitatio autem viscerum huius, plurimum per integram ualitudinem accidet: ea uis, in quos omnes detrahitur sanguinis insuit, uel cum extenuare uisus & medicinarum ratione. Eorum tamen qui affecti sunt fuerunt, nullus ad senectutem peruenit. Panniculo ambiens cor quomodoque affectus, nullus avertit periculum, nisi ipso inflammatione affecto, cor cōforti lege afficiatur. Porro si periculis cor, spirationem efficiat magnam, densam & celerem: calidumque semper spiritum reit. Cōterit refrigerat, exiguum reddit spirationem, & raram.

CAPUT II.

Similiter etiam thorax (propriam ipsius respirationis organum) aut primario, aut per consensum afficitur: à cuius quidem affectibus necessario respiratio uitari. Igitur ubi doloris affectus infestatur, exiguum densumque reddit spirationem: id quod etiam uicinis partibus, & his quae simul mouentur affectus solet accidere. Quippe interdum laeditur respiratio, thorace non laborante proprio aliquo affectu, sed uel nervo alii quo orto à spina, uel spina ipsa affecta. Eorum uero affectuum qui proprie ad thoracem pertinent, quidam in ipsis musculis, quidam in membrana costarum succingente consistunt. Igitur intercostales musculi, qui in ima parte consistunt, grauiori & externi dolore ob inflammationem cruciantur: reliquae membranae subdite suam affectionem communicant: quemadmodum ubi ipsa primario aliquando affectu infestatur, intercostalium musculorum partes inter se, similiter et conuolunt. Verum exquisita pleuritis fit, ubi succingens costas membrana primario affectu laborat. Proinde dolor, uel ad iugulum, uel ad praecordia potest extendi: ad iugulum quidem, superioribus eius partibus: ad praecordia uero, inferioribus inflamatis. Vehemens quoque febris, huiusmodi inflammationem sequitur: quia sedes affecta & parum distat à corde, & cum panniculo inuoluentem ipsum, a septo transuerso, cognationem habet. Iam uero inflammati intercostales musculi, minus cingens uero membrana, magis & tendit, & indurat arteria. At in peripneumonia, nulla apparet talis durities. Porro effusa in uacuitatem thoracis sanies, in alperas pulmonis arterias recipi: ac dein per talem excreta, naturam huiusmodi moris qui peperit inflammationem, declarat. Etenim si bilis abundat, pallidum aut flauum: si atra bilis, nigrum: si pituita, spumofum, & candidum: si sanguis, rubrum spiritum reit. Quod uero ex thoracis capacitate aliquid expuat, hinc liquet manifestissime: quod si per uulnus thoracis penetrant, aqua multa insudant, moxque tussibus expuantur, zger uel ex sapore multum esse deprehendet. Praeterea in eo ipso spacio, quod inter pulmonem

Respiratio animalis non potest nisi prius cor afficiatur. Palpitatio animalis non potest nisi prius cor afficiatur. Lactis nec uero, nec fletus, nec alii.

Cor incalescentia refrigeratur, quod est signum.

Thorax proprius non potest mori organum. Thorax dolore cruciatur & infestatur. Thorax dolore cruciatur & infestatur.

Membrana costarum succingens costas membrana primario affectu laborat. Pleuritis quae ad iugulum pertinet.

Spectum diffinitio, pro uacuitate humoris separatum plus uidetur.

atq; thoracem est, paralentis & pus continere, & ipsum tussiendo expuere, haud obfcurè cernitur. Nec verò defendi potest, sanguinem in ea vena quæ circa spinâ est, contenti, regurgitare ad cor, ut inde ad pulmones feratur: quod ex Erasistrati sermone colligitur. Nâ è còtrario, vena hæc, à dextra cordis auricula exorta, sanguinè secû defert, qui omnibus thoracis partibus, quæ circa ostio costarum inferiores còstitunt, alimentû præbeat. Etenim superiores quatuor nò ab ea, sed à vena perreptante ad iugulû, nutrimentû suscipiunt. Pus itaq; in thoracis capacitate contentû, expirationis tempore in pulmonis asperas arterias transmittitur. Si quidè respirationis actio ad ipsum thoracem pertinet, pulmone nullam propriam habente motionè, quippe qui per consequenti dilataro thorace, patitur ipse attollitur: eo verò còstricto, spongiam manibus còpressam exemplo, rursus in sese relidit. Proinde thorax vehementer còstrictus, humorè qui in vacuitate subdita còtinetur, in asperas eia; arterias còprimunt. Nisi verò thorax admodum vehementer pulmone omni ex parte còmpresserit, humor in asperarû arteriarû ora recipi baudqua; poterit. Quamobrem quò robustior fieret còmpressio, animali adiunxit tussim naturâ, quæ naturale est symptoma, steruationis, singultui & nanse, cò simile. Verum quia viribus opus est, quibus excutitur humumidi naturale symptoma, contingit frequenter per suppuratos affectus interire x-
gros, viribus antea prostratis, quod à validissimâ & celerrimâ còstrictione thoracis fiat tussis, quam vires adeo imbecillæ præcitate nequeunt. Porro inseparabilis lateralis morbus symptomata sunt, febris acuta, dolor, peninè ac si locus vel intendantur, vel pungatur: spiratio frequens & cuius, pulsus parvus, arteriam & duram, & quodammodo tenfam indici, tussis magna ex parte cum coloratis sputis, nonnunq; verò sine his. Atq; hæc sanè in còcætas vocant pleuritides, quæ vel celerrimè hominè rapiunt, vel longo tempore spacio finiuntur. Sunt præterea alij laterû cû febre dolores, per quos spirationè exiguis reddi est necesse, sed nullum spûrû reddunt: ut in ea re nihil à pleuritide sine spûro còstante differre videatur. Verum hi faciliè ab illis discerni possunt, quod in his quidem nulla omnino tussis molester (quemadmodû in illis, qui absq; spûro infestantur pleuritide, in quib. sicca adeit tussis) inest tensionè, neq; villâ duritiè pulsus referat, nec per se inde acuta febre laborant, nec deniq; adeo difficultati spirent. Sunt etiâ nonnulli, qui extrinsecus pulso inflammato loco, dolore sese faciunt. Atq; ij per spûrû purgantur minimè: quia ab initio nihil eius succi, qui excitavit inflammationè, pervenit ad spaciû thoracis cònferuit. Ad inflammationè concoctâ, nisi pus prius discussum fuerit, ad cutim vsq; attollitur, inciditq;.

CAPVT. III.

Phren.
Septem trans-
versum separat
transversâ an-
ni faciliatam
ab appetitoria.

Terminû quo thoracis pars inferior finitur, antiqui phrenas vocarunt, fortè quia eo inflâmto mens laeditur. At Plaro ipsum septû appellat, quod irascibilem animi facultatè, quæ in corde est, ab appetitoria, cuius sedes est in iecine, distinguit, separatq;. Ceterû recentiores septum

transuersum id nominant, ut Aristoteles succin-
ctur. Qui sanè masculus spirationis instrumen-
tum cum sit, nò immerito, si afficiatur, ipsam le-
dit spirationè. Antea tamè q; quis ob affectum se-
ptum delirè, frequentè atq; exiguum infestantè
verò delirio, multa varietate iniqualem spûrû
reddidit. Delirare tamen solent nonnulli, ob vitium
còstitens in ore vètriculi: sicut per febres ardentes,
pleuritidè, & peripneumoniâ. At quæ ob se-
ptum transuersum deliria oriuntur, non multû à
phrenidè distant. Etenim per ceterarû partium
affectus, & per ardentes febres, torq;ari solet de-
lirium, quod morbus declinare videtur. Pleuri-
tidis autem propria præcipuè nota est, ne in
declinatione quidem febrilè, delirium quiescere,
cum animû non per còsensum sub huiusmodi
morbo cerebrû, sed primariâ affectione laboret.
Proinde paulatim affectus hic gignitur, nec rep-
tentè subito vè alienatû ægi, vè in aliarû partû
affectib. quætiis prius q; inualecat in morbus,
præcedant ipsû nò pauca accidentia à phrenitica:
ut puta immensus vigilie, vè somnus imagi-
nibus variis turbatus, aut deniq; versum omniû
quæ faciliè, ægressis quodam obliuio. Interdum
etiam, quæ phrenitis evadit, maiori cum tumultu
aut temeritate respondent, cum antea tamen
fuerint mansueta. Atq; ij omnes, potu exiguo
venerunt. Nonnunq; occipit dolore infestatur. Cum
verò ad phrenitidè iam proximè accedunt, oc-
culi evadunt eis vehementer squallidi, aut ex al-
tero ipsorum acris lacryma effunditur, ac dein
lippitudo innatâ, & venæ intumescunt sangui-
ne, sanguisq; nullat è naribus: quo tempore ni-
hil quod exactè ad prudentiâ pertineat, respon-
dent, & floccos vellant, & festucas carpiunt, atq;
aridiori febrî, cui non ita magnè in altervram
partem mutationes accedunt, torq;erunt. Ad hęc
lingua quoq; illis aspera est, nonnullis audita fal-
luntur, atq; interdum iactè cogitandi. Quin-
etiam dispositione dolorifica affectû, vel acutius
premente aliquo, tam haudqua; sentiunt. Ergo
hoc modo per cerebrî affectum, paulatim phre-
nitis gignitur. Ab aliarû verò partium nulla, per
petuum delirium oriri potest, dempto solo septo
transuerso, cuius vno excitatû delirium, parum
à continuo distat: à phrenidè tamen distingui-
tur, & ex symptomatis, & ex sanguinis distilla-
tione à naribus, ex ipsâ spirationis specie. Si-
quidè spiratio phreniticorû est magna, & ex lon-
gis facta intervallis: inæqualis verò, vbi à septo
delirium oritur. Ceterû præcordia* revelli, septi
transuersi ducè ab initio affectû, propriû indicî
est: id quod affecto cerebro, posterius accidit, vi-
delicet non incipiente affectu, sed vbi formatus
iam fuerit. Calor quoq; circa caput & faciem, ve-
hemètiore est, usq; quo cerebrî vinum delirant.

CAPVT. IIIII.

Illius partis quæ inter fauces & os vètriculi
media est, & quæ erophagus, stomachus, & gu-
la dicitur, duplex est vitium. Vnus, q; velut via sit
corû quæ devoratur: alter, q; circa vtrûq; pro-
gressum, tam devoratoris, q; corû quæ à ventricu-
lo in os rescuntur, aliquid moliri videatur. Nâ
cû geminè infuit et tunice, altera ad cibi potaq;
deglutitionè vitium: altera ad eam, quæ vomitò

*Deliria quibus
ex casib; orian-
tur.*

*Deliria ex sep-
to transverso
ortu, non maliti-
am à pleuritide
differunt. Phrenitis
non ea prout qua-*

*Phrenitis
præcordia
symptomata.*

*Phrenitis
infestans sym-
ptomata.*

*Delirium nali-
um perpetu-
excepto phre-
nitico, q; quod
oritur à septo
transverso.
Delirium à se-
pto transverso
ortum, quoniam
à phrenitide
distinguitur.*

*Stomachus.
Orophagus.
Gula vna de
ple.*

*Gula cum tuni-
ca duplici fuit
data.*

fit,expulsionem. Proinde rationi est consonum, duo esse affectuum ipsius generati: vnum quidem quod veluti viæ tum ingessorum, tum vomitione reietorum, ei accidit: alterum verò, quod ei, veluti vtriusq; actionis instrumento, evenire potest. Constat itaq; eorum duorum vsum, alterum qui dem semper esse necessariu; alteru' propter occasiones quasdam. Agitur eorū symptomatum quæ gulam tanq; viam infestât, genus vnum est, cum ob tumore aliquem præter naturam, angustior 10 ipsius meatus redditur: alterum, cum perficere proprias actiones nequit. Accedit etiã gulæ inflammatio ascitria, vbi à vertebis in trô luxatis com primitur. Vbi verò gula inflammata, non à viciniis partibus cõcilata, sed propria familiariq; angustia torquetur, grauissimus tunc inter deglut iendū infestat dolor, accedente quoq; perq; diffi cultati transitu, præsertim si supinus, qui laborat, iacens, deglutire quippis conetur. Nam cetera si gura transglutitio multo facilius perficitur. Nec 20 verò puto latere vos, partiū inflammationi nulli nō dolere, vbi suo munere fungitur cœca, mi gari dolorē, vbi ab agendo destiterit. Cuius autem gula senientiū facultate fit prædita v ipsam quoq; vltra auctantium indicium, in vsum evo care oportet, quod plenius affectus illius digno scantur. Quare iussu regis in interrogare quid nō 30 deglutendo sentiant. Quippe imbecillitate nō nunq; percipere se farentur, vt longo vix tem poris spacio per gulam transeat iugiter. Interdū ea in media via luerere & cõcereri aiunt. Horū pri mu actionis infirmitate: alterum, particulæ cu iuspiam angustiam indicat. Verum vtriusq; dūte reutias ex reliquis accidentibus intelligere licet. Nam in imbecillitate quæ ex sola intemperie citra tumore fit pæter naturā, ingessorum in trā su tarditas, & equalis, & sine dolore, & insupē no quidē decubitu, maior: ceruice verò erecta, minor, sine vllō angustie sensu, accidere solet. Vbi verò cum tumore cõiuncta imbecillitas est, 40 vnam quampiam particulam angustiorē ceteris efficiat, atq; per eam ipsam tardior erit transitus. Quod si tumor fuerit inflammationis non erysipelatis particeps, accidet ei dolor & sitis, & mul ti caloris sensus, febrisq; non admodum ardens, quæ si in proportione haudquaq; respondeat. Si verò tumor aliquis ex non ita calida fuerit, tum citra febrim, & calorē, & sitim, deglutitionis inæ qualitas aderit, retentis cibis in parte aliqua. Por rō affectus dolorisq; gulæ, iuxta dorsum quoque sentitur, cum gula incumbat spinæ. Iam verò si ob ruptū aliquod vas ipsius gulæ, sanguis aliquando vomatur, dolor statim sentitur iuxta locum vbi talis ruptio cõgignit. At referatō ore vas, nullus percipitur dolor: quæ re à rupture atque effusione vasis distinguitur: ac præterea, q neq; ictus, neq; casus hanc profusionē præcēdit, id quo rupto vase videre est. Quantū ob solam sanguinis plenitudinē, vasa interdum disrumpi possunt. Quæ verò per erosionē sit electio san guinis, vlcere præcedente contingit. Fit autē vlcus, vel rupto vase, vel vitiosorum humorum in fluenta: id quod in cute quoq; sæpe numero ac cidit.

CAPVT V.

De vetriculi (quod veteres ob accidentia quæ

inducit, cornominabant) nō solūm syncopam, sed cõvulsionem, sopores, morbum comitalem, atq; melancholiam infere solet: necnō sympto mata, qualia per suffusionem infestant. Quos qui dem affectus omnes, consuetudinibus ei ceteris partibus, in ipso fieri contingit. Quippe ad propiam eius rationē pertinet, & tum satidire, tum natantes cibos corrumpere. Nam si cibi in ven triculi fundo firmentur, præcipue si suapte natu ra nō facile corrumpantur, & neutru' ex illis acci dit. Porro eum grammaticus quidam muenens, quones vel nimis vehementer docebat, vel cogi tabat, vel esuriebat, vel irascebatur, morbo comi tiali, ob nimis uicariū sensum citis vetriculi, corri peretur, tertio vel quarta hora panē optimē præ paratū ei exhiberi iussit, solum quidem si nō sit iret: si verò sit cruciatu, ex viuo madidum, & quidem albo, modiceq; adstingente. Nam iussu huiusmodi vinum, vt vires addit vetriculo, sit minime tenet caput, quod solēt vina vehemen tia. Deu verò singulis annis bis, aut ter, picrā ex aloe ei exhibens (quod quidam medicamentum totum ventrē ab excrementis liberat, & ipse sumy ad actiones proprias corroborat (ita restituit homi nem, vt reliquā vitæ integrā sanare frueretur. Cõplices etiā nō solū infomia & somni tumuli inoli molestant, sed ementia quoq; propter vi tiosum humorē collectū in ore vetriculi. Iam ve rō statulentū illū hypochondriorū morbu', om nes profusi sunt, tristitiā, desperationē atq; me lancholiam inducere, nihilq; ad melancholiā acciden tia rebus facere. Laborantes autem eo morbo, post cruditates, dictis accidentibus multo ve hementius cruciatur: ac quidam ipsorū quoq; sple nenti sunt. Quocirca consuetudinem est, ex bo catione vlcere vitiosum sanem in vetriculi rele gari. Ergo ea accidentia quæ cerebrū afficiunt, vel oculos, vitiosorū humorū vaporatorem se quuntur. At syncopa quæ vino stomachi, hoc est, 40 oris vetriculi, accidit, ob dolorū ipsius proprietatē exolutiōnē inducit, fortasse verò eius quoq; intemperie ad cor perveniente. Quemadmodū vbi cor vehementer intemperatū est, vires agni nam cadant, oportet. Similitur etiā citra, hoc est, picrā, multiteribus accidit, ore vetriculi affe cto. Nausea præterea, cardialgia & singultus, inter huius partis affectus debent annumerari. Af fectus autem vetriculi vniuersa capacitas, simi libus dispositionibus quibus & os illius, ceterū nō peninde vehementib. At quia cõsuetudo opus perficimus in partib. ori subditis, necessum est eaz ipsas partes, cum malē dispositæ fuerint, crudita tis easum existere. Quod verò sanguis à iecino re atq; liene effusus, vacuari per vetriculū pos sit, sanē de hac re lanquālibi sumus dicturi.

CAPVT VI.

Atiecori duplex etiam genus morborū acci dit: vnum à sola intemperie, citra tumore præter naturam: alterū, vbi vñ cum intemperie, tumor quoq; aderit, vt inflammation, erysipelas, scititua, infansio, & obstructio à crasis & viscosis humo ribus, in extremis vasorum partibus, quæ à ve na portæ exoriantur, facta. Verū in eis labo rans grauatior percipit in dextra præcordio rum regione. Quod si halitus ipsius quoq; spiritus, 50 cui

De vetriculo
li qua infirmitas
solus sympto
mata.

Ore vetriculi
affectus præ
ter

Vinum album,
modiceq; adsting
ens, vires ad
det vetriculo,
et munit in
tot caput.

Hypochondria
ca melancholia
symptomata
et signa.

Syncope vitio
rum vetriculi
accidentia, quomodo vires ac
cidit.

Citra sunt ore
vetriculi affe
ctus.
Nausea.
Cardialgia.
Singultus.

Sanguinem à
iecinore & lien
e vacuari per
vetriculum
posse.

Intri de ple
gma morborū
accidit.

Gula affectus
genera duo.

Gula inflama
ta indicia.

Inflamata an
net partes de
lent, vbi sua
funguntur ma
nere: impetator
dolor, vbi ab
agendo destit
erit.
Gula sitis, et
indicia, esse in
tendum, ad di
gnoscendum af
fectus illius.

Refectio vasi
qua re à ruptio
ne atq; effusio
ne distinguitur.

Vlcus vnde
fit.

cui nō pateat exitus, illic concludatur, nō solum
 grauitas, sed tēſionis quoq; ſenſus ſequetur. Me-
 miſiſſe autem oportet, octo numero muſculos
 per abdominis regionem extendi, quatuor com-
 prehenſos coniugationibꝫ. Quarū prima ex mu-
 ſculis conſtat rectis, per totū carnes, à pectore
 ad pubis offa protenſis. At reliquarū trium cōiū-
 gationum muſculi, vñq; ad reſtorū contactum,
 carnes ſubſtantia conſtant: vbi verō primū illos
 attrigerint, in membranas terucas degenerant. 10
 Horum itaq; muſculorū cōiugatio vna, quæ qui-
 dem reliquis eſt exterior, à thorace obliqua de-
 ducitur, in anteriores partes deſcendens. Altera
 huic oppoſita, ab infernis exorta partibus, obli-
 qua ad anteriores aſcendit. Huic tertia muſculo-
 rum cōiugatio ſubiicitur, qui tranſuerſum habet
 poſitū, atq; peritonæo innectuntur. Reſtorū igitur
 muſculorū tumores præter naturam, oblon-
 gi, ac per totū extenſi vidētur: quapropter haud
 obſcura eſt iſtorum dignatio, ſicvñ & eorū qui 20
 obliqui à thorace deſcendunt. Armulorū diffi-
 cilior eſt notitia muſculorum, qui ſi ſunt ſubieci:
 difficillima verō tranſuerſorū. Cū igitur iſci
 ſub peritonæo à tribus ex illis muſculis conſtega-
 tur, fieri nō poterit vt tractus aliquam ipſius notitiam
 præſentet, niſi vel magna in ipſo inflammatio
 oriatur, vel incumbentes ei muſculi admodum
 extenuentur. Iſci tamē de clatate affici, in dexte-
 ra præcordium parte grauitas, dolor totū præcor-
 dia retrahens, atq; ipſius ad iugulum vñq; 30
 extenſio: exigua ruſus, lingua color, in primis
 quidem ruber, de inde veſto ingerens cibifati-
 ſcendum, in explebis ſiſis, vomitus tam ſincer
 biles, tum eius quæ odorū luteis aſſimilatur: quæ
 aliquando ærgitis quoq; colorē reſert. Alius
 quoq; aſtingitur, niſi vna cum viceris huius im-
 becillitate, inflammatio ipſa acciderit. Eryſipela-
 tis accidentia hiſ ſerē ſimilia ſunt. Sed in ſuper fe-
 bris quoq; cum vehementiſſima ſin, laborantes
 cruciat. Etenim iecoris ac ventriculi flammæ 40
 diſpoſitionibus, ardentes febres ſolent ſuperue-
 nire: quas etiam excitari contingit in pulmonis
 inflammatione participē eryſipelatis. quæ admo-
 dum etiā per vniuerſum corpus, ob putredinem
 bilioſiorū humorū immo dicē eſſe tractū. Verū
 tum quæ aut iecoris aut ventriculi occasione eve-
 niunt, ex febres omnū ſunt vehementiſſimæ, ac
 magna ex parte in marſum degenerāt. Quæ in
 ſinis iecoris partibus eveniūt inflammationes, vt
 magis, ſi illæ que in eius gibbo ſint, ſaltidū, nā ſe-
 ſcam, vomitū bilioſum, ac ſim ingentem indu-
 cunt: ſic cōtrario hæ, maiori ſi illæ inter ſpiran-
 dum dolore laborantē inſeſtant, magisq; tuſim
 excitant, atq; dolorem vñq; ad dextrū iugulum,
 adeo vt detrailū videntur, extendunt. Verū autē
 parti, cū dolor adeſt, nōnunq; notitiæ cōſiſte
 cōſentunt. Soli verō iecoris eſt proprium, vt tu-
 moris cumulum cōprehenſum habeat circūſcrip-
 tum. Quare durus in ipſo circa principium tu-
 mor (quem ſcirrū vocant) multo evidentiſſus
 ob duritiem dignoſci poteſt, quā inflammatio-
 nis. At verō tractu temporis, ſi vis magis incre-
 ſcat ſcirrū, nūq; tamen æque facile deprehendi-
 tur, interpetere ſcilicet indicium aqua inter-
 ſum, quæ & ſcirrū ſequi conſuevit, & aſſi-

afficiatur hepar, gigni minimè potest. Non tamē
semper ob primariam excitatū affectionem al-
lius, et si hoc frequētius accidat. Etenim quia
hepar facultatis sanguificatricis est instrumen-
tum: consequens est, vt ipso vitato, actio quoque
eius vitetur. Accidit tamē interdū, vt ob inten-
sionem alicuius particulæ, earū quoque aut per me-
tericas, aut causam venam, cum illo cōmēricum
habent, ipsū quoque refrigeretur. Porro si marū
partis venæ, ab ea quæ in porta est, exorte, in te-
nuissimas extremitates siuuntur: ad quem simi-
liter locū, alia quoque venarū extremitates, à con-
cava venæ in gibbas viscetas partes distributæ,
perueniunt. Cibus igitur vniuerso corpori distri-
buitur, ex omnibus siuuntur partis venæ exiens,
ad gibbas partes per dictas extremitates trans-
mititur. In qua quidem vaularū cōspiracone,
nonnulli fieri obstrucciones existimant. Ergo ob
refrigerationē iecinoris, in sanguinem mirari cu-
bus non potest, refrigeranturque cum illo totius
corporis venæ. Sæpenuero etiā, nullo modo
re apparente in iecinore, æger aqua inter cutem
corripitur, vel ob vitium licus, vel isæus, vel al-
cuius intēstini tenoris, aut mesenterij, aut pul-
monis, aut renū, aut ob immodicū hamorrhoi-
dum, aut mensium profusū, aut ob suppres-
sionē mēstruorū, aut ob alium vitæ momenta-
neum affectum. In interpelluū præterea frigi-
dæ potatione iecur asanā refrigeratū, itanā a-
quā inter cutem inducit. Ac sic affectū, vehēmen-
tē ciborum desiderio tenentur, quod solent om-
nes omnibus ob ventriculū fuisse refrigeratum.

CAPYT VIL

Porro vtrū ſemper in morbo regio locus affe-
ctus fit hepatis, an alia præterea diſpoſitio hūc af-
fectum efficit cere poſſit, deinceps conſiderandum.
Siquidem videmus nonnunq̃ iecore haud im-
mō affecto, per morbi indicationem effuſi pal-
dā bilem per vnuſam eum. Quatenus
40 morbi indicationē interdū aliena quadam cor-
ruptione, qualis ob ſeratum morſum contingit,
quandoq̃ ſanguis in bilem mutatur. Perī autē po-
teſt, vt iecoris naturali tēperie mutata, humores
huiusmodi vitio afficiantur, & quidem cum
obſtructionē, aut inflammationē, aut ſerulū. Co-
ſplenis quoq̃ vitia, corporis color vitiatuſ, ſi-
mule nigrior fit, q̃ ob affectū hepatis. Cum igitur
vtrū ſanguinis generatio hepatis munus exitu
nullū ſane aliū facultatis huiusce generationis dī-
cimus eſſe, & cauſate ipſius viſceris propria. Co-
terū omniū facultatū eſſentia, in peculiaribus
partium temperaturis conſiſtit. Proinde ſi hepatis
ad aliquā dīſcrepantiam aliquādo li-
batur, accidit facultati ipſius noxa, quæ pecu-
liariter dīſtemperantiæ debetur. Igitur calidi-
oris intemperantiæ, cū cōtēntus in ipſo
mores, tum epi qui ſuggerūtur per meſenteria,
naſ, aduſrūt & aſſant frigida autē, ſuccoſi iam
ipſo cōtēntos, craſſos, ad ſummiſſe cōtēntio-
60 eſſi cūnt. Quod vērō ad ipſum ſuggerunt, pitui-
oſum, crudū & lemicōſū reddunt. Rurſus ad
dīſtemperantiā, ſicciores craſſi ſorēty. Lun-
dæ vērō rempoſes, aquoſiſſorq̃ humores elī-
cūt. Igitur cū aliā ſedimenta, aqua, in aqua nu-
māctur carnes fuerint ablutz, humida videntur.

Hydropsi gigni
non potest, nisi
afficiatur he-
par.
Hepar est san-
guificatorium
universum.

Venation *herp-*
on *explandis*
110.

Hydrophila rosea
la densa.

Cibi desiderium
vehementius in-
esse ait, quibus
et ventriculi
sacris profreg-
ratum.

5- Sangre que
16, in bala me
20, 1000.

Ceter corpore
 quod modis
 tiam posui.
 Locus, quod
 hepatis, vi
 sanguinem re
 tem reddunt
 Effinita fac
 latione in pr
 peris partim
 temperamen
 tem conficit.
 Hepatis aut
 perantibus

ni legge affe-
fifi- guale a str
per mende cit
110. a. m. r.

Abdominis o-
lis manifesta,
quatuor cipe-
bra coniuga-
tum.

Legumes first.

lower inflation-
ism goes indi-
cated.

Hepatic erysipelas
late affectu ac-
cidental.

Fibres arden-
tes à ventricu-
le & hepate or
ta, in maras-
mum sepe de-
generant.
Sensus hepatis
inflammatus qua
ad fens lympho
mata.

*Causes hepatis
inflammatis quae
Symptomata
causant.*

Hepatus firi-
rhæus aquo fe-
qua hydrops cū
fuerit.

*Hepatica excre-
menta qua di-
centur.*

iecur esse affectū existimabim. Nominatur autem
præcipue hepatica, quæ ob imbecillitatem ipsius
deiciuntur. Vt autem tenue excrementum & fan-
niem referens, infirmi iecinoris gignere sangui-
nem non valentis: ita id quod simulatur feci, su-
peraffantis sanguinem hepatis esse indicium. At
verò nonnulli primò quidem fanniem, & cruentam
quædam: dein tractu temporis, atrasium ac me-
lancholici sanguinē: postmodò atram quog bil-
lem, atq synceram, deiciunt. Qui affectus interdum
ob frigidam intemperiem, citra febrem, inci-
pit: ac tunc quidem tenuis fanies excernitur:
dein verò progressu temporis, corrupto in vis-
cere sanguine, febris solet supervenire. Porro
nonnulli eorū qui ob frigidam intemperiem labo-
rare incepterūt, nō solum nō amittunt cibi cupi-
ditatem, verumetiam multo magis q̄ antea ap-
petunt. At calidas intemperies nunq̄ comitatur
cibi cupiditas, sed fastidiū grave, sitis vehemens,
febris insignis, atq̄ prauroū humorū vomitus.
Sciendum autē est, singulis nostri corpora parti-
bus quatuor naturales facultates inesse: quarū
prima appellatur attractrix, quæ peculiares parti
fuccos, alendi ipsam gratia, & appetere, & at-
trahere potest. Altera deinde est, quæ alteratix
dicit, qua succus attractus, similis evadit ei quæ
nutritur particulæ. Hæc aliæ quæ ministrant: re-
tentrix nempe, quæ suo munere fungitur, quan-
do pars succū attractum concoquit, donec cum
in sinu ipsius naturam cōvertit: & expultrix,
quæ post absolutam cōfusione, excernit id quod
inutile est, atq̄ excrementum vocatur. Si igitur
in iecinore attractrix facultas quomodo cūq̄
afficiatur, cibum quem cōscit ventriculus, atq̄
in chylum convertit, relinquet, vt liquidus ex-
cernatur per alium. Atq̄ hoc sanē ipsius facultas
affectæ erit signū. Si quidem quicquid ab ali-
quo proficiat, tanq̄ a causa, id etiā esse illius
signum constat. Vbi autem hepar integrē valet,
mensari venia veluti quibusdam manibus, quæ
ex ventriculo ei cibum afferant, vititur. Cæterum
vbi vel inflammatio vel erysipelas afficit mē-
terium, nō solum qualia per iecinoris imbecilli-
tatem excrementa deici consueverūt, planē excer-
nuntur, sed apparet etiā veluti ab inflammatione,
fanies quædam illia admista. Vt autē nō potentes
ob imbecillitatē hepate succū à ventriculo attra-
here, attractrix facultas afficitur: sic vbi retinere
nō valet, retentrix vis infirma putāda est: ob idq̄
primò quidem cruenta fanies excernitur, dein
crasior & fæculentior. Similiter aliæ quæ dī ex-
cretionē contingunt, non quidem ob imbecilli-
tatem, sed ob expultriciæ facultatis robur, ratio-
ne plenitudinis, idq̄ interdum per integram va-
letudinem. Sic plerumq̄ pars aliqua cum affecta
est, per hepar purgatur, viribus ipsius iam robu-
stioribus factis. Quæ admodū autē retentrix fa-
cultas dum imbecillior est, ac rem quæ ipsam gra-
uat, retinere nō potest, vix expultrix id quod in-
festat evacuat: sic infirma expultrice, retinetur quæ
dum res solēt, facultate retentrice nō vsque adeo
gravata. Nam in quolibet instrumento aliā alia
facultas vel fit fortiori, vel imbecillior, facta rela-
tione ad actionem. Et enim omnis particula, se-
cundum temperamētū quod ei p̄perit inest,

*Calidas intem-
peries nunquā
comitatur cibi
cupiditas.
Facultates na-
turales qua-
tuor inesse si-
ngulis nostri cor-
pora partibus.*

*Facultatū sin-
gularum lesio-
nem in hepate,
qua signa indi-
cant.
Signū aliquam
dicitur, quod
ab ea proficiat
per sanguinem
a causa.*

*Pars aliqua
purgatur intero-
di per hepar.*

*Particula om-
nis æque firmi-
tatem propria-
tem tempera-
mentis.*

agit, proprietatē. Iam verò interdum etiam con-
tingit, vt ob folliculū fellia imbecillitatē, ad febi-
lem minimē attrahere valens, impurus vage-
tur sanguis per vniuersum corpus, aliq̄ o natur
morbi arcuari species præter illas, quas superius
exposui. Qui folliculus sic enī nonnunq̄ im-
pletur, quem admodū vrinæ vesica, aut evacuari
nō possit, aut quia obstructus est, vt quia secre-
toria ipsius facultas esse imbecillior. Veluti etiā
cū obstructus aut infirmus vas, quæ ab ipso ex-
tenduntur in hepate, biliosum humorē interdum
attrahere nō potest. Proinde excrementorū pro-
prietatem in morbo regio considerare, perq̄ ne-
cessariū est. Porro quibus citra febrem morbus
regia accidit, urgente in dextra præcordiorum
parte grauitas cuiusdam sensu: si omniūbus æ-
perienā obstructions cibis & potibus, & medi-
camentis extenuantibus, deinde medicamentū
quod bilem ducere possit, exhibens, corā pluri-
mos vna die sanitati restitui. Qui verò purgatio-
ne liberari nō poterūt, illi rursus valentiorē ad
aperiendum data ponone, medicamentū quod
vehementius purgaret, exhibuisse. Vt sub purga-
tione sine, corulea magia q̄ flaua bilis cum acri-
mordacitate secerneretur. Atq̄ in his conici fel-
lis folliculum similiter affici, vt solet vrinæ ves-
icæ, vbi magna humoris copia distenditur, quam
excernere nequit, interdum ob excretoriæ facul-
tatis imbecillitatē, interdum quod ob grauē so-
mnum, vel negotia quæpiam, vltra q̄ par est, vri-
nam supprimere, dein ab ea prosternatur, mirum
in modū intena. At folliculus fellia, * cū iue-
rū nihil ad excretionē a facultate animali, vni-
cū habet imbecillitatis principium, veluti cætera
quog naturalia instrumenta, à partia intempe-
rie ortum.

*Morbi regni
causa.*

*Excrementorū
proprietatē in
regio morbo co-
sideranda.*

*Regni morbi
absq̄ febri in-
terdum acci-
tu.*

GALENI PERGAMENI de locis affectis, lib. VI.

CAPVT I.

Ilen autē, cū ex hepate sanguinem melan-
cholicū trahat, quo ipse postea nutritur, fan-
ni si in eo facultas attractrix facta sit imbe-
cillior, sanguis ex icore impurus in vniuersum
corpus trāmittitur, ac proinde color nigrior e-
vadit. Quinetiam exemplo hepatis, spemur eo
ex se reuic excrementa quæda: ita vt per vomitū,
cui nausea accedit, nonnunq̄ excernatur melan-
cholicus sanguis: qui interdū etiam solet per in-
ferna descendere. At humiōdi vacatione sup-
pressa, nonnulli melancholica tristitia afficiuntur,
cibosq̄ auidissimē cōcupiscunt: idq̄ præcipue, si
valde fuerint acida, quæ excrementa ad ventricu-
lum trāferuntur. Si autē alia melancholica hu-
moris corruptio accidat, subverti, deiciq̄ appe-
tentiū videbis. Quod verò induratio ipso, aqua
inter cutē effundi possit, consentiente iecinore,
iam antea est dictū. Quinē a laborante aliquan-
do vtroq̄ viscere, regium morbum euenire con-
speximus, nigriore q̄ pro cōfusione subsèque-
te colore, ita vt videretur flaua bilis esse fuligini
admista. Quæ admodū autem vniōsa aqua &
frigida, * si confertim & intemperatius bibatur,
solet aquā inter cutem inducere (nocet enim sic
ingesta interioribus partibus, maximē verò ūa,
quæ

*Lien sanguine
alitur melan-
cholicus.*

*Lien induratio
ipsoq̄ confusa
tente iecinore,
aquā in tertium
otitur.*

*Regium morbus
percutit.*

*Frigida intem-
peratio calidius
sola a quam
intemperatē ef-
ficere, præcipue
si vniōsa fue-
rit.*

quæ tum temporis fuerint imbecilliores) sic ob refrigeratum vnam cum tumore lenem, vtpote si adsit icterus: vel citra tumorem, vt per iam nuper dictam aquæ portione, aqua inter cutem etiam venire conuenit. Exterum nisi ad hepatis vix ipsa refrigeratio pervenerit, aqua inter cutem subsequi potest minimè.

CAPVT II.

Dysenteria exquisita, intestinorū vlcus existit. Qui sanè affectus, non gignitur affatim, aut subito, vt ille quem vitio hepatis accidere diximus: sed prout quidem ab ipsius initio, bilis mor-
10 das excernitur, quæ deinde interaneorum abrasiones sequitur: postea verò paulim cruoris deici simul videtur, quando videlicet ipse affectus ijs esse dysenteria censetur. Cum itaq; huiusmodi abrasiones solæ excernuntur, considerandum est,

num pingue quippiam simul cum eis deiciatur: ita enim vlcus in crasis intestinis consistere, exi-
15 stimandum est. Vbi verò cruorem quoq; excerni videris, intui oportet, vtrum is reliquis excrementis adeo permixtus sit, vt vniuersis vniuersis miscatur, an pars eius aliqua reliquis super-
20 net. Et enim si admittis sit, in superioribus: verò supernatet, in humilioribus intestinis vlcus esse portendit. Idem etiam & in abrasis excrementis videre est, verum non ita manifestè, vt in cruore. Similiter crustula, quod nō in intestino sit vlcus, intui declarat, tum ex effluente proprietate,

tum ex modo, quo vel misceri reliquis excrementis, vel vni eorū parti supernare videntur. Nec
25 verò mediocriter cōducit ad curandū, nosse in qua intestinorū parte consistat vlcus. Nam si in superioribus intestinis sit, ab epotis medicamen- tis prædictum petendum est: si vero humilioribus hæreat, clystera subicere magis conuenit.

At huiusmodi dysenteria, ab us quæ ab hepate profluunt, sic ducitur. Nam ab initio tenuis sanies sanguinis ab hepate excernitur: deinde au-
30 ctō malo, crassius humor facibus vini laud ab- similis. Præterea, in hepaticis excrementis nihil abrasum expellitur, atq; interdum duorum, aut trium dierū intervallo, supprimitur evacuatio: dein rursus malum reuertitur, atq; excernuntur excrementa prioribus multo peiora. Id verò per
35 intestinorū vlcera laud quaq; apparet: quippe in iis neq; affatim, neq; ex longis temporis intervallis, laborantes deucere consueverunt. Porro vlcera quæ in recto intestino oriuntur (necimū vocant) vehementer quidem tensione, & prom-
40 pra deiciendi cupiditate insciant, paucis admodum sequentibus excrementis: quæ quidem ab initio pituitosa, & pinguis, progressu verò tem- poris, etiam ramenti specie deiciuntur: sed per totum morbi spacium, us quæ à supernis descen-
45 dunt, minimè misceri videntur. Iam verò vt doloris colici, nephriticūq; distinctio, in initio diffi- cilia est, sic circa id tempus, non ita magna præ- sidia differentia desiderant. Exterū & nausea, & vomitus, per id genus affectus virgēt: sed mul-
50 to grauioribus, & magis asiduis, dolēte colo. Euo- muntq; ita laborantes pituitosa quædam, atque corrupta: hac in re longè superantes nephritico: ac retinent etiam magis excrementa, vt ne statū quidem, neq; etiam rictum excrementa possunt,

Sæpenumero veluti circuire videtur dolor, modo hanc, modò illam partem infestans. Nephritici verò dolores eodem in loco stabiles, intesti-
55 iugiter. Cū itaq; dolor in loco fuerit aliore re- nubus, manifestum colicæ indicium portendit: si verò circa sedem renū infestet, vtriusq; conside- randæ sunt. Nam nephritici ab initio dilatas pu- rissq; reddunt vrinas: dein sequentibus diebus, crassum aliquid in ipsis subsidere videtur: demū areosæ minguntur. At in colica, si quid ab alio
60 deiciatur, id statim usum quodammodo est, & sæ- penumero aquæ supernare consuevit, similem habens bubulo sterconi consistentiam. Quin etiam cruciatus colici, quā nephritici, multo magis lenientibus minguntur clysteribus. Atq; inter-
65 dum evcnit, vt frigidū aliquo humore simul eie- cto, illico quiescat. Quare ipsum præsidia miti- gant, erit etiam curatius atq; prognostici. Nephritici etiam dolores, cum vrina exeat lapide, simul & solvantur, & locū affectum indicant.

Vt autē perferantur dolores vtriusq; pars eisdem auxiliis indiget, sic tempore subsequente ad præ-
70 scriptionem oportet diuersa præsidia adhibere. Cū autem omnia intestina ordine quodam à ventriculo ipso descendant, atq; omnium supre- mum, ieiunum sit: deinde, quod tenue vocatur: postea cæcum, quod vix ad usueras partes ex-
75 tenditur: deinde colon, quod ad superiores rever- titur partes, ita vt sæpenumero hepatis lenem attingat, satis mirari non possum, quo pacto ve- hementissimos quoq; dolores, quacumq; in parte
80 consistant, ab omnibus colo tribuantur. Igitur ob frigidum crassūq; aut etiam humore visci- dum, aut ob stantulentū spiritū, in corpore crasso densūq; aliquid intestini inferioris genitum, sed egredi nequeunt, excitat dolor consuevit: ve-
85 liementis quidem, ob intemperiem atq; tensionē corporū in quibus hæret impactus: longus verò, quia difficulter vacuatur. At dolor ille acer- bilissimus, quem ileon, voluolum & chordeaspion vocant, sublimioris intestinorū partes infestat,

adeoq; impellit ad vomitum, vt nonnulli sterces
90 per os reddentes, miserrima tandem morte mori- antur. A quo affectu vix aliquis vnquam eva- dere potuit. Itaq; nō ab re visum est medicis an- ti- quioribus, vel ab inflamatione, vel ab obstru- ctione aridi sterconis, omni huiusmodi tenuiū in-
95 testinorū affectū. Sunt & alia symptomata, quæ & intestinus & ventriculo simul affectus venire creduntur: vt quæ lienterias cordacas nominant, vbi materix ipse minimè mordaces existit. Et
100 enim vt mordaces ob mordendi vim omnia inre- stina ad excitationē excitant, sic nō mordaces, in testinorū imbecillitate sequuntur: quia retinere contenta ne exiguo quidem tempore possunt.

CAPVT III.

Igitur si nephritice repente incidat, lapide nota
105 tu digno, vel in renū aliquo, vel in vtreteris eni- impacto, dolorem excitabit haud abfimilem co- lico: verum dissingetur ab eo, per illa quæ in ca- pite præcedēte accidere colo affecto iā diximus. Vbi verò exis quæ in vrinis residet, aut ex la-
110 pide excreto, discerni ipsi dolores possunt, quæ- stioni nullus locus relinquatur. Poterō vbi dolor alterius repit, cum horum inordinato & vario,

Aqua inter cu-
tem gigni non
possit, nisi ad he-
par refrigeratio
pervenerit.

Dysenteria est
vici intestina-
rum.
Dysenteria
causa.

Intestinorum
qua nam ex-
creta sint,
crassioribus, an
tenuis, ab ex-
crementis di-
gnoscitur.

Intestini, super-
ius excreta
sunt, epotis medi-
camentis cōducen-
tibus, quæ ab
hepate profluunt,
sic ducitur.

Tinefisi deseri-
piti.

Colici doloris
nephriticūq;
circa præ-
cipue, eandem se-
re medendo præ-
tentionem deide-
re.

Colici doloris
à nephritico
quædam di-
stinguuntur.

Nephriticum
vrina qualis.

Colica excreta
ta qualis.

Intestinorum
et do.

Dolor colicum.

Ileoi.
Voluolum.
Chordeaspion.

Voluolum Labo-
rantes vix ab
quæm crassūq;
Voluolum nōq;

Lienteria ab-
laca.

*Herphricum do-
let cū horre-
mordato, ac
febre etiā mor-
dinata affli-
genti, quando
abfiffam fi-
guificet.*

*Renis evulsera
ni iudicia.*

*Caruncula cū
vrina excreta:
efficiatur a
viceratorum
renum fons no-
ta.*
*Pila fimilis ex-
creta, que in
vrina cer-
nuntur, non
gignit.*

*Diabetes.
Dyspnoea.*

*Vefica non tra-
hit a renibus.
Inflatio non
trahit a ven-
triculo.
Diabetes caufa
eft imbecillitas
renum.*

*Appetitus ra-
norum.*

*potentia di-
fi animale*

necnon inordinata febre affligit, si per primum decubitus atque in alterum latus permutatione, in ipso tunc dolente suspensi cuiusdam poderis sensum perperciat, abfcessum iam cōcrem esse conicere oportet. Quo concesso, pus mictum ut laborantem a dolore liberat, sic viceris in rene periculum affert: quod nisi illico cicatrice inducatur, vix curatio recipiet. At perscrutantis viceris notae ex vrina haud obscurè deprehenduntur. Adde quod laborans creberrimè in affecto rene dolorem sentit: atque interdum cum vrina exiguum pus velvè ab vlcerè excernitur. Similiter ramentum nonnunquam cum vrina excerni videtur: atque interim sanguis quoque, qui erosi iam viceris est indicium. Quamvis rupto aut referato aliquo vase, sanguis potest etiam profuere. Verum efficacissima exviceratorum renum est cōiectura, si exiguè quaedam caruncula cum vrina excernatur: vtpote quas renum essentiae partes, casque ut vehementer viceris erosionē aualis esse constat. At quae vna cum lorio excernuntur pilis similia, probabilis mihi visum est, ea in venis, quae in renum capacitate, gigni: id est ex crassa lentaque materia, quam calor callicet excoquit: cuius sane affectionis per diuretica speravi curationem futuram, nec vniquam me fecellit. Iam vesica, ubi longo tempore acres per ipsam vring transcunt, viceribus affligi solet. Est et abusus renū affectus, quo tenuis sanies sanguinis mingitur: cuius quidem existet causa, aut ipsorum imbecillitas renū, aut maxima relaxatio eorum meatuū, per quos ex vena caua in renes percolatur vrina. Atque ad renes quoque pertinere is affectus videtur, quem alij matellae hydropem, alij profluuiū vrinæ, alij diabete, alij dyspnoea vocant: qui certe gravissimè accidit. Quo morbo affectū, inexplabili fin vexantur. Quare et exuberant bibunt: & reddunt totum id quod biberūt, minime a sua qualitate mutati. Hic igitur renū vesicæ affectus, similes est leuati ventriculi, intestinorumque. Igitur ut ex ventriculo lecur per mesenterij venas, vel vii arbores a terra per radices, alimentum ad sese trahit: sic etiam renes sibi quicquid in venis est agnosum, alliciunt. Ceterū vesica non trahit a renibus: quemadmodum neque intestina a ventriculo: sed renes quidem per vterque excernendo in vesicam mittunt: ventriculus autem in ieiunio, per intestinū ab Herophilo dictū dodecadactylum. Proinde diabetes causa, seu imbecillitas, non potestum diutius continere vrinam, censenda est. Verumenimvero obicit aliquis: si imbecilli sint renes, qui fieri potest, ut vrinam ad sese tam celeriter attrahant? Cui quidem respondere licebit: quemadmodum canina apperenna, in ventriculi ore conficiens, non potest ipso sustinere pondus devoratorij, multa impetuose ingerere, eademque celeriter excernere cogit: sic in renibus etiam ferosi humoris cupiditate, vna cum virum imbecillitate accidere. Vnde & humida tem affatim trahere, & eam mox in vesicam pellere, ipsi renes coguntur. Quod aut vrinæ fluor repente evulsa possit, leuitas intestinorum non possit, vel vni nec canina appetitia: ob id sit, quia cupiditas qua cibum appetit venter, animale officium exstitit, quo citra sensum nostrū fungit u-

quaque potest. Renum verò desiderium est naturale, neque ab ipso sensu nostri afficiuntur. Proinde cum ad statū pervenit, ne sensum quidem mouet, quemadmodum apperenna canina. Porro laborantes vehementer huius, quatuor accidentiū discrimina a ponere solent. Vni, & quidem primū, vomitus est alter, vix ex per alium excretio, aut fluore, aut laxitate intestinorū: tertium, quod potius diutius quam par est, in ventriculo manet: quartū denique est diabetes, siue vring profluuium. Occurrit interdum affectus alius diabete simillimus, & quidem ob ciborum multitudinem, qui nec crudi permanent, nec deiciuntur per alium, nec plenitudine gignunt, nec etiam probe alere possunt, sed discuntur, dissipanturque. Cuius ut crebrior est, quam dyspnoea, eventus, ita faciliorem curationē admittit. Quippe si prius quidem ad summū pervenerit, ipsum cognoveris, haud ita difficulter curabitur. Atque is affectus, a celeri dissipatione ortum ducit, omnibus partibus attracticem, appetitricemque facultatē seruantiibus. At verò ingentis sitis, quae citra diabete accidit, causa est ventriculi, aut calida, aut sicca, aut vtrique intemperie laborans: maxime verò os ipsius: proximè ventriculo hepatis, sed maxime pars eius sima, simul inflammata mesentericis venis, & ieiuno, & ventriculo, atque cum gula, pulmone. Quarum partium incendium marcorum plurimum comitatur. Diabetes itaque proprius renum affectus existit, qui canina in ore ventriculi appetentē proportionē respōdet, accedente praeerea retentis facultatis imbecillitate.

CAPVT IIII.

Vesicæ superveniunt symptomata, partim cōmuna ceteris, veluti omnes ipsius prae ter tumores, dolores, & quae hos gignunt dispositiones: partim ipsi propria, vtrichuria, hoc est, vrinæ retentio: stranguria, hoc est, stillicidium vrinæ, praeterea immoderata vrinæ profusio. Quae quidem evacuationes vesicae cum meatu vtrunt, ipsa haudquaquam affecta. At verò stillicidium vrinæ, si ob vrinæ acrimoniam fiat, symptomata vesicæ est, affectus verò minimè. Si verò aut ab vlcerè, aut ab imbecillitate procedat, in vesicæ affectu consistit. Ceterum cum ab intemperie vesicae sit imbecillitas, propria ipsius actio laeditur, quae est vrinæ excretio: ad quam animal excitari solet, cum vel a multitudine contentae in ipsa materia vesicae grauat, vel a mordacitate convellitur. Quin etiam instrumentales affectus interdum imbecillitate inducere possunt: praeterea omnes intemperantiae, praecipue illae, quae saepe nonnulli eveniunt, cum frigore conspiciuntur. Ad haec, iscluriae symptoma supervenire solet vesicae, tanquam metendi instrumenti: interdum quidem, cum circa id quod in ea continetur, cōtrahi non potest, ut ipsum exprimat: interdum etiam, obstruendo inferiori meatu aut a crassie humoribus, aut a lapide impacto. Atque accidit nonnunquam vel ab inflammatione, vel ab alio id genus tumore, ut angustior reddatur meatus, vel etiam omnino obstruatur: Sciendum aut est, non vesicæ, sed metendi munus, veluti etiā deiciendi, non intestinorum officium, pendere a voluntatis imperio. Quippe vesicæ officium unicum est, cōtractio. At musculus qui

*Seimen volu-
mont, quod
acciden-
tum dicitur
a potione sub-
re possunt.*

*Sitis ingenui
causa.*

*Diabetes pro-
prio renum
affectu est.*

*Uthuria.
Stranguria.*

*Stillicidium vri-
nae quod hy-
pocysta vesicae
est, quando of-
ficio sui pro-
prio exstat.*

*Metendi mu-
nus non vesicae,
prodest a volun-
tate imperio.
Deiciendi mu-
nus, non intesti-
norum, est vo-
luntarium.*

VRINAE

vrinæ meatum in circuitu ambit, in origine cere-
visæ vesicæ potius, instrumentum est, cuius o-
pus ab electione excitatur. Similè quoq; & actio
nem & vsum habet musculus, qui recti intestini
partem extremam ambit: proinde ipsi resolutus,
neq; urinam vesicæ, neq; alius sterora, retinere
potest: sed præter voluntatem, & vtriusq; paulatim
effluunt. Quare suppresio vrinæ fieri nequit ob
afflictum spinæ, aut nervorum ab illa in dictos
musculos exortum: quod nonnulli putant,
credentes vesicæ officium à voluntate pendere
sed ipsius involuntaria excreto. Atqui vr non-
nulli tum vrinarum, tum excrementorum alui
deiectionem totam ab electione procedere exis-
tantes, hallucinati sunt: sic rursus alij, his è di-
verso totum hoc opus naturale purantes, ab sco-
po aberrant. Etenim cibi à ventriculo in inte-
stinum transmissio, tota naturæ opus est: volun-
tas autem, extensio digiti. At alui deiectio, & v-
rinæ redditio, vtroque instrumentum propriis suis
facultatibus operante, perficitur. Rectum enim
intestinum, atque vesica, naturali facultate vtun-
tur: musculus verò, ea que animalia & volunta-
ria vocatur. Quippe musculi qui solent cohibere
fluores, ab opere quiescent, abdominis mu-
sculus munere suo fungens: maxime verò medi-
ca. Quum igitur vesicæ corpus ita fuerit affec-
tum, vt quod in ea cõnuerit exprimeret & neque-
at, vrina supprimitur, vocaturq; symptoma id
ischuria. Accidit etiam interdum, propter ipsius
sensum obtulsum, vt uõ reddatur vrina, citra
tamen expultricis facultatis lesionem: nimirum si
propter vicium nervi afficiatur, nervus musculi
teruicem eius cõstringentis, munere suo fun-
gentibus. Qui quidem si resoluantur, vrina præ-
ter voluntatem excreminur. Ob spinæ etiam lu-
xationem ad interiora, supprimi aliquando vri-
na cõsuevit: orta videlicet phlegmone in affec-
ta particula. Quemadmodum vertebrae ad ex-
ternas partes lutas, invito vrinam produere vi-
dimus, ob resolutum neruum musculi vesicam
ipsam claudens. Retenit enà longo tempore
vrina, vel ob somnum diuturnum, vel ob nego-
dia virgentia, ipsa vesica extenditur, atque vrina
supprimitur: contrafrice facultate propter ten-
sionem immodicam lesa. Præterea ob saguina-
grumum & pus crassiusculum, internum retine-
tur vrina. In pueris etiam, quos lapis in vesica
cruciabat, vidimus siperuicem ipsam vrinam
supprimi. Eos itaque, reliquo figurato corpo-
re, adeo concussis, vt à meatu lapis dimoue-
retur. Ceterum grumosa vocatos, non solum eos
qui in vesica, sed multò magis illos quoq; qui in
intestino, ventriculo, atque e thorace nonnunquã
continentur, animi defectio, & color pallidus se-
qui solet: pulvis verò parvus, & obscurus, & fre-
quens apparet: laborumque ipse, cum anxietate
resoluitur. Sunt autem ad intentionem affectus
sedis, non solum præsentia symptomata, sed præ-
terita etiam inuestiganda. Nonnihil enim com-
fert quantitas puris (si quando excreminur)
& milturam cum vrina, considerate. Nam
si pus cum lotio exactè permixtum sit, à superno
aliove parebus effluit. Si verò sine vrina ex-
creminur, in vesica consistere suppurationem indi-

cat. Sed quod median inter hæc conditionem
seruari erit, id à renibus descendisse, certum indi-
cium est. Similiter expendendum est, si rupta vo-
mica, cum non affecti loci, viceris aliquod quo
que signi appareat. Nam & hoc, aut exactè, aut
mediocriter, aut omnino nihil cum vrina misce-
tur. Atq; vocarum quidè remeuit, viceris: efflu-
entia verò, proprietas, affectus partis proprii indicij
est. Quippe partes à vesica anast, lamina renib-
verò, sunt carunculis similes. Similiter vbi ex sub-
limioribus pars aliqua affecta est, excrementa cõ-
vrinis electa intuent, & ea suspectarum partium
essentia cõparare oportet. Igitur cum vrina ex-
purgitur gibbæ hepatis partes, atq; omnes quot
quot his superiores existant per alium verò pars
iecinoria sima, intestina, ventriculus, lien. Præter
has alie quedam sunt purgationes, sed raro: vt
quæ thorax & pulmo per alium purgatur: quæ
sub septo transuerfo sunt positæ partes, per vri-
nas. Vidimus etiã nos pulmonis vomica expur-
gari similiter per vrinã: reiecto videlicet purè, à
pulmone quidem per laeuem arteriam, in sinistram
cordis ventriculũ: à corde autem, per arteriam
magnã, ad renes: atque effluunt tandem per vete-
ras ad vesicam. Etenim vt à concaua vena, ita ex
magna arteria, rami ad renes descendunt.

CAPVT V.

Vteri affectuum plurimè differentie existunt.
Siquidem mulierum que historici dispositiõibus
corripuntur, alie quidem sine sensu immo-
biles iacent, cum obscuro paruq; pulsu, vel om-
nino sine vilo pulsu. Alie autem sentiunt, atque
moueri possunt, integrâ ratione fiunt, sed
tamen de liquio animi, difficilib; spiratione labo-
rant. Alie denique crura simul & brachia con-
trahunt. Porro nonnulli ad explorandum, nutu
penitus respirano perirent, si oculos lang carpti,
suspendi cori naribus iubent. Alij pocolũ acque
plenum cori vtriusq; imponunt. Quippe immortu
omnino seruari humore aient, si spiratio tota sit
intercepta. Etenim in cõficio est, & spiratione
à vita, & vitæ à spiratione separari nõ posse:
ad vt viuente non spirare, & spirante non viuere,
sit impossibile. Quod si in animalibus, quæ in la-
tebris delitescunt, nulla appareat respiratio: no-
ta, neq; ob id mirari debemus, quum videlicet ea
animalia sint frigida. Quippe maximus vius res-
pirationis est, vt intus calor & refrigeratione
& ventilatione fructuet. Quare hand ita difficile
fuerit pendere, exiguum illum calorem in es-
derelictum, arteriarũ cordisq; motu seruari: quæ
actio à quibudã medicis transpiratio vocatur.
Similiter autem, percutere ob vteri affectum spira-
tionem, quoniam viuens corpus refrigeratur,
(id quod perspicuum est) fieri potest, vt à nullo
attracto peros spiritum, aut reddito, transpiratio,
que per arterias fit, periret, licet adeo inter-
dum exigua, vt sensum omnino effugiat. Aggidit
aut vteri affectio magna ex parte vidus mi-
60 lioribus iis præsertim, que quum antea probè
purgarentur, parent, atque viorum con-
gressu fruerentur, his omnibus postea priuati-
tur. Quare verisimile est, ob retentionem istam,
vel semem cohibitum, eiusmodi mulieres vteri di-
spositionibus insectari: idq; fortasse magis ob se

Ischuria quan-
do accidat.

Vrina suppres-
sa causa.

Ischuria quan-
do accidat.

Ischuria quan-
do accidat.

Ischuria quan-
do accidat.

Pus si cum vri-
na excreminur,
milturam ipsam
esse consideran-
dam.

Ramenem est
signum viceris.
essentia proprie-
tatis, affectus
partis, indicij
est.

Partes à vesti-
ca anast, la-
ma, a renibus
sunt caruncu-
lis similes.
Partium sinu-
la per quam re-
gimen purga-
tur.

Pulmonis vomica
cum alijs
per vrinam
purgantur.
Arteria ma-
gnam rami ad
renes.

Vteri affectus
plurimè differe-
rentia.

Respirationem
penitus conser-
uare non pot-
est, quibus mo-
tus deprehend-
atur.

Spiratio à vita
separari non po-
test, nec à respira-
tione, vita
vita.

Respirationem
vita.

Lactatione a-
nimalium in ca-
vis, vnde car-
ni transpiratio
transpiratio.

Transpiratio
per arterias.

Vteri iusticia
quibus præ-
sentia & præ-
terita.
Vteri iusticia
ob rationem
finit vel cal-
idum vel frigidum
sunt accedens.

Semen mulie-
bre quale.

Semen retentum
nonnullis vero
qua symptomata
inducit.

Semen retentū
nonnullis
quoniam causet
grauia sym-
ptomata.

Libidini indol-
gere multo mo-
destius viros va-
lens gra-
uitate.
Diogenes Cyri-
cus.

Animalia om-
nia que paulo
excitantur ad
venenum.

Phalanga nūm.

Scorpius in-
tū.

Torpedo ma-
rina, piscatorum
manum reddens
torpidam, per
medicū erudi-
tum.
Herastum lo-
pu.

Veneno exten-
ditur, quomodo
distinguitur
ab aliis que ob
prauum corporis
succum incedunt.

men retentum. Nam quoniam muliebres semen hu-
midius atque frigidius sit, ipsum externi oportet,
praeteritum si copia redvndet. Nec secus etiam in
viris. Sunt quippe nonnulli eorum, quos promi-
nus ad iuuenture, concubitus inbecilliores red-
dat. Alii, nisi assidue coeant, capitis grauitate in-
sistunt, cibos falsitudinis, febribus inter obnoxii, dete-
ritus coquant & appetunt, ac denique torpore, pi-
gritia, ac melancholicis accidentibus molestantur.
Proinde ex retento semine, quoniam ex suppressis
menstruis, videtur mihi longe maior noxa eveni-
re posse corporibus, eorum praeteritum, qui suapte
natura vitiosis abvndant humoribus, plenius sunt,
& in oculo educantur, quoniam antea nihil fecissent
ad libidine reliqui, assatum continere ceperant. In
quibus sane concilio, naturale excernendi ipsum
cupiditate, rationis causam existeret. Etenim quoniam
tale & tantum ipsum semine evaserit, neminem non
ad sui excretionem vel quoddam stimulat. Ob idque plane
constat, modo citius viros, non ob volupratem, sed
ut ab impedimento praeteritum, indulgere
libidini, perinde ac si nulla sit ei coniugata volup-
tas. Ita Diogenes Cynicum narrat, virum alio-
qui mortuum omnium (quod ad concinnam
pertinet) constantissimum, libidini tamen navasse ope-
ra, non ad concinnam illi voluprate veluti bono a-
liquo, illectum, sed ut noxam, quae a retento semi-
ne provenire solet, arceret. Eum namque meretricem
adire pollicita, quam diutius cessaret, ipse manu
pudendis admota, semen excussit, ac venientem
deum mulierculam remisit, inquit: Manus hyme-
neum celebrando praevenerit. Sic etiam arbitror
animalia omnia excitari ad coitum, non quod ex-
sistunt voluprate boni cuiusvis speciei praese-
ferre, sed ut semen, quod retentum ipsa molestat,
excernant: haud secus quam deiciunt stercores,
excernendūque vinum desiderio suapte natura mo-
ventur. Fieri autem potest, ut profluentibus men-
struis, retineatur in viduis semen, grauisimamque
inducat symptomata. Nec sane cuiuspiam mirum vi-
deri debet, si exiguus humor in vna parte concen-
tratus, tantorum accidentium sit causa: quoniam a phalan-
ga ictu affici totum corpus videatur, exiguus veneno
per minimū foramen injecto. Praeterea scorpio-
nis ictus breui admodum tempore grauisima
symptomata inducit, quoniam vis in illius aculeo for-
me nullū videatur. Rationi tamen est consonum,
ut vel a spiritu quodā, vel tenui humilitate inue-
cta, accidentia illa proficiantur. Sunt qui putant,
res quasdam solo tactu per qualitatē vim, ea quae
ipsis vicina sunt, alterare possidentibus planē videri, ea
in marina torpedine aut, vipote cui tā vehemens sit
potentia, ut per piscatoris tridentem transmissa
ad manus alteratione, totū reddat repente torpi-
dā. Similis etiā facultas inest Heraclio lapidi: fer-
rum siquidē, quod tegerit, ei adhaeret. Deinde si a-
liud, id quod primo tactum fuerit, tegerit, simili-
ter ut primū illi inharebit: ac sic deinceps. Porro
idem affectus oriri possunt & ab humoribus
in corpore putrescentibus, & ab epoto veneno.
Sunt tamen qui venenum hauserunt, ab illis qui aliter
sunt affecti, discerni possunt. Quoniam enim homo
suapte natura probus succis abvndans, ac & salu-
bri secundū omnia usus victus ratione, repente
moritur (ut letali assumpto veneno fieri contin-

git) deinde corpus aut livens, aut nigricans, aut
varium apparet, aut dissilans, ac aut grauem red-
dit odorem putredinis, hūc venenum sumpsisse
aiunt. Igitur si cuiusmodi affectibus non insisteret
fateamur, qui ex nobis inmensis accepto suo ori-
ginis impetu, similes sunt us qui epoto veneno
eveniunt: nihil mirum fuerit, si etiā venatū semine,
aut menstrui, huiusmodi, quod reti nectat, aut pu-
trescit in corpore, grauia symptomata inducat,
us praeteritum, qui ut afficiantur, sunt apti. Siqui-
dem quantū vim habeat efficiendū rei aptitudo,
in canibus licet videre. Quoniam enim reliquorum
animalium nullum rabie arripitur, solus canis
eo affectu corrumpitur, tantāque firmitate ipso humorū
corruptio, ut vel solum eius ipsarum, si humanū
corpus cōgesserit, rabie excitare sit potens. Quod
vero ad gignendos veteri affectus maiorem vim
habeat semen quoniam menstrui retentum, vel ex
hoc liquet, quod dum supprimuntur menses in mulie-
ribus cōiugatis, etiā pluribus accidentibus in-
fesiunt, nunquā tamen aut spiratione priuatur,
aut animae deliquo laborant: quod solent non-
nullae viduae, licet aequae ut antea, aut paulo mi-
nus, quod peruenit ad menstrua, purgare. Quae
sanē symptomata Plato exponere cupiens, sic in
Timaeo edidit: Ea pars quoniam in mulieribus & va-
teris & vulva nominatur, quoniam fir animalium
dum generandi, si irrempitū diuini insecundū
manerit, admodum indignatur, erransque per to-
tum corpus, ac meatibus spirituum obstruens, rei
spiratūque non sinit, in extremū anxietatē addu-
cit, & alios morbos complures exorat. Haec Plato.
Ceterum illius agitationis veteri, quam malig-
tes percipiunt, non est causa ascensus eius visus ad
regionem diaphragmatis, vnde nulli putarunt.
Nam si aliquid ex vtero videatur ascendere, id quod
exiguum est. Sed veteri ipsius tensionis esse po-
tius in causa dixerim, cuius tangentibus obstru-
bus, modo sursum, modo retrahi in larus videtur.
Nam simul cum vtero, ceruicē quoque ipsius
retrahere necesse est. Quoniam igitur ad vterum malis
admodum venarum ora perveniant, per quas
ex cōcava vena sanguinem attrahere possit, & fa-
uē ob plenitudinem earum earum, tum vinculo-
rum quae ex illis dependunt, cōtingit vterum sursum,
aut etiam ad larus retrahi: Siquidem omne con-
vulso firmitate a plenitudine, aut ab inanitione. Ple-
nitudine quippe, repleta corpora & in larum, & in
profundum extendit, sed longitudo reddit bre-
uiorem. Quod autem breviora sunt, eo magis ad
suam originem retrahuntur. Dum itaque descen-
dens sanguis ad vterum, ingredi ad ipsius inter-
nam capacitatem non potest, aut quia crassior est,
quoniam vel vasorum ora permeare possit: aut quia
clausa sunt ostia, multiplicatus in venis, eas ex-
tendit, atque vicina ipsius vincula madefacit ad quo-
rum omnium tensionem, continuo vterum re-
trahi est necesse. Quoniam si vndique trahatur aequali-
ter, recta erit & sine inclinatione ipsius transmu-
tatio: sin vero inaequaliter, ad partem vehementi-
us trahentem intenditur. Non ergo vultu ani-
malis errabundum, aliis ad alium locum discurrat
in mulieribus, vterus, sed ab extensione retrahitur.
Quod si quispiam dixerit, veteri corpus tunc mi-
nimū affectū esse, sed pervectione laborare, haud
abfur-

Afficienda ra-
tione, ma-
xime ad ex-
citandū affec-
tus. Causa fuit ra-
tio corrumpit-
ur, quoniam
tamen excen-
dit illi potius.

Plato.

Timaeus.

Vterum non
ascendere ad
regionem dia-
aphragmatis per
veteri affec-
tus, sed tam-
quam ipsum, cum
vtero rursus ten-
do per rationem
videtur vane-
rari.

Cum vultu ani-
malis sit aut a ple-
nitudine, aut
ab inanitione.

hic.

hic.

hic.

hic.

Vteri peruer-
siones ad super-
flua suppleant
inmensa.
Vicia que ab
que vteri per-
uersione re-
ducantur male-
fide, ob retentum se-
men ardeat.

Menstrua defi-
ciunt mulieri,
cui lac iussu
nec pregnan-
ti, nec cunctis
in puera.

Menstrua defi-
ciunt, que pe-
cto deprehendit
nec, an sit
grauida me-
lior sit nec.

Colo intesti-
ni suppurari
interdum iux-
ta bubones.

Suppressio men-
strua signa
sunt symptoma-
ta.

Menstrua flu-
tia immo-
di, que a supple-
mentis.

absurda is dixisse videbitur. Igitur peruerisiones
vteri, eo quæ duximus modo, ad suppressa sequi
tur menstrua: eas tamē ob hoc, accidentium quæ
in animalis corpore apparent, causas esse, nequa-
quam putandum est. Quæ verò citra peruerfio-
nem, aut mensurorum retentionem, viduas mo-
lestias noxæ, hæc ob retentum semen evenire pu-
tantur. Cæterum pro multitudine, qualitatise
ratione, tum mensurorum, tum feminis, aliis a-
liis accidentium species oriri solent. Etenim
10 xia causa vniuersum corpus refrigerare potente,
adeo vehementer omnes partes refrigeratur, vt
& respiratio, & arteriarum pulsus, sensu depre-
dendi non possint. Quæ si vel crassa fuerit, vel a-
cria, cōvulsiones: si verò atræ bilis naturā refe-
rat, morbiā inducit: quæmodum animi quoque
delequa, & ad fortes extensiones, & refrige-
rationes, & oris ventriculū affectus, subsequi cō-
sueverunt. Porro si mulier nec prægnans, nec
puerpera, lac possideat, menstrua ei defecerunt.
At nullo in mammis lacte apparente, menstrua
suppressa hisce notis deprehenduntur. Grauitas
totum corpus infestat, necnon fastidium, atque
inequalis horror. Quod si citra horrorem inæ-
qualitatis aliqua fuerit, atque fastidium, appetat
mulier quædam aliena, vt (exempli gratia) extin-
ctos carbones, iube vt obsterix vteri ceruicem
tangat. Nam si citra duntaxat clausa inueniatur,
eam prægnantem esse conicies. Si verò etiam du-
rities adit, affectum aliquem in vtero esse portē
20 d. Oportet itaq; speculā obstericem, ad quā
partē vel declinet, vel retrahatur vterus: nā in ea
parte affectū vteri sedē esse conicies. Atq; in qui-
busdā feminis, eius pars dolor cum grauitate,
nōnihil potest significare: quæ in coxā dolor
interdum transit, & crus ipsū, qd ē regione est,
per incessum claudicat. Quod si lōgiōri tempore
supprimatur menstrua, nullūq; medicus mulie-
ri vacuationē, pmoneat, tumor aliquis præter
naturā in ilibus interdum oritur, ostendens nimis
ex internis partib. quāpiā esse inflāmatā.
Nonnullis panus in extrema siū parte excita-
tur, vel vti vtris quoq; eo dem in loco nōnunquā
oriri solet. * Qui panus in quadam muliere fuit
suppuratus, adeo vt opus fuerit sectione. * Luxta
hāc ipsam partem vidimus colou intestinum &
suppuratum, & sectum: interdum ignorātib. me-
dicis imperitis quidā incidere, interdum in-
telligentibus quoq;. * Cæterum quoties suppu-
rari cōtingit colou, semper facili curationem re-
cepit: vteri verò sectiones, ægrius cōglutinūtur.
Itaq; symptomata huiusmodi consueuerunt fe-
qui suppressa menstrua: ac præterea lumborū, &
collis, & scincipitis dolor, qui ad oculorū vsq; radi-
ces extenditur: item febres ardentes, & nigrican-
tes vring, cum rubra quadā sanie, perinde ac si a-
que, in qua nuper macerata carnes ablutū fuerit,
fuliginem quæ miscuisset. Quibusdam vrina ad
difficiliter redditur, aut omnino supprimitur.
Quod si per alium quempiā corporis locum san-
30 guis effluxerit, aut inflāmato, aut erysipelas ex-
citerit, an menstrua purgentur in interrogare de-
bes. Siquidem nihil horum accidere solet, iute-
gre repurgatis. Quam verò immodice vacuitur
menfes, color sequitur fuscus, pedes molli tumo-

re attollitur, corporis robur prosteritur, viria-
tur ciborū tum cōcoctio, tum cupiditas. Sed ac-
cidit interdum feminis muliebres vocatū proflu-
uium, vel vtero haudquaquā affecto, quū videli-
cet vniuersum corpus per ipsum interdum purga-
tur: quæmodum per renes quoq; aliquan-
do solet vacuari. Id verò potissimū fit, si mulier
laxis sit carnis, & piruosa. Atq; id quod excer-
nitur, nōnunquam rubra sanie est, interdum a-
quosa, & sup pallida. Quod si purus fuerit san-
guis, qualis ex dissecta vena prodit, diligenter
animadvertere oportet, nam erosio fit aliqua in
vtero. Ea verò magna ex parte in ceruice potius
quā in alibi cōtingere solet: discerniturq; per ex-
cretā sanie, si fuerit profunda: si verò circa os cer-
uicis cōstiterit, nō solum per hæc, sed per tāclū
etiā cognosci potest. Atq; prægnantes quoq;, quū
ora venarū in ceruice aperiantur, excernunt san-
guinem. Ergo si mulieri vtero graui, subito exte-
nuetur mīma; abortus sequitur. Atq; geminos
ferens, si altera mīma extenuetur, alterum amit-
tit: & omnino si dextra mīma extenuata est, mæ-
re: si sinistra, foetū dēdet. Mares siquidem dex-
tris, foetūq; magis cōtinentur si sinistris vteri par-
tibus: atq; rariō aliter accidit. Si mulier promptē
quidem conceperit, dein secundo, aut tertio, aut
quarto impregnationis mēse ferens elecerit,
circa vteri acetabula humorē piruotum abv-
dare, atq; idcirco venarum arteriarūq; eius lo-
ci ad ora vāorum in vterum descendentium, ne-
zum debiliorem esse, cōciendum est, vt factum
ob grauitatē ferre nequeat, sed abrupatur facili.

CAPVT VI.

At colis vici deprehenditur ex dolore in-
stante ipsum: necnon ex iis, quæ familiaria viceri,
vnā cum vrina purgantur. Cæterum hæc ab iis
quæ a vesica excernuntur, miscellū modis distin-
guit. Nam quod ex cole debuit, in primo statim
exitu excussum, vrina præuenire cōsuevit. Quod
verò a vesica emittitur, vrina admittum viderur.
Quieniam assidue inter meciendū mordicus dō-
lent pudendorū vlcera, præcipue quum vel cr-
istula, vel fordibus solutis, pura remanserint. Por-
rō gonorrhæa est feminis assidua excretio, & in
vita, quæ sit cole haudquaquam extenso. Priapi-
smus verò est permauens colis tumor extensiove
in longitudinem atq; circulum, nullo stimulante
ad libidinem aut desiderio, aut acquisito calore,
vt quibusdam consuevit accidere, qui stipini de-
cumbunt. Igitur quæmodum omnia corporis
nostrī excrementa, duobus modis vacuantur
(interdum enim a cōninentibus ipsa corporibus
excernuntur, interdū spontē profusant, eo quod
ob imbecillitatem ab ipsis retineri nequeant cor-
poribus) ita de femine quoq; dicendum est. Nam
in huiusmodi omnibus, vt excernere tēpestiue,
ira continere, nature est officium. Verū secre-
tio fit, aperto fluxu ius meatu: ac reliquo conce-
pitū spatio & contracto, & ad apertum ius
meatum, quicquid intrus continetur, pellente. Re-
tentio fit, quum clausus maner meatus, & cōten-
tum a continente haudquaquam impellitur, sed
potius per contractionem comprehenditur, &
retinetur. Hoc modo cōtenti in cauis instrumē-
tis humores, per integram valerudinem natura-

Prægnā mul-
iebres causa.

Prægnā si ex-
tenuetur mī-
ma, abortus se-
quitur.

Mares continē-
tur dextris, si-
nistris vteri.

Colis vici va-
de deprehendit
tur.

Excretio a cole
ex vesica, quo-
modo distinetur.

Constrictio
est feminae
assidua profusa
in vita, quæ sit
cole haudqua-
quam extenso.

Priapiasmus
quid sit.

Excrementa sup-
per duobus modis
vacuantur.

Excretio quo-
modo fiat.

Retentio vt
fiat.

liter & excernuntur, & retinentur. In illis autem qui præter naturam se habent, retentio quidem, ob excretis facultatis imbecillitatem: excretio verò, ob retentis infirmitatem evenit: vel ob dispositionem aliquam, quæ haud secus quàm naturalis ipsa excretoria vis partes mouere possit. Id quod in feminariis vasibus videtur licet, ubi quis vel comitali morbo, vel convulsione violenter fuerit correptus. Cæterum videmus alias quoque partes, ut manus, pedes, aut digitos convelli, modò simul cum totius corporis convulsione, modò ipsis solis affectus. Quare minimè præter rationem fuerit etiam in seminariis vasibus, & quidem interdum solis, eiusmodi excitari dispositionem: quænammodum & gonorrhæam, quæ vrinæ, quæque in vasa emittit, proportionem respondet, quæm retentum videlicet facultatem resolui contingerit. Gonorrhæa igitur in ista mentorum semina est affectio, non pudendorum, quibus crura via per quam excernatur, vniursem. Priapismus verò planè colicis est accidens, quæquam ad arterias eius potest referri: vrpote quæ solæ interdum huiusmodi labetur præter naturam dispositionem, quæ ab affici cõsueverunt, quæ naturaliter totus coles intenditur. Atque à spiritu ipsum in tumorem attolli, manifestè patet iis, qui celeritatem eius, & quum iterum resider, perpendunt. Quippe liberis humor tam subitam in alterutram partem mutationem efficere posset. Quum igitur pudendi corpus sit vniuersè fistulosum, facile à vaporoso spiritu per arterias affluente, ubi quis libidinis impetu stimulatur, aut dum ob supinum decubitus calfacti sunt lumbi, extenditur: glande ipsius semper magnitudinem æqualem seruante, quod fistulosus in ipsam nervus non ingreditur. Natura etenim corporis partes fugiens, perficiensque, sicut ut ipse citra doctrinam, proprias actiones aggredietur. Quippe omnium quæ à cõsilio & voluntate pendunt actionum instrumenta, esse per se docti videntur: animaliaque omnia simulataque genita sunt, & spirant, & vocem edunt. Quare mirum esse non debet, genitales partes, eas actiones, quarum gratia à natura sunt infusuræ, protinus ab initio cognoscere. Vterus siquidem, quum semine genitale conceperit, donec fuerit perfectus factus, exactè clausus permanet: perfectò verò factus, plurimum aperitur, ac deinde sic apertus excludit. Populares autem hæc, propter creberrimum eventum, continentur: vrpote qui nihil quod re vera sit admirabile, sed ea duntaxat, quæ rara vident, prosequuntur admiratione. Quid autem in rerum natura potest admirabilius contingere, quàm quod nouem perpetuis mensibus claudatur eo vteri adeo exactè, vt ne specilli quidem acumen admittat: potest autem factu, vique adeo didenditur, vt totum animal per ipsum egredi possit? Ne igitur dubites pudendorum vim per se docti esse: vt fistulosum locum, nervosumque corpus, ubi ad coitum insurgit animal, à naturali caluitate, quæ ipsum potest attollere, protinus distendatur. Cuius rei simile, & in corde, & arteria planè videtur est: nisi quod horum motus perpetuus existit, quæ necessaria nobis est eorum actio: fistulosus verò nervus non semper monetur, sed quum vi-

sus requirit. Quum ergo sic fuerit extensus, sequitur atque illud replet ex arteriis spiritus: quodmodum pulmo thoracè, ob eam habere ad ipsius morum consequentiam. Atque eam actionem satius est vt ad verum, quàm ad arterias referas: quum præsertim omnes functiones, ex propria partium essentia, non ex earum situ, venire, rationi cõsonum sit. Arterix itaque nulli aliè in pudendo habet actionem vim, quàm in vniuerso corpore: licet calfactus lumbis par sit, vt arterix calidiores reddatur, & magis etià pateant ipsarum ora. Quam ob rem non exigui tunc spiritus essentiam, in fistuloso nervo effunditur: qui paulatim impletur, cõsule extenditur, ita vt tota ipsius essentia consistere in fistuloso nervo videatur. Ex dictis igitur constat, vel ob arteriarum ora immodicè patrefacta, vel vaporoso spiritu in fistuloso nervo ortu, priapismum oriri. Cæterum ab vniuerso ipsum fieri posse existimo, crebrius tamen ob arteriarum ora patentia. Porro medicamenta excitantia tenuissima vim obtinentia, tum epota, tum pubi lumbisque admora, calida omnino, ac flauulenta sunt: quæmadmodum cõtraria omnia, minimè status excitant, ac potius refrigerant, quàm calfaciant. Sunt præterea alimenta quedam, quæ, plurimum ignem seminis, excutere ad libidinem possunt. Li vè quæ quum plurimum semine abvndent, à cõcubitu abstinent, interdum priapismo vexari solent, præsertim si venereis imaginibus molestantur, nec studeat vt multa exercitatione sanguinis abvndantia dispent. At cantores & athletæ, qui iam inde ab initio nullam viæ partem venereis illis cecris contemnantur, nulli admittentes eiusmodi vel cogitationem, vel imaginationem, iis pendenda & exilia, & rugosa fieri, vel vti senibus, cõsueverunt. Siquid præter cetera quæ accidere solent iis, qui protinus iuuentute prima immodicè se se permiserunt libidini, id etià evenit, vt horum locorum vasa, amplius patentia, maiorem ad se sanguinis copiam alliciant, & cõeundi cupiditas magis increseat. Ignavia siquidem (vt inquit Plato) exoluit propriam autem officii exercitatio, robur augere solet. Sic mamma quoque, in iis quæ nondum impræguatæ fuerint, cõtractæ permanent: in aliis verò à partu in fantasmas suos lactibus, vastissime evadunt, atque ita magnè permanent, hæc fundentes quandiu lacti lactauerint: quo ablato, haud ita multo post à lactis generatione desistunt.

GALENI PERGAMENI de differentiis febrium, lib. I.

CAPVT I.



Roprix ac maximè principales febrium differentie sunt, quæ sumuntur ab ipsa febris subtilitanta, quæ in calore præter naturam consistit. vt si dixerimus, febrium alie quidem mordaces, alie verò sunt mites. At reliquæ differentie, ab accidente aliquo deducuntur: vt quæ dicimus, febrium alie pallide, alie ruber, alie liuidæ. Porro differentie caloris præter naturam, & ex eo quod magis & minus, & ex materia in qua calor accenditur, & ex modo motus eiusdem caloris, sumuntur. Sunt autè omnino euentes, quæ

Priapismus
ad verum
posse
esse, quæ ad
arterias.

Quæ in
fistuloso
nervo
posse
deinde
reddantur.

Priapismus
tota in nervo
fistuloso
consistit.
Priapismus
vniuerso
corpore
excitantia
tenuissima
vim obtinentia.

Alimenta
a venereis
Purpura
quæ
fistulas
venarum
plurimum.

Cantores
quæ
fistulas
venarum
plurimum
vires
reddunt
cõtractas
& rugosas.

Ignavia
robore
exoluit.
Exercitatio
vires
augere solet.
Mamma.

Remanere
in vasa
per
convulsiones.

Gonorrhæa
in
seminariis
vasibus
est
affectio.
Priapismus
colicis
est
accidens.

Colicis
a
spiritu
intenditur.

Glândam
pudendi
semper
magis
tendit
ad
tendendum
eandem
ferre.
Partes
omnes
extra
doctrinam
aguntur
propriis
fuerint
eius.

Populares
ea
tantum
quæ
re
vident,
prosequuntur
ad
admirationem.

Febrium
differentie
maximè
principales
sunt
quæ
sumuntur
ab
ipsa
febris
subtilitanta,
quæ
in
calore
præter
naturam
consistit.

quæ in eo quod magis aut minus calor est accens, consistunt. Quo in genere differentię, cōsueverunt medici magnam ac parvam febrem vocare, improprie quidem rei quali, nomē quanti tribuentes. Quæ verò à calidioris materia ducuntur, maximè propriè differentię caloris præter naturam sunt. Atq; hæc sanè ternario numero ambiunt. Nam aut incalēscit ipſius cordis corpus: aut qui continentur in ventriculis eius humores: aut sola quidem æræ spiritalisq; substantia sufficēter incaluit: humores autem & solida corpora incalēscunt quidem adhuc, nōdum autem sunt calefacta. Māsi siquidem est in arteriis omnibus spirantibus per infinita foramina, æræ substantia sanguini, ac nullo minus in corde ipso, ceu + consueti: & conspicibili cum vniuersis arteriis. Incipit itaque hic præter naturam calor, quem nōmanius febrem, alijs ex alio eorum, quæ nuper diximus: pergitur autem, atque vni cum patiente afficit duo reliqua genera. Facillimè igitur ab humoribus ad spiritum caliditas transumpno: nō æquè autem promptè vni cum spiritu, accenduntur humores. Corpus enim solidum, humoribus atque æræ substantiæ facilius impartitur calorem, quā ipſum ab eisdem suscipiat. Omnis siquidē substantia tenuis, promptius alteratur quā crassa. Est autem tenuissima quidē æræ: crassissima verò corporum solidorum: media humorum substantia exiit. Ceterum solidas partes, continentia: humores, contenta: spiritus, impellentia appellauit Hippocrates.

CAPVT II.

Quod igitur ex laboribus, ira, tristitia, solis ardoribus, frigore, vigiliis, cruditate, ebrietate, & crapula, nonnulli febres accendantur, omnib. est in confesso: quemadmodum etiam, quod pestilens æris consensio febres conciliet: quodq; periculosa sit conversatio cum laborantibus pestilenti morbo, quoniam nimirum si non fecus sit contagiosus, quam scabies aut lepra. Sed neque ratum est cum iis qui tabe correpti sunt, cōversari: in eo (vt summam dicā) cum illis q; spiritum putrem reddunt. Iam verò qui consueua exercitia omiserint, & aliis morborum generibus, & febribus maxime corripiuntur. Plethora etiam, vino si cibi, medicamenta, æstusq; circa canis syderis ortum, atq; alia id genus complura, similes febres accendunt.

CAPVT III.

Igitur calidum, frigidum, humidum, atq; siccum, corporum elementa existunt: ex ipsoeumq; temperaturis primi constituntur morbi: quorū vnus est febris, vbi in corde quædam præter naturam caliditas generatur. At differentię caloris, à triplici differentia materię desumebantur. Siquidē vel in ipso corpore cordis, vel in humoribus, vel in spiritu, calor præter naturam accenditur. Præcipiant autem causæ quædam notissimæ, in omni febrium constitutione, quatenus dictum est. Sed neque sat est, si calor aliquis dicatur esse præter naturam, ad hoc vt dici febris reatur: oportet siquidem prius vt cor illo incalēscat: alioqui calor à sole aut ab igni inductus, febris esse dicendus. Porro iracundia est veluti

feruor quiddā, ac motus vehemens potentia irascibilis, in corde + delitescens. Simul autē cum eo seruire calit aliquando spiritus, aliquando substantia sanguinis. Quod si ita contingit, vt ea corpora que in se admixta caliditate, longo eam tempore retinere sint apta, licet motus cordis sedetur, in hisce tamen permanet calor præter naturam, atque inde hominem febricitare est necesse. Huiusmodi autem febris habet originē à motu atque seruire nature caliditate. Quæ autem ex tristitia sit, ex solo motu, non autem ex seruire et gignitur. At illius quæ labores sequitur, principium est musculorum, nervorum, copularum, & articularum motus immoderatus. Ea siquidem primò, calorem quandam concipiunt. Dein verò continuat calor accendit ad cor, ac tunc homo necessarī febricitat. Quæ autem ex densitate cunā accenditur febris, qualis maximè conspiciat atque asfrictis corporibus accidere solet, mordaci effluuii in corpore coaceruato contingit. Semper enim corpora animalium dissantur, idq; duplici modo: nempe effluuii ad exteriora vaporosis fuliginisq; supfluantibus, ac rursus iorus attracta refrigerant ac venilantem naturam calorem æræ substantia. Quoniam igitur vehemens aliqua causa cutim ipsam condensans, meatus aliquos reddiderit, scipius in plethoricam dispositionem incidit corpus, si & vaporem & optimum, quod effluit, extrahit. At si fuerit mordax & acre, nonnulli febrem corripitur: quo tēpore etiā calor maximè augetur, refrigerio extrinsecus adueniente priuatur. Acris autem ac mordax superfluitas + effluit iis, qui aut natura viciosos habent humores, aut prauis cibis vtuntur, aut sapis cruditate vexantur, maximè si post eiusmodi cibos aquam vinosam biberint. Idem his quoque accidit, qui supra modum laborant, aut vigilā, aut cogitant, aut medicamina acuta iugiter sumunt. Eorum igitur qui cruditate patiuntur, quidē qui prauis succis redvndant, ac male dissantur, aut intempestiue laborant, aut balneis superfluis vtuntur, facile corripitue febribus. Qui verò boni habitus sunt, integrèq; dissantur, & quiescunt, regionēq; ventriculi & hepatis calfaciūt, impossibile est vt febricitent. Nam in eisdem residet ventriculi & hepatis partibus, quicquid corruptum est, ac paulatim coquitur, reddendiq; optimum: sicut & is qui se moribus vehementioribus torquent, aut æstiuo sole, aut balneis calidis dulcium aquarum vtuntur, quicquid vinarum est, recipitur in corporis habitum. Quibus verò corrupti cibi descendunt in ventrem, * eos febris non corripit, nisi ob alias causas: veluti si defangati sint ob crebriorem deiciendi necessitatem, aut ventrem inflammatio tentauerit. Porro per obstruētiōnes meatuum, & humorum consipationes, ob putredinem solet febris oriri. Promptissime namque putrescunt omnia calida & humida, in calidis locis contenta, nisi distat ipsa et refrigerantur contingit. * Quinetiam in altera plerumque quæ ad vires dicitur, succitior ad corruptionem deveniunt, * quam nec vincantur, nec concoquantur à facilitate, vt pote imbecilla existente. Propterea autem quicunque cibi

Febri ab iracundia quando gignatur.

Febri orta à tristitia. Febri ab exercitio immoderato

Febri à cute densata.

Dissari animalis corpora duplici modo.

Asfrictionem cutis, quomodo febris significatur.

Cruditatē patientium, qui nam facili in febrem incidunt, et qui egri.

Febri oriri solent ob obstruētiōnes meatuum. Potrescunt facili calida et humida si calida loca nec refrigerantur. Plerumque ad vires.

glutinosi atq; crassi sunt, & i ratione putredinis magis morbifici existunt: quandoquidem succi ex ipsis geniti, longè promptiores sunt, vt & in meatibus hæreant, & impingantur. At acres & attenuantes cibi, quòd mali succi sunt, febres etiã accendunt. Partes etiã quæ experiuntur inflammationem, ratione putredinis similiter febres inducunt. Impactus siquidem in eis qui influxit humor, si natura calidus sit, nec disseritur, acturum putrescit. Si igitur fluxionem ipsam exquisitè a-

Inflammata a particula cur febris suscitatur.

Caliditas erysipelato & phlegmonosa, quæ a do infertur.

Carbunculi oriuntur à feruore & a calore loco sanguinis.

hic impendit caliditas, quod in corpora non fit, moritur.

Postulatio febri causa est infusio aëris vitiosi & putredinis, necnon vitiatus succus in corpore, ad putrescendum habet.

Causam nulli posse agere, ab qui patiuntur corpora apta sunt.

Postulatio febri, quæ a corpora facit, & quæ a dissolutione corrumpuntur.

Aëris assuetudo calida & humiditas, postquam aëris moritur.

Corpora dissoluta causa morbosus, facti corrumpuntur.

Corporum dispositiones dissimiles.

dam insuperabiles atq; impassibiles permanenti quædam ægrè patiuntur. Est autem ipsius medicus opus, correctiua errorum omnium, qui circa humanum corpus contingunt. Quare in us omnibus prima esse debet, atque communis intentio, vt corpus quammaximè purum sit, ac perspirabile: secunda autem, vt præpotenti causæ auerteretur, quòdmaximè fieri poterit. Nam quibus horum contraria insunt, corpiuntur celeriter, acerrimèq; laborant.

CAPVT V.

Igitur omnes pestiferæ febres à putredine originè ducunt. At ephemeræ, minimè putredinem humorum sequuntur. Sed qui quidem ex solis incendio febricitat, ab ægrentis causæ caliditate affici natura est aptus. Qui ex ira, huic feruorem quidem fieri caloris qui in corde consistit, est necessarius: non tamen etiam putredinem. Sic & ei qui supra modum exercitatus est, vehemētor calor præter naturam sine humorum putredine in corpore accenditur. Cui autem cutis adstricta est, quum prius aciores superfinitates exspirarent per eam, posteaquàm sunt retentæ coarctatæq; in febrem incidit, nulla interveniente humorum putredine. Porro quæ tumoribus inguinum superveniunt febres, omnes (auctore Hippocrate) perniciose sunt, exceptis ephemeris. Sunt siquidem quædam febres & genere ephemerarum, supervenientes tumoribus inguinum: quæ quidem ab eis differunt quæ ex humorum putredine eveniunt, quæq; vel in aliquo visceri, vel in causis & maximis vasibus radicem habent suæ generationis. Quandoquidem quæ inguinum tumoribus ephemeræ superveniunt, concalescunt semper partes vicinas, donec usque ad cor febrilis calor perveniat: quò tamen potrida fuligo non pervenit, sed ibidem, in loco inguinis circumscripcta remanet, sola alteratione per continuum facta, atque usque ad cor ipsam extensa sola caliditate. In putredine autem quæ aut in visceribus, aut in magnis sit vasibus, quidvis veluti fumus, ex putrescentibus succis ad ventriculos coe dis attollitur. Præterea in tumoribus inguinum omnes simul, collecti quæ humoribus putrescunt, siue per vnum, siue per duos continuos dies, vtpote in vno eodemq; loco compacti: at qui in visceribus sunt, vasisque magnis, quum perpetuo fluant, suoque contactu vicinos ad putredinem trahant, spatio temporis putridum calorem accendunt.

CAPVT VI.

Humorum autem putredo, quæ in vasibus sit, similis est ei quæ in inflammationibus, abscessibus, atque tuberculis accidit, duplex existens secundum genus. Nam aut fit vincente natura: aut omnimodo superata, aut ad eò imbecillius reddita, ut nullam amplius in putrescente extremè ad optimum moliri possit transmutationem: quod quidem tertium genus putredinis ex duobus primis conflatur. Per abscessus igitur, integrè superante natura, optimum confluunt pus, asperit album & crassum, & quaqueverum fibi simile: læve autem rangenti, ac minime feridum. Nam si semiputridum fuerit, tertium in tali transmutatione genus, quod paulò aut duximus,

Corpus contra pestilentiam aërem debet reddi purissimum, ac maxime cō perspirabile, tum causæ præpotenti contra naturam.

Pestifera febres emittit à putredine.

Ephemeræ superveniunt tumoribus inguinum, quomodo à putredine differant.

Putredo humorum quæ in vasibus sit, continetur dupliciter.

Pus laudabile quale esse debet.

mins, fit: quodq; secundū magis & minus, varias differentias sortitur. Quotcunque autem in abscessibus putredinis sunt differentie, eisdem & in febribus quæ ex putredine succeduntur, sunt eorum quæ in vrinis apparent, formæ varietates. Optima verò vrina quæ ex putrescente humore perficitur, qui adhuac concoctionem à continenti vase suscipiat, est quæ albam, liquam, æqualem, & minutimæ foridā habet hypostasim. Pei-
ma autē est, quæ in omnibus maximè cōtrario modo se habet. Quæ verò intermedia existit, quantō ad alterā propius accesserit, tantō aut melior est, aut deterior.

CAPVT VII.

Ephemeræ oñi oriuntur à procatartico causa.

Porro febrium ephemerarum hoc vnum est præcipuum atq; inseparabile indicium, quod ab aliqua manifesta causâ præincipientē quædam procatarticum vocant) oriatur. Non est tamen id signum earum proprium. Nam & aliarum quædam, à causâ manifesta gignuntur, quæ nimium præcipit. Inseparabile verò ac proprium ephemerarum est, vrinæ statim prima die concoctæ: pulsiuq; ad magnitudinem & celeritatem effatu dignam accedens, ita vt frequentia à propione deficiat secundum externam quietem. Est autem & magis inseparabile & proprium, quod nullo modo ad celeritatem ea pars pulsus, quæ dicitur systole, tendit: & si aliquando contingat hoc, minimum ac vix perceptibile existit, parimq; à naturali tenore mutatur. Sed & caliditatis suauitas, proprium atq; inseparabile est huiusmodi febrium indicium. Inseparabile quoque, æqualis atq; incompressus ascensus, in calore simul & pulsibus: non tamen proprium, quum & aliis quibusdā adfuit: sicut etiam consistente febre mediocritas. Neg enim hoc etiam est ephemerarum proprium, quanquam eis maxime inest. Proprium præter ea inseparabilē ephemerarum indicium est, cum sudore, aut rore, aut aliquo optimo vapore inclinat, quam sequitur integritas. Atq; hæc quidem est communis ephemerarum febrium digno. Earum verò quæ ex aduerso ab ephemeris distinguuntur, quædam in putredine humorū consistunt, quædam solidas animalis particulas occupant. Atque hæc sanè medici febres heclicas appellarūt, vel quia firmæ atq; fixæ, perinde ac habitus, sunt: vel quia corporis habitum comprehenderunt: sic enim parites solidas vocitant. Primum autem & proprium, non tamen inseparabile, putridarum febrium est signum, quod nulla procatartica causa eas antecedit: id quod nentri aliorum generum inest. Quandoquidem ephemeræ omnes oriuntur à procatartico. Hecticæ autem, quando sine las gignuntur, minimè ab inno invadunt. Vbi quis igitur citra manifestam, præincipientēq; causam cepit febrem, scire oportet eius febri causam in humoribus esse. Interdum tamen aliqua ex procatartico causis sui ratione febrem accendit ephemeram: succedit autē altera ex putredine humorū, qui quod afficitur corpus, & impurum, & superfluum humoris colluie redvndis fuerit. Successione autem ipsius, vna quidem propria inseparabilēq; digno habebatur, quod febri ephemeræ ad integritatem non

Ephemerarum vrina est pulsiu equalis.

Ephemerarum calor est propius suavis.

Ephemerarum inclinatio accidit cum sudore vel rore.

Putrida febris. Hectica febris occupat solidas corporis partes.

Putrida febris nulla procatartica antecedit causa.

Putrida febris quando succedit ephemeræ.

definat. Contingit verò aliquando, vt per vigorem ephemeræ, ac multo magis per declinationis initium, signum aliquod permutationis cernatur: videlicet si ea tranquillitas absit, quam adesse oportebat. Initium autē sumere à rigore febrem, vbi nec insolatus, nec præcelsi aliqua refrigeratio vehementis, putridarum febrium est proprium signum, non tamē inseparabile. Si quidem nō inest putridis omnibus rigor: sicuti neque horror. Præterea inæqualitas pulsuum atq; caloris, siue in principis, siue in augmento contingat, huiusmodi febrium est signum proprium, sed ne ipsam quidem inseparabile. Multo aut minus inseparabile existit, quod accessiones ipsæ habeant plures veluti insulas: id quod super exacerbari vocamus: quemadmodum & pulsuum compressio, quæ putridarum febrium est propria, (nisi alius symptomaticis ratione citra febrem accedat) non tamen inseparabilis. Maximum etiam earum febrium quæ à putredine oriuntur indicium est, mordacitas & acrimonia caloris, quæ perinde ac fumus nares & oculos, sic ipsa erodere tactum videtur. Sed in principis quidem accessionū, vt pote in quibus calor adhuc suffocatur, superdubitari quæ succeduntur intus, non statim ea qualitas, ad mora manu, discernitur. Asper moram, prædicta caliditatis species effertur ex penitioribus partibus. Proprium præterea inseparabilēq; putridarum febrium est signum, velocitas systoles, quæ manifestius quidem in crescentibus febribus, non obscurat autem in incipientibus & consistentibus fit. Comitatur autem hæc febres, in initiis quidem, pulsus parvus ac velox: quum vero consistunt, velox simul & magnus. Sic & quæ circa externam quietem versatur frequentia, in huiusmodi febribus deprehenditur manifestè. Cuius similis neque in ephemeris, inest in heclicis cernitur. Maximum verò & harum febrium indicium existit vrinæ cruditas: earundēq; est proprium, imbecilla concoctio. Neque enim vnuquam magnum aut effatu dignum concoctionis indicium per huiusmodi febres in primis vrinis appareret, si quidem excipiamus eam, quæ fit ex ephemeris febribus, permutationem. At verò pulsus durus nullius generis febrium, quatenus febres sunt, est aut proprius, aut inseparabilis. Comitatur tamen magna ex parte heclicas febres: nonnunquam verò etiam duo genera alia, symptomatica aliquo interveniente. Quippe durities accidit arteriarum tunicis, aut ob congelationem, aut tensionem, aut siccitatem. Congelationes igitur, vehementes algore efficiunt: tensionem verò, inflammationes, & duri tumores, & nervorum dispositio inflammationibus correspondens. At siccitatem, evacuationes diuturnæ, & longi temporis fames, & diutina febres ardentis. In vniuersum autem, quæcunque solidas animalis particulas vehementer excitant, sicuti & heclicæ febres, arteriarum duritiem efficiunt.

CAPVT VIII.

At verò heclicæ febres magna quidem ex parte ardentibus febribus solent supervenire, vique adeo productus, vt humorem in corpore cor-

Ephemeræ permurari in putredinem, quibus depergitur indicium.

Putridarum febrium calor est mordax & acrim.

Putrida febris ad diffi velo em systolem.

Putridarum febrium pulsus.

Putridarum vrina equalis.

Febrium nulli, quatenus febri, ad diffi pulsus durus.

Durities vnde accidit arteriarum tunicis.

Hectica ardens febri solent supervenire.

Kk iij

dis contentum absumperint: quanquam fieri etiam potest, vt magna adhuc eius portio seruetur. Ceterum illæ non tantum hæcticæ sunt, sed etiam tabidæ. Quæ verò manente adhuc humiditate gignuntur, vbi cordis occupauerint corpus, hinc maxime succeduntur, quemadmodum lucernæ flamma ex ellychnio. Alio autem modo febres hæcticæ oriuntur, vbi statim ab initio invadentes, simulque ortum cum ephemeris habent: videlicet aut ex ira, aut tristitia, aut lassitudine insigni, aut ardore solis contractum. Quæ igitur sic gignuntur, non admodum egrediantur. Quæ autem pervenerint ad tabem, liss, vbi iam exquisitè consistunt, & tandem inceptum, vt medeatur est impossibile. Siquidem earum natura calida est & sicca, quoniam per eas tale quid perpetiatur cor, quale lucernæ ellychnium, dum plurimum est exvinctum. Dissert autem tabida febris à tabe, siue marasmo. Marasmus siquidem etiam absque febre in decrepitate solet accidere, extincto namque calore: id quod nihil aliud existit, quam mors, quæ ferè sine sensu doloris, ac secundum naturam, ex siccitate contingit: sicut & iis qui præter naturam tabescunt, altera species marasmi accidit, quæ à Philippo ex morbo senectus vocatur. Tabida verò febris non tantum siccæ, sed etiam calida est passio.

CAPVT IX.

Hæctica igitur quæ in tabem incidit, febris, cognita promptissima atque facillima existit. Nam priusquam pulsus atque calorem perpendas tactu, videbis oculos immodicè concauos, ac veluti in foueas quasdam recooditos, exhausti iam vniuersi ipsorum homines, ita vt osium, quibus palpebre coherent, eminentè cernantur. Sordes præterea iis ipsis facie ostendantur, & quædam veluti squallida dispositio, qualis maxime inest iis, qui toto die sub solis ardore per puluerem iter longum fecerunt. Quinciem in eis est coloris flos vitalis extinctus: frontisq; & faciei cutis rigida, ex siccitate, & squallida. Ad hæc affectu frequenter palpebras cōtralunt, dormitantiū initia: non tamen affectus eorum est somnus, sed potius vigilandi impotentia. Præiacie etiam sunt illis collapsa & concaua tempora: nihil in eorum corporibus cernitur præter cutim atq; ossa. Pulsus autem tenuis, durus, debilis, atque frequens apparet. Caliditas verò, quoniam primum admovent manus, languida est: paulatim autem accedentem, atque erosionem ostendit: ac magis, quoniam plus tangendo immoraberis. Porro marasmus tunc incipit, dum cognatus humor, qui in medijs partium familiarium spaciis inspersus est, & ex quo primum vniuersæ partes nutriuntur, pericitatur circa corpus cordis non amplius adest. Quandiu enim pars aliqua humoris illius conseruetur, solum febris hæctica existit, non dum etiam tabida. Vbi verò res eo discriminis iam pervenerit, vt nihil ex tali humore superest, tunc exquisita rabes existit. Est autem hæctica eorum omnium dispositio difficilis, vbi præterierit principii tempus: quod non dierum aut horarum numero, sed ipso dispositionis modo determinandum est.

Ceterum quoniam naturalis temperies cordis primum iocenti iocenti, neque natua humiditas promptus dissipatur, neque virtus laborat plurimum: sed primum fit veluti quedam effuscentia ipsius humiditatis: quo tempore faciliè est eiusmodi febrem sanare, tanquam nihil adhuc virtute perperisset. Tamen autè virtus laborat, quantum siccitas & caliditas in ipso corde inualeuit. Iam verò, quæ febris æqualiter ab utraque distat, ab ea scilicet quæ exquiritur tabida existit, & ab illa in qua nihil est adhuc tale, mediam quondammodo sese habet ad curanone, dubio ad partes ambas momento inclinans. Quæ autem tabidæ proximior existit, est vicinior periculo, quam quæ alteri primæ magis adhaeret, non parum salus sperni possit nobis promittere. Emagamus igitur aliquem esse corrupti febre, quam præcescerat conspicimus & procatartice causæ. Si enim febris ipsa ad sequentem diem extendatur, neque integrè desinat, neque exasperetur magis, ardentem tamen maiorem in corpore repræsentet, talem hæcticam fore tibi suspicandum fuerit. Quod si & in tertio die sine cibo permansere voluerit regere, donecq; ternariæ accessionis præterierit horas suspectas, nihilq; est tu dignum priori accesserit febri, aut imminutum fuerit, sed tantummodo quædam exiguæ reliquæ primæ febris procedant, permancantq; cum ardentate corporis, & caliditate, quæ primum quidem tactu mitis sentitur, processu verò acris, mordax & sicca: huiusmodi febrem hæcticam esse existimandum est. Maximum verò & indubitatum erit eius naturæ indicium, si citim homini post suspectas horas obtuleris. Si tamen siquidem vna vel altera hora post cibum exhibitam, quicunque ægrotantem tetigerint, alteram febrem accessione opinabuntur adeste. Omnibus namq; hæcticis febribus hoc proprium ioseparabileq; adest indicium, scilicet quod alio cibo accendatur * calor, pulsusq; ad magnitudinem & velocitatem augeatur, sic vt videatur oborta esse incompressa quedam accessio, hoc est, libera ab omni inæqualitate, qualis comitari alias febres solet. Nam tamen in aliis nonnullis febribus huiusmodi insultus incompressi cernantur, si tamen absque cibo solent accidere. In febribus autem hæcticis nunquam aliqua accessio conspicitur, sed perpetuò cernitur vna febris continua, vtilis quæ synochos appellatur. Ea tamen quandam veluti flammam plurimam admoventi manum possidet occupantem: pulsusq; ædit celerissimos, frequentissimos, atque maximos. In hæcticis autem febribus, neque multa occurrunt caliditas, poliùsq; tantò minores, rariore, atque tardiores sunt iis, qui per synochos fiunt, quāro etiam caliditas ipsa est minor. Commune itaq; omnibus hæcticis febribus est, quod pusillus, & semper à principio vique ad finem æquales existant. Proprium autem est tabidarum, siccitas. Nam sine siccitate sæpius hæcticæ febres consistunt, quoniam minime in tabem degenerant. Iam ceteras febres quæ incompressas accessiones sortiuntur, omnino compressio aliqua comitatur, dum cibus ingessus fuerit in accessionis principio. Hæcticas autem,

Hæctica febris investiganda.

Tabida febris.

Hæctica febris interdū ab initio invadens, simulque cum ephemeris habent: videlicet aut ex ira, aut tristitia, aut lassitudine insigni, aut ardore solis contractum. Quæ igitur sic gignuntur, non admodum egrediantur. Quæ autem pervenerint ad tabem, liss, vbi iam exquisitè consistunt, & tandem inceptum, vt medeatur est impossibile. Siquidem earum natura calida est & sicca, quoniam per eas tale quid perpetiatur cor, quale lucernæ ellychnium, dum plurimum est exvinctum.

Marasmus, Tabida febris à tabe quomodo differat.

Tabida febris indicia.

Hæctica febris post suspensionem cibum exacerbat, exacerbatq; equaliter.

Hæctica febris non nuda adest accessio. Synochos febris est tota vna febris continua.

Marasmus quo modo incipit.

Tabes exquisita quando dicitur.

Hæctica omni passiva et aqua liss semper a principio usque ad finem exasperat.

Hæctica omni passiva et aqua liss semper a principio usque ad finem exasperat.

Hæctica omni passiva et aqua liss semper a principio usque ad finem exasperat.

post

*Pulsi cuiusque
alterari pos-
sunt post cibum,
in magnitudi-
nem atq; velo-
citatem.*

post cibū assumptū, quandam velut incēssum
insulsum fieri contingit, qui tamen non est accē-
sio, sed incrementum caloris, atq; promotio pul-
sus in magnitudinē atq; velocitatem, qualis cui-
cunque alteri post cibū solet accidere. Quamobrē
alteratio ipsa tandiū perdurabit, donec distribu-
tus cibus appositusq; humēta uerit cordis aridi-
tatem. Postea verō corpus ad pristinū reverte-
tur statum, in quo antea quā cibus exhiberet,
cōspiciēbatur. Quod si rursus nutrire velis, vel in
diuersis temporibus, senties semper calorē post
cibos adactū: pulsus autē (ut dictū est) alteratos:
vtpote quibus idē videtur accidere, quod calci
& lapidibus calefactis, quorū nimirum caliditas
arida, per aquē affusione, & humida substantia
nutritur. Humida enim caliditas, quā sicca, vi-
res habet non parum evidenter. Ar verō sicca
in hēcticis febribus est caliditas, quas conse-
quitur tabes, hinc constat, quōd nullus eorū qui
habitu corporis sunt humidiori, statim ab initio
huiusmodi febre correptus fuerit. Quicquid autē
sunt natura siciores, ac praeteritū si temperiem
etiam calidiorē fortiantur, virāq; elegerint in
laboribus, vigiliis, curis, tenuiq; victus ratione,
hos statim ab initio solet hēctica febris invade-
re, ex ira, vel tristitia: ac magis xstāte, statiq; tem-
poris calido & sicco, ac loco praeterea consimili.
Ac terminus talium hēcticarum principū est, si
eo tempore, quo solent ephemeræ ad integritatē
desinere, non solum istis nihil tale accidat, sed sic-
citas etiā manifestē intendatur. Alter verō cuius-
dam veluti ipsius augmenti, atq; integræ perfe-
ctionis terminus, est tertie diei accessio. Nam si
tunc nec altera accessio supervenerit, neq; xgro-
tus absq; febre fuerit, adacta insuper siccitate,
proculdubio hic hēctica febre laborat: quæ pro-
gressu temporis citō ad tabidam cōvertetur, nisi
rectē curetur. Terminus autem permutationis i-
ppius ad tabem est, dum pulsus debilis simul atq;
durus sentietur: qui quidē necessariō etiā erit par-
uus & frequens: non tamen propterea febris dici-
tur tabida, sed ob id potius, quōd debilis atq;
durus existit. Debilitas siquidē, vehemētē sequi-
tur febris intemperantiam: durities autē, aridita-
tem. Si igitur huiusmodi affectus cor occupa-
verit, hinc febre tabida necessum est animal labo-
rare. In eandem verō incidit febrē ex ardentis-
sima atq; acutis febribus plures, qui rectē curati
nō sunt: quicquid egerent potione frigida, non
solum eam nō biberunt, sed nullū etiā aliud re-
frigerans medicamē applicuerūt thoraci & pre-
cordiis. Quilicet hēctis ac ventriculi inflām-
mationibus, nisi rectē curetur, tabes supervenire cō-
suevit, affectione ipsa cordi cōmunicata. Siqui-
dem tabe corripitur cor, interdum quidem ex se
ipso, sicut per exandescēcias, vel emētēsq; at-
que diuturnas tristitias: nonnunquam verō ex
ardentibus febribus: aliquando autem ex pul-
monis ac thoracis affectibus, ac praeteritū ex em-
pyemate & pleurisi, atque adeo ex diuturnis nobis
ipsum partium inflāmationibus. Similiter in liem-
teria & diarrhœa, si vel ab initio statim, vel pro-
gressu temporis, febris invaserit, tabidē postea se-
bres succedunt. In vniuersum autem, quando-
cunque praecuratum cordis corpus febrilem ca-

*Hēctica statim
ab initio, quo
prehenditur.*

*Tabida febre
tunc laborantis
animal, quicquid
causā hēctice ad
ipsum cor occu-
paverit.*

*Tabes quāvis
solaat superven-
ire.
Tabes corripit
cor quāvis causā
sua possit.*

liditatem susceperit, & quæ cum difficultate ex-
tinguatur, tabida occupatur febre. Quare & quā
arteriæ circumstantibus partibus calidiores sen-
tiuntur, maximum sunt hēcticarum febrium in-
diciū. Vbi igitur sola per seipsum consistit hē-
ctica febris, perspicua est, an sit absolutē hēcti-
ca, an simul & marasmodus. Vbi verō hēctica fe-
bris vni cū putrida coit, longē difficilior cognos-
citur: quamvis ex arteriarum perseverante calo-
re, morūq; celeritate & frequentia, eam discernere
possimus.

CAPVT X.

Potro quid ex fervore solis inciderit in febrem,
his cutis magis ad calorem & siccitatem, quā
pulsus ad febrilem vergit dispositionem: nam &
minus siccundi sunt iis, qui æqualem habent ca-
liditatem: & quamprimum manus admoventur,
ingens calor percipitur. Contrā res se habet in
iis, qui ex cute densata & adstricta laborant: nam
in eis reaccenditur calor. At quæ ex fervore solis
sgrorant, his maxime devit caput videtur: plūsq;
ex balneis frigidis vilitatis & delectationis percipi-
unt. Oculi quoq; in eis rubicundiores & ca-
lidiores cum quadam ariditate videntur, si qui-
dem sine graevudine ac destillatione affligantur.
Est autem minus calida cutis iis qui ex frigidita-
te febricitant, corpūq; eis in maiorem tamorem
attollitur: ac nullus in frōte squalor, qualis illis
qui ex insolati febricitant, sine plenitudine capi-
tis. Siquidem magna ex parte his lotus caput re-
pletur, nisi quis purum, materiæq; involti experta
corpus possideat. Solis quippe his caput calsciri
contingit, siue aliqua plenitudinis noxa.

*Hēctica mi-
seri interdu-
m causā putrida.*

*Febris ex insu-
lata.*

*Febris ex cute
adstricta.*

*Febris ex frigidi-
tate.*

GALENI PERGAMENI
de differentiis febrium, lib. II.

CAPVT I.

Superest autem nunc, ut de differentiis febriū
quæ ex humorum putredine oriuntur, si-
militer differamus: idq; vbi admonuerimus
prius, non fā esse (quemadmodū multi opinan-
tur) ad omnium febrium generationem, si in cor-
pore amara bilis redvndet. Alioqui laborantes
atque morbo, ad vnum omnes maximis cor-
riperentur febribus: id quod nequaquam con-
tingit, priusquam bilis quæ in illis copiosissima
est, cōputrescat. Absurdum etiā est credere, in
quartana & quotidianis febribus exquisitis, æ-
ceruari bilem amarā, quemadmodum in ter-
tiana, atq; in caustione, quæ in illis nullum ta-
lis succi vestigium addit. Etenim febres tertianæ
magna ex parte in corporibus natura magis bi-
liosis sunt: in ætate videntur quæ omnium bilio-
sissima est: tempore æstivo (in quo dominatur
is humor): aliis locis præterea quæ calidam & sic-
cam temperi possident, in similib; æris ambien-
tis constitutione: ac breviter in homine qui la-
boribus, curis, vigiliis, xstu, tenuis victus ratio-
nem, eademq; calida & sicca, ac deniq; medicami-
num calfacientium & exiccantium immo-
ditia, fuerit commaceratus. Quotidianæ verō, natu-
ris in quibus pituita superfluit, sunt familiarē:
in hyemēq; præcipue, atque in omni locorum &
temporum statu frigidiori atque humidiori gi-
gnuntur. Ex ætatebus porro, senilem atq; pueri-

*Tertiana febris
quæ in natura
magis sunt bili-
osa.*

*Quotidianæ fe-
bris quæ in a-
tate magis sunt
familiares.*

lem inestant magis: preteritum si accedat otiosa vita, quam crapulæ comitantur: atq; etiā si post pituitosos cibos quiescant balneis vtatur. Neq; etiā q̃ qui quotidianā febre tenentur, a mara evomunt bilem, nec per ventrem inferiorem aut sudores illam excreant, quod in febribus continetis tertianis: hæc siquidem flaua bile putrescentem gignuntur. At quotidianæ ex pituita, quemadmodum quartanæ ex atra bile, ducunt originem. Proinde corporum naturæ magis ad atram bilem proclives, ex tantibus præcipue declinans: ex anni vero temporibus, maxime autūnus: ac breuiter victus vniuersus frigidus atq; ficcus, quartanas febribus originē præstat. Quare & rigor q̃ vitiosū genus febris antecedit, haudquaquā similis est: sed q̃ in tertianis quidē accidit, repræsentat sensum causæ efficiētis, veluti rei cuiusdā pungētis, ferētisq;: qui verō in quartanis, tanq̃ refrigerantis. Porro febres intermittētes, que nimirū ad integritatē desinūt, ortū habent ab humore qui per oēs corporis partes suo moru defertur. At in cōtinuis, humor delinēat atq; cōtinetur in venis.

CAPVT II.

Intermittētis igitur tres sunt omnes numero differētis, quōdiana, tertiana, et quartana quidē: ex pituita: tertiana aut, ex flaua bile: quartana deniq; ex atra putredine, p̃pagata.

Continuarum species duplex. Synochis vniuersum tempus q̃ vna accēsis, Synochis tres differētiæ. Earū igitur quæ appellantur synochi, tres differētiæ cōnumerantur. Nam earū quædā a principio ad finē vsq; perseverat equalis: quædā paulatim augētur: aliæ decrescūt, atq; minuantur. Vnde nonnulli primas quidem homotonas acmasticas, secundas epacmasticas, tertias paracmasticas, hoc est, vniormes, invalescentes, & decrecentes, nominant. At continuarum duæ sunt differētiæ primæ. Si quidem earum nonnullæ quidem, tertio quoq; die invalescunt exasperantq; referentes naturam tertianæ febris: aliæ verō etiam die intermedio exacerbationem faciunt: neutraq; tamen harum ad integritatem desinunt. Earum igitur continuarum quæ die intermedia accēsiōē faciunt, nonnullæ quidem formam quōdianarū seruant, duas invicem accēsiōes simillimas cōficientes: aliæ vero, quum duas dissimiles faciant, simillimam primæ tertiam efficiunt, atq; secundæ quartam, insitit duarum tertianarū progredientes. Hæc igitur ex bilioso magis, altera verō quæ singulis diebus similem accēsiōē faciunt, ex pituitoso humore consistunt. Est & tertium genus febriū continuarum, quæ perrorū tamen eventū, quarum accēsiōes quartanarū figuram progredientes ostendunt, nec desinunt tamen integrè. Quæmodum autem febris tertiana aliquando sit duplex, & aliquando triplex: sic hæc etiam non duplex modō, sed triplex potest evadere.

CAPVT III.

Quæ igitur a flaua bile per sensibiles corporis partes delata oritur febris, ea cum rigore viua-

di, atq; ardentis febris similitudinem gerit, & biliosis vomitibus, aut defæctionibus, aut sudoribus, vel horū quibuscūq; vel omnibus simul, soluitur. Huius febris accēsiō duo decim ad summum horarum æquinoctialium intervallū finitur. Vocamus autem ipsam exquisitam tertianā, quæ in temperaturā laborantis biliosa, & anni tempore, & regione, & victus ratione, calidior & ficcior cōstitit. At verō copiosior bilis, ea quæ paucior est, longiorem facit accēsiōē: tenuis autem, crassa brevior. Sic & vigor, maior quidem, breuiorem: imbecillior autem longiorem. Præterea corporis dispositio, rara quidē brevior, densa verō longior. Tempus autem intermissiōis in hac febre, nullū habet humoris præceptis ex pulsū perceptibile indicium, in die aut nocte, quæ cōsequitur accēsiōem. Quum verō parumper succenditur, vix agnoscitur potest in primis diei aut noctis subinde sequentis partibus: manifestus autem circa fines ipsius diei vel noctis: atq; adhuc manifestius die proxima, quæ videlicet antecedit accēsiōis diem vel noctē. In illa verō iam signum evidētius apparet, ac multo etiam magis accēsiōe iam incipiente: atq; adhuc plus, invalescente febre. Quū verō iam cōfinit, minus quàm quum augebatur: multoq; minus vbi iam declinaverit.

CAPVT IIII.

Est & alia exquisitè simplicitatis febris, quæ ex puri laginosa pituita ortum habet, per sensibiles a natura partes impulsā. Incipit autem a refrigeratione extremorum, & horrore magis quàm rigore. Cum difficultate per eam accenditur calor, ac longum cōsumit tempus dum in invalescentia pervenit ad summū. Quoniam verō is ex quo cōstituitur humor, frigidus est & humidus, ac præterea lentus & tenax, idcirco rēgre accenditur, ac tardē mouetur, sepiusq; in foraminibus hæret. Opprimat autem atq; aggravat aliquando virtutem: vnde inæquales ac debiles magis, parviusq; efficit pulsus, quū primū accēsiōes invadunt, atq; in primis incrementis partibus. Fiunt & in biliosa febri circa accēsiōem principia, singuli quos duobus pulsū affectibus: in ea tamē statim desinunt: cætera verō, necnon inæqualitas, plerumq; tali febre invadente non adfuit. At postquam cessaverit rigor, non multum post calor accenditur, veluti ignis effulgens, puriusq; omnis humoris fuliginis expertus. Pituitosi autem humoris caliditas, ignem humidum ex accēsiōe lingnis viridibus refert. Idcirco & exiguæ evaporationes ab ipso, & accēsiōis spaciū longius producit: neq; intermissionis tempus est adeo vti in tertiana lyncemur, sed humoris putrescentiæ servat indicium. Attramen quum exquisitè suam naturam servaverit, plerisq; & mihi nō raro videtur habere puram intermissionem. Hæc febris, naturas cōsequitur corporum, & tempora, & loca, & status, ætateq; & victus rationem, aliq; omnia prorsus alimna pituitæ. Accenditur autem singulis diebus, est minus calida sit, quum biliosa tertiana. Hæc enim, quū humorem habeat minimo negotio inflammabilē, facilius quicquid ex eo efferverit, totū propter subtilitatem in accēsiōe expurgatur, ad puriorē quandam integri-

Tertiana Symptomata.

Tertiana ex quibus quæ.

Accēsiōis febris quæ calida brevior, longiorq;.

Quotidianæ febris descriptio.

Tertiana ex quibus quæ, febrem puram singulis calidior.

Quotidianæ accēsiōis singulis diebus, quæ in accēsiōem declinatior, nec expurgatur autem, ut exquisita tertiana.

integritate terminari videtur: atque exigua quoddam vestigium post paroxysmum, patridē caliditatis relinquere. Quæ autē ex pituita febris acceditur, in accessionē declinationē non expurgatur integrē, neque parā relinquit eius quod velut succēdi videtur: ac postea intermissio eius longē deterior est, ac secundæ accessionis multo magis festinat insulsa.

CAPVT V.

Tertiū febriū intermittentiū genus est exquisitā quartana, quā ex solo atræ bilis humore gigni solet, quā frigida & sicca cōstat tēperatura. Succenditur autē paulatim, velut lapis aliqui, aut corpus similiter frigidū atque siccū. Vbi verō aliqua ex eo flamma fuerit accēsa, nihil humidū, aut semicombustum in accessione relinquit: atque idcirco ex hoc humore, quā ex pituita, plures evacuationes oriuntur, intermissiōque exquisitē pura videtur: quod quidē quicquid atræ bilis accēsum fuerit, exaltatur atque discutitur. Quamobrē in sic affectis talis est rigor, qualis iis, qui vehementi gelu frīgescunt. Hanc autē febriū necessariō antecedit, quæcumque atram bilem accumulāt. Anterius accessio ipsius, quod quidem ad longitudinem pertinet, similis est tertianæ: nonnulli autē etiam & longior, quā videlicet exquisita persistit, usque ad frigidioris humore producta. Pro multitudine autem & qualitate humoris, vigore & imbecillitate potentia, necnon ipsius ægotantis dispositione, per omnes febres solet longitudo accessionum variari. Si igitur neque putrefcat, neque vehementer per partes sensiles deferatur, mediocris cholicus humor, nūquam efficiet exquisitum quartanum circuitum. Iam verō, regit quidem morbi passionibus, diuturni mediocris cholici splenis affectus, et colores in toto corpore fœdi: herpetibus verō atque erysipelatibus, quæ ex flava bile gignuntur, cancri & phagedæni, proportionē quadam respondent. Verū neque in iis, neque in aliis atræ bilis affectibus necessariō febriū cōstat, nisi prius atræ bilis putrefcat. Semper quippe natura suis viribus freta, quicquid optimū sed de potest ex succis, id nutriendis partibus conatur assimilare: ex eorum autem, quod talem correctionem nō recipit. Quod si quando ob occasione aliquam id ipsum nequeat expellere, necessum est, ut diutius delitescens in anima corpore, corrumpatur. Sic igitur iis qui morbo regio, atque atræ bilis passionibus infestantur, quando biliosi humores superabundantes, diutius corpus obsecrunt, febriū supervenire cōsuevit. Sed neque ob redvndantem pituitā febriū vnam accenditur, nisi prius cōpuerit. Ob pituitam autē visum est spiritus (quod impossibile auterantur veteres) oriri absque febre rigorem.

CAPVT VI.

Generē quotidianarum est febris quā Hippocritam vocant, vbi simul & febriunt, & rigent æque eodem tempore in toto corpore vtriusque sentiunt affectū. Oritur autem hæc febris ab humore illo, quem vitreū Praxagoras vocat, quicquid est species quādam pituitæ, satis frigidus atque tenax existens. Siquidem omnis frigidus atque humidus succus, ad pituitæ appellationem refertur. Cuius tamen plures sunt differentiæ. Est namque vna species pituitæ, usque adeo frigida, ut quā detinetur alibi, dolores acerbissimos ex-

citet. Atque hæc sanē vitro fuso est perfimilis. Est & alia pituitæ species haudquaquam exactē frigida, quā plerique cum sereno expuunt, sensibilem habens dulcedinem. Accedit tertiā species pituitæ, quæ sentitur expuentibus acida: citius minus frigida, quā quæ dicitur vitæ: magis verō quā dulcis. Præter has species, est falsa aut ob putredinē, aut ob serosā humiditatis missionē: ex qua quidem febriantes non rigent, sed tantummodo horret. Acida verō ac vitrea pituita, si per partes sensiles deferatur, rigores citra febrem inducit. Quod si modica aliqua in ipsis fiat putrefactio, febrem Hippocritam conciliant. At si vehementius putrefcant, rigor quidē antecedit, febris verō sequitur, à multitudine caloris frigida materia devicta. At putrescente dulci pituita, rigor minime antecedit febrem.

CAPVT VII.

Potest si pituita putrescens miscetur amaræ bilis, duplex fieri causa, sic etiam dispositio iungetur. Alter frigiditatem humor affert quotidianæ accessionem, alter verō tertio quoque die itaque alter quidē dies duabus accessiones habebit, alter verō vnam duntaxat: nisi accessionū tempora sibi mutuo cohercant: cohercantur siquidem fiet vna febris confusa, quæ neque puræ tertianæ, nec quotidianæ formā præ se feret. Quoniam verō vtriusque febriū duplex species est, quatuor ex ipsis fient coniugationes. Vna quæ in quarta tertiana quotidiana intermittens miscet. Altera, in qua tertiana quotidiana continuæ iungitur. Tertia, in qua quotidiana intermittens, tertianæ cōtinuæ miscetur. Quarta denique, in qua permiscet quotidiana cōtinuæ tertianæ continuæ. Harū verō nuper dictarū coniugationum omnium, duæ sunt differentiæ: quæ aliquando quidem in eandem horam accessiones occurrunt: nonnunquam verō diutius temporibus superveniunt. Ceterum ex accessionis forma, non ex periodorum simili proportionē, cognoscenda ipsa febris venit. At quæ singulis diebus accenditur atque intermittitur febris, ea amphimerina, hoc est, simpliciter quotidiana vocetur. Quæ verō intermissionem non habet, continuā quotidiana dicatur. Idem etiam & in aliis febribus est faciendum iudicium. Iam verō ex quotidiana continua, & tertiana intermittente, hemimerici natura constat. Quum igitur tertianæ insulsa cum rigore invadat: quotidianæ autem continuæ, sine rigore: sanē si ambe in vnam horam (quod interdum per hemimericam contingit) conspirent ex æquo, febris constata est vtrique, horrorem præ se feret, rem quidem rigorem minorem, sed maiorem refrigerationem. Quocirca dimidiam hemimericam portionem vtriusque larum febrium dico quotidianæ cōtinuæ, & intermittens tertianæ occupabit. Est autem hemimerici duplex generatio modis. Nam aut illarum febriū accessiones in vnam eandemque horam cōducunt, quod altera quidē anticipat, atque altera prorogetur: vel statim ab ipso initio ambe febres miscentur & confunduntur. Quæ igitur sit, in vnum tempus conspirent vtriusque accessionem, vnum duntaxat hemimerici naturæ paroxysmum sortiuntur: altera autem omnes, à principio ægritudinis usque ad finē: quæ febris maximè ab

Quæritur ex-
quisita gigni-
tur ab atræ bi-
le.

Quarta etiam
rigor qualis.

Hippocritam fieri
etiam à pitui-
ta acida.

Tertianæ febris
et quotidiana
mixta, quæ
intermittens
est.

Amphimerica
febris.

Hemimerici aut
constat ex quo-
tidiana contin-
ua, et inter-
mittente tertia-
na.

Hemimerici quoque
dividuntur in
duos generes.

Hemimerici du-
plex generatio
est.

Quæritur ab ipso
fieri aliquando
ex pituita
atra.

Hippocritæ est
genus quoti-
dianarum.
Hippocritæ
autem vitreæ
pituitæ.

Pituita species
quatuor.

omnib. hemitritico vocatur. Qui aut intermit-
tentis tertianæ & quotidianæ cōtinuæ formæ per
se cognoscuntur, faciliè cōplicatas per symptomata, ap-
pria distinguunt. Porro quæni ex eis cōplicatis clari-
us sit habitura finem, ex ipsarū specie, accessio-
nis prolixitate, magnitudinēq; præterea ex mo-
re, motu, reditu periodorum, necnon ex conco-
ctionis & cruditatis indicibus, coniecturandum.

CAPVT VIII.

Febris igitur quæ ex intermittente tertiana, &
quotidiana cōtinua, cōposita est (quam hemitri-
tæum vocamus) aut si uiam bilē habet ex speran-
tia atq; ob id, in ea sunt tertianæ febris acciden-
tia maiora: aut hæc quædam parciore, putuita uerò
abundantior existit. ob idq; quotidiana cōtinua
affectus firmiores: aut neuter horū humorū alte-
rum vincit, sed ambo æquipollere videtur, id qd
in exquisitis hemitritis, hoc est, semitertianis, cō-
tingit. Ergo si in multione ipse prævaluerit febris
tertia, horridior sit tota febris, & nonnihil sibi
in inuasiōe perigris associat. Confestim uerò &
feruidior sit huiusmodi febris, & incendū plus
habet, magisq; ad summū festinat: & aliquid bilis
per vomitū, aut per aluū, aut per sudores exceroi-
tur. At si altera ex putuita febris sit præpotentior,
rūc frigus uehementius extremas occupat partes,
& pauci adfunt horrores, ac pulsus magis, & diu-
tius cōprimitur: tardiusq; accessio inualefcit, ac
longū post tempus cōstitit: non tamen aut firmi,
aut magnum adfert incendium: nec in ea, vt in
alia, bilis excernitur. Itaq; in hemitritico exqui-
sita, quæ ex æquali duarum febrium (quando-
quidem humorū duorum) temperata est compo-
sita, veluti pugna quædam inter varios affec-
tus onatur, quum æger nonnunquam in ualefcen-
te febre tertiana, atq; ad cutem humores pellicite,
incalescat uehementius, remoraute interim re-
uellentēq; intro ipsius morum febre quæ ex pitui-
ta ortum habet: * quum nimirum is humor sit
tardi ac difficilis motus, frigida & lenta existens
materia. Dicitur aut hemitritæus febris non ex-
quisita, ubi aut balem, aut pituitam habet uincen-
tem. Est & alia secunda copula commutatioq; dua-
rum febrium, tertianæ scilicet & quotidianæ, am-
barum intermittentium, quæ similem quidem nu-
per dictæ accessionem facit: hoc tamen interie-
cto discrimine, quodd hæc quædam intermittitur,
atq; necessariò ad integritatem desinat: quoddq;
die secunda cum rigore aut horrore, sola quoti-
diana febris invadat. Quamobrem huiusmodi
febris non est dicenda hemitritæus, si quidem
ex numero continuarum hemitritæus existit. At
si in utroque genere hemitritæus consistat, non
hæc tantum, sed multæ præterea aliæ febres, he-
mitritæi dicuntur. Cæterum minimè ex duabus
continuis, quarum altera ex bile, altera ex pitui-
ta oriatur, potest hemitritæus produci: quando-
quidem hæc cōmixtio, febrem horridam, & quæ
multas habeat reduplicaciones, non facit. Nam
quum omnis febris continua, sui quidem ratio-
ne, si exquisita fuerit, neq; horrorem habeat, ne-
que rigore: certe quæ ex ipsis componitur, hæc
quæquam horrida fiet. Necesse igitur est, si hor-
ridus simul atq; continuus sit hemitritæus, futu-
rus, ex duabus ipsam febribus generari, quarum

altera sit intermittens, altera uerò cōtinua. Pro-
inde tertiana mista quotidianæ continuæ, hemi-
tritæum producit: quam febrem neque vtraque
continua, neque vtraq; intermittens efficere po-
test. At uerò si quotidiana intermittens, misce-
tur tertianæ continuæ, oriri poterit continua si-
mul atque horrida febris. Hæc tamen contrariò
modo se habebit quàm prior: quoniam conti-
nuatatem quidem ex bile obtinebit: horrore uerò,
ex pituita: reduplicaciones autem, ex pugna
mutua, ac tunc præsertim, quum humores æquas
vires habuerint. Porro quæ de biliosa & pitui-
tosa febre simul mistis conspissimus, ea transfe-
rentes ad melancholicā, poterimus ipsius cum
vtraq; illarum cōmitionem & confusionem si-
muliter cōiecturari. Voco enim complexionem,
dum invadunt differēbus horis: confusionem
uero, si eodem tempore inciperint. Tres itaq; si-
mul febres completi quispian & cōsum iteri po-
terit, ipse per se, ex iis quæ diximus, contem-
pationem exoritur. Nam horum omnium princi-
pium, fons, atq; elementum est, singularium fe-
brium formam atq; figuram exquisitè cognosce-
re: id quod persfacile existit, quum tres tantum
existant numero: nempe quæ ex amara bile, & quæ
ex atra, & quæ ex pituita gignitur. Quare singu-
laræ duas habent differētas, continuæ scilicet
intermittentisq; ita vt omnium quæ ex humo-
rum putredine ortum habent, fiant sex numero
differētiæ. Quod si quæ alia accessione particu-
larum præter has differētia, ea vel ex multitudine
humoris, vel ex quantitate vel ex qualitate put-
refactionis, ac præterea ex modo motus, & par-
ticula in qua putredo consistit, habebit originē,
tam uerò quæ intermissione habuerint minore
febres, nempe accessione ipse in longius tē-
pus producta, et sanè extensæ vocantur: quæ ta-
men in eo quod magis aut minus, variis differē-
tiis recipiunt. Ex accessionis autem & intermis-
sionis spacio, opportunum ad exhibendum ci-
bum tempus cognoscitur.

CAPVT IX.

Quum autem oriri soleant ephemeræ, sangui-
ne nō putrefacto, sed tantummodo calefacto: in-
uestigandum nobis iam est, si putrescere illum a-
liquando contingat, quænam species febrium gi-
gnatur. Porro ab aliena caliditate exoriri putre-
dinem, rectè professus est Aristoteles. Vocat au-
tem alienam, externam: non familiarem, neq; in-
tuam. Hæc si quidem coquere nata est, illa uerò
corrumperet, * quod est putrefacere. Incalescit
autē externo calore sanguis, & insolari desitio-
ne, & pessilē aëris flatu, atq; in febribus vniuer-
sis, quæcumq; ex causa nascantur. Vbi uerò in ali-
qua corporis parte sanguis plurimus accumulatus,
eiusdem partis vim superat, corrumpi cōse-
quit: præsertim si in paruis vasis propter crassitu-
dinem conspiciatur, aut ob multitudine impin-
gatur: quemadmodum videre est in vniuersis in-
flammationibus in quibus sanè duabus de cau-
sis ipse sanguis corrumpitur: & quia scilicet non
diffunditur, & quia à natura non vincitur. Nonnun-
quam itaq; sanguis in inflammatis partibus sub-
ire potest putredinem: ex qua simpliciores quid-
em, quàm ex aliis humoribus febres oriuntur:
similem

Hemitritæi or-
tus.Febrim com-
plexio ex con-
fuso quæ.Putredinem fe-
brium vniuer-
sa differētia
simplici, immo
numero am-
buitur.Ephemera cuti-
ridum aëris à
sanguine calida
fit.Putredo ab alie-
na productus
caliditate.
Calor nativus
coquere, alio-
rum corruptio-
nem natum.Sanguis quon-
do externo calo-
re incalescit.Sanguis in in-
flammati partu-
culis duplato de
causa corrumpi-
tur.Febris à putre-
dine sanguinis
ortus simplicior
est: quæ ab
aliis humoribus.Hemitritæus
exquisita quo-
modo constituitur.Hemitritæus
non exquisita
quid dicitur.Hemitritæus
exquisitus
quid dicitur.Hemitritæus
exquisitus
quid dicitur.Ephemeræ febres
nec horrorem,
nec rigorem fa-
ciunt.

similem tamen accessionū proportionē seruantes, qualem tertianæ febres ostendunt. Sic enim in his quæ laterū inflammationes patiuntur, est obferuatum: quo tempore maximè rubidum expuunt. Quod si sanguis supra modum affetur, pars quidem eius subtilior ac pinguior, omnino in fluxum bilem conuertitur: crassior autem, in atram: quod in his moribus, qui carbunculi appellatur, videre licet. Igitur pro varietate humorum in quos cōuertitur sanguis, febres fiunt, solum bonitate vel malitia diferentes. Illæ liquidæ quæ sanguinis cōcōctionem transmutatioem, sunt simpliciores, tum in reliquis, tum in caliditate qualitate maturi. Nam etsi se plurima manu tangeant offere, est tamen omnino mitis: si uero quæ in balneo cōtralpui. Semper enim multitudo febrilis caliditatis, in multitudine effluxus consistit. Quod uero tangenti manus calor molestus sentiantur, id pro uenit ex humoris accedine. Si igitur calor & apud, & minus insuauis uideatur, & sanguine proficitur. Qui uero molesti, rodentes atq; mordaces existunt, cōcoquantur utraq; bilem. At ubi in primis occurrit, aliquid magis vaporosum q̃ acre, se representat manus, sed per modum paulatim crescit mordacitas, eaq; admodum inæqualis, perinde ac si per cribrum excolari uideatur, ex pituitæ putredine oriatur talem febrem ne dubites. Indaganti autē mihi, cur in febribus alius calor æqualis occurrat: quæ uero ex pituita ortum habent, talem caloris inæqualitatem ostendit: tenacitas & pituitæ crassitudo, quæ dissoluitur ægrè, uisa est esse in causa. Si quidem ex eo humore, si uero ex aliis omnibus, ea pars prima omnium expirat, quæ iam attenuata fuerit: uix autem attenuatur, quod ualde crassum existit. Quod si etiam natura frigidi fuerit, tunc difficultas augetur: ac proinde nō totus humor, nec ex omni parte æqualiter, sed ex illa tantum, in qua putredo invaluerit, effluat, atque attenuatum effertur.

CAPVT X.

Solent autē per circuitus affligere, quæ admodum febres, alij etiam morbi particulares: ut lippitudines quædam, nonnullig; aurium, capitis, oecidui articulorum dolores. Ut igitur per hosce affectus uidere licet, uenas quidem in partibus quæ exacerbantur in humore atrolli, atq; inflammationē augeri, doloresq; intendi, ac deniq; affluxum materię inuoluit ad exteriora fieri: sic etiam in interioribus oportet imaginari ea omnia, quæ cum minimè cadant sub sensum nostrum, eandem tamē cum illis perpetuū analogiam sortiuntur. Itaq; in laterum & pulmonis inflammationibus, circa accessionē quidem principia, tumores crescunt: in declinationibus autem, evaporant, & submittuntur. Porro alibi à oobis est proditū, esse quatuor naturales potentias, à quibus dispensantur tū plantæ, tum animalia. Quarum prima quidem est, similis attractrix: secundæ, eorundem retentrix: tertiæ post has, altera, quarta deniq; alienorum expultrix. Duplex autem est in omnibus rebus alienum: alterum quidem quælitare, alterū uero quantitate. Accuratur autem hoc, ob eorum potentiam quæ in membris sunt, vel imbecillitate, vel robore. Ete-

oim si æquæ valentes ipse partes extiterint, & metus qui iouitilem materiam deducunt, secundum naturam se habuerint, tunc membra sanitate fruatur. Vbi uero plus assumptū fuerit, quam alterari possit, omne id quod superfluum est, uirtute expultrice trahitur, excernitur: Quod si hæc imbecilla fuerit, in eodem residet loco: ac si multum sit, grauat, distenditque: sinace, exedit, ac mordet: si uero & quod calidū est, calfacit: quod frigidum, manifestè refrigerat. Solet autem sepe excrementum ab aliis in alijs partibus transfluere, fortioribus nempe id semper à se pellituribus, suscipientibus autem imbecillioribus: Qui motus nō cessat, donec in eas quæ omnium imbecilliores sint, oberrans humor incidit: Hinc uero ad fortiores relabi est impossibile. Idcirco per plethoras atq; caco-chymias, imbecilliores partibus insecitari solent varijs fluxionū affectibus. Nilul igitur mirum, vel cerebrū, vel vniuersum caput, excrementū in se collectum, ad partes imbecilliores expellere, vel uti ad aures, oculos, tempora, labra, dentes, malas, palatū, gingiwas, gingulionem, paritidimia, aut deniq; ad glandulas illic consistentes. Quod si ex his nihil imbecillitatem patiantur, ad pectus, pulmonem, fauces, gulam, ventriculum, ipsa fluxio delabitur. Si uero igitur causa talium omnium morborū sepe numero est caput, ita & eas quæ in iecore ac liene sunt inflammationes, aliquæ partes vicinæ, vel etiam ex remotioribus aliqua uia, vel plures, generant, augent, immitunt, ac per circuitum exasperant. Qui igitur nescius non fuerit, primam inflammationis originē, ex fluxione in hepar incidente, suam ortum traxisse: ac quod deinceps exacerbetur, casum in ipsa parte patiente consistere: uigilans non mirabitur in febribus quæ accenduntur ex hepate, ordinis proportionem. Consistit autem materia inuoluit interdu quidem (quarenus dictum est) impulsu ad infirmiores particulas, interdum ab illis attracta. Etenim calor natura est aptus ad conciliandas ac recipiendas fluxiones. Proinde in corporibus plenis, aut in quibus excrementa redyuant, magna portio ad eas deluit partes, quæ in caluerit uelentius. In his autem quæ superfluitantibus vacant, admodum pauca. Nō parum uero & ad partes dolentes humoris solet confluere. Videntur itaq; manifestè, fluxionū causæ quæ ex ipsis partibus laborantibus originē trahunt, esse duplices: quarum altera est, in ipsis accensa caliditate; altera, excitatus dolor. At uero quod melius sit, aut deterius, quod influit, ex partibus mitrentibus pendet: quod plus vel minus, tum ex his quæ mittunt, tum ex his quæ recipiunt. Hæ igitur sunt differentie fluxionū, quæ sine partibus, quæ fluxiones admittunt, imbecillitate consistunt. Aliæ uero, & propter harum imbecillitatem, & propter earum robur, quæ excrementa transmittunt. Cæterum omnes quæ circa uulnus & contusionē, partibus adueniunt inflammationes, excrementis quæ à fortioribus membris propulsantur ad infirmiora, gignantur. Vbi autem cōstituta excrementa in particula inflammationis putruerint, calor quidam præter naturam accenditur, qui ab inflammato membro in alia illi

Excrementa semper a fortioribus ad partes omnium imbecilliores trahuntur.

Si autem morbus in una parte sit, fluxio in aliam trahitur, ut ad cerebrum, quæ a capite.

Febres ex hepate accensa.

Humores ad dolentes particulas.

Inflammatio per uulnus quomodo sepe trahatur.

vicina, atq; ab his in alia, successione quadā extenditur, donec ad cor aliquando ipse calor perveniat. Porro vbi superfluitas quæ ab vna in alteram partem transferitur, adeo copiosa & vitiosa est, vt facultatem recipientis particulæ opprimat dissoluaturq; sic vt iam nequeat vincere, quæ antea vincebat. tunc certe necessum est, vt ipse etiam putrescat sanguis: idq; ratione duplici, * & quia humoris, qui à proprio calore nō vincitur, nihil amplius superest, nisi vt in putredinē transcat. & quia cum superfluitatibus putrescens simul ipse putrescat. Quod si nec tanta, nec tam viscosa ipsa superfluitas existat, vt facultatē omnino dissoluat, atq; feriari compellat, semipotentis ac semivivatus in tali statu reddetur sanguis, ob cōmercium quidem putrescentis excrementorum, ad putredinē raptus: tantū verō in natura sua perseverans, quantum ab ea, quæ exornat ipsum potentia, vincitur. Vtque verō res habent, qui in prima putredine accenditur calor, acrior atq; mordacior est eo, qui naturalis existit. Tantum autem augetur, quantum natura superfluitati suppedat. Hæc quidem ad eum qui ab ipsis calor augetur, ferē similem quandam rationem habent, quam ligna ad ignem. Exemum hæc minime in infinitū viget tempus ad alterationem sufficiens: sed est quidam transmutationis terminus, cum tandem possunt exviri, quoadu aliquid naturæ caloris habuerint. Qui vbi consumptus ex toto fuerit, tunc ardere iam desinūt: & quæ superstant reliquie, cineres appellantur. Eodem igitur modo putrescentium humorū caliditas permanet, donec prorsus fuerint asiani. Parum autē reliquiarū terrestrium resistere ex humoribus est verisimile, quoniam in eorū substantia humidum & ossificum prævalet elementū. Cum itaq; feruentes in putredine humores à calore extenuentur, substantia ipsorū, vbi febres cōsistunt atq; declinant, in ambieutem aërem discutitur: superfluitas autē, vel exigua remanet, vel nulla penitus: ex crassioribus quidem humoribus, pauca: ex resosioribus verō nulla. Quod si nullam imbecillitatem pars inflammata contraxerit, neq; iterum superfluitates accedant, aggritudo finietur, nec rursus homo febricitabit. At si illæ mittantur de novo, aut ne mittantur quidem, sed adsit sola potentia imbecillitas, hominē secundō febrile est necesse. Fingimus enim, primū quidem validā esse particulæ facultatē: interim verō easdem io paribus, quæ prius transmiserunt, acervatas esse rursus superfluitates, & quantitate & qualitate pares, us quas antea immiserant: certē nemini dubiū est, quoniam eodem quoq; circuitu ad eas expellendas, versus imbecilliora membra, moubentur ipse immittentes partes. Si quidē vis excretoria tunc primū excitatur ad proprium opus, quando aut multitudine superfluitatū gravatur, aut qualitate pungitur. At verō cum in lippitudine quæ per circuitus accedit, medici qui se oculario vocant, semper oculis negotiū

habitant. Nam quandiu humor qui ad caput confluit similis fuerit, eadēque dispositio capina, tandiu superfluitates æquali tempore, & similes & æquales acervabuntur, simileque oculorum exasperationes oriuntur. Quod igitur contingit in oculis, idem in pulmonia, cerebri, laterū, & aliarum partium inflammationibus accidere potest, si illis quæ superfluitates transmittunt, sint eodem tempore imbeciliores. Mirandum autem non est, si non iisdem statim temporibus eadem excrementa acerventur. Nam cum is qui pro alimento sanguis deferatur, non semper visquequaq; sit similis, nec item nutriendarū particularum eadem dispositio: alij aliud sufficit tempus ad colligendam tantam superfluitatem, à qua quidem vbi primum membri natura laceratur, cogitur eam tanquam alienum onus protrudere. Sed neq; ob accessiōis imparitatem mirari oportet. * Nam si non eadem est nec species, nec multitudo superfluitatū, non oportet eas similiter omnibus aut accendi, aut dici. Nam quæ plura & frigidiora, tenacioraq; & crassiora excrementa sunt, faciunt accessiones longiores: quæ autē pauciora, calidiora, & subtiliora, breviores. Præterea rarior quidem corporis habitas, breviores sui ratione accessiones reddit: densior autem, longiores. Quiniam potentia robur, minus diuturnas efficit accessiones: imbecillitas autem, in longius tempus producit. Longissima itaq; accessio fiet ob materię invitis multitudinem, crassitudinem, lentorem, facultatis imbecillitatem, ac meatuum angustiam. Brevisima autem, propter materię invitis subtilitatem, paucitatem, potentia vigorem, ac laxitatem meatuum. Cum igitur primæ accessiōnis tempus adeo breve fuerit, vt antequam superveniat secunda, iam prima quieverit, omne id temporis spacium, quod secunde principii & primæ finem interiacet, sine febre est. Si verō secunda invadere anticipaverit priusquam omnino prima solvatur, nihil intervenit medium. Hoc autem fit, cum facultas membri recipientis superfluitates, sanguinem in se contentū, quemadmodum antea, cōvincit. Quod si quando imbecillior reddatur, non solum materia invilis, sed sanguis etiam cum ea corruptus & putrescit, ex eoque accenditur febris: atque hinc oritur aliud principium earum, quæ per circuitum fiunt, accessiōnum. Si igitur caliditas ab excrementis orta, etiamnū perseveret, duplex febriū seinvicem completentium species gignetur. At si illa cessaverit, membri verō fluxionem recipientis remanens, quæcumq; de parte mittente prius exposuimus, eadem de hac quoq; intelligantur. Nam & ipsa aliquas in se superfluitates gignet: idq; duplici ratione, quemadmodum illa, & quia vitiosum sanguinem continet, & quia facultas eius est imbecilla. Eodem modo si ex aliqua quavis causa membri vis adeo debilitetur, vt is qui adiacet sanguis, illi sit potius oneri, quam nutrimenti: cōtinget vt corumpatur, aut si calidior sit, putrescat. Nam si frigidus fuerit, & pituitæ naturam gerat, non subito, sed tempore ad eandem veniet dispositionē. Porro si eas quæ in ipsa genitæ fuerint superfluitates,

Sanguis quādo
necesse est po-
tentialis.

Excrementa fo-
mit calori præ-
ter naturam,
quemadmodū
ligna ignem.

Febres per cir-
cuitus accedunt,
vnde accedat.

Excretoria facul-
tas quādo mo-
vetur.

Lippitudinem
accidentem per
circuitus quā-
modo curari
Galenus.

Accessiōnum
imparitas vo-
de accedat.

Accessiones lon-
giore aut bre-
viores fieri, vo-
de accedat.

Accessio longissi-
ma à quib. fiat

Accessio brevissi-
ma quādo ob-
tingat.

rates, nequiverit particula aut coquere, aut ad aliam partem detrudere, tale sibi ipsi febrilendi principium constituit, quale ea quæ transmittit alteri, affert. Nequit autem aliud superfluitates transmittere, aut ob propriam imbecillitatem, aut propter recipiens robur, aut denique ob conspersiones meatuum, quæ fieri à lentis & crassis & multis humoribus consueverunt. Quæcumque autem naturales meatus obstruunt, hæc necessariò putrescunt tempore, atque etiam in causa sunt, ut in ea parte multitudo coaceruetur excrementorum, cuius solitaria evacuationem & dissipationem prohibent. Vnde igitur cum illis putrescunt & alia quæ postmodò acceruntur, statimque simul omnia in membro febrilem caliditatem accendunt. At verò, ubi cunctis accenditur atque augetur caliditas, illuc ab aliis partibus sanguis solet colluere. Quo igitur tempore colluit, illas quidem priuam sanguine est necessarium: quod verò patitur membrum, grauari & distendi: ipsi quoque confluentem sanguinem alterari, & quod aliæ quæ iam putruerunt superfluitatibus permiscetur, & quod dissilari, vtpote impacuum, non possit. Proinde fit, ut instat lignorum humidiorum, quæ super exiguum flammulam præciùtur asiam, succendantur. Quod totum est accessione principium. Vbi autem caliditas iam materiam conuincit, id tempus augmentum vocatur. Vbi verò calore per vniuersum corpus disperso, inflammati humores ad summum feruorem pervenerint, id accessione tempus, dicitur consistencia. Hinc igitur, si humores fuerint tenuiores, potentia robusta, corpus rarum, maxima humorum putrescentium pars in sudorem resoluta evacuat. Si vero hi crassiores fuerint, & vis expultrix infirma, necnon meatus angusti, nihil quidem defluit sensibiliter: sed id solum, quod ita est extenuatum, ut in subtilioria vaporis naturam transierit. Atque id sane tempus declinatio appellatur, humorum effluuiescuntium dissilans quidam existens. Cæterum cum in parte adhuc remaneat affectus, necessum est in ipsa aliam gigni superfluitatem, cum nimirum id quod denuò ad ipsam trahitur alimentum, non conficiatur exquisitè vniuersum. Quæ quidem superfluitas rursus id putridis excrementis in parte relictis, necnon proprio ex vitio, initium putredinis suscipit: cumque satis caluerit, rursus ad ipsam influit, quemadmodum antea, ex reliquis animalis partibus sanguis: ac sic eodem rursus modo, principii, ascensus, status, & declinatio, alterius fit accessione. Nec hoc per circuitus definit fieri, quandiu in particula gignente superfluitates perseverant affectu: quæ quidem existit duplex: altera quidem, imbecillitas partis, à qua superfluitates gignuntur: altera, quæ ex iisdem quoniam de genere ducit originem. Impossibile autem est solui remanentem illam dispositionem, si vniuersum corpus multis ac variis excrementis repleatur fuerit: ac multo etiam magis, si his accedat omnium, per quos excrementa membri excernuntur, restrictio meatuum. Sanitas autem succedet, si & meatus aperti sint, & facultas vegetior, & corrigatur affectus partis, vniuersumque corpus nec multis nec vitiosis humoribus opprimatur. Nam

quandiu hæc perdurauerint, tandiu accessione circuitum perseverare est necesse. Quemadmodum in mulieribus accidit, in quibus quandiu æquales ac similes menstruum causæ persisteant, idem circuitus servabitur. Earum igitur febrim, quæ per circuitum accessiones faciunt, nescio an aliqua fuerit nobis omisa causa: aliarum autem quæ carent ordine, nonnullæ ex transmutatione humorum, nonnullæ ob victus errorem, ad talem dispositionem deveniunt. Maxime autem transmutatur, atque in alteram transit naturam sanguis, dum putrescit. Nam pars quidem ipsius una fit flava bilis: alia, nigra. Quantam verò in ægrotantis corpore humores mutantur, tantam etiam accessione circuitus. Quæcumque autem circa victus rationem errat, ad ægrotantis sunt, ordinem circuitum pervertunt. Sæpe verò ob complicationem circuituum, quæ à medicis ignoratur, videntur absque ordine accessiones ægrotantibus fieri. Reliquum est id febrium genus, quæ synochi nominantur, quarum vniuersum tempus vnica accessione finitur: quæ vel semper in eodem vigore persistit, vel minuitur, vel augetur, donec finitur. Hæc verò omnes ex tali causa ortum habent, qualem Praxagoras existimabat, humorum videlicet in causa vena putrefactionem. Quanquam absolutior & venior hic est sermo: Quæcumque per circuitum aliquos ægritudinis accessiones fiunt, ex membrorum dispositionibus ortum habent, quæ vel mittunt, vel recipiunt, vel generant, vel attrahunt superfluitates. Atque circuitum non habent, in his nulla est corporis pars, quæ præcipue sit offensa. Qui autem in venis & arteriis omnibus continentur humores, præcipue qui in maximis & plurimo calore abundantibus delitescunt, aut ob aliam quamvis causam, quemadmodum in ephemeris, aut ob putrefactionem feruentes, febrem accendunt synocham, quæ à principio usque ad finem nullam habet intermissionem: ac tandiu perseverat, hominemque devit, donec humores ipsam gignentes, aut consumantur penitus, aut coquantur, aut vitæque parsitur.

GALENI PERGAMENI de marasmo siue tabe, liber.

Marasmus est viventis corporis interitus præficcitate. Cum autem interitus bifariam dicatur, tum de eo qui fit, tum de eo qui iam factus est, sanè secundum prius significatum oportet appellationem accipere. Similiter etiam marasmus, hoc est, tabes dupliciter dici potest, nempe cum iam aliquid tabuit, vel cum adhuc tabescit: de qua quidem significatione secunda, impresentiarum nobis est sermo. Porro cum genera viventium sine tria, videlicet animalia, stirpes, & semina, ac propter hæc etiam fructus: tabem quidem esse horum affectum, proprie loquentes dicimus: quamvis per translationem & ceteros etiam interitus, cum ex ficcitate proveniunt, communiter tabem appellent. Cum igitur primi & simplices modi quibus omnia vivencia intereunt, sint quatuor, siquidem & elementa substantiæ eorum quaternò etiam numero.

Excrementa
aut nequeat
pars una ad aliam
mutare.

Accessione fe-
brilis tempore
describitur.

Declinatio ac-
cessione febrilis,
est humorum
effluuiescuntium
dissilans.

Afflicta pars
duplex.

Accessionem
circuitus quoniam
de declinatione,
& quando perseverant.

Sanguis putrescit,
non alia naturam
transit,

Circuitus ordo
non pervertitur.

Synocham vni-
uersum tempus
vnica accessio
est.

Circuitus facit
interitus, ex
membrorum di-
positionibus, vni-
versis attrahitur.

Synocha gene-
rata.

Marasmus est
viventis corporis
interitus
præficcitate.

Marasmus est
duplex.

Viventium ge-
nera tria.

Tabes quatuor
esse affectus des-
cendunt.

Interitus modi
sunt quatuor.

Elementa vni-
versum quatuor
sunt.

ro ambiuntur: tabescere sanè ea dicimus, quæ ex siccitate intereunt. Quòd si hæc tantum habeant, quòd siccitentur, altera verò contrarietas quæ inter calidum & frigidum intercidit, intra suos terminos maneat, simplex & tabes erit. At si vel caloris vel frigoris accedat immoderatio, iam modus is interitus; duplex & compositus erit. Simplex itaq; tabes inædus solum supervenire, tam eorū qui inædiam spontè tolerant, quàm eorū qui præ alimentorum penuria, fame con-

Tabes simplex quæ dicitur. Tabes composita quæ. Tabes simplex inædus solum supervenire. Tabes composita quæ supervenire contingunt.

Tabes fieri non potest, nisi animæ principium affectum sit.

Senectus vitari non potest, immutabilis est nature opera.

Nature opera quæ. Senectus.

Senio animalis vita efficitur obnoxia.

Calor noster quomodo exoritur & immutatur ad opem.

alimenti coniungit, ut contabescat paulatim: atque id ipsum existit senectus. Sed & paulò post extinguitur penitus, id quod mors est. Hæc itaq; sermo omnibus ferè tam philosophis, quàm medicis rectionibus placet, licet verus omni ex parte non sit. Hallucinantur itaq; dum flammam ignis omnino cum calore animalium cõferunt: idq; minime animadverentes, quòd ortus flammæ est ex materiæ interitu, de qua ea est accensio. Animalia verò, non sic sum, ab eo qui illa effinxit, infusum habuere calorem: sed potius vt ab eo augerentur regerenturq;. Nec vilius est tempus, quo innatus is calor per vniuersam eam marciat non diffundatur, vires non modò eas cõtens, quibus animal format, verum & aliis præterea plures: quippe & alimentò attrahit, & materiam dispensat, apponit, vnit, assimilat, omniaq;, vt in summa dicam, circa sibi congenitam materiam perficit, contrà quàm flamma facit.

Senectus quid mors.

Flammæ quæ non est composita cum calore animalis. Calorem nostrum, et flammam quæ ignis est, dissimulando.

Caloris opera.

Nam quæ vnquam flamma, materiæ cui annexa est, adauget: vel quæ etiam materiæ potius alimentam assimilat, quàm eam sibi? Et quæ tot excogitavit modos, vt eam tueretur materiæ? Itaq; cum illi udem tantum calorem esse naturam fateantur, non rectè faciunt flammam eum compariantes. Nam quòd ait Hippocrates, eum calorem nos interficere, qui genuit corpora: certè si liber ille referri ad Hippocratem debeat, locus is requirit expositionè. Verum si quidem est, corpora ob innatum calorem senescere interireq;: modus tamen, quem isti aiunt, verus non est. Neque enim vt flamma ligna, ita innatus animantis calor, eorum corpora absumit. Quod fortassis exemplum illis congrueret, qui ob febrem caliditatem intereunt. Porro natura, quæ tum animalia, tum plantas procreat, omnino corporeis aliquod principium, ad illorum generationem assumit: cum nihil sit, quod vquam possit sui ortus initium habere, ab eo, quod penitus est con-

Calorem nostrum esse naturam. Calor qui genuit corpora, quæ resunt nati. Senectus ob innatum calorem corpora.

ens. Inde verò exorsa, semper in eum scopum ordinatè tendit, quem in ea procreatione statim ab initio sibi proposuerat. Id autè est, perfectum illud reddere, quod ab ea gignitur. Sanè perfectum est, quando nulla suarum functionum deest illi. Ipsarum autem functionum complures durioribus instrumentis egent. Vnde postea fit, vt multæ in animantibus particule duræ evadant. At principium generationis ipsarum, contrà quàm in animali perfecto, necessarium est vt sit molle, vt & aptè cõpingi, efformariq; possit, & ad omnia tractabile se suo conditori exhibeat. Ac proinde, quantumcunq; semet sit durum, molles tamen plantas editur, modèrati nimis quodam humore prius macerata, vt pro femine fiat natura. Itaque si opus est, vt generatio animalis à substantia molli sua habeat exordia, quæ vt absoluitur, ita dureat: necessæ itaq; fuerit, vt in prima elementorum, vnde illa constituitur, temperie, tum humidum, tum siccum præpolleat. Ceterum humidum quidem ipsum est aqueum: sicum autè, naturaliter aut est terreum, aut igneum. Fieri verò minime poterat, vt statim à primis exordibus, plus terreni cõmiseretur, cum opus esset principium animalis fore humidum: reliquum igitur, solum est igneum, quod in prima animalis gene-

Nihil ex nihilo fit.

Principium generationis partem calorem, carnis essentia sit habundans.

ratione

ratione & formatione, obinet principatum. Si igitur fieri possit, vt natura cum animal, vel plantam, ad consistendi vigorem perduxerit, aliam rursus elementarem dispositionem, proportionem viribusque aequalem, apponeret, sic tantummodo sua illi fabrica posset expers tam sentis, q̄ interitus perdurare, si tamen custodire sapientia alicuius viri mox demandata fuisset: alioqui si malam adhibuisset victus rationem, ab interitu immunis non esset. Nunc verò posteaquam prima elementa generationis tam animalium, quam plantarum, nec transferri, nec transmutari possunt: idcirco necessum est, post consistendi vigorem corpus semper ficescere, quamvis non amplius egeat, vt id ipsum patiatur, cum iam illi visus non sit, vt ficescat. Verum etas in diuinationis, quæ ficescatem quidem, quamvis exiguam, habet, multos laetæ, ac si non dum aliqua tabes sit. Senectus autē, quæ ab ea non genere, fed tantum magnitudine differt, facile deprehendi potest. Hęc igitur causa est, quæ vniuersam animam tribus tractu temporis ficescatem præbet: perspicuè ostendit, senium nec evitari, nec etiam sanari posse. Etenim vniuersa etas, quæ vigori succedit, frigida est & sicca. Manifesti autem signes, inter eorū etatem qui iam declinant, & eorum qui senescunt, humidiorum est excrementorum experientia. Vnde quidam decepti, statuerunt senium esse humidum. Ceterum & omnes actiones etiam in his fieri imbecilliores, manifestè videri possunt: atq; etiam via ad mortem, quæ latebat in inclinatibus, iam omnibus fit cōspicua. Quam obrem senescunt tabes nequit vlla ratione dissolui, licet ipsam plurimum remorari possimus: quod minus ad gerocomicem, hoc est, ad artem senū curatricem, spectat. Quæ quidem hoc sibi proponit, vt quoad eius fieri potest, obstitat, prolubeatq; quod minus ipsum cordis corpus eoque arefacit, vt ab omni opere vacet. Siquidem vitæ terminus vacuitas cordis est ab actione: cum impossibile sit mori animal, quando cor sua actione moueatur. Quare si possit subitannā corporis ipsius cordis humidior fieri, vel per louē etiā iecinoris, poterit senectuti obstiti. Si vero nemo est, qui queat iecur vel cor humidiora reddere, quā ipsa sint ex se, sed potius semper tempore procedente ea necesse est indies ficiora fieri, cum eisq; arterias & venas, senium quidem prohiberi nō potest: potest tamen detineri, ne citō ingruat, idq; lumenstante adhibita victus ratione, quæ nimirum augere possumus illam humiditatem, quæ in corde iecinorēque est dispersa. Cum autem cor (cui valentissima est attractrix facultas) sit origo pulsum & arteriarum, quemadmodum venarum atq; sanguinis hepar: contingit vtiq; vt hæc viscera nunquam moderatis alimentis destituantur, nisi cum valida sanguinis penuria vniuersum occupauerit corpus. Vnde vbi corpus ex longo morbo extenuatum fuerit, putandum nō est, cor quoq; atq; etiam iecur, esse pro aliorum proportionē extenuata. Ceterum vera tabes, similiter partes omnes occupat, propterea quod etiam e principia ipsa. Atq; hæc tabes in ætate quidem, est senium: in iis verò qui præter

naturam affecti sunt, febris tabifica, & alia præterea affectio, quam senectam ex morbo cōmodè appellauerimus, idq; longè melius quam Philippus, qui eam etiam tabidam febrem nominat. Nam neque febris vnquam huiusmodi erit affectus, vbi cor frigidius redditum est, quā ratio naturæ postulet. Quod autem per eum affectum sit talis ipsius cordis temperies, indicio est pulsus rarus & paruus, similiterq; spiratio rara si mul & parua, necnon qui expiratur aer, minimè calidus. Quæ sanè tabis species fit, febribus ob intempestiuā immoderatamq; refrigerationem in eam transmutantur. Est & alia tabis species, quæ dicitur torrida, sicuti & tertia, quam synopalem appellant: quarum illa quidem ortum habet a calore, febribusq; ardentissimis, maxime verò vbi habitus fuerit ficior: hæc autem gignitur, quando iis qui corpepi fuerint deliquo animi, vbi vehementiam periculi effugerint, aliquid ex eo affectu remanet, ita vt adhuc defectum illum animi sapiant. Est autem duplex ipsa extenuatorum affectio: vna quidem, vbi is humor solidorum corporū perit, qui eorum proprium est alimentum, & præterea molliores carnes liquæque sunt: altera verò, dum solidiora enī corpora sunt exsiccata, quæ vtiq; & prima, & similia appellantur. Hęc igitur nequit curari, sicuti nec senectus. Altera verò periculo quidem non caret, non tamen eoisq; vt nullo modo curari possit. Igitur humectare oportet tres illas species tabisiam dictas: & hoc est illis commune, quippe quæ cōmunem ficescatē fortiantur. Sed earum vna eget vt calseat: ea nimirum, quam comparauimus senectuti. Altera verò, quam esse torridam diximus, refrigerari postulat. At tertia, quæ habet animi deliquum cōiunctum, si nō dum facta sit, sed etiam num fiat, ita vt humiditas solidis membris innata absbsumatur, miscellaneam curationem desiderat. Conspiciū autem humectare resiceret exsiccatos videtur balneū, vt facile possumus in iis obseruare, qui ætate sub sole vel iter faciant, vel alio quopiam modo exercentur, aut exvuntur. Hos enim omnes, atque etiam eos qui sinuosi sunt, humidos reddat, & sibi liberat. Sed & alios omnes quocumque modo exsiccatos, siue ex vigilia, siue ex curis, siue ex venere, siue ex edulis, vel medicamentis exiccantibus, siue ex ira: hos inquam omnes mæd facere fouereq; balneum videtur. Cum autem sint tres differentes febrium generalissimæ, in præsentia quidem omittamus diuinas: conuertamus verò sermonem ad eas, quæ ab humoribus proficiuntur: & ad illas etiam, quæ quod in habitu sint, hæctice nominantur. Illis igitur quæ ex putredinibus humoribus accenduntur, si concocti uiserint, balneum remediō est. Hæctici verò quæ sole consistunt, nec aliud quodpiam genus febres secum habent, balnea quovis tempore cōferunt. Sin autem illæ secum febrem aliam habuerint, exiis quæ ab humoribus pendunt, cum q̄ concocti iam fuerint. Eadem etiam tempora putandum est esse cōmoda, ad propinandum frigidum: præterquam quod si in hoc aberrauerit, id minimè fiet sine magno incommodo. At balnearum usus in iam dictis febribus

Tabes, quæ ex morbo, senis appellatur, non est tabida febris. Seniam ex morbo, quomodo intelligatur.

Tabes torrida, vnde signatur, Tabes synopalem, in quando accidat.

Extenuatorum affectio est duplex.

Tabes incipibilis, quomodo fit.

Tabes vniuersa, quomodo sint curanda.

Exsiccatos manifestè videtur refrigerari balneo.

Balneū visus.

Febrium tres differentia genera habent.

Putrida febres, quæ post concoctionem humorum, balneo oporletur. Hæctici febres, quibus alia non copulatur, balneo quovis tempore cōferuntur.

Siccorum nec sanari potest.

Senectus ab inclinatæ etate, non genere, sed in ætate differt. Senium nec evitari nec sanari potest. Antea vniuersa, post vigorem est frigida et sicca. Senis ab inclinatæ etate, non genere, sed in ætate differt.

Gerocomicis.

Vitæ terminus vacuitas cordis est ab actione. Senectus quæ rationem possit obstiti.

Senium detineri potest, ne citō ingruat: idq; lumenstante adhibita victus ratione. Cor est origo pulsum & arteriarum. Hepar est sanguinis origo & venarum.

Tabes vera cur ex aqua omnes partes occupat.

procul est ab omni periculo, nisi forsitan virium imbecillitas sit suspecta. Cæterum quædam ex diariis febribus, cum hæc tunc communione quamdam formantur, quæ sanæ itam in prima die exactè discerni nequeunt, sed circa secundam, vel omnino tertiam. Quo tempore, ubi quis primū eas novit, intrepidè offerre aquam frigidam poterit, cum nimirum tunc & vires validæ sint, nec deest adhuc corpori sanguinis copia. Vbi verò immoratur diutius fuerint, tunc sanæ vires imbecilliores redduntur, & sanguis exiguus sit: unde duplex ex portu frigidæ sequi solet incommodum. Primū, quod interim dum aquam bibunt, percutitur & refrigerat aliquod membrum. Deinde, quod qui aquam exhibent, nisi debitā mensuram sint assequuti, præter alias particulas illam etiam refrigerabunt, in qua est situm principium generationis febris. Vbi verò supra quàm par sit cor refrigerat, si narium vacuum adhuc humiditatem servet, vires concidunt. Si efficiatur siccus, ab eo affectu arripitur, qui similis sentio existit. Sed eodem ipso tempore, quo primū signa febrium hæcucarum fuerint conspicua, expedit ut refrigerantia medicamenta adhibeantur extrinsecus, & super ipso febris a foco, & origine. Porro cor primū, si plus quæ incalcescat, hæcucam febrem affert. Dein vero iterum: hoc tamen non habet esse, perinde ut cor, sed ob id, quod illud secum in consortium trahit. Mox verò ventriculus, & post hunc quæcumque alia, consortij lege, possunt secum cor calfacere. At pulmo hæcucā febrem non gignit, propterea quod hoc viscus humidum est, & per inspirationem assidue refrigeratur, non facile in similem occasionem incidit. * Ut plurimum autem secūdem reliqua viscera febris hæcucā gignunt, insulso bilioso humore in ventrem ipsius loci patientis. Cum itaque sola febris consistit, absque illa alterius morbi mixtura, balneum expositum, non secus ac cæteræ siccitates, quæcumque vel calidæ fuerint, vel frigidæ. Nam id sanè mirum balneum inest, quod tam calidis prosint, quàm frigidis siccitatibus: quemadmodum & illud, quod eos singulosos efficiat, qui sitis sunt vacui: id singulosus verò sitim abigat. Quandoque tamen cum hæcucā tabificāque febre adest etiam erysipelas affectus: qui exigit, ut prius cibo & potu, & us etiam quæ apponuntur exterius, refrigeretur. Quo tempore omnino est super sedendum à balneo, frigida autem confertim in ipso morbi vigore viriliter exhibenda: id cuius tamen vsu abstinendum est in principio, nisi non forsitan ipse cogat agrotos, quippe qui sit assuetus potu frigido, nec sinum perferre velit. Exterius autē sunt applicanda ea quæ refrigerant: quæ si nihil profecerint, cogendi virilia etiam intra corpus usumant. Præcipue verò illis prosunt molles lacteæ, recentelæ, solummodo in frigidam aquam demersæ, ac ita assumptæ: vel si placet, prius acetato diluto intinctæ. Extrinsecus etiam erudem lacteæ succus vtiliter adhibetur, sicuti & semperuiæ & myrtili. Præstantissimum vero ad id etiam est medicamentum confectum ex succo vire acerbæ, necnon portulacæ, cui parum albæ farinæ miscetur. Quod quidem exceptum duplici

lenteo, præcordiis est prætendendum, donec tepescere incipiat. Dein vero, ipso ablato, alterum ad movendum est. Nonnunquam is & oleum immaturum miscemus, vel rosaceum, præsertim verò si aliquid inflammationis denuntiet præcordia. Sciendum tamen est, fieri non posse, ut vbi erysipelas viscerum disposito consistit, ea sit febris exquisitè hæcucā. Siquidem exquisitè febris hæcucā est, quæ nullum habet particularis accessus principium, nullum incrementum, nullum vigorem, nullam inclinationem. Solominus autem hæcucæ febres post assumptū cibum, perinde ut calx, inspersa aqua, effervescunt. Quod incrementum si ab his, semper æquales permanent. Tabi igitur torridæ, quæ ab ardentibus febribus suam ducit originem, obstitit remediis refrigerantibus, quæ tum exterius secundū locum affectum administrantur, tum interius accipiuntur. Cum verò senescit quæ ex morbo est, invaserit, ea quidem quæ absoluta est, nequit curari: quæ autem non est perfecta, eo tamen accedit, ut ferè tam facta sit, hunc solum habet curationis scopum, quem refecionem & nutritionem vocamus. Nam corpora solida, dum arcescunt, cibum sanant. Cum autem alimentum omne, non ipsum per se deferatur ad alendas particulas, sed potius ab eis trahatur: hoc ariditatem verò atque frigiditatem, in tabidis sint illæ ad trahendum invalide semimortuæ: utique alimentum desiderant, quæ facile possint trahi, ut imbecillitatem attrahentium virium, suppleat promptè materia. At ea sunt tractu facilia, quæ tenuioribus partibus constant, suntque natura calida: quæ sanè cum difficultate nutriunt, cum alimentum omne debeat esse crassum & lentum, ut & permaneat diu, nec facile possit dissilari. Quare aliquod investigandum est, quod in mediocritate consistens, mediocriter vtraque possit præstare. Ac mihi sanè nihil ad hæc omnia lacte videtur præstantius, præcipue si quis ore apprehensa mamma muliebri, lactet. Quod si id fieri nequeat, bibat saltem lac asininum, dum adhuc caler, temporè brevisimo aëri expositum fuerit. Quæ quidem alimentorum ratio tribus illis speciebus marcoris convenit. Quinetiam præstantia & alia illis ex vsu sunt: aceto tamen condiri debent, ut facilius distribuantur. Porro mel, vel frigidioribus affectibus prodest plurimū, sic calidioribus obest summopere. Quare torridæ qui dem febris inimicissimum est: us autem qui senilis affectui expositi sunt, vtilissimum. At illis qui tabescunt ex defectu animi, nisi obstat ventriculi ratio, poterit coctum vel solum, vel aliis intermixtum cibus offerri. Opportunus balnei vsus, optimus erit auxilium etiam ad alimentorum distributionē. Erit tamen administrandum, ubi cibus concoctus fuerit, nec longior inedia præcesserit. Jam & vini potus, vel summopere frigida rabi prodest, si torridæ fugiendus est. At ea quæ in animi defectu consistit, sicuti affectus medius & miscellaneus est, sic in hoc mediā rationem obinet.

GALE-

Ephemeræ
quædam cum
hæcucā habent
non infrequen-
ter: quæ
bus aqua est
intrepidè propo-
nenda.

Frigida potus
in hæcucā quæ
incommoda in-
ferat.

Hæcucā febris
cognita, refriger-
antia esse co-
nstitutum ad
remedia cordis.
Erysip. ventriculi
quæ ratione
febris hæcucæ
faciem inferat.

Pulmo cur hæcucam
febrem non gignit
non erit ot.
Hæcucā febris
quæ ratione
fœculis reliqua
viscera ardeat.

Balnea tam ea
lida, quàm frigi-
da siccitatibus
conferunt, ut
singulosos mod-
o qui sitis
sunt vacui, at-
que sitim a sitis
bando abigat.
Hæcucā cum ery-
sipelas affert
Cum sit curatio-
nis, curatio.

Hæcucā exqui-
sita nec prin-
cipium nec au-
gmentum, nec
statum, nec de-
clinationē par-
ticulari aucto-
rius fertur,
sed tantummodo
post assumptū
cibum effervescit.
Tabi torrida
quæ ratione ob-
stat.

Semum ex mor-
bo absolutum
quid, est in-
tabitum non
absolutum aut
cibo instant
dom.

Tabida partes
qualia cibum
ta possunt.

Alimenta tractu
facilia quæ.

Alimentum un-
um cur esse de-
beat, ac crassum
et lentum.

Lac muliebri
statim ex man-
u sustinet, &
modicissimum
si ab aëre nostro
maturum.
Lac asininum
lida vtile.
Præstantia.
Alia.
Mel cum mar-
risa vtile.

Balneum quod
de adustissimis
dum est id.
Vinum in ta-
bis conferat.

GALENI PERGAMENI

contra eos qui de typis suis circumstantiis
scripserunt, liber.



Bi quid specie idem, rursus æquali sit tempore: totum ipsum curriculum, Græci periodum, siue circuitum, atq[ue] inter eos nonnulli, typum etiam atq[ue] ordinem vocat. Cæterum cum nihil vtilius sit, præsertim in febribus, quam futurarum accessio-
num principia prænotare: plurimum ægro prode-
rit per totum ipsius morbi spacium, qui nomi-
num disputatione neglecta, statim à morbi
initio, artificiali quadam coniectura poterit idi-
psum assequi. Quod si quis prima statim die per-
venire ad talem cognitionem non possit, pote-
rit certe secundam, vel tertiam, vel quartam. Si quis ve-
ro sit, qui neq[ue] in hac morbi speciem nouerit, is
non exiguam artis partem ignorat. Etenim tum
alia, tum febrium accessiones, vel quotidie, vel
tertio, vel quarto quoq[ue] die invadunt. In quim-
plurimis siquidem morbis, ubi sanè maxime vti-
lis sit futura accessio: prænotio, ea vel alternis
diebus fit, vel quotidie, in paucis vero quib-
usdam per quartum. Qui verd præter has tres
periodos, & quintanam, & sextanam, & septima-
nam, aliaq[ue] innumeras esse arbitrantur, præter-
quam quod inania produciunt, infinitisq[ue] cogi-
tur dare periodorum complexus, nunq[ue] poterit
futura accessione prænotare. Porro quis fue-
rit huiusce attonitæ sectæ autor primus, ignoro:
dicam tamen, quidò primum illam explicari au-
dierim. Decefferat paulò antè de vita Antoni-
nus, qui Adriano in Imperio successerat, Regna-
bat autem Severus, qui seipsum nomine muta-
to, Antoninum appellavit: Lucium vero, quem
Imperij participem fecerat, Severum appellavit.
Cæterum præter illorum absurditatis ne memi-
nisse quidè, Pythæi præcepti memores, Esse par-
eendum temporì. Nos vero in præsentia diem,
tempus id vniuersum dicimus, quod diem atq[ue]
noctem complectitur. Quia ratione dicunt annu
constare diebus trecentis & sexaginta quinq[ue], &
quarta vnius parte. Horæ itaq[ue] quatuor & vigin-
ti, diem absoluant: duos autem, octo & quadra-
ginta: tres, duo & septuaginta. Typis autem no-
mina in dicta sunt, non ex diebus ipsos comple-
ntibus, sed ex accessionu reditu. Ternanà quippe
appellamus, ubi accessio tertio quoq[ue] die inva-
dit, duobus interim absolutis: quartanà, in qua
videlicet quarto, in hac quoq[ue] tribus iam perfe-
ctis: & in aliis quoq[ue] secundum eandem ratione.
Si igitur periodum inveneris typi alicuius, qua-
tuor continentem complexos dies, illum quin-
tanà dicis. Negi enim est idem, accessione quin-
to oboriri die, & esse quinq[ue] dierum circuitum.
Siquidem numerus horarum periodicari, qui iux-
ta duo initia accessio: non est mediâs, conside-
randas est, atq[ue] ex illo typus febrium meriendus.
Sic enim dicimus, quotidianu typum fortin ho-
ra viginti quatuor, tertianu quadraginta octo,
quartanu septuaginta duas, quintanu nonagin-
ta sex. Quo similiter passio ceteri perficiuntur
ex horarum viginti quatuor mul-
tiplicatione.

GALENI PERGAMENI

de typis, lib. Vnus.



Typus est ordo intensionis & remissionis: periodus verò est tempus inten-
sionis & remissionis, quod iuxta mor-
bis exiit. * Pauci autem ex affecti-
bus carcat typo: vt atrophus, nervorum resolutio,
elephantiasis, & quicunq[ue] his proportionem
respondent. Plurimi verò affectus typum quidè
præ se ferunt, verum rarius. Porro omnium ma-
ximè febris typos admittunt, iis continuis excep-
tis, quæ vel remittunt nunq[ue], vel inordinatè ex-
sistunt. Typorum itaq[ue] alq[ui] quidem sunt primi, alq[ui]
verò secundi, alq[ui] permanentes, alq[ui] mobiles, alq[ui]
simplices, alq[ui] cõpositi. Primi igitur sunt, qui bre-
vem habent invasionem, longam autem remis-
sionem: quales tertiani & quartani existunt. Se-
cundi verò, qui longam habent invasionem, bre-
vem autem remissionem: vt quotidianus & val-
de extensus semitertianus. At permanentes sunt,
qui iisdem horis perpetuò invadunt remittunt-
que. Mobiles verò, qui diversis semper horis ac-
cedunt. Ex quibus qui præveniunt, & celerius
horas præoccupant, proleptici: qui verò tardius
morantur, hysterici nominantur. Simples sunt,
qui vnum tantummodo insulsum faciunt. Com-
positi, qui ex pluribus invasionibus & remissio-
nibus constant. Cæterum compositorum quiddam
ex homogeneis, id est, genere similibus: quidam
verò ex heterogeneis, hoc est, dissimilibus con-
stant. Ex genere quidem similibus, cum quoti-
dianus typus (exempli gratia) simplex, duplici
quotidianum implicatur: aut duplices tertiani,
aut tres tertiani existunt: vel rursus duo & tres
quartani. Ex diversis autem genere, cum quoti-
dianus (exempli causa) tertiano consuectur, aut
tertianus quartano. Etenim quotidianus est,
qui quotidie vnam invasionem longitudine cõ-
mensuratur, vnamq[ue] similiter remissionem effi-
cit. Tertianus autem, qui tertio quoque die, vni
invasionem & remissionem similiter cõmensu-
raram adducit. Quartanus denique, qui quarto
quoq[ue] die suam invasionem & remissionem mo-
latur. Atq[ue] eadem intelligantur de quintano & se-
ptimano, & si quis alius typorum ordo inveni-
tur. Porro quotidianum consequitur typum, hu-
miditas habitus, vomitus pituitosi, sitis non ad-
modum intensa, tonus corporis gravitas, som-
nus gravis atq[ue] profundus, pulsus magnus, ra-
rus & laxus, facies fulvida, taxa & præmolli-
tis, & quæ multâ præs se ferat materie tum præstitæ,
tum murationem. In hoc enim typo splen-
dior evadit. Quod si protrahatur diutius, tre-
muli & veterinosi sopores sequuntur, & thoracis
fluxiones, & aquæ inter cutem affusiones. Post-
sumum autem huiusmodi male affecto conti-
nuantur. Tertianum verò comitantur sitis inten-
sa, ætus, æves utq[ue] biliosi vomitus, in edicis inquie-
tudinèq[ue]. Vt plurimum autem rigores hunc præ-
cedant, nonnunq[ue] verò etiam refrigeratio. At pul-
sus in his qui tertiano typo vexantur, parvus &
frequens subsequitur. Noctes, quæ accessionis
dies præcedunt, moleste admodum sunt. Vbi ad
acm morbus produciatur, non amplius moleste

Typus accessio-
num quid.
Periodus accessio-
num quid.

Typus carcat
febris.
Typorum diffi-
cultas.

Typi primi.

Typi secundi.

Typi perman-
entes.

Typi mobiles.
Typi proleptici.

Typi hysterici.
Typi simplices.
Typi cõpositi.

Typus quoti-
dianus.

Typus tertianus.

Typus quartanus.

Typus quoti-
dianus qua-
druplicatus.

Quartianus la-
tis accessio fe-
bris indicatur
bona.

Quotidianus
typus venarum
in male affecto
constans indicatur.

Tertianum ty-
pum quæ cõse-
quantur.

Periodus.
Circulus.
Typus.
Ordo.

Accessio: siue
tota: conu-
lsum, in feb-
ribus est maxi-
mè vtile.

Adrianus Im-
perator.

Adrianus Imp-
eratoris stude-
re nomine vo-
catus fuit Anto-
ninus.

Lucius fuit ap-
pellatus Seve-
rus.

Tempori esse
parandum.

Dies quod tem-
pus sit.

Anaxora quæ
dictum conficit.
Flora.

Tertianus qua-
druplicatus.

Quartianus qua-
druplicatus.

Typus febrium
rude metens
duo sit.

Febrium inter-
mittentium ty-
pi singuli, quæ
impleantur ho-
re.

exiſtunt, ſed febrem ipſam compeſcūt. Qui verò ita febricitant, quandoq; à tertiano in ſemiter-
 tiano tranſeunt. Hic autem tertianus typus om-
 nium minimè vexat, præſertim ſi æſtate fuerit cō-
 tractus. Quod ſanè indicauit Hippocrates, di-
 cens: Ternana exquiſita ſeptem circuitibus, qd
 longiſſimū eſt, iudicatur. Rarò autem diurna
 fit, niſi deſineat autumno, aduentatēq; hyeme
 gignatur. Vixne ſunt flauæ, necnon vigilæ infe-
 ſtant. Omnia autē quæ comitātur tertianam, eadē
 & ſemitertianæ contingunt, cum euſdem
 generis ambæ participes ſint, tertio quoque die
 molietes remiſſionū & acceſſionū repetitiones.
 Propriū autem ſemitertianorū typorum exiſt
 in vaſionū extenſio, & quod plerūq; cum reſtri-
 gatione, & ſtatu nōdum completo, ruriſus acceſ-
 ſionem inſeſtant. Arqui ſemitertianæ periculū
 ſemper minatur, eo quod nō ſolum os ventricu-
 li & neruoſas partes attingat, & in vniuerſum
 eas adhuc, quæ mediæ cōpoſitione cōſiſtunt, verū
 etiā veternoſos inducat ſopores, & cum de-
 liriis vigilas annexas: nōnūq; & reſolutiones,
 quas ſyncope comitantur: linguā etiā validè ſiccet,
 atq; animi defectum efficiat, ea quæ ſunt in
 profundo vehementius cōmouent. Vt autē ſum-
 matim dicā, typus hic ſerius eſt, periculūq; vn-
 decunq; portendens. Quandoq; autē primo die
 cōſtituitur, quemadmodū cæteri typi: interdum
 verò & à ſecundo & tertio incipit. Oriur autem
 nonnūq; à tertiana producta: nonnūq; etiā ſolus,
 in tertianam degenerat: interdum verò
 & in duas tertianas & quondianas, ob longi-
 tudinem in vaſionis, diſtinguitur. Plerūq; autem, qd
 attingit ad naturas, virilem corripit: quod æta-
 tis, florentem maximè: quod verò ætatis ad anni tem-
 pora, in autumno præſertim, quādo & valde pe-
 riculoſus exiſt. At nō perpetuò continuus eſt,
 ſed & intermittens quandoq; inuenitur. Habet
 autem & tres, quod ad eius magnitudinē, differen-
 tias: alia ſiquidem ſemitertianæ eſt exigua, alia
 media, & alia magna. Exigua igitur eſt, quæ cir-
 ca viginquaginta leoras torquet. Media, quæ
 circa triginta ſex. Magna, quæ circa quadraginta
 octo: quæ & cōtinuæ febris eſt propinqua. Porro
 Agathinus à relatione ad tertianā, ſemitertianā
 fieri cenſet. Etenim tertio quoq; die vtriſq; ſunt
 in vaſiones. Quartanū verò typum rigoris qui-
 dem validi conſequitur, & vomitus pituitoſi, &
 lienis inflammatio, & tumor: nonnūq; & aboli-
 ta appetentiā, & ſalutis copia. Interdum etiā ex
 contrariis appetitus intensus. Quāthodq; & nuſci-
 ſicalia ſimul adeſt, ſi corporis habitus corrumpat-
 ur. Idcirco typi quartani difficile ſolubiles ſunt,
 cæteriſq; omnibus diurnioribus, ita vt ſiquæ ad
 hærent perdurant. Cuius autem inualeſcit quar-
 tanus typus, ipſe ſibi ſemel complicatur, vt duas &
 tres quartanas efficiat, aut ad aliquam etiā deve-
 niat continuatē. Ruriſus verò cum moderatior
 fit, in vnam conuertitur. Interdum autem & ob
 ſymptomata quæ complicantur ipſi, ad eo pericu-
 loſe huiuſcemodi febres evadūt, vt ad plithi-
 ſim tandem, aut ad quæ inter cuntes aſſuſiones
 perducant. Frequentiores autē ſunt quā aliiſ
 temporibus in autumno potiſſimū, quo etiam
 tempore ſoluantur ægrè. Quæ verò æſtate ſunt,

omniū minimè infeſtant, & magna ex parte aliis
 præcedentibus morbis ſuperueniūt inordinatē.
 Quandoq; etiam, ſed rarò, ab initio conſiſtunt.
 Cæteri pulſus eis qui tertiana laborant, nō tan-
 tum magnitudine exiguis ſit, quāntū in quæ ve-
 xantur quartana: neq; vſque ad in tumorē at-
 tollitur, quāntū illis qui quondiana occupat.
 Nam in hoc typo, pulſus quædam mediocritas
 inuenitur. Eſt autem quandoq; & in acceſſionū
 initis rarior eo, qui ſecundum naturam eſt. Ve-
 riū præter has tres, inveniuntur etiā febres quæ
 typicos diēri motus ſeruāt: ſicvti & alix typo-
 rum prōrius expertes, præter vnam. Quæ igitur
 fuerat typicos diēri motus, vel ante leoras con-
 ſuetas corripuit, vel retardant. Fiant autē inor-
 dinate, ſed præter motus formam. Quare interdum
 præoccupant, interdum tardius morantur,
 at citra ordinē vtrāq; præter id tamen quod mo-
 dō inordinatē moueant, modō ſiſtant, niſquam
 autē ordinem habeant, vbi enām à nullo impe-
 diantur: verū manente ſemper diērium figura,
 quam ſolę particulares in ordinationes comiten-
 tur. Quæ verò omnino typorū expertes ſunt, &
 præter omnes modos enameratos, & ad alix ci-
 tra diērum ordinē ſunt. Quædam enim in vaſio-
 nes adducunt, quædam exiſtunt prōrius in ordi-
 nate. At ſpeciei huius differentias plures eſſe cō-
 tingit. Licet itaq; modo prædicto cuiq; ſpecula-
 ri, necnon vtrūq; voluerit, prædictorū typorū
 proprietas complicare. Porro ex typis dupli-
 cantur q; qui primi appellantur: vt quondianus,
 tertianus atq; quondianus. Quondianus itaq; du-
 plex eſt, qui diebus ſingulis ſimiliter bis in vadit,
 & bis remittit. Duo autē tertiani ſunt, qui per
 ſingulos dies duerſis acceſſionibus ſibi invicē
 ſuccedentibus, tertio quoq; die apprehendunt.
 Quartani verò, cum die vno ſalubri ſuccedente,
 duobus denicpe ſequentibus diebus contingat
 febricitare, in ſingulis in vaſionū horis ſeruatis
 figuris, quæ nimirū ex quaternario circuiſu ſunt
 æſtimandæ. Quondianus verò tertiano adiu-
 guntur, cum primo quidem die bis in vadit, & bis
 remittit: die autē ſequenti, ſemel: tertio verò, rur-
 ſum ſimiliter primo. Quartano autem quondia-
 nus miſcetur, cum primo quidē die bis in vadit,
 duobus ſequētib; ſemel: quarto verò die, bis,
 primo ſimiliter. Porro quondianus, tertianus at-
 que quartanus, inuicem cōmiſcentur, cum dies
 quidem prima tres habet in vaſiones, & totidem
 remiſſiones: ſecundā vnam: tertii duas: quarta
 tres: quinta vnā: ſex duas: ſeptima ruriſus tres: at
 que ita reliquis diebus ſimul ac primis ordos ſer-
 uatur. Tertianus autē quartano iungitur, vbi pri-
 mi dies duas in vaſiones adducit, totidemq; re-
 miſſiones: ſecundā verò nullas omnino: tertii vnā,
 & quarta vnam ſimiliter: quinta vnam: ſexta
 nullā prorsus: ſeptima duas: atq; in ſequētib; pari
 modo. Cōmiſcentur adhuc tertianus typus,
 quartanus & quondianus: cum ſcilicet primo die
 acceſſiones contigerint, ſecundo quæuerint &
 tertio tertianus, quarto quartanus, quinto verò
 tertianus ſimul & quondianus in vaſerint. Sed
 aliter etiā quodammodo huius typi in vaſio cō-
 tingit, in eundem nihil minus typi ordinem in-
 cidente, tertiani cum ſemitertiano cōiugatione.

GALENI

Hemitertianæ ad
 eſſe quoniam
 comitantur ter-
 tianam,
 Hemitertianorū
 typorum pro-
 pria.

Hemitertianæ
 typus eſt ſerius,
 periculōſior; ra-
 diatior; potius
 dens.

Hemitertianæ
 quibus magni
 ſit familiaris.

Hemitertianæ
 aliquando in-
 termittit.

Typus quarta-
 nam quæ conſe-
 quatur.
 Quartanū ty-
 pi accurata de-
 ſcriptio.

Quartana ve-
 ro ab initio in-
 cipiens.

Typi aduſum
 ſet duplicatio-
 nem quiſq;
 Quondianus
 duplex,
 Tertianus du-
 plex.

Quartanus du-
 plex.

Quondianus
 typus tertiano
 miſcetur.
 Quondianus
 typus quarta-
 no miſcetur.
 Quondianus
 typus tertiano
 & quartano
 miſcetur.

Tertianus ty-
 pus quarto ty-
 po miſcetur.

Tertianus ty-
 pus quartano
 & quondiano
 miſcetur.

GALENI PERGAMENI

Ars medicinalis.

CAPVT I.

Doctrina ordi-
nata sunt tri-Doctrina à fi-
ni notione or-
gan, nemo au-
te Galenum re-
posuit.Doctrina defi-
nitiva reitor
Galenum in ar-
te medicinali.Definitio opti-
ma in se capa-
ta totum artu
complectitur.
Definitio est de
piet, substantia
la & actione la.Medicina est
scientia salu-
brum, insalu-
brum, & neu-
trorum.Salubria qua
dicuntur.
Insalubria qua
sunt.

Neutra qua-

Res sunt omnes doctrinae quae ordi-
ni inhaerent. Prima quidem ex notio-
ne finis, quae per resolutionem fit. Se-
cunda ex compositione constat eorum
quae per resolutionem inventa fuerunt. Tertia ex
definitionis dissolutione, cui nunc incumbimus. 10
Ex quibus sanè primam, quae oritur à finis notio-
ne, & ex qua omnes artes via quadam atque ordi-
ne & constituntur, neminè ante nos scripsisse cõ-
perimus. Hic itaque definitiuam faciemus doctrina-
m, quae quantum ab ea quae ex resolutione consti-
tuitur, & dignitate, & ipso docendi ordine linquitur,
tantum & ad totius compendium, & ad singu-
lorum memoriam praestare inuenitur. Sufficien-
ter siquidem, ac facillimè commendantur me-
moriae vniuersa, ex definitionis dissolutione: & 20
namque totius artis capita in se optima definitio cõ-
plectitur, quam quidem substantialem appellat:
ex aduerso distinguentes eam ab aliis, quae no-
tionales vocantur. Illae siquidem ab aliis quae ac-
cidentibus definitis, hae verò ab ipsa essentia
constituuntur.

Quid sit medicina. Cap. II.

Medicina est scientia salubrium, & insalubriũ,
& neutrorum. Nomen autem scientiae cõmuni-
ter, non propriè, accipere oportet. Porro salubre
ipsum insalubre & neutrum, vnumquodque tripli-
citer dicitur: hoc quidem, vt corpus hoc autem,
vt causa: hoc verò, vt signum. Etenim corpus
quod natura suscipere sanitate est aptum, & causa-
m quae eandem efficere aut cõseruare, & signũ
quod potest indicare, hae omnia salubria Graeci
appellare consueverunt. Eadem ratione & susci-
pietia morborum corpora, & eisdem efficien-
tes cõseruantesque causas, & signa indicantia, in-
salubria vocant. Nec aliter corpora neutra, cau-
sas, signaue dixerunt. Ceterum secundum quide-
m primam rationem, atque praecipuam, causa-
rum salubriũ est medicina scientia. Propter eas
autem, & aliarum: secundo autem loco, insalu-
brium: & tertio, neutrum. Et post has eodem
modo corporũ, primò quidem & hic, salubrium:
secundo loco, insalubrium: tertio, neutrorum.
Itidem & de signis dicendum. In actionibus au-
tem prima quidem est corporum cognitio, quae
habetur ex signis: post haec, earum quae in ipsis
cognitio causarum. 30

Quot modis dicatur effectiuum, indicatiuum,
& suscepiuum. Cap. III.

Sed quoniam & effectiuum, & indicatiuum, &
suscepiuum, dupliciter vnumquodque dicitur, hoc
quidem simpliciter, hoc verò vt nunc nosse oportet,
amborũ esse medicinae scientiam. Ipsum verò
simpliciter, duobus dicitur modis: & quod
semper, & quod vt plurimũ: de quorum vtroque
medicina perracitat. Neutra verò, et causa, & cor-
pus, & signum, & quod simpliciter dicitur, & quod
vt nunc, tripliciter vnumquodque appellatur: hoc
quidem, quia neutrius contrariorum est parti-
cipe: hoc verò, quia vtriusque: atque hoc denique, quia
aliquando huius, aliquando illius. Horum autè 40

Simpliciter dicitur
ei modis duobus.Neutra dicitur
tripliciter.

ipsorum secundum, rursus duobus dicitur mo-
dis: aut quia vtriusque contrariorum ex æquo par-
ticipat: aut quia aliquando plus alterũ. Primum
igitur de corporibus ipsis dicemus, qualia nam
sint, & salubria, & insalubria, & neutra: post haec
de signis & causis differemus.

De corpore salubri. Cap. III.

Salubre simpliciter corpus est, quod ab ipso
naturae ortu bonam temperaturam sortitur in sim-
plicibus ac primis particulis: estque in his quae ex
illis constant instrumentis cõmensuratum. Salu-
bre verò nunc, est corpus, quod in presenti est sa-
num. Est verò & hoc, eo tempore quo sanũ exi-
sit, bonam habens temperaturam & cõmensu-
rationem: non tamen optimam, at sibi propriam.
Ipsius verò salubris simpliciter corporis, semper
quidem est tale, quod optimè temperatũ ac ma-
ximè cõmensuratum existit: vt plurimum au-
tem, quod à constitutione optima, non valde ad-
modum deficit. 50

De corpore insalubri. Cap. V.

Insalubre verò simpliciter corpus est, quod ab
ipso ortu naturae, vel in consimilibus partibus ma-
lam temperiem possidet: vel in instrumentis aliis
in cõmensurationem, vel vtriusque vitium. Insalu-
bre verò vt nunc, est illud, quod eo tempore, quo ta-
le dicitur, aegrotat: vel in consimilibus prauam
temperaturam, vel in instrumentis aliis in cõmen-
surationem, vel vtriusque vitium tunc habens. Est
verò & semper insalubre, quod ex ipso naturae
ortu vel pessimam temperiem possidet in sim-
plicibus & primis particulis omnibus, vel in aliqui-
bus, vel in us quae obtinent principatum: vel in
instrumentis aliis in cõmensurationem existit, idque vel
in omnibus, vel in nonnullis, vel in illis quae prin-
cipatum obtinent. Vt multum vero insalubre est
corpus, quod ab huius quidè vitio recedit, non-
dum tamen medio citrate attingit. 60

De corpore neutro. Cap. VI.

Quoniam verò & neutrum corpus dicebatur
tripliciter: vnum quidem, quod neutrius erat ex
extremis dispositionis particeps: aliud, quod vtrius-
que: aliud, quod aliquando huius, aliquando al-
lius: iuxta primũ significatũ, neutrũ erit corpus,
quod exquirere mediũ est & saluberrimi & insa-
luberrimi corporis: & huius, hoc quidè simplici-
ter tale, quod ab ipso naturae ortu, ita est cõstitu-
tum: hoc autem vt nunc, quod in presenti tem-
pore, exquisitè mediũ existit, & saluberrimi, &
& insaluberrimi corporis. Ipsius verò simplici-
ter, semper quidem tale est id, quod in omnibus
vitiis perdurat tale: vt multum autem, quod
nonnullas recipit mutationes. At iuxta secun-
dum significatũ, neutrum erit corpus, quod ab
ipso ortu naturae, contrariorum simul est parti-
cipe dispositionis, aut scilicet in vna parte, aut
in duobus differentibus. In vna quidem, si se-
cundum alteram oppositionem effectiuarum
qualitatum bonam habuerit temperiem, vel e-
tiam secundum vtriusque, sed in formatione, vel
in magnitudine, vel numero partium, vel situ, de-
clinat: aut contrà, in his quidem rectè se ha-
beat, vel omnibus, vel quibusdam, peccet autem
in ipsa temperie. In differentibus verò partibus,
& iuxta omnes oppositiones potest quicquid sumi 70

Salubre simpli-
citer corpus
quod sit.Salubre vt
nunc, quod sit
corpus.Insalubre sim-
pliciter corpus
quod sit.Insalubre vt
nunc, quod sit
corpus.Neutrũ corpus
quod sit, iuxta
primum significatũ.Neutrũ iuxta
secundum si-
gnificatũ
quod sit.

esse particeps contrarium. Et semper quidem est tale, quod per omnes etates in eodem perseverat statu. Vt multum verò, quod aliqua ex parte evanescat. Ita etiam & nunc neutrum erit corpus iuxta secundum significatū: quia vel parte in vna, hanc quidem sibi salubria sunt, illa verò insalubria: vel in differentibus ita afficitur partibus. Iuxta tertium significatum, neutrum erit corpus, quod aliquando quidem salubre, aliquando verò insalubre existit. In vno autē tempore, quod ita est neutrum, & exacte quidem consistere nequit: latius verò si accipiantur, potest.

De signis salubrium. Cap. vii.

Sunt autem ex signis, salubria quidem, quæque præsentem indicant sanitatem, & futuram prænuñciant, & præteritam memoriæ subiciunt. Insalubria verò, quæ & præsentē indicant ægritudinem, & futuram prænuñciant, & præteritam memoriæ subiciunt. Eadem ratione neutra dicuntur, quæ neutram dispositionem ostendunt, prænuñciant, & memoriæ subiciunt: quæque partim quidem salubrem, partim insalubrem dispositionem indicant: & quæ aliquando quidem salubrem, aliquando verò insalubrem. & hæc quoque secundum tria tempora, veluti salubria & insalubria, appellantur. Dicuntur autem nonnunquam & vetustioribus medicis hæc omnia, signa prænuñciativa, quævis sint præsentium & præteritorum indicativa. Porro vñus non parvus ex prænuñciativis atque indicativis accedit: minor autē ex his quæ memoriæ subiciunt.

De signis optimæ constitutionis.

Caput viii.

Salubritas autem corporis dignotiones fumentur sunt ab his quæ secundum essentiae rationem eis insunt, & ab his quæ necessario sequuntur ipsa functionibus atque symptomatibus, quæ propriæ accidentiæ appellantur. Ab essentia quidem ipsa, eorum quæ optimam habent constitutionem, cōmensuratione: cōnissimilium quidem, in caliditate, frigidityte, humiditate, & siccitate: instrumentorum verò, in quantitate ac numero eorum ex quibus cōstitant: ac præterea formano ne, situ partium singularium, & totius instrumenti. Ex his verò quæ necessarii cōsequuntur cōnissimilia, quantum quidem ad tactum attinet, à medio critate quæ in mollitie & duritie consistit: quantum verò ad aspectum, à colore optimo, & leuitatis atque hispiditatis medio critate. In functionibus à perfectione, quam ipsarum esse virtutem dicimus. Ab ita verò quæ instrumentarias sequuntur partes, à cōmensuratione & pulchritudine omnium totius corporis instrumentorum: ac præterea, ab earum quæ ipsis insunt, virtute operationum. Optimæ igitur constitutionis corporis signa indicantia sunt hæc. Eorum autem quæ ab ipsa deficiunt, & adhuc rament salubria existunt, nonnulla quidem in cōnissimilium temperatura vitium aliquod parum habent: nonnulla verò in instrumentariarum vel omnium, vel aliquorum cōmensuratione, & hoc quoque perexiguum. Sunt quæ iuxta vitium vinum aliquod habeant. Vitiorum verò genera, eadem sunt his quæ virtutem perficiunt temperatura quidem in cōnissimilibus: numerus autē, & formatio, & magnitudo, & situs, in instru-

mentariis: vitiosæ verò cōmēnis vnitas, quæ ipsorum cōnissimilitatem vocamus. In his autem ipsis generibus sunt corpora insalubrium vitia, secundum vitium salubritatis significatū. Terminus autem qui vitium distinguit, est operationum lesio sensibilis. Etenim quæ simpliciter insalubria sunt corpora, distinguuntur ob id, quod faciliè à causis morbidis superantur: & quo nū in vigore operationum deficiunt plurimū. In medio autē salubrium & insalubrium collocantur ea, quæ neutra exquisitè appellantur, & cum latitudine quadam. Quo fit, ut tota sanitatis latitudo in tres partes, quarum singulæ latitudinem habent non parum, diuidatur. Erant autem prima quidem insalubrium corporum, secunda neutrorum, tertia insalubrium. Post hæc deinceps sequuntur quæ iam ægrotant corpora: quæ sensibilibus operationum lesionibus distinguuntur. Hæc autem omnia sensu diuidantur, non ipsa natura rerum.

Signa itaque sanorum corporum, siue ea salubria, siue insalubria, siue neutra existant, quantitate distantie differunt, duobus invicem contrariis terminis à nobis cōstituitis, optima videlicet cōstitutione corporis, & nuper genito morbo: ac deinceps considerantibus, vtri eorum sint viciniore, quæ ad examen corpora veniant. Quæ enim proximiora sunt optimæ cōstitutioni, salubria: quæ verò ab hac longius distant, atque ad ea quæ iam ægrotant, magis accedunt, insalubria: quæ autem intermedia, atque equaliter ab vtriusque distant, neutra existunt. Optimæ igitur cōstitutionis corporis indicia optimauius. Eorū verò quæ ab ipsa deficiunt, tandem sunt numero genera, quæ in magis & minus secari possunt. Quot sint differentiarum partium. Cap. ix.

Partium vniuersæ differentiarum sunt quatuor. Siquidem earum nonnullæ principia quædam existunt: alique ab ipsis originem habent: alique neque aliarum gubernationi præstant, neque aliunde gubernantur, cum insitas habeant à natura potentias, à quibus reguntur. Quædam verò sunt, quæ insitas simul & aliunde emanantes fortuntur. Principia igitur sunt, cerebrum, cor, hepatis, atque testiculū. His verò & originem debent, & famulantur: nerui quidem & spinalis medulla, cerebrum: cordi autem, arteriæ, hepatis, venæ: ut testiculū feminaria vasa. Quæ autem à se ipsis gubernantur, sunt carnalago, os, copula, fœligamentum, membrana, adenes, adeps, & caro simplex. Reliquæ verò partes, cum vna cum istis habeant ex seipsis regimen, arteriis, neruis, & venis insuper indigentur. Capillorum autem atque vnguium neque regimen viliū est, sed generatio tantummodo.

De signis cerebri. Cap. x.

Cerebri autem naturam, quinque indiciorum genera ostendunt. Primum quidem, totius, capitis dispositio. Secundum, sensibilibus operationum virtus & vitium. Tertium, actinarum, quartū, earum quæ principia obtinent. Quintum denique, naturalium. Est & aliud sextum genus præter hæc dicta, alteratio quæ extrinsecus advenit. Porro totius capitis dispositio, ex magnitudinis ipsius atque figura sumitur, necnon ex capillis.

De par-

*Nervus iuxta
sententiam sequi-
caram quid.*

*Salubria signa
qua sint.
Insalubria si-
gna qua sint.
Neutra signa
qua sint.*

*Signa prænu-
ciativa, indi-
catoria, effe-
rentia, que
memoria sub-
iiciunt.*

*Salubrium cor-
porum digno-
tatione: vnde
scirentur.*

*Insalubria sin-
gulariter corpora
facile à morbi-
dis causis su-
perantur.*

*Sanitatis lati-
tudo vniuersa
in tres partes
diuiditur.*

*Ægrotantia cor-
pora à sanis
sensibilibus ope-
rationum lesio-
nibus distin-
guuntur.*

*Salubria & in-
salubria corpo-
ra, quoniam de
sanitate.*

*Partium vni-
uersæ differen-
tiarum sunt
quatuor.*

*Principes par-
tes sunt cere-
brum, cor, he-
par, atque tes-
ticulū.*

*Capilli vnguif
que maxime su-
berantur, sed
genuerunt dis-
tincti.*

*Cerebri natu-
ram quinque in-
diciorum gene-
ra ostendunt.*

De paritate & magnitudine capitis.

Caput x1.

Caput magnū
quādo sit bonū
inducitur.

Parū igitur caput, vitioſe conſtitutionis ce-
rebrī propriū indicium eſt: magnū verō non ne-
ceſſariō indicat bonam cerebri conſtitutionem:
ſed ſi quidem ob inſite virtutis robur, quæ mul-
tam ac optimam materiam aſſormat, eveniat,
optimū ſignum eſt. At ſi ob materię tantū mul-
titudinem, haudquaquā bonum. Diſtinguenda ve-
rō ſunt hæc, & ex figura ipſa, & ex his quæ ab eo
habent ortum. Ex figura quidem, ſi ſit cōcinna:
ſemper nanq; hoc bonum ſignum exiſtit. Ex ſu-
autem quæ ab eo ortum habent, ſi ceruicī valide
inſideat, aliſq; oſibus optimē conſtet: atq; om-
nis præterea ſubſtantiā boni ſit habitus, ac robur
habeat intentum. Propria autem capitis figura
eſt, veluti ſi excoigatæ ſphæræ exquiliſtæ ro-
rundam ex cera cōſtructam, paulatimq; vtrinſq;
depreſſam. In hac enim nec eſſe vi, vt poſterior-
es priorēſq; partes plus gibbæ ſiant, q̃ ſphæræ
cōueniat: quæ verō vtrinſq; conſiſtant, magis re-
ctæ. Quod ſi ea quæ ſecundum occupat eminenti-
a aliquatenus minuat, ſimul intueri oportet
neruos, atque ceruicem, vñ cum oſibus aliis.
Nam ſi ſecundum naturam cōſiderentur, materię
deſectū, nō virtutis imbecillitatē, contingit. Illa
verō nō rectē ſe habentibus, principium eſt debi-
le. Vt plurimū verō exiſtit optimū ſignum figu-
ra cōcinna parencephalidis, quam nōnulli me-
dici poſterioris cerebrum vocant, vt eſt revera po-
ſterius, diſtinctum labdoide ſutura. Eſt verō hæc
pars principii ſpiualis medullæ, ac proinde ner-
uorum omnū, per totū corpus animalis, actio-
nis ſubſervientiū. Ipſa ſiquidem cerebri pars
poſterior, per ſeipſam, paucos admodum ſenſi-
uos poſſidet neruos, plurimos autem actiuos.
Anterior verō contrā, ſenſitiuos quidem pluri-
mos, actiuos autē perpaucos. Quare vbi vtrę
fuerit optimē affecta, robuſtas habebūt eas, quæ
ab ipſis pendent, deriuationes. Exdem quoq; di-
ſtinctiones facientes ſunt ad partes capitis an-
teriores, quæ etiā ad poſteriores: earundemq; par-
tium, magnitudinem, & figuram, oecnon ſen-
ſus ibi collocatos, viſum, guſtum, & odoratum,
expendere oportet: ſiquidem ſeſe invicem indi-
cant atteſtantiq; & quæ a principijs oriuntur,
principij virtutem & vitium: & principium, ea
quæ ab ipſo ſancuntur.

Paracephale.

Labdoide ſu-
tura.
Cerebrum eſt
principium ſpi-
ualis medullæ.

Principia et ea
quæ ab illis o-
riuntur, ſeſe in-
vicem atteſtan-
tium & indicia.

Principium
animæ acti-
uum ſingula
quæ ſignifi-
cant.

De operationibus obtinentibus prin-
ciparum. Cap. x11.

Earum autem operationū quæ obtinent prin-
ciparum, virtus ac vitium, ſunt ipſius principij
ſeorum tantūmodo indicia. Voco autem ope-
rationes principiarum obtinentes, quæ a ſolo prin-
cipio proveniūt. Sagacitas igitur, ſubtilem cerebri
ſubſtantiā indicat. Tarditas verō intellectus,
craftam. At diſcendi facilitas, ſormarū facile ſuſ-
ceptivam. Memoria, ſtabilem atq; firmam. Diſ-
ſicultas diſcendi, ſormarum non facile ſuſcep-
tivam. Oblivio, fluidam. Mobilitas in opinioni-
bus, calidam: vt ſtabilitas, frigidam.

Signa bonæ temperaturæ cerebri.

Caput x111.

Si quidem cerebri ſortitur bonam primariā
quatuor qualitatum temperiem, omnia quæ di-

ximus, habebit quāmodō moderatā. Excrementa
quoq; quæ ab eo expurgantur, moderatē ſe ha-
bebunt, atq; ab iis quæ extrinſecus alterando oc-
curreant, nequaquam lædetur. Tulſus igitur ca-
pilli capitis, cum adhuc ſunt infantes, ſubruſi: ſi
verō pueri, ſublaui: cum iam adoleuerint, ſlavi
ſunt: mediū inter omnino criſpos & lenes
Nec verō caluſcent facile.

Signa calidi cerebri. Cap. x1111.

Signa calidi cerebri ſunt, in iis quæ circa caput
conſiſtant, rubor & calor maior, & quæ in ocu-
lis viſuntur veng, conſpicuū magis. Capilli quo-
que in his ſtatim in lucem editis & celeriter ge-
nerantur: & cum plurimum in calore a medio cri-
temperatura receſſerint, nigri & robuſti & criſpi
ſunt: cum verō non multū, ſublaui quidem ab
initio ſunt, deinde nigricant: ac progredienti-
bus ætatis, caluſiū paritūtur: eoq; magis, quō
temperies plus æquo calidior fuerit. Excrementa
verō quæ per palatrum, & nares, & oculos, &
aures purgantur, pauca & concocta ipſis exiſtūt,
ſi integra ſanitate fruuntur. Si verō eis caput re-
pleatur, plura quidem in ipſis excrementa, ſed nō
incocta, gignuntur. Impletur autem aggrauan-
tēſq; eorum capita, a calfacientibus tum cibis, tū
potibus: necnō ab odoribus, iſiq; omnibus, quæ
extrinſecus nobis occurrunt: in quorum nume-
ro eſt aër circumfluus: ac tunc præcipuē, ſi nō ſo-
lum natura calida, ſed etiā humidā, ipſa corpora
exiterit. Breuib; aut ſomnis huiusmodi tempe-
raturæ cōtinent ſunt, oec profundis admodum.

Cerebri calidi
indicia.

Cerebrum cal-
di a quibus fa-
cile impletur.

Signa frigidi cerebri. Cap. x1v.

Frigidioris verō quim oportet cerebri indi-
cia ſunt plura in propriis meatibus excrementa:
capilli recti, ruſi, ſtabiles, & qui longo poſt nati-
uitatem tempore naſcuntur tenues, atq; ab in-
itio malē nutriti. Poterō quibus tale cerebrum oc-
tigit, facile a frigidis cauſis læduntur: quo ſane
læſionis tempore deſtillationibus & grauedinib;
corripuntur. Sed nec partium quæ iuxta ca-
pit ſunt calor magnus aut rubor, nec oculorum
venæ illis conſpicuæ inſunt. Sunt autē quodam-
modo ſomnolentiores.

Signa ſicci cerebri. Cap. xv.

Siccioris autem cerebri indicia ſunt pauca ſu-
perfluatates effluentes, & ſenſuum perſpicacitas.
Sunt autem ad vigilas prompti, & capillos ha-
bent robuſtos, criſpos potius quā rectos, & qui
celerimē eis genuis naſcuntur. Citō autem cal-
uſeſcunt.

Cerebri frigidi
de prædictis ſicci
le a frigidi
cauſis læduntur.

Cerebri frigidi
de prædictis ſu-
perfluatates
ſunt.

Cerebri ſicci
indicia.

Humidi cerebri indicia. Cap. xv1.

Humidioris verō cerebri indicia, capilli plani,
quodq; minime calui ſiāt: ſenſus turbulentus, mal-
tudo excrementorū, ſomni multū & profundū.
Atq; hæc quidem ſimplices ſunt imperies.

Cerebri humidi
de indicia.

Signa calidi ſiccioris cerebri. Cap. xv11.

Qui calido & ſicco ſunt cerebro, ſuperfluatati-
bus carent, ſenſibus viget, plurimū vigilat, atq;
citō ſunt calui. Prima autē capillorū generatio
in illis celerima eſt, ac plurimo alimento abun-
dans. Capillos verō habent nigros & criſpos: ran-
gentib; ſque caput ſentuntur calidi, rubicunditq;
ſunt, viſq; ad conſiſtentiam ætatem.

Cerebri calidi
& ſicci indi-
cia.

Signa calidi & humidi cerebri. Cap. xv111.

Si verō humiditas caliditas igitur, ſed parū

*Cerebri calidi
& humidis in-
dica.*

veraq; qualitas mediocritatem superet, ad est co-
lor bonus colorq;, & quæ in oculis sunt veng, ma-
gnæ. Præterea excrementa plura, & mediocriter
cocta, & capilli recti & subtili; nec facile calui
fiunt. Impletur verò atq; aggrauantur eorum ca-
pita à calidia. At si humefcentur, tunc multò ma-
gis: & præcipuè vbi multitudine excrementorū
redvndant. Quod si plurimū caliditas atq; humi-
ditas creuerint, his caput est morbis obnoxium,
excrementisq; abundans: ac facile à calfacienti-
bus & humefcantiis læditur. Proinde Auster
semper talibus aduersatur: atq; optimè in Aquilo-
ne se habet. Hi nō diu vigilare possunt, & cum
se ad somnum converterint, simul graui somno
tenrantur & vigilant, & somnia habent imagina-
tionibus plena. Vilius est eis turbulētus, nec sa-
tis sensibus vigent. Pro ratione autē ipsius qua-
litas in mitione excellentis mediocritatem, so-
lent etiam signa ipsa excellere.

*Cerebri calido
& humido pra-
ditu, ut aduer-
satur Auster, sic
conferit Aquila.*

Signa frigidi & sicci cerebri. Cap. xx.
Frigidæ verò & sicce cerebri intemperantiæ,
frigidum & minimè coloratū, sui ratione, caput
efficiunt. Qui autem sic sunt affecti, in oculis nul-
las habent venas conspicuas, facileque à frigidis
causis læduntur. Quare & inæquali sanitate fruū-
tur.

*Cerebri frigidi
& sicci indi-
ca.*

De sensibus. Cap. xxi.

Sensus autem eorū, in iuuentute quidem om-
nes vigent, atq; omni vitio carent: sed progrediē-
te ætate citò marcescunt. Vt autem summatus di-
cam, omnia quæ ad caput pertinent, celerrimè il-
lis marcescunt: quamobrem citò cani fiunt. Ca-
pilli verò ipsis quidem genitis, viæ exsunt, & ma-
le nutriuntur, & rufi sunt. In progressu autem æ-
tatis, superante magis frigiditate caliditatem, q̃
siccitate humiditatem, non calescunt. Contra-
verò, si contigerit siccitatem quidem plurimum
dominari humiditatem, frigiditatem verò parum
calori, calui fiunt li.

Signa cerebri frigidi & humidis.

Caput xxii.

Humidæ verò & frigidæ cerebri tempera-
tæ, graues somnos conciliant, sensuum hebetu-
dinem pariunt, vim excrementorum accumulāt,
capitis reddunt frigori & plenitudini obnoxiiū.
Sic affecti, destillationibus & graudinibus faci-
le corripuntur: at in omne calui fiunt.

*Cerebri frigidi
& humidis in-
dica.*

De oculis. xxiii.

Qui oculi tangentibus manifestè calidi appa-
rent, & facile ac cerebro motu mouentur, & venas
latas habent, q̃ calidi omnes sunt. Frigidi verò,
his cōtrarij. Et humidis quidem, molles, multaq;
humiditate repleti: sicci verò, duri simul & aridi.
A similibus autem suæ temperaturæ causis facile
offenduntur: iuuantur verò à modico contrario
rum vsu. Sed hoc quidem commune in omni cu-
iuscunque partis temperiei dignotione memi-
nisse oportet.

*Oculorum tem-
peramta quo-
modo dignosca-
tur.*

*Oculi à simili-
bus tempera-
ris suis causis læ-
duntur facile:
iuuantur verò
à modico con-
trariorum vsu.*

De magnitudine oculorum. xxiiii.
Magnitudo oculorum quidem, vbi conciti-
nitas adit, & operationum virtus, multitudine
bene temperatæ substantiarū ostendit, ex qua sunt
conformati. Quæ si desint, nullam quidem
substantiam, non tamen bene tem-
peratam indicat.

*Oculorum ma-
gnitudo quid
inducat.*

De puritate oculorum. Cap. xv.

Paruius verò oculorū, aduocata quidem con-
cinnitate, atq; oderationū virtute, paucam qui-
dem, sed bene temperatam substantiarū pōn-
dit, ex qua sunt conformati. Si verò inconcinni-
tas adit, atq; functionum vitium, paucam simul
atq; vitiosam materiam demonstrat.

*Oculorum puri-
tatem quid si-
gnificet.*

De colore oculorum. Cap. xvi.

Glauci oculi, qui pura humiditate ac nō mul-
ta præfulgēt, tales fiunt ob splēdidi luminis ab-
vndantiā. Cōtrā verò nigri, & q̃ intermediis natu-
ræ feruēt, causas quoq; intermedias fortiuntur.

*Oculi glauci
nigri talem so-
ant.*

De glaucidine & nigredine oculorum.

Caput xxvii.

Glaucis igitur oculi sit, vel propter magni-
tudinem, vel propter splendorem crystallini hu-
moris, vel propter situm prominentem, vel pro-
pter tenuis & aequi humoris, qui in pupilla ex-
istit, paucitatem & puritatem. Omnibus autē his
in vnum cōiunctis, sit glaucissimus oculis. Si
verò aliqua adit, aliqua desint, tunc maior mi-
norve glaucido contrahitur. Niger verò ocu-
lus sit, aut ob paruitatem crystalloidis, aut pro-
pter profundū situm, vel quia splendidus ac ful-
gidus exquisitè non est, vel quia tenuis humor
vel superabvndat, vel impurus existit, vel ppter
vnam ex hisce causis, vel propter omnes fieri cō-
suevit. Tenuis igitur humor quō magis ad aque
naturam accedit, & superabvndat, humidior
ostendit oculum: quemadmodum si crassior ac
minor fiat, siccior. Crystalloides autem hu-
mor, si quidem durior existat, siccior efficitur:
culi: si verò mollior, humidior. Sic & si plus
modico tenuem humorem exceiserit, siccior: si
relinquatur ab illo, contrarium.

*Glaucolus in
oculorum (quod)
significet.*

*Nigredinis ocu-
lorum causa.*

De cordis temperatibus. Cap. xviii.

Vnamquāq; partem calidiorē aut frigidiorē
rem dicimus, nō alicui rei alteri, sed ad seipsam,
eam comparatis. Sic enim vtique existit cor
natura frigidissimū, multò sanè calidiorē tem-
periem fortinet calidissimo cerebro.

*Cor frigidissi-
mum erit cali-
diori calidissi-
mo cerebro.*

Signa cordis calidi. Cap. xix.

Calidioris igitur cordis, quā pro naturali
symmetria, indicia quedam sunt inseparabilia,
& propria, magnitudo respirationis, pulsus ve-
locitas & frequentia, audacia, & ad actiones na-
turæ prompta. Quod si multum in caliditate ex-
ceiserit, tunc furibunda quedam iracundia, & te-
meritas adfunt. Est autem his thorax hispidus,
& præsertim pectus, & quæcūq; hypochondriis
partes proximiores. Magna verò ex parte calidi
cordis temperies vniuersum corpus calidū red-
dit, nisi hepar vehementius obstituerit. Est præte-
rea & latitudo thoracis, caliditatis indicium, ni-
si & hic quoq; cerebrum plurimū relectetur: cui
spinalis medulla magnitudi proportionē re-
spondet. Tantæ verò erunt magnitudine verteb-
ræ, quāta spinalis medulla: quare & spina vni-
uersa. Cōpingitur autē thorax ad eam spinæ par-
tem, quæ iuxta metaphrenum, hoc est, dorsum,
cōstitit, tanq̃ ad naui carinā. Quare necessariū
eius longitudo æquabitur dorso. Latitudo verò
erit pro vertebraū ratione, quando ad propor-
tionem crassitudinis eorum fuerit compactus.
Cū verò cordis caliditas superans persisterit ac
dilatuert

*Cordis calidi
indicia.*

*Thoracis latitudo
quando sit
caliditatis in-
dicium.*

dilatauerit in primo sui ortu thoracem, erit eiusdem caliditas proportionem respondens. Quare quā caput paruum, thorax autem latus existerit, maximum hoc tibi fuerit cordis caliditatis indicium. Quum verò magno existente capite, paruus fuerit, propriissimum hoc tibi sit cordis frigidioris signum & argumentum. Si verò capiti fuerit proportione respondens, tunc alia signa de corde distinguas, ex ipsius thoracis amplitudine nihil iudicans.

Signa cordis frigidi. Cap. xxx.

In frigidiore verò corde pulsus minores existunt, quā modo naturæ conueniat: non tamē necessariò rardiores, vel rariores. Respiratio autem, si quidem tantò thorax minor existerit, quā cor frigidius, pulsibus erit proportionalis. Si verò maior fuerit, quā pro frigiditatis portione, non solum minor, sed etiam tardior & rarior ipsa respiratio erit. Sic affectus, sunt naturaliter timidi, pusillanimi scilicet, atque tardi: pectusque glabrum fortiuntur.

Signa cordis ficci. Cap. xxxi.

Cor autē ficcius, pulsus duriores efficit: iramque non promptam excitat, sed ferinam, quæque facile compesci non possit. Magna autē ex parte sic affectus vniuersum corpus ficcius existit, nisi hepar obstitit.

Signa cordis humidi. Cap. xxxii.

Cordis verò humidioris signa, pulsus molles, & mores ad iram quidē proclives, sed talem, quæ sedari possit: ad vniuersum corpus humidius existit, nisi hepar obstitit.

Signa cordis calidi & ficci. Cap. xxxiii.

Calidi & ficci cordis pulsus duri sunt, magni, veloces, atque frequentes: similiterque respiraciones magnæ, veloces atque frequentes. Multo autē magis ad velocitatem ac frequentiam vergunt, thorace cordi non aucto proportionaliter. Sic affectus, præ cunctis, pectus habet maximè hirsutum, & hypochondria. Ad actiones autem sunt prompti, iracundi, & celeres, morisque præ se ferunt rannicos. Sunt etenim ad furores faciles, inextorabilesque.

Signa cordis calidi & humidi.

Cap. xxxiiii.

Si verò caliditas cum humiditate præcellat, minus quidem eis quos antea diximus, hi sunt hirsuti, ad actiones verò nihilò minus prompti: non tamen ferus ipsis est animus, sed ad iram tantum proclivis. Pulsus verò magni ac molles, velocesque & frequentes existunt. At respiratio, si thorax quidem cordi fuerit proportionalis, eandem cum pulsibus speciem seruabit. Si verò minor existerit, tantò illis velocior atque frequentior erit, quā cor & thorax minor existerit. Quod si multa facta fuerit eversio in ipsa temperatura, atque in humiditate præcipue, præter ea quæ diximus, continget etiam ex putredine morbi, hiis, qui in ipsis fuerint, humoribus corruptis ac putrefactis. Expirationes autē maiores fient, ac velociores inspirationibus: necnon arterie contractio velox.

Signa cordis humidi & frigidi. Cap. xxxv.

Qui humidior & frigidiore sunt corde, pulsus molles fortiuntur, minimèque audaces, sed timidi & segnes existunt. Tales enim possident glabrum pectus: minimèque iracundiam conseruant,

ad quam enim non sunt admodum prompti.

Signa cordis frigidi & ficci. Cap. xxxvi.

Frigidius verò atque ficcius cor pulsus quidem duriores reddit & paruos: respiracionem autem, si quidem thorax paruatè cordis frigiditati proportionalem habuerit, moderatā: si verò maior existerit, raram & tardam. Hi verò præ omnibus minimè ad irascendum sunt prompti: quum autem coacti fuerint irasci quibusdam, retinent iracundiam. Habent autem maximè omnium pectus glabrum. * Ceterum quæcunque de moribus, siue nunc, siue quouis alio sermone explicata sunt ad temperaturæ cognitionem: sciendum est, ea non de optimis moribus, aut vitiosis, qui ex philosophia hominibus adueniunt, sed de infimis vnicuique, naturalibusque, ad nobis exposita fuisse.

Signa calidi hepatis. Cap. xxxvii.

Hepatis calidioris indicia, venarū lantudo, fluxuabundantior: consistente verò grate, enī atra: calidior ipsis sanguis, atque eadē ratione vniuersum corpus, nisi cor obstitit. His venter & hypochondria hirsuta.

Signa hepatis frigidi. Cap. xxxviii.

Frigidioris verò, angustia venarū, pituita abundantior, sanguis frigidior, adeoque totius corporis habitus, nisi caleat à corde. Venter illis glaber est, atque hypochondria.

Signa hepatis ficci. Cap. xxxix.

Siccioris autem, sanguis quidē crassior, & minimè abundans: venæ duriores, & totius corporis habitus sicciior.

Signa humidi hepatis. Cap. xl.

Humidioris autē, sanguis quidem copiosior, humidiorque, atque venæ molliores: ita verò & vniuersum corpus, nisi cor reluctetur.

Signa calidi & ficci hepatis. Cap. xli.

Calidioris verò simul ac siccioris hepatis sunt indicia, hypochondria plurimū hispida, sanguis crassior & sicciior, fluxa bilis plurima: consistente autem xrate, etiam atra: venarum autem latitudo & durities. Sic verò & vniuersum corpus se habet. Nam quæ ex corde caliditas originem duxit, potest obtundere eam, quæ ab hepate nascitur, frigiditatem: sicviti & frigiditas caliditatem, sic citatem verò non potest humidius cor ad habitum contrarium perducere. Ad media inter has quæ dictæ sunt, ea quæ ab hepate humiditas nascitur. Magis enim à cordis siccitate superatur, quā siccitas ab humiditate: minus autem à caliditate: adhuc verò multo minus à frigiditate. Hæc enim inter omnes qualitates quæ eueniunt ab hepate, facillimè superatur. Vbi igitur in vnam conuenerint vtriusque principij temperaturæ, totum exquisitè secundum illas afficitur corpus.

Signa hepatis calidi & humidi.

Cap. xlii.

Humidius autem, ac simul calidius hepar, minus quidem quā calidius & ficcius hispida hypochondria reddit. Plurimum verò sanguinis, et venas amplas, habinimque calidiores, et humidiores facit, nisi obstitit cor. Si verò amplius in amplexibus qualitanibus, à naturæ modo recedat, à morbis qui ex putredine ac vitiosis humoribus fiunt, sic affectus minimo negotio corripit, præsertim si plurimū augeat humiditas: caliditas verò non ita. Sin autē cōtrā, minimè humorū vino laborat,

Mm

Cordis frigidi indicia.

Cordis siccioris indicia.

Cordis humidioris indicia.

Cordis calidi et ficci indicia.

Cordis calidi et humidioris indicia.

Cordis frigidi et humidioris indicia.

Cordis frigidi et ficci argumenta.

Mores ipsi sunt duplices: namque cum sit naturalis siue infusus.

Hepatis calidi indicia.

Hepatis frigidi indicia.

Hepatis siccioris indicia.

Hepatis humidioris indicia.

Hepatis calidi et ficci indicia.

Hepatis calidi et humidioris signa.

Signa hepatis humidī & frigidi. Cap. XLIII.
Humidius autē atq; frigidus hepar habet hypochondria glabra: sanguinem verd accedentē ad pituitæ naturam gignit, cum venarum angustia. Sic & reliquum afficit corpus, nisi à corde ad contrariam transferatur naturam.

Hepatis humidī & frigidi indicia.

Signa hepatis frigidi & siccī. Cap. XLIII.
Frigidus & siccus hepar, parum sanguinis, et exiguas venas exhibet corpori: ipsiusq; frigidus reddit, & hypochondria glabra, nisi & hic cor to dominetur.

Hepatis frigidi & siccī indicia.

Signa calidæ, frigidæ, humidæ, & siccæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLV.

Testiculorū temperaturæ signa siccæ.

Temperatura verò testiculorum, calida quidem, proclivis ad venere, masculorumq; productrix, atq; fecunda. Eadem celerimē genitales partes obsepit pillis. Frigidior verò cōtraria efficit. At humidæ, multo & humido semine abundat. Siccæ, pauci & modicæ crassī generat semē.

Signa calidæ & siccæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLVI.

Testiculorū calidæ & siccæ temperaturæ indicia.

Calidior verò & siccior, crassissimū semē habet, & fecundissima est, ac celeriter ab initio proxima ad coitū excitat animal. Sed & his genitales partes citissimē hispidæ fiunt: atque omnes quæ cūstunt, suprà quidem, vix ad umbilicū: infrà verò, vix ad media femora. Perulca igitur est, et ad libidinem prona cūscemodi temperatura: statim verò satiatur, & si cogatur, offenditur.

Signa calidæ & humidæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLVII.

Testium calidæ & humidæ temperaturæ indicia.

Sin autem caliditas humiditati iōgatur, hispidi quidē tales minus, plus verò semine abundat: non tamen plus ceteris appetunt, sed minor detrimētum præter modū veneris indulgēt. Quid si caliditas & humiditas abundanter exasperaverint, non sine detrimētum à veneris abstinent.

Signa humidæ & frigidæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLVIII.

Testium frigidæ & humidæ temperaturæ indicia.

Si verò frigidiorē & humidiorē temperaturæ testiculū habuerint, partes circumpositæ glabræ sunt, & tardē rem exercere veneream incipiunt, nec proni ad actū huiuscemodi sunt. A quo tum verò & tenui ipsi est semē, infecundūq; & feminariū generatiū, uel omnino nō generat.

Signa frigidæ & siccæ temperaturæ testiculorum. Cap. XLIX.

Testiū frigidæ & siccæ temperaturæ indicia.

At frigidior et siccior temperatura, similis quidē in reliquis est antedictæ: crassius tamē in ipsa semen existit, atq; paucum omnino.

De totius corporis habitu. Cap. L.

Totius corporis habitus in illis maxime cōstare dicitur partib. q̄ primæ oculis subsunt.

Sunt verò hæc, musculi, qui omnia ambiunt ossa, existentes quædā carnes composite, ex prima & simplici carne, & præterea fibris, quibus innascuntur. Propria siquidē musculorū substantia constat ex his duob. Quæ verò ad ipsos vasa pertingunt, veluti rivi quidam sunt, qui non substantiā complent, sed eis subministrāt, vt in vita permanent.

Musculorū substantia ex quibus constit.

Signa moderatæ temperaturæ. Cap. LI.

Temperamentū moderatū indicia.

Moderatæ temperaturæ indicia secundum totum animalis habitum, sunt: color quidem ex rubeo & albo cōmixtus: capilli flavi, & vt plurimū mediocriter crispī: carnositasq; mediocritas in qualitate et quantitate. Medium namq; est exqui-

sit, ac veluti Polydeni regula, huiuscemodi corpus, inter omnes excessus, eū ad quod ipsi & dicantur, & cognoscantur.

De corpore calidiore. Cap. LII.

Quæcunque autem in caliditate à medio recedunt, non tamen in humiditate, vel siccitate, hæc quæritur ad carnosum genus attingit, videtur quidem rangentibus calidiora tantum, quantum & eorū temperatura calidior. Tanto verò magis hirsuta sunt, quāto et calidiora, et minus pinguedinis habent. Colorem autem rubrum, & capillos nigros sortiuntur.

Temperatura calidiora indicia.

Signa frigidæ temperaturæ. Cap. LIII.

Frigidioris autem temperaturæ indicia sunt, pilorum priuatio, pinguitudo, & occurrans frigiditas. Color autem, vni cum capillis, rufus, & vbi frigiditas excessit, luidus quodammodo existit.

Temperatura frigidiore indicia.

Signa siccæ temperaturæ. Cap. LIII.

Siccior temperatura rōo gracilior & durior est bona temperatura, quāto maior est siccitas.

Temperatura sicciora indicia.

Signa humidæ temperaturæ. Cap. LIV.

Humidior autē temperies, carnosior atq; mollior existit.

Temperamentū humidiora indicia.

Signa calidæ & siccæ temperaturæ. Cap. LVI.

Calidior simul et siccior, magis hirsuta, necnō calida & dura existit: itaque pinguedine caret, tenuisq; est, & capillos nigros formiat. Si verò multum in caliditate exccelat, color quoque niger illi adest.

Temperatura calidæ & siccæ indicia.

Signa calidæ & humidæ temperaturæ. Cap. LVII.

Calidior autē & humidior temperatura, mollior & calidior & carnosior tanto existit bona temperie, quāntum & vtriusq; qualitatibus aucta fuerit. Quod si plurimum augeatur, citō similiter à putredinis corripitur morbis. Si verò parum quidem humidior sit, multo autem calidior, mollior quidem parum huiuscemodi sunt, iis quæ bonam habent temperiem, & magis carnosī: nō parum verò hirsutiores, & tangennibus enā nō parum calidiores. Nigri verò eis sunt capilli, & caro pinguedine caret. Sin autem paulo quidē calidior, multo verò humidior, mollis his caro est, & multa: coloriq; miscellaneus, ex albo simul & rubeo: rangennibusq; paulo calidiores apparent. In summa aut, omnibus temperaturæ conlutionibus, semper excellentis qualitatis indicia eminebunt.

Temperatura calidæ & humidæ indicia.

Signa frigidæ & humidæ temperaturæ. Cap. LVIII.

Frigidior autem atq; humidior temperatura, si parum quidem vtriusq; augeatur, capilli nudi est & alba, mollisq; & crassa, & pinguis. Si verò magis excesserit, reliqua quidem sunt secundum proportionem qualitatum auctarum: color autem, vni cum capillis, rufus. Quæ admodum si plurimum vtriusq; augeatur, liuidas. Si verò qualitarum augmentum in æquale fuerit, eius quæ superaverit, indicia eminebunt.

Temperatura frigida & humidæ indicia.

Signa frigidæ & siccæ temperaturæ. Cap. LIX.

Si autem frigiditas vni cum siccitate augentur æqualiter, natura durum ac tenue & glabrum corpus sic affectū sortiuntur, ac rangentibus frigidum: pinguedo tamen ipsi, est gracilis sint, per carnes dispersa inest. Capilli autē & color, frigiditatis modū, ac proportionē sequantur. Vbi verò calida & siccæ temperatura, per detrimētum

Temperatura frigida & siccæ indicia.

crementi tempus, in frigidū & siccū labitur habitum, graciles hi tunc fiunt, & duri, atq; atra bilis in eis dominatur: & ob id nigri simul, hirsutiq; evadant. In uniuersum autem, si membrum facile frigefit, vel frigiditas, vel raritas est signū: si verō non facile, vel caliditas, vel densitas. Si autem desiccantib. offendatur, atq; aridum & siccū, nec facile mobile fiat, siccitatis: quemadmodum & si ab humectantibus grauitur, hanc habear, humiditatis. Porro pauci simul & dura caro, membrū siccū efficit: multa autē & mollis, humidus. Sic & intermedia spacia corporū simulariū, vt plus vel minus humidæ substantiæ in se cōtinent, vel crassius vel tenuius, vel humidius vel siccius, rariū ostendunt, humidus quidē, vbi subtilior & plurius est humiditas: siccus verō, vbi crassior sit, mult & minor. Ipse enim solidae partes, quæ verē solidae sunt ac primæ, nullo modo effici humido res possunt: intercepta autē in ipsis spacia, hanc vel illa humiditate complere possibile est. Hoc verō est proprium partium simulariū alimentū quod ex appositione fit, & non per vasa attrahitur.

Signa siccit. ventriculi. Cap. lxx.

Ventriculi indicia sunt, eius quidem qui natura siccior existit, si celeriter sibiundi fiant, & pauci ei potus sufficiat: plurimum autē aggrauentur, fluctuationibusq; infestetur, aut superfluitet id quod abundat, cibisq; delectetur siccioribus.

Signa humidioris ventriculi. Cap. lxxi.

Humidioris autē, si neq; sibiundi fiat, & super abundans humiditas facile tolerent, & cibis humidioribus gaudeant.

Signa calidi ventriculi. Cap. lxxii.

Calidior verō natura ventriculus, melius quidē cōcoquit quàm appetat: & multo magis quæcumq; sunt dura, & non facile alterationem suscipiunt. Nam quæ facile alterantur, in eo corrumpuntur: gaudetq; calidis potibus ac cibis, nec a frigidis vlla percipit noxam, si modice ipsis vitetur.

Signa ventriculi frigidi. Cap. lxxiii.

Frigidus natura ventriculus, ad appetitū quidem plurimum viget, ad cōcoquendum autem, minimè tales præsertim cibos, qui & frigidi sunt, & non facile alterationem suscipiunt. Citro itaq; in ipso acescit: ac proinde acidius ructibus talis ventriculus ab vna dicitur plurimum: gaudetq; frigidis, sed ab eorum vfu immodico offenditur. Sic & ea quæ extrinsecus frigida occurrant, neque lōgiori tempore tolerare: quemadmodum neq; calidus calida. Malè verō temperatæ quæ morbi ratione ventriculū occupant, hoc differunt ab iis quæ naturales existūt, quoniam contraria, non autem similia, appetit, quemadmodum naturales.

De sin. a corde & pulmone profecta.

Cap. lxxiiii.

Nec verō tantum ventriculus sibiundos, minimèq; sinescentes reddit, & frigidi calidq; potus appetentiores, sed ea quoq; viscera quæ in thorace sunt, vt cor atq; pulmo. Ceterum quod ob liorem sunt caliditate, plus inspirant, & longius expirant, atq; æstus in thorace percipiunt: non sicut qui ventriculi ratione in hypochondriis caliditatem patiuntur. Præterea bibentes, non statim quiescunt, & frigidus potus magis eorum sitim reſcitiguit. Refrigerat autem eisdem & frigidus æris inspiratio: quæ nihil illos leuat, qui ven-

triculi ratione sunt sibiundi. Sic qui contrariō modo se habēt, sensibilibiter a frigida inspiratione læduntur.

Signa pulmonis frigidi. Cap. lxxv.

Ethoc maximū sit frigidus pulmonis indicium. Vt etenim, frigidum inspirātes, manifestē dolorē sentiunt atq; frigiditatem, ita & caliditas est ipsis amica. Sed & pituitosa excrementa tum loquentes, tum tuiſcentes reſcitiunt.

Signa pulmonis siccit. Cap. lxxvi.

Pulmonis autē siccitatis excrementis vacant, & pituita: vocemq; claram efficiunt: quemadmodum humiditates obscuram eam reddunt, ac rancam. Et quum vehementius aut acutius loqui studuerint, tunc intercedunt excrementa.

De voce. Cap. lxxvii.

Non tamen ipsa vocis magnitudo a caliditate, sicut neq; paruitas a frigiditate oritur: sed altera quidem asperæ arteriæ latitudinem sequitur, & vehementiorem efflatum: paruitas verō, a contrariis procedit causis. Quare nec semper, nec primum, sed ex accedenti, & solas naturales temperaturas, nō autem aduentitias, vocis magnitudo aut paruitas sequitur. Quia enim talia instrumenta temperatq; ratione sunt facta, ad hoc autē cōsequitur huiusmodi vox: ob id nimirum contingit, ex voce de naturali temperie rano cinari.

De leni & aspera voce. Cap. lxxviii.

Nam lenis vox, arteriæ lenitatem cōsequitur, sicut & aspera asperitatem. Lenitas igitur arteriæ moderatā temperiem sequitur, vt asperitas siccitatem. Asperitas quippe fit a duri corporis inæqualitate. Arteriam verō duram, simularium partium, ex quibus constat, siccitas efficit: inæqualitatem dispersit in eisdem humiditatis defectus.

De voce acuta. Cap. lxxix.

Eodem modo neq; acuta naturaliter vox, sine angustia faucium, nec grauis, sine latitudine fieri potest. Angustia igitur ab inflata atq; innata frigiditate nascitur: annuendo autem a caliditate. Porro cuiusq; facultatis virtus & vitium, a temperie ipsa, seu a causa præcedente, exoritur.

De homine pituitoso bilem vomente.

Cap. lxxx.

Vidi equidem hominem, cuius totus habitus pituitam præ se ferebat, quotidie tamē biliosum evomebat humorem. Censui itaq; inspicuūda alui excrementa esse, in quibus minimè apparebat bilis. Quare coniectura quadam comprehendit, cum meatu, qui biliosum humorem egurgitat, non minimè ipsius partem ad æmum officium ventriculi, quod Græci pyloron vocant, effundere, vt in quibusdam animalibus ceratur. Plurimum itaq; ad eorum quæ latent sensu cognitionē cōducit, ea quæ ex sectionis inspectione habetur perina, operationū atq; vrilatū in vñtio.

Quomodo cognoscantur ægotantia corpora. Cap. lxxxi.

Vbi igitur iam corpora ægotāt, ipsorum partes quæ quidem subiciuntur sensui, sunt dignoscendæ ex eorum quæ insunt eis secundum naturam permutatione, in magnitudine, colore, figura, numero, situ: & ea quæ est secundum duritiem, molliem, frigiditatem, & humiditatem, differētia. Quæ autem visum effugiūt, ex operationum læsionibus, aut iis quæ excrementur, aut dolori-

Solidas partes non posse vltimo modo humiditas sui effici, solidorum corporum alimentum quod sit.

Ventriculi siccitatem indicia.

Ventriculi humidioris indicia.

Ventriculi calidioris indicia.

Ventriculi frigidi indicia.

Intemperies morboſa, a naturalibus instemperantiis quæ differant.

Sinu a ventriculo thoracis orta quemadmodum distinguenda ab illa quæ ex thorace ventriculus.

Pulmonis frigidi indicia.

Pulmonis siccitatem indicia. Vocem rancam quæ efficiantur.

Voxis magnitudo ex paruitate ad quæ temperie sequatur.

Vox lenis asperitatem, quid conſequatur.

Vox acuta grauis, quæ quæritur. Vtrum vultu emittitur facilius a temperie ipsa auocatur.

Bilem corporis non, nimirum aspicitur vomant.

Aggrotantia partem digne sensu ration.

bus, aut tumoribus præter naturam, aut horum quibuscumque, vel omnibus.

De signis patientis cerebri. Cap. lxxviii.
Igitur cerebri ægras dispositiones, aut ex deficiunt speciebus, aut sensum, aut imaginatio-
nem lationibus, aut actum qui secundum ele-
ctionem sunt, aut ex his quæ excernuntur per pa-
larum, vel nares, vel aures, aut ex dolorum, qui ti-
veniunt, differentiis, cognoscere oportet.

Signa cordis patientis. Cap. lxxviii.

Quæ verò in corde fiunt, ex difficilis anhelitus
speciebus, & tremulis moribus, qui ipsi contin-
gunt, & pulsibus quoque eius & artetarum, & ex
ire ex cædentiis celeritate vel tarditate, & ex fe-
bribus, & refrigerantibus, & in colore differ-
tibus, eisq; quibus constitatur, doloribus.

Signa pancreatis hepatis. Cap. lxxviii.

Quæ in hepate fiunt, ex defectu humorum atq;
ab vndanna, & a did, quod præter naturam est, e-
versione, & colore malo. Sed et ex grauitatibus, &
tumoribus, & doloribus, non modo his qui in
eo ortum habent, verum & ex illis, qui consortij
lege proveniunt. ut per aliquam difficilis respira-
tionis, aut etiam tulsis speciem.

Signa patientis ventriculi. Cap. lxxv.

Sic & ventriculi affectus agnoscitur, ubi in co-
coctione, & appetitu humidi vel siccissimi, vel
superfluitatæ excretionem, delinquitur. Nec secus
ex singulis, eructationibus, nausea, vomiti-
bus, & ipsis eorum quæ vomuntur, speciebus.

Signa patientis thoracis. Cap. lxxvi.

Thoracis agnoscitur affectus ex spirandi diffi-
cultatibus, rufibus, & doloribus. qui in ipso fiunt,
& ex eorum quæ cum tussis expiuntur, differen-
tia. Sic & asperæ arteriæ ægritudines, spirationes
difficiles, & rufes, & dolor in loco, & quæ expu-
tur, & vocis offensionem ostendit. In vniuersum
autem, ex tumore, dolore, operationum latione,
& excrementorum differentiis, omnium partium
affectus noscuntur. Tumores igitur præter natu-
ram, in inflammationibus, scirrhis, atque us quæ
vocalur ordemata, explorandi sunt. Dolor autem,
quemcumque obfiderit locum, aut solutam
continuitatem, aut subitam actionem, indi-
cat. Soluitur autem continuitas incisione, exci-
sione, fractione, & tensione. Altera verò substan-
tia à caliditate, frigidityte, humiditate, & siccita-
te. Tripliciter autem ipsius operatio: aut quis de-
biliter, aut quia viscosè, aut quis nullo fit modo.

At verò quæcumque excernuntur, nonnulla qui
dem sunt veluti partes locorum patientium, non
nulla verò cæ excrementa. Etenim quæ in ipsis
naturaliter continentur, singula propriam facient
indicationem.

Signa futuræ ægritudinis. Cap. lxxvii.

Eorum autem indicia, quibus ægritudinis pe-
riculum imminet, mediam formam habet inter
ea quæ sanis & ægrotantibus accidunt. Siquid
sanis omnia secundum naturam insunt: præter na-
turam verò ægrotantibus, quatenus ægrotant. In
confinio autem horum, indicia neutrorum cõ-
sistunt. Quocirca dispositiones corporum, quæ ca-
sura in morbum videntur, sunt ex neutrorum ge-
nere, similisq; enim quæ ipsa indicant signa. Pri-
mo siquidem hæc sanitatem ostendunt, secundò
autem ægritudinem. Ac proinde eadem signa se-

cundum habitudinem, quæ ad aliquid est, neu-
tra & insalubria dicuntur: quæ quidem præsen-
tem dispositionem ostendunt, neutra: quæ verò
futuram præmonstrant, insalubria. Eadem verò
ratione, & quæcumque ægrotantibus signa salu-
ria apparent, dicuntur quidem salubria, quia futu-
ram sanitatem ostendunt: ægra autem, quatenus
præsentem indicant ægritudinem. Nec in simbi-
guo est, quod quæ sunt verorumque indicia, neu-
tra dicuntur, secundum vnum quoddam neu-
trius vocabuli significatum. Quum igitur eorū
signorum quæ futuram ægritudinem indicant,
duplex sit differentia, prius ea pertractemus, quæ
quæstantibus, vel qualitantibus, vel temporibus,
non autem propriis speciebus, ab eo quod secū-
dum naturam, evasint: veluti ciborum appeti-
tus in rem, vel dissoluta, vel quæ non ferat con-
suetum tempus, aut quæ ad eduliam non vitata fer-
tur. Ad hoc etiam genus pertinent excretiones ci-
bi superfluitatem, quæ aut pauciores, aut plures,
aut humidiores, aut duriores existunt. Sic humi-
diorum excrementorum vel defectus, vel præter
consuetudinem ab vndanna, aut in colore, aut in co-
sistenna varietas, aut in excretionis tempore. Præ-
terea vigilie plures, somniq; aut non cõsueti tem-
pore obiti. Eodem modo potus plures aut pau-
ciores, calidi aut frigidi in solens appetitus, vene-
reorūq; immodica aut intempestiva concupi-
scentia. Ad hæc plures aut pauciores sudores his
qui sunt opportuni, & ad motus torpor: vel li-
mouent tætauerint, tarditas, exolutio ve insignis.

Huc pertinet mensurorū suppressio, vel immo-
dica, aut diminuta evacuatio. Similiter de fluxu
hæmorrhoidū est designandum. Quod si non ead-
em quæ prius ex cibo potusq; volnptas capitur;
est futuræ ægritudinis signum: quæmadmodum
hebetudo mentis sensuq; minimè naturalis: aut
obliuio insolita, somnive turba in imaginibus. In
summa verò, quæcumque secundum naturam interit,
hæc quidè supra modum aucta, hæc verò imminu-
ta, hæc repugnans quibuscumque, aut qualitantibus,
aut quantitatibus immutata, futuros morbos prænu-
ciant. Porro morsus ventris, vel in ore ventricu-
li, vel in aliquo intestinorū, aut quum alius sub-
ducitur, aut quum vomitus excitatur, aut quum
mingitur, sine aliis aliquis dolor mediocri, ex
genere quidem existit eorū quæ præter naturam:
non tamè qui sic se habent, ægrotare dicuntur: sic
viti nec qui capite grauantur, aut dolent, aut vi-
gillant: quum nondum solæ ipsorum impediunt
operationes. Hic siquidè in huiusmodi o-
perationibus terminus est. Atque idcirco in eo
quod ad aliquid, eandem dispositionem ægram
atque neutram dicemus. Nam pro vigore poten-
tiæ, quæ vel facile sustinet, vel vincitur, vnaquæ-
quæ ex his quæ antea diximus, vel morbus est,
vel dispositio neutra. Sic & quæcumque in sensu-
bus, non in eo quod magis aut minus invicem
differunt, sed toto genere sunt præter naturam, fi-
gnes morborum existunt, quando modica fue-
rint, & non dum sufficient hominem ad confus-
tionis operibus amovere. Es autem contingant, vi-
bi sensus ipsi circa sensibilia propriis palam lra-
lucantur.

Signa corporū ægrotantiū. Cap. lxxviii.

At quæ ita ingratantibus signa videntur, non-
nulla

Cerebri morbi
quomodo digne
jocandi.

Cerebri morbi
vnde agnoscitur.

Hepatis affec-
tus vnde sunt
cognoscendi.

Ventriculi affec-
tus quomodo
deprehenditur.

Thoracis affec-
tus vnde sunt
deprehendendi.

Dolor quid in-
dicet.

Solui vites
quomodo possit
operatio triplici
aut leuiter.
Excrementa diffi-
cultas.

Morbi futuræ
signa a iudicio
ex naturæ ge-
nere existunt.

Ægritudinis fu-
turam indican-
tiam figuram
naturæ duplex.

Morbi futuræ
prænuclis qua
a natura ordi-
ne rursus.

Signa salubria.
Signa perniciosa.

Excrementa quod indicant.

Decretoria excrementa.

Salubria causarum differentia dicitur.

Conseruatrices causae quales.

Corpus necessarium alterantia quae sunt, et quot numero.

Air cur non afficiat.

Motu. Quies.

Somnus.

nulla quidem salutem, nonnulla mortem portendant. Ac prima sane salubria: secunda vero genere quidem aegra, secundum speciem autem, perniciose dicuntur. Sumuntur autem, ut dicamus vniuersaliter, ex operationum virtute ac vitio: secundum partem vero, ex particularium operationibus: quarum genera prius diximus. Porro excrementa, quandoquidem coctionis & cruditatis signa continent, fieri non potest quin omnino significent, aut naturam materici, aut materiam naturae, aut neutrum alteri dominari. Salubria igitur signa dicuntur, superante natura: insalubria vero, deviata. Neutra autem, quae pugnas habet aequales. Ceterum quae manifestam coctionem indicant, ex salubribus sunt: sicut quae cruditatem, aegra. Quae vero neque coctionem nec cruditatem, ex neurotorum natura exiunt. Sunt vero & neutra, quae cumque nunc quidem in hoc, nunc vero contrarium significant: veluti denigrati digiti. Ac talia sane sunt decretoria accidentia.

De causis salubribus, in salubribus, atque neutris. Cap. LXXXIX.

Quoniam vero causarum hae quidem salubres, hae autem insalubres, hae denique neutrae: primum de salubribus differemus. Ceterum quandoquidem nonnullae earum conseruatrices, nonnullae effeetrices exiunt: suntque & tempore & dignitate priores conseruatrices, ab illis nobis est auspicandum. Quum igitur non vnum tantum sit sanum corpus, sed plura, in eorum singulis propria erit causa conseruatricis. Siquidem omnis causa, in eo quod ad aliquid, est. Haec igitur denuo sumendum iterum ab optimae corporis constitutione: & quae illi salubria sint, considerandum. Eorum autem inventionem in ipsis rei natura indicat.

Quot modis alteretur corpus.

Cap. LXXXI.

Secundum quod igitur corpus nostrum alteratur modos, rot causarum conseruatricum genera habebit: quas laquet etiam correctrices exiunt. Alteratur autem corpus, si nonnullis quidem necessariis, si quibusdam vero non necessariis. Nec cessario enim alterantur, quae nulla ratione vitari possunt: non necessarij autem reliqua. Nam aeternam quidem ambientem semper attingere, comedere, bibere, vigilare, & dormire, est necesse: eni bus autem, & extrinsecis feris occurrere, non item. Quare iuxta primum causarum genus versatur pars corporis conseruatricis, circa secundam autem minimè. Quot igitur sint ea quae ex necessitate corpus alterant, distinguentes, proprium in singulis eorum causarum salubrium genus inveniemus. Inest igitur vnum ex ambientis aeris adhuc. Alterum, ex motu & quiete rotius corporis, & singularum particularum. Tertium, ex somno & vigilia. Quartum, ex his quae assumuntur. Quintum, ex his quae excernuntur & retinentur: Sextum, ex animi affectibus. Ex his itaque necesse est aliquo modo affici corpus. Ab aere quidem ambiere, quia vel calidus, vel frigidus, vel excruciat, vel humectatur, vel secundum horum patitur coniugationem, aut in tota alteratur substantia. Ex motu vero & quiete, quum vitraque modum excesserint, aut calidatum, aut frigidatum, aut humectatum, aut excruciatum, vel aliquid secundum horum patiens coniugationem. Sic & ex somno &

vigilia ipsum pati est necesse, iuxta eandem rationem. Præterea & ex animi affectibus, & ex his quae assumuntur, aut excernuntur, aut retinentur. Hæc quidem omnia, partim quidem evident, partim vero per alias causas medicas, alterat corpus, & sanitatem corrumpunt. Omnia igitur nunc dicta genera, materici quædam sunt salubrium causarum. At vii opportuno adhibito, cense fiunt conseruatricis, atque salubres: si vero à modo aberrauerint, redduntur insalubres. Quocirca singula earum rerum, quandoque salubres, quandoque insalubres sunt, quod ad aliquid referantur. Quippe ubi motum corpus desiderat, exercitatio quidem salubris, ovis vero insalubre existit. Quum vero eget quiete, otium salubre est, insalubris autem exercitatio. Eodem modo de cibis & potibus, ac de alus omnibus statendum. Horum namque singula, quando vt necessitas corporis exigit, cum mensura, & opportuna qualitate adhibentur, salubria fiunt. At quum circa omnem necessitatem, ac præter modum affuerint, insalubria. Atque hæc duæ sunt circa salubre & insalubre intentiones: rei scilicet, quæ adhibetur, qualitas, & quantitas. Non est autem rationi consonum, etiam temporis occasionem, quæ in usque dicta sunt, conueniet, veluti tertium aliquod ab eisdem diuerfum, introducere. Nam si tanta & talis re allata eget corpus, nemini dubium est quin etiam in tempore opportuno afferatur. Siquid inde temporis occasio est nata, quod fluxile & transmutabile mortale corpus quum sit pro modo transmutationis, alia alio tempore auxilia solet. Optimæ igitur corporis constitutioni, quæ circumfusus aer optimè temperatus fuerit, omnium earum rerum, de quibus nuper sermonem fecimus, quantitas moderata conveniet. Quum vero aer à temperie recesserit, tantum illas à medicritate evanare oportet, quantum fuerit aeris ab optima temperatura recessus. Hi vero medicritatis termini existunt in aere quidem ambiente, vt neque horreat propter frigus, nec fudet propter æstus. In exercitiis autem, quum primum lassari cœperit corpus, confestim quiescere. At in cibis, coctionis perfectio, & excrementorum modus, in quæro & quali coeconsens. Aequalis vero in his quodammodo est coctione appetitus. Optima quippe natura, quantum appetit, tantum etiam concoquit. Sic & somno modum ipsa natura præstinit, qui optimam corporis constitutionem sortuntur: nam si tunc à somno excitantur, quum corpus ampliori quiete non eget. Quinque talem victus rationem adhibuerint, nullum est in coram excrementis delictum, quæ vel per ventrem, vel vrinæ mearam, vel per totum corpus vacuatur. Liqueat igitur ipsos cauere debere ab immodicis animi affectibus, ab iracundia videlicet, tristitia, furore, timore, & invidia. Hæc quidem alterat, atque à naturali statu corpus immutat.

De venetis. Cap. LXXXII.

Veneretur vero iuxta Epicuri sententiam, nullus est vñs salubris. Re vera autem confert, si tantum intervalla in eorum viâ adhibeatur, vt nec resolutio aliqua percipiatur, & ipsi seipso homo quodammodo leuior factus, ac melius spirare videatur. Tempus autem ad vrendum opportunum, quum in omnium rerum circumstantiis

Vi. n. l. a.
Amato affectum

Salubrium causarum differentia quæ sunt.

Intentiones circa salubria, insalubria, sunt quatuor ex quibus dicitur et quæ sunt.

Medicritatis termini in aere quidem ambiente.

Natura optimae appetit ad vñ, quantum concoquit.

Vnus quatuor vñs salubris.

Veneris ejus apud quod sit.

exquisita mediocritate corpus fuerit constitutum, ubi scilicet nec supra modum plenum, nec vacuū existerit: aut in calore, aut frigore, aut siccitate, aut humiditate excesserit. Quod si aberrare contingerit, parvus sit error. Melius autem illi calefacto magis quam frigefacto, & pleno quam vacuo, & humecto potius corpore, quam exiccato, uti venereis. Horum autem singulorum quæ dicta sunt qualitas, in optima corporis constitutione est eligenda: exercitij quidem, in quo totius corporis partes æqua proportionem mouentur, ita ut non aliq̃ quidem ultra modum fangentur, aliæ verò citra. Cibi autem & potus optimam habent temperiem. Eadem in reliquis etiā est ratio habenda. At si ab optima constitutione aliquod defecerit corpus, non autem vehementer, & hæc quæ ipsius sanitatem conseruant cause, ad proportionem mutabuntur. Sed quum multa sint huiusmodi corpora, per singula genera est seorsum docendū. Quod igitur in partium similitudinem temperie evariat, instrumentarium autem partium seruat cōmensuram, duplicem habet salubrium causarum formam: alteram quidē earum quæ ipsius conseruant temperiem, alterā verò earum quæ ad optimam transferunt. Quæ itaq̃ ipsius temperaturam conseruant, tantum à causis optimæ temperatæ nature distabunt, quæ tūc & totius corporis temperatæ ab illa evaria bit. Caldiora siquidem corpora, calidiorē vītus rationem postulant, frigidiora autem frigidiorē, sicciora sicciorē, & humidiora humidiorē. At secundum coniugationem, calidiora & sicciora, calidiorē simul atque sicciorē: eadem in reliquis quoque coniugationibus proportionē seruata. Rectē siquidem causarum vītus materia, qui naturales earum potēstias agnouerit: videlicet quod motus, alimenti penuria, vīgilia, excretio, & omnes animi affectus, corpus exiccant: at quæ hisce contraria existunt, humectant. Ita verò & calfacientia, & refrigerantia vītus instituta, & ciborum, ac potuum, vītū simpliciter dicam, omnium quæ corpori afferuntur, materias quis nocens atque potētias, salubribus vītetur causis, similia similibus adhibendo, si quidem eandem in qua acceperit, seruare corporis temperiem sit animus. Quod si permutare, atq̃ ad melius eam traducere studeat, alterum est hic salubrium causarum genus, his quidem quas nuper diximus, contrarium: æqualiter verò declinās ad alterā partē à bene temperatis & mediis, quæ optimis naturis cōveniūt. Calidior liquidē & siccior temperatura, a calidioris ac siccioris vītus ratione, ad excelsissimum bonę temperaturæ habitum non transfertur. At talium erit vītus necessarius, quæ tantum eis quæ probē temperata existunt, frigidiora atq̃ humidiora sint, quantum & natura naturam, in caliditate & siccitate superabat. Nam tale causarum genus inſitas corrigit impenitētiās: alterum verò de quo supradiximus, temperaturam conseruat. Est autem vītusque vicissim apud medicos vītus necessarius. Nam quum plurimum suppetit, eū corrigere oportet, ac sensum ad meliora transferre. Neque enim natura partium repentinās alterationes. Hominem autem occupationibus necessariis districtum, in eodem præſtati habitu conseruare. Por-

ro quæ similem habent in omnibus corporis partibus intemperiem, eadem egent procuracione: dissimili, quæ dissimilem.

De causis salubribus partium instrumentum. Cap. lxxxi.

Instrumentarium autem partium causæ salubres, quatenus & hic ab optima cōſtitutione delinquitur, ita & inuicē distabunt. Aliquantum sunt salubres erroribus qui in formatione cōſiſtunt: aliæ ita qui in magnitudine, vel numero, vel positione. In formatione igitur plures contingunt errores: nā & figura partis, & si qua in ea cavitās est secundum naturam, vel meatus, vel oriſcium, vel asperitas, vel lenitas, si quidem parum à naturali ſymmetria recesserint, salubrium corporum retinent appellacionem: si verò amplius, in salubritate. Quod si tantas fuerit recessus, ut operationi afferat detrimentum, iam ægrotare dicuntur. Secundum quantitatem autem, excessus atq̃ defectus ad easdem ducit differentias. In numero verò, siue vna, siue plures, quæcūq̃ ex similibus partibus fuerint, aut deficiāt, aut superabundent. Ex hoc genere etiam sunt, quæcūq̃ in nobis substantiæ præter naturam cōſiſtunt. Reliquum est aliud genus, quod ad situm cuiuslibet simplicis attinet partis, in quo et ipſo quatuor sunt omnes differentię. Prima quidem, quæ optima exiſtit. Secunda, quæ parum evariat, ob idq̃ salubre adhuc efficit corpus. Tertia, quæ in salubre, quādo amplius à modo recesserit. Quarta, quæ iam ægrum recessu plurimo reddit. Quæcūq̃ igitur partes in figura delinquant, vel uti quæ blæx, varæ, & obliquæ appellantur, hæc, quam fortis nuper natus atq̃ tenellus est, formatione & ligatura, ad naturalem habitum traducuntur. At si iam aucto infante, ad duritiem peruerint, emendari non possunt. Si errores quidem qui ad cavitatem attineant, quomodo adiuſt augeri perſeuerāt, correctionem admittant. Quum autem iam ad vltimum peruerint, nullus est remedio locus. Cavitate igitur quiete atq̃ alligacione parux reduntur: magnæ verò, partium operatione, & retentione spiritus. Sic & quæcūq̃ foramina, orāq̃. Et quidē quæ naturalem magnitudinē partes exuperāt, quiete, ac cōmodo a ligacione, minores reddūtur: augēt autē & naturali motu, & frictione moderata, & quibuscūq̃ aliis plus sanguinis cōſiliare valētibz. Deficiētes autē partes, quæcūq̃ ex sanguine duxerūt originem, corrigi quidem nō est imposſibile. Quæ verò ex ſemine, ipſemodum imposſibile exiſtit. Licet tamē aliquādo loco earum alias facere, quæ vſum laudis diuilem præſtent. Earum verò omnium natura opifex est, medicus autē miſiſter. Porro quæ numero excedūt, iis ablatio, causa salubris exiſtit. Inſpicere verò oportet, in quibus id fieri poſſit. Nam ſi imposſibile appareat, transponere tentandū est. Eadem est & eorum, quæ in ſitu vitiata ſunt, emendatio. Nec verò in ambiguo est, quod duo ſpēcies ad tria vitta, eandē poſſunt partē cōpreludere. Reliqui est id morbi genus, q̃ ſimilibz & inſtrumentalibus partibus exiſtit cōmune, vnitatis diuortium.

De causis salubribus, seu ad eos, qui morbo tenentur. Cap. lxxxiii.

Salubrium causarum, aliæ quidem occurrunt

Optimè conſtituta natura & melius requirit meliora.

Emacientia corporis quæ ſit.

Similia ſimilibz eſſe adhibenda, dum ſeruari corporis temperamētum eſt animus.

Intemperantia quando ad meliora transferenda, quæ quædam ſic conſeruantur.

Errores in formatione, quos explicare conſiſtere poſſunt.

Partes ex ſanguine creatæ poſſe corrigi ſi de ſitu ſunt vitiatæ, ut inſanantur, eſſe ſed imposſibile. Naturæ opifex ſeruat generationis partitionem. Medicus naturæ miſiſter.

*inter periculi iam genitrix: alix illi quæ in generatio-
ne cõstitit: alix illi, quæ futura est. Igitur liarũ quæ
sunt postremæ, lĩq quidẽ in præseruatua artis par-
te cõtinentur, hæc verò in salubri. Primæ autẽ alix
inter oẽs, in curatiua tantũmodo: at illę quæ in-
ter vtrĩsq; collocauimus, in præseruatua simul
& curatiua. Si quidẽ factũ iam ægritudinẽ curare
oportet: eam verò quæ nondũ adeit, sed futura
est, phibere ne fiat, ab ea quæ est in corpore dispo-
sitione. Eius autẽ quæ adhuc sit, qd quidẽ factũ est,
curare expedit: qd verò futurũ, phibere ne fiat.
Prohibebit autẽ, sublata ea dispositione: quã scq;
morbis natura est aptus. Talis etẽm dispositio,
causa antecedẽs dicitur. At facta iam ægritudo cu-
tabitur, soluta ea dispositione, à qua primũ le-
ditur naturalis functio. Quẽ sanẽ ipsam dispo-
sitionem, morbi causam vocamus.

De communissimã intentione curatiua.

Cap. lxxxiiii.

Curatiua fo-
pna.

Curatio verò vnũ præcipuũ cõmunissimũq; 30
habet scopũ, nẽpe tollẽdẽ causam contrariũ.
Ex hoc siquidẽ genere sunt causæ illæ oẽs, quæ sa-
nitatẽ efficiũt: particulatim verò, ex vnicũq; dis-
positioni cõtrariis. Calido igitur affectũ, causa
frigida cõtraria existit, frigidũ autẽ calida: eadẽq;
in cõteris pportione. Etẽm si omne immoderatũ
præter naturã est, moderatũ verò secundũ natu-
ram: necesse est omnino, vt immoderatũ ab im-
moderato cõtrario, ad mediocritatem trahatur.
Cõterũ secundũ potentiam, non secundũ
imaginanem, calfaciens refrigeransq;, & alia
id genus, vtrĩ accipienda. Fungamus itaq; in hu-
moribus putrescentibus febrem accedi. Indica-
tio in huiusmodi affectũ, est euacuatio simul et
alteratio: hæc quidẽ, quæ putredinem finiat, man-
nente adhuc substantia: euacuatio verò, quæ to-
tam ex corpore substantiam putrem educat. Sed
dicta quidẽm alterationis species, concoctio exi-
stet. Euacuationes autem sunt, & per sangui-
nis emissionem, & clysteris vsum, & per vtrĩq;
vias, atq; eam quæ per cutim fit transpirationem;
atq; præterea per eam quæ fit ad partes oppositas
attractionẽ, atq; ad alijs propinquas deriuatio-
nem. Nam & ad hoc ipsum genus pertinet citare
menstrua, hæmorrhoidesq; aperire, ac deniq; ex-
purpare per palatum & nares. In vniuersum au-
tem, si vnamquamq; prius effectricem causam re-
sciderimus, dein verò ad illam quæ ab eadẽ cau-
sa facta est, ægritudinem accesserimus, causarum
salubrum inuentionẽ habebimus. At secundũ 50
compositas intemperies, ex simplicibus compo-
sitis cõmoditabit salubria præcepta. Etẽm si
decem quidẽ gradibus ad caliditatem maioreẽ
ea quæ naturæ cõueniat, labatur corpus, septem
verò ad siccitatem maiorem, tunc salubrem cau-
sam in huiusmodi affectibus esse oportebit, de-
cem quidẽ gradibus frigidiorẽ, septem verò
humidiorẽ. Quod si particula affecta in pen-
sionibus locus sit fixa, machinari oportet inspu-
rale remedium salubre, cuius vis nequaquã in iti-
nere ante exoluatur. Si itaq; calidus esse opor-
tuerit eo quod est moderatũ, non solum tantam
habeat caliditatem, quantam exigat morbus, sed
vltã eandẽ mensurã tantũm adiciatur, quãtũ
ex situ, vt pertingere possit ad locum patientem,

Immoderatum
omne est præter
naturam.

Alii putredine
inducit do-
plex.

Alteratio putri
um humorũ cõ-
coctio est.
Et variationes
speciei.

Affectus in alio
fissis, reuocato-
rem medica-
mentũ non vo-
quant, quod ex
sua ipsi natura
possint.

fit necessariũ. Si verò frigidus, nõ simpliciter tan-
tũ frigiditatem oportet augere, sed & materia
quorũ prius animaduerenda est. Si enĩ crassa sit,
non admodũ poterit penetrare ad profunda: sed
potius contrariũ præstabit effectũ, ipsũ laudo su-
perficiẽ, atq; densando. At si tenuioribus parti-
bus constet, poterit sanẽ plurimum subire pũ-
dum. Idem in humectantibus atq; exsiccan-
tibus accidit, in quibus crassitudo & subtilitas partũ
substantiæ inspicienda venit. A situ itaq; loci, inue-
nit indicatio salubre remediũ. A formatione autẽ
& situ simul, quidẽ effluxus sensibiles, atq; ad a-
lium locũ foraminib; patentes habuerunt, auri-
o mino caruerunt. Quos enim effluxus ad prin-
cipales essent partes cognouerimus, a vertemus,
atq; ad illas impellemus, quæ minime principatũ
obnunt. Porro causarum quæ intemperatam
efficiũt, curatio fit per euacuationem. Nam ipse
intemperatũ, sola alteratione sanantur.

Augetur efflu-
us qd: à parte
bus principatũ
est, ad quodbi-
liores.

Curatio solutionis continui in parte car-
nosa. Cap. lxxxv.

Cõtinuitas autẽ solutionis curatio, intentio-
nem quidẽ habet vnionẽ, quæ in partibus quidẽ
intrinsecus inuicem possibilib; est, in similibus ve-
rò non semper possibilib;. Quandoq; verò, si cuti
in carnosã, sanitas cõglutinatione perficitur. Ip-
sam verò antecedit, si vulnus maius existerit, par-
tũ applicatio distantũ, quæ ex formanonis ge-
nere existit. Vt autẽ hæc ipsa firma & stabilis fiat, al-
ligatio cogens in vnum, & sibiũq; & futuræ vti-
litatis sunt. Coalescere autem facit ea quæ distant in-
vicem, ac pristinam restituit vnionem, ipsi natu-
ræ. Nostrium verò opus est, primò quidẽm appli-
care extrema distantũ partium: secundò autẽ,
quæ in vnũ coacta sunt, sic cõseruare. At terciò,
cautere ne quid labris intercidat viceris. Quarto
deusq; ipsam partis substantiam cõseruare salu-
brem, id quod per mediocriter exsiccata fiet. Hęc
igitur est solutũ cõtinuitatis curatio, quum ipsa
sola scõsum in carnosã parte consistit.

De solutione cõtinuitatis in ossẽ.

Cap. lxxxvi.

At fractio est in ossẽ cõtinuitatis diuortiu: qd
quidẽ quantum ad intentionẽ primã, insanabi-
le est: quò verò ad secundã, quodammodo recipit
curationẽ. Prima igitur intentio est coactus partũ,
qui ob ossis duritiẽ fieri non potest. Secũda, allig-
atio, quæ fit callo supernato partes fractas cõ-
cumbente. Calli autẽ generatio, quæ quidẽ ex ma-
teria & à natura fit, est & ad alia cõmunis. Qua-
tenus verò formã ossis vicinũ habet, ex eiusdẽ sit
alimento. Molle verò & puerile os coalescere po-
test, sed perrarò sit talis affectus, qn alio cietur al-
tern. Magna enim ex parte adiacẽtes musculi, vni-
cum corporibus alijs, per fracturã ossis panuntur.
Quo circa & curatio nis intentio ossi duplex:
quarũ altera quidẽ circa ossa, altera verò circa
corpora adiacẽtia versatur. Quum igitur fractũ
sit sanitas, callo adueniente fiat, ad huius autẽ ge-
nerationem, propriũ ossis alimenti superfluitatẽ
naturæ suggerere oporteat, quæ quidẽ sup erdui-
tur in qualitate & quantitate debet modũ serua-
re, talis certẽ victus ratio adhibenda est, quæ influ-
xurũ ossibus sanguinẽ tantũ ac talem præparet,
qualis & quãtus generãdo callo sit opportunus.

Vniũ in parti-
bus intrinsecus
tariũ solutũ est
impossibile.

Vulnus carnis
soluit, quæ præ
callo.

Vulnus præ-
statur natura.

Soluta partũ
substantia cõ-
seruare medica-
mentis exsiccato-
ria.

Fractura quod
pertinet ad in-
tentum pri-
mam, est insa-
nabile.

Calli generatio

Ossa puerilia
molliora possũt
fractũ esse si-
milis affici ma-
nifest.

Fractura san-
tas fit callo ad-
ueniente.

Fractura ratio-
nis vniũ ratio
est veniens.

Mm iij

De punctura nerui & tendonis.

Cap. LXXXVII.

Punctura nerui, ut ad excitandam ei volitionem sit prompta.

Punctura curatio.

Cautio curatio.

Cicatrice indurata, si curatio desiderari.

Vulnus si adit tumor, hoc primum curandum est, quam succurramus illi.

Perforatio membrorum curatio.

Obstructionis curatio.

Lapide in vesica curatio.

Pelvis enterica aditio ciborum si medicamentum remedium.

Nerui verò & tendonis punctura, propter sensus vehementiam, & quoniam pars principio conuulsatur, propterea est ad excitandam conuulsionem neruorum: ac tum præsertim, quò nil extorsum expirat, obsecraro curis vulnere. Aperiendū est igitur, atq; excucandum sub illa tenui, quæ visus ad ima nerui obliquis posuit descendere. In simplicibus igitur huiusmodi affectibus, saluberrimam causam formam talis existit. In cõpositis verò cõplical vlcibus, prima quidem cõquiras: quæ nō dissertia vlcis, sed est alterius ægritudinis genus, in quo facta est subtilitatis iactura. Curatio autem in morbo duplici, duplicem exigit intentionem. Nam cõtinuitatis solutio, vnitatis: substantiæ autem iactura, generatione indiget. Quod autem primò quidē hunc affectū oporteat sanare, ac dein vnitati restituere tentare, ipsa natura rerū nos docet. Vbi verò repletum vlcus iam fuerit, ad æqualitatemq; perductū, cute inducendum est: quod si fieri nō possit, saltem carne quæ cuti vicina sit, cõmunendum. Est autem huiusmodi, quæ & ficca, & calli similitudinem præ se fert. Ad cicatricē igitur inducendam, necessaria exiccantia erunt, ac sine mordacitate astringentia medicamenta. Sic et si sordides aliqua fuerit adnata, intentio abstergendi erit. Præterea si inflammatio aliqua vel attritus, vel scirrhus, vel tumor mollis & laxus, vel intemperies vna cum vlcere adsint, prius quidem eorum curatio nisi intendamur, ac dein ipsum vlcus curandum.

De speciebus morborum qui iuxta formationem contingunt. Cap. LXXXVIII.

Quod verò ad figure permutationem pertinet, in iis sanè qui adhuc crescit, possibile est plurimarum partium peruerfionem corrigere: in eis autem qui iam sunt aucti, minimè. Scopus igitur in iis quæ curationē recipiunt, est, in contrariū peruerfionis adducere. Si verò fractio aliqua nō recte conformata, aliquis membri figura vitata fuerit, cui substantia callosa innasci præuenit, si quidem hæc adhuc recens existerit, perfringere os compactū oportet, ac rursus recte affirmare, deinde callum superinducere.

De obstructione. Cap. LXXXIX.

Est verò & obstructio ex eodem morborum genere, sitq; ex crassis & lentis humoribus, vni & ipsa scopum habens morbum contrarium, videlicet aperiorem. Cause autem salubres sunt, abstergentia & incidentia medicamenta. Quæ verò sit ab stercore duro, intersepiente intestinū, obstructio, primū quidem habebit duriciæ remediū, ex humidis pinguibuscq; clysteribus: postea demum ab acris evacuationem exposcet. Quæ autem ab lapide sit in vesica, subitò quidem illius transposuionem requirit: integre verò sanitatis gratia, incisionem & extractionem. At humidorum quæ præter naturam continetur sanatio, in exacta totius evacuatione cõsistit: quædam modum etiam in suppuratione. Immodica autem repleto, immodica evacuatione curatur. Quæcunque igitur in pulmone vel pectore cõmmentur, educuntur quidem per rursū, sed à medicaminibus extenuantibus. Quæcunque verò in hepate, vel venis, vel arteriis, vel renibus: aut per vrinā,

aut per infierem ventrem. Sed per vrinā quidem, ab iis quæ vehementer extenuant: per ventrem verò, ab eis quæ attrahendi aut aperiendi opera vim habent. Quæcunque in superiori ventre cõprehenduntur, per vomitum: si veri quæ in inferiori, per subductionē. At quæcunque sub cute, per sectionē, vel ignem, vel aduentia medicamenta. Sic aliquando etiam, quæcunque in aliqua naturali cavitare, vt in thorace. Vt autem summam de cam, quicquid præter naturam in aliquibus partibus continetur, eius sanationis intentio, est ablatio: vel si fieri hæc non possit, transpositio. Quæ verò non sunt ex genere præter naturam, atque vitate damnantur, in his scopus detractio existit. At inuenio eorum, quæ ad ipsorum sanationem perducunt, partim quidem ex affectu, plurimum verò ex ipsis affectus particulis sumitur.

De asperitate & leuitate. Cap. XC.

Quæcunque verò partes, quod exasperate sint, naturalem amiserint habitum, in leuitas naturas restituenda est: ossa quidem leuigando, asperam verò arteriam vel linguam leniendo, humidis quæ nihil mordeant, atq; lentorem habeant. At quibuscunque leuitas inest non naturalis, cognata asperitas reuocanda est medicaminibus, quæ sufficienter abstergant, alitringentq; parum. Quæcunque verò vel obstruções, vel angustias metui, alios morbos sequuntur, eorū curatio prius est perficienda. Quod si nonnulla ex proximè factis inuicem complacentur, varias habebunt indicationes. Si igitur in particulam aliquam rita sanguinis copia confluxerit, vt vniuersi ipsius venæ intumescant, & distendantur, nonnullique in spacia vacua & intermedia transfundantur, liuius quidem affectus sanatio scopum habebit evacuationem: aut, vt aperiunt vtamur vocabulo, detractioem: quandoquidē morbus est immodica partis repletio. Itaq; necessarium est vt superfluitas vacuetur, aut retrocedat, aut per ipsam patientem particulam. Retrocedat autem, vel impulsu, vel attractu, vel transmissu, vel vno aliquo horum modorum, vel omnibus. Per locum verò patientem vacuabitur, partim curatio manifeste, sensibilitatēq; partim verò resoluta in vapores. Si igitur vniuersum corpus plus squo plenum fuerit, per panem locum minimè vacuare expedit. Nam si scarificationibus, aut sectionibus, sensibilitate aliquidē euacuamus, plus ratione excutari doloris attrahemus in partem. Si verò calfacientibus conemur discutere, maior copia caloris vi ad partem trahitur, quā dispersatur. Quod si hac in re laboremus, vt retrocedat id quod influxit, corpus quum plenum sit, non admittit. Vt igitur fieri licet ambo possunt, in primis euacuare vniuersum corpus oportet, dein autē id quod in partem influxit, ad contraria loca retrahere. Quod quidē vbi fecerimus, prius repellemus à parte, quā aggrediamur discutere. At quod minoræ præsidia fuerint, id erit longè aprior vacuatio. A panēte verò loco repellemus, attingendo, atq; refrigerando. Quinetiam loca in anura attrahant ad seipsa quæcunque reperciuntur. Vasa præterea, vi medicaminum astringentium corroborata, à se ad alia remittunt. Si igitur superfluum omne itac vi retrocedat, bene se res

Dixerunt quod hoc esse debuit.

Cautio in quibus vitiis si modica curatio.

Aspera quibus sunt leuiganda.

Lenia quibus extenuantur.

Vacuationem per partem laesam esse morbi remedium, vniuersum corpus oportet plene euacuare.

Influxum ut per se curatio, vbi vniuersum corpus est plenum.

Repulsionem fieri per attractionem & refrigerationem.

se res habet. Si verò aliquid fuerit retentū in parte, id lentum & crassum esse, ob idq; ægrè solubile, conicere oportet. Potest enim, vel si iussu humor non sit eiusmodi, effusus tamē esse ad intermedia spatia: quo tempore evacuationus est per ipsum locum affectum imponētibz nobis particula superiacentibus ea, quæ repellendū humorem vim habent. Maxime verò evacubis quod in spatii iis delatēsit, et scāficātionum auxilio, & medicaminum quæ discutendū vim habent. At quia discutientia omnia vires calidas habēt, effectus autem huius temperaturæ est mordere, vbi caliditatis modum excefferint: cauēda ex eis sunt vehementissimè calida, ac tum præsertim, quam patiens locus in superficie cōstitit. Neq; enim parvus excitabitur dolor, si præter propriū affectum, in super mordetur. Taceo etiam dolorem omnem irritare fluxiones. Quod igitur medicorū caliditatem obinet, in huius dolore sedat, ac multo magis si humidū fuerit. Et quidem quicquid per summā laxet, potens est id medicum leni digerere, etiam si validas non fortiantur ad discutiendum vires. Quod si summæ quidem partes omni noxa caruerint, id verò quod evacuari oportet in penitioribus partibus hæret, intendendus atq; augendus discutientis medicamentis est calor: quomodo dubitandum sit, ne prius quā ipsas partes attingit, interim vires amittat. Nec tamē ex eo superiores partes aliquem dolorem sentient, quomodo omnes vacent affectu. Quare duo hæc simul invitant ad calidorū pariter atque acrim medicaminum usum, & summæ partes quæ tolerant, & profundæ quæ egent. Hanc igitur indicationē à finis partis desumebamus. Porro affectarum partium, in quibus retinetur superfluitas fluxionis, nonnullæ quidem rari, laxæ, & molles natura existunt: nonnullæ autem densæ, pressæ, ac duræ. Priores igitur evacuantur facile: reliquæ autem medicamentis acris vacantibus, ac præterea tenuioribus partibus habentibus, egent atq; eo magis, quod profundior situm habeant. Hæc igitur tibi rursus sit indicatio, vna quidē à particula parentis substantia, altera verò à formatione & situ. Fingamus enim in hepate esse proximè dictam affectum, in angustis vasorum sinibus, impactis humoribus, qui vel lēti & tenaces, vel crassi existant, vel superabundent: nonne in promptu est, primū quidem crassitatem vni cum lentore & renacitate, cibis ac potibus extenuantibus, ad subtiliorū partū substantiam transferri oportere? Secundū autē, non per angustos tantum in visibilibz meatibus, sed per latiores etiam, qui quid inibi insertū est, evacuandum esse? Sunt enim in hepate venæ, non minus amplitudine quā in numero, insignes. Terminantur autem, hæc quidem in gibbis, ad venam cauli: hæc verò in cauis, ad portam. Vnde latius diffiçile tibi futurum est, vbi cūq; pressi conspiciantur humores fuerint, roidem expedire evacuare: trahēdo quidem ad ventrem, cum his quæ attrahendi vim habent medicamentibus, quicūq; ex ipsis, in venis ad caua hepatis pertinent. à certis sunt ad vixæ verò meatus promouendo, per cauum venā, quicūq; in venis ad eam pertinentibus hæret. Est & alia indicatio ab hepate sumpta, veluti

Discutientium
qua vehementi-
ssimè calida
sint, in quibus
sit usus cauda-
rum.
Dolor omni su-
mme evitat.

Discutientium
calorem inten-
dendum affe-
ctibus lenius
caudis in peni-
tioribus parti-
bus hæret.

Partiū quæ nō
vacuantur faci-
le, & quæ arri-
ta medicamen-
ta deservit.

Hepatis obstru-
ctio curatur.

Hepatis causa
& gibba, quæ
partes vacuan-
da sunt.

Hepatis venarū
principium.

ad venarū principio. Nam quomodo non tantum se-
ipsum regere natura sit apta, sed largiatur etiam
virtutē venæ: verendū est, ne si eius vigor fomen-
tus & cataplasmas relaxantibus exolutus fuerit,
& ipsum primum ad proprium opus, & omnes
subinde venas, ratione illius, imbecilles reddan-
tur. Quare in curationibus, eius aliqua ex astrin-
gentibus medicamentis temp. misceere oportet. Sed
quorū in profundo admodum loco situm est,
dubitandum erit, ne adstringentis medicaminis
vis debilitetur, nisi ab aliqua altera subtiliū par-
tium substantia, qualis aromatum est, traducatur.
Melius verò fuerit, si & ipsum medicamen astrin-
gens, etiam aromaticum fuerit. Nam si duas ha-
buerit naturas iustas qualitates ac potestates, va-
lentius operabitur, ita vt evacuet quidem quod
præter naturam in ipsum membrū conflatus, ser-
uet autem humorū modum cōvenientē nature.
Explorandū itaq; est, num quid ab humoris con-
fluentis qualitate, temperies eiusdem membrī sit
alterata: vel hanc ipsam curantes intemperiem, sa-
nitate parti restituamus. Curabimus autē, cōtra-
riā ex adverso asserites qualitates: quantum vni-
quodq; calidius aut frigidius redditū est, tantum
refrigerantes, aut calfacientes. Quare & hic rursus
agnoscenda est ipsius secundū naturā temperies.

De morbo secundum numerum. Cap. xcxi.

Quibus autem aliqua particula deficit, in iis
quidem scopus est efficere alteram, subministran-
do naturæ, eo quod duximus modo. Quibus au-
tem redvndat, hanc rescicere oportet aut scalpello,
aut igne, aut caustico medicamine. Hæc igitur
omnia sanare, s' ferme possibile est: ut generari
nō omnia possunt. Quædam verò sunt, quæ et si
generari nequeant, pro ipsis tamen licet alterum
substituere: quemadmodū osse ex toto sublato,
carnosum quēdam callum inducimus, qui proci-
pe tempore duriorē naturam contrahit, quā
ab initio carnis imitaretur substantiam. Vbi verò
parte quancūq; sublata, neq; eandem secundum
speciem substantiam, neq; eandem efficere possu-
mus, tertius nobis scopus est, in venire decorem
quemdam quemadmodum in mutilationibus.

De morbo secundum magnitudinem.

Cap. xcxi.

Communicata autem hoc genus totum cum eo
quod ad magnitudinē pertinet. Nam quodcūq;
ex eo est secundum naturam, illi propinquū
existit: id verò tantum frivolum est, quod inter
minimè naturalia cōnumeratur. In quo quidem
prima intentio est ablatio. Secunda verò, si illa sit
impossibilis, transposio: quemadmodū in sus-
pensionibus. Quicūq; autē non integris partibus,
sed earū tantum partibus, aut deficient, aut ex-
cedunt nature modum, resectio quidem, vel ge-
neratio, in iis quæ deficient: ablatio verò & abo-
linio, in iis quæ superabundant, scopus est. Quare
neq; in ipsis altera inteno, neq; medicaminū
forma est duera.

De morbo secundum situm. Cap. xcxi.

Sed iam veniendum est ad reliquum salu-
brium causarum genus, quod ea corpora emen-
dat, quæ in situ sunt vitia: veluti luxationes, &
in scroto intestinum. Quæ sanè vitia cōtingūt,
partū ex violenta tensione atq; impulsu, partim

Hepatici morbi
causæ aliquæ
ex astringenti-
bus adsumen-
da esse, & quæ
aromatizata non
obstant.

Intemperies esse
per citra co-
randa.

Redvndante
partes rescicere
tripliciter possi-

Mutilū mem-
bra arte cōtra-
hendi esse deo
crem.

Luxationum
causæ & cura-
tio.

ex dilataio continente, vel rupto. Quare modus etiā curationis est duplex: alter quidē ad oppositam partem ei * ad quā facta est permutatio, intendendo, & pellendo: alter verō, id quod continet, firmius solidius reddendo.

De causis præseruatius. Cap. x. cxi.

Porrō eorū quæ præseruatia dicitur, triplex secundū genus discretio existit. Prima quidē, iis morbis qui integra fruitur sanitate. Secunda verō, eius qui non integrē valet. Tertia deniq; eius qui iam ægrotat. Primū igitur genus ad salubrē artē spectat, in duāq; partes diuiditur. Secundū verō ad præseruatricem pertinet. Tertiū ad curatiuā. Hoc autē vniuersum genus præcipuē circa humores versatur, quos neq; lentos oportet esse, neq; crassos, neq; a quosq; neq; plurimos, neq; velerementē calidos aut frigidos, neq; mordaces, neq; putredini obnoxios, neq; vniuersæ naturæ afines. Nam ubi aucti fuerint, generant morbos. Augentur verō nonnunq; eadē ex causa, quæ ab initio eos generauit. Illud autē plerūq; accidit, vt sua alteratione inficiat illos, q; sunt in corpore humores. Scopus verō & horū curationis duplex existit: alteratio scilicet, & euacuatio. Alteratur igit, vel cōcocti a corpore, vel ab aliquibus facultatibus aliis, quæ vim medicamentosā fortiūtur. E' quorū numero existūt ea, quæ aduersant exaltatū ferarū venetus: quæq; etiā pharaca viciatū transmutant. Euacuitur autem satis calidis medicamentis, purgationibus, clystis, sudoribus, & vomitibus. Hæ igitur sunt ipsorum cōmunes euacuationes. Proprie autem, ex locis in quibus coaceruantur, sunt. Aut verō promptius euacuitur per ventrem, quæcumq; continentur in primis venis superfluitates. Quæ autē in iis quæ in hepate sunt, per vrinæ meatus. At quæ in toto corpore, per sudores: sicvti quæ in capite, per palatum, vel nares, vel per vtrūq;. Cæterum quæ in spatis pectoris laxioribus continentur, per guttur simul cum tussis: quæ in renibus sunt, vel vesica, per vrinam. Cōmunis autem in his indicatio est, & reuulsio quidē ab omnibus partibus, ad quāmaximē distantia loca: deriuatio verō, ad vicinā. Quæcumq; itaq; huiusmodi curā dispositiōes, causas salubres vocamus: sicvti insalubres eas, quæ adangeni: & neutras, quæ neq; obsunt, neq; iniunt. Pars igitur artis præseruatia talis est.

De illa artis parte, quæ conualescentes reficit, & senibus congruit. Cap. x. cv.

Quæ autem reficit atq; restaurat, in conualescentibus atq; senibus locū habet. Cæterum quæ nam horum sit dispositio, & à quibus præcipuē causæ ad naturalem habitū reducitur, in metho do medendi explicauimus. Dispositio igitur talis est. Optimus quidē, sed exiguus est sanguis: atq; vna cum ipso spiritus animalis, vitalisq;. Ipse verō solidae partes sciores: atq; ob id, earum vires imbecilliores: proindeq; vniuersum corpus, frigidius. Causæ verō salubres quæ hanc emendant dispositionem, vt vno eas comprehēdam capite, sunt quæcumq; præsentaneum tūmque exhibent alimentum. Particulari autem, in morbis moderatis, & cibis, potibusq;, ac somnis consistunt. Sunt porro materis morbosæ, vehicula, ambulationes, frictiones, & balneæ. Vbi igitur non parum

se ex his profecisse senserint, paulatim se ad consuetū opera redeunt. Cabos autem assumant, in principio quidem, humidos, concoctiq; faciles, neq; frigidos: in processu verō, eos qui plurimū alimētū impediūt. At potus eis opportunus est, vinū, quæ quidē moderate pvescūt, substantia autē purā, pellucidūq;: quod scilicet vel substatum, vel album existat, atq; suauiter olēs: gustū verō neq; aqueum omnino, neq; aliquam qualitatum insignem aut dulcedinē, aut a cruditatem, aut amarorem, aut deniq; astrictionem referens.

GAL. DE PERCAMENI

de medendi methodo, lib. I.



Nec alias causas quæ ad cōdenda medendi methodo me laetentis dehortatæ sunt, charissime Hiero, hæc fuit vna & præcipua, q; frustra me scripturum timent, quum nemo propē dixerim hac nostra fte, veritatis inquisitū sit deditus: sed pecuniam, & ciuilem potentiam, & in explebiles voluptatum delicias, omnes cōvitijs suspiciant, vt si quis sapienter quodvis studium sectetur, pro infano hunc habeant: quippe qui primam ipsam, & verē sapientiam, quæ diuinam humanarūq; rerum est scientia, ne esse qui dem omnino existimet: ac proinde inter eos censetur optimus, non qui plurimis instrumentis musicis, aut etiam sermone vni philosophico nostrit, sed qui multo, & longē maximos calices exccarit. Eōq; sit, vt quum ægrotare iij perperit, medicos ad vocent locupletēque, ubi quidem optimos, sed eos qui adulter ipsi: quicq; & frigidam dabunt, si hanc poposcierit: & laubunt, quum iusserint: & niuem, vinūq; porrigent: ac breuiter, quicquid iubebitur, mancipiorū ritu facient: cōtrā quā veteres illi medici ab Arsculapio oriūdi, qui veluti duces militibus, & reges subditis, imperare semper egros volueūt: nequaquam verō empiriorum Getarum more, paritē & obsecundare: id quod facere Romæ erat solitus impudentissimus Thessalus, eo etiā temeritatis, progressus, vt sex tantum mensium curriculo, traditurum se totam artem medicæ profiteretur, citra vllam aliarū disciplinarum institutionē. Quamobrē ipsius facilitate allekti, sutores, textores, fabrig, steruilibus opificiis relicti, cæterarum hodie sese sub eo preceptore ad professionem sacratissimam conferunt, in perniciem hu mani generis. At verō minime licet alicui curare cōmodē morbos, nisi prius naturā corporis vniuersi perspexerit, apud omnes sapienter professores est in confesso. Totius autem naturæ constitutionem, accuratissimē exposuit nobis Hippocrates. Quæ quidem Peripatetici atq; Stoici sequuti, vtiq; sanē hoc illius dogma recipiūt, nempe, vniuersum corpus cōspirabile & cōfluxile existere, omneq; apimalis particulæ à se inuicem affici: dissi dent tamen in eo quod Aristoteles quidem, qua litares tantum ite se murō transire, atq; omnino misceri: Stoici verō, non hac modō, sed etiā substantias ipsas existimant. Cæterum medicinæ fuerit abunde, si concedantur ea quæ ab vtriusq; sunt demonstrata: necnon quod qualitates virtutēq; in mistis, totæ sunt totis permixtis. Hac autem hu-

Tipici sui morbi Galeni de pleat.

Sapientia est diuina humanarūq; virtū scientia.

Medici vniuersi perperam agere veluti duces militibus.

Thessalus pallecebat delectum si erit medicum curare misum fte.

Curatori morbi necessarii est corpus autem a groupa.

Corpus vniuersum est cōspirabile & cōfluxile.

Misturam qualitates et fuerit virtutes, sunt tota per tota mista.

Præseruatricem causam differt in triplex.

Alteratio humorū à quib; fiat.

Euacuatio morbi multiplex.

Reuulsio fit ad quāmaximē distantia loca. Deriuatio fit ad vicinā.

Conualescenti, non solum de dispositio qualis.

Conualescenti atq; sicut refectio ratio.

mani corporis cōtemplatione posthabita, nullāque vñs demonstratio nē, ille sapiētissimus Thesalus, duos tantum esse morbos simplices tradit in vniuersis, nēpe fluxū & clausum: ex quibus si mul cōiunctis, gignit tertiū vñū cōpositum: nō intelligēs se differētia quādam morborū, nō nūmerū, in mediū adferre. Anqui minimē conuenit, quibz de animalū numero quaeritur, vñā differētia oppositiōē producere: alioqui duo sic vni uerfa animalia erūt: vt, gratia exēpli, rationale & irrationale. Proinde ad species quæ in substantiā, nō quæ in differētia versantur, respicere oportet eum, qui numerū morborū sit traditurus. Porro nō omnis differētia generi addita, ad speciei cōstitutionē cōducit aliquid: sed quæ ex generis, propria diuisione nascitur. Hæc siquidem differētiæ sunt, quæ species cōstituant: reliquæ oēs, alienæ. Etenim, propriæ animalis differētiæ existūt, mortale & immortale, rationale & irrationale, mansuetū & ferū: aliq̄q̄ id genus. Molle verō ac durū, graue & leue, rarū & densum, magnū & parū, animalis differētiæ nō sunt, sed substantiæ. Itaq̄ etiā si cū animali vel molle vel durū cōponas, ad speciem cōstituendam nihil sanē cōtulerint. Sin vel rationale & immortale, vel rationale & mortale, animalī adieceris, efficiūt iam illūc Deus, hic homo. Ita verō & si rationali animalī duas illas differētiās peculiares addideris, quæ sunt, gressile & bipes, sic quoq̄ hominis speciem effeceris. Vnde fieri nō potest, vt vilius rei specificas differētiās inueniat quis, nisi prius substantiam illius aut definierit, aut oratione circūscripserit accurate. Si quis igitur tradere de morborum numero instituit, is nō debet statim in prima differētia subsistere, sed diuisa illa procedere, donec ad aliquā infirmarum specierū, & quæ in aliam distrahī amplius non possit, perueniat: id quod facere illi statim est promptum, qui in diuidēdi arte magno perire fuerit exercitatus. Peccauit etiā vel grauissimē Thesalus, quod nō principium quidem inde demonstrabile, ac per se notum attigerit, illius rei quam pertractanda suscepit. Principium autem intelligi, quæ sit vniuersi quæ rei propriā essentiam: à quā necessariū est ordiendum, quā ad inventionem specierum & differētiarum, tum vel maximē (vt ait Plato) ad diuisionem, atq̄ ad omnem cuiusvis rei absolutam inquisitionem. Sed neceratione, nec experientia, ad fulcienda sua dogmata vñs vnquam est Thesalus: quæ quidem duo instrumenta, iis quæ optime inventa fuerint, apud homines solent semper patrocinari. Ceterum in his cōmentariis animus nobis est agere, nō de experientia quæ ratione nō vitur, sed de iis prædictis, quæ methodo & ratione inveniuntur. Etenim methodo quippiā inquirere, inuenireq̄, ex aduerso opponitur ei, qd est fortitū & temerē. Est siquidem illud, cum via quadam & ordine, quippiam investigare. Experientia autē amethodos, non artem, aut ordinem certum, sed tantum fortune vñus fauorem, ad rei inuentionem desiderat. Quæ quidem prorsus neglecta, nos de demonstrationi insistamus, quæ à principis inde monstrabilibus, & per se notis, intellectuq̄ obiectis, nunquam non proficitur. Nam quod intellectus se vno occurrū nō exhibet, id prorsus

controversum existit, demonstratiōemq̄ desiderat: nec arte vllam à tali principio incespisse conuenit. Quādoquidem igitur morbi curationem inuenire est propositum, haud dubiē necesse est, prius morborum numerū sciri. At quoniam fieri nequit, vt aut differētiās generis vñus morbi, aut species inuenias, ipso quod diuiditur non planē explorato: oportet profectū nunc, etiam quid morbus sit, enarrare, quod sic diuisionem eius ritē adeamus. Id verō fiet cōmodē, nobis d cōmuni notione auspiciatis, sine qua inuenire, pōssit rei substantiam non licet. Vt igitur vbi contra offensam omnīū partiū actiones obeunt, homines valere se dicunt: sic dum naturalium corporis actionū senserint quampiam vel malē geri, vel prorsus non geri, & ægrotare se illa corporis parte existimant, cuius actionem oblesse vident, & medicum de remedio consulunt. Actales sunt vniuersis hominibus notiones & sanitatis, & morbi. Ergo accipito illo, quod omnes cōstitunt, principio, nempe id in medendi methodo propositū esse, vt agra corpora in sanitatē restituamus, hoc est, naturales partiū actiones, si quæ oblesse sint, emendemus: claritatis gratia oculum proponamus, huius nimirum particulæ opus esse vt videt, inter omnes homines conuenit. Nec verō refert, partē tēne, an particulā, quampiam oculum dicat. Siquidē quicquid totū complet, atq̄ integrat, id, corporis totius, quod complet, particula siue pars nominat. Est namq̄ pars ex iis quæ dicuntur ad aliquid. Quippe pars totius integritate pars dicitur: xque profectū vt totum integrūm, per relationem ad partes & particulas suas nominatur. Ceterum à rerum, nō nō minimum differētia, in omni cōmentatione principium sumendum est. Est itaq̄ visio, oculorum actio: quædam odū locutio, lingux: incessus autem, crurū. Ipsa visus actio, motus est actiūs. At motus est prioris habitus immutatio. Qui quidem actiūs dicitur, quum al & editur: passius verō, quum ab alio posito extrinsecus, excitatur. At verō immutatio prioris habitus dupliciter fit: nēpe aut in qualitate, aut in loco. Ceterum quæ circa locum versatur, latius dicitur: alteratio autem, quæ in qualitate consistit. Porro instrumentum appello eam animalis partem, quæ perfectē edere actionem potest. Quæ significatione oculus pars animalis, & particula, & instrumentum vocabitur. Cornea verō tunica, particulā quidem & pars: et instrumentum nō irem. Simili modo & quæ rhagoides, & quæ arachnoides, & quæ amphiblastroides dicuntur: quarum nimirum singulæ, primum quidem ac maximē, oculi particulae sunt: & quia iis etiam faciei pars est, iidem & illæ faciei sunt partes, sed secundaria ratione. At verō similes partem appellant, quæ vndique in particulas similes diuidi potest: vel vt vitreus humor, & crystallinus, & tunicarum propria cuiusq̄ substantia. Est itaq̄ instrumentum visus oculus, actio verō visio: vna ex eius particulis similaribus, ac primum instrumentum visionis, crystallinus humor. Id nōq̄ est, quod alterari debet ab aliquo extrinsecus occurrentiū colorum, vt animal videat. Alterari verō nō potuit, nisi purum omnino, perspicuumq̄ esset. At purum ita,

Thesalus con-
stabitur duo
tantum simplici
ei morbos in
vniuersum.

Differētiæ spe-
cies.
Animalis differe-
ntia propria.

Deum animal
rationale, defuit
Galenus.

Efficientia cuius-
que rei esse
proprium: à
quo ordinē
est ad exallam
omnem inquisi-
tionem.

Instrumenta in
rationibus, dicitur,
talis ex parte
actus.

Methodo in quo
re, quod sit.

Experientia a-
methodos, vni-
us fortune don-
tatur fauorem
disparat.

Natio cōmuna.
Valere ex ægro-
tare quando se
dicat homines.

Pars quid dicitur.
tot.

Visio est oculorum
actio.
actio quæ.

Motus duplex.
Immutatio duplex.
Latus.
Alteratio.
Instrumentum
quod.

Oculus tunica.

Similari parti-
cula quæ dicitur.
tot.

Crystallinus hu-
mor primum in-
strumentum vi-
sionis.

pellucidamque esse non posset, sine eo quod nunc obinet temperamento. Quippe ostēsum est, vnaquam rem talem esse, qualis est propter calidit, frigidit, humidit & siccit temperaturā. Ideoque si qd horum magnopere immutātū sit, aut planē nō videbit, aut malē videbit animal. Vbi igitur nequē videre oculum cernimus, qui tamen probe antea cernebat, subitō nos accingimus ad ipsius le-
sionis causā inuestigandā, quum sine causā nihil in natura rerum cōtingat. Causa inventa, ne-
cessariō fatēdum est, aut morbū ipsum tam esse: aut, si morbus lēxio actionis existat, affectū qui huic officit, morbi causā existere. Dubitauerit tamen aliquis, ipsūne oculi affectū, a quo cernendi actio vitatur, dicere morbum debeamus: an ipsū actionis vitium. Quodcumque tamen ele-
gens, necessum est vt de sanitate enūciet, & quidem multo antea, cōtraria: nēpe eam esse vel in-
collemem oculi actionē: vel affectū, qui visio-
nem aboluat. Sanitas quippe & morbus, maxi-
mē cōtraria quā sint, sub eodem genere cōtinen-
tur. Contraria siquidē sunt, quæ in eodem gene-
re posita, plurimū inter se dissident: vel vti album & nigrum, quorū vnum est genus, color. Ergo si
sanitas actio est, quæ secundum naturā se habet: omnino morbus, actio præter naturam erit. Sin autē affectio quæpiam, aut cōstitutio naturaliter se habet, existerit sanitas: & morbus affectio, cō-
stitutio vē præter naturā, necessariō fuerit. Verūm quum duo rerum genera sint, nūquā inter se si-
milium, sed tota differentium natura: quorum al-
terum quidem, corpus, certo modo cōstitutū, vo-
catur autem verō, functio: farendū proculdubio
est, affectū ipsum corporis causā esse: functio-
nem verō, id quod ab affectu ipso proficiūtur. Comitatur quippe necessariō affectū naturaliter se habentē, naturalis actio. Cōtrā, si a natura recessit, actio statim præter naturā se habebit. At-
que hoc ipsum est veluti elementum primū totius
medēdi methodi, quū nihil aliud sit qd curatur a
medico, quā ipsius affectus corporis. Contingit tamen nō ex nominū, sed rerum rectā opinio-
ne, recta morborū curatio. Vt autem omnia me-
thodo compēdiosa explicemus, quatuor in vni-
uersum res sunt, quæ in præsentī contemplatione
proximē inter se cohærent. Ac videtur sanē ex his
esse vnum genus ipsorum corporū: alterū verō,
actionū ac corporum quidem genus præcedere
actiones, easq; gignere: has verō sequi: idq; si cor-
pora se naturaliter habent, inculpabiles, natura-
lesq; sin præter naturā sint affectū, aut nullas, pri-
us, aut omnino certē impeditas. Tertium præter
hæc genus est causā, quæ hos affectus creit. Nā
quā rationē habet affectus ad actionē, hanc alte-
rum quippiā ad ipsū affectū omnino habeat
oportet: illud dūtaxat evariā, qd affectus vnā cū
actione cōstituit: nec potest vīquā aut, pba actio
esse, sine corporis naturalis affectū: aut vitiōsā, ni
si quī corpus fit vitiō affectū. Ipsius aut affectus,
q actionē impedit, causæ possunt & adesse, & ab-
esse. Ab hoc quartū aliud genus est eorū, q quum
corporib; & naturaliter & præter naturā se habē-
tibus in sint, actioni nec cōmodant, neq; in cōmo-
dant: vt, exempli gratia, color niger, ob diuturnā
in sole moram contractus. Affectū igitur corpo-

ris præter naturam se habētis, qui actionem ali-
quam vitat, morbum (si placet) vocemus. Ipsum
verō functionis vitium, insigne quoddam mor-
bi symptoma. Quæ alia ratione accidunt, ceu co-
lores, ea symptomata etiā, sed familiaria, apprāq;
posuit quispiam vocare. At quærum ab his genus
sit insalubriū siue morbi ficarū causam. Qua-
rum eas quidē, quæ in ipso corpore animalis con-
sistūt, internas siue antecedētes: quæ verō extrin-
secus accidunt, externas aut procaratūcas appel-
labimus. Vt autem hæc exemplo clarescant, phle-
gmonem esse pedis morbum cōstitutum: ipsum
autem ingressum, esse insigne ipsius morbi sym-
ptoma. At rubor, tensio, renixus, & tumor præter
naturā, diuersā quædam symptomata nomenen-
tur. Porro sanguinis redvndantia, phlegmonis
causā interna dicatur. Sicviti externa, quæ præce-
dit abvndantia ciborum. Cæterū nullus affectus
dici morbus metetur, nisi aliquis præ actionē
vitiat. Quod aut postulat curatio nō, aliud planē
nō est, quā affectus qui vitiat actionē. Etenim
qd primū, maximeq; omnium desideramus. Porro qd cō-
stitutionē ipsam vnde actio nascitur, necessariō
sequuntur, sanis quidē nobis, accidentia: ægro-
tantibus, symptomata nuncupantur. Atq; hæc: qua-
tuor genera sunt omnium, quæ in nostro corpo-
re habentur, siue secundā naturā nos, siue præter
naturam habeamus: actiones, cōstitutiones, quæ
las præcedunt, quæq; etiā sequuntur.

GALENI PERGAMENI de medendi methodo, lib. II.

ERgo affectus qui actionem vitat, morbus
vocalur. Hunc si quis sequatur, symptoma.
Quod illū excitat, causa. His ita distinctis,
inpicenda diligenter est nominū diuersitas, quæ
ægritudinibus imponitur ipsorum primi aucto-
res. Partim namq; a læsa particula fuerunt indita,
vt pleuritis, id est, punctio lateris. Peripneumo-
nia, id est, pulmonū phlegmone. Ischias, id est, co-
xendicium morbus. Podagra, id est, pedum vitium.
Nephritis, id est, renum affectus. Arthritis, id est,
articularum vitium. Ophthalmia, id est, oculorū
phlegmone. Cephalgia, id est, capitis dolor.
Dysenteria, id est, intestinorū tormina. Subde
ab ipso symptomate, vt Ileus, hoc est, voluulus.
Tinctus, id est, desicidit a siccitā cupiditas. Spas-
mos, id est, convulsio. Palpos, id est, palpitatio.
Tremor, id est, tremor. Paralysis, id est, resolutio
neruorum. Apepsia, id est, cruditas. Dyspnœa, id
est, difficilis respiratio, vel inordinata spiratio.
Apnœa, id est, spiridit defectus. Agrypnia, id est,
vigilia. Paraphrosyne, id est, delirium. Coma, id est,
sopor. Scæpe ab ambobus simul. vt, Cephalgia,
hoc est, capitis dolor. Oralgia, hoc est, dolor au-
rium. Cardialgia, id est, oris vetriculū (qd veteres
appellabāt cor) dolor. Odonalgia, id est, dentū
dolor. Hystralgia, id est, vteri dolor. Sprenume-
ro a causa putata, vt Melancholia. Nōnunq; a simi-
litudine ad aliqd extra positi, vt Elephas, Cæcer,
Polypus, Straphyle, id est, vna. Leuce, id est vitula-
go alba.

Morbū qd aff-
ctus præter na-
turam functio-
nem vitat, aut
symptoma a dop-
plex.

Causæ morbosi-
ca.
Cōstitutio dīf-
ferentia.

Nihil sine cau-
sa contingit.

Sanitatem &
morbū sub eo-
dem genere co-
tineri.
Contraria quæ
dicuntur.

Affectus corpo-
ris vitiat fun-
ctionem causā.

Accidentia &
symptomata
quomodo dīf-
ferant.
Rerum quæ in
nostro corpore
habentur qua-
tuor.

Morbū.
Symptoma.
Causā.

Morborum no-
mina indita a
læsa particula.

Morborum no-
mina sumpta
ab ipso symp-
tomate.

Morborum no-
mina trasta a
partē affectū,
a symptoma.
Morborum no-
mina sumpta a
causā putata,
vt ab aliquo
simili.

go alba. Myrmecia, id est, formica. Atheroma, id est, tuber, cui pulcritudine quid simile inest. Stenoma, quod aliquid seu simile continet. Staphylo ma, id est, oculi morbus, cum in fumina tunica quiddam acino simile eminet. Melicerus, hoc est, capitis vlcera, sanie inftar mellis fundentia. Anthrax, id est, carbo. Alopecia, id est, arex in capite. Ophiastis, id est, vinum serpentis formam repræsentans. Sycolitis, id est, ficus. Saryriasmus & priapismi, pudendi erectiones præter naturam. Ipsorum verò morborum, qui nec locum affectum nomine repræsentant, nec causam quæ eos efficit, per pauca sunt nomina, phlegmone, gangræna, scirrhus, erysipelas, apostema, oedema, empyema, vlcus, exarthema, caragma, spasma, rhegma. Coloboma, id est, mutilatio. Dorthia, id est, furunculus. Ionthos, id est, varus. Phyma, laxarum partium phlegmone. Quoniam hominum quoque nonnulla, partium locum corporis, siue particulam affectam, subindicare videntur, partim à prægrauata symptomate nominari. Porro vlcera (quod vnitatis solutio est in carno sa parte) differentie particulares partim ab iis qui primùm eas sanauerunt, dicuntur: partim ab ipsis qui iisdem affecti sunt, vt telephium. Cancer autem, à similitudine ad animaliam. Phagedæna herpès, à symptomate. Verùm phagedæna quidem, vlcus depascens est. Herpes autem nō semper existit vlcus. At quotiescumque cum exveneratione invadit, ritu serpentis bestie, ad vicinas partes progreditur, easque depascit & populatur. Causam verò vlcus, & sordidum, & cruentum, & purum, & æquale, & carne excrefcens, hæc magis proprias appellationes sortiuntur, non tamen similiter omnes. Nam æquabile, cauum, & supercrefcens, à propria differentia: at cruentum & purum, & sordidum, non à propriis differentis, sed ab externis symptomatis appellatur. Tres igitur esse in corpore affectus præter naturam, ostensum iam est: causas videlicet, morbos atque symptomata. Causas, veluti redvndantiam & corruptelam. Morbos, vt phlegmonē, vlcus. Symptomata, vt prauum colorem atque gracilitatem. Diuersa ab his sunt quæ immodicè excerpuntur à corpore, aut retinentur præter naturā, & functionū vitia: omnia scilicet cōmuni nomine appellata symptomata, ceterū non vni generi subdita. Quippe affectus quidam corporis est vitiosus color. Quod excernitur autem, aut retinetur, affectus non est, sed affectum sequitur. Similiter actio vel læsa, vel integra, affectus sanē nō est: particulæ autem vnde editur, necessariō cōmitatur affectum. Ac oedema quidem & phlegmone, ex iis sunt, quæ absolute dicuntur esse. Eodem modo & redvndantia, si ea sit sanguinis & corporis pallor. Actio verò ex eorum numero nō est, quæ esse absolute dicuntur, aut certe nō similiter sicut iam comprehensa. Si quidem nullo temporis spaciō eius partes manent, sicut nec sermonis, nec villius moris: sed horū quilibet in generatione consistit. Cū verò duplex sit ipsius motionis genus, vnum in loco, aliud in qualitate: prius lano, secundum alteratio dicitur. Ac omnis quidem actio, motus est actiuus: omnis alteratio, eius quod alteratur, motus est pas-

sius: patitur nō quod alteratur. Ergo affectus dum alterantur, mouetur: vbi verò à motu cessauerint, iam alterati sunt, nō autem amplius alterantur. Quiquid enim quocūque modo se habet, aliquo omnino affectu est præditū. Quod autem in constanti, ægrèq; solubili affectu est, id habitu iam quodam affectum est. Sanē alteratus est qui nigrescit: alteratus est, qui obnigrit. Itaq; alteratio, generatio est qualitas. Nam quæ absolute dicitur generatio, ad substantiā via quardam est & progressus. Aliqua igitur in generatione, alteratione, & vt semel dicā, motu, suam essentiam obtinent: aliqua permanentē habent substantiam. At sanitas quidem & morbus, & quæcumque symptomatum causarūq; affectus vel habitus sunt, ex permanentium numero existunt. Actiōnes autē omnes alterationēq;, circa rem quamlibet, in generatione propriam essentia sortiuntur. Porro corpus ipsum, secundum quodcumque mouetur, secundum idem patitur: morūq; eius patios, siue passio, est. Etenim prisci, motus omnes, enā si naturales existant, nisi actiui sint, pathe, hoc est, passiones nominant: sicut actiuos motus, actiōnes. Nos autē contrarium sanitas affectum, à quo lædi functionem diximus, tantū morbum vocamus, siue diutius hic sit, siue brevis, siue momento duret. Ex reliquis affectibus præter naturā, eos qui hunc præcedunt, causas rationē obrinet, causas tantū dicimus, non pathe. Qui illum sequitur, si actiōis offensio sint, & symptomata, & pathe. Eodem modo, & immodicas vel inanitiones vel retentiones. Qui verò affectus sunt, veluti vitiosus color, supra affectionis & symptomatis appellatioem, etiam affectus, vel affectiones vocamus: ita nimirū vt sunt. Omnis igitur horum cōmune id est, quod præter naturā sunt. Propriū autē morbi quidem est, quod actiōis incommode: symptomatis, quod morbum sequatur: causa deniq; quod præcedat. At verò medicorū propriū est munus, vt morbos adimant: quibus sanē sublati, non modō actiōis vitium evanescit statim, sed reliqua enī omnia symptomata. Quisquis igitur ex iis quæ particulis naturaliter insunt, tum eas quæ aliter accidunt, tum proprias functionis causas distinguere nescit, qui obsecro fieri potest, vt dispositionem inueniat, à qua primū læditur functio? Etenim quæ fortuito corporibus accidunt, etiā si millies sint alterata, nocere actiōis non possunt, quādiu à quibus sebat, omnia naturā saluē seruauerint. Horū verò si vel vnum quodvis aliteratū fuerit, actiōis quoque ipsam statim in tantum lædi est necesse, in quantum ab eo est, cum secundum naturam se habet recte, aduosa. Fieri autem nō potest, vt omnium morborū numerum methodo se comprehendat, qui numerum omniū actiōis causarum, corpore secundum naturam se habente, nōdū norit. Qui autem omnem morborum numerum methodo non inuenit, hic maxime labatur oportet in ipsis medendis auspicis: tum cōter tot esse medendis rationes, quot morborum idē existunt. Verumtamen verò primos omnium ille affectus investigandos est, qui dicitur functionis effectrix causa. Hunc sanē præteritū nos dicimus esse calidi, frigidi, humidis &

Habitu quid affectum dicatur. Alteratio quid generatio est ad substantiam progressum.

Pathe.

Causa symptomata.

Medici munus.

si in ratione & iustitia est, non est in iustitia.

Medici ut esse rationes, quod morborum idē existunt. Functiois causa.

*Phthones eda
a corporibus si-
milibus.*

*Crysalinus hu-
mor est instru-
mentum visus.*

*Hypochyma, a-
ctus totius cor-
poris instrumenti, est
morbus.*

*Similes par-
ticulari soluti-
o tempera-
turæ etiam, ab
affluu humo-
rum affluu: tot-
idem enim, di-
stus affluu.
Morbus genus
duplex.
Morbus instru-
mentalis quæ
duplex.
Solutio citius
et communis
morbus simi-
lari instrumenti
aut parti-
culari.*

*Experientia se-
pe quæ dolent
discumbere.*

fici, ex intemperie quorum, primus morbus in particulis similibus nascitur. Cum autem à similibus ipsis, corporis functiones edantur, merito instrumentis singulis vnica ratio e...ribus similibus particula, à qua ipsæ ipsa actio possit. Reliquæ verò quæ cum hac quodvis instrumentum absoluit, in aliquem vsum illius quæ prima existit actionis causa, sunt constitutæ: quæ ipsæ retinēt suas peculiare actiones. Etenim instrumentum visus, est crystallinus humor. Reliquæ verò partes, eius grana sunt factæ. Singulæ tamen earum aliquam eorum actionem obtinent: ac vena quidē & arteria, & neruus, toti animanti cōmunē: membranae autem oculi omnes, cum sint nutrimentum participes, prædix omnino sunt naturalibus facultatibus, ac proinde etiam functionibus quæ ab ipsis proficiuntur. Quoties igitur crystallinus humor intemperie laborat, omnino læditur oculorum functio. Non est tamen affectus is, eorum, ut organa sunt, morbus. At hypochyma, hoc est, fusulus, nullius similitudinem morbus existit, sed oculi totius, seu instrumenti. Ad eundem modum si in sinibus venarum, quæ sunt in cavo iecinoris, obstructio aliqua oritur, digestio quidē in corpus per has morabit: ægritudo tamen totius hepatis, seu instrumenti censetur, nulla similitudinem eius partium adhuc ægrotante. At si intemperies venas illius infestauerit, ipsarum quodam illarum morbus primus erit, ex accidenti verò etiam iecinoria. Solent autem similes particulari, octo intemperaturis secundum nudas qualitates cruciari: nempe quatuor quidem simplicibus, quatuor autē cōpositis. Quod si ad intemperiem accedat & humorum affluxus, totidem rursus intemperies orient. Duplex itaque erit morborum genus: alterum in partibus similibus, alterum in organicis. Quod igitur ad particulari similes pertinet, circa intemperantias versat. Quod verò ad organa, vnum quidem in figura, aliud in particulari numero, tertium in magnitudine, quartum denique in positura spectatur. Vitarum verò partium, id est, similitudinis & instrumentalium, cōmunis affectus est, vitæ divortium. Quare sex in vniuersum morborum genera existunt. Vnum, quod similitudinem est proprium, nempe intemperies. Quatuor, instrumentorum cuiusque. Et cum his sextum, quod vitæ partibus est cōmune, ipsius vitæ solutio. Porro omnis medendi methodus, seu ratio ab experientia procedit. At medicorum plerique non tantum experientie applicites animi (per quæ tamen licet eis e videri in probos medicos) sed perfectionis etiā rationis cupidi, cum autem iis quæ circa demonstrationem sunt enunciata, credant, aut vinosis salutarum demonstrationibus, non solum nihil excogitant boni, sed etiam quæ per experientiam cognita sunt, corripunt. Proinde talibus experientie ut incumbant consulo: cum nō sic in se peccatulum iis, qui supra vires aliquid moliantur, ut & id non consequantur, & quæ intelligere alii possent, omnino omittant. Itaque cōmittendum est, ut vtræque simul miscantur, & quæ per experientiam inuenta sunt, & quæ sola ratione inuestigata: sed cum vtrunque seorsum sit tractandum, post ambo coniungantur. Etenim tota Empiri-

corum ars, observatio quedam est & memoria eorum, quæ visa sunt inter se habere consecutionem aliquam. At ex ipsa rei natura ordiri, atque ab ea, quod sequens sit, invenire citra experientiam, id est indicationem invenire. Voco autem indicationem, ipsam veluti consecutionis imaginem. Omnis itaque medendi methodus docet ad operum finem pervenire, per indicationes progreditur. Quod quidem quicquid ab experientia est seicunctum, id totum indicatio vocatur. At finis propolire tractationis est, invenire cuiusque morbi remedia. Nunc autem inventionis principium, est ipsius morbi cognitio. Ergo primū, quænam generalis, cōmunisque morborum omnium indicatio sit, investigandum est. Ab hac deinde ad alias speciem iter descendendum, donec finem eum consequamur. Porro quemadmodum hominibus vniuersis inest quippiam cōmune, cuius vniuersi ratione omnes dicunt esse homines, ita & visu venit in morbis. Ut enim Socrates arguit Plato, specie quidem sunt vnus homo, numero autē varii: sic, mea quidē sententia, morbus qui vtrunque eorum inest (sit febris, exempli gratia) genere & specie erit vnus, est duo numero existunt. Id quod Plato significare videtur, dicens: Multa vnum esse, & vnum multa. Recte igitur ab antiquis philosophis dictum est, aliud numero, aliud specie, aliud genere esse, quod tum idem, tum vnum est. Cum igitur omnis affectus præter naturam, functionē lædens, sit morbus: necessum haud dubie est, omnes id genus dispositiones, quatenus tales sunt, vel genere vel specie vnum morbum existerent. Quamobrem, vnum genere, specie ac numero dicti & esse qui nō intelligunt, & nō (quo nullum est animal stupidius) mihi stolidiores videntur: nam hic, aliud esse vnum quidē specie, numero autē aliud, cognoscit. Quæcumque verò de morbo dicimus, eadem & de opima valitudine, & de aliis etiā dispositionibus, intelligenda veniunt. Nam quemadmodum huiusmodi nomen est vnum in vniuersis hominibus, morbi in omnibus morbis: facti sanitaris denominatio, vna eademque est, in omnibus illorum constitutionibus, quæ prospera sanitate fruuntur.

GALENI PERGAMENTI de medendi methodo, lib. II.

S igitur indicatio quæ ab ipsa rei natura primum oritur, quid agendum sit invenit, necesse est remedium invenientium initium, ex morborum ipsorum natura sumi. Ceterum indicatio ipsa, quæ à morbis sumitur, principium tantum est, vnde medendi ratio promouet, non autem ipsius artis medicatricis pars: aut certe nec magna, nec propria, sed quæ etiam plebi est cōmunis. Quamobrem cum solū esse medicū existimamus, non qui vult, quidnam morbi prima indicatio dicitur, sed qui illa perficere potest, quæ à tali præscribitur indicatione. Is igitur, si per experientiam ea invenit, observator & Empiricus, est vocandus: si ratione quadam & methodo, logicus, & methodicus, & dogmaticus. Empiricus quippe per experientiam invenit omnia cōtendunt. Nos partim experientia, partim ratione: cum nec illa invenire omnia queat, nec

*Empiricorum
est quid sit.*

Indicatio quid

*Multa vnum est
si vnum est.*

*Idem & vnum
quæ modo di-
catur.*

Morbus quid.

*Alius nullus est
si stupidius ani-
mal.*

*Alius vni spe-
cie, ab aliis
numero est. De
nomine, de ratione,
Morbi, natura
est vnum in
vniuersis morbis.*

*Medicus quid
nec solus est
hominum.*

Empiricus.

Logicus.

Methodicus.

Dogmaticus.

Partim experientia, partim ratione.

nec

*Dilectum em
perich, logicū,
non esse confu-
dendum, sed for-
sum verūq; tra-
dendum.
Solentem cū-
mū spicere.*

nec sola ratio. Verū cōfūfam mīstamq; tradendā esse doctriā nō censemus: sed seorsum empiri-
cam, & seorsum logicā: quō facili appareat, quā
vtrāq; earum vim habeat. Igitur vnitatis solutio
(quæ in ossē quidē fractūra, in carnosa autē par-
te vlcus dicitur) vnitatiōē postulat: quemadmo-
dum & vulnus, & ruptio, & convulsio. E quibus
vulnus quidē, solutio quædā ex vulnerando in
carnosa parte relicta est: ruptio autē atq; convul-
sio, citra vulneratiōē accidit: ac prior quidem,
carnose partis diuisio existit: secunda autem, ner-
uofe. Hæc itaq; omnibus vniōis molientiā indica-
tur: quæ an præstari vbiq; possit, an in multis nō
possit, hoc vtriq; internoscere, primū iam artificis
est. Si quidem hocipsum primū artis est opus, vt
intelligas, sperarene id quō tendi debeas, an fecus.
Eius rei duplex cognitio est, hæc potest addi
tertia. Altera per experientiam, cui longo vſu est
opus: altera per ipsius rei naturam. Hæc siquidē,
tum cuiusque substantiam particulam, tum actiō-
nem, tum vſum, sitimq; æstimabit. A quibus pro-
cedens, non solum quod sanari non potest, præ-
videbit, sed etiam quod recipere sanitatem po-
test, de inveniēdiā ei remediū deliberabit. Con-
stat autē quod si simplicissimis auspicabitur. Por-
rō nihil est simplicius vlcere, quod in summa car-
nosa parte consistit. Huius ergo, si quidem vlcus
tantum sit, vniū curationis scopus, vniōis est.

*Vlcus cani co-
rationis duplex
scopus.*

Sin autem cum cavitatē adit, erit duplex affe-
ctus: nempe vlcus, quod est vnitatis solutio: &
cavitas, quæ ex amissa aliqua animalis propria
substantia cōtracta est. Ac, pinde duplex enī pro-
ponitur eius curatio: nempe vt indu-
catur cicatrix, & impleatur cavitatē. Horum ta-
men alterum sepe fieri non potest: vitupra, cum
non modō carnem, sed etiam illi subiectum os,
perire cōtingit. Quippe impleri ad vnguem hu-
iustmodi minimē potest: cicatricē induci, facili
potest. Invenio enim autem, vt aliarum rerum, sic
remediōrū omnium duo nobis sunt instrumenta:
ta: videlicet experientia & ratio. Cæterum qui so-
la experientia vtiuntur, cum videant, cui anstolo-
chia vlcus carne nō impleuit, huic thus conse-
re: cui autem thus nō contulit, ei irim ad mortem
esse vniem: iudicant nō omnes ab omnibus me-
dicamentis similiter affici, ac proinde quampluri-
ma eiusdem speciei medicamenta sarconica in
vniō confundunt, quō nulli corporis nature des-
sit, qd sit ex vſu. Atq; hi quidem quā turpissimē
hallucinantur. Primū quidem, nam solus com-
positionis quæ ex similibus specie medicamen-
tis constat, non eius quæ ex contrariis initur,
instituitur methodo. Dein autem, quia in eius
miscellæ multitudine, vniū fortasse medicamen-
tum laboranti prodesse potest: fortasse neque
vnum quidem: contra vt septem aut octo ob-
esse: ita vt plumbus numeris eiusmodi medica-
mentis oblit, quā proſit. Ac proinde, quod qui-
dem ad hanc rem pertinet, n̄ plura mihi ignora-
re, quā nōuisse videntur. Etenim oleum cauo

*Infructus in-
venio autem reme-
diū esse duo,
experientia &
que rationem.*

*Empirici citra
dilectū in vniū
medicamentā cō-
traria mīſcere.*

50
vleri infusum, adversissimum omnium medica-
mentū est, ipsumq; & sordidum, & fetidum red-
dit. Quod si tempus quorū anni calidius sit, ac vi-
tio mali succi homo laboret, aut sit naturā obno-
xius fluxionibus, aut in viciis ratione delin-

*Oleum cauo
vleri ad vſum
vniū medicamen-
tum est.*

quat, timendum est ne pars illi exputrescat
ex vſu olei, quæ fuerit emulcerata. Periculosus est
etiam, & ceræ siue solius, siue in oleo solute, v-
ſus. Hæc itaq; putrefcere vlcus faciunt. At si æru-
ginem, ad leuiorem tusam, inspergas, ea quidem
nullo modo putrefaciet, dolorem tamen & moe-
sum nō parum inferet: præterea exedet, ac phle-
gmonem excitabit. Quod si largius vtare, etiam
convulsionem accerſet. Quoniam igitur neq; o-
leum, neq; ærugo, neq; cerā, cauum vlcus perse-
implere carne potest: cōstat quod ex iis qui expe-
rientiā profitentur, nemo vſquā mīſcebit illa: id
quod faciet rationalis intrepide, videlicet haud
ignarus, ex duobus temperamentis immo dicis,
cōtrariisq;, confici vnum modicū posse. Non est
ergo difficile, ex oleo, cerā, & æruginē, medica-
mentū sarconicū, & moderatē siccum conficere:
quale vlcari cauo est apissimum, cui qd medio-
criter exicari postulet. Omnis igitur quæ præter
naturā est cavitatē, repleri postulat: quare & quæ
in carnosa accidit parte. Ipsa verō repleto, inveni-
endorū remediōrū finis, quō tenditur, est. Cæ-
terum vt illa quæ implent iuvenias, & multa ra-
tione est opus, & multiplici particularim in dica-
tione, & methodo rationali exacta. Quæ quidē
deſtitutum vulgus medicorū cum sit, etiam oculo-
rum doloribus illa medicamentā adhibet, quæ
ex opio, mandragora, & hyoseyamo parantur,
maximam planē oculorū perniciem: vitpote quæ
nulla realia sublati ad præſens speciem doloris
præſtant, quā quod ipsum sensum extinguant.
Nos verō, dolores oculorū grauissimos, aut bal-
neo, aut vini portione, aut fomentis, aut mīſtio-
ne sanguinis, aut deniq; purgatione sanauimus.
Vt igitur ad caui vlcis curationē revertar, in eo
sanē proponitur nobis, vt quæ perlit caro resti-
tuatur. Scire autem oportet, generandæ carnis
materiam, sanguinem bonum existerē opificem
verō atq; autorem, naturam illius, videlicet co-
poris, cui caro superinduci debet. Porro natura
cuiusque corporis, calidi, frigidi, humidī & siccī
temperatura cōstat. Quare perspicuū est, iustum
horum temperamentum in subiectis particulis,
quibus deficiente carnem sumus reſtituturi, opi-
ficis habere rationem. Ac primū quidem in om-
ni cauo vlcere hæc duo consideranda veniunt
iustitæ sit temperie id quod subiectum est: nem-
pe an secundum naturam se habeat (similium
quippe corporum sanitas, iusta est quantum qua-
litas temperies) & an sanguis qui insuit, bo-
nus ac mediocris existat. Nam si horum alteru-
trum sit vniōsum, multi affectus præter naturam
constituerint. Verum si & sana sit pars, & sangui-
nis cōfluxus citra omne vitium: nihil obest quo-
minus prima carnis generatio cōtingat proſpe-
re, idq; nullius externi medicamenti ope. Cæte-
rum quia in ipsa primæ carnis generatione du-
plex excrementū oritur, alterū quidem tenuius
(quod in vlcere sanies dicitur) alterū verō cras-
sius, quod d nuncupatur sordēs: atq; ex tenui quide-
m, vlcus humidum redditur, ex crasso au-
tem sordidum: duplicibus sanē medicamentis est
opus: vtique vt humidum vlcus est, siccatibus
vt sordidum, quæ ipsum expurgent. Ergo cum
nullo vnquam tempore natura ceſſet, certē nec

*Cera vniū cauo
vleri ex qd
periculosū
ærruginū vſu.*

*Temperamen-
tum vniū modi-
cum conficit ex
mandragorā atq;
citrarū possē.
Sarconicū me-
dicamentū vlc-
eris apertis
cicari ex oleo, ce-
rā & æruginē.*

*Oculi pernici-
sissima est, quā
medicamēta ex
opio, mīſce ag-
ra. & hyosey-
amo cōſtant.*

*Oculorum dolo-
res quāvis ma-
dando ratione
Galienū sanari.*

*Carnis genera-
tā materiam est
primū sanguis:
opificis ipsa na-
tura.*

*Natura cuiusque
corporis qualitas
temperie cōstat.*

*Sanitas simila-
rum paritū est
quoniam quali-
tatem ipsa tem-
peries.*

Vlcus in homi-
dum natura
mum siccan-
dam esse, ut
cuius autem
venaturus.

Vlcus tunc ca-
uum tunc po-
stulat, quid
solum.

Cicatricis in do-
lorum natura
mum siccan-
dam esse, ut
cuius autem
venaturus.

Cicatricis in do-
lorum natura
mum siccan-
dam esse, ut
cuius autem
venaturus.

Cicatricis in do-
lorum natura
mum siccan-
dam esse, ut
cuius autem
venaturus.

Cicatricis in do-
lorum natura
mum siccan-
dam esse, ut
cuius autem
venaturus.

Excessus
eum in vlcis
a vlcis
siccan-
dam esse, ut
cuius autem
venaturus.

Cicatricis in do-
lorum natura
mum siccan-
dam esse, ut
cuius autem
venaturus.

gant, desiderat. Iam verò vlcis mediocriter ca-
uo, statim quicquid volumus applicamus, siue
siccam id, siue humidum medicamen exiit. At
in vlcibus quorum maior profunditas est, id
nō licet. Etenim & cerussa & lithargyros cicutis,
astringentes modicē: ad vlcis tamen fundum
vis eorum nō pervenit, nisi humori cuiuspiam mi-
scescantur. Porro quemadmodū cauum vlcus vt
repleatur, carnis generationē (cuius materia san-
guis est) postulat: sic plenū, vt perducatur ad ci-
catricem, generationem cutis, quæ ex carne est,
nō vnionem tantum, desiderat. Verū caro eadē
specie cum ea quæ perit, glori in cauo vlce
re potest. Caris talis omnino, quālis erat quæ pe-
rit, prorsus resitui non potest: sed simile quē-
dam cuti, & quod eius officium suppleat, potest.
Etenim cum cutis carne ipsa tum scior, tum
densior sit, certē si resiccamus & astrinamus
carnem, persimilem illam cuti reddemus. Cete-
rū multo scior quod cicatricē inducat, quā
quod agglutinet, esse oportet medicamentum.
Quandoquidem glutinaturū, solum id propo-
situm est, vt eius quod secidū naturam est, sed
vindictam consumat: qui autē cicatricem indu-
cet, nō hoc modō, verumquā vt ei quod secidū
naturæ se habet, aliquē dēradat. Galla igitur
immaturæ hoc loco, & malicorium, & Aegypti-
acæ spinæ fructus, modicē sciantur pharmaca
sunt. Chalcitis, & as vltimū, & as squama, & mi-
sy, multo his valentiora existunt: misy quidē
& chalcitis, præcipue minor autē xris squama: atq;
etia hoc matius as vltimū, præsertim si abluti fue-
rit. Sed hoc quidē ad speculatiōē dē cōponen-
dis medicamentis pertinet, quæ medendi sequi
methodum quemadmodū ipsam præcedit, sim-
plicium pharmacōrum notitia. Deinceps autē aga-
mus de excrecentia carnis in vlce, quæ mor-
bus in magnitudine existens, primō omniū sui
ablationē indicat. At hæc, sola vehementer siccan-
tium medicamentōrum ope perficitur, haud im-
naturæ opera: contra q̄ in carne resituenda, aut
glutinatione res labuit: hæc enim ipsius nature
sunt opera, nec aliud medicamēta moliuntur,
quā submovere illa, quæ actiōnis eius obstant.
Porro medicamenta carnē minuētia, proxima
tum his sunt quæ valenter detergūt, tum iis quæ
cicatricē inducunt. Ceterū misy & chalcitis, si
humidæ nature applicentur, potius carnē exedēt,
quā cicatricē inducant: nisi forte in polinem
admodū tenuem redactis, parcissimē illis quis-
piam utatur. Nam sic imposita, partibus cicatri-
cem cōsiliant. Quod si minuire quæ supercre-
re studemus, liberalius vlcis imponēda. Argento
autē, magis adhuc q̄ hæc, minuire carnē potest,
ita vt genus eorū quæ cicatricē inducunt, prorsus
egressa videat. Iam verū si exvras hæc omnia,
vt minus acris, sic etiā ad cicatricē indocendam
ipso reddes aptiora. Si verū etiā laues, adhuc eva-
det mitiora. Hoc autē semper curantis animo
hæreat, nō omnē naturam eadē remedia requi-
tere: sed infirmiores, molliorēq; mitiora: vali-
diores sciorēq; valentiora. Quare natura xgrī
in primis venit consideranda. Cū autē cuiusq;
nature proprietas ineffabilis sit, nec exactissima
sententia cōprehensibilis, ac præterea cuiusq; ho-

minis propria curatio habeat, is erit optimus cu-
iusq; particularia xgritudinis medicus, qui iam
eam methodum cōparavit, ex qua & diagnosticē
naturas posuit, & cōstitutura cōsequi, quæ sint cu-
iusq; propria remedia. Verū legitimā vlcis aratū
partia temperamento, quōties eas vel carne im-
plere, vel glutinare, vel cicatricē inducere stude-
re, maior sibi sollicitudo est. Nam si ipsa ex vlcis
caro calidior sit, aut frigidior æquo, utiq; mede-
lym exigit, quæ nō modō moderatē siccet, sed
etiam in tantū calfaciat, refrigeret, in quantum
subiecta caro a naturali suo recessit habitu: cū
fieri nō possit, vt in vlce vel carnis productio,
vel ipsa impletio, vel agglutatio, vel cicatri-
cis inductio, nec vnquā cedat, nisi subiecta ca-
ro pro naturali modo se habeat. Vrgitur si phle-
gmone vā cum vlce virget, priusq; hæc ef-
fectu discussa, nemo id vel carne implete, vel glutin-
are, vel inducere cicatricē teatret: ad eundē
(arbitror) modū, etiā si sine phlegmone sola
intempes subit, nullū horū fore prius sperabi-
mus, q̄ illa fuerit sanata. Cauenda tamen sunt
interim immodicē cū calfacientia, nam etiā refri-
gerantia. Ergo hyoscyamū, mandragorā, & cicy-
ram, seu supra modū refrigerantes herbas vita-
bis: tamēti siccet ex quoq; quantum sit vlcis ex-
vra. Resina verō & pix, & asphaltus, quāq;
modicē siccant, immodicē tamen sunt calida: ideoq;
eis solū vltimū nemo, nec alter, nisi admissis cū
leuiter refrigerantibus, vnū ex omnibus medica-
men fecerit, qd sit temperatū. Inspeciunda quoq;
est & ætas nos circūstantis temperies. Si quid
vel vltimū medicamentū quoddam in etiā corporib;
nostris foris incedens, vbi immodicus ca-
lore, vel frigore est, sanationē morat. Danda igitur
opera est, vt medicamēta eius excessus occu-
rant. Ideoq; Hippocrates in calidiorib; anni tem-
poribus, iis quibus frigidior facultas sit, medica-
mētis vitur, calidioribus per frigidiora. Iam verō
quemadmodū humidior natura, humidiora,
scior sciora medicamenta exigebat: ita nūc,
calidior calidiora, frigidior frigidiora requirit
contra q̄ scilicet semper us, quæ præter naturā,
& quæ secundū naturā sunt, indicatōē præstan-
tibus. Quippe quæ secundū naturā sunt, similis
sibi indicatua sunt: quæ præter naturā, cōtrario-
rum: si modō illa seruati, hæc submoueri est ne-
cessē. Quod verō ad cōtrarias indicatōes per-
tinet, si quantum xgrī temperamētū iusto est lu-
midius, tantū particula iusto sit scior, tale adhi-
bendū est pharmacū, quāle si vlcis in mediū tem-
peramētū particula, corporis mediocriter tem-
peratū cōsisteret, adhiberemus. Sin autē particu-
la fuerit scior iusto, q̄ corporis temperamētū
sit æquo humidius: vnq; in tantū intendi siccita-
tem medicamētū cōvenit, quantum particula tem-
peramētū, tonus temperamētū excedit. Veluti
si ex vlcis aratū, quatuor numeris sit scior
medio temperamētū: xgrī autē natura gradibus
tribus humidior: manifestū est, particulam quæ
nunc ex vlcis aratū, si cū vno gradu desideratū
temperamētū, q̄ quæ sit temperata particu-
la. Simili modō & de aliis excessibus licet tibi
ratiocinari. Porro sciores particulae sunt, quæ
minus carnosæ existunt: cuius generis sunt, quæ

Medicū cuius-
que morbo opti-
mus, quā si de-
cedat.

Vlcis resitui
non potest,
nisi subiecta ca-
ro pro naturali
modo se habet.

Vlcis curatio
non potest
esse extrema
calfacientibus
atq; refrigerantibus.

Adipē tempera-
torum ad vlcis
naturā cōueniē-
tē esse ostendendū.

Naturaliter si
habentia corpo-
ra similia sibi
præter naturā
vires, contra-
na potest.

Sicca partē
quæ sunt.

circa digitos articulosq; habetur: præterea, quæ circa aures, nasum, oculos, & dentes constitunt: atq; ut semel dicam, ubi crebræ cartilagine, & membranulæ, & ligamēta, & ossa, & nervi adfunt: adeo verò & caro, vel omnino nulla est, vel peræquis. Ordo autē curandi viceris sordidi & caui, à sorde expurganda orietur, eum nec glutinari quicq; nec carne impleri possit, priusq; purum fuerit. Secundū locū, riget cauitas sanatio. Tertium, cicatricis obductio. Quod si vni cum illis vel phlegmone, vel erysipelas, vel gangræna, vel interperies aliqua simplex cōpositiue, partem infestet, nisi quis prius eam sanarit, vicus imple-

*Vicis sordidi
ex carne carid
morbida.*

*Carnis genera
tione ex sibi
sua sibi sibi.*

re carne nō poterit. Carnis liquidæ generatio, ex subiecta, quæ sana est, ortū ducit. Ex ea verò quæ premit phlegmonem, quæ ibi imtemperta est & ægrotior, gigni caro noua non potest. Etenim iusta subiectæ carnis temperies, causæ rationē habet: ut quæ cōcreuerit scēu, quod viceratū est, faciat, & cauitatē impleat. Puritas viceris, rationē eius sine quo nō, atq; hanc sordes interpellans, curationem moratur. Habet autē & vicus ad cauitatē, rationē eius sine quo nō: quandoquidē si vicus cicatrice fuerit obductū, nō amplius cauitas impleri carnis poterit. Ergo si phlegmone, & cauitas, & vicus, & sordes, in eadē particula simul adfint, primū phlegmonē, secundo loco sordē, tertio cauitatē, & quarto vicus sanare oportet. Cæterum affectus vnde primū maximēq; imminet periculum homini, hic debet curari, atq;

*Puncto capite
musculo, si con
uulso, oritur
medicabilis,
scindendum effe
bitur trāuersum
musculum.
Sanguis fluit
tem inmodico,
supperat, si per
transuersum to
tum vas praeci
datur, vicus ta
men eius postea
sanari nō possit.
Nervus quidē
transuersum se
candus.
Luxatio cū vel
ere quidē de
beat in sanatio
relaxari.*

etā solus interdū: vel vti si puncto capite musculo, cōuulso, quæ cōgruenti omnino medicamentorum vim respuit, accidit, præcisio per transuersum toto musculo, cōuulsione quidem sanaueris, aliquē tamen ex particulæ montibus vinaueris. Ad eundē modū, cum ex vena, arteriæve sanguis immodicē profuit, si totū vas per transuersum præcideris, vicus quidem eius postea sanare nō poteris: periculū tamen qd ex profusio sanguinis impendebat, sustuleris. Iam nervum punctum sepe cogitant transuerſim præcidere, quoties vel cōuulsiones, vel deliria, vel ambo, magna ægroti sanabilia, superuenire vulnerationi cernimus. Similiter vbi luxatio cum vicere in aliquo maiori articulo incidit, vicus sanamus, luxatio autē in sanatum relinquimus. Nam si hanc quoq; sanare conemur, cōuulsiones haud dubiē sequētur. Primus igitur medendi in hisce est scopus, ille qui vel vti à causis sumitur, eius qd est futurū: alter, qui ex rationē obtinet, eius sine quo nō. Tertius deniq; is de quo nuper diximus, qui ad id quod vrget dirigitur. Porro quod cōsistere seorsum & per se potest, id nullius vñq; alterius discretiā fuerit: sed quod alteri accidit, nec seorsum per se consistit. Quamobrem vicus, nec seorsum, gangræna, & purredo, eum seorsum & per se consistere possunt, affectus quidam præter naturam potius dicenda sunt, q̃ viceris discretiā. At magnitudo, paruitas, æqualitas, inæqualitas, tempus & figura, ex eorū numero sunt quæ aliis accidunt: ac proinde ab iis sumuntur propriæ simplici viceris discretiæ. Indicatio autē curationis à discretiis fit, sed non omnib; Nam nec recē, nec vetus vicus per se indicat aliquid. Siquidē quod vicus tantū est, omniq; alio

*Differtia nodi
si pingu, quod
per se consistere
potest.*

*Vicis simpli
ex discretiis
proprie vnde
sumantur.*

affectu liberū, siue recens, siue antiquum fit, eandē semper curationē desiderat: nihil planē proprium, indicante discrimine eo, quod à tempore sumitur. At si cauitatē altē recondit sub cute habeat, considerare oportet, vtrum ea in superiore parte sit sita, ut sanies ex ea p̃na effluat: an in inferiore, sic ut illic sistatur. Eius igitur cui effluxus pater, eadem quæ aliorū curatio est. Cui non est, huius ipsi moliamur effluxum quendam oportet.

*Effluxum molis
de ratio in un
vicibus qua
apio expurgato
non possunt.*

Eius duplex ratio est: aliās tota cauitate defecta, aliās in fundo ranti aperta. Quando verò harū alterutra sit incunda, docebit tum locum ipsa natura, tum verū iētis magnitudo. Si namq; & loca ipsa periculosam sectionē faciunt, & vicus magnū fuerit, in fundo aperire magis expedit. Sin contrā se habeant, perscrutare præstat. Deligatio verò eius incipiat quidē supernē, sed finiat infrā, vbi scilicet pater effluxus. Iam verò trāuersa vlcera, quod eorū labra magis disteant, à scēu abfint, diligentiū cōiungi possunt: ideoq; tum saturis, tum fibulis, in eis etī vtendum. Quæ verò per longitudinē musculorū sunt facta, hæc si duplici initio deliges, nec saturis egebis, nec fibulis. Sin aliter deligare placebit, vel fibulis, vel saturis vtire. Sufficient autē paucissimæ omnino suturæ. Et magna quidem vlcera, iis quæ valentius siccant medicamentis curabis. Parua verò, vel quæ moderate siccet, abvnde sanauerint. Cæterum profunda vlcera, eadem etī sunt magna, volūntq; tum à duobus initis deligari, tum verò nec labra sua præpropter glutinari. At quæ profunda multū, longūq; sunt, vt duplici ratione sunt magna, sic duplicem quoq; præstant indicationem. Itaq; & quæ valenter siccant possunt, & in immaturæ labra coniungas: & vti à duobus iuris deliges, & vt altis suturis confuas.

*Deligendo vice
tu ratio.
Trāuersa vlcera
diligentiū
quæ recta in
gunda esse.*

GALENI PERGAMENI de medendi methodo, lib. IIII.

Se itaq; vnum morborū genus, diuortium continui vocatū: quod quidem in carnosa parte, vicus: in ossē, fractura: in nervo, cōuulsio appellatur. Eiusdem generis sunt avulsio, ruptio & conuulsio: illa quidem in ligamēto, hæc in vasis musculiq; ex violento ictu, vel graui casu, vel alio quopiam valente motu excitatæ. Exchymosis verò vt plurimū vni cōuulsione & rptione incidit. Fit autem aliquando & ex ortis valorum apertione, quæ anastomosis dicitur, & ex ea quā diapedesin vocant, & ipsam existentem solutæ continuitatis aliam speciem. Iam verò & ex erosione etiam soluitur intertum in animalis partibus cōnuitas. Verū is iam mistus affectus est. Porro erosio, si intrinsecus ab ipso animali proveniat, vitiosi succi est fofoles: si extrinsecus, aut à valentibus medicamentis fit, aut ab igni. In vniuersum autem, simplices affectus à compositis distinguere oportet, cum simplici morbo simplex curatio adhibenda sit, composito verò non simplex. Igitur omne vlcus, aut solum atq; per se, nullo nec cum eo simul invadente, nec ipsum præcedente, aut sequente alio affectu, partem intestat: aut cum alio quopiam vno, pluribusve coniunctum: quorum alij, non modo statim ab initio excitantur vicus, sed neuc

*Vicis sol
Vici.
Fractura.
Conuulsio.
Avulsio.
Ruptio.
Conuulsio.
Exchymosis.
Diapedesis.*

*Anastomosis.
Diapedesis.*

Erosione causa

etiam maius efficiunt: alij, eius sine quo non, ut
ad curandi opus, rationem obtinent. Ceterum
qui vlcus maius efficiunt, submouendi e corpore
sunt, aut pervincendi id, quod inducunt, inco-
modum. Hoc autē, si affectus exiguus sit, fieri li-
cebit facile: si verō magnus, duci ad cicatricē vlcus
nō poterit, priusquā illi affectus subventum
fuerit. Ergo omne vlcus subiecti sibi carnē prædi-
tā naturā dispositione, oportet, & nō quid ali-
quid inter oras cōiungendas interitus, quod
curatorem morari possit. Subiecte verō carnis
affectus, causæ rationē obtinet, ad id quod effi-
citur. Quippe ex hac, & per hanc, tum quæ dissi-
dent, glutinantur: tum quæ causa sunt, carne im-
plentur: quare pro naturā suā se habere oportet,
quod hæc utraq; cōmodo perficitur. Recte autē il-
le se habuerit, si pro priū temperamentū tueretur.
Itaq; necessum est ad vlcera tum glutināda, tum
carne implenda, temperatam esse subiectam car-
nem. Nec fat hoc ipsum videtur esse, nisi enī qui
affluit sanguis & probus sit, & quāritate medio-
cris. Quippe egregie sanabilius, rebelliusq; vlcus-
rum, alia ob intemperie carnis exulceratæ, alia
ob affluente humore sunt talia. Caro autē ipsa
interdum solis qualitatibus naturæ modū egre-
ditur, interdum accedente tumore præter natu-
ram. Iam humor confluens, aut qualitate aut
quantitate, à naturæ modo discedit. Interdum
verō miscetur dīctorum affectuum, aut aliqui
aut etiam pariter omnes. Ac carnis quidem intē
periem, si siquēns sicca videatur, aqua temper-
rata fouens humectansq;, do nec rubefcat, antol-
latūq; in tumore, corriget. Si verō vltra per-
fuderis, id quod attritu evocabis: ac proinde
nihil profeceris. Quin etiam medicamentum humi-
dior, q̄ sanæ carni, adhibeantur. Si verō humi-
dior q̄ pro naturā habitu caro fuerit, contraria
ratio incunda est, ac medicamentorum facultas
ad siccus transierit: aqua verō nullatenus ad-
mouenda: sed si laudum vlcus videtur, vinum,
aur posca, aut decoctū austera cuiuspiam herbæ,
parandum. Eodem modo & calidiorē q̄ par
est, carnis habitum refrigerabis, & frigidiorē cal-
facies. Agnosces verō horū utraq; partim colo-
re, partim tactu, partim laboris sensu. Quippe
aliis vitionem se sentire fatentur, aliis mani-
festum in particula frigus: gaudētq; vel frigidis
medicamentis, vel calidis. Et alius quidem rubor
levis infidet, alius color magis albit. Partū por-
rō quæ cum aliquo præter naturam rumore ex-
ulceratæ sunt, earum prius sanandus est tumor.
Vbi labra tantum vlcis de colorata durāve plu-
sculum fuerint, excidenda ea sunt ad sanam vsq;
carnem. Cū verō altius id malum serpit, deli-
beratione est opus, excidendū ē omne sit, qd
præter naturam cernitur, ac temporis spacio cu-
randum: quā in re certē consulendus etiam est
ager. Iam verō si prauus humor in particulas cō-
fluens exulceratæ, nec vberior sit iustus, nec mul-
tū excellat malignitate, averti hunc, atq; repel-
li cōveniet: attritus scilicet, refrigeratisq; us parti-
culis, quæ ante exulceratā consistunt. Inchoati
da etiam deligatio est à laborante particula, de-
ducendāq; versus sanā. Qup autē vlcibus ipsis
admoventur pharmaca, siccant valētius oportet,

quā quæ simplici applicantur vlcis. Quod si
sint, cōpescitq; medicamentis influxus nequeat,
causa eius in vestiganda est, atque hæc prius ad-
menda. Ac si quidem ob partis, quæ fluxum reci-
pit, imbecillitatē aliquam id contingat, hunc ni-
mirum medendum est. Imbecillitas autē partis,
omnino ab intemperie nascitur: nō tamen ab om-
ni, sed ab excellentiori, quæ sanè per contrariū
est abigenda. Vbi igitur in temperie ipsā sanā-
ueris, te ad curandū vlcus cōvertere: nō aliter pla-
nē nunc curata intemperie, q̄ si incidisset citra vl-
cus. Si verō ab alia quavis particula, vel etiam à
toto corpore, vitiosus aliquis humor influxerit
exulceratæ particule, medendum in primis est
ipsius fluxionis radici. Ita igitur & varices, quæ
sepe supra exulceratū locum sunt, prius sanabi-
mus, ut deinde mox vlcus sanemus. Adverten-
dum autē est interim, nullam primitivā causā
rum, quæ procatarticas vocant, nisi etiam tum
affectum producant, esse curandos in indicatōe
sed huius indicatōnem, ab ipso affectu initium
habere. Si quidem à nullo eorū, quæ adducunt
permanent, indicatō sumi eius quod ex vltu fu-
turum sit, potest. Est tamen vltis causā proca-
tarctarū cognitio, ad noscendos affectus eorū,
qui tum rationē, tum sensum latent. Est itaq; rei
quidem præsens curatio: sed utrum, pro vi-
dentia. Quod verō nec nunc ledit, nec lesurū ti-
metur, id ab utroq; artis munere, tum eo quod
curat, tum eo qd̄ pro videt, excelsit. Quare nec in
dicatō ab hoc ad curationem vlla, nec providē-
tiæ ratio sumitur. Si igitur à procatartica cau-
sa indicatō curatio nō sumitur, vltis mansi-
stum evadit, quod ab ea quæ præsens est, sume-
tur. Ceterum propectrix pars artis, est duplex:
altera, quæ morbosum affectum iam præsentem
submouet: altera, quæ illum qui nondum vrget,
prohibet. Porro cōtingit vlcera nō sanescere, in-
terdum quidem ob labra ipsa pestime affecta, in-
terdum ob intemperiem particule, absq; vltio tu-
more præter naturā: nonnunq; ob intemperan-
tiam quidem, sed quæ cum tumore aliquo sit cō-
iuncta, nō tamē qui omnino sibi labra excidi po-
tuit. Fieri etiam potest, ut superiacēs vltis, vel
auctior lien, vel aliqd̄ vltis lecinosis, vel imbe-
cillitas exulceratæ particule: quæ ipsa quoq; in-
tensā quædam est intemperies vel totius corpo-
ris cacochymia, vel plethora, ut vlcera minus san-
nescant, prohibeat. Quare causa ipsa, quæcūq; il-
la sit, circūcidenda veniunt vltis vlcus omne
cacochymie, hoc est, malignantis naturæ, continuū
& cauum sit est necesse, cum ex eroione nascat-
ur. Nunq; autem id genus vlcera, si vlti neq; alia
vlla, calido acnē medicamentis exasperes, prius-
quam vniuersum corpus à recrementis liberet:
quemadmodū facieb imperitissimus Thesi-
lus. Quippe cuiusmodi medicamenta omnia, cu-
cubitq; ritu ad se trahere à toto corpore sunt ha-
bilia. Itaq; nisi id prius vacuaret, materij vltis
acnē medicamentis relinques. Etenim q̄ nec rectē
sanare oculū ante totum caput, neq; hoc ante to-
tum corpus, vlla ratione licet, tum philosophis
tū medicis vniuersis, qui methodo mederi sunt
soliti, est in cōfessio. Voco autē methodū, certam
quandam vniuersalēq; vram, quæ sit omnium

Vlcis curanda
qua requiritur
tor.

Vlcis caco-
che curanda
radant.

Carnis siccā in
temperie, quo-
modo corrigenda.

Carnis humi-
dior curanda
quo modo
corrigenda.

Carnis intem-
perie curanda
do corrigenda.

Vlcis labra
quæda exci-
denda sit.
Ager quæda
sit excidenda.

Humor in par-
ticulas cōfluen-
s exulceratū,
quæda averten-
dus & re-
primendus sit.
et quo ratione.

Imbecillitas
partis ab intem-
perie nascitur.

Varices prius
sanandas esse,
quæ vlcus ab
eius fluxum reci-
piunt.

Indicatō vltis
in anali sumi-
tur a causa nō
permanente.
Procatartica
causam causantem
causa

Indicatō cura-
tionis à causā
præsens sumi-
tur.
Propectrix ar-
tis pars duplex

Vlcis sanescit
re quæ prohibet.

Vlcis exci-
denda non esse
prius quam cor-
pus vacuetur.
scilicet sit parum.

*Methodus est
certa quædam et
variis modis
vitiis, omnium
particularium
communis.*

particulariū cōmunis. Ceterū notitiam quan-
dam habere oportet, tum finalem, tum disimulalem.
qui methodo quidvis molitur. At verò, etiam si
in singulis morbis priuatā quædam esse metho-
dus medendi videatur, cōmune tamen genus in
omnibus vnum existit. Quippe in omnibus cu-
rationibus, vnum est methodi ipsius principium,
quod ab affectus indicatione sumitur: vitiū etiā
quæ ab eo principio ad finē vltimū perducitur, est in
omnibus particularibus similis. Quæ igitur vlti-
mā, omnibus rite decenterq; factis, nō sanantur,
ea medici cacochæ, hoc est, maligna, contuma-
cia, rebellisq; nuncupant. Protrahuntur autem,
vbi quis illis, perinde ac si tantū vlcera sint, me-
diter. Ceterū ex diuturnitate ipsius vlcera, indi-
catio curationis nō sumitur, sed ex ipsius particu-
larē affectū. Si ergo tantū exulceratæ partes af-
fectæ sint, si eas curaueris, continuō sanaueris vl-
cus. Sin verò vniuersum corpus prano succo re-
dundet, si hūc euacuaueris, idem haud dubie mo-
lebitis. Ac signū quidem vitiōsi succi, est ipsa diu-
rurnitas vlcera. inventio autem eius quod expe-
dit, nō ex diuturnitate, sed ex succi vitio sugge-
ritur. Quare tria hæc sibi mutuo coherēt, signū,
affectus, & curatio: signum quidem, ipsa diutur-
nitas: affectus, succi vitium: curatio, eius vacua-
tio. Veteres autem, vt prope breuitatis studiō sissi-
mi, prætermisso medio, interdiū iterū itam pri-
mo subiiciunt. Veluti Hippocrates fecit, cum di-
xit: Tum ab inveteratis vlcibus confecti vt af-
fectū sanguinē effluere facias, vitiumq; id oppor-
tunum videtur. non vitio curationem indicantē
diuturnitatem, sed sanguinis vitio. Porro omne vl-
cus, quā vlcus est, vt sanetur, medio citius exul-
ci postulat. Si verò etiam habeat secum affectum
alium cōiunctum, primō quidem illius curatio
nem: secundō autem, suam propriam requirit.
Sed de curatione vlcis, sic verba fecit Hippo-
crates: Quodcumq; vlcus cefim, perverfime a-
cuto telo est diuisum, medicamentū enonem, &
siccare, & quod suppurari vetet, admittit. Sin ca-
ro aliqua telo tum cōtusa, tum cæsa sit, hinc ita
medendum est, vt q̄celerimē suppuret. Nam &
minus phlegmone vrgebitur, & necessum est car-
nes, quæ cōtuse cæcæq; sunt, putrefactas & in
pus verfas, liquare, postea novam carnē produ-
ci. Quo quidē sermone nos docet, oportere om-
nia ficari, præter ea quæ sunt cōtusa. Porro om-
nia quæ putrefiunt, ex calido & humido sic af-
ficiuntur. ideoq; etiā ea cataplasmata quæ ex hor-
dei farina constant, ceu quæ calificant hume-
ficientq;, omnibus us affectibus, quibus mueri
pus expedit, admodum sunt. Hordei uiaq; farina,
ex aqua & oleo: itēq; panis, ex aqua & oleo: præ-
terea fomentū multæ calidæ aquæ & tetrapla-
smaci vis, omnia deniq; calfacientia simul & hu-
meftantia, pus q̄ celerimē mouēt. Sciendum ta-
men est, admoueri cataplasma calidū atq; humi-
dum inflammationi, haud quidem tantū remediū
ipsius (phlegmones namq; remedia facultatē fici-
oriorē possident, vt verbasculū coctū, & solia trifo-
li in cruda, & epipann folia cocta, & polium) sed vt
lenimen quoddā symptomatis. Ac proinde hor-
dei farina, lenit quidē dolorem, minimē autē me-
detur inflammationi. Igitur vel prauus succus non

*Vlcera acerbis
quæ dicuntur.*

*Vlcera diutiora
aliter est facta
vitiūq; indicat.*

*Vlcus enim, quod
vitiū est, vt sa-
netur, meliorem
tuo vitiūq; po-
stulat.*

*Putredinem eri-
ri a calido &
humido.*

*Pus mouentis
quæ sunt.*

*Inflammationi
cur adhibean-
tur cataplas-
mata calida et
humida.*

*Hordei farina
dolorē mitigat.*

amplius cōfluit ad partē exulceratā, aut etiam
num fluit. Si nō amplius fluat, ipsi tantū quod la-
borat, est succurrendum: si quidem vel liuidum,
vel nigrum, vel rubrum conspiciatur, scilicet ad-
d, ac sanguinē emittendo, mox iponiam siccorē
potius q̄ humidiorē superimponendo: post hæc
verò etiam scilicet remedia applicanda. Ab his,
si res postulat, rursus sanguinem auferendo, ac
mox iterū eadem peragendo, donec parsa sanan-
tas sit. Quod si labra vicena dura, callosaq; appa-
reant, etiam ea excindendo. At si aliquid de hu-
mor ad partē fluat, fluxionis est occurrendū ori-
gini. Si verò valens aliquis morbus, vni cum vi-
rium robore affligat, vel si redundantis sangui-
nis concursus nō addit, nemo est qui nō sangui-
nem detrahat, qui vtiq; in artis operibus fuerit
exercitatus. Quippe sanguinis redundantiā huius
quāq; sanguinē eile mittendum indicat, sed ma-
gnitudo morbi vni cū virtute vegeta: exceptis
tamē a sermone pueris. Etenim si quis etiam nū
sanus, nec adhuc quicq; læsus, sanguinis redun-
dantiā grauetur, non ita huiusmodi mitti sanguinē
est necessarium: alij satis facit inedia, alij cibi par-
citas, alij soluta alius, vel purgatio, vel frequen-
tius balneum: alij sola exercitatio, vel multa tri-
ctio, abvnde sunt. Sed nec purgatio in sola vitio-
si succi abundantiā cōuenienter administratur, ni-
si etiā magnitudo ipsius morbi ipsi cacochy-
miæ, cōiuncta. Sic enim vlcibus atq; vulnerib;
omnibus quoties valida sunt, purgationem esse
vilem est professus Hippocrates, quod nimirū
& insigniter vacuet, & ad diuersum trahat. Vni-
uersa autē vicia, trifariā grauiā valdēq; reddunt:
nempe vel propter afflictiē partis præstanti-
am, vel propter affectus magnitudinē, vel pro-
pterea quod sint cacochæ. Vnus igitur quod
inter thoracē, peritoniumq; penetrat, nō parū
periculum adfert, præcipue si interiorū quæcūq;
sit simul conuulseratū. Quinetiam cacochæ ita-
tum fieri, quæcumq; in articulo accepta vulnera
sunt, id quoq; omnes ferē sciunt. Vbi enim ten-
dones, & nerui, & carne vacua, osculentaq; sunt
loca, hic doloris, vigiliatū, cōvulsionis, & deli-
rii periculū instat. Tum hæc igitur vulnera, tum
quæ adeo sunt magna, vt futuris aut ligaturis in
digeant, purgationem desiderant. Ad hæc, qui-
bus periculum corrumperdi osus impendit, ea
vitiū non sunt absq; magnitudine phlegmones.
Quæcumq; verò exeduntur, ea tū cacochæ sunt,
tum maiorum succorū soboles. Herpetes quoq;
a bilioso excremento ortū habent: ceteraq; di-
uersa omnia, ex huiusmodi quapiam causa pro-
ueniant. Quare in omnibus his merito purgare
per alium iubet Hippocrates. Si igitur valenter
etiam vnum fluxio irruat, rellere ad cōtraria stu-
debimus: vtiq; si in superioribus vlcus consi-
stat, per inferna purgantes: sin autē in inferiori-
bus sit, superiorem ventrem vacuantes. At si iam
fluxio residerit, etq; in membro inhaesit, detrahare
per vicina magis expedit: & in propinquiora
translato, & purgantē medicamento tum acces-
sus, tum attractus, ē vicino, sit promptior. Ma-
gnitudo autem morbi, ceu scopus quidam san-
guinis detrahendi, aut purgationis adhibenda,
a nobis cōstituta est. Quæ sanē scopū invenit
primus

*Sanguis mis-
cendum esse vti
cum magno
da morbi cū vi-
rium robore cū
puraueris, vel
si sanguis ad
corpus non ad-
sit.*

*Sanguis redū-
dantiā nō po-
stulat postu-
lanti vnde.*

*Purgatio in
sola cacochy-
mia non adhibe-
ndam cōiuncta
est nisi etiā ma-
gnitudo ipsius
morbi eam po-
stulat.*

*Vicia omnia in
saniā grauiā
reddunt.*

*Vulnera articu-
lorum et ad
re cacochæ.*

*Herpes a bi-
lioso excremento
oriuntur.*

*Et vltimū ef-
fectus ad diuersa
loca mouenda.*

*Detrahatio faci-
enda est per vi-
cina.*

*Morbi magni-
tudo est scopus
sanguinis
detrahendi pur-
gationisq; ad-
hibenda.*

primus omnium Hippocrates: secundū cuius quidem sententiam, omni recens factō vulneri, nisi in ventre consistat, expedit ex ipso statim sanguinem plus minusve effluere. Quippe phlegmone sic minus tentabitur vlcus ipsum, tum quæ circumposita et loca sunt. Idem etiam cōfirmat, debere scilicet imitatore esse medicum, nō tantum naturæ, sed eorū etiam, quæ cū sua sponte eveniant, conseruant: necnon conducere, si ab inveteratis vlcibus eorūq; circūiacentibus 10 partibus, crebro sanguis fluere cogatur. Porro quæ acuti sensus pars est, eam q̄maximē seruare citra dolorē tentandum. Quæ verō parum acuti sensu est prædita, hæc, si affectus ita suadet, valentiora præsidia admittit. Rursus principis quidem membri robur seruari oportet. Quod tale nō est, licet huic adhibere relaxantē medicamentum. Quod verō ad positum pertinet, si ventriculus fuerit exulceratus, medicamenta bibenda sunt. Si gula (quæ transitus comestorū bibitorūq; est) nō semel, nec rota simul sumenda, sed paulatim, aliūdiūq; ligenda: & sanē tum crassiora, tum magis lenta esse debent. Nam ex transiū contractūq; vlcibus quæ illis labētur, emolumentū accedit: nō ex cōtēnendo, & diutius adiacendo: sicviti quæ in ventriculo sunt. Quæ verō vlcera in crasis sunt intestinis, iis quæ per sedem iniūciūtur remedia magis egent: quippe cui magis suū propinquū. Quia in renibus habentur, quoniam & longinquiora sunt, & medio sita positaambo requirūt, & quæ superne sumuntur, & quæ infunduntur per sedem. Cōmuni autem omnium internarum partium est indicatio, vt ea eligantur, quæ animalis naturæ maxime sint familiaria, siue cibi sint, siue medicamenta: sugantur respuantq; his cōtraria. Quāq; in us quæ foris sunt vlcibus, innoxius etiam talium medicamentorū sit viciū, æ ruginis, æris viciū, æris squamæ, cadmiæ, pompholygis, lithargyri, argæ ferulæ. Hæc igitur & similia, interioribus exhiberi nō debent. Eligenda verō alimenta sunt, si quidem ad cicatricem perducere, aut vlcis glutinæ itud emus, rū austera, tum glutinosa, & quæ minime rodant. Sin emundare, quæ modicē abstergeant: quod minus mel non coctum, præter cetera præstat. Ac voco sanē austeri, id quod astringens dicitur: vt acerbum, quod impensē est austerrum. Ergo internis vlcibus opitulantur, hypocistis, balsasium, puni corum citini, galla, malicorū, terra Samia, Lemniū sigillum, rhois, rosarum succus, acacia, aliq; id genus, quæ citra in cōmodum viscera, prædium internis viscibus afferunt. Danda verō hæc sunt, ex aliquo astringenti decocto, vel melli cotoni, vel lentisci, vel clauiculorū rubi, vitivæ, vel myrtorum, vel deniq; ex vino aliquo austerō. Cauendum tamē à vino est, vbi phlegmones suspiciō adeit. Sunt autē & præparanda id genus medicamenta, cum eisq; miscenda etiam, tum tragacantha, tum gummi: præsertim si ob gubæ vlcera exhibeantur. Sed & gargariæ quoq; iubendas est, quæ ad fauces & paritissima his vteret. Ad vlcus autem quod in aspera sit arteria, vt supinus t̄diu n̄sumē in ore teneat, ac omnes qui illic viciū musculos laxet, remittatq; præcipiendum: insit n̄

quæ sic sensim & paulatim de medicamento aliquo sensibiliter & manifestē in ipsam arteriam. Nam & cū naturaliter sese habet, scire licet positionis nōnullū illuc percolari. Semper autē caudum est, ne largus quicq; & per mediam spiritus viam, iustatū: alioqui excitabit rufum. Iam verō medicamenta omnibus, quæ thoracis & pulmonis vlcibus sunt destituta, nō admiscendum est: quod quidē digestiois eorū in corpus, acceperis transitus, velut velicula erit, cū eo, quod ne quē nocet vlcē. Ad eundem modum, quoties in vesica & renibus consistit vitium, non solum mel ipsum, sed etiam diureticorū aliquod viciū medicamentis miscere oportet. Cæterum partes exulceratæ, tum ex earum substantia, tum functione, tum vilitate, tum positū, tum figura, facile discernuntur. Itaq; non modō illa quæ diximus, sed etiam complura alia, ex figura partium, posituraq; indicantur. Etenim cathetere omnino probe vti nequeas, nisi & positum, et figuram tonus vesicæ planē perspiciam habeas. Ergo in huic omnibus nō parum ad totam curationem locus affectus indicat. Porro valentiora medicamenta requirunt, affectus in alto & durescentes corpore, quā qui in summa superficie consistunt. Ecchymosis omnis, vacationem pro curationis remedio indicat. Quare calcassibus huic, & modicē siccanibus medicamentis est opus. Quod si ecchymosis altius descendat, non tuerit viciū cucurbitulæ in vitiis: quod quidem instrumentum fuit à medicis, ad violentam attractionem excogitatum. Ergo si vocatum celeriter ecchymoma sit, facile coalescet rupta ipsa caro. Sin longiore spacio, fordes multa subiacēs, medium inter vlcis labra spaciū occupat, ita vtiā comē ruptio non possit, sed tantum ipsa labra protē amoueantur.

GALENI PERGAMENTI de medendi methodo, lib. V.

Monstratum igitur est, omne vlcus siccania medicamenta requirere. Cæterum quod sinum habet, vt minus sanē quim reliqua, sic ea quæ præterquā quod modicē siccet, etiam abstergendi facultatem possideant, desiderare. Quod verō coniungi sibi labra possunt (cuiusmodi sunt cruenta) huic tum quæ magis etiam siccet, tum quæ citra absterfionem leuiter astringant, esse opus. Iam quæ vlcera per duci ad cicatricem possunt, hæc non solum magis adhuc siccanibus, sed etiā strenue astringentibus remedia egere. Quod si caro eorum præter naturæ modum intumuit, acia, & demolientia desiderare. Si quod verō aliud d̄ symptomata vlcē adiunctum erat, ab eius natura curationis indicatio sumebatur: atque ex hac rursus petebatur remedium facultas. Si namq; fordes inascerent, quæ hanc tollent opus esse: eaque omnia abstergēdi vim habere, multo sanē maiorem, q̄ ea quæ carne impleantur. Ac si agglutinarum medicamentū esset, siccanē, astringentiq; id esse debere. Si carne impletur, siccanē & abstergentē: argi in singulis reliquorum, vti dictum est. Si verō intemperata subiecta caro esset, primum per cōstrata succurrendū esse illius intem-

Potius noui
hul semper in
asferam dola
be arteriam.

Mel permiscu
dam esse medi
camenta in
qua liberati
palmorūq; vlc
erib insistent

Diureticorum
aliquid, meli
ipsum misce
dam esse medi
camenta que
ad vesicam &
renes facimus
exulcerari.

Affectus in alto
sunt, valentiora
medicamenta
la requirere,
quā qui in su
summa superfie
rie consistunt.
Ecchymosis cu
ratio. Cucurbitula
viciū.

Vlcus causi mo
diū facientia
non sunt dier
gine possunt.
Cicatricta me
dicamenta quæ
lia nam esse
debeant.
Cicatricti ind
centia medica
menta quælo
q; esse oportet.
Incrassati car
o quælo requi
rat in cicatricta.

Vlcus recent
expedire vt ex
ipso statim fluat
sanguis.

Gula exulcerat
re medicamenta
la esse paulatim
sumenda, sed
paulatim, aliūdiūq;
ligenda.

Intestini ex
ulcerati quo
modo iocuerunt
dum.

Intus quæ pro
panda non
sunt.

Mel crudum,
austeri quid,
acerbum quid.
Vlcibus inter
nari partium
quæ p̄stiat me
dicamenta.

Viciū fugien
dum esse, vbi
phlegmones su
spiciō adeit.

Astera arteria
vlcibus quæ
ratione meden
dam sit.

perantia. Nihil siquidem redire ad propriam naturam potest, sine his quae ipsi facultatē habent contrariam. Considerandas praeterea esse & ipsius intemperantiae causas: ac primū quidem medendum esse causae quae adhuc intemperiem foueret: post hanc vero, & ipsi quae iam facta esset intemperantiae. Ostendimus autē, tum ab ulcerum

Indicationes à laborantis tempore sumptas, diversim habere rationes, quae ab ulcerum differentia sumuntur.

differentiis diuersas indicationes praebere, tum eas quae à laborantis corporis temperamento sumuntur, diuersam ab his habere rationē. Si quidem illae, cum ex his, quae sunt praeter naturam sumuntur, omnes contraria esse adhibenda dicuntur: haec, cum ab ipsa natura capiuntur, similia. Nec illud omisimus, ex praecellentiis membri, aut contrario statu, itemque sensu acuti, hebetere, diuersum medicandi consiliū peti. Cum autē non modō in similibus, sed etiam in organicis partibus solutio cōtinui oritur, remediōrum indicationes aliae quidem à similibus, aliae ab instrumentalibus desumuntur. Ceterū quandoquidē satis superius de his ulceribus, quae in carnosissimis accidunt partibus, differuimus, tempestiuū videretur nunc de illis agere, quae in arteria, vena, & nervo contingunt. Ergo si cui arteria, venae magna sit vulnerata, copiosum sanguinis profusum subito supervenit, & glutinari id vulnus difficile quidem in vasa potest: in arteria autem (sicuti nonnullis medicis est visum) fortasse omnino nō potest. Sanē profluit ex vena aut arteria sanguis, aut reteratur eorum ore, aut tunica earum diuisa, aut transcolatur, siue sudoris instar transfusus. Porro diuisa ipsa tunica, aut vulnerata, aut contrusa, aut rupta, aut erosa. Anastrofismus (hoc est, refectio) accidit, propter tum vasis imbecillitatem, tum sanguinis quidam est eius impetu ruat, copiam: ad haec, acrem quamvis, quae illi extrinsecus incidat, qualitatē. Diapedesis verō ex tunica earefacta, & attenuata sanguine oritur. Accidere tamen potest, & ob graciliū vasorum os adaperitum. Quae igitur vulnerant, ea sunt acuta, atque secandum habilia. Quae cōtundendo soluit, dura grauius existunt. Quae rumpunt, omnia tensio nis interveniū id faciūt. Idem & intensior actionis vehementia facit: tum plenitudo illa quae respectu vasorum dicitur, tum causa ab alto, necnon graue quippiā durumque incidens. Ac si ex vulnere, vel clamore, vel casu, vel cōtusione, perruptū vas sit, vtrique in his causa ipsa desit. Si verō est abū danna, fieri potest ut vas etiam amplius rumpeatur, effectrice saltem etiamnum causa manente. Quare in tali affectu, quā primū est ipsa plenitudo vacuanda, dein suppressendus sanguis: ac demū vlcus curandū. Vbi verō effectrix causa iam desit, primō quidem sanguis sistendus est, ac mox vlcus sanandum: idque obstatum perrupto vase, translatōque aliorum quod per id ferebatur. Porro vlcus ipsum claudetur, vel labris eius, quae discedunt, in id adductis, vel osculo ipsius obstruendo. Adducētur in idē labra, tum nostrorum manuum opera, vbi scilicet manus vlcus se exhibet: tum per deligaturā, tum per refrigerantia astrigentiaque remedia. Neque enim suere fas est, arteriae venaeque vlcus. Obstruētur vasis osculū & sanguine ipso cōcreto, & iis quae foris illi admoventur emplastris linimentisque: necnon igne, & me-

Sanguis quatuor modis à vasis effluere potest.

Anastrofismus vasorum vnde accidit.

Diapedesis causa.

Saracum arteria aut vena vulnus nō est. Vas aperit ab ista quotuplus interpositum.

dicamentis ipsodentibus crustam. Potest etiam superimponi vlceri circūiacens caro, atque ipsa in nonnullis vulneribus cutis. A vertitur autē sanguis, tum ad proximā deriuatus, tum ad contrariā reuulsus. Deriuatio ad vicina loca fit, cum id quod per palatum vacuatur, deriuatur per nares: reuulsio autem ad contrariā, cum ad inferna reuolvitur. Rursus, quod per sedem profluit, id deriuamus per vulus, sursum verō revellimus. Ita nāque & natura ipsa facere solet. Mulieri enim (inquit Hippocrates) sanguinem vomenti, mentis supervenientes remedia sunt. Hac de causa, si vel mentis cōsertim eruperint, vel sanguis ab vtero quoquo modo profluxerit, sursum reuelles, cucurbitā maximā suffigens inammis. Eandem ob causam, si ex dextra quidem nare profluat sanguis, cum retinetur maxima cucurbitula hepatis admo. Si ex sinistra autem, lienem. Quem admodū si per vnaqueque suat, vtrique vlceri cucurbitulae applicandae sunt. Quod si resolutus adhuc aeger non sit, etiam vena ex eodem cubito incidenda est, qui profusio nō directo respōdet. Ceterum vbi paulū detraxeris, mox vnam horū intermittens, rursus detrahes: post iterū atque iterum, pro laborantis viribus. Ad eundē modum, quae per alium fluunt, ea vel per vrinās, vel per vterū deriuabis: quae per vrinās, ea vel per vterum, vel per sedem transies. Pari modo, quae per vterum erumpunt, vel per vrinās, vel per alium. Quae verō in oculis, aures, vel palato, fluxiones accidunt, earū ad vicina deriuatio per nares est. At reuulsio in iis quae superius sunt omnibus, deorsum semper agitur: sursum in iis quae sunt in frā. Praeterea à dextris ad sinistram: sicuti ab his tur fus ad illa. Similiter ex iis quae intus habentur, ad ea quae foris sunt: contrariā ab his, ad illa. Ergo & frictio contrapositae partis, potissimū per ea medicamenta quae calfaciant, praeterea vincula arctiora, iis quae ad contrariū revocant remedia annumeranda sunt. Non secus profectō, & naturalium meatuum qui positi ex adverso sunt, reclusio. Porro vinculi ipsos profluentibus vasis iniectum, fluentē sanguinē sistit: nostrisq; similiter digiti appositi: atque adeo dissidentū vulneris labrorū ligatio, quam epidesim vocant. Si autē particula vulnerata sit talis, ut & spectet sursum, & ipsam indolentem conseruet. Si vas unde sanguis profluit, alius demissum sit, vno atollendū est, modicāque introquendū. Quod si ne tunc quidē sistatur, ipsūque vas vena fuerit, imprimendus est cataplasmans quae ex friza refina, & farina triticeae tenuissimo polline, & gypso, aliisque id genus confecta sunt. Sin sit arteria, aut vinculo amplexens, aut totū vas praecidēs, pro fluxum sistes. Sed vinculum etiam inicere magnis venis compellitur: interdumque transversum totas praecidere, vbi rectē ex profundissimo loco assurgunt, ac praesertim per angustias quasdam, vel per principes partes. Tunc tamen est vtrumque moliri, & vinculi vasis radici inicere, & quod deinceps habetur, praecidere. Vasis radicē vo co priorē eius partē, quae vel ieciori est prior, vel cordi. His peractis implendū carne vlcus est, priusquam vinculū à vase decidat. Itaque sistendo sanguini longē sunt cōmodiora emplastica,

Sanguinem dextris aut sinistris, & reuulsio ad contrariā.

Mentis reuulsio sanguinem admo. cucurbitula inammis.

Sanguinem ex dextra nare fluat si supponas, ad mētem cucurbitula hepatis: ex sinistra autē lienem.

Sanguinem per nares fluat, quod de cyquali si cōda sit vena.

Deriuatio uno di diuersi.

Emolliendi ratio.

Frictio. Vincula.

Epidesim. Vulnere per vnaqueque.

Sanguis profluit ex vasis demissum alius, quomodo supprimendus.

50

50

50

50

50

50

*Astringentium
finitur et reser-
vatur. Namque ad
suppressionem
sanguinis ap-
plicatur ex-
trinsecus, non
vbiq; probat
Galenus.*

*Refrigeranti-
bus quâdo cir-
ca partem vnde
fuit sanguis
utendum.*

*Constituta
summa cervice
affixam, et re-
lata à naribus
sanguinem.
Sanguis fuit
in periculis
et vasis du-
plex.
Diaporesis quo-
modo sit curân-
da.*

*Dura omnia
agri conside-
randa.*

*Vena temporis
securitas mî-
tens. Gracile
vitem erat con-
suetum.*

*Vesica pro cy-
stis Galeni
vulgar.*

*Lentia terra.
Bona esse ma-
gnam etiam
fluvioribus.
Pulmonis vici-
na cur difficilis
ra, amara sint.*

anre dictis succis aut decoctis. At verò quæ ex-
trinsecus profluent particulæ admoventur, tum
astringentia, tum citra astringentem frigida, hæc
ipse nō vbiq; probat: sed mihi contrā omnino q̃
fieri res postulat, ipsum sanguinē intrō compelle-
re, ac vnas quæ in alio sunt implere videntur.
Vidimus enim quosdam eorum, qui sanguinē à
pulmone reiciunt, ex thorace refrigerato ma-
nifestè lætos: æquē vt qui sanguinē vomuerunt
nonnullos, quod venter esset foris refrigeratus. 10
Eodem modo & eorum quibus ex naribus san-
guis p̃fluxit, aliqui ex capitis refrigeratione de-
terius habuerūt. Quare nec omnino, nec sine dis-
crimine, nec omni tempore loca que circa particu-
lam vnde sanguis profluit, sunt sita, refrige-
randa suasim, sed posteaq̃ in alia diuerteris: vt
exempli gratia, in naso, vbi sanguinis missione
vltas fuit, vel artuum frictio, de vinctio nēq;
vel ad præcordia cucurbitis defixis. Quin ne sic
quidem ad frontem caputq̃ refrigerantibus vrē
dum est illud, sed revelendū prius ad contraria:
vr̃q; affixa in summa cervice cucurbita. Quippe
duplex est in sanguinis è naribus profusione a-
versio: & quæ est ad totius corporis inferna, &
quæ ad capitis posteriora: propterea videlicet
q̃ ipse nars & in superiore & in anteriore parte
sunt sitæ. Tam vero sanguinis effusio diapedesis
dicta, refrigerantibus & astringentibus est curân-
da: necnon victu crassiori, si ob tenuitatem san-
guinis acciderit. Porro quod venter infestus vlcus, si
ad manum est, eandem curationem cum iis desi-
derat, quæ in carne consistunt. Enimvero quem-
admodum dura omnia ægre consolidantur (car-
tilago enim cum cartilagine per coitionem haud
coalescit, si vñ nec os cum osse, fed per callum rā-
tum coniungitur) fit etiam solutæ arterie cum
difficultatē ob substantiæ duritiem coalescunt,
et si ea aliquando conglutinant viderimus: idly
in mulierib. arq; pueris, tum circa frontem, tum
circa malleolum carpi m̃q; ac medium extremitatē
manus. Simile quiddam aliquando & agresti cō-
tigite iuueni, dum sanguinem sibi mittendum ver-
nō curaret tempore, quod nostratibus est maxi-
mē in vsu. Illi quidem pro vna fuit secta arte-
ria in cubito, quam postea non ipsi conglutinaui-
mus. Est autem sanatu difficilis arteria incisa q̃
vena, tamq̃ue siccoribus medicamentis eger,
quanto ipsa est suapte natura q̃ illa, siccioris tem-
peramenti. Cætera verò, eiusdē speciei ambæ me-
dicamenta desiderant. Porro ad ea quæ in recto
intestino sunt vlcera, per vesicā, cui sit fistula re-
cta ad finē annexa, in iungere liquatū medicamen-
atq; tepidū licet. Cæteri sicca medicamenta ma-
gis sunt idonea, q̃ quæ liquabilia vocantur: quo-
niam facile vel planraginis, vel alterius eius ge-
neris succo miscentur. Eiusmodi medicamenta
sunt, & crocū, & pompholyx, & aloë, & quæ di-
cuntur cephalica. In ipso autē primō producen-
dæ carnis tempore, quod suppressionem sangui-
nis continenter exoptat, etiā Lemia terra salu-
tare est præsidium. At que pulmōni adhaeruerunt
vlcera (cuiusmodi sæpe in vrbe Roma videntur,
loco profecto maximē obnoxio fluxionibus)
difficiliora curam existunt, ob assiduum ipsius
visceris agitationē. Quod quidem factū & spon-
-

giosum cū sit, minimē etiam mirari convenit,
si sanguis aut pus in thorace contentū, aliquan-
do per membranam illius transmittatur ad arte-
riam asperam: quandoquidem per aliam longē
duriore in osiū fracturis effunditur sanguis cras-
sus ad calli generationem. Vbi igitur vel ex casu,
vel prævalida acutiq; voce vas aliquod in pul-
mone rumpitur, citraq; dolorē cōsertim sanguis
feruens, floridus, multūq; cum tussis expulitur, sic
re licet in viscere vulnus consistere. Itaq; laboran-
ti iniungendum est, vt nec respiret vehementer,
ac semper silentiū agat. Præterea vena cubiti in-
terna protinus incidenda, à qua bis rēq; postea
sanguis est detrahendus, vr̃q; avertendi gratis,
tum artus omnes fricandi vinciendi. His per-
actis, primū posca tum diluta, tum tepida, potui
offrenda est, quod si quis in viscere cruor cōnere-
tus latet, solutus expulatur. Atq; hoc nihil vnt
bis tēve, ternis horis facere. Ab iis verò etiā ali-
quod eorū que tum emplasticū vim habēt, tum
astringunt, medicamentū est excludendum: idly
aut ex posca diluta primū, aut ex maiorū myrro-
rāme decocto. Rursūq; vespertī medicamen-
hoc similiter dandum, circūcisō (si valentior sit
æger) omni nutrimento. Sin aliter, sorbitionis q̃d
satis est excludendū. Maximē verò ad rem perti-
nebit, si etiam postero die (modō æger robustus
sit) parū sanguinis rursus ab incisa iam vena de-
trahas. Victu autē, medicamentisq; eodem mo-
do in quatuor vsq; diem vitatur: pectoris interim,
si ætas sit, vndiq; melino & rosaceo, madefacto:
sin hyems, nardino vnguento. Iuueni etiam vel
maximē nō modō ad vulnus pulmonis, sed ad
alia omnia, illud medicamen emplasticū, q̃d ex
bitumine acetog, & alias que illi miseri solent,
conficitur. Quod si mulier puerorē, aut corpori
quod molli sit carnis, medeatis, quod ex chaldi-
ne sit, satis habile medicamentū fuerit. Cæteriū
si rupturæ vas succederet inflammatio, exigua
40 spes est cōglutinandi ipsius: quōdoquidē inflam-
mationis solutæ pus, expurgat sine tussis nō po-
test, que maximē rupturæ aduersatur: in lēgula
tamē tempus produci ipse affectus potest. At se-
pti transuerſi vulnera, quæ foras nō pervenerūt,
in carnosus quidē partibus subinde visa sunt nec
lescere, eius motu minime obstante. Quæ in ne-
phros eius hærent, insanabilia sunt. Sanē diffici-
lis grauius curatio est etiam vbi quæ in carno-
sis sunt partibus, si has iam phlegmone obfeda-
rit, idly non in diaphragmate solū, verum etiā in
omnibus que intris petronæū ambitur: quod
in ea scilicet sanies defluit. Danda tamen op̃era
est, vt illa quacunque ratione sicemus, tum per
ea præsidia quæ extrinsecus imponuntur, tum
per ea que ex aqua, vnde vbi bibuntur. Notum
maximē idonea sunt, quæ diaphanota vocan-
tur, & quod ex calia componitur. Immutatur
autem plurimū ipsa etiam vlcera, per singu-
las animalis partes. Indica siquidem, vel vñ vi-
tium ipsam, vt cæteris, sibi applicandum esse ob-
tratum: si particula quæq; quod sibi sit simili-
limum. Quamobrem auris vlcera, cū ex par-
te longe siccissima sint, glaucio ex cæcis curan-
tur: necnon (si valentior sit opus) medicamina
Andronio, feridq; ferri in polinem requisita
læuigata,

*Pulmonis ard-
etate adeo.*

*Flammam
moris carnis.*

*Pesca diffusa
graves.*

*Sanguinem ex
pulmone re-
pelli q̃d nō
fuit sangui-
ne.*

*Pulmonis rupt-
disrupti, spon-
tanea puer-
cessione, ut
fuit nequid
confidit.*

*Autem vici-
na quibus
de curatio
reuer.*

*Vltis curatio
non immo-
plocina per sa-
culum animalis
partes.
Autem vici-
na quibus
de curatio
reuer.*

*Tetrapharma-
cū cognit phle-
monē, angustū
afflicta parim
periculis.*

*Oculi vicia
qualia medica-
menta possint.
Nasi vicia
qua medicant
sa possint.*

*Oris vicia
qua medicant
sa possint.*

*Diamorus, et
viceribus com-
modum.*

*Medicamentū
quod a sublan-
tis partibus affli-
ctis, et ab affli-
cto illo sanan-
dum.*

*Vitendi modus
a figura et a
situatione.
In viceribus qua
ratione mederi
debeat.*

*Clinici non
possunt perire
ad viceribus
ventriculi pro-
prie.*

*Thoracis et
pulmonis vici-
a, valentiora
praesidia requi-
runt, quam in
pulmonis vici-
a.*

*Ventriculi re-
victus, et
dilatatus, et
quod sanari
possit.*

*Pulmonis re-
victus, et
dilatatus, et
quod sanari
possit.*

languata, & cum acerrimo aceto, quovisque ad lu-
brici mellis consistantiam deveniat, coacta. Porro
quod tetrapharmacum dicitur, siccare vicia id
genus profusius non potest: at maturare phlegmo-
nē potest, augere affectus partis putredinē. Itaque
audiendi locus, quoniam siccisissimus est, idcirco
medicamentis eget quae vehementissimē siccant.
At oculo exvicerato, collyrium fortasse quod ex
theriis cōstituit, expeditur: nam, verō, quod multo
sanē magis siccet, quam vt conveniat oculis mi-
nus autem quam vt auri quadret. Vicerum verō
quae in ore accidunt, quaeque admodū humi-
da existunt, praesertim si proximē adhaerent osi-
bus, ea medicamentis egent quae vehementer sic-
cēt: velut diaphylo, tum ipso per se, tū ex melle,
& vino, & mulso: praeterea & ea quae iritis dicitur,
& quae anthera: hisque vel siccis, vel ex melle, vel
mulso, vel vino. Vile verō ad talia est & Musae
medicamentū, praeterea rhoeis succus, & ompha-
cium, aliisque strenuē siccantia. At quae simpliciora
oris vicia sunt, haec sanare commodē possunt et-
iam medicamentis quae modicē siccant: velut quod
ex moris conficitur, & quod ex rubi fructu, & quod
ex succo corticis iugladiū viridis, atque etiā his
magis, quod ex mulso & cupressi sphaerulis cō-
stituit. In vnicuique autē, genus quod medicamen-
ti, ab ipsa curandū partium substantia & affectu
est sumendū: vitendi verō modus, a figura & situ.
Siquidē quae in ventriculo, pectore, & pulmone
vicia consistunt, per ea quae eduntur, bibuntur-
que curanda sunt. Quae verō in intestinis, bifa-
ria. Nam quae vicina ventriculo sunt, his per co-
mestā bibitis succurrunt. Quae verō inferius
sunt sita, per ea quae iniiciuntur: quippe neq. ad ea
quae vicina ventriculo sunt, subire potest quod
per sedē infunditur: nec integris vinis, ad inferio-
ra pertingere, quod per os sit ingestū. Quamob-
re thoracis atque pulmonis vicia, tū difficiliora
sunt: quae in ventriculo sunt, sanantur, vt quorū situs
longius abest, atque idcirco medicamentorū vis re-
mittitur: tū propter hoc ipsum multo valentio-
ra ea quae devorantur praesidia requirunt, quā
si ipsi statim viceribus admoveantur. Quod li-
gatur pulmonis atque thoracis vicia expurgetur
per tussim, ventriculi autē per vomitum & deie-
ctionem, id ob ipsarum partium contingit formā.
Ceterum quae in ventriculo fluere pus volunt, non
sine periculo vomitis, provocant: sicvi si alter in-
stet illi putris per oxy meli & radicali dererger-
ret. Tutius itaque est deiectione vii, quā vomiti
periculum sit, ne & quod exviceratum est dilace-
ret, & succū quempiā in viis ex vicinis attrahat.
Porro si in pulmone ruptū vas sit, scire licet, nisi
protinus, anteq. excitetur phlegmone, glutine-
tis, id postea insanabile fore. At vicia interioris
tunicae asperae arteriae, & praecipue laryngis, cura
nonem sanē recipiunt per medicamentā humida
quidē, sed facultate exsiccantia: quae retinent ore,
paulatim per fauces delinunt, idque agro iz-
cente supino. Lac etiā ad talia vicia vnicē com-
mendatur, sed praecipue quod Tabis habetur, quū
nimis illic locus sit latis & durus, & aer circūda-
tus siccus, & passum pectoris salubre. Licebit
autē ubi simile locum etiā arte parare, in ferreū
in eo agrostem, sorum, polygonum, mellisophyl-

lum, lentiscum, arbutū, rubū, hederā, cythum, &
alia id genus. Lam verū lac bubulū, crassum natu-
ra est: asinum, tenue: caprillum denique, mediū
consistentiā sortitur. Verū muliebres lac tabidis
auxiliari eximē, quā naturae humanae sit ad mo-
dum familiaris. Hoc tamen de lactis usu, sit maxi-
mum & cōmune praecēptū, vt quibus eo opo-
pus, omnino id altante animalis statim multum
ebibant: etiam melle infecto, si cui cogni in ventri-
culo solet, necnon sale, si ipsum cinis ad alium
descendere cupis. Quod verō ad sanguinis reie-
ctionē ex cathartico ortam pertinet, quom olim
acerrimis fuisse ad splendidiā quandā matro-
nā Romanam, tali affectu prehensam, incidere il-
li venam non placuit: quandoquidem illi quadri-
centum sine cibo egerat propter catarrhū: sed usi
si vt acri vteretur dytiscē, tum crura manusq. cal-
facienti pharma co plurimū perficeret, vinceret-
que: mox caput raderet: cui deinde medicamen-
tum, quod ex palumbium stercore cōstat, imposui: in
terpositisq. horis tribus, in balneo duxi, ac lau-
i, nullo caput contingens pingui. Dein caput i-
doneo pilo contexi, & pro eo qui tum erat tēpo-
ris statu, nutritiū sola forbitione: postquam, ita-
rim fructum aliquē autumnaliū austerum dedi.
Quum autē dormitura esset, theriacem propina-
ui, circiter quatuor menses ante confectā. Habet
enim id aetatis adhuc praevaleat papaveris suc-
cum, qui in antiquitate ignavus redditur: idcirco
& fomiferū est, & fluxiones tum siccant, tum
leuiter crassat. Secundo autē die iussu omnes eius
partes fricari, vno capite excepto: ad vespē verō
poteris rursus theriacis ceu fabae nostrae ma-
gnitudinis. Erat enim quod pridie acceperat, hoc
lōge amplius. Postea verō quae hac quoque nocte,
pōtē dormisset, tertio die manē mel coctū copiose
exhibui, & in quiete seruavi. Procedente die to-
tum corpus similiter fricui, ac pīstā cremorem
cū pane exiguo, pro cibo sumere iussi. Mox quar-
to die mane dedi theriacem cōsistentē in aetatis vi-
gore, idque cū melle copioso. Capin verō mulieris
eodem pharmaco, quod vehementer tum siccant,
tum calfacit, imposito, ac dein ipsa lora, nutritā-
que modicē, valentius si pulmonem expurgare
sum in quinto conatus. Ac de hinc rursus, rursus
in extemplo, ad caput quidē cōsuetō ceta-
ro, quod thapsia recipit, sum vsum. Totā verō cor-
poris curā, in gestatione, frictione, ambulatione,
lauandū abstinentia, ac victu tū moderato, tū
boni succi, ad reficiendū direxi. Quia industria
recte se habet mulier, minimē lacūs o pem re-
quirens. Alteri verō adolescenti, cui ex refrigeratis
spiritus instrumentis orta tussis fuerat, quū san-
guinē ipse reiectisset ad dimidiā heminam, statim
venā incidit, ac bis eodē die ex ea detraxi sangui-
nē: deinde rursus postmodū bis: ad artū frictio-
ne & vincula priore die vsum, ad vespem dedi
pharmacū nostrum, quod diaspermaton dicitur.
Secundo die post alterā detractionē imposui to-
ti pectori ceratū quod ex thapsia cōstituit: mox
vesperi, ne supra modū calfaceret, id auferēs. Ter-
tio die rursus ad tres horas imposito, hoc in me-
lā. Cibari autē similiter tribus his diebus: prio-
ribus quidem duobus, forbitione calis: tertio ve-
rō, pīstā primū cremore: dein, pīstā statim

*Lac bubulum.
Asinum.
Caprillum.
Lac muliebres
tabidis esse ma-
ximē congrua.
Lac asinē an-
imali statim
multum, hu-
manum esse.
Lactis quando
sal et mel ini-
ciendum.
Sanguis reie-
ctus a catarr-
ho producit
ceratū.*

*Theriacis qua-
drimestra fa-
cilitas.*

*Sanguinem be-
talem dicitur
ex radice ve-
na detraxit
Galenum rem-
edientis sangui-
nem ex refriger-
ata spiritus
instrumentis.
Diaspermaton
medicamentum.
Ceratum ex
thapsia.*

aliquo, qui facili concoctio esset, adfectio. Dedit quoque medicamentū dispermatō & secundo & tertio die similiter circa vespere: appē & somnū cōciliat, & sensum doloris leuat, & siccandi vim habet. Vbi autē & spiritui delegare partes in naturali essent temperie, & totū corpus vacuatū, ac nulla phlegmonis suspicio iuxta ruptum vas su periret, tunc expurgare inceperim. Mox propin- nata theriace virgēis xratia, illum ad Tabias di- misit. Ex his verō qui vicius in pulmonē habent, q̄ demū insanabiles mihi esse videntur, qui ex suc- ci vino si erosionē id possident. Oportet autē in principio nullius rei xquē se sollicitū, quā vī negr ruisant, neq; ex capite aliquod in pulmonē deſcāt. Cauetur id triplici p̄ſidio: purgatione primū: secundo, medicaminē qđ dispermatō dicitur: tertio, ip̄i capiti providendo. Quod pur- get, diuerſas facultates habet oportet: cuius ge- neris noſtra sunt puluē, quæ ex Aloē, Scammonio, Colocynthide, Agarico, Bdellio, & Gummi Arabico cōficiuntur, ad plures videlicet purgan- das species extremētorum. Capiti providebunt cerati vſu quod ex thapsia cōſtat. Atq; hæc quidē sunt peragenda in principio. Poſt verō reſcien- dus eſt q̄ger ſalubriter, cibis boni ſucci, fr̄ſtione, in ambulatione, & balneo, ac præterea lacte ſou- uendus. Quicunq; parū habere ſanguinis vide- buntur, uſ ad quēdā ſucci probiorē reducti, detrahē ſanguinē poteris: tum ruriſ reſicere: eoſdē etiā ruri� purgare, ac ruri� reſicere: de-

Diſpermatō medicaminū vici.

Pulmonis vici- ra contraſta- ex viciſi ſeco- erofione eſſe p̄ſuſa inſana- bilis.

Pulmonis vici- cerati curatio.

Catapſia de- ſcripta à Gale- no.

Pulmonis vici- ra in ſui qui de- p̄ſuſa non ſunt, curari per detrahē ſangu- ſanguinis, pur- gationem, & ea quæ caput roborant. Extrema mar- hu extrema re- media adhibē- da eſſe. Podendū vici- ra quales me- dicamenta po- ſſent.

Alia inſer- ſum aſſe ſaluta- ri medicamin- tum ſolu et po- denderum vici- cerati.

ſe pini cortex, itēq; lapis hæmatites, idoneus eſt. Quod ſi profundius quāpiam adſit, vbi exci- cata fuerint, detorſi alicui tantū manne admiſcen- dum eſt, quantū ſit ad carnem gignendam ſatis.

GAL. DE METHODO MEDENDI LIB. VI.

de mediendi methodo, liber VI.

Solutio continui, in carne quidem, vicius: in oſſe, fractura: in nervoſis fibris, ſp̄ſma: in muſculus deniq; vicius atq; ruptio vocatur. Singuli verō horū affectuū, quatenus quidā aſſe- ctus ſunt, ſui per contraria ſubſtationem indictū quatenus autem ſolutionem continui, vñitionē. Igitur ſi cutis tantum acu (exempli gratia) alicui ſit puncta, ſicileg in eo ſanſcane vlcera, etiamſi citra medicamentum, nudōq; membro, ipſum ad conſuetā dimittas opera, niſi ſentiat mali- ſin verō xgrē in illo ſanentur, primū quidem dolebit, poſt etiā tum pulſu particula infecta- tur, tū phlegmone. Quare minime imponemus medicamen qđ glutiniſ, ſed molle, & blandū, & quod dolori mitget. Si quidē vbi magna diſtūſio eſt, ibi ſtūdium impendi debet, vt magis ſicciti- bus remediis labra vlcera & vñantur, & coale- ſcant: vbi autē acu diſſolue facta diſſuſio fuerit, id dū taxat curādū eſt, ne phlegmone tenetur particu- la. Porro vbi aliquis nervus eſt punctū, cuius i- pſam apertā ſerare oportet: aut (qđ ruri� eſt) la- tius incidere, vt per eā ex nervo vulnerato eſſu- at ſanies: dein verō admoūdā quæ ſimul dolo- rē mitigent, & exitum ſaniei pateſcat. Si virtus vegeta ſit, ſanguinis miſto eſt expediri, purga- tio vñiuſi corporis, ſi vitiōſi ſucci redūdēt. Aqua verō calida, quāquā reliquas phlegmo- nas valde mingat, vulnerati tamē nervi inimi- ciſſima eſt, quā p̄ſentem corū ſubſtantia ex re- frigerata cōcretatq; humidiorē materia ſit cōdita. Omnis quippe euſmodi conſtitutio, per ea quæ ſimul calſciant humectantq; reſoluitur, atq; pu- treſcit. Quare præſtat oleo tenuiſium partium, & veteri, & calido, cruentos punctos ſovere. Hoc ſi quidē, ſi frigidum applicetur, tenuis meatus ob- ſtruit: ſin calidum, digerit. Etenim medicamen- ta quæ nervi punctura auxiliantur, debent eſſe fa- cultate tenuia, modicēq; calaciētia, & quæ ſicca re citra dolorē poſſint: quādoquidē ſola lix & tra- here ex proſūdo ſaniem, nec demorſa, nec cōtra- ctā particula, valent. Ego itaq; ſum vſus primū reſina terebintina, tū per ſe, in iis qui molli erāt carne: tum cum euphorbio, in iis qui dura. Non fecit etiā & propoli, nō per ſe modō, verum etiā cum euphorbio ipſam emolliens: qđ ſi durior eſ- ſet, cum aliquo tenui oleo. Quin & ſagapeno, o- popanacēq; ſum in duris corporibus vſus, vñq; cū oleo & terebintina id miſcēs. Sed emplaftri eſt lachryma Cyrenaica nō vñitile ad iſe fore mi- hi videt. Nec ſecus ſulphur viuum, ac minime la- pidōſū, tenui oleo permiſtū, donec forſdū craſſi- tudinē cōtrahat. Calx etiā lota, oleoq; cōmiſta, ſi- militer auxiliat, præcipuēq; ſi in xſtu caniculē bl- tērvæ aqua marina abluit. Ego verō ad neruos punctos hoc vñ conſuevi emplaftri: Cere partē vñā: reſinā terebintinæ, aut (loco eius) humidę pini, aut colophoniz, aut abietinz, vñius par- tis dimidiū: picis tantū dē. Si itaq; humidā reſinā miſcebis

Solutio conti- ni in ſecro.

Punctura nervi.

Punctio nervi vñiuſi di- ſtentionem. Punctio nervi curatio.

Aquā calidam eſſe vulnerati nervi non com- muniſſimam.

Nervus p̄ſuſa oleo calido ſo- uendū eſſe. Punctio nervi quales medic- amen- ta poſſent.

Terebintinā anſian per- ſicem.

Punctio nervi emplaftri op- timum.

miscetur, tumsum cibratūq; euphorbiū reliquis immittitur liquans. Esto verō pōdus eius, pars cere duodecima. Siu sicci, sicuti que colophoniam dicitur, vtiq; oleū pusillū desiderabit euphorbiū.

*Puncti nervi
qualia deside-
rantur medica-
menta.
Nervi per duri-
tatem celi co-
natae.*

Itaq; vulnerati nervi curatio medicamentā postulat, quæ & tepidū calorē excitet, & valenter siccat: rū quæ ex subāritie sue natura & attrahēdi vim habeat, & tenuiū sint partiū. At si nervus nō pun-
ctus, sed per directū sit cūsus, vtiq; diuisa cute
ostēdatur, vim euphorbiā nō feret, ita vt quā in-
terposita cutis est, ferre potest. Quare nūc optimē
calce elota, & in plurimo oleo soluta vitē. Salu-
tare etiā est medicamē, qd ex pōpholyge medica-
mentū sit, si in largo sit rosaceo liquariū. Quod v-
tūq; melius fuerit, si tū rosacē ipsū, tum oleū,

*Metallica medo-
camenta debet
elata esse, si ci-
tra morsum
sunt fracturae.*

salus sit experta. Porro quæ ex metallis cōstant me-
dicamēta, ea elota oīa esse debēt, si citra morsum
sit fractura. Salubre verō medicamentū est, qd
ex melle soluto in oleo infuso cōstat. Cera præ-
terea, terebinthināq; si his miscantur, elui prius
debet. Quippe medicamētis omnib; qu; laueris,
acris mordēsq; sanies eluitur, abstergiturq;. Si
verō robustus sit q; vulnus accepit, & cui corpus
sit a supervacuis humorib; mundū, in hoc fas est
valentioribus remediis nōnullis vt: cuiusmodi
sunt linamēta imbuta pastillis Polyidē, sapa solu-
tis, & super aqua calida tepesactis. Nā eorū quæ
vulneratū nervū contingit, nihil esse frigidū de-
bet: quādoquidem ea pars maximē sensibilis est, &
principiū partiū primari cōtinua, et tēperamento
suo frigida. Quorū omniū occasione facili a frigi-
do ostenditur, & suam offensam impertit cre-
bro. Quod si ex eis fuerit qui pervenit ad muscu-
los (sunt. n. hi instrumentū voluntariæ motiois)

*Nervi volun-
tari moli de-
bent admodum
frigida.*

etiā convulsione facili accersit. Idē tōrē & in ten-
donibus expectabitis, nisi de causis. Sanē oleo p-
fundere tale vlcus non cōvenit: nam oleum viri-
bus illius pastilli est aduersum, vlcisq; sordidum
reddit. Nec enī parū interest, nudōne nervus, an
per interpositā cutem ad moueas. Abluenda igitur
a vulnere est sanies per lanam mollē specillo
circivolūtā, ac in principio quidē sapa madefa-
ctam, expressāq; postea verō enā vīno dulci,
sed omni mordēte qualitate carente. Nam quæ-
cunq; dulcisa pariter & fulua sunt, vt Falernum,
ad id inuitia eustunt. Quippe acris sunt omnia
italia, & supra modum calida. Vicere verō iam ad
cicatricem veniente, quæ alba planē sunt, & ten-
nua, nec multam aquā tolerant, nec odora sunt, ea
dulcibus præstant. Aquæ verō vsū ad ner-
vū vulneratū perpetuū fugies, sicuti & cataplas-
ma relaxā. Ad iam dicti pastilli vsū proximē
illud medicamentū accedit, quod diacalcitreo
vocant. Liquari autem id debet, vitare rosaceo,
hyeme Sabino oleo. Quod si Polyidē pastillus
nō suppetat, Andronis vel Passonis, loco eius su-
mendus est: vel voster, qui etiam omnibus eis est
valentior. Vbi verō nervus alicui transversim est
vulneratus, deatere largius sanguinem expe-
ctat: tenui magis, quā in illis, vti victus ratio

*Nervi volun-
tari neque ea
quæ neculan-
tibus cataplas-
ma admove-
re oportet.*

ne: tum in quiete omnino acleſtulo molli ho-
minem continere: tum oleo lēti vbertim in ax-
illis, collo, tendonibus, ligamētis, & capite vti.
Quod si vulneratus nervus eis sit qui in crure
habētur, sicuti quū in manu est, alē, ita in his bu-

*Nervi transver-
sim vulnerati
curatio.
Nervi volun-
tari in bra-
chio axillis: in
crure, brachio
largo oleo
fundendi offi-
cium.*

bones largo oleo imbuenti: rū per totā spinā ad
collum & caput ascendentū. At contusi nervi, v-
bi cum eis est simul & ipsa cutis cōfusa, cataplas-
mate ex oxymelite et fabacea farina curātur. Qui
verō absq; cutis simili affectu, contusi sunt, his o-
leum calens, atq; tenuiū partium, auxilio est. At si
dolor vnā cum cōfusione cutis & nervi infestet,
enā picem liquidā immiscere illi cataplasmati, ac
bene coquere, tum calens medicamentū impone-
re oportet. Vbi verō magis ficcans efficere vo-
les, erui farinā iniicies. Quod si vt amplius quo-
que siccat desideras, irim immittes llyricā. At si
totus præcisus nervus sit, metus præterea nullus
instat, debilis tū remanebit particula. Curatio ve-
rō eius cōmunis est cum ea, quæ aliorū est vice-
rum. Ligamenta aut, quū similia habeat speciē
tendonibus, valentissimorū remediōrū vim to-
lerant: neq; ad cerebrum pertingant, & sensus
sint expertia. Nā nervi omnes, alij ex ipso statim
cerebro habent ortū, alij spinali interveniēte me-
dulla. Tendones quoq; quoniam ex nervo & liga-
mēto cōstant, quatenus nervi participes sunt, ea
tenus ex cerebro oriuntur, minus tū q; ipsi nervi
cōvulsionem accersunt. Ligamenta verō, quū ex
osse ortū habeat, quæcunq; rotunda sunt, ea ner-
vis sunt cōsimilia: duritie tamen plurimum diffi-
dent. Verū in eo quod alba sunt, & exanguia et
cautate carentia, & in fibras diuidi rū, similitu-
do illis cum nervis & tendonibus cōstat. Ligamen-
ta igitur vulneratū, si id est quod ab osse ad os p-
meat, & maximē sine periculo est, & si id sicces
q; bulbit medicamētis, nihil hominē offēderia.

*Contusio nervi
curatio.*

*Ligamenta
sunt sensu ex-
perta, neq; cum
fractura cere-
bri.*

*Nervi ortū
ad cerebrum.
Tendones con-
stant ex liga-
mento & ner-
vo.*

*Ligamenta a os
nascuntur ab osse,
ligamenta ob
necesse periculo
cum vulnerant
tunc quia sunt.*

Sin id qd se in musculum iusserit, quāto est nervo
& tendone minus opportunū periculo, tamō v-
tiq; nisi rectē curetur, reliquis ligamentis magis
terre debet. Sed id opertæ precium est, vt de ab-
dominis vulnere aliquid etiā dicamus. In abdo-
mine extrinsecus cutis omnibus antestat: quæ in
membranam finitur. Post eam, medio circit
loco, nerva tenuitas muscularum gemina tendi-
tur, membranarum ritu. Post has deinceps habē-
tur duo muscoli recti, et carnosī, qui a pectore ad
ipsa pubis aīa perveniunt. Atq; hæc quidem om-
nia sibi mutuō coherent, abdomēq; cōstituit.
Quod verō deinceps hoc excipit, pentionū vo-
cat, etq; ex corporibus duobus exangui-
bus & nervosis cōstatum. Verū alterū eorum ner-
uosa tenuitas eorum muscularū est, qui per tras-
uersum se agunt: alterum, membrana prætenuis,
velut aranea, quæ vtiq; verē est peritonæum. Ac
tale quidem in medio fit abdomen. Partes ve-
rō eius, quæ vtriq; ad latera ad quatuor quasi di-
giros recedunt, hæc statim a cute obliquos muscu-
los habent: priores quidem, qui a pectore demit-
tuntur: secundos, qui ab illis ascendunt: dein
post hos, transversum vtriq; musculū, sub quo
est peritonæum. Ergo & minus periculi in hoc lo-
co convulsiore est, quā in medio: quum ten-
uam pæoneurosim nullam habeat, & futura in
medio difficulter administratur: quum nimirum
& hæc parte maximē procident intestina, & ægre
inibi cōtineri queant. Si igitur maius sit abdomi-
nis vulnus, tum plura necesse est intestina excide-
re, tum difficilis denuō immitti: quanquā &
parva vulnera tractata etiam sunt difficilia. Nā

*Abdominis de-
scriptio.*

Peritonæum.

*Abdominis pars
tam anterior
cū vulneratur,
necesse curatio
in qua confu-
sio ad latera.*

Abdomine vol-
nerato, ut me-
diocri firmiter
sit salutarum
angulo.
Intestinum ex-
ternum per
abdomen
vulnus quid
agendum.

nisi q̄ procidit, illico in suum reponatur locū in-
flatur, surgitq̄ in tumorē: quo fit, vt per angustū
foramē immitti nequeat. Quare minus graue ē
huiusmodi vulnera, mediocriter foramē est. Prin-
cipiō itaq̄ id agendū est, vt intestina quę excide-
runt, in suum recedantur locū. Secūdo, vt vici-
suatur. Tercio, vt medicamē imponas. Quarto,
vt ne qua præstāior pars simul afficiatur, prospici-
as. Si ergo adeo parū sit vulnus, vt inflatū in-
testinum ex frigore ambientis aeris remitti ne-
queat, discutimus statim spongia molli, & ex
calente aqua madenn, mōxq̄ expressa, intestinū
ipsum caltantes. Præparetur verō interea vi-
num austerū calidum: quippe id magis calfacit q̄
aqua, robūq̄ intestino addit. Quod si huius quo
que prædicto, intestini inflatio nō cesserit, incidē-
dum peritōngi tantulum iyringotomis est, quā-
tūm ē q̄d exodit, reponēdo sit satis. Scalpelli ve-
rō quibz, acies vtrūq̄ habetur, aut quibus cuspis
acuta est, sunt omnino fugiendi. Sinus autē laborā-
ri sit talis, vt que vulnerata pars est, sublimiorē
semper locum obtineat. Cauendūq̄ magnope-
re est, ne id quod excident, degeneretur quicquid
ab intestinis aliis. Qui igitur intestina per mag-
num vulnus prolapsa, reponere in propriā vult
sedem, is vbi totum vulnus manibus suis extrin-
secus apprellerit, debet intro reprimere, nim
cōstringere, ac exiguum semper suentū prænuda-
re: quinetiā id ipsum quod assutum est, modicē
cōprimere, quoad totum perfuratur. Quomā igitur
coire coalescerēq̄ oportet cū peritonæo abdo-
mine, incipiendū quidē ā cute est, atq̄ ab ex-
terno introitus acus incutienda. Vbi verō tum cu-
tim, tum rectum musculum totum transierit, præ-
terito quod ē subest peritonæo, per reliquum pe-
ritonæum eam ab interno extorsus iniicias, atq̄
inde per reliquū abdomen ab interno extrā trāsmi-
ttere. Vbi hoc peritū penetrauerit, rursus ab
externo introitus idē abdomen est perforandū.
Mox vbi peritonæum quod ille quoq̄ subhæret
præteritis, atq̄ ad contrarium venens, hoc quo-
que ab interno extorsus est perpungendum, v-
nāq̄ cum eo totum ipsi consuectum abdomen.
Deinde ab hoc incipiendū perfurari, atq̄ id cum
contrario peritonæo consuectum: ac rursus vici-
cina quoq̄ cute transmissa, iterum ab ea parte a-
cus introitus est trahenda, cōsuendūq̄ abdo-
men id cum peritonæo contrario, etiam inibi vi-
cua cute trāsmissa. Atq̄ hæc iterū iterūq̄ faciē-
da, quoad totum vulnus similiter cōsuertimus.

Quod verō ad intervallū punctiōnū, earundēq̄
altitudinem pertinet, medicocritas eligēda est. Fi-
lum etiam, inter durum & molle medium quod-
dam obineat. At verō medicamenta, quibus in
his vtemur, eiusdē mōtis sunt, cū vulnera gluti-
nandus. Sunt qui aliter vulneratū abdomen cō-
suant, ad hunc modum: Oportet ā vicino nobis
abdomine incipere, atq̄ ab externo introitus p̄
id tantum aciem transmittere. Pōst, præteritis v-
triusq̄ peritonæi labris, ex aduersa parte ab exter-
no introitus per vtrūq̄ eius labrum aciem revo-
care: deius rursus idē reuocare, atq̄ ab interno ex-
troitus per aduersum abdomē trahere. Atq̄ ita
totū peritonæum sibi mutuo coalescēs, prorsus
intra abdomen absconditur. Deligatio verō extima

secus, vel præcipue in his necessaria est. Ad hæc q̄d
inter bubones & axillas est, id totū molli lana ex
oleo medio crito calido imbura circūdare oportet.
Sarius itē fuerit, & si per chylerē intestinis a-
liud simile infusus. Quod si q̄d ipsorū intestinorū
sit vulneratū, q̄ extrinsecus fieri debet, omnia
similiter vt diximus, sunt peragēda. Ceterū q̄d
iniicitur, vinū nigrū austerū, & tepēs erit. Ac cras-
sa q̄dē intestina, sanari facilia sunt: & cōtrario dis-
ficia, q̄ tenuia existūt. Leuior autē est omnino in-
curabile, tum ppter magnitudinē multitudinēq̄
vasorū, rū q̄ tunica eius nervosa, præteritus sit.
Adde q̄ tum bilē synceram hoc intestinū recipit
vniuersam, tum q̄ omnū maximē est vicinū ieci-
nori. Vēniculū autē q̄ carnosē partes inferne sunt,
curatē cū fiducia restatibz q̄ verō in ore eius sunt,
et sensus acutē quo minus sentient, obest: atq̄
hoc etiam q̄ medicamenta illæ diu hæcere non
possint. At verō omentū si per vulnus exciderit
(præstat enim hæc pars animalī vsum nō vique-
adeo magnum: cōtrariū ex membranz tenuis, ar-
terius atq̄ venis cōtextra) si q̄d ex eo nigricans sit,
excipiemus id vinculo, ac sic, q̄d post vinculum
est, amputabimus: atq̄ vt in imo sine id prædictē
future abdominis, pendat ipsius vinculi extre-
ma, curabimus, quod nimirum ea, quum ex vulne
re suppurate eueniunt, facili recipiamus. Sed
iā ad fracturę curam nō veniendū est: cuius q̄d-
dam scopus vnitio existit. Ceterū coalescere ne-
queunt ossa iuuenio, adolecentium, cōsistentiū
ætate, necnō senum, ob eorum maximā siccitatē
duritiēq̄: tametiā interueniunt alia quapiam
substantia crassiuscula (quę ex proprio eodemq̄
crasso ipsorum ossium alimento redvndat)
crefcentē in labris fracturę, possint eū quod il-
glunno separatē ossis partes connecti invicem,
atque cōglunari. At verō quā abvndē sum mol-
lis, quæta in puerilis cōspiciuntur, ea sola vni-
tionem recipiunt. Ergo si os aliquod per trāsver-
sum frangatur, si disident ā se eius partes, vt ē
directo nō taceant: quare primō curandū magis
est, vt in directū & contrarium agantur, iuxta inte-
grę exemplum: si qua nimirum certissimā trāspō-
sitionis fracturorū ossium indicatio sumenda
est. Quæcūq̄ igitur retrorsum (exempli grana)
magis sunt acta, ea prorsum magis impellē cōve-
niet: nec minus alteram quoque fracti ossis par-
tem modicē ad contrariā retrudi. Contrā, quę
prorsum sunt emora, hæc rursus ipsa quidem re-
trorsum, reliquā verō partem sensū duci prorsum:
nec secus de ceteris differēntiis. Cauendū
tamen est iterum, ne in adducendū cōtrario mo-
tu partibus, extantibz fracturorū ossium frangan-
tur. Quibus sanē cōfractis, non poterunt ad a-
mulum iterum se coaptari fracti ossis fines. Ob id
quę disidentis ossa, ē directio ad mortē esse opor-
tet: q̄d cōmodē fieri nequit, nisi retracta fiat, idē
aut manibus, aut vinculis, aut instrumentis. Pos-
tea verō quā abvndē reclusa fuerint, nec vllus
superfit metus, ne se in adducendo tangant, tam
iā directū opponere, vinculoq̄ remittere, ac mu-
sculis ipsa diductorum in idem commissiōnem
permittere expedire: interim verō te ipsum quoq̄
manibz, subseruire: & sicubi aliquid paululū sub-
sultet, corrigere atq̄ formare. Ab his secundum,
quod

Intestini os-
sibus vulneratū
quid agendum,
tandem traf-
sa rē facili
faciliē desol-
vitur: autem
quæ tenuia
sunt, etiam
tenuis nigris
velis, ut
incurabile.

Omentū trahi-
te per vulnus,
quid agendum.

Fractura fra-
gura vnitio.
Ossa vt con-
nectantur, scopus
quæ sit.
Ceterū gluti-
nandū vni-
onem ex alio
ut vnitio.

Ossa postvbi
sola possunt
vni coalescere.

Fractura cura
ita.

Abdomen vol-
neratum cō-
suendo firmiter
ad modum.

quod diriges, fuerit, vt immotus prorsus membrū cōstitat, nequid eorū quæ efflueris, moueatur. Ne verò per motiones ipsas disiungantur ossa cōmissa, tuta deligatura cōplecti fracturam oportet. Quam sanè deligaturam nec adeo debemus arctare, vt eam cōprimat: nec remittere ita, vt sit laxa. Ac pectori quidem lanissima fascia cōgruit: artubus autē & iugulo, angusta, sed quæ tantum ex versuum numero securitatis adiciat, quantum ex angustia deficit. Ad hæc deligaturæ principii

debet super ipsam fracturam inuici, ac circūduci bis terve: hinc verò ad membrum reliquum dispensari. Si quidē qui sic deligat, & ab integris ad laboratrem partem sanguinis cōfluxum arceat, & quod iam collectum in ea est, exprimit: prohibet quæ circa fracturam excitari tum phlegmonem, tum sphacelum, quæ osium carnes & corruptela existit. Cæterum quum dux partes sint, quæ & recipere aliquid à laborante particula, & transmittere ad eā possunt: vni quæ superiacent, tum

propter multitudinem, tum magnitudinē, ad ambo magis sunt habiles. Extremæ verò, ppter causas cōtrarias, exiguam quidem aliquid vel recipere, vel transmittere possunt: at multum nec ægris subministrare, nec ab ipsis recipere. Sed nec sola deligatura fasciarū est sanè ad cōmissorum osium tutelā, nisi etiā & splenia vnā cū fasciis exteriorib. adhibeantur, quæ licet quoque ipsa stabiliant. Ne autem phlegmone oriatur, cerato est humido vrendum. Iam verò repositionis figura eligenda est, quæ à dolore maximè sit immunita, quæ nec phlegmonē particula cōtrahat, & æger persistere in vna eā diutissimè immotus possit. Ac talis sanè est quæ maximè naturalis membro, vt brachio quidē, angulosa: cruri verò, quæ paulo minus potest esse. Verum ad dolorē vitandū, non modò naturalis habitus cuius instrumētō est utilis, sed etiam consuetudo quoque cōducere nonnihil videtur. In vniuersum autem tum extendere, tum effingere, tum deligare, tum reponere, vna eā figura, quæ doloris minimum habeat, est studendū. Soluere autē deligaturā tertio die debet, ne in membro prater solitum cooperito, dolor aut pruritus creetur: nec eius, quod in fracturæ est infixū, perspiratio prohibeatur. Cuius occasione nō modò noxius pruritus quibuscūq. accidit, sed etiā cutim ob acrimoniam saniei erosam exulcerari. In funderidū igitur tantū temperate aquæ est, quantum ad evocandū euimodi saniem sit satis. Quod si rursus quoque simili modo facies, vni septimo id à primo die facere debes. Apparterint verò iam omnia phlegmone libera, & si pro naturali habitu magis aliquid gratiā.

Tunc igitur licebit & ferulas circūponere, & soluere ex maiore intervallo. Nā aures quam phlegmone periculū esset, nō erat tutum ferulis premere. Quod si ex longiori intervallo eas soluas, callus multo felicitas cōtineat. At vbi adeo excruciatum fuit ossa, vt callus produci nequeat, tertio vel quarto die modicè aquam calidam infundemus, donec carnes in rubrum tumore amollantur: dehiscentibus prius q̄ subdere incipiant. Vbi verò aliquid digerere volumus, nō prius est desistendum, q̄ quod ex perfusione intrumit, subdat. In quibus autē, quo minus callus in fracturā

pveniat, humiditas abyndatior obstat, ibi hanc ficcare cōuenienter deligaturā, & pfusione aquæ, quæ vel minimā omnino sit, vel plurimā, conabimur. Minima quippe, humores qui in superficie sunt per spiritū digerit: & qui in alto hæret, modicè liquat. Plurima verò, digerit plus q̄ attrahit. Cōstat autē, in ea qdem deligaturā quæ exprimit, minus esse actūs osium fasciarum fines: in ea verò quæ ad renutriendum est comparata, nec minus hos esse actūs, & vniuersos circūduci laxiores faciendos. Quo tempore callus gignitur, nutriendum corpus est cibus optimi succi, & qui multum nutrit: ex quibus pvenire succus consuevit, nō solum bonus, sed etiā tenax, qualis desideratur ad calli generatōē. Magnitudo autē calli ea sit, quæ & ossibus tuto vinculo existat, nec musculis tñ cōprimat. Quare danda opera est, vt si minor iusto pveniat, augeatur: vel inhibeatur, si immodicè crescat. Sunt verò quib. hæc efficias, ipsius perfusionis quantitas, qualitasq. præterea ciborum quæritas, & medicaminū quæ illi imponuntur extrinsecus, facultates. Etenim quæcūq. emphaticè substantiā habent, ac modicè calfaciunt, ea callos tum promouent, tum verò augent. Quæ verò digerendi vim obtinent, ea magnos is callos diminuant. Cōseruant in proprio statu, medicamenta quæ cruentis adhibentur vulnerib. Atq. hæc tenus de transferis fracturis. Longæ autē, similes sunt curandæ, cæterum cō primendæ magis in ipso fracturæ loco: tñ quod recessit, retrudendū intusiorum est. Quæ verò multifariā cōfracta sunt, iis splenia circūdenda fasciæ ritu incurra, vt monet Hippocrates. Medica menta etiā omnia ex siccanū sint numero, atq. ex iis quæ enema vocant. Capitis autē fracturæ simplices, quæ ad secundā vig. laminā caluarie perveniūt, scalpellis angustis indigent. Expedit autē hos, vt numero multos, sic effe magnitudine impares. Atq. vbi os vinarum nudatū fuerit, primo quidem vrendum latiore est: secūdo loco, eo qui sit illo angustior: mox ita deinceps reliquis, vig. ad angustissimū omnium: quo sanè est in lapa secunda lamina, quā duploem appellat, vrendum. Post hæc tum pronus, tum ad finem vig. fissis est medicamenno medendum, quæ ob id cephalica vocitantur. Ea cōponuntur ex iri illyrica, & erui farina, & mīna, & aristolochia, & panacea radice cortice, & in summa, omnibus quæ ex tergere citra morsum possunt. Ipsa namq. generatio carnis, naturæ opus est. Itaq. ægro ad eam rem nihil est opus arte medica. Vt autem quæ pvenit caro coalescat, circumhæretq. omni ossis parti, id inde maximè eveniet, si nec fordes super eo sit, nec oleosa quæpiam pinguitudo. Id igitur est, quod ægri medici ad carnis productionem præstant, vt totus locus fissus sit, tum quælibet ossis vicini pars planè pura. Ex fracturis verò quæ ad cerebri vig. membranas pervenerint, si simplex tantum fractura sit, angustis scalpellis vrendum. Sin cum confusione aliqua, quod contusum est, excidi debet: idq. vel terebellis prius in circuitu foratum, ac mox calpis admons, vel protinus ab initio cylindricis. At quæ per terebellam quidem ratio fungitur, parum rata est: propterea quod dum audacius eam tractant, duram

Callo generato qualis vni ratione conueniat.

Callos prominentes emphaticè medicamenta, quæ modicè calfaciunt, Callos minores, Callos in statu proprio seruati, Lingue fracturæ curandi ratio.

Capitis fracturæ curatio.

Cephalica medicamenta.

Carnis productio, naturæ opus sit.

Fracturæ simul et contusæ capitis ossis curatio, Terebella vsum in fracturæ capitis, et in partem taram, Galen. damnat.

Fracturæ ossis deligando ratio.

Sphacelus ossis osium carnes & corruptela.

Splenia fracturæ osium confirmando requiruntur.

Ceratum humido.

Figuram eam ossis fracturæ eligendam esse, quæ minimè doloris sit. Fracturæ ossis, ratio ad solvendum esse.

Ferulis quando vrendum ad fracturæ ossis firmam. Perfusio ossis calida quando vrendum circa ossis fracturam.

est: securitas tñ impar. Nisi. n. cuncte q̄ ei q̄d curatē
circūdate sunt parculi, valide planē sint, verē
dum est, ne ab iis q̄ refrigeratē, noxi contrahat nō
leuē. In reliquis duabus qualitatib, est securitas
similis. Tēpus tamē curationis in sicca intēpere
multū amplius est. Quippe q̄d senium in sanis, id
in egriis sicca intēperies existit. Itaq̄ etiā insanabi
lis est, si prius sit cōsummata: nēpe vbi solida par
tū similitudinē subitāna reddita fuerit sicciōr. Nam
est & altera sicciōr, vniq̄ quā ea, quorū subliāna
in humore cōcreto constat, sicuti caro & adeps,
sunt liquata. Bñā tertia, quum ppria humiditas,
vnde partes nutriūtur, & quē in illis habet, veluti
rōū quiddā sparsū, omnino est absumpta. Diuersa
ab iis sicciōr est, quē in ppriis cuiusq̄ particule
exhib. artēus atq̄ venis cōstitit. Provenit autē &
hæc nō penuria sanguinis. Omnib. igit̄ his sicciō
ribus maxime cōtrarius est austerorū vsus: appe
tus q̄ si qd in iis superest naturalis humoris, id ab
sumit, partim cibētia, partim in sinū vērper per
exiguos meatus exprimētia, partim ad cōnētes
partes tradētia. Curabis ergo ipsas, si meatus q̄
cōtracti sint, dilataueris, ac qd in vicinis particu
las est impulsū, reuelas: præterea singulas simi
lariū partium propria humiditate, humectan
tis nutrimentū ope, repleas. Cui negotio lac asini
num ex ipso animalī suctum, vel maxime ex vsu
est. Quiddā si asinum sugere eggerit grauetur, ex
pedir vt quamminimo tempore lac in ambiente
aëre moretur, ppter ea q̄ celeritū mutari est a
ptum, genitalis feminis rita, quod nec ipsū ali
quando extra propria vāse morari patitur. Opti
mū aut, vtore cognatū, existit muliebre lac
quod quidē sugendū iis videret Prodicus, qui ta
be absumūtur. Sed quoniam id exhiberi sibi ceu
pueris pleriq̄ recusat, vtiq̄ ceu asinis, asinum
ipsis dari conuenit. Id siquidem reliquos omni
bus ad propriū affectū vilius est, quum &
tenuissimū sit, coagulētūq̄ minimē, & quoquo
versus ocyssimē digeratur in corpus. Est itaq̄ lac
ipsum ius tum per se dandū, tum paulullū ei repi
dū mellis miscendū. Ceterū quod mel flavo est
colore, odore suauī, tum purū adeo, vt totū pel
luceat, ac gustanti parum acre iucundissimūq̄:
præterea tam libi hærens, vt si attrollat digito,
cōtinuum sibi, nec intercisum, ad humū desiliat,
id omnium optimū iudicatur. Si verō abruptū
tur, nec demissū, ad terram vsq̄ continuitatem
tuet, id aut crassius iusto est, aut tenuius, aut dissi
milium partium. Debet autē nullam penitus al
terius cuiuspiam rei eminentem in se continere
qualitatē oponium meli. Quare quod thymum
planē odoler, minimē probō. Ad eundem modū
& lac nullam externā qualitatē odore gu
stūve præ se ferat: sed eio quāmodulissimū, & si
bripi conueniū, & pvt lacti cōuenit, splendens,
super omnia, quoad eius fieri poterit, similes par
tes habere. Quō verō tale lac fiat, & idoneis nu
trimentis alendi animal est, & exercitationib. me
diocribus exercendū, & pullis, si quem lactat,
auferendū. Quōd autem ætatis quoq̄ florentia
esse vel maxime debeat, id neminē laret. Curan
dum quoq̄, vt quamoptimē concoquat: cōtem
pus videlicet iis, qui si asinus quoq̄ p̄scribens
victus rationē, nō debet. Fungamus igitur ægrum

aliquē tum lotum esse, tum lacharisse: hunc ad
secundam vsq̄ lauationē quiescere p̄mittemus,
tum modicē, incubimus, & pinguit, vniq̄ si lac
quod sumpsit, iam ad vnguem consecit: id quod
tum ex ructu, tum ventriculi mole, nobis licet
coniciere. Modicum verō temporis inter primā
& secundam lauationē intervallū erit, si quatuor
aut quinque æquinoctialū horarū intervallum
interit, scilicet si tertio adhuc lauare parat: sin al
iter, plurius. Sanē tertio lauabis, si multis lauari
onibus fuit assuetus. Quinetiā post quāq̄ lauari
onem hominē vngemus oleo priusq̄ se vestiat: ne
videlicet plus digeratur equo, sed obstitit ructu
ga curis spiramentis. Quippe conductā & remu
tricanonē id quoq̄, sicuti & frictio. Iam verō si
ue cuiuslibet partī corporis temperatam infundas
calidam aquam, siue frices, siue laues, siue aliter
quomodo cumq̄ vasa facias, primum quiddā attol
latur, quod efficiat gratias: id eōq̄ vbi carne im
plere quod libet corpus studemus, id eatenus cal
faciendū nobis est, dum intumescat: vbi verō
primū intumuerit, tunc superferendū est. At si
digeret & evadere contendimus, eatenus con
nuandū est, dum qd prius intumuit subdant.

Si æger igit̄ desideret lactē, post secundā quoq̄
lauationē id exhibebit. Sin aliter, p̄fauā diligen
ter coctam, aut ab aliis p̄fauā ritu preparatam.
Hinc vbi rurū quēuērit, ad tertia redicendū
est lauationem, aut tertia ad cōnam. Si autē præ
paratus illi panis purus, probē coctus in furno,
quicūq̄ tum ferment, tum salia, quod satis est, ha
buerit. Opsonium quoq̄ sit ex saxatilibus pisci
bus, aut ex albo iure assellus: necnon alia testellū
gallinacei, qui lactē sit alius. Quorū si copia non
est, aliis vtendum. Ad eundem modum & per di
cibus, & montanis auiculis, quē mollem carnem
fortiuntur, vescendū. Vitanda autē & quæ pul
stria sunt, & quæ carne sunt dura. In summa verō
alimento sit coctū facile & nutritum, minimēq̄
glutinosum aut excrementitū. Porro omnīū ci
borū, quos nouimus, maxime nutritēs sūlla caro
est, verū nō æquē ac prædicta, cōcoctū facilius
præterea glutinosum succum crassūq̄ generat.
Quare hac vti ad propriū affectū non cōue
nit. At vino vt vrantur omnes, quibus refici cor
pus est opus, cōsulo, modō nō febricitet. Estō ta
mē id & aquosum & astringēs leuiter. Aquosum
natura appellō vinum, quod tenue est, & purū,
minimūq̄ aquæ missionē ferens. Quædum autē
a vino est, q̄ feriat vires imbecilliores. Rurū
nouellū vinū rum aquosius, tū imbecillius quo
dā modū est, q̄ vt vino cōueniat. Adde etiā q̄ egri
us cōcoquitur, ac magis excrementosum est. An
tiquius verō, vt vinosius est, ita vehementius ex
stet, q̄ vt pprius sit ex vsu. Porro aquæ vitæ pen
dit eius frigidiore causa: culus culpa & mora
ra in precordiis diuissimē, & fluctuationes ex
citāt, id in flasti ventur, & corrūpitur, adeoq̄ ve
trici robur resoluūt, vt deterius proinde cono
quat. Sed nec digerēdo per corpus alimento ma
gnopere videt aqua cōducere. Quib. sanē aquæ
visus, quale nuper diximus vinū cōtrarias virtu
tes obnert. Porionis itaq̄ is erit modus, vt neq̄
in vtriculo innaret, nec fluctuationis viliq̄ sensū
invehat: cibori verō, vt vel nō grauet, vel grauā

Vallens ex o
leis obstat, quo
minus digeratur
ac resoluatur
interfici.
Carū supen
da minū legi
quale frictio
persuadeo deso
derat.

Trope galind
en.

Sulla caro est
maximē nutritē
manti. xxi tamē
cum coquitur.

Vino vrantur
omnes quib. res
fici corpus repe
dit, dammodo
nō febricitet.
Vini aquosum
Vini vinosum.
Vini nouellū.

Vinum anti
quum.

Aqua vitæ
provenit ex
eius frigidiore.

Aqua distilla
da alimento
per corpus non
vultus vngue
admodū cōducit.

Sicca intēper
ies in ægriis est,
quod sanis in
sanis.
Siccitas chlam
mata est insa
nabilis.
Siccitatem spe
dei variā.

Austeriorum v
sus sicciōribus
ab vterius ma
ximē.

Siccitatem co
trario.

Lac asinum
sicut affertur
maximē cōgr
ui offit.

Lac si in airo
aliquid aliq̄
mōtur, motū
re promptū.
Semen galeale
extra propria
vāsa curatū.
Lac muliebre
affert optimū ta
bida.
Lactis asini
prærogatiua.

Mel optimū
quale est do
beat.

Lac optimū
quale.

Animal cuius
lactis vti volu
mus, opus est
se viciū ratio
ne educandū.

re quicquid deficiant. Ab hoc tenio inflatioque precordiorum virandæ iis sunt. Ergo si ob affectum ventriculi totum corpus macrescat, exquisitior victus ratio desideratur, propter concoctionis imbecillitatem. Vbi vero æger sanior est redditus, ad refectionem eam transferendus. Id fiet, si pluribus & fricationibus, & gestationibus, quæ antea, vitæmur: ac ciborum rû qualitate, tum quantitate mutabimus, ita ut plures & valentiores quæ prius exhibeantur.

*Refectio rati-
onem rationis,
modum admi-
nistratur.*

*Heferuam quoniam
recreant aciem
porcellum, facili-
tatem concipiunt.
Vt si ex aliis
dum est alimen-
tum valitum.
Mactentur
fuit cibis par-
tes, sed crebri.*

*Cibi cur traf-
fionem non causa
danda.
Habendum illi-
cibum causa que-
bus non fit.*

*Can valens imi-
nus velus rati-
onem, modum ad-
ministratur, quæ
fuit, & causa
quæ agere debet.
Conferunt cibum
vinculum.*

*Vigilia quibus
fuit aduersus
ma.*

Quæ vero ad sanitatis statum, pro modo ventum tam fit, cibandus volatilibus est: illi iam offerre carnes suillas licet: primum quidem, porcelli pedes in prisa elixos, deinde pernam: ab hac etiam reliquas partes. Quæ porcellis: si hyems sit, pridie fuille iugulari oportet: nam heferus, quæ recens necatur, facilius concoquitur. At æstate factus fuerit, porcellus manet immolatus fuerit, ac iuxta occasum solis edatur. Quippe semper alimentum valentius ad vesperam exhibendum est. Quod igitur qui macilentissimi sunt, plurimo nutrimento indigent, nequeant autem vel quid medio crece concocquere: paulatim eos, sed spissius cibare erit melius. Atque hac sane de causa ipse eos ter cibare sum solitus. Verum quando iam manifeste meliores sunt facti, etiam bis utiui iisse sit satis. Quare tantum exhiberi primam cationem est rationabile, quanta prius quam secunda sumatur, tota prius erit concocta: id quod valentiori contingere alimento non potest, sed circa primo loco leue sumendum eis est, sicquid autem crassius: quando quidem & quies, & somnus, & longius tempus, huius naturalis administratione excipit. Id vero bibendum illico post cenam non est, antequam cibum fuerit concoctus. Siquidem in natæ cibi si bibat, ita ut eos ventriculi corpus, propter humoris interpositum, non contingat. Ceterum si magna sit torquedus, tantum illi est, pinandum, quod & molestum soletur, & situm leuet. Vbi vero nutrimentum concoxerint, abinde bibere sunt sinendi. Manet autem post somnum, quum deiecerint, & paulum inambulauerint, modice sunt fricandi, videlicet donec corpus in caleat: mox gestationibus utendum. Deinde rû laudum sunt, tum fricandi, idque intra vel circa meridiem. Quum igitur cõualefcentium victus ratio media quedam sit inter eam quæ saniorum propria est, & quæ ægrorum: difficile minime fuerit, ex iis quæ de vtriusque sunt prodita, ut per se ipsum quæ mediis inueniat. Domus in qua cõualefcentis nutritur, sit temperata: labor admodum ut ad eos cibos reducat quosque, quibus insuevit: naturam interim proprietate obseruat, nec non regionis & temporis. Sciendum autem est, vniuersum corpus rû habitum excitari a vigiliis: ac proinde eas infestissimas esse iis qui ex siccitate laborant. Quod vero ad nutrimenti modum spectat, si corpus modice siccum sit, vbius nutrire id licet: propterea quod vires eius, quæ vtriusque alimentum conficiunt, penitus non condecunt. Si vero immodice, parcius, contraria ratione. Porro in temperies sicce, vbi solida corpora cõtingerunt, si quidem in vna quapiam parte consistant, vel vni nuncius ventriculo propositum est, nunquam integrè sanabuntur: neque in eum statim qui ante morbum fuit, reuertentur: sed in reliquam vitam particula affecta laborabit imbecillitate. Quod si in temperies sicca etiam solida cordis partes occupet, celeriter

sic affecti inarescunt: quem marasim, Philippus vocat ex morbo senili. Id itaque breui mortem conciliat. Proxime illuc, qui à iecinore inceptus est. Mox qui à ventriculo. Qui ab aliis partibus ortu habet, tantò tardius, quanto quilibet harum ignobilior quam ille existit. Ceterum victus ratio eadem genere est, cum in hac siccitate, tum in illa, quæ solam eam humiditatem absument, quæ nutrit solidas partes. Præterea etiam in tertia, quam supra memorauimus, siccitate. Facillima verò omnium sanatio est celeritima. Scire autem licet, solidorum corporum siccitatem, si perdetur, succedere necessariò frigiditatem. Celeritè namque ex nutrimento defectu refrigerantur partes, propterea quod ex calido sanguinis succo nutriuntur. Si igitur siccitas partium iuncta frigiditas sit, duplex erit medendi ratio, humectans scilicet, & modice calfaciens. Nam quæ calfacient impense, iis vehementer succidit vis inest. Quare calfacientis materis humectantibus medicamentis tantum miscendum est, quantum particula ad frigus ratione siccitatis inclinat. Proponamus ergo (exempli gratia) ventriculum tum siccum, tum modice refrigeratum alicui esse: huic certe simul cum lacte vberius mel exhibebimus. Vinum verò, quod minus aquosum quam prius sit, & plurius annorum, dabimus. Quæ tamen esculenta omnia calidiora offeremus: idque tum naturali temperie, tum ignis opera, sic coparata. Nardino præterea vnguentum vnguentum admodum est venter, sic ut nunquam siccus remaneat. Eius si siccitas non adsit, vitæ masticino, aut opobalsamo, & pice, & misto dictis vnguentis. Quod si cupis ut magis ea corpori adheret, certe nonnulli est admiscendum. Si ær ambiens sit frigidus, istam opobalsamo aut vnguento nardino imbutum, in quibus liquata prius Chia mastiche fuerit, admovebis ventriculo. Præsterit autem imbucere optimè purpuream, qualis est Tyria: quando & astringi ipsam modice, & cutis eius meatus obstrui expedit. Siquidem quæ rarum habitum faciunt, & relaxant, ea tum dægerunt succus, tum particulas frigidis extrinsecus aduenientibus obnoxias reddunt. Quæ vero valenter astringunt, ea siccant. Quo fit, ut medicamentum quod eiusmodi corpora calfacit, id neque evocantem vim habere expediat, neque astrictioriam multam sibi immittit. Memineris etiam, qualiter acerbam, sua quidem ipsius virtute, & refrigerare & siccare: quare etiam prohibenda est in huiusmodi affectibus. At si cum sicca in temperie multa frigiditas adsit, in nardino vnguento similiter Chiam mastiche quam pinguis- simam solves, ac purpura excipiens, vitæris. Comodissime etiam adieceris opobalsamum. Dandum præterea vberius cum lacte mel est, sed super prunas ex quercu vitæ, despumatum curiose, quo & minus sit excrementosum, & magis nutrit. Quæ tamen mel ipsum despumatum per se optimum nutrimentum frigido ventriculo est, ut aduersissimum calido. Vinum autem elegendum semper antiquum est, eoque antiquius, quod maior fuerit frigiditas. Sed nec adeo esse debet

Senium ex morbo

Siccitas siccitatis quæ

Siccitatis corporum solidum si perdetur succedere necessariò frigiditatem

Ventriculo sicce, modice refrigerato, quæ medendi ratio debet.

Ventriculo sicce, modice refrigerato, quæ medendi ratio debet.

Purpura Tyria.

Acerbam quæ tatem refrigerare ac facit.

Mel cum lacte conferre vniuersum siccum, immodice refrigerare. Vinum antiquum semper antiquum est, eoque antiquius, quod maior fuerit frigiditas. Sed nec adeo esse debet rû,

Vina amara
incommodi
sunt.

Potations in
quibus vitium

Facilis admo-
tus ventri, si
nec calorem si-
lum.

Fomenta cali-
da quibus vi-
tus est.

Ventriculus ad-
motus ficit, et
modico incal-
escit, prater na-
turam, qualis vi-
tus ratio fit ex
vitiis.

Ventriculus in
tempore la-
tente calida, et
modico incal-
escit, prater na-
turam, qualis vi-
tus ratio fit ex
vitiis.

Humida inter-
peries facili-
ter curatur.

Ventriculus in
peries esse cor-
ruptus, si cal-
idus.

vis, vi iam amarior. Siquidem vina amara, immo-
dieste ficit. Sane opum medicamentum talis, om-
nibus sit, quo picatores hinc utitur. Ergo illi
re eo totum ventrem, si vitiis & alias oēs particulas,
que alimentorum visu non pmouentur, conueniet, ac
post avelis, priusque refrigeret. Quod quidem si bis
vno die feceris, ab vitiis fuerit. Naturalis ventriculi
calor tueretur & fouet ad motus puellus qui boni
habitus sit, & minimè cute humecta. Sunt qui ca-
tellos pingues in hinc habeat vsum: qui etiam ex vi-
tu sunt ius, qui, ppter siccitatem solam habet imbecil-
litate ventriculi. Nocet autem interperantia eiusmo-
di, fomenta calida: quæ quidem sicca sunt, eo quod rorē
similariū depaſcūt corpori: quæ verò humida, &
hinc digerūt, ponsimum vbi largius vis vitium,
præterea quod nimis rarū, frigorigi opportunū cor-
pus efficiat. At si multæ siccitatis sit calor non admo-
dum multas adiunctus, abstinendū à melle est, vi-
nūque minimè antiquū bibendū. Iam cibos offe-
remus tepetes: sed si æritas sit, qualitate referentes
aquā fontanā. Ventriculū autem vngemus oleo
tūm crudo, tūm melino. Ac multo sanè magis, si
pluſcula caliditas sit, ipsum vinum tum aquosius
exhibebimus, tum sub eo fingere, quod fontis a-
qua per medium ver exhibet. Illud nobis persua-
dentes, eiusmodi affectū febri proportionē cor-
respondere. Nam quod illa in toto animali, vel in
corde est, id propositus nunc affectus est in ven-
triculo. Cæterum vbi valide in ambabus qualita-
tibus immutata quævis particula est, omnis vis
ad hoc perit, atque labefactatur: nec facile quod sic
est affectū, ad suam naturam reuerti potest. Vbi
verò altera tantum qualitas pluſculum immuta-
ta est (vel vni nunc siccitate finissimum) reliqua-
rum autem aliqua se habet mediocriter: vitium qui-
ta est affectus, sanari potest. Si ventriculus inter-
perie affigitur calida, cui mediocriter humiditas
iuncta sit, facile affectus in frigida potione cura-
tur: quoniam minimè ex ea ledantur partes vicinæ;
vtpote se habentes mediocriter. Nam in siccis ven-
triculi affectibus, necesse est non ea modò quæ pro-
xima sunt, sed etiā totum corpus gracilius reddi:
ac proinde tunc porus frigide maiori cum peri-
culo administratur. Sic vbi verò adeo velenosa
caloris intemperies ventriculū occupet, vt vsq;
ad cor ipsum pueniat, febricitare hominē est ne-
cesse. At intemperies humida vtique acidat, fa-
cillimè communi curatur. Cuius quidem, si sola
constat, remedia sunt cibi citi valentem calefa-
ctionem, refrigerationem ve siccatem: præterea
confusæ potiones parcatas. Eius autem quæ cum
caliditate coniuncta est astringentium tum cibo-
rum, tum potionum minimè calfacientium vsum,
necnō potus frigide, quæmadmodum illius quæ
frigori est iuncta, opima præſidia sunt acia om-
nia: quibus admisceri debent quæ acerbæ sunt, mi-
nimè tamen videntur refrigerantia: præterea po-
tio ex aqua, cuius vini in signum calidi, veterisq; in
vniuersum autem, calida intemperies ventriculi
refrigeranda est, frigida calfacienda, humida sic-
canda, sicca madefacienda. Ad eundem modum
quæ ex duabus qualitatibus intemperantur con-
ſtat, reliquis contrariis sunt retundenda. Pesi-
ma autem omnium est intemperies, inter simpli-
ces quidem, sicca: inter compositas verò, sicca si-

mul & frigida. Atque hæcenus de ventriculi inter-
perantia, citra humoris affluxum. Vbi verò ali-
quis humor aut in ipso sinu ventriculi interseſcit,
aut imbibitus in illius tunicis, aut delinquent
nec exiterit, expurgandus ille est. Quod si ab aliis
partibus transmittatur (id quod ex toto corporis
habitu, ac tum singulari partium exploratione,
tum ex vacationibus solitis reſentit, necnon
cōſuetâ victus ratione cognoscitur) primò illis est
succutendū: dein verò roborandus ventriculus,
quod eorū quæ ad seſe conſiunt, minus promptè
quicquid admittit. Verum si quid ex minus momē
taucis facta translatio sit, quod superfluum est, tur-
sus ad ea reuelles. Sin ex iis quæ maioris momēti
sunt, ambobus simul conſules, cui ſemper affectū
submouēs, qui fluxione excitet. Erit id, si omnes
corporis partes ad bonam reducereſ habitudi-
nem: omnemq; expulſiones nature, fluxiles ſemper
reddideris. Quod si ob æqualitatem in toto corpore
redvandantia humorū, ventriculū fluxione tēte-
tur, totum corpus est euacuandū. Si ppter mali
succū ab vndantia, ea purganda est: atque lunc ad ven-
triculū cōuertenda curatio. Quæ igitur in ſinu
eius cōtinentur, cōmodè expurgantur per vomitum.
Verum si quod plures dies prauis humor
decubuerit in ipſum, vter aliquod ſibi vitiū cōtra-
xerit, haurit intēperſiue, qui sic laborat, ab anſthē
potione vitetur. Per cōtraria autē corrigindū ea
intemperies debet. Si vitioſus succus in ventricu-
li tunicis sit receptus, curari in affectū debet phar-
macis quæ modicè purgēt. Cæterum quæ ex aloē
componuntur, omniū sunt longe aptiſſima: nec
ſecus ipſa ſola aloē. Quæ quidem si illora sit, valē-
rius vacuat: elora autē, purgas quidem minus, ſed
roborat ventriculū magis. Expedi ergo para-
ram habere hierā, tum ex aloē illora, tum ex elora
confectā. Admiſcentur autē, buius drachmæ ſe-
tenis, cinnamomi, xylobalſami, alari, ſpicæ nar-
di, croci, & Chiz maſticheſ, ſingulorū ex drach-
mæ. Præſtituſi mihi hoc medicamentū eſt cōtra viti-
oſos ſuccos, qui in tunicis ventriculi habētur: vti-
liſſiq; fuerit eo ſiccō ex aqua vii quādam partium
cochleariū menſura, vbi mediocriter illo vti ſtu-
deamus. Siquidem maximus eius vitiōſus, eſt ma-
gno tum dūm coctilearium ponō, in aquæ tem-
peratæ cyathi tribus: vt manuūq; vna parū.
Vtendum verò hoc tempore & pſiſſimæ cremore
eſt, qui primus à balneo ſumet. Nam medicamen-
tum ſolito purgatiū medicamentorū tempo-
re dabitur. Poſt id verò, vbi modicè in ambulaue-
rit, de reliqua victus ratione nihil ſit immutan-
dum. Siquæ repouant medicamentum, exſipientes
id deſumato melle: & ſit qdē ſic durabilius,
cæterum non perinde ad propoſitos hoc loco affe-
ctus valde, quā & minus ventriculū roboret,
& magis alium ſubducatur. Verūm quib. lenta pi-
uitia eſt inſiſſa ventriculo, iis prius ſunt exulben-
da, quæcumq; eā diſſecent: pſiſſa dē de purgandū.
Quod si ad vomendū ſint apti, non vtiſe iueri q;
radicalia ex oxymelate vomere. Sin verò nec len-
tis humor ſit, necraſſus, vtiq; abynde fuerit a-
pſiſſimæ ſolius cremore vomuisse item, à mulia,
Quo ſuſumendum vtiſiſſus plus eſt, q̄ vel utri-
mentū, vel etiā deſiccationis cauſa ſumeret. Ido-
neū verò eſt, eſſi multa, ut q̄ cedū abſynthiū ſit,

Ventriculus in
perantia quib.
capulatus
est humor, qui
ratione curari
est vitiis.

Abſynthiū potio
quibus sit con-
gruus præſidi-
um.

Alumini purgare
humores in co-
niti ventriculo
ambitus.

Alumini elata fa-
cilitas.

Vitæ pice de
pice.

Vitæ pice cō-
pofitio.

Vitæ fice v-
sum ex aqua vii
quādam partium
cochleariū men-
ſura.

Vitæ fice v-
sum ex aqua vii
quādam partium
cochleariū men-
ſura.

Vitæ fice v-
sum ex aqua vii
quādam partium
cochleariū men-
ſura.

Vitæ fice v-
sum ex aqua vii
quādam partium
cochleariū men-
ſura.

Vitæ fice v-
sum ex aqua vii
quādam partium
cochleariū men-
ſura.

Vitæ fice v-
sum ex aqua vii
quādam partium
cochleariū men-
ſura.

Vitæ fice v-
sum ex aqua vii
quādam partium
cochleariū men-
ſura.

Vitæ fice v-
sum ex aqua vii
quādam partium
cochleariū men-
ſura.

*Affectui omnium
manuum vergit
et, dirigi, semper
curantur consilio
non debet.*

*Affectui maxime
tudo est triplex.*

*Ventriculi gra-
uissimi laborum
humorem a capite
descendens
curatio.*

*Affectum multum
periculi sanem
posse, manente
affectu ipso, ut
de vena est, cum
fuit.*

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

ad vena est

bibant. At verò si plures affectus in vñu coeant, ad eum qui magis vrget, dirigi primùm curantur consiliū debet. Vbi autē efficiēs est, aliud quod ab eo efficitur, ipsa causa spectanda. Sin autē curari hoc ante illud non licet, ad id quod ordo dicitur, est respiciendum. Atq; in eo quidem curatio nis consiliū, quod ab vtgente initur, affectus magnitudo perpēdenda est: quae siue triplex exiit. Alia namq; ex laeae actionis praesentia spectatur, alia ex propria affectus efficiētia. Tertia prae-
ter has, ex facultate quae laeae corpus gubernat. In eo verò consiliū qd ex causae ratione initur, an-
nuadvertere dū est, quidā eorū quae inter se sunt
cōiuncta, augere aut gignere reliqua possit: quae
rursus vel gignatur, vel incrementū ab alio acci-
pian: at in eo qd ordo praescribit, qd ante qd, vel
quid cū quo, vel quid post qd, sanari possit. Fin-
gamus igitur in ventriculo deluere ex cerebro
superfluum quendam humorem frigidū: atq; eius occa-
sione intemperie quandā in vētriculo contractū
iam esse: vel potius malū iam succū per totū eius
corpus media oīa similariū particularū spacia oc-
cupasse: ab eōq; si placet, etiā mordicanonis sen-
sum, ac pīnde tum deliquit animi, tum sudores,
eū syncope quadā dissolutione excitari. Manife-
stū vtiq; est, in primis esse occurrendū ei, qd vires
resoluit. Vbi autē vires firmatae erant, nec plurimū
vitioli succi in vētriculo aderit, tūc nimirū ad flux-
ionis causam nos cōvertemus: illud qd cōperto
habentes, nō posse ad perfectiōnē vllū affectū sa-
nari, manēte adhuc ipsa, vnde natus est, causa. Er-
go si sic pīsanarimus cerebrū, vt sensibile amplius
redvndantiā non creet, vel sonitū fluxionis in
vētriculū evertimus. Ceterū si neq; copia nota-
bilis excrementorū in vētriculo sit, nec eorū quae
in capacitate ipsius cōtinentur, nec eorū quae in
tunicis, sed nec mordicatione quae officiat vmbus,
tū omniū primū sanandū ipsum cerebrū est. Ab
hoc, sinus ipse vētriculi vacuū, extendendūq;
est: postea expurgandae tunicae. Postmodū intempe-
rii medicandū. Ac reliquarū etiā partū inespēran-
tiae, similiter ita quae in vētriculo pīposuimus, sa-
nabuntur, adhibēntibus semper nobis remediū af-
fectū cōtrariū, illiq; remediōrū indicatōnē, quae
ad laboris mēbris natura sumitur, adsciēntibus.
Ea autē indicatio est multiplex. Vna quidē ac pri-
ma indicatio ē laboris loci rēperie sumit, quae
mensurā introductōe qualitatis praescribit. Secū-
da ex eo sumit, qd actio eius omnib; animalis par-
tibus sit cōmunis, aut qd cōmunē virtutē submi-
nistret. Tertia, ab ipsa partis figura. Quarta, ab i-
pīus positura: cuius portio est ad vicinas partes
societas. Tum praepter haec omnia, ipsa sensendi vel
acrimonia, vel hebetudo. Porro quēq; calidior-
is naturae partes ex frigore laborant, hae & libera-
lū, & diuinius calidius postulant. Si verò calido
morbō vrgerēt, exigū breuiter rēporis refrige-
rationē deiderāt. Si quidē parvus hic est in id qd
pīrter naturam, lapsus: quare et in id quod secū-
dum naturā, rediōr. Eatenus namq; redas ad na-
turā suā vñq; hōdō ē necesse, quatenus si natu-
rae recessus de vñu quadā via retrō ferat, quae in-
dicemur agat ei, quae facta in ipso est, transmuta-
tione. Minus imo periclitantur, quicūq; cognato
naturae suo morbo laborant. Quēmadmodū 20

tem reducendā esse ad mediocritatē diximus ca-
lidam & frigidam intemperiem, sic reducētur &
ceterae, siue eae simplices sint, siue cōiunctae. Porro
in his temperaturis quae sunt ex humoribus ortae,
si particulari sibi soli inferatur, audacter evacues li-
cet, prout affectus suadebit, sed tamē etiā virtutē
attentus. Sin necessariū opus eius sit omnib; ani-
malis partibus, veluti ventriculū & iecimonia, nō
leuis labēda sollicitudo de robore virtutis est, ne
hāc, magna semel vacuatione vsus, dissoluas. Est
autē commune opus & venarū, & artēriarū, &
cordis, & thoracis, & renū, & vtriusq; vesicae. Ce-
rebrū verò opus, quū sanū sumus, ad volūtatē
actiones est necessarium, iis scilicet instrumētis,
quibus eiusmodi actiones obimus. Quum vrgi-
sumus, necessariū non est, nisi iis tantum, quae ad
respiratū sunt deputatae. Reliquorū verò organo-
rum actio certē non est: ministerium tamē est ad
vitam necessarium, veluti pulmonis, & asperae ar-
teriae, & gutturis. Ergo ex eiusmodi particulari
quae primū vacuare redvndantiā licet, prout
volueris. Est vacuare verò & iecimonia vtiq;
vacuare non licet, sed cū cautione, vt ne quid vir-
tutis officias. Habenda praeterea est & dignitatis
actionum ratio. Maxima autem est cordis officij
dignitas, vrgentissimūq; omnīū maximē neces-
saria. Cerebrū verò ad vitam par est momentum:
nō tamen par robur eius in vrgentissimū requirimus,
quum necesse omnibus non sit nervorum ac m-
sculorum opera vti. At iecimonia opus omnibus
particulari pernecessarium est: non tamē adeo sal-
tem perpetuam necessitatem habet, sicuti ipsius
cordis. Ad portionem autem iecimonia, etiā ven-
triculi opus se habet. Itaq; ex partium functioni-
bus facile intelliges, quatenus cuiusq; robur cu-
stodiri expedit. Ad eundem modū, & quae cūq;
partes alius sunt facultatū auctores, harum quo-
que robur seruare decet, pro facultatis earum v-
sui portione. Etenim cerebrum nervus ac muscu-
lus, cor arteris, iecur venis facultatem suppedi-
tat. A figura verò, indicatio ipsius modi vacuan-
di excrementi, ad hunc modum suggeritur. Ven-
triculus vomiti, deiectioneq; inanitur. Intestina
deiectione tantū: sicuti & iecimonia causa. Re-
nes verò, & vesica, & iecimonia gibba, si multo vi-
tioso succo redvndent, per deiectiones & phar-
maca deiectiona expurgantur: sin mediocri, per v-
rinarios meatus. Cerebrum, per palatum, & au-
res, & nares. Pectus & pulmones, per asperam ar-
teriam, & fauces. A situ indicatio dabitur, vt ad
solidarum intemperies, tum ad succorum vñū,
non leuis. Nam qui per summa corporis intem-
perie laborant, iis medicamēta quae intemperies
requirit, applicabimus. Quibus autem in sum-
mo corpore intemperies est, in us rationē inter-
vallī mibimus. Si enī medicamēta iis vrēre, quae
intemperies postulat, vtiq; multo imbecilliora,
quā pro vñu tuo, ad affectū locū perveniant.
Iam ad vacuationes quoq; sinus nō nihil indicat,
dum societas laborantis particulae cum aliis do-
cet. Non spernēda verò indicatio est, & ea quam
sensus partium acuit, hebetudōq; suppeditant.
Quandocūq; omne medicamēta contrarium,
quae tardi sunt sensus, etiam si non leuiter mor-
deat, At quae acuti sunt sensus, earū vires dolore
soluā-

*Partis afflu-
quandū inde.
ēter, qd quid
tempore venae
si debet.*

*Partis afflu-
quandū inde.
ēter, qd quid
tempore venae
si debet.*

*Cerebrum.
Cor.
Hepar.
Vacuatio
modis quorū-
da a figure par-
tu afflu-
mat.*

*Sine parte af-
flicta quae mō
causae est.*

*Sine parte
afflicta quae
pericit mō
causae.*

soluuntur. Expedit igitur his, nec cōfertim, nec semel, valentibus auxilium mederi tentes, sed tutum ponis in tempore. At ubi tardus est sensus, in his etiam celeriter obire quod iustum est, licet, semel visus remedio quod sit idoneum.

GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, lib. VIII.

Quod igitur ex calido, frigido, humido, & sicco, similium particularium natura cōstitit, quodque ipse simplices atque primæ particulæ secundum tales temperaturas inter se diuisit, alibi à nobis est traditum: quemadmodum etiā duo esse morborum genera, quæ simplicibus ipsis particularibus accidunt: alterum, quod cōpositis est etiā cōmune, & dicitur vniuersis solitum: alterum peculiare ipsarum, quod in calidi, frigidi, humidis, & sicci temperie cōstitit. Quarum sanè interperantiarum, quatuor diximus esse simplices, quatuor vero cōpositas. Simplices quidem, quæ secundum vniuersalem à naturæ ordine aberrat: cōpositas vero, in quibus secundum oppositionem vtriusque ipsa natura variatur. Febris autem, vnus morborum est, quæ interperies gignit: vtriusque autem immo dicitur et auctus calor, ut & offendat hominē, & eius functiones lædat. Porro primarum differentiarum febrium, vna illa est, in qua causa adhuc adest febris creta: aut febris excitata, si dicitur. Altera vero, quæ ægræ solubiles, si soluti calibus febribus diuinguuntur: illas hæcicas, has Greci schēlicas vocant. At vero prima indicatio omnis febri, veluti à morbo est, ablationem eius præscribit. Secunda autem, veluti à tali est morbo, quæ certā quandā sublationē indicat: nepe interperies febri, quod sit caloris excessus, p. occursum refrigerantiū tollendū esse. Omnis quippe excessus per contrarium excessum sanat. Ergo si febri ipsa sit genita, causa autem quæ eam excitauit, si desit, huc tantum sanandus eius dirigitur consiliū, ut refrigeretur. Si vero in generatione adhuc febris est, causa quæ accendit illā, est submouenda. Sin pars eius iam genita est, pars etiam nūq. gignitur, consilium vtriusque fuerit: primum quidem, submouendo quæ eā accendat causam: dein extinguēdo, quæ ab hac accensa est, febrem. Excitare autem vel maxime febrem solet consipiano meatuum, in iis corporibus, quibus quod transpirat, halituosum non est, sed mordax, ac, & fuliginis simile. His igitur corporibus saluberrima est æqua dulci temperata lauatio, tum frictio quæ rarefaciat, & exercitationes mediocres, & victus qui dulces efficiat succos. Adversissima vero sunt lauatio frigida, & aluminosa, & lauatio sine abstinentia, & exercitatio acuta, & frictio vel planē nulla, vel dura, & victus mali succi, & vigilæ, & ira, & tristitia, & cura, vtriusque in sole, & fatigatio. Grauiusque autem peccare multi videntur, à carnis cibibus nihil differre, qui medicā hominibus natura biliosa, tenuissimam per morbos rationē victus iniungunt, cōstiterint in eda cōficiunt. quum nimirum tales naturæ, ex longiori abstinentia cibi, acerrimis acutissimisque febribus corripantur, à quibus promptus est in hæcicas transitus, atque ab his rursus in marasmiū torridum, aut (si os ventriculi est iniuriis ubi oxium) in eum qui syncope infert. Etenim in quorum temperie siccum prævalet humido, &

calidū frigidū: his corporis habitus gracilis, hiustus, & ignior est: ac reliquos tribus in temperatiis, quæ hac minus calidæ sunt, tactu calidior aduertitur. Plurima quæ his staua est bilis, vringit ac defectio bili saturā, & pulsus magni, & somni leues & pauci, & animi impetus veleniens. Quaræ his tum refrigerant non, tum aquæ potione, atque adeo requirunt cibum largiore congruere proficitur Hippocrates. Quam autem refrigeratio ipsa cōcilietur corpori, tum ex aliis quibusdā, tum non minus ex ciborum exhibitione. cōueniet vtriusque corpus calidius sicciorque solito est redditum, frigidum humidiusque nutritum, et exiliber sed quod nec medicamentosa villam sensu perceptibilem facultatē obtineat: nec ipsum quod nutrit, plurimum: quemadmodum neque minus quam sit ex vna. Cōmodissimum itaque tali corpori est prænascitur cremor ad vnguē coctus, in quo nullum sit cōdimentum superfluum: utpote qui & refrigerare, & humectare, ac sine sit scruare hominē potest, cum eo & g. nec halituosum, nec humidum, nec siccum detinet excrementum: quum nec astringēdi, nec obstruēdi, aliquid vim formatur. Ac quod non astringit quidem, vel gustus ipse docet, cuius vniuersi iudicare est proprium. Quod vero nec obstruat meatus, hunc licet etiā conuicere, quod non secus quæ aphronitrum, sordes cutis extergat: vomitūque à ventriculo medio cremi pituitam eliciat, nihil infelicius quam multa: quæ nec nec sim

refringit, ut prænascitur. Sin naturis biliosis bilem facit. At vero si multa, & veleniter glutinosa & crassa pituita ventriculo adhæreat, hanc radice ex oxymelite, non multa, aut prænascitur detergere est habilis. Optimum itaque biliosis temperamentis nutrimentum est prænascitur. Proximum huic, alia, cui paululum aceti ad faciorem distributionē adiectum fuerit. Tertium, quod sine aceto liquida exsistit. Iniectione vero huic, dum coquitur, aliquid porri, satus est. Nam quod tum anethi, tum salis aliquid necessarium habebit, neminē latet. Quin etiam panis in furno coctus, est vtilis cibis: sicuti etiam omnes pisces saxaniles: nec ipsi minus asceli. Proxime ascellos sunt, solea, torpedo, lupus, mulusque: post, mugil & pelago. Ois autem piscis de tenor est, quod prope lacum qui mari iungitur, aut magni fluminis ostium, pascit. Ex volatilibus optimi sunt perdices, ac montanæ oēs aucupis. Ab his, gallinæ, & phasianæ, & columbæ iuuenes. Sed nec hæc tamen intus claudendæ, quum excrementosa sint omnia, quæ exercitacione carēt. Excrementosa vero non minus sunt, tum lacustria, tum palustria omnia. Quo fit, ut ex ipsis etiā suis caribus, optima sit montana. Ab his demum sunt hæc di. In omnibus autem fugienda tum vetula, tum recens ædita sunt: illa nam duriora, concoctusque difficiatior sunt: hæc immodice humida, & excrementosa. Igitur, quibus acce aliquid quotidie transpirat (revertamur enim rursus ad institutum), si cutis eis conspicietur, facile corripuntur febri. Stipant vero ipsam, tum quæ astringunt omnia: tum quæ lentina, crassitudine sua, in exiguis hæret meatibus. Aliquando etiā ipsius cutis immoderato siccatas, exiguos meatus dēat. Qui ergo ex stipata cute febri laborant, inclināte prima accensione, ducendi omnia.

Calida et sicca corpora a natura.

Calida et sicca corpora a natura.

Prænascitur cremor ad vnguē coctus.

Galeni quid proprium.

Prænascitur in natura biliosa bilem facit.

Alia biliosa natura conuenit.

Piscis biliosi natura sanguinolenta.

Exercitacione carota esse a vno excremento.

Medi biliosi apti.

Stipantia cutem qua sunt.

Similium particularium natura cōstitit.

Similium particularium natura cōstitit.

Interperantiarum genera sunt duplex.

Febris quando gignatur.

Febris prima differentia.

Hæcica febris, schēlica febris.

Excessus omnes per contrarium excessum sanantur.

Consipiano meatuum quæ natura febri gignit.

Bilis natura, ex longiori abstinentia cibi.

Diarrhea ex cruditate fieri solet in biliosis temperamento. Cruditas autem differtur.

Febbris ex deficiente quibus frequenter. Febri à diarrhoea etiam curatio.

Fomentum ex oleo et abstinere quibus intendit.

Purpura marinis. Purpura Tyria. Ventriculi imbecillitas quae roboratur.

Tépida, si admodum ventriculi firmitudinem.

Vnguentum efficitur duplici vase. Aluo fluo quae conferunt.

Romanorum luxuriam quae vnguentis invenitur. Ceratum roborans ventriculo commendat.

Aluo fluo si venter non excernit.

Appetentia restituitur vso medicamentis ex succo cydoniarum et feni.

ter aqua quae parū apri incoctū in se habuerit, nihil est offerendum. Iam verò diarrhe febris (de quibus tantū in presenti cōmentario agere est animus) in ppositis corporū tēperamentis spemumero etiā cruditas bilis solet supervenire. Est autē pessima in eiusmodi tēperamentis cruditas illa, cūsumq; febrem accedit, in qua cibis in nidolentia & fumosam qualitatē corrūpitur: quādo ea quae in acidam vertit, vt rarō talibus naribus cōtingit, ita minus nocet. Nidorosa tā cruditas, si alius lubrica sit, minus est noxia: sin astringit, grauis existit. Febricitans etiā nōnulli & ex iis, q̄ diarrhœa ex cruditate male habet. Quib. vtq; nō minime priat febris ex defurgēdi frequentia. Est autē eorū quibus clausa alius est, & quib. fluxus, non eadē sanatio. Si igit ea tantū quae corrupta fuere, per diarrhœā vacuata esse videtur, tum lauandū, tum nutriendū in remissione febris est: sed iis quae circa ventriculū sunt, prius cōsulto. Sin ita multa inaniter aut prius facta sit, aut nunc etiā in homine dures, vt virtus iam sit defessa, satius est omīssa lauatiōe cibare, sed cōsulto prius iis q̄ circa ventrē sunt. Cōsuletur ita laborantibus, si modō vacuatio amplius non perseueret, fomento ex oleo & abynthio. Quod si quis morbus, aut doloris sensus in ventriculo adhuc super sit, amiciri peniculo post fomentum debet, qui vel calidus sit, & si siccus: vel ex oleo in quo abynthium incoctum fuit, vel ex vnguento nardū mō madens, ac plurimum expressus. Iam multo etiā satius sit, si purpura marina sit fuerit: atq; etiā longē optimum, si optima sit Tyria. Quod si os ventriculi imbecillius sit, tanta portione Chue mastiches in nardino trāsis, vnde sordium crassitudo existat, ma defacta ex eo purpurā imponemus. Esto autē abvnde calēns talem quodq; quum primū admoet. Nam quae tēpida sunt, dissoluunt ventriculi firmitudinem. Vnguenta autē ipsa calcāre in duplici vase soleo: quandoquidem aliter calcāta, vniatur eorū facultas. Ceterum fluente adhuc aluo, vtilius est optimo recentē melino, simili modo quo nardino, vt. Vtile autē ad omnia talia est & mastichinum: nec in postremis conferunt spicata & foliata vnguenta, quae Romanorum luxuriam inuenit. Mire etiā ventriculum roborat hoc ceratū quod subdam. Ceratē Tyrrhenicā, vnguentū nardinū, singulorum vnciam j. Aloēs, Mastiches, singulorum drachmas ij. Fiat ceratum. Si verō intus vratur ventriculus, ita vrastectus quidam phlegmonae similis consistere in ipso videtur, vnius est ceratum quod ex melino conficitur. Porro cibandi sunt, fluente quidem enanimum aluo, polenta & pane, quae pauxillum aceti receperit. Quod si plus nequo alius excernat, inspergere oportet polentam succo cotton eorum malorum, vel si segro magis ardeat: piriorum, aut malorum, aut myrtorum decocto. Sin venter non amplius excernit, suffecerit tum alica, similiter pisanā preparata, hoc est, aceti habēs pauxillum: tum ex ea sine aceto sorbitio: tum gallinae eorum testiculū & saxatiles ex albo iure pisces: praeterea fructuum aliquis ex iis qui astringant, vel solus, vel cum pane. Quod si appetentia deficiat sit, ex medicamentum quod ex succo, vel ex carne cotoneorum conficitur, vnum aut duo cochlearia exhibebis. Atq;

ita sanē in prima remissione iis qui ex cruditate febricitant, ventre excernente, mederi conuenit. At si omnino venter astringitur, si quidē in superioribus intestinis, vel enām in ipso ventriculo cibis crudus consistat, aliquid diarrhoea pepercon propina, eius videlicet quod in opere De tuēda sanitate laudauimus, ceu & simplicissimum, & apertissimū iis qui cruditate laborāt. Pōt deinde pprcor dis, omnēq; ventrē perfundere. Hoc verō, enām si inferius defecerint quae vitiōsa sunt, facies, plaris minorisq; ratione id varians. Siquidē plus & temporis & perfusionis exigat ad preparationē eorū quae deinceps sunt agenda, quib. in superioribus vtrius corruptū nutrimentū adhuc manet. Sin morū id notabiliter ad inferiora sit, adiuuandum aut glandē subdita, aut leui per inferna infusione est. Vtiq; si morbus simul adit, hic mingantibus nobis. Sin status, hunc cōprimētibus. Sin neutrum fuerit, ex melle, aqua, & paulo olei lippum clysmū facientibus. Vbi verō morbus vehementior vrget, Sabinum oleum, in quo aliquid ferui asnerini, vel gallinae, vel caprilli liquatū sit, est vtilius. Quodrum copia si defuit, incindendum parum cerq; est elote. Flatus verō sanandi sunt oleo in quo ruta, & semina quae flatus discutiunt, incocta fuisse: cuiusmodi sunt, apri, cumini, marathri, sinonis, aliaq; id genus. Vacuata aluo, nutrienda protinus in ceteris quidem iis quos memorauimus similiter est, astringentibus tamen a morbis. His igitur prima & secunda die obstitit, si secunda die febris defuit, hominem lauare permittes: ac vbi sequenti nocte citra offensam dormierit, sanum iam hominem prorsus existimabis. Si verō qui cruditati successit dies cum sequente nocte febrim attulerit, veltri in secundo die, ita tunc & accurandus, & nutriendus homo est. Quod si nox tertie die febrile quiddam paululū asserat, ne sic quidem est nutrimentū, sed hos quoque postriede laubis, formidūq; ac reliqua omnia in illis, vt antē definitum est, ad portionem exequeris. Acida autem cruditas non coningit in biliosis temperamentis, nisi admodum raro, idē ex cibis qui promptē accescunt: nec accendere febrem diariam solet, atq; vt nec coctionis tarditas: quandoquidem sicubi ob talem cruditatem febricitant, quibus amara bilis abvndat in temperamento, obstructionis & humorum putredinis est suspicio. Ad haec, fumidus vapor ex tarditate coctionis, aut cruditate, in qua ructus sennuntur acidi, nun quā excitatur. Quippe frigidi liturū abs talibus succis ascendant, hūcque omnino paucissimi: minime autem vapores multū, humidique, ac fuliginosique, quum ney in iis quae sunt extrā, aliter aut fumum edū, aut fuliginem videas, quā fumum ex materia semivivis, hūc genem ex immodice asēs, vtiūque. Est namq; fuligo vapor terrestris. Fumus mistio quaedam ex terrestris, atqueq; substantia. Absoluta iam in illo natura, quibus amara bilis redvndat, diariam febrem disputatiōe, ad aliud corporum temperamentum transeamus, in quo vt calidum frigidū, sic fisco humidum praevalet. Est enim haec in temperies omnium maxime obnoxia putredinis morbis, propterea quod per ipsam sanitate ad putredinem proximē accedit: id quod tum ex sudori-

Diarrhoea pepercon esse medicamentum cruditate cibis ventriculo aperiens.

Intestinum morbum lauantia.

Flatus discutiunt quae sunt.

Acidam cruditatem non contingere in temperamento bilioso, nisi admodum rari: atq; accendere febrem diariam.

Fumidum halitum non excitari ab acida cruditate.

Fumus ex materia semivivis nascitur.

Fuligo ex immo dicto vso materiae non generatur. Intemperies calidam atq; humidam, esse maxime obnoxiam morbo putredinis.

bis conicere est, qui grauius his olem: tum vero ex vitiis, deiectione, atque adeo ipsa eius expiratione. Etenim qualis est hiccorum, talis est humorum naturarum temperies. Ideoque prompta est ex qualibet occasione, tum alius morbis, tum vero febribus corripi. Si quidem quorum eorum cuius est stipara, erigere febrem non possunt. Sed nec qui valentem crudelitatem contraxerunt, aut per vitia fuerunt, aut tale quippiam aliud perpessi. Iam vero si crudelitatem nidorosam obstruuntibusque
19 tunc calida & humida, & sicce, promptius ledentur. Itaque omnes diuina febres acceduntur promptissime in istiusmodi temperamentis adeo ex qua libet earum causarum, quas in philosophia naturae retulit, curantioneque persimilis illi habet, ac in paucis omnino dissidentem. Nam quoniam haec natura humidior est, ita aqua quam illi famem & sitim perferunt. Edidit illis ex visu habundantia, quod cum laxum, non aut quod deorsum humescit. Quocumque vero de eiusmodi natura sunt diuina, eadem &
20

Natura calida & humida, magis quam calida & sicca, faciem & sitim perferunt.

Intemperies calida & sicca est ad exiguam febrem opportuna. Intemperies calida & sicca est ad exiguam febrem opportuna.

Intemperies frigida & humida est ad exiguam febrem opportuna.

Naturalem febrem quanta ordinem, semper similia postulant: vi citra, quae ad naturae ordinem aberrant. Febrem requirit viciis naturae secundum aptitudinem. Temperantia incipit a similibus postulant. Temperantia viciis, quod requiritur similibus, & quod contraria. Naturae calida semper effluet.

bis in medio temperamento consistit, ab ipsa febri contrariorum indicatione accepta, calidus humidus frigidum adhibebimus victum, quatenus siccius calidiusque autem ita reddidit corpus apparet. Humidus igitur victus (vt testatur etiam Hippocrates) febribus omnibus conuenit: maximè vero pueris, & aliis qui sic quibus affluere. Etenim febribus omnibus, quatenus febribus, ex ipsa contrariorum indicatione humidus victus conducitur pueris ex similia. Nam quod ita ex his sit quae natura nobis insunt, similes si habet victum postulat. Quae vero & consuetudine indicatio sunt, sic sumpta est, si vti & quae ab aetate. Quippe seruare quoque hanc iubet Hippocrates, penitus ad proprium, istius temperamenti. Sed & regione etiam & anni, tempore interdum indicationes sunt. Ceterum ad consuetudinem quidem semper est indicatio similia, quod & facile argotant homines. At ab aetate, natura, regione, anni tempore, & statu corporis, ubi temperata haec sunt, similibus semper praesidio est indicatio, sine valeant homines, huc etiam egrotent. Contra ab intemperantia, anni tempore, ita ut celi, & regione, contrariorum est indicatio. Verum ab aetate & natura non absolute, sed cum consuetudine. Porro nihil in contrariis indicationibus tam conuenit expendi, quam magnitudinem eorum quae adduntur in contrariis, quae quidem duplex existit altera, quae ex eorum dignitatibus spectatur, altera quae ex ipsorum propriis substantiis. Quas sunt ex collatione cum quod diocri, & quod secundum naturam est, esse accipienda liquet. Quibus igitur conspiciantur vnum indicationibus, vnam prius victus rationem constitutus. Diuidentibus vero inter se, quae valentiores & plures fuerint, eas praesertimus, ita vt victus ignem, quam he praesentent, inponamus: autem me tamem negligamus contrariam. Porro quae febri sumitur indicatio, ex reliquis, quando omnes contrarium esse sciendum distat, numero quidem inferior est: magnitudine tamen quae ex dignitate spectatur, utique superior existit, potissimum si longe & natura recessit. Quippe duplex tunc est magnitudo accedendi & quae ex febri genere provenit, quae omnis est communis: & quae propria, siquidem ipsius existit. Sin vero parua sit febris, huc est reliqua omnes conueniens indicationes vna cum ipsa conferri. Ac si quidem pares videantur, media victus ratio eligenda est. Sin altera indicatio exuperet, tantum recessisse a temperato est medio victu par est, quantum ea quae pollet, sua contraria superant. Ac diarium quidem febri indicationes ex his capiuntur generibus, ratiōe a laborans vnum modo. At febrem, quae pluribus diebus affligit, indicationes, tum vitiis respectum necessarium a dubitare, tum causas quae ipsas exortit: exceptis tamen hec his, vitiis quas nulla accendit causa; quae modum neque corpus id quod iam habitu calorem ignis in recepit, siue id lapis sit, siue lignum. Illud namque commune cum diuina habent, quod videlicet non amplius fiant: differunt autem in eo, quod diuina in leui affectu calore habent, hec in habitu qui ex
21

Humidus viciis febribus omnibus conuenit, maxime vero pueris.

Indicationes febrium sunt aetate, natura, regione, anni tempore, & statu corporis, ubi temperata haec sunt, similibus semper praesidio est indicatio.

Indicatio ab aetate, natura, regione, anni tempore, & statu corporis, ubi temperata haec sunt, similibus semper praesidio est indicatio.

Indicatio ab aetate, natura, regione, anni tempore, & statu corporis, ubi temperata haec sunt, similibus semper praesidio est indicatio.

Indicationes febrium sunt aetate, natura, regione, anni tempore, & statu corporis, ubi temperata haec sunt, similibus semper praesidio est indicatio.

Indicationes febrium sunt aetate, natura, regione, anni tempore, & statu corporis, ubi temperata haec sunt, similibus semper praesidio est indicatio.

GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, lib. I X.

*Diarrhoeam de-
scripsit qd vna-
runt circumscri-
pta dicit.*

*Diarrhoea transi-
re in putredinem,
hecticam, & mife-
re hanc mactatur.
Putredine febri-
qua,
hectica febri-*

*Stipatio quoad
placenter fuit.*

*Diarrhoea febri-
qua, & ex hinc,
ex ducuntur.*

*Synocha febri-
qua vocatur.
Synocha febri-
qua, & ex hinc,
ex ducuntur.*

*Synocha febri-
qua, & ex hinc,
ex ducuntur.*

Diarrhoea igitur curacionem præcedet libro
expositum. Quarum sanæ febrium vna ac-
cessio est, vnaque plurimum die, ex ipsarum salte-
tem natura, circumscripta. Ceterum nisi quæ eas com-
modè tractet, in reliqua duo genera febrium, nẽpe
in putridas & heclicas, transiunt. Putridas. n. appel-
lo, quæ ex humorum putredine; heclicas verò, quæ ex
immodica solidarum partium nascuntur calfactione.
At verò in illo transitu à diurnis in reliqua illa duo
febrium genera, alterum quoddam febrium generum mediū
licet imaginari, quod neutri extremitatū sit idē. Ceterū
rū mediū id, quod incidit, nec nosse quod possit, nec
reprimere, quæ extremitatū, quarū exiit mediū, spe-
ciē ignorant. Ergo ex aduisione, cruditate, laesura
dine, vigilia, perturbacione animi, vel bubone ab e-
vident causa aliqua oborto, nunquā ad tertiū vsq; di-
em, prædictarum febrium accessio, nisi quod delictū cir-
ca laborantē fuerit. At quib; stipatio febri occa-
sio est, iis etiā ultra hos porrigi accessio potest. E-
tē stipatio fit, vel obstruccionē exilub. meatibus, p-
pter glunfosos, vel crassos, vel copiosos succos:
aut cōiuentibus, ob ea quæ corpus siccant: vel deniq;
improbē cōdensatis, ob occursum causarū re-
frigerantiū. Quas igitur febres vel cōiuentia meatu-
mū, vel rectē corporū densatio excitat, hæc & post
primā accessione dēstitit, si quæ rectē ipsas tractet:
& verē diarrhoea tum sunt, tum dicuntur. At quæ ob
struccionē creantur, si hæc quædā passila sit, solus quæ
ipsæ similesit vt alix diarrhoea possunt, si quæ ea legiti-
time sanet. Sin autē aduē vehementer sint humores
impacti, vt valētius aliqd quod eam eximat, postulat,
id genus febres porrigi ultra vni dē necesse est,
ac, pinde diarrhoea generum videri egressa. Verūm si
neq; humor putrescent subit, neq; ipsum corpus
febrilē calorē susceperit tanquam habitū, vsq; ge-
nus id febriā, ab aliis duob; diuerſum erit. Quare
huiusmodi febriā natura quidē eadē est, quæ dia-
rheis, nomen verò non idem. Siquidē quæ febres ab
initio ad finē vsq; vni dē accessione fortissimè, in
multos dies porrectā, ex synocha, hoc est, cōtinen-
tes vocant. Quarum natura est duplex. Quædā nẽq;
eāz manifestā habent putredinem notam: quædā
prorsus non habent: quas nimirū esse diarrhoeas esse
genere cōstat. Quā enim accessione remissio ex
seruentiū humorū transpiratione contingere solet,
nō transpirent autē prorsus in stipatione vehemen-
ti: necesse haud dubie est, multorum dierum fieri
accessione. Igitur vbi in tali febri nulla subest oc-
casio, quæ alterius accessione principium excitet,
non modò multorum dierum evadit febriā, sed
ab ipā invasionē vilius accessione, ab initio ad finē
vna febri persistit, nec quondam, nec tertiā,
nec quartā referent. Quoniam igitur
ex duobus his fieri febri potest, & quod to-
tus vapor nō transpiret, & quod idē vapor ea quæ
conningit exalcalizat: necellum est tres esse syno-
chorum differentias in vniuersum: nempe vel pa-
ri permanente magnitudine ea, quam in primæ
accessione vigore habuit: vel adiciente semper
exiguū aliquid, minuentē: atq; lux & æqua
liter faciente, vel inæqualiter. Ac si quidem quod
accenditur, ei quod transpirat par fuerit, nec au-

geri nec minui febrilis calor cernetur. Verūm si
eorum alterum vicent: vsq; si quod vacuatur, ne-
cessariū est febri minui: sin quod adiciatur, om-
nino incrementum. Hæc itaque est continentiam fe-
brium species vna, quæ eandem naturā cum dia-
rheis sortita, absque humorum putredine in plures
dies extenditur. Altera verò contingit, vbi in om-
nibus vas, ac positum maximum, æquabiliter
fucci putrescunt. Quarum sanæ febrium in gradū
& frigido corpore neutra solet cōsistere, sed pla-
rimum in iis qui sanguine abundant, & corpulen-
tis: quando nec obstruccionē citra putredinem ex-
citare febri valent, nisi id quod transpirat, & copio-
sum, & calidum sit: nec humorum putredo in om-
nes quæ inter inguina & alas interfunt venas, æ-
quabiliter ac citius porrigi in frigido habitu po-
rest. Debet enim quæ putrescunt, tum calida &
humida esse, tum difficilem habere transpirationē.
Eōq; sit, vt neq; in frigida ætate, neq; in frigido
corporis temperamento, continens excutitur
febriā: quemadmodum neq; in gracilibus, vel qui
raro sint corpora habitu: sed prorsus in tempera-
mentis, corporibus atq; naturis contrariis. Proinde
sit, vt qui ita febricitant, iis & pulsus maxi-
mus sit, & æqualis, & vehemens, arteriæq; cōsti-
stentia inter molle & durum mediocritas. At celeritas
atq; frequētia pulsus, pro ipsius magnitudine
febriā. Hæc itaque sunt ambarum febrium
communis. Alteri tamen priuatiū insunt notæ
putredinis, nō modò in lotio, sed in pulsa etiam,
calorise qualitate innotanda. Quarum sanæ fe-
brium dignotionem & curacionem ipsū tum rati-
one, tum experientia didicimus, qui statim ab
adolescētia philosophiz studio capiti, primū nos
ad eam contulimus: mox parvis evidenti infom-
nio moniti, ad medicinæ studium excolendū ac-
cessimus. Est porro continens febriā præsi-
dium maximū, si modò vires valentes sint, sangui-
nis diminutio, vel vsq; ad deliquium animi. Pri-
mū namque in contrarium statum agitur cor-
pus, celeritē ex animi defectu refrigeratū. Hoc
verò nihil inueniri posset neq; ipsa ægia, nec na-
tura quæ animantē gubernat, iucundius viliū
ve. Postmodum in corporibus ipsius necessariū su-
peruenit alui deiectioni, nonnunquam & vomitus
bilis. Quas res statim à toto corpore maiores su-
dorēve excipiūt. Et enim vel sola sanguinis detra-
ctione sic obita, restitui olim ipse quando adole-
scētem ac densissimā laborantē synocha. Cui
sanæ post dnas à sanguinis missione horas pau-
lum nutritimē exhibui, permisi vt quæceret.
Iam verò eorū quora ex sola obstruccionē febrici-
tantes mihi videtur contigit, nemo in putredine
febri incidit, qui sanguinem prius detraxisset.
Quem quidem, vbi valida virtus subest, & ætas
permittit, vsq; ad animi defectū (vt diximus) mit-
tere expedit. Vbi horum alterū haud sanā respon-
det, tunus est, quantum sanā virtus fuerit, tantum
principiū detrahere: quod defuit, iteratione & sup-
plere. Quo quidē præsidio omissio, in summū ægi
discrimen veniunt: nisi eoa vel viriū robur, vel lar-
gum profusum sanguinis, vel sudor copiosus,
ex manifesta perniciē eripiar. Agimus itaq; impro-
sentiarū de iia febribus, quæ ex stipata per obstru-
ctionē meatibus oriuntur. Quas, si sine putredine

*Putredine qua
requiritur,
Continens febri
in quibus non
posset excutit
poribus.*

*Calidus patris
infantibus adno-
tum Medica
non aut oportet.
Continens fe-
briū præsi-
dium maximū
est, si sanguis
vel ad animi
deliquium
vsq;.*

*Sanguis detra-
ctus in ardētiss-
simis febribus,
interpositis ho-
ris duobus, esse
medicē altissimū
agimus permitti-
tē de quæ
sunt.
Sanguinis missio
quando sit cele-
brandisq; ad
animi defectū
nem.*

quidem consistant, ex diariarum esse genere dixi. Sin us putredo aliqua superveniat, ubi in omnibus venis ac precipue magnis ea consistit, synochas, siue continentes excitat febres: ubi in vnicuique malis parte, ex acerbatione quæ certo ambitu petat. Quibuslibet corpus ex succorum abundantia inhabile ad transpirationem iam redditum, tantum caloris cogerat, ut inde iam febriat, us tantum sanguinis detrahendum esse, quantum vires tolerat. Alioqui certe verendum est, ne aut suffocent, aut corrumpant syncope: nisi eos vel virum robur, vel plurimus sudor, vel largus sanguinis, pluvium à morte liberet. Nec verò exultans de plenitudine illa, quæ copatur ad vires: hinc à nobis sermonem fieri (quippe quæ nec sic obstruit venarum ora, ut refrigeratione plubeat, nec tunicas earum distendit, nec rubore, nec tumore invexit) verum de ea quæ contineri à vasis vitra non valet, quæq; ob id ipsum solet predicta symptomata inducere. Siquidem copia hæc, dum bonitatem suam servat, ut pariter augeri cum virum robore est nata: ita si quando has grauat, nec de cætero augebitur, et bonitatem naturæ amittet: quare tunc fieri nequit ut non putrefcat. Ergo festinare ad sanguinem detrahendum oportet, quo vasorum natura, ex transpiratione venientis quoque naturalem temperiem servat, humoribus, quo inter initia modo, dominari, quando si ad intemperiem versam laborabit, metuendum est ne hi putrefcant. Excitat autem intemperies in ea, ex febris calore. Optimum itaque est in eiusmodi febribus, statim non numero dierum, sed vni virum robori attentum esse. Quocirca ut siolum sexto septimoque, sed etiam sequentibus diebus sanguinis mittendus est. Quod si aut alii medici, ut æger, aut propinquus ipsius, non permittit ut feces venæ, ad frigiditatem exhibendam accedat, sed diligenter ante discernat, quantum consensum est ea cōbuerge possit. Quippe in interpetuam immodicam exalibata, lentos et crassos humores attenuari, digerique prohibet: imbecillas partes corporis cōcutit. Nonnullis illicto spirandi difficultate, convulsionem, atq; tremorem cōcitat. Tum verò quibuslibet in particulari principe tumor aliquis est phlegmones, cedematos, aut sancti genere consistit, us frigiditatem offerre nō licet. Sed neq; us quibus obstructio, putridusve humor non concoctus in cōmodat. At si per continentes febres concoctio sanguinis non tam videtur, absq; impedimentis exposita, auctor ægri frigiditatem quantum appetat, dabit: precipue si talia ponantur assueverint. Porro erysipelas verum, consistens in aliquo viscere, non aliter quam frigiditatem potu sanabit. Sin verò mistum cum phlegmone sit, in hoc cōcoctionis expectanda sunt nota. Ceterum minus tutum est qui paucillum sanguinis carnisq; obtinent, frigiditatem potio efficeret: namque ad solidas animalis pervenit partes, nulli quod eius vim frangat, occurrent. Quia ratione etiam hæc febres nec profus frigiditatem, nec multam aquam desiderat. Ad cōducendum febri maxime remedia hæc duo sunt: detractio sanguinis, et potio frigida. Verum illa nullo non tempore, modo vires lueant: hæc, quomodo in pulsu et vrinis, cōcoctionis evidenter cernitur nota, febri autem est maxima. Est etiam habenda ratio in missione sanguinis, tam eorum quæ præcesserunt, quam quæ consequentur ipsam. Nam si præcedat ciborum cruditas,

tanto tempore differre venis sectionem iubebis, quantum satis facere tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendant, videbitur. Sin sequetur necessarium vacuatio quæpiam (ut, ex cæpi gratia, muliere profluuium) tantum illi relinquendum est, ex eo quod superfluum existat, quantum est per eam vacuum. Sed nec negligenda interim natura eius qui venit vacuandus: si venis neq; ætas, nec cæli status, sub quo & regio, & anni tēpus comprehenditur. Sunt enim nonnulli ad extrallem digerendos succos, natura propensum: nempe qui humidus & calidus existit, quig raro sunt corpora textu. Ad hæc, quibus, os vitæ aut amara bile redvndat, aut umbellæ est, aut supra modum sensibile. Pucri certe propter ætatem perpetui. Cæli vero status ubi calidus nimis & succus est, corpus in ambientem resolvitur. Atq; hi quidē scopi sunt, qui à sanguinis detractioe dehortantur. Eam aut postulat, vni autem affectu, cuius causa primum requirebatur, habitus durus densusq; quique digeritur ægre: tum ambiens humidus frigidusq;. Quum autem in vniuersalibus methodis, in particularibus exercitatione consultat, fieri non potest, ut sine multiplici in ægri singulari exercitatione, quod ex vni fieri, facias: nec sine vniuersali cognitione, probè exercitatio procedat. Non licet siquidem vilius artis scientiam uanescit, nisi & methodum quandam habuerit per vniuersalem theorematem, et in particularibus te exemplis exerceas. Virgiter revertar ad methodum: e quidem virtutis considerationem ad curationem morborum sæpe maximè necessarium arbitror, sic ut quæ circa ægrum administrantur, omnia ferè eius vniuersa causæ fiant: aliquid medio ceteris necessarium, sic ut aliquid ex hac quoque, ad ea quæ facienda sunt, consilietur, non tamen præcipua faciendorum ratio hinc omnis dirigatur. Possum rursus ostendere, virtutem adeo eugum ad inveniendam remedia conferre, ut propter exaltationem etiam lateat: alia verò prætermitti, ac silentio præteriri, quasi profus ex vilitate consideranda non sit: ut in diariis febribus, in quibus vires nullam providentiam requirunt, vtpote valide. Verum quod in virtute accidit, id in reliquis omnibus quæ aliquod faciendum indicant, vñ venit. Horum autem omnium aditum Hippocrates nobis ostendit, incultum tamen, quem methodo postea nos explanauimus: perinde ut Traianus fecit, qui omnes Italie vias asperitate difficiles resecat, instaurauit. Vt verò accuratus de ipsis viribus disseram, oportet præcipuum esse scire, tribus diuersi generis facultates siue animi vniuersum animal quæ beatum. Quarum sanè prima, quæ stirpibus est communis, quàmque vocant naturalem, atq; etiam appetentem, iecur pro fonte habet, per venasque illuc sparsas in vniuersum corpus, id alit. Secunda autem est, quæ non modo ut stirpibus, aut viti præditæ, sed etiam vniuersalibus anima, est insita. Hæc in corde, fonte caloris insiti, residet, ab ipso per arterias, ab eodem ortas in totum corpus disseminatur: diciturq; tum vitalis facultas, tum irascibilis anima. Tertia deniq; est anima ratiocinatrix, quæ in cerebro domiciliu habet, voluntaria actionibus præfedit, per neruosq; cœu canales, totum corpori sensum & motu largitur. Hæc igitur facultates

Sanguinem detrahens quæ consideranda.

Sanguinem detractum quæ prohibent.

Sanguinem detractum quæ possunt. Methodus consilii sit in vniuersa salubris. Exercitatio in particularibus consistat. Artis cuiusvis scientiæ acquisitionem apud hæc in methodo quando habet aut per vniuersa scientia theoriam. Ceterum pariter vniuersa scientia plurimè curat.

Vires in diariis febribus aliquæ, quæ ex vniuersa sunt, valide, ceteræ vero providentiam requirunt. Hippocrates de curatione sanctorum explanat Galenum. Traianus autem Italia vias diffinit, instaurauit.

Animæ natura in fine appetitio sine ratione habet.

Animæ irascibilis in caliditate in corde. Animæ rationalis consistit in cerebro.

Synochi quando oriuntur.

Acquisitiones febrium vnde ex genere ducunt. Sanguinem detractum sit.

Plenitudo febrium vnde.

Plenitudo febrium vnde vasa.

Sanguinem effere quæ vniuersa sunt. Erysipelas autem non patitur si hoc iocari vendit. Erysipelas autem non patitur si hoc iocari vendit. Erysipelas autem non patitur si hoc iocari vendit.

Frigiditas quibus non offerenda aut quæ auctor danda.

Erysipelas verum consistens in aliquo viscere, non aliter quam frigiditatem potu sanabit.

Frigiditas potu sanabit. Sin verò mistum cum phlegmone sit, in hoc cōcoctionis expectanda sunt nota.

Continuatio febrium detractio sanguinis aut potio frigida.

Continuatio febrium detractio sanguinis aut potio frigida. Continuationem febrium detractio sanguinis aut potio frigida.

cultates seruare, nihil plane est aliud, quàm vitam seruare. Siquidem qualibet earum amissa, necessum est reliquas simul perire. Ac proinde in opere De sanitate tuenda, huc omne cõsiliũ direxi-
 mas. In hoc verò, primũ propõsitũ est, morbi sublatio. Nã cuiusmodi in isto est sanitatis ruinã, eius modi in hoc est morbi sublatio. Quorũ vtrũq; cõmunis est ipsa vires custodia. Hoc tamẽ inter est, quod secundæ valetudinis tuendæ grãtia geritur, eadẽ itam vitam tuentur: quæ verò affectiones præter naturam in morbis discutiũt, ea nõ omni-
 no vitæ custodiant. Quippe aliqua eiusmodi prædi-
 citur sunt facultate, vt si immoderate aut intempe-
 stive vtare, vitæ aduimũdũ solent vacuationes im-
 modicæ. Ergo quũ virtus tantopere necessaria sit, eam aut læditi oĩa vacutiũt remedia, si quĩ ipsi pa-
 rum moderate vtantur: vtrũq; ad verse inter se faci-
 dorum in dicationes in talibus corporib; sunt, in
 quib; affectus, quò expugnet, notabile vacuati-
 onem desiderat: virtus autẽ hanc ferre nõ valet. Ce-
 terum quemadmodũ nihil quod sanitatẽ tuet in
 valentibus vires corrumpit: sic in ægronũ aliquis-
 do virtus succeditur, quæ veluti in perniciẽ eius
 administrantur: vt si evacuemus in plenitudine q̃
 est supra vires, aliquis do ab ipsis dissoluitur. Ete-
 nim in synochis febribus, ex meatuum stipatione
 oritur, quoniam valida plerũque virtus est, citra pe-
 culum vacuatio adhibetur. In aliis verò quæ ex
 corruptela humorum gignuntur, exiit maxime
 periculosa. Siquidẽ qd corruptum est, alienũ a natu-
 ra quũ sit, id se auferendũ dicat, vel vena incisa,
 vel purgatione. Horum autem præfidiõrũ neutri
 feret inbecilla facultas, si quan do cum corrupte-
 la colerit. Oportet igitur, vbi in dicationes ita si-
 bi aduersantur, paulatim quod vniõsum est, va-
 cuare: paulatimq; quod salubre est, in eius locum
 reponere: quam curatiõnem vitiõs succi, Medici
 episcrasin nominant. Quam igitur sectio venæ,
 sanguinis sit vacuatio: sanguis autẽ ipse vitæ, pos-
 sessio nature existit: sic vniõque oportet venæ sec-
 tionem fieri, vt quod in vitæ est sanguine ipsi na-
 ture est, emittatur. Fit porro sanguis bifariam na-
 ture in vitæ: vel quum propriam qualitatem ad
 vniõnem non seruat, nec amplius nutrire, sicut
 prius, potest: vel dum ita multitudine creuit vt
 premat vires, aut diuendat vasa, vel rumpat ea,
 vel obstruat. Arg in his quidem misio sanguinis
 vitæ est, ceu vacuatiõnem præfidiõrum vniõ: in
 aliis autem, ceu quod humorum vehemẽtiorẽ
 impetum ad partem diuersam revocet, vel ad late-
 ra deriuat. Postulat autem semper valentes vires,
 quæ modo vacuatiõnis eius respondeant. Quo-
 ties igitur virtutis notabilis ex vacuatiõib; auxiliis
 noxa incidit, toties ipsa vitæ aliquid indicabit,
 acq; vniõque, vt quum manifeste iouabitur. Vbi
 verò ex his quæ affectum submouent, nec com-
 modum illi accedit viliũ, neque incommodum,
 ibi veluti in vitæ prætermittitur. Porro quic-
 quid aliquam præstat in dicationem, si natura id
 simplex sit, etiam quod indicatur, vtrũque simplex
 erit. At si illud compositum sit, & hoc erit quo-
 que compositum. At sanẽ quædam custodiã sui,
 quædam amotionem indicant. Virtus itaque sem-
 per vnam rem indicabit, vtrũq; sui custodiã. Cu-
 stodiã autem, primò quidem, si quod ex sub-

stantia ipsius vel in animum, vel alteratum est, cor-
 rexerimus. Secundò verò, si quæ ipsius substantiam
 vacuare, alterareq; possunt, prohibuerimus. Ac-
 tuiam autem debet interiri, quod magnitu-
 dine, dignitate antecellat. Maxime igitur digni-
 tas vniõ ipsarũ est, quando vitæ ipsum no-
 bis ex harum custodia constat: vt pote quum vi-
 tam, aut ipsas esse vires, aut earum actiõnes, ne-
 cesse sit. Virtus ergo omnium primã custodienda
 hominibus est. A vniõ indicatione proxima ex-
 istit, quæ ab affectibus, quos curare conamur, sub-
 ministratur: postea deinceps reliquæ. Quicquid
 igitur indicatiõ, quam vires præbent, ad versa-
 tionem, id secundi est loci. Quæ verò cum his quæ con-
 ducunt vitæ, in idem competunt, hæc vtrũque
 calculum referant, & eorum quæ primæ sunt no-
 tæ, & eorum quæ secundæ. Quare citra contro-
 versiam faciendũ. Quæ verò ad versantur, aliquan-
 do administranda prius non sunt, aliquando
 paulatim. Prima igitur indicatiõ omnium est, quæ
 a virtute sumitur: non tamen sic primã, vt cura-
 tionem nos doceat, quum ex numero curatiõis
 indicatiõnum non sit, sed vitalium. Nam neque
 vt valeamus, neque vt a morbo liberemur, ab ea
 quicquam primũ desumimus, sed vt viuamus:
 quam vis ex accidenti interdum virtutis roborati-
 o ad affectus curatiõnem conducit. At verò me-
 dicatrices indicatiõnes a morbo ipsi sumuntur,
 & a temperie corporis, & ab ambiente nos aere,
 qui causæ sine qua non, ratiõnem obniet: quum
 sine ipso nec tolli morbus, nec teneri sanitas pos-
 sit. In omni itaque curatiõne agendorum, in dication-
 es in his tribus ad summum consistunt. Reliquæ
 autem omnes ab his in partes deductis, ori-
 untur. Ceterum affectus ipse huiusmodi quum
 in causis didici est aptus, quemadmodum temperies
 atque ambiens aer, sed tantummodo in dis-
 cretione. Nam aut in similibus consistit parti-
 bus, aut in instrumentariis. Ac in similibus qui-
 dem, vel simplex est intemperies, vel composita.
 In instrumentariis, circa simplicium partium vel
 posituram, vel formam, vel numerum, vel magni-
 tudinem, tum quæ horum sigillatim tradite sunt
 differentie, consistit. Porro affectum qui simpli-
 ces partes occupant vniõ, est intemperies calida.
 Quæ si in totum corpus diffusã sit, appellatur febris.
 Ideoq; omnis febris, quæ febris est, humecta-
 tio refrigeratiõis remedia sunt. Ac si sola quidem
 sit febris, ad refrigeratũ humectandũq; vel
 vtrũq; ad suum, dirigetur omne medendi cõsiliũ.
 Quare materia inuenta, opportunum tempus ex
 quatuor febrib; temporibus sumes: quantitatẽ
 verò, ex conferendo cum naturali habitu mor-
 bum. Quippe quantum is recessit a naturali ha-
 bitu, tantum opus est ægriũ refrigeret & humec-
 tet. Ambiens autem aer (cuius fugere commercium
 non licet) si contrariam morbo temperiem
 habeat, & præfidiõrum numero est vniõ: in simi-
 lem, vna est morbi cõsuetudo causatur. Idcirco tunc
 inlibenda eius noxa est, scilicet reliquorum au-
 xiliõrum humiditate ac frigore intensis, adau-
 ctisq;. Ipse autem aer reddendus est talis, qualis
 ad prostrandũ febrem, aut aliam quampiã di-
 spõsitiõnem, desideratur. Si igitur morbus siccus
 & calidus sit, humidiores frigidioreq; de morbo

Vires quæ me-
 da ferat de sit.

Indicatiõis di-
 gnitas esse a-
 sumenda.
 Viam esse aut
 vniõ ipsarũ, aut
 ipsarũ ex haerit

Indicatiõ om-
 nium primã est
 quæ a virtute
 sumitur, non sic
 tamen vt cura-
 tiõnem nos doce-
 at.

Indicatiões
 medicatrices
 vniõ sumantur.

Morbi diffusi-
 o.

Febris quid.
 Vtrũq; remedia
 humectatiõis, re-
 frigeratiõis, res
 sit.

Aeris commercium
 non fugere
 hanc quæpiã
 possit.

Febricitantibus
quales alicui
generi preparare
debeamus.

& eligemus, & preparabimus. Sicuti diuerso, si
frigidus, humidusque, eas quæ calificant & siccant.
Sunt itaque eligendæ quæ ex ipsius eiusmodi sunt:
alioque industria nostra preparabimus ipsas, per
quas quidē eas subterranas molientes, & ad Sep-
temtrionem conuersas: ac pauciores ipsarū aliudus
humore aspergētis, ut ex euripo aliquo aura
exspiret, machinantes flores præterea & germina, quæ
frigida humidusque sint facultatis, per arēā dissemi-
nantes: per hyemē vērō, cōtraria horū facientes,
per festinū ubi morbus suadet: ubi non suadet, ex-
cessus tantum, utriusque temporis remittentes. Po-
terunt rursus tres illæ indicationes prædicte ad duas
tantum reduci: nempe ad morbum & sanitatē. Ne-
que. aliud ipsa sanatio est, quam morbi in sanita-
tem transitio. Quæ affectus cōtrarij quā sint, ne-
cesse est per cōtrariā fiat eorū alterius in alterum
transmutatio. Arg ita rursus vna est sola curatio-
num indicatio generalissima, videlicet cōtrarietas.
Ceterum ad accuratiorū contrariorū administra-
tionem, necessarium est curandorū corporū prius &
naturas & temperamenta cognoscere: quæ quidem
tum ex his quæ in libris temperamentorū tradita
sunt, noscuntur: tum ex ætate, & tota antea vita,
quæ nimirum in victus & exercitio ratione consistit:
præterea, in hac regione, & hoc anni tempore, &
hoc cœli statu, cōuersatione. Ex ipso autē tempera-
mento inuitō, ad quæuis aurores indicatio suppe-
ditabitur. Sed neq̃ parū quid negligendum ve,
ad remediōrū inueniendū cōsuetudo adiēt: vel
vix nec ad sanitatē tuendā, quā si sigulorū corpora
etiā natura offēdat. Non siquidē via rationeq̃ ab
ea, præcedentes, inuenimus ipsarū partium affectū:
deu ex illo rursus peruenimus ad faciendū indi-
cationem. Cōsuetudo itaq̃ curationis ratio-
nem indicat, per corporis naturam intercedentē,
quemadmodum etas: quæ & ipsa temperamenti
interventū, præstat indicationem. Advertere au-
tem oportet, corpora frigida & sicca, quæ ex ter-
restri natura cōstitant (cuiusmodi sunt mineralia)
quam germinē solui. At quæ calida & humida
sunt, eorū substantiā celerrimē dissipari in am-
bientem. Quæ verō in medio horum, ex diutius
pugnantium, consistunt, ea corpora quo magis
ad lætē vel ad illa accesserint, eo vel apriora ut
dissipentur erunt, vel consumtacia magis. In sum-
ma, citra calorem non potest in halitum digeri
corpus viliū, quando substantiā eius coacta den-
sataq̃ manserit. Puerorum autem substantiā, facil-
limē omnino digeritur, dissipaturque, propterea
quod est ut humidissima omnium, si nulla frigi-
dor. Quo minus vacuans præsidij eget, quom ex
se ipsa naturaliter abvnde vacuetur. Fit autem
profectū & propter calidam siccāque regionem,
& tempus æstiuū, & statum cœli impensē sic-
cum & calidum, norabilis per curam vacuatio. Ita
quæ hac de causa, quæ sanguinis detractionem de-
siderant, ut aut profusus non secabimus venam, aut
parum detrachemus. Erantq̃ in hac detractione
quoque spectanda, natura ab initio, cōsuetudo, &
locus habitatio, anni tempus, cœli status,
necon in, quem curamus, affectus: aliāq̃ ratione
ante hunc, laborantis facultas. Quā verō affectus
sint numerosi, cuius ipsorū sua est curationis per
contrariā indicatio. Quo circa, octo tempera-

menta quom sint, octo erunt etiam morborum,
quibus simplicia corpora sunt obnoxia, particu-
lares indicationes. Vtrique hæc, vna eius affectus,
qui instrumentum communis est, diciturq̃ con-
nui diuorum: cuius sanē est indicatio curatio-
nis, vniū. Est igitur vnum morbi genus, quod
similares & simplices animalis vexas particulas,
quam intemperiem vocant. Huius alique differen-
tiæ oriūtur, ubi corpora nodis qualitatibus
alterantur: alique vbi accedente etiam humo-
rum affluxu. Quia sanē dispositio vtrique, vel af-
fuit vna pars corporis, vel plures, vel vniuer-
sum corpus.

GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, lib. X.

Diatriam ef-
fectus simplicis

Ergo in diatriis febribus simplex quidem est
in corpore præter naturam affectus: vt ipse
causis quæ primū eas excitantur, iam ad-
demptis. In quib. verō causa quæ eas accendit ad-
huc manet, in his neq̃ affectus simplex, neq̃ sanatio
est. Si quidem quod febris iam receptū in corpore
est, id ex propria ipsius curandi indicatione
discutere oportet: quod adhuc est futurū, id propul-
sare, ac ne fiat, vtare. Veritabilē autē, si quæ id excitat
causa prius sumpta sit, itaq̃ in diatriis faciendo
rū indicationē maxime ex ipsa lebre capiemus. In
reliquis verō, quæ accensiois hinc causam intus
habent, prima indicatio ab ipsa sumet causa. Quæ
re si febriū quæ multos dies cōnuant, recte ostē-
dimus putredinē esse causam, hæc nimirum sanatio
est prima. Sed nec interm huiusmodi febres,
quæ per eam iam accensa est, ratio non habenda.
Ac si quidem in idem cōsistant, & quæ febrem
exhinguunt, & quæ oppugnant causam: in quod
vtrique cōspiciant, quom vnum sit, sine cōtentione
non est agendum. Sin febris, quæ iam accensa sit,
sanatio, causam quæ hanc excitauit, est auctura,
aut quæ causam submouet, febrem exasperabit,
diligens habenda consideratio est de remediō-
rum specie. Et enim si intolerabilis ægro sit magni
rudo febris, committendum non est, vt per ea qui
vires causam adimimus, febrem aueramus. Sin ita
mediocri sit febris, vt quo tempore contra cau-
sam tantū pugnas, obruendū interim vires æ-
grotantis non sint, vtrūq̃ contemendum si curatio-
nis modus non est. Non contemendum autem
nec ille est, qui contra id, cuius maius momentum
est, instare iubet: nec tamen alterius omnino ne-
gligenter esse. Quom autem in examinandis his,
ad hominis salutem non parum momenti facul-
tas habere videatur, tria nimirum erunt, quæ in
propositis iam ob putredinem febribus, agendo-
rum indicationem nobis prima largiantur: febris
videlicet: eius effectrix causa: præterea naturalis
facultas. Ceterum priora duo submouenda sunt,
tertium est custodiendum. Erit itaq̃ rursus & hic
necesse, vt tum febrem, tum eius causam, cum fa-
cultate ipsa cōferas. Mox si eadem ambio reme-
dia requirāt, ea promptē exequaris. Sin indicatio
nes pugnant, vnam præferas, vel quæ a viribus
sumitur, vel quæ a causa, vel quæ a febre: si vt
quæ ceteris sit valentior, hanc magis sequaris,
nec tamen ceteras negligas. Nunc verō ad parti-
cularium præsidiorum differentias nos con-
uertamus,

Indicatio sim-
plicis partē
esse octo, totē-
demq̃ aliorū
particularem in
dicationem
selectionē cō-
nuū indicatio
est vniū.
Intemperiem ef-
fectrix.

Indicatio ipsa
quidā a febre,
ex quanda a fe-
bris causa
sanatio sit,
putredinē esse
causam febriū
quæ plures die
sunt duræ: ac
proinde prius
ruendum esse.

Indicationes a-
gendorū in po-
tēda febre in
ui a febre ipsa,
& ab effectrice
illius causa, &
a facultate.

Sanatio quid

Indicatio cura-
tionis generalis
simā, est vna
videlicet cōtra-
rietas.
Ceterumq̃ ex
habitione, quæ
ram ratione de-
derat cognita.

Cōsuetudinem
ad indicationem
remediōrū, et
ad sanitatem
tuendam pluri-
mam possit.

Cōsuetudo
quidā cura-
tionis ratio-
nem
Corpora diffi-
cilius quæ
sunt.

Puerorū substantiā
ma cur omni
facilius digeratur.
Puerorū substantiā
ma cur minus
ceteris egat
profectus vacuatio.

Sanguinem de-
trahunt de-
trahunt quæ
sunt consideranda.

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Stipatio qua
faciatur.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

*Diarrhea febri-
dam imperit
tractatur, dia-
tremnes fieri.
Dianteris cau-
sa quando res-
dant, & quae
de praesentia in
corpore.*

vertamus, reperiatur mentione diariorum: quibus
& ipse, incitatio medicorum, in plurimum dierum
febris aliquando degeneret: idque vel eorum effe-
ctrice causa abeunt, vel enamus persistente. Por-
ro abut effectrix causa, quoties ab ira, dolore, vi-
gilia, cura, aestivo sole, fangatione, & bubone qui
tam defuit, circa stipationem febris est excitata. Ma-
net, quoties vel ab externa causa, vel ab ipsa fe-
bre, stipatio aliqua est orta. Nam & frigiditas, & as-
tutentum in vltis, per media stipationem semper
febrem excitat. Vltio praeterea nonnunquam consti-
pat corporis habitum. Id ipsum febris principium,
vbi cum humore in vasis, stipationem exubitate le-
cit. Quin etiam glutinosi, & crassi, aut etiam copiosi
succi, vbi medicorum obstruxerunt, diariorum aliqua-
do febrem accendunt. Dicuntur autem id genus
febres omnes diariorum, quia solui vno die sunt apte:
computata cum hoc vno & nocte. Ceterum non
est idem diariorum omnium affectus: sed ab aliquibus
inseparabilis stipatio est: ab aliquibus minime
inseparabilis, sed vel ut plerumque simul adeat,
vel ambigua forte, vel raro. Inseparabilis stipatio
est, in qua ex aluminosa aqua, vel diacanthode,
vbi tali quapiam alia, vel ex frigore, aut leui ob-
structione febricitant. Plurimum verum us adit,
qui ex vltione febricitant. Ambigua forte, in qua
ex fatigatione. Quicquid vero ex ira, vel tristitia,
vel vigiliis, vel peritacit studio, vel cruditate, vel bu-
bone febricitant, in raro adiecta stipatio est. Argy-
larum omnium febrium nulli (quod vix ex ipsa sit) ad se-
cundam vix accessione perdurat, sed intra quatuor
& viginti horas omnino defluit: idque cum sudore,
vel madore, vel transpiratu quodam halitioso. Aut si
quando earum aliquae (quod tunc rarius contingit)
longius trahunt, duae in accessu causae quae ipsas
solui videntur. Earum vna frigus est, quod vel ex am-
biente aere, vel ex vltione quapiam extrinsecus
admotu, proveniat. Altera egregia illa diatriotica, est
si qui videlicet hanc transire, medicorum incitatio con-
guntur. Multa igitur apparent diariorum esse fe-
brim differentia particularia. Vna, quando iam
profusus recessit ipsarum effectrix causa: vel vni-
vltio. Altera, quando hoc etiam adeit: scilicet stipatio,
cuius duae sunt differentiae: nempe exiguorum me-
tuum & densitas, & obstructio. Sane densitudo ip-
salarum ex siccitate, provenit, alia ex frigore, eodem
vel simplici, vel cum astutentia vi. Id vero obstructio-
num ipsarum, alia est quae ab vltione, alia quae
ex qualitate succorum, scilicet qui aut lentis, aut cras-
si sunt, incidit. Praeterea autem inter remedia, in ea
quae copia facit, sanguinis missio: in ea quae ex hu-
morum qualitate consistit, attentum vltis. Co-
siliu verum sumptum à vltis, ut in diariorum san-
e exiguorum, ita in quibus pluribus diebus vrgent,
sane magni est momenti, eodem maioris, quod hic sunt
longiores. Euius vbi naturaliter vires se habent,
be, ne minimi quidem in diuturnis febribus vac-
uationum vltis morantur: vbi autem sunt iustis-
mores, pro magnitudine imbecillitatis, impedi-
tus vltis auxiliorum vacuantiu. Rarius autem ac-
cidit, ut protinus in primo, secundove die, vires
imbecillae cernantur: id quod rari interdu accidit,
vel propter aggratans malum corporis habi-
tum vel propter senium. Nonnullis etiam fangatio,
vbi tristitia, vigilaeque praecesserit, & inedia per to-

tum secuta est diu, dein febris prius quam homo
cibaretur, circa vespere occupavit, & nox infom-
nis est acta, vires impensae resoluunt. Porro quibus
temperies corporis ad siccum caliditatem conuer-
sa, febrem accendit, et interdum vel in prima inva-
sione accessiones nutriendae sunt, medum autem illas.
Eam autem sole ipse fortior est ex alia exubere,
infectus in eam mali puni grauiusque vbi bilis
in stomacho est optimus. Nam & roborat hunc
malum puni: & alia, qui diutius in eo citra
corruptionem maneat, sensum concoquitur, idque nec
accensens, nec etiam inuatis. Igitur mordeus halitus,
succusque, vbi per sensibilia corpora fertur, horro-
res & inaequales totius corporis concussiones facit,
in his, quibus, cute stipata, quae prius transpi-
ratur, iam sunt detenta. Quae quidem, si fuliginosa
sint, febres accedunt. Euiusmodi autem halitus, suc-
cosque, tum multa & vehementer dispositi, tum vici-
li, & ira, & dolor, & cura, augent: tum proxime
ab istis, vno illud per se interdum augere eos suffi-
cit, vix si cibum quod non sumptis: scilicet in namque
corporis halitus in his naturis, quae facile amarum
hilem gignunt, ex longa inedia deliosus. Concussio-
itque siue rigor succederet, propter eorum quae ferun-
tur excrementorum, tum multitudine, tum acruo-
niam, tum impensae celeritatem, tum laborans vi-
rium imbecillitatem. Horror vero fiet, vbi & ac-
litas eorum, & impensae velocitatem est remissa: tum
copiam minor, ac potissimum quod vires tristitiae ob-
stet. Quod si largius remittatur iam dicta, ne hor-
ror quidem continget: sed vel quidam cum vltio-
sus sensus, vel tantum inaequalitas. Porro quibus
cuique virtute existere imbecillia, squaliditque ipsius
corporis habitus, incipientis adhuc accessione vi-
di adesse symptomata, in omnibus panem ex vno
no diluto & calente, maturae exubere, horrorem
statim inhibuit. Quamto vero hoc otus cibave-
ris, tanto scilicet magis febrem proliuere. Sin-
duae horae ab initio inaequalitatis interposita sunt
nutries tunc quoque, modo adhuc durat horro-
predicens ramque, quod in febricitantibus, etiam in-
noxia febre, & cui cum in maior succederet, quo fa-
cto, tum laore, tum nutrie debere. Quod si hor-
ror praeterea, ac iam plane febricitant, id temporis
non sunt cibandi: sed de crecente iam accessione,
atque interdum in summo vigore, nutriendi sunt, so-
lutionis integritate non expectata. In nullo namque
squalido affectu eodem defuit accessio, priusque
illi vel ex rigor, vel humido vltio, humectatio
accessit. Calidis itaque & siccis naturis, sine ad-
mo ortu sunt tales, siue sine eadem accessione maxi-
me inedia aduersa, febris peracutissima causa. Inter
alia autem, calidus in summo, fuscilque celi status, id
dicta temperatara efficit. Hic autem status alio diu-
tempore, si est aere, plane incidere nequit: si vni-
ne humidissimus panter frigidissimusque, in alio
hyeme. Corpora igitur frigida & sicca, ex inedia fa-
cile in febres ardentes incedunt quibus, nisi prius
mors occurrat, in hekticas transiunt: atque ab his, in
marasmodi: vel protinus ab initio, ardentibus pra-
teritis abstrahunt hekticas. Maxime autem siccas, ca-
liditque dispositiones corporum, à principio fe-
bris hekticae corporis: ad quod olim cumdam iuueni
conngit, qui ex ira febricitauit. Cui quidem, quo-
ties nutries est, fontanae plane gelidae dedimus

*Nutriendi etiā
in prima inua-
sione accessio-
nis qui sint.*

*Primum me-
dum, vltio
non roborat.*

*Stipatio actu
qua gignat.*

*Rigor vltio
accidit.*

*Horror vltio
provenit.*

*Vltio sus-
sum quod facit.
Horror in pro-
cipio accessio-
nis, inhibet pan-
em ex vno diluto
& calente co-
bibeant.*

*Nutriti inte-
rim dum hor-
ror qui possunt.*

Alia autem,

*Inedia aduer-
satur caliditatem
& siccitatem.*

*Hectica febrilis
est principia
corporis caliditatem
& siccitatem dispo-
sitionem.*

interim binos cyathos, interim ternos : quidō frigidam simul multam sibi dari, qui ita sunt affecti, citra noxam non ferunt. Quocirca vtilissimū fuerit, vbi febris ideā perspexeris, in prima statim occasione, minoris cū periculo, copiosioris frigida vti, corporibus ad validam siccitatē nondum perductis. Iam verō quemadmodū in quibus febris accenditur propter mordentem acrimoniā ex caliditate attenuantē a Sole, inedia & laboribus, sicut, maximum eius remedium est humidum nutrimentū: sic & diuerso, vbi ob copiam, vel obstructiōem, vel phlegmonem, vel humoris alicuius putredinem, febris est orta, maximo malo est cibus.

Quare huius quidem, nec in febris inclinatione, citra noxā nutritia, uedum ipsa accessione in vaden te illis verō, omni certē tempore, sed potissimum per inclinationem. In summa verō, illa dū a primo statim die, sunt tibi in omni xgro spectanda: morbi summus vigor, & agrotantis vires, i quibus cibandi consilia petas. Postea si transiri summum incrementū sine omni cibo potest, in cibi abstinētia hominem ipsum seruabis. Sin exiguum ad minimum requiritur, abunde erit sola mulla. Quod si maius desiderat quā sit ex mulla, prorsus cremor satis erit. At si fas non est summū morbi incrementum aut tenui victu, aut inedia transimiri, id agendum, vt homo statim in prima accessione inclinatione et nutriatur. Aliquos verō ipsorum, & quā in vasa illuc eat, & qui incipit, cibabis.

Sunt porro hi sicco temperamento & calido, oportet, tum viribus necessariis imbecillis: quā fieri nequeat, vt abvnde sicco calidumq; corpus, si febricitet, viribus sit valētissimū. Si autē cum eiusmodi febri & corpore, momentanei membri phlegmone sit coniuncta, omnino xger morietur, magisq; id certum est, si vel peripneumonia, vel pleuritis, vel angina, vel ventriculi, vel tectinoris phlegmone in se fecit. In quibus sanē affectibus vna salus est, virium robur. Nam quod ad phlegmonem quæ in iis est partibus attingit, minimē planē est cibandum. Quod ad virium infirmitatem, vtrique saepe. Ac proinde necessum est, aut resoluant vires, aut phlegmonē augeatur. Quoties igitur vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus curis, vel vigiliis, vel tristitia, vel longa inedia, vel vniuersis vnd coeunibus, siccātū corpus est, ac febris invasit, quæ & aridam reddit cutem, & igneum calorem refert: vitig hunc talem timor est hestica febri correptū iri, potissimū in æstate, ac celi statu calidoq;.

Oportet autem quamprimum prorsus tremore, & forbitione ex aliqua nutritum, panemq; post oblato, atq; frigidæ potione hominem curare. Quippe protinus extinguitur, ac cessat omnino febris, modo nec phlegmonē aliqua ei sit aduersa, nec putridus humor. Quāquā ego etiam vel si hinc aderant, agrotorum non paucis aquam frigidam dedi, rarius esse ratus, phlegmonas in præsens augere, quā finere hominem in hestica febrem prolabi. Ceterū si magnū fore in eodem, vel humori putri, vel phlegmone sit suspicio, a frigiditate danda abstinēbis: refrigerantibus autē remediis, quæ foris applicantur, vtrius: modō & super os ventriculi, aut tota præcordia, modō super pectus imponēs, vbi scilicet phlegmonem subesse calorū, maximē iudicabis. Balnea etiam iis

qui siccato plurimum corpore sunt, & citra humorum putredinem febricitant, non incommoda existunt. At phlegmonas subsequenter febres propter putredinem humorum, qui in ipsis impacti habentur. Possunt tamen vel citra phlegmonem, in ipsis vasīs aliqui humores putrescere: idq; aut in vna animalis particula, in finibus ipsorum impacti: aut etiam in totis eorum capacitatibus, quæ inter bubones & alas sunt, comprehēsi. Vbi igitur citra putredinem squallenti corpori febricitare contigerit, caput totius curam nonis in iis remediis quæ refrigerant humectantē, statuerē oportet. Porro duplex genere est harum rerum prima materia. Vna, eorum quæ foris incidunt: altera, quæ intus in corpus sumuntur. Extrinsicus corpori incidunt, tum aer ipse qui nos ambiat: tum pharmaca, quæcūq; humectantē refrigerantēq; vim obtinent: & tertium præter hæc, dulcis atq; balneum. Intro in corpus sumuntur, quæ eduntur, ac bibuntur, & inspiratus aer. Ab his generalibus tentandum est propositis hoc loco febribus, tum humiditatem, tum refrigerationem comparare. Verum refrigeratio, quoniam per efficacissimam qualitatem inducit. & parui temporis est, & periculosa. Contra siccitatis, per ea quæ humectant, curatio, vt longi temporis est opus, ita minus est, quā refrigeratio, periculo exposita. Si igitur tēperatus sit aer, qualem se exhibet, tali eo est vitanda, nihil amplius de eo uobis sollicitis. Sin verō admodū calidus, vel admodum frigidus sit, pro calido inducendus arte contrarius est, subter raneis inuentis domibus, quæ & frigidissimæ sint, maximeq; persilare: & ad septentrionem conuersæ: tum auris quibusdam suisuibus opera nostra paratis, aliis ex euripis, in quos multæ aquarum fontes præcipiunt: aliis aqua frigida ex vasīs in vasa transiuit, id quod etiam conciliat somnū: præterea domo abscondit aqua, quæ prorsus frigida sit, aspersa: ac rosas plurimas humi fusas, aut vitum capreolis, aut ruborum clauiculis, aut lentis ramis, aut deniq; reliquarum, quæ refrigerent, stirpium aliquibus: turba quoq; hominum ingredi prohibita, vt quæ domū similiter calfaciat. Ac sic quidem calidissimum aerem, qui scilicet in æstate calida & sicca accidit, refrigerare est tentandum.

Qui sanē si modicē frigidus sit, hoc esse contentos oportet, nihil de eius temperie alteret. Qui verō frigidissimus est, vitig quatenus respirando attrahitur, admittendus est, vt qui admodum calorem cordis refrigeret: non tamen quatenus extrinsecus ægrum contingit. Quippe densas congestis cutim, putrilaginosorumq; humorum effusum, atq; transpirantem cohibet. Siquidem per pulmonē, quod rarum est viscus, difficile non est, vt tum qualitas ipsius, tum etiam substantia, facile ad cor perveniat: per cutim verō, vitpore densatam, fieri id non potest. Ceterū ex frigida inspiratione maius sequitur cōmodum, quā in cōmodum ex cute densanda, præstetrim quā operamēntis hanc nobis calfacere liceat. Porro vitendum maxime eiusmodi aere est in iis hestitis, in quibus primū quod afflicti, ipsam esse cor: atq; vt si ventriculus primū affligeretur, ipsi per comestā & bibita succurrēdū esset. At tectinori ex inspiratione aere nulla certē accedit vnlitas: a comestis

halitus quibus emanant.

phlegmonas qui febrem sequuntur.

interdū hanc rem quæ opus est accidit posuit.

Remediorum refrigerantium humectantium quæ duplex est materia.

Refrigeratio in febribus cur brevis sit tempore, atque periculosa.

Aeris febrium: raneis vniuersis se committat.

Somnum conciliari ab aquarum fontibus.

Turba hominum ingredi prohibita, ne calidissimum aerem quandoque refrigerandum.

Aere frigido de facili.

lactinori ex inspiratione aere nulla accedit vnlitas.

verō

Nutriendi qui non siccus, ne in ipsa quādam ac cessante delinquant.

Hectica febris quando sit excludenda.

cuanto quæ excrementorū, omni febris est vtilissima. Pari modo & rarsitas, & relaxatio. Fusio tñ, & calor, nō item: sed calor omni febris inimicus est. At fundi æqualiter, id solidi quædam animalis partibus nō est alienū: succi certe nō perpetuū est vtilis: sed quoties in animali vel phlegmone, vel affectus phlegmonæ similis cōstitit, vel vtriusque plenitudo, omnino inimicissimū. Nā phlegmonæ quædā, quā calfacti & liquan succi ad ipsas cōfluunt, augentur. Tunice verō vasorum, impares plenitudi-
 10 ni, quæ iā ex liquatione est repleta spiritu, distenduntur, & vires hoc nomine habent. Ergo calidus illis scissis affectibus, effusio mordenū est salubris, liquidior eorū cōtingit citra periculū. Calfactio tñ noxa non caret. Atq; hæc quædam ex prima balnei parte optimè administrata sumuntur. In secunda autē (quæ lauacrum erat) vt febrilia corpora ex humectatione iuantur, sic ex calore nihil illis cōmodè accedit. At in tertia refrigerantur iuniorē quæ fuerat excalfacta, & vires firman-
 20 ti. Si qua verō & laxata, & iusto plus sunt remissa, ea in naturale redunt medio citatē: id quod quarta balnei pars, quæ deterfus est, indicat. Quippe quibus rite sunt omnia adhibita, ipse post frigide usum adhuc fudit, & omnia ipsæ excrementa vacuantur. A balneis igitur (vt vnam omnū vel vni summam colligi) vacuatur quicquid in corpore vel humidum, vel fuliginosum præfuit. Reducitur ad naturā symmetriā, tum caro ipsa, tum cutis: cor rigitur solidari partium ariditas: & calor nō modo
 30 us qui ex lauacro accessit, sed qui etiā præfuit, ex frigide usu extinguitur. Maximo huius rei documento est præfidiū, quod sentiunt homines ex huiusmodi balneo, vbi a feruenti sole exccati, lauantur. Quippe quædam accedit ad id, ritu stipulæ aridi, egressi ex frigida, illud cō in naturale habitum redeunt. Si itaq; certam febriecantium naturæ haberemus notitiā, nō dubitarem eorū aliquos zsi due in aquis frigidas extra balneū lauare. Quia verō exacta nobis dispositionum nō est
 40 notitia, ac maxima ex errore impendit noxa, vtiq; eiusmodi reculam præsidia, potissimū in febribus hæcticis: quidō per has & pauci sanguinis, & nudū carne, & experts adipis, corpus est redditū. Etenim iuuenis corpulentus, ætatis tempore, ac in febris summo vigore, modō nulla viscerum phlegmone subest, sudabit, si in frigida se coniecit. Quidd si sit frigide lauationi assuetus, securè re medio vteret. Qui autē ex calida & sicca intemperie febriecat hæctica, ac possimū quæ iā marasmus est, iis vbi tale præfidiū petunt, tutum non est in totam conici: quæ vt nec gracilibus & imbecillis, qui æstate calida & sicca, longa via peracta, refrigeratione indigent. Nam utq; his tutus est frigidi solū vsus, nisi prius fuerint in balneo æqualiter excalfacti. Si quidem simile quidd nobis videret accideret, quum in frigidum solum post balneum ingredimur, ei quod ferro accidit, quum
 50 tingitur. Etenim tum refrigeramur, tum roboremur: quemadmodum & illud, vbi candens iā redditum frigide mergitur. Atq; huius rei causa ad imbecilla corpora inuentæ sunt balneæ, quæ ea præcalcant, atq; ad frigidum solum præparent. Nō dissimile quiddam facinorū, & qui sine balneo frigida vtrantur, quum scilicet se ab exercitatione in

eam saltu demittunt. Si quidē quod nobis balneū, id præstat illis exercitatio: vt quæ non calfaciat citim, sed etiam insit caloris morum a profundo corpore extrorsum conicit, sic vt & frigide impetū occurrat, & quo minus viscerum aliquod feriat, ad verteret atque prolubeat. Neque cum ipsam frigide substantiam, neque eius qualitatem omnino integram, vique ad viscera pertingere est salubre. Imo satius & tutius fuerit, solam qualitatem, eamque retusam calidorum occurſu, descendere. Iam verō qui hæctica febriecantes ad balneum accedunt, nisi in frigidam sint demissi, nihil iuantur, contrā quā alius correpti febribus. Nam quum iis solidorum partium affectus candens ferro sit similis, callescere duntaxat eos humectatq; haudquaquā videret fides (sic enim alimentū incrementūq; præbuerimus febris) sed opus est, vt mersus in frigidam, extinguamus calorem. Quod si ex violoento ipso subitoque frigide usu male fuerint affecti, vt pote in contrariam qualitatē mutati, hoc licet in toto quod sequitur tempore calfaciendo facere: quum neque par periculum sit in frigido affectu, nec in remedus quæ illi adhibentur. Quum autem insanabilis solidorum partium summa scissitas sit, ad quam per hæcticas febres via expeditissima patet, melius est hominem in frigidam intemperiem transferre, ac curationem adhibere habere, quum tendentem recti ad interitum sinere, desperatūq; illi salutem facere. Ergo eos qui hæctica februiant, illi cō omni ratione refrigeremus, antequā progressi in marasum perveniant. Nam quum iā occuparit marasum, hunc nequiquā sanare tenaueris. Ipsum tamen in alterum transferre marasum, quem appellant ex morbo sensum, licet ibi ac sic superstitum, non tantum plures dies, sed etiam menses, seruare. In cæteris autem febribus, quas vel phlegmone, vel putrescentes succi accendunt, nihil offendet, etiam si in frigidam ægrum
 40 ipsum non merseris. At in hæcticis, id quod remedium affert, calidè solum non est, sed frigide. Quicunque igitur hæctica febre laborant, atque ex us præcipue, qui iam marasmo de tenent, modō his nulla alia febris, vel ex solo putrescente humore, vel cum phlegmone sit adiuncta, eos omnes audacter lauiabis: sed prorsus citā omnem laborem, ne resoluant vires. Sint ergo tres domus balnei: in quarum primam, quæ satis esse calida debet, in lectulo cubans ducatur, inibi-
 50 que nuderet. Illinc autem valida sindone seu secundam portari debet: quæ non tantum sibi sit media, sed etiam temperie: tantō scilicet prima calidior, quanto est terra frigidior. In ea itaq; oleo tepido super sindone perfundatur. Hoc factū, ad tertiam ducatur domus, vbi nimirum est solum. In cuius quidem moretur aqua mediocriter: idq; sustentus sindone, nullāq; infusione aque, cuiusmodi in aliis vni solemus, adhibita: imō nec capiti eius quicquam infundi velim, in quā sit satis id quoque, his tēve vna cum toto corpore in aqua mergi, demissa mediocriter deorsum sindone, ac rursum per quatuor iuuenes, qui cum portant, leuata. Mox hinc educibus, in frigidam semel totus tingatur, ne vel breuissimo quidem spacio illic moratus. Protinus verō alter paratam ha-
 bens

Calor omni febris inimicus est.

Phlegmonæ quædam augentur.

Balnei singula partes quæ optime præstantur.

Exercitatio præparat corpus ad balneum frigidum.

Exercitatio vtilis.

Hæctici, dum ad balneum accedunt, nihil iuantur, nisi in frigidam sint demissi.

Scissitudo summa solidorum partium citi est insanabilis.

Hæctici sensum esse morbum refrigerantem refrigimus. Marasum esse insanabilem, seruare ex morbo.

Balnei partium descriptio. Hæctici quomodo sint per quatuor partes balneum trahantur.

Balneum frigidum quibus in corpore, et quibus causis debet administrari.

Balnea calida ad solū frigidum vni corpus præparantur.

bene calentem si deinde, ipsi iniiciat. Deinde niger suo in lectulo collocatur, primū spōgis detergetur deinde in collibus lineis, quoad fieri poterit, blav dissimulē. Postea vero vinctus, amictusq; vestibus, auribus super lectulo reducatur in aliquā aliam de mīā vicinā, ubi et ibi consuevit, inibiq; natiatur. Porro humidum esse ac frigidū, qd lecticis febribus sit cōduciturum, nemo nescit. Eiusmodi verō sunt tum cremorē pīsiā, quī frigidus funnunt. tū alia, similiter pīsiā cremori condita: id verō est ex aqua, & exiguo potui, & anetho, tum sale, oleo, & aceto. Cōmodus præterea iis qui sic laborant, est & ex aqua in aqua frigida paui. Ceterum nullius horū pura frigiditas esse debet, sicuti potius. Quippe huc maturē tum incalēscit, tū per cor quē digeritur. Illa, quī pīsiūculum temporis in vētriculo morentur, ipsū fortassis refrigerat, si fuerit immodice frigida. Vbi autē febris iam traxerit, dandū quoq; alimētum lac est: sed diluenter obseruato, ne in ventre concreseat. Cauebitur autē id, si mel illi admisceratur salis, quo necimur, exiguum. Abstinentium tamen in hēctici, quoad fieri poterit, à melle est: atque idcirco etiam à mulla: quippe prout in bilem cōuertitur, & siccioris, ætiorisq; caloris febres reddit. Dandus itaq; principio a sinini lactis est non plus cytharus: sed induta in ipsū cubiculum a sinā, quō nullum tēpus interponatur: niger autē id prout bibat. At verō si corruptū in vētre lac fuerit, pulvis paruos atque inæquales inuenies, quales accidunt in cōpressionē ventriculi. Sin autē nō sit corruptū, & maiores & valentiores eos, q̄ pro consuetudine, inuenies. Quia ratione obseruata, licebit tū lactis, tum aliorum ciborum omnium modū sensim augere. Qui igitur iuxta marasmo vexantur, eos, sicuti dictum est, lauabis. Quos verō hēctica premit, nondum tamen marasmo tentantur, eos licet etiā laues sine subiecta fīdione, vt pote viribus adhuc valentes. At qui ex his muui sunt valētes, eos nō autem est pmittere in frigidā uationē descendē, sed fors ipsos potius perfundere, primū tepidā, secūdō frigidā, qualis fontana est. Ac si quidē omnia curiosē admiuiterentur, vno lauandū iam eius quem marasmo consumit, spes est. Sin error vel in vno cōmittatur, is rebusq; subvertit omnia. Quippe quum exitialis horum affectus sit, ne leuissimū quidem errorē tolerat. Acti quies talium est seruatur, hinc carnosam tantū portionē marasmo iā occupauerat. Iplis verō solidis refectis, fieri nequit vt homo prorsus sanetur. Etenim primū eiusmodi febri propriū partium humiditātē, ex qua nutritur, depascit: hinc transit ad genus carnosum: deinde solidas populatū particulas. Vocatur autē caro tantū ea que in musculo est. Nā que in visceribus cōspicitur, non carnes, sed parenchymata nominatur. Porro singula rū particularum substantiæ moles, ex tali maxime cōpleta est natura, q̄ & perire, & regnari possit. At verō nec fibrosa, nec nervosa, membranoia vē natura eandem generationē habere censitur: nec fas est, eiusmodi singulariū partū fibrā, à febrib. malignis liquari, penidē vt carnes: quando animal ipsum, prius q̄ lux prorsus sint exiccatæ, interemerint. Sanē sunt & quas marasmo des febres vocat, vniuerse ex eazū genere que colliguntur in so-

differunt, q̄ in his, que porrio carnis colliguntur, ea semper vaporis vice digerunt: in illis de huius in ventrem. Nam quemadmodū quo magis animal vel adipē, vel carne abvndat, eo, qd ab ipius catinibus, dū in crāculis torretur, defluit, copiosius censitur: eundē modū in calidissimis, febribus, si carnes humidæ ac molles cum adipis copia fuerint, eas sensu liquari deprecandus. Sin ab ipis adipē & sicce sint, infusibiliter absumuntur, & in febres marasmodi trāscunt. Hec præmonitus, colliguntur febriū uidem methodis curantur ages, tum ad frigidā exhibendā, quam primū properas, tum iis que refrigerant & humectant, nutritens. Multam verō iniunctissimam illis esse cōstebimus.

GALENI PERGAMENI de methodo medendi, lib. XI.

MOdum igitur curandā ephemeratū, in octauo huius operis cōmentariū: continentium, in nono: hēcticarum deniq; in decimo, satis accurate exposuimus. Nunc verō, quemadmodū quæ ex putrescentibus humoribus excitantur, methodo sint sanandæ, aggredi est animus. Duo autē sunt scopi curationis in vniuersum: affectus nempe ipse, atq; exortantes tēperies. Affectus quippe, ex utroque fibi contraria sint, adhibenda esse remedia iudicat. Laborans verō temperies, simul cum ipso morbo, mensuram contrarietatis definit. Potest etiam ambiens nos aer, qui ex colatibus, anni tempore, ac regionis natura suas mutationes (fortitur) viam efficere indicationem, ac vel ætitudinis causā, vel similitudinē, annūmerari. Porro auxilium, quo ad morbos tollendos vltimur, prima & vltima dicitur sanitas causā, diuersis tamen rationibus. Dicitur quippe vltima tempore: quandoquidē & natura, & ars, & fortuna, priores, secundū tempus, eo sanitatis existunt causæ. Prima verō est, quatenus id primū laborantis corpus tangit, alteratq; eius effectū. Ars quidem artifexq; & fortuna, nō per se primū, sed per auxilia morbos profligant, materiæq; interuentu operantur: quemadmodum per seipsam naturā. Quæ nimirum ex tum spiritus, tum solidarū particularum (que ex semine genitali oriuntur) tum carnosarum substantia, constat. Quarum trium substantiarum singulæ propriam per naturā suā tum qualitatē, tum quantitātē habent. Ac qualitas quidē earum, ex congruā temperie humidi, sicci, calidi, & frigidi efficitur. Quantitas verō solidarum partium patet semper manet: sed ita qui adhuc inaugetur, numero duntaxat: qui vero absoluti iam sunt, etiam magnitudine. Carnosæ verō substantiæ magnitudō variatur, etiam si iam nō augeatur animans. Pari modo & substantia spiritus: propemodum quolibet momento tum maior, tum minor conspicitur. Ergo ad duos illos scopos prius traditos, etiā vniua virtus additur, iuxta earum trium substantiarū enumerationem: aut temperies per se distinguetur, quæ & ipsa rursus bifariā scinditur, nempe & in originalem naturam, & in acquisitam dispositionem: sic nimirum, vt ex istis, & aliis que prius dicta sunt, propria quadam cuiusq; remediorū sit indicatio. Ex iudicatione rē utatē etiam, vitz studiū, consuetudinēq; remediorū indicationes sumuntur. Proponatur igitur

Colliguntur febriū curatio.

Curatio scilicet fieri debet, ut si sit etiam exortans temperies. Temperies laborantis quid indicat. Aer vnde suas mutationes fortitur.

Auxilium cur primū & vltima sanitas causa dicitur.

Fortuna per auxilium cur primū & vltima sanitas causa dicitur.

Fortuna per auxilium cur primū & vltima sanitas causa dicitur.

Variatur effectus tum ex curatione, tum ex fortuna. Temperies est duplex.

Iudicatione rē utatē etiam, vitz studiū, consuetudinēq; remediorū indicationes sumuntur.

Intemperiam per celeritatem aliam sanandam esse.

nobis in temperies quedam curanda: ea vltiq; per contrariam intemperiem sanabitur. At quoniam vniuersū febrium generis intemperies est calor, vtiq; per frigiditatem curabitur. Quęmadmodum autem ab affectu ad materias præfidiōriū peruenimus, eodem etiā modo à singulis reliquorū generum primorum, ad eas est descendendum: veluti à virtute, quę morbo ceu ad versatix opponitur, & cui omni ratione opitulari & subvenire est cōsiliū. Quare virtus quidam ipsa erit vnus ac primus scopus: alter aut atq; secūdus, qđ ab ea significatur, nempe custodia ipsius. Pari etiā ratione, morbus qđem dicitur esse primus scopus: secundus autē, sublatio ipsius. At verò custođia, similiū in dicabit exhibitiō ē sublatio, cōtrariorū. Quoniam verò virium subſtitiā tum ex spiritu, tum ex carnosa specie, rū solidis ipsis cōpletur: ex iis quę similia sunt, moliri cuiq; suam custodiā oportet. Spiritui, ex respiratiōe, transpiratione, & vapore qui ex sanguine attollitur. Solidorum verò generis, ex solido nutrimento. Carnoso generi, per eam naturam, quę in medio humorum ac solidorum corporum est. Porro cuiusq; horum modum ex conservandę subſtantię modo inveniemus qualitatē verō, ex ipsius temperie. Quam autē horū cuiusq; temperies, vel optima sit, vel aliqua tenus vitiosa: quę qđem optima est, semp feruari debebit. Quę verò omnino vitio nō caret, hæc in sanis qđem vel seruāda est, vel alterāda: in ægris verò secūda. Quam autē diuersitas non parua sit in partem animale temperamētū, propriā cuiq; mensurā, eorū quę ipsi similia sunt, oportet accōmodare. Nempe ei qđ terra est magis, eorū qđ magis sint terra: & ei quę humidior est, eorū quę sint humidiora: ac sic de cæteris cōsuetudinibus. Hinc verò illi materie particulares oēs in cibis, potione, aëre, & omnibus peragī solitis, inueniēdę sunt. Quod si mutuō inter se pugnent aliquę indicationes, ppendenda * indicium scoporū rū magnitudinis, tum dignitatis est, efficiendūq; id, qđ maiorē dignitatis, rū digniores scopi admonent. Quorum dignitas qđem indicāda est, vel vite, vel sanitatis respectu. Magnitudo autē est duplex: vel proprię subſtantię ratione, vel declinationis à natura li habitu. His igitur præmissis methodis, illi in febrium genere exercitemur, qđ ex putredine nascitur. Ac primum ab illa febris exordiamur, quę ex putredine humorū in maximis vasīs, vel in omni bus simul, cōputrescētū oritur: quāq; necessum est synochon, hoc est, continentem existere. Fieri autem nequit, vt talis febris sanetur, nisi inhibita prius ipsa putredo sit: quę sanē inluberi, causa manente nō potest. Quare submouēda ipsa causa est, si modō putredo in se prius, mox post ipsam, febris sanari debeat. Oñsum autē est, illa rē tum putrescere cōpora, quę quum calida humiditas natura sint, neq; perſtata, neq; ventilata, in calido humidōq; loco includuntur. Quod si in motu sint, ventilenturq; ac perſentur, posse ea nō putra, integritę seruari: potissimū quęcūq; corpora sua ipsorum natura reguntur, vt animalia, stirpibq;. Eā namq; ab initio cōgenitos seculi motus habent, quib; sup̄flua excernūt. Nec minus etiā est demonstratum, quanta sit tum respiratiōis, tum pulsus vtilitas, ad perſuram, ventilatiōemq; corporis, atq; eius naturam calorem tuēdum. Itaq; si

quid in eo manifestē putrescere debeat, dictas trās spiratiōes esse impediendas oportet. Fieri autē nō potest, vtiq; per totū sitantur animal, nisi vel finibus vasorū spiratis, vel tota cute. Porro accidere in finibus vasorū spiratio potest, vel ex vehementi extrinsecus refrigeratiōe, vel ex succori, quę extrorsum in ipsis consertim ruunt, crassitudine, multitudine, vel lentitia. Accidit hoc illis & ex iis exercitatiōib; quę in palæstra, vel aliis obestur, & itinere laboriosis: vel ambulantia itatu, quō ex rigore in æstum mutatus est subitō. Nonnullis verò seruētēs ex ira sacci, ac foras simul imperu ruitēs, effecerunt dictas spiratiōes. Quisquis igitur propositū sanaturus est febrem, hic simul causam eius oportet adimā: simul calorē qui in animali excitatus ab ea est, refrigeret. Ac quemadmodum qui dem ille refrigerandi sit, prius est dictū. Causam verò adimi oportebit, propria cuiusq; nature inventa contrarietate. Vnq; si ex frigida causa spiratio, densūq; redditū corpus est, relaxato eo, omnib; ratione rarefactio. Sin ex obstructiōe ita est affectum, hæc reclusa. Quod verò recludit, hic quoq; ad cōtrarietatis indicatiōē attentus inuenietur. Vbi namq; abvndantia humocum est, hos vacuabis. Vbi crassi, glutinosi sunt, eos tenues & fluxiles reddes. Si plures causę aliquando cōiūt, omnibus per contraria occurret. In eiusmodi autē dictarum causarum cōplexu, corpis ē sanguinis misiōne conueniet: ac abvndantia vacuata, tum ad extenuandos humores venire. Ab hoc ad remittenda quę sunt cōstricta, & rarefacienda quę sunt densata. Atq; hæc quidem à morbi affectu indicatiue sumenda sunt. Quā autem ciborum atq; potioniū, necnō spirituum decens quantitas quę lrasq; virtutes ipsam custodiāt: ac modus quidem quantitatē ipsorum à virtutis subſtantiā inueniatur, qualitatis verò à temperie: nimis æstui mari debet, quemadmodum vires quę corpus regunt, se habent. Quę quidem si sint valentes, quācūq; vacuantibus præfidiū vtrius. Sin infirmiores sint reddite, vacuantiā remedia cautius administrabis. Sed & nutrimenti modus hinc tibi desumendus est. Quippe quum vires legitimum robur suum habent, & morbi summus vigor breui expectatur futurus, tenuissimū cibo vti licet. Vbi verò infirmiores fuerint, nō licet sine grauissima: sed adiungere ad nutrimenta tantum oportet, quātum est de robore virium detractum. At nutrimenti qualitas, ex morbi affectu, vni cum solidorum corporum temperamento præſenti, sumenda est. Tempus autem nutrindi, quod quidem ad reliquas febres pertinet quę ex putredine oriuntur, in progressu fermonis dicitur. Quę verò vnicam tantum à principio ad finem vsq; accessiōem habent, synochis dicuntur (de quibus impræſentiarum est sermo) in iis tunc ostendendus est cibus, dū ægri melius se habent: eoq; potissimum dicti tempore, quō in sanitate prius cōpari erant fuerint. Est autem frigida quoque iis propinanda, quom fucus & iam concoquantur, & crassitudine eorum est extenuata. Ceterum iam operæ precium est explicare, quorū sint febrium, quę putredo accendit, in vniuersum differentiæ. Dein, quęnam sit ipsius generis earum communis vtilium auxilio rum indicatiō. Mox, quę sit singularium cuiusque propria, & quę igitur ad differentiās perti

Transpirationes vnde proba heri cōtingat. Spiratio in finibus vasorū va de contrarietate.

Spiratiōis causa.

Temperies optima, semper seruanda. Intemperies vitiosa quādo seruanda, quādo de se alteranda.

Indicium scoporum dignitatis, ut qđ expendendum.

Synochos febris qđ dicitur. Synochos horum curatio.

Putrescentia calida ex humida, quę in similibus loco includitur, perſurā nō possunt.

Nutrimenti quantitas ad virtutes, qualitatem à temperie sumenda esse.

Tenuissimū cibo quādo sit vti licet.

Nutrimenti qualitas ab affectu ex temperie sumenda.

Nutrindi tempus quādo sit in synochis aptū.

Prigida quādo de se propinanda in qđ febris nāt synochos.

Putredinem febri differre.

Putredo est motus corporis ad corruptionem calidam externam, calorem naturalem autem etque unumquodque omnium, etiam si vultur, calorem naturalem quomodo se fruetur in corpore.

Putredo quomodo se facit.

Putredinem humorum quomodo se vacuandum.

Vacuandum me dicantur mox pariter febri ipsam adaugere. Vacuandum me dicunt quia sunt.

Rarefaciendum non esse corpus prius, quod sit vacuandum.

Vinum a quoque promouet omnem evacuationem.

Constituentia febri detentia, nec balneum, nec vinum nec vultum, nec rarefactionem esse videndum.

net, prima sanè ex eo est, quod causæ ipsius putredinis vel adiunt, vel non adiunt. Secunda ex eo, quod per totum animal, aut eius partem aliquam, diffusa putredo sit. Tertia, quatenus cum phlegmone, aut citra hæc. Etgo ordiamur ab humorum putredine, quæ primò indicis in diuisione fuit. Cuius quidè natura, ad curationem est inventio principii. Porro natura putredinis est mutatio totius putrescentis corporis ad corrupteli, à calido, externo. Non enim perfectò à proprio calore corrumpitur quicquidam prius cetera, quicquid in rebus subsistit, id augetur, robotatur, sanam est, ac vivit, dum proprio calore regitur: veluti nimirum ipsa animalium corpora, quandiu servatur proprius cordis calor, in cordis quidem corpore, per respirationem: in reliquis omnibus partibus, tum per communiter quam habent cum corde, tum per aliam quidam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutem, & transpiratio, perspiratiove dicitur. His verò levis, vti etiam calor naturæ læditur. Alter verò quidam alienus, ac præter naturam in corporibus excitatus, primò quidem ipsos succos propter humiditatem putrefacit corrumpit. Spacio verò, tum adipem invadit, tum etiam carnem. Putredinè in corporibus ortam sanabimus, id quod iam corruptum est, omni ratione vacuantes: quod reliquum est, moderatis moribus, & refrigerantè perspiratu ad exactam symmetriam reducentes. Ac vacationem quidem illius per vinam, deiectiones, sudores, vomitumque molimur, si putridus humor ad os ventriculi aliquando sua sponte impetum faciat. Post hæc dimotiones mediciores, vni cum ambietatis bona temperie adhibebimus. Causam vero putredinis, si adhuc perseveret in corpore, per cetera tollemus. Itaque quoniam transpirationis prohibitio fuit occasio putredinis, hanc submovere oportet. Quia verò ea (quemadmodum exposuimus) à variis causis est orta, ipsarum singulas cetera medendi ratione occurrerunt. Sciendū tamen est, non easdem omnes partes vacationes, medicamentisve requirere: cum & temperamentis, & posituris, & forma, & omni denique constitutione, naturarum inter se dissideant. Cum autem maior pars medicamentorum vacuantium, febrem ipsam adaugeant, utpote facultate calida & sicca: deligenda medicos sunt, quæ citra calfactionem siccationemque valentem, ipsas vacationes moliantur. cuiusmodi sunt, cremor prisanæ, aqua mulsa, oxymeli, apomeli, & apyradix, in aqua, quæ potui datur, incocta. Hæc autem ipsa ventri sunt quoque idonea: qui si nihil reddat, iniicienda per chylærem mulsa cum oleo est. Sanctorum corpus, priusquam id vacuare, rarefaciendum non est. Vbi vacuatum sit, vtiq; licebit id medicamento aliquo, cui calor tepidus inest, rarefacias: cuiusmodi est quod ex chamæleome conficitur. Hoc tempore si vinum quoque aquosum bibatur, id omnes vacationes promouerit. Idem faciet & temperatum dulcis aquæ lauacro. Ceterum vbi magnitudo febris obstat, sicuti in ebriennibus, nec vinum est vitendum, nec lauacro, nec iis, quæ habitū rarefaciunt, vniutionibus. Iam verò id genus ardentissimis febribus, potius frigida conieci: nisi subsint putrescentes humores, per alium, urinas, vel sudores

vacuandi. In vniuersum autem, dum plura firmul coeunt symptomata, id quod maximū omnium est, aggregari oportet, atque ei vel soli, vel magis quæ ceteris, subvenire. Porro ad corrigendos putrescentes humores, non tantū requirimus vires ipsius pulsus firmas: sicut vires nec eius facultatis quæ voluntariū motū largitur, sed multo magis ipsius cōcoctricis. Ergo si & vires cūctæ valentes sint, & ardentissima febris, & cōcoctio nis notæ planè evidentes, frigida interdire ppriabilis. Quidd si etiā æger bona corporis habitudine sit, rû ita ratione calidus ac siccus, etiam si in frigida natura non hanc dimittas, haud quāquā lædetur. At si mediocriter est febris, & vires nō valide, sed cum notis cōcoctionis, iis quita se habent, balneum prodest, & vini potio: tum verò ex vniutionibus eæ quæ rarefaciunt: idque multo magis, cum ambients est frigida. Neg enim aut frigidam in balneo lotionē, aut frigidam potioniē in eiusmodi cæli statu ferè expetunt, utpote inspirationibus asiduo refrigerari: cum si quando in frigido ambiente vehementer vi ægroti cōtingat, exigua salutis eius habenda spes est. Si verò nec cōcoctionis habeat signa, nec vires validas, seuari is planè nō potest. Quo minus auridem lauandus in balneo est, aut medicamentis iis quæ rarefaciunt, vnguentis, aut vinū illi dandum, frigidave ostenda. In quo enim desperata omnino est salus, imprudens consiliū fuerit apud vulgum infamare præsidia; quæ multis fuisse salutem. Febris igitur, pro vi febris est, aqua frigida est perpetuo remedium. Quod verò ad alia pertinet, nō perpetuo. Velut cum ex obstructione glutinosi & crassi humoris putredo nascitur. Ponatur autem cum hoc, & redundantiā in toto eæ corpore, tum virtutē nō imbecillam. In eiusmodi etenim cum plexionibus, cum multa præter naturam in corpore sint, quædam eorū præcedentes causæ erunt: veluti redundantia cum glutinosis & crassis humoribus. Horū namque vino obstructio est orta: quæ morbus instrumentalis est, eorū quæ obstructa sunt corporū. Hanc symptoma sequenti est, ipsa transpirationis cohibitio: quæ rursus putredine humorū exceptit, antecedens quædam ipsius febri causa. Ergo qui febri curare vult, necesse est inhibeat putredinem. Ac sic dux indicationes se exhibent, altera disfebrili, altera à putredine. Atque si febri rursus dux: scilicet ut portio febris, quæ iam accensa est, percuratur: quæ verò etiam nūquā gignitur, inhibeatur. Aliter autem dux rursus à putredine erunt indicationes: ut & quod putredinis iam factum est, sanes: & quod in generatione adhuc est, sistas. Porro quod in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac rursus aliter dux indicatio nes nascuntur: tum vt quod retentum est, vacuetur: tum quod retinendum est, probetur. Prohibebitur sanè, si obstructioni medicamus. Cuius quoque ipsius, quod iam occupavit, sanandū est, per ea quæ obstructa liberant: quod futurū est, propulsandum, per ea nimirum, quæ assiduum obstructum succorum compescunt. Ergo quod vltimū in ipsa methodo reolutius est inventum, id primū omnium in curatione tibi est peragendum. Etenim si iis auxiliis, quæ obstructiones eximant, vii, non vacuata

Frigida quidè sit propinanda interdire febri symacho afflicto.

Frigida natura quando pessimum vii in constitutionibus febribus.

Vinago quidè calidior potest per constitutiones febri.

Letalis signa in febre.

Inferenda se habita medica menta non esse vbi salus est de plerumque.

Febris, ut febris, aqua frigida est perpetuo remedium.

Obstructio quid.

Putredo est antecedens ipsius febri causa.

*Obstruere non
esse aperire la,
primo quam ple
nitudine vacue
tur.
Obstructionem
curare.*

prius abundantia, velimus, nō modō nihil proficiemus, sed maiorem etiam reddemus affectum. At si vacuata prius multitudine ad curandā obstruccionem accedamus, medicamentis usi viemur, quæ citra calorem obstruccionis expedire sint apta. Vbi autem quæ obstruunt de tera, dissecti sunt, per alium, vniuā, atq; sudorem, ea vacuare tentandū, idq; medicamentis, quoad licet, minimè calcificantiis. Hoc verò tempore etiā vires roborare, quo & putredinē superet, & succos concoquant, siudebimus. Quod autē febris ipsius iam accensum est, refrigerabimus. Itaq; in auxilliorū inueniendorū ordine, vltima est quæ ab hac sumitur indicatio: q̄vis alia ratione sit prima, cum à febre videlicet corporis inueniendorū prædictorū methodos. Ac si nullum quidem interim vehemens symptoma incidat, prohibeant quo minus auxilia ab iusto morbi ad finem ita procedant, celerit̄q; febris finiet. Sin tale quippiam incidat, quod totā ad se curanonē reuocet, producet̄ & curationis finis. Expendere aut oportet medicamentorū tum vsum, tum noxam.

Mulsa facultas.

Quippe aqua multa, quatenus crassos succos ex tenuat, glutinosos detegit, atq; excretionē promouet, optimū in iis synochis medicamē fuerit, quos habinus coarctator, & putredo excitat. Quatenus verò calor febris adauget, est noxia. Quare si hic immodicus sit, parcendū multæ est, viendūq; tremore priscæ. Quod si difficiles & cōtumaces iudicantes esse obstruccionem, etiam oxymelitis. At hoc ipsum rursus, si immodicè vitare, & intestina tadit, & rursus excitat, & nervosa ledit. Perpetuū autem dogma illud existit verum, Contrariorū contraria esse remedia.

*Contrariorū
esse remedia cō
traria.*

Quandocūq; fieri nō potest, vt eorū quæ præter naturā sunt, quicq; per aliam vllam remediōrum speciem curetur. Non tamē ex vfu est, semper omnibus quæ præter naturā sunt, mederi sed cum sola per se subiuūnt. Nam si cū aliis vnā incidunt, alius expe est ante illa medendum: sicut in causis vlcibus, vbi ea simul cum phlegmoge sunt cōiuncta. Siquidē verū in his quoq; manet, quod per ea quæ carne implent, curantur. Ceterū his vti nō licet prius q̄ curaueris phlegmonē. Quare itaq; præter naturā sunt, omnia ab iis quæ ipsis sunt contraria, curantur. Cum autem eorū quæ præter naturam sunt, duplex prima sit differentia, alius per se subsistentibus, vltura affectionibus: alius in generatione suā essentia habentibus, ac vmbre ritu affectus concomitantibus, nempe symptomatibus: vnus sanatio quidem, affectu sublatō est. Hanc verò symptomatū amorio sequitur. Quare affectu ipsorū, qui verē & prima nō curantur, potissimū dicuntur esse contraria remedia: symptomatū autem, ex accidenti. At verò contraria dicuntur, quæ sub vno eodēq; genere, plurimū inter se disiciunt. Si autē in illo genere quod mediocre est, hoc est, mediū inter duo extrema, intellexeris, infinita quandā contraria rerū multitudinē, quæ maioris minorisq; ratione inter se disideat, ex eo inuenies. Non enim in corporū modō qualitate, verum etiam in quantitate, nulli modō contrarietatem inuenias: quam vniq; Aristoteles nō contrarietatem, sed oppositionem nominat. Verūm Hippocran, omnia id

*Rerum præter
naturam differe
ntia duplex.*

*Contraria quo
que dicuntur of
fi.
Cetera quo.*

Oppositio qua.

genus contrariorū habent appellationem: sicut etiam Platon, qui ex contrariis esse dicit generationes. Contemneret tamen nomina oportet, minime autem scientiam rerum. Cuius nō ignarus Hippocrates, ait: Medicina appositio est, et detractio: deficientium quidem appositio, redundantium autem detractio. Porro deficientium, redundantis nōnulla quidem in quantitate, quædam autē in qualitate. In quantitate, cum sanguis immodicè est auctus, aut rursus minor redditus. In qualitate, cum vel calidus, vel frigidus, vel crassus, vel tenuis, plus iusto, minui, est effectus. Vtū ad medendi indicationes propositi nobis febriū generis reuertamur. Genera causarū quæ in nobis præter naturam oriuntur, sunt, multitudine, crassitudine, & lenior humoris. Causa simul atq; symptoma est, transpirabilis excrementi retentio. Simili modo causa pariter & affectus est ipsa putredo. Morbus verò tum obstruictio, tum febris ipsa. Symptoma est, transpirabilis excrementi retentio. Ergo indicabit prædictū causarum quælibet propriū aliquid, poscens nimirū ablationem per se opposita. Nempe multitudine ipsa, quæ ex eorum est numero, quæ sunt ad aliquid, in prædicamento quantitatis, vacationē. Lenius verò & crassitudo, quæ sunt in qualitatis affectu, incisionē & absterisionē. Obstruictio autē, qui morbus instrumentalis est, reclusionē. At transpirabiliū retentio, excretionē eorundē. Sicut & humorū putredo, excretionē, refrigerationem, ventilationē, & concoctionē, semiputridorum: quæ omnia illi ex aduerso respondent. Ipsius verò febris, refrigeratio opposita est. Sin gulæ itaq; semper vnā indicationē exhibent. Ac si præter naturā ipsum indicans sit, semper in dicabit contrariū: sicut nō contrariū, sed simile, si secundum naturā se habeat. Igitur si vires eius qui ex putredine humoris febricitat, valentes sint, mittendus statim morbo incipiente est sanguis, si cruditas ventris nō addit. Si vires infirmæ sint, aut etas dehorret, incisionē vena nō est. Eiusmodi tamen febris in virtutē imbecillam nō incidit. Quippe synochos, bene habuit corporis, & calentes etas est propria. At si in puerū incidat, qui quattuordecim annū hæcenus nō attigerit, mitem illa sanguis nō debet propterea quod tantulus, cum præter calidū & humidū sint, plurimum corporis substantiæ quondā defuit, ac digeratur. Ita qd ex incidenda vena moriendū nobis fuerat, id vltro nobis ex curandi corporis natura præstat. Quod si corpus quattuordecim excesserit annū, æstimandū est, qualis eius natura sit, num gracilis, & spissa, & dura, & copiosi sanguinis, aut contrā. Atq; ita in priori missionē sanguinis adhibebis in secunda, nequaq; Quin etiam modus vacuandi sanguinis ex iudice sumetur indicationibus. Si enim cui sanguis mittitur, triginta annos sit natus: sed laxus, & mollis, & pinguis, & albus, & gracilioris venis: huius aut planè sanguinē nō mites, aut parū detrahes. Et omnino quidē nō mites æstiuo tempore, regione sitiosa, & cæli ita calido & sicco. Parū detrahes in reliquis tum anni tēporibus, tum regione, tum cæli ita. Iam verò si neq; obstruictio, nec putredo subesser, sed sola redundantia succorū, protri-

*Medicina cū
appositio est de
trahit.*

*Conferam gra
uius præter na
turam.*

*Conferam præ
dictam febrē
putredinem, quæ
sanguis indicat.*

*Sanguis in prin
cipio illam
mittendus est,
si putredine febre
laboris valida
vires sit, nec
cruditas sed sit.
Synochis non
incidenda im
becillitas res.
Pueri autē an
num quattuor
decim ex non
si sanguis mis
sionem, vel si le
uocet synochis.*

*Pueri post
quattuordecim
annos non
quando mittit
du sit sanguis
& quando mo
nim.*

nus in misione sanguinis, pro natura suae ratione homo se haberet. Verum quoniam nec obstru-
ctio, nec putredo per se solam curari misione san-
guinis potest, reponi sanguinis aliquid ad spa-
cium curationis debet, quo minus intempesti-
ue nutrire necessitate vicia cogamur. Quantum
namque ad huiusmodi pertinet febri, prius nu-
trirendum est. Siquidem ostendimus prius est, so-
lum virtutis respectu esse, qui nutrimento pre-
beat indicationem. At vero evacuationis ratione,
nutrire oportet. Ita necessum est duorum alterum,
aut febrem, si nutris, augere: aut vires, si non nu-
tris, desicere. Satis itaque fuerit aliquid sangui-
nis, quod propriis partibus animalis nutritum
sit, relinquas, ac ipse paucissimas sorbitiones,
portionem exhibere contentus sis: quibus vi-
tici medicamentis, potius quod nutrimentis egre-
mus. Porro cum ars ipsa tota sit magna non levis-
sima eius pars est, scientia ordinandi victus: quae
vires ex his maxime remediis constituuntur, cibo,
potione, perfusione, cataplasmatibus & clysteribus.
Ceterum calfacere praecordia cataplasma in aut
perfusionibus, non est perpetuum: sed in his
tantum aegris, quibus in toto corpore nullum er-
rat superfluum. Ceteris omnibus extrema est per-
niciens. Nam siue redundantia utraque sit, vel ad
vasa, vel iuxta vires: sine etiam in una parte plu-
rabus vitiofa excrementa habeantur, omnia ad
partem exaltatam trahuntur, inibi sive phle-
gmonas excitant. Quare in eiusmodi morbis di-
uites potius quod pauperes perperam solent curari.
Nempe & quod raro illis miratur sanguis, vel si
maxime tali egerant auxilio: & quod medici, vi-
agere aliquid semper videantur, de perfunden-
dis praecordis maxime sint solliciti. Itaque accidit,
ut illo ipso tempore phlegmonae incipiant diuiti-
bus, quo iam pauperibus morbus propemodum
perductus ad finem. Saluberrimum igitur est in fe-
brilibus venam incidere, non fynchis modo, ve-
rum etiam aliis omnibus, quas putrescens hu-
mor concitat: ubi praesertim neque aetas, nec vires
prohibent. Lenata enim quae corpus nostrum re-
git natura, exonerataque eo quo veluti sarcina
premitur, haud egre quod reliquum est, vincet: co-
quens quod cocoqui est habile, & excremens
quod potest externi. Porro ubi humor ad locum
affectum confluit, remittere repellereque hunc ex-
pedit, non ad ipsum trahere. At repellentia reme-
dia, quae certe astringendi vim obtinent, in prin-
cipiis idonea sunt duplici ratione: & quod ro-
bur affectus particulis inserat (vide minus pro-
prie affluxu excrementorum in se recipiunt) & quod
eorum quae in ipsis iam recepta sunt, tenuissimum ex-
trorsum exprimat. Quod si cum fluxu humorum
per ea remedia coepserit, tum densitas quae in
affectu particula relictæ est, crassiora detinet,
iam tempestiva relaxatio est, quod ea quae retenta
sunt, vacues. Praecipue autem astringentibus, est ven-
dum, ubi in iecur aut ventriculū, supervacuum ali-
quid profluit: quando & primo morbus admodum
hæ paries sunt: & vi manus suae obstant, vel in
ipsis morbis est necessarii, cum alimentū corpo-
ri vniuerso cōficiat. Quare ciborum coctio, siue
ea in iecore, siue in ventriculo sit in prospera,
febres interit, ac succi vitio exacerbat. Quo ma-

gis in omni febris, ciborum coctioni prospicere
magnopere oportet. Atque eius rei gratia, robo-
ris quoque instrumentorum quibus, periculi, non le-
vis habenda est cura. Si ergo vel minima sit suspi-
cio iecur aut ventriculū laborare, abstinere pro-
tinus oleo incoquamus, ac eas particulas per-
fundimus. Cum autem duplex in omni abscissio
facultas sit, vtrique in pontico astringendi facultas
non parua est. In reliquis omnibus amara quidem
qualitas est vehementissima: astringitio vero, aut
plane obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde
ponticu ad iecoris & ventris phlegmonas
eligi praestat. Et si autem id cum folio, tum flore lon-
gè quod cetera abstinencia minore. Odor quoque huc
non modo non infusaui, verum etiam quid aromati-
cum referat. Reliquis omnibus plane est foedus.
Quare haec fugere oportet, vtrique autem semper pon-
tico. Etiam reliquorum medicamentorum, in quibus
mixta cum amaritudine astringendi vis est, ali-
quid in oleo cōcure, atque ad eundem modum vti
licet. Amara siquidem qualitas praestit, vtrique astringen-
ti facit. Et si quidem intendere astringentem stu-
des, oleum ipsum etiam astringendi vim habet: cu-
iusmodi est quod Hispani vocant, & quae cum quo
oleo frōdū, preparatur. Similiore vtrique astringen-
ti ne placet, aliud olei genus preparabis, praecipue
quod tenuius sit partiu: quod genus Sabinū est.
Optimū tamen ubi astringere vehementius expe-
dit, est histricū oleū. In penaria vero abstinencia,
inter istia vel melius, vel maxime, vel lentissi-
mum satisfecerit. Quod si afflicta febris sit, etiam
vnguentū nardinū: quod vtrique valentius iis om-
nibus faciat. Quare si aliorum copia non est, inva-
lescens febre rosaceū illi admiscebis. Sanè myr-
tini astringitio idonea non est cum crassior sit par-
tiu, quod vtrique aliter descendere possit. Ad eundem
modum & cataplasma cōpositam vim obtineat, ex
ea quae tenuius sit partiu, ac relaxatum etiam ex
amarā, astringente. Superet autem in ista, ubi scilicet
tum reprimere, tum robur addere studemus,
quod astringat. Vbi teneare ac digerere, amarū:
vbi evo care, quae ex relaxatis tum etiam maxime
sint partiu. Siquidem quae crassae substantiae sunt,
ea pus mouentibus, sunt accommodata. Cataplasmate
aut quod sequitur sumus nos feliciter vti, cōtra
iecoris phlegmonem. n. olei in quo abstinencia
decocti fuerit, & cydoniorū decocti, sing. vnc.
ij. myrobalarū & rad. ireos, pulveris fiat, sing.
drach. ij. cere quod sit satis. Fiat emplastrū
iuxta artis praeccepta. Coquitur & in vino auster-
o cydoniū, ex ipsiusque carne aliquid eiusmodi cat-
aplasmatibus indur: ubi videlicet et quod cōstū
copiosum est, & particula ipsa infirmior: tunc
siquidem astringentē vim in augemus. At vero
nec colo laborante, nec reliquorum intestinorum
quovis, nec muscularis qui in praecordis habentur,
aut ipso peritoneo, miscenda astringentia sunt.
Sed nec vena vesica male habet, vtriusque: modo
nihil ultra ad locum suat, nec sanguinis redun-
dantia, nec excrementorum copia, in toto sit cor-
pore. Porro ceteris & peccatis in media praedictorum
coctione consistunt: quantum scilicet ad ventri-
culi iecorisque solitudine absum, tantum reli-
quas antecellunt. Siquidem in ventriculo iecori
reij resoluti robur peracuosissimum est, minime in

Qq ij

Sanguinem fe-
brem requirere
necessarium
vultum ratio-
nem.
Vires indicant
firmam nu-
tritionem,
Sanguis cor non
sit in synocha
destruendum
immediat.

Vitium insti-
tutum parti ar-
te, ut quibus
causis.
Praecordia
perforantur
quod sit perni-
cia.

Diuites quos
pauperes in
terdum solent
deterior curari

Sanguinem mit-
tere in omni-
bus, perniciosa
quando sit sa-
luberrima.

Repellentia re-
media esse ido-
nea phlegmo-
nas mouentibus.

Relaxantibus
quod sit vici-
um videndum.

Astringentibus
quod sit vici-
um videndum.

Com-
horum
per se per se
esse in sin-
gulis febribus,
abstinencia ha-
biti operatur
abstinencia do-
pice facit.

Abstinencia
potest esse
perniciosa ad
vires & ven-
tri phlegmonem.

Amara quali-
tas vtrique a-
stringenti facit
Oleo spicis do-
nata.

Myrrinum olei
esse crassius
partiu, quod
vtrique aliter
descendere possit.

Phlegmonis ha-
biti cōposita
vtrique cataplas-
ma.

Astringentibus
in quovis
partiu afflu-
tu non sit
videndum.

ilium periculum. In his vero est quidem periculum, non tamen perinde ac in illis: nisi pus educere ex peccatore aut pulmone, aliquid sit opus. At in liene, curando, si vel xger ex eis sit, qui atrabiles excrementa naturaliter congerant, vel enī eo tempore succua in eis redvnder, necesse est reliquis stringentia permiscere, quod viceria robur custodiat: ita enim & excrementa ad se trahet, & cū corpus expurgarit, ipse rursus per ventriculū excernit. Sin atrabiles sit omnino excrementum nullum, aut prorsus stringendum nō est, aut parvisimū. Ad hæc, si in quavis phlegmone obfessa particula, calor tumore superet, agendum vt sensim per ea quæ tependē calorem obtinent, digeratur: quod genus est tum lini semine, tum chamæmelū. Quibus adici vel modeste vel fabarū farina debet: quippe quorū neutrum exal facit. Sæpe verō & artometelae ad eiusmodi phlegmonas vitium: cui aquæ aliquid admiscemus. Ad lienē verō enī acen aliquando aliquid. Si ve-

niūm partū est, sed enī nō mediocriter reprimenda vim obinet. Quo profectō rationabilis in principis affectuum ipso vitium, rosaceo admiscens. Procedente vero tempore, etiā spōdylin & serpylli aliquid miscet: quo scilicet tempore transire ad ea quæ cōcoquant, ac digerant, cōvenit. Sane ad eum modū & castoreo vitium: cum tamen ipso in aliis phlegmonis minimē vitamur, quis enī in summa inclinatione consistant. Est itaque calidus id, q̄ vt phlegmonis sit idoneum. Soleo autē ipse singulari particulam meatus, qui us ad excrementorū emissionē sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, vtriculo, mesenterio, et iecinoris cōcauis, intestinū rectū. Renibus, vesicæ, iecinoris gibbis, venæ caue, arteriæ magnæ, & omnibus qui in lumbis habent, eum qui vesicis inserunt. Pulmonibus & pectori, arteriæ asperæ, atq; fauces. Cerebro & eius involucria, eum qui per palatū & nares descendit. Paratur fluxibilitas

Phlegmonas quare calor in morbo superat, quibus curari medicamentis debeant.

Artometelae.

Phlegmonas quare calor in morbo superat, quibus curari medicamentis debeant.

Liens effectus quæ medicamentis curantur.

Hepatis cataplasmatis effectus, quæ medicamentis curantur.

Pulmonis inflammatio, quæ medicamentis curantur.

Pulmonis inflammatio, quæ medicamentis curantur.

Castoreum effectus, quare calor in morbo superat, quibus curari medicamentis debeant.

Fluxibilitas medicamentis curantur.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

Balneo quare calidum.

niūm partū est, sed enī nō mediocriter reprimenda vim obinet. Quo profectō rationabilis in principis affectuum ipso vitium, rosaceo admiscens. Procedente vero tempore, etiā spōdylin & serpylli aliquid miscet: quo scilicet tempore transire ad ea quæ cōcoquant, ac digerant, cōvenit. Sane ad eum modū & castoreo vitium: cum tamen ipso in aliis phlegmonis minimē vitamur, quis enī in summa inclinatione consistant. Est itaque calidus id, q̄ vt phlegmonis sit idoneum. Soleo autē ipse singulari particulam meatus, qui us ad excrementorū emissionē sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, vtriculo, mesenterio, et iecinoris cōcauis, intestinū rectū. Renibus, vesicæ, iecinoris gibbis, venæ caue, arteriæ magnæ, & omnibus qui in lumbis habent, eum qui vesicis inserunt. Pulmonibus & pectori, arteriæ asperæ, atq; fauces. Cerebro & eius involucria, eum qui per palatū & nares descendit. Paratur fluxibilitas

niūm partū est, sed enī nō mediocriter reprimenda vim obinet. Quo profectō rationabilis in principis affectuum ipso vitium, rosaceo admiscens. Procedente vero tempore, etiā spōdylin & serpylli aliquid miscet: quo scilicet tempore transire ad ea quæ cōcoquant, ac digerant, cōvenit. Sane ad eum modū & castoreo vitium: cum tamen ipso in aliis phlegmonis minimē vitamur, quis enī in summa inclinatione consistant. Est itaque calidus id, q̄ vt phlegmonis sit idoneum. Soleo autē ipse singulari particulam meatus, qui us ad excrementorū emissionē sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, vtriculo, mesenterio, et iecinoris cōcauis, intestinū rectū. Renibus, vesicæ, iecinoris gibbis, venæ caue, arteriæ magnæ, & omnibus qui in lumbis habent, eum qui vesicis inserunt. Pulmonibus & pectori, arteriæ asperæ, atq; fauces. Cerebro & eius involucria, eum qui per palatū & nares descendit. Paratur fluxibilitas

niūm partū est, sed enī nō mediocriter reprimenda vim obinet. Quo profectō rationabilis in principis affectuum ipso vitium, rosaceo admiscens. Procedente vero tempore, etiā spōdylin & serpylli aliquid miscet: quo scilicet tempore transire ad ea quæ cōcoquant, ac digerant, cōvenit. Sane ad eum modū & castoreo vitium: cum tamen ipso in aliis phlegmonis minimē vitamur, quis enī in summa inclinatione consistant. Est itaque calidus id, q̄ vt phlegmonis sit idoneum. Soleo autē ipse singulari particulam meatus, qui us ad excrementorū emissionē sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, vtriculo, mesenterio, et iecinoris cōcauis, intestinū rectū. Renibus, vesicæ, iecinoris gibbis, venæ caue, arteriæ magnæ, & omnibus qui in lumbis habent, eum qui vesicis inserunt. Pulmonibus & pectori, arteriæ asperæ, atq; fauces. Cerebro & eius involucria, eum qui per palatū & nares descendit. Paratur fluxibilitas

mus, ut quoniam ab utroque nutriamus. Verū si febris ipsa sit cōtinens, cōstat eam breui finem dam. Si igitur ultra septimū nequē progressura videat, prorsus cōtinendus à cibo xger est, si virtutem nō defuturū coniciamus. Sin ad nonū, aut vndecimū, aut quartumdecimū vsq̃ progressura videatur, aut etiam finienda septimū, ceterū xger vires infirmiores habere, quā in tantum tempus sufficiat, necessum erit nutrire, ac deligere id, quod minus sit noxiū. Etenim vbi vel iecur, vel ventriculū phlegmone prehendit, perniciosū fūsimū est ante accēssionem cibare. Vbi hæc abest, quibus infirma est virtus, vniūsum. Porro summū vigorem febrilis accēssionis expendens, an circa magnitudinē febris caloris sit siccus, squalensq̃, an circa siccitatē vrēs. Priorem namq̃ humectante victū q̃ppimum madescere oportet. In secundo, dum plurimum se se calor remittat, manere. In principij verō accēssionis more æstimabis, an corporis extrema refrigeret, & magnam sanguinis reuocationē ad interna corporis faciat: an omnino corpus nō premat. Quippe secundum hoc, ce facile manutetur, contemnes. In priore distinguas oportet. Nam si absq̃ visceris phlegmone, aut succorum redvndantia mortus ad interiora in accēssionibus pollet, nihil offendet paulū ante cibans. Sin vel phlegmone, vel redvndantia subest, cauenda est ante accēssionem cibatio, ce res maxime noxia.

GALENI PERGAMENTI de medendi methodo, lib. XII.

Quæ cum symptomata constitunt febres, non sunt ad febrium genus vllā, aut ipse ctes, aut differētiā distincta. Porro grauiorū symptomatū, & quæ rarēter febricitibus incidunt, primē differētiā sunt tres. Aut enim in læsione actionis cōsistunt, aut in retentorum vacuatorūve immo dicio excessū, aut in corpore ipso affēctū. Ex quibus quidē quidē diffērentiæ priores, si cōtristat, ad se totā curatiōē cōvertunt, affēctūq̃ deferre cogit. Terna verō, alterius quidē quē curare oportet, affēctus est signum: nullam tamen seorsum curatiōē exigit, vtpote cum affēctū, vnde nascitur, vñ cessans. Nullū autē symptoma, quā symptoma est, hæc curatiōis ratiōē indicat, nec primū immutari: licet ex accidētī interdū id faciat, vbi scilicet causæ locū fortitur. Porro eorū omnīū, vbi vel vī causæ curatiōē immutat, vñ caput est, ipsa læsio, siue virtutis sit, siue dispositiōis. Lædunt autē vires, vigilæ, dolor, atq̃ vacuatio immo dicio. Affēctui verō eadē, nō vniq̃ semper, ceterū magna ex parte, nocēt: ac positiūm cū fuerint immo dicio. Quæ de causā, quandoque cogimur prius submouere symptoma, q̃ morbi, murato videlicet insitūto. Ergo si labant vires, nō tamē vehementer sint resoluti, sed adhuc resistunt, ad symptoma tantū sumus attenti, atq̃ id q̃primū tollere mstruamus. Sin iam resoluta vehementer sint vires, non modō symptoma sedare, sed illas etiam firmare cōtendimus. Vbi verō virium roboris fiducia est, ad rō nūq̃ cōtra symptoma pugnamus, ut (quod prorsus contrariū est) per ea

nonnunq̃ præsidia, quæ dolorē afferūt, morbos ipsos curemus: veluti profectō dysenterici ipsi, mordentibus maxime medicamētis tum positiūm medemur, cum vniq̃ est grauissimā. Est autē duplex medicis contra dolorē instantiā ratio. Altera, quæ deliciis cubantiū subscindunt: altera, ex artis ratione. Quippe si licet ægrū dolorib. obtinentē valentib. remediis vno die persanari, q̃ tota curatiōe neglecta dolori tantū intentus est, nō ex artis ratione, sed in gratiā ægrotantis id facit. At si ex dolore vires soluantur, atq̃ ex eo impendet periculū, mingat dolor, & roborari vires debent, quā & morbo resistere, & curatiōis spacio sufficere valeat. Esto igitur terminus in ægrotantibus, quem nō transibit is, qui ærte generosē contra morbū pugnat, vt ruti medicetur. Et verō qui dolorē mingat, vt vires custodiat. Porro dolorē mingit, quæ ex papauenis succo, vel alterci semine, vel radice mandragoræ, vel deniq̃ styrace cōstant. Ceterū si fas sit, iis remediis quæ morbum sanent, vsuēdo, quod optima efficere, cauendum ab id genus sporitibus medicamētis est. Sin verō ex vigilis & viribus resolutis, xger ad mortis discrimē tendat, tum profectō ipso tempore uti vrare: nō ignarus scilicet corporis habitum nonnullū ex eis lædendū, eligendam tamen potius læsionē ipsam, q̃ mortē. Hac nimirū persuasiōe ipse quoq̃, tamētū omnīū maxime ab vī grauior sopientium abhorrens (quod rebellem valentēq̃ in corpore frigiditatē relinquar) aliquando tamen eā & colicis exhibeo, & iis qui vel oculorū, vel aurium, vel aliarū partium vehemētissimō dolore cruciantur. Interim verō, & cū xger ex tenui desillatione, vigilis, & vehemētī tūm vrgetur, pauxillum cuiusmodi medicamētī offero: faciliē noxiū eius, si quis semel sit vsus, spacio emendatum iri ratus. Omnia tamen id genus magis salubria sunt, si post annū id cōpositione fumant: vel vī quod ad Plaiōnē refertur, quod ad dolores stupefaciēdo sedandos, nullo minus est celebre. Id verō etiam si duorū, triūve aut quatuor annorū sit, multo sanē fuerit præstitū: sed neq̃ in vīlē ramē sequentibus annis, ad decimū vsq̃. Ergo si vī cauetus est, quoad fieri potest, cuiusmodi medicamentorum vīus ita si necessitas vrgeat, nec ad modū recentia sunt offerenda: quid habenda quæ in his sunt, prævalentes vires adhuc frabrant: nec ita antiqua, vt spēm nostrā frustrerint: sed tandū dimittēdæ sunt, quoad violentia refrigerantī, ab eorū quæ calfaciunt vī mitiget. Et taliū quidē medicamentorū vīus, eorū qui ad versus symptoma pugnat, est proprius, positiūm vbi ex frigida causā dolor est excratus. Ob sunt enim talia plurimū toti affēctui, curatiōisq̃ contumacē eum reddunt. Ad sanguinis missiō, quæ scilicet vires nō deicit, symptoma spectatis medicis opus nō est, sed ius qui totū affēctū adimere studet. Ad eundē modū & balnē, & purgatiō, & fomēta calida, & vini potio. Quæ omnia, dum affēctus sanant, vñ cum ipsis etiā dolores sedant. Eodem modo & nutrimentū exhibitis, vbi sicco & squalente morbo os ventriculi afficitur, dum affēctum ipsū sanar, hominem præhēdi gyncope prohibet. Porro qui ex copia cru-

Continentia febre detentur, quando ab ipso cibo seruati debeat.

Phlegmone affligit ventriculū, ut, si de ipso, per necessitatem esse ante accēssionem cibare.

Symptomata grauiorū tres differētiæ.

Symptomata ex se nec curatiōem rationē indicat, nec primū immutat.

Vires à quibus læduntur.

Symptomata submoueri, quādo negligēdo morbo cogimur.

Dysenterici grauiorū in rari maxime morbiūbus mōdetur.

Dolorē expugnādo ratio de plex.

Medendum tūc est.

Vires esse seruati dāt.

Superfieri, si se in pso, vñ dāt.

Superfieri quādo medendum.

Stupefaciētiū medicamētū Galenū vsu hauri interdū in dolorib. acerbissimū, & non transibit desillationibus. Stupefaciētiā medicamētū ita esse post annum id compellitur fūm car.

Pholodum stupefaciētiū.

Stupefaciētiā medicamētū, cui nec vīlē anima, nec vīlē ita improprē subdanda sunt.

Varia per
fistulam fist.
quid debet ad
miseriam, &
quomodo.

Oleum Sabin.
Oleo Hyssopi.

Oleo Sicyonis.
Oleum chama-
melinum.

Præter vberior
alios similia.
Somnia dicitur
non crudos suc-
cos diger proba-
bit, & vberior
reddat graui-
ra.
Somnia conco-
qui.
Vigilia digerit

Melle exhibe-
re.

Carapla(ma)
vtriusque uo-
ci-
fiprima quoniam
per vacua per-
tinet sunt vacua
ta partem con-
cisa.
Inodis longissi-
ma sunt quibus
corpus crudi
fucis molen-
dat.

dorum humorū, vna cum oris ventriculi offen-
sione febricitat, neque missionē sanguinis, neque
purgationē tolerat, cum tamen vacationē desi-
derent. Quare eis vacatio per fricutionē solā ad-
ministratur. Ergo lente mediocriter aspera sta-
tim in ipsius auspiciis morbi fricandi sunt, à crui-
bus superne deorsum. Debet enim radi ab his cu-
tis, cum simul & calferi per eam, & digeri cor-
pus postuler. Dein tota brachia, simili modo ab
humeris superne deorsum. Vbi verò artus om-
nes abvnde calere iam videbuntur, & metus fuerit
ne ex multitudine fricutionis, confusa iam car-
ne, superveniat lassitudinis sensus, oleo relaxare
veteris: quod genus est Sabinū. Ab astringente verò
abstinebis, cuiusmodi Hispanū existit. Hyems ve-
rò si fuerit, nihil deterius sit, si ad digerentium
aliquod transferis, quale Sicyonis est, aut etiam
chamamelinū. Vbi igitur oleo membra ipsa ab-
vnde fricueris, oleum est detergendum, atque ad
spinam dorsī transeundū: quam totā panter fri-
care, primū quidē sicca fricutione, post oleo, expe-
dit. Ab hac rursus ad crura te conferes, & ab his
ad brachia, denuoq; dein ad spinā: sic totū diem
agens, in domo & lucida, & tepera. Sanē mul-
ta, in qua coctū hyssopum fuerit, his est aptissi-
ma: qua sola primis tribus diebus vteretur. Ipse ve-
rò eo tantū tempore dictā intermittere fricutionē,
quo somnus hominē occupaverit. Ad quē etiā
alluciendū, & frictio vberior facit. Ceterū som-
nus vberior his minimē est salutaris: cum nec
crudos succos diger linat, & viscera reddat gra-
uiora. Sed si quis alius affectus est, qui somnū &
vigilias modicas postulet, hic profectō in lusu
est. Quippe somnus cōcoquit, vigilie digerunt.
Quorum vtroque est opus his qui ex multitudine
crudos succorū egrotant. Ac si pulsus his parvus
admodū infirmūq; sit, aut etiā supra hæc velle-
menter inæqualis, extremū periculū iudicat: nec
quicquid, præter iam dicta, molienti dicit. Sin verò
mediocriter sit robustus, nihilq; interitus videat-
ur, si sua quidē spē alius cōmodē nō deiciat,
soluenda est, multa iniecta. Quod si maior inho-
superfluorū impetus ad aliu cietur, principio q-
dem percoquere mulsam amplius oportet. Ea
tamen sicv minus alium subducit, ita magis nu-
trit. Post hæc, si supervacua largius descendant,
ne sic quidem sistenda: sed exhibendus pro aqua
mulsā prafana cremor est. Si verò fluere pergat,
alice sorbitione ægrū nutres. Si pulsus interim
ad imbecillitatē, vel inæqualitatē, vel parvitatē
mutetur, panē imbutū diluto vino porrigere cō-
venit: utiq; si nec ventriculus, nec incur laborent
phlegmone: quando si hac infestentur, corpore
crudis fucis referto, salus deplorata est, pulsū
sic immutat. Minimē autē vendū caraplasma-
tis aut persufusionibus est, priusq; supervacua ma-
gna ex parte partim vacuata sint, partim conco-
cta. Interimq; sola mulsā, in qua coctum hyssop-
um sit, viciq; ad septimum diem vtiatur. Si qui-
dem longissimā sic affectū cibi abstinentiam se-
runt, corpore salicet ex crudis ipsa, quas conti-
nent, succa cōcoquenda alio. Verū si alius im-
pensē fluat, vel æger mulsam fastidiat, ad praf-
ana cremorem est transeundum. Si lunc quoq;
averferet, alicā ad eundem quo prafana modū et

preparabitur. Neq; n. eis qui sic sint affecti, acetū
incommodum est. Imò sic vbi crudos affarum suc-
cos esse animadverteris, oxymeli assidue pro
mulsā dabis: si quidem æstas sit, & æger frigide
assuetus, frigidum: sin hyems aut, omnibus cali-
dum. Maxime verò pulvis parvus, tardus & rarus,
frigidus subesse succos ostendit. Sanē propo-
sitis ad versissima sunt tam balnei, tum aer ambi-
ens, quones vel nimis calidus est vel frigidus.
Itaq; ut laudā di nō sunt, sic & etiam di in do-
mo sunt: æstas quidem, quæ frigeat: hyems, quæ
caleat. Læduntur namq; nō parū ab vtroq; exces-
su. Atq; hæc quidē agenda sunt nbi, vbi à primo
die curationē susceperis. Si autē ad eos quos iam
premit syncope a citius fueris, si ea quæ retuli lo-
ca phlegmone vacet, panē exhibebis nō multū,
eumq; ex vino aliquo, quod celerē in corpus di-
gestionē adinuocat: statimq; ad fricutiones venies,
quas vt diximus administrabis. Ac si quidē celi
status sit vehementer calidus, cum frigida vinum
dabis: cum calida autē mediocter, si teperatus.
Quæ tamē secundo & tertio dabitur porio, om-
nino calidam exhibendū curabis, vt quæ succo-
rum crudorū concoctionē adiuvet. At quib. ex
staua bilis, quæ os vetriculi infestet, syncope inci-
dit, us frigida exhibenda potio est. Vinū tamen
quod & calidum natura sit, et deductionē in cor-
pus promoveat, omnibus quoq; syncope male ha-
bet, offerre cōvenit. Constat autē ex vino ea de-
ligenda esse, quæ & stauo colore sint, & substan-
tia tenui, & ætate vetera. Tertia nimirum & boni
odoris cōtinuo fuerint. Quin etiā si paululū vbi
mista sunt, gustus, senties calore per totū corpus
transmitti. Ceterū amara prius vetustate vna ne
sunt, præteritum quæ his exhibebis, quibus sto-
machus staua bile virgetur. Cōmodissima igitur
his vna sunt, quæ cum naturaliter sint austera,
sensilem iam astringendi vim, propter vetustatē
nō amplius exhibent: calorē tamen admodū evi-
denter habent. Huius igitur generis vinorū opti-
ma sunt, Surrentinū, Signinū, Sabinum, Tiburti-
num, & Marsum, omnia quidē Italica, astringen-
tiaq;. Quibus tamen ex crudis humorib. synco-
pes periculum imminet, sanē Falernū tantū iam
memoratis præstat, quanto tū melioris est succi,
tum etiā calidius: & virore qd & velocius illis di-
geretur per corpus, & crudis succis cōcoquendis
auxilio erit. In summa verò, quibus ex abundan-
tia crudorū humorū syncope incidit, us crassa vi-
na, seu noxia: a quā, seu parū efficacia, fugienda
sunt. Deligenda autē eorū sunt media, quæ staua
existit & calida. Neq; enim inveniās ex albo
vinorū genere calidū vllum: quādo etiā austera,
& mediocter aiba, cum inveteraverint, quodā
modo fulsiora redduntur. Quotquot autē in ipsa
calidissima sunt, omnia profectō sunt staua. Re-
liquorū vini generū, austera quæ mediocter al-
ba, crassa sunt, certē nullū ad digestionē in cor-
pus est idoneum. Si tamē abvnde inveterarint,
nec aliorū copia sit, vt illis licebit, quod stoma-
chum roborent. Ceterū vna quæ calasciunt im-
modicē, us offendat nō sunt, quib. caputq; im-
becillū, faciliq; ab id genus vniis repletur. Por-
ro vna quæ odora fulsuaq; sunt, quantū ex ipso
sum est natura, omnia caput grauit, Eoq; rā Fa-
lernum,

Oxymeli con-
grore ille qui
crudos succos re-
ducant.

Prigida subesse
succos qui pul-
vis indicet.

Syncope si cru-
ditate curari.

Syncope labo-
rantes omni-
bus quæ vna
sunt exhibenda

Vinorum gene-
ra vana.

Vinum album
quod calidū sit
reperiri nullo.

Vina impetu
calida su offendi
da nō est, quon-
iam caputq; im-
becillum.

sententia uobis omnia responderint, etiam carne iis aliquid nutrimenti post alia dabimus, porisum post quartū diem, succi qui febrem exciterunt, iam ad concoctionem venientibus. In omnibus autē eiusmodi curationibus, si illa ad sit syncope, omnis sollicitudo medentis ad symptomata vertetur. Sin expectetur, utriusque curam habebit, & ut symptoma non incidat, & ut paulatim discutiatur morbus: quē celerius discuteremus, si nullas symptomata subisset metus. Quippe qui multitudine et crudi succi grauat, hūc si modo iustam semel vacationem ferre posset, nec metus aliquis syncope impenderet, semel, arbitror, vacuare explicaremus ad morbo. Eum verō cuius spiritus & succi facile exhalant, si ante scissionē cibare nō cogermur, longiorem illi morbum certē nō redderemus. Sunt & alie quing; occasione quibus succedat syncope: nempe dolor vehemens, vigilie, immodica ventris manitio, motus in delirantibus, ac denique principiorum intemperantia, vel nuda, vel cum humorum affluxu. Si igitur causam ipsam vnde excitatur dolor, adimere possis, ita utiq; contra symptoma non pugnaueris, sed curaeris agitudinem. At si qua occasione prohibitis, affectui submouendo intentum esse non licet, vehemētia mirigabis doloris. Dolent proptantū tantum particulē sensibiles, idq; vel ob continuatē diuortū, vel ob aliquam alterationē, nō sensim, sed confertim & violentē factam. Quippe videntur corpora, nō solum cū in non naturalē habitum confertim aguntur, tristēm mutationē sentire, sed etiam in ipso ad naturalem statum suum reditu, nisi is sensim fiat, torqueri. Ac ex alterationibus quidem dolore afficiunt, omnia velicenter calfacientia, atq; refrigerantia. Ipsam autem solutionē continui, necesse est vel ruptio nem, vel cōtusionem, vel erosionem existere. Aruptio ex diffentione quadam, cōtussio ex gra uante aliquo, erosio ex mordente prouenit qua litare. Ergo cū nihil extrinsecus sit, quod vel distendat, vel granet, vel erodat, sed ex seipso ho rum aliquod corpus sentiat, neminem latere po test, diffentionem ab aliqua intrinsecus subitan tis, quæ multitudine sua corpus se continens di stendat, aut immodica siccitate, provenire: cōtusionem, ex eo quod aliquod corpus occurrat extrinsecus, quod vel durum, vel magnū, vel grane, vel simul ambo extitit: erosionē verō, ex succo aliquo, cui mordens natura inest. Qui qui dem si sit in tunicis intestinorū imbibitus, com modissime hiera picra ex purgatur. Quod si ali quodam exkicationē peperint, nutriendum certē æger est calente alic, sed insectis mālī punici grauis. Porus autē illi offerendus est, mālī punici cremor. Porro si sanguis ab vndauna sit qd distendit, protinus sanguis mītendus est, modō vi res ægri non sint infirmæ. Sed si is vel sanguinis mīssionē timeat, vel vinbus sit imbecillis, tum reuēlendus in diuersum est sanguis, tum per pro pinquā deriuandus. Quod si his peractis dolor etiā perstat, patet profectō in ægrotante particu la impactū esse quod cōstitat. Patet verō nō mi nus, & quod curatio ipsa per digerentia medica mēta molienda sit. Similiter etiā curantur dolores

si flatulento spiritu orti magis tamē q; extenuan tia remedia desiderant. Si moles aliqua grauando, contundendōve dolorē exciter, moli ipsi est medendum. Sin mordens humor, aduersissima huic sunt, quæ extenuant & calfaciunt. Postulat namq; huius generis affectus, ut ea quæ cōstitit vacuetur, aut atereant, aut medicamentis torporē inferētibz retundantur. Ea quippe minis hos affectus lædūt, q; alios, qui ad crassis glutinosissiq; humoribus, phisicantur. Huiusmodi tamen suc cos, dolor vehemens nō comitatur, nisi aliquis eis halituosus spiritus copuletur, qui ex iis corponibus quibus cōtinetur, erūpere prorsus non possit. Nam sic, grauissimi folent excitari dolores. Etenim cū tunicæ intestinorum sint dupli ces, si in medio ipsarum spacio frigidus ac viscidus humor collectus sit, a calore liquatus in flatulētū mutatur spiritus: qui crassus frigidusq; cū sit, acerbissimos dolores inducit. Ac ad tēpus quidē, post bibetū medicamen stupesciens, prorsus indolentem redditur ægri, ceterum affectus iis variis modis sit maior. Nam & intesti norū tunicæ medicamentorū frigiditate densiores, minisq; statui transmittēdo habiles redduntur: & humor ipse tum crassior, tum ad motum ineptior evadit. Quare id genus dolores omnes, per ea quæ incident & concoquant, præterea status discunt, deficiētiq; citra valentem calfactionem, curandi sunt. A nullo autem in eiusmodi succis tam est metuendum, quā in calore qui & eos liquet, & in statum verrat, sed nō valeat discutere. Porro ægrissimū quidem, alio co mēsto, vinōq; ad vesperā meraciori bibeto, à dolore colico fuit liberatus: neq; id iniuria: alium siquidem statum discunt, ac minimē sitim inferit. Quamobrem ipse alium theriacem ægyptiū appello: etiā cōmodissimum iis omnibus, qui regionem frigidam incolunt. Quos igitur ex prædicta causa vehemens intestinorum dolor ci tra febrem exerceat, iis & allium esse licet, & theriacem bibere. At si cum febris vna talis dolor ali quando incidat, principio quidem, si id ferunt, fomentum siccum ex milio adhibendum est. Si ab hoc non queſcant, semel aliquod, quod statum dissipet, in oleo quod tenuissimū sit partium, coquere, mox per lintēd, quō purum sit, oleum colere, dein anferis, aut gallinaceum seum, nec falsum, nec admodum vetus, in ipso oleo liquare, & per sedem in fundere oportet. At si neq; ex hoc remittatur dolor, secundū rursus initiē dum est tunc, adiecta etiam mīnum castorei & papaueris succi, vtriusq; sabbæ non amplius magni tudine. Idem vel minima modus est. Excipitur & lanula ex hoc medicamento aliquid: quæ appensa fortis illo, quam penitissimē in rectum in testinū inferi debet, quō vniq; & cūm libet, in facile recipiatur, & evidentē utilitatē cōferat. Simi liter & a oculorū, & aurium dolores, qui ab istis causis in febre excitantur, sedare conveniet fōmēto ex milio. Sed infum dimus etiam auribus medicamentū id qd ex castoreo & papaueris succo conficit, sapa liquatū. Quod sanē suri instillatū, oculorū etiam ac dentū dolores lenit. Iam verō si cataplasma imponi aliquid res ipsa suadeat, papaueris capitibus in aqua coctis, ac farnigretici,

Doloris à flatu lenis farnigretici uti curatur.
Doloris à multitudine humoris curatur.

Intestinorum tunicæ esse duplices.

Stupescientia medicamentis, obstandant quod dem doloris situm tamē non inter se reddunt.

Doloris instigmentum à crasso succo productis quæ sunt ratione curando.

Allium anallitatur dolor subice.

Alliū statum discunt.

Allium dicitur cōtusionem inferre.

Theriacemq; vtilis.

Colici doloris cur si mēta sit bria, curatur.

Passivus conficiendi in oleo ad leniendū dolorē coloris.

Doloris subice quæ ratione sit mēta.

Auribus instillatum medicamentū ex castoreo & papaueris succo papaueris et sapa cōstitit.

Oculorū atq; dentū doloris lenit.

Doloris mēta, de cataplasma opus.

Syncope quibus succedat causis.

Doloris causis.

Solutio cōtusionis quæ triplex sit, ruptio, cōtussio, erosio.

Diffentio spontanea vnde accidit. Cōtusionis causis. Erosio vnde fiat.

Hiera picra ex purgat humores aceti tunc uti tunc uti cōtusionis cōhibet. Diffentia quæ in viciis cōtinetur. Diffentia in sanguinis copia curatur. Reuēlendus est in cōtusionis mēta. Deriuandus sit per propinquā.

cogimurq; alia sanguinē mittere, idē aut vena incisa, aut membris us, quæ læsa nō sunt, scarificari. *Manu et epim laborante, scarificabis crura.* Altero crure male habete, reliquū. *Hæc namq; vacuationes indicat ipsa copia: sicuti etiam succorum vitium, et redvantis succi purgationē.* Sed quæ etiam græcè dicuntur phymata, glandulæ, sicuti fluxio in eas procubuit, citra viceris occasionem accidunt. *Vbi ergo dūtenus velerement glādulae sunt, aut alia quavis particula, quæ premit phlegmonē, cogimur, toto corpore prius vacuato, ipsam, scarificare.* Sanē vacuumus totū corpus, etiam si iam medicoritate succorū continet, si morbi magnitudo id suadeat. Si quidem dolor, et membrum inflammatum calor, etiam si purum ab excrementis sit totum corpus, fluxionis causæ sunt. Tunc tamen parcius vacuare expediat idq; habita ratione ætatis, naturæ, anni temporis, et regionis, ac denique consuetudinis ipsius negotantis. At vbi iam phlegmones ipsæ velvis feruor subsedit, mitigatorius emplastris dimissis, ad ea quæ digerunt, paulatim est transeundum. Ac primū cum mitigatoris ipsi paulum mellis miscendum. *Mox triticea farina in totum est auferenda, contentis hordeacea cum melle vberiore. Deinde ad aliquod eiusmodi digerentium medicamentorū veniendum, quæ vel humida consuetudine sint, vel cerati specie. A duris autem est abstinendum: nam & phlegmonarum reliquias contrahunt, & rursus phlegmonem in ægra particula exciunt.* Quod si pus aliquod notabile in suppurante particula sit contentū, non expedit incidere protinus, sed digestionem moliri medicamentis ad id valentibus. Cum autem quod ex phlegmone ipsa relinquatur, scirrhus effectum videtur, fidenter iam valentibus medicamentis vtens. Si quādo ergo ægram partem medicamentis acrimonia irritatam videris, mitigabis eam interea fomento, quod per spongiā administrabis. Id autem aliquādo ex aqua dulci esto: aliquādo etiam sal habente, vbi scilicet scirrhus ossis sunt phlegmones. Sin aliquando puris copia medicamenta superet, nec ea videantur tibi totum digerere posse, quod sic abscessus secare, eo posuimū loco oportet, quo est editissimum: obseruata interim effluxus indicatione: quippe tenuissimam illic etiam cutim inuenies. Post sectionem verō, medicamentum ali quod, eorum quæ sine morfu siccant, impone. Quod si cōputruisse porrio aliqua suppurantis partis videbit, excidi eam est necesse. Sectio igitur quæ vtetur in suppurante particula, myrti imitur folium, sirig planē nō magna: quali nos semper cōtemi fuimus. Ceterū cum in tali incisione longitudo maior q̃ latitudo sit, esto in inguine longitudo per transversum ducta, nō autem per rectitudinem membrum. Quippe ita dum membrū inflectimus, naturaliter cūis sibi applicatur. Post excisam cutim, medicamento, quod mannā vocant, affectam partē implebimus. Est enim ea purgamentū thuris, leui astrictione prædita: quo nomē etiam thurs ipso ad nonnulla vtilior. Thurs siquidem puris tantū mouendi facultatem obtinet, vapore nullam astringēdi vim habens. Magisq; id facit, quod pinguius ex eo

est, & magis albicans. Sicuti quod magis est fluuam, potentius siccatur. Mannæ verō, etiam corticis thuris paululum est admittum, vnde astrictionem vim habet. Ipse autē cortex thuris, tum astringit, tum siccatur insigniter. Itaque eo solo vtimur ad sanguinis perfusiones. Quin et si mingere prius incisam partē oportet, fomentis primū, dein cataplasmate, mox lumentare aliquo medicamine, aut nō siccante, singulis scilicet extrinsecus impositis. Nam in ipso vlcere tum mannam, tum pus mouentia, deū quæ expurgant, sunt imponenda. Post quæ, si cautas etiam ad fures, quæ impleant adhibenda sunt. Sin minus, ea quæ citatim inducant: veluti quod ex cadmia conficitur. Vtendū verō medicamentis id genus est prius, q̃ vlcus ad equalitatem, prorsus impletū fuerit, ne ipsa forte citatim circūspōsita sit cutē emittentior. Porro vbi æqualiter inter se succi omnes sunt aucti, plethora, siue plenitudo in affectus vocatur. Vbi verō vel flaua bile, vel nigra, vel pituita, vel serolis humoribus repletum corpus iam fuerit, eum habitu cacochymia vocamus. Ergo plethora tum sanguinis missione curatur, tum balneo frequenti, tum exercitatione, tum frictione: præterea digerentibus medicamentis, atq; etiam media. At succorū vitium, purgatione, quæ redvantis succo sit accommodata, corrigitur. Ceterum si iam æger febricitet, nec exercitatione vacuare licet exasperantem, nec frictione quæ calefaciat, sed nec multa frictione, nec balneo: imō sanguinis missione, vna cum media, vel purgatione aliqua. At si non febricitat, omnibus iam dictis vtare, optimū quodque ad id quod instat, deligere. Verū cui crura laborat phlegmone, ambulatione vel cursu exercitandus non est: sed nec stare iubendus. Satiū quippe est, vt sedens fricetur pluitum, moxq; manum motu exerceatur. At si quæ ex supernis partibus virgen videtur phlegmone, huic motus ex inambulatione aut cursu est admodum salutaris. Similiter & frictio ea tunc potior est quæ cruribus adhibetur, illis quæ in supernis partibus administrantur. Si quidem in omnibus talibus reuulsio debet fieri in contrarium. Neq; igitur cum vel circa sedem, vel aliquā huic partem vicinā, initium phlegmones incidit, alium deiciat. Neq; cum in vetrica, vel cole, vel renibus cepta est, pharmaca quæ vrinas provocent, bibenda dabis. Nec si mulieri in vtero, vel pudendo infedit, menses huic provocabis, sed ad partes quæ maximē longinque sint, semper reuulsio est molieris, æstumata tum phlegmone magnitudine, tum corporis totius statu. Nam si plurima succorū abvndantia sit, nec exercitatio ne, nec balneo sine periculo vtare. Sin exigua sit, licet & per hæc vacues. Iam verō, si phlegmone oborta sit ad affectū partis quā vexat, primū quidem affectus ille sanidus est: mox quicquid ex phlegmone est genitum. Quæ ambo interim iidem prædixi tollunt. Ceterū ad incipientes phlegmones, frigidis astringentibusq; magis vtendum est, quā iis quæ digerunt: atq; etiamnum magis, vbi crassum quod condit non est. Sed si sanguis in inflammata particula velerement impaciū fuerit, nō est amplius vtendū repercutientibus:

*Manu laborante
scarificanda
esse crura.*

*Crure altero af
fecto, reliquum
scarificandum
esse.*

Phymata.
*Phlegmone affe
ctas particulas
quando scarifi
care cogimur.*

*Vacuare quan
do solamur cor
pus, etiam si iam
medicoritate suc
corū continetur.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Thurs enim
diffundit et le
uat.*

*Lucifus paru
esse alioque fi
nitio circa in
flectionem lous
dat.*

*Ulcus in par
te felle videt
curare.*

*Cicatrici inde
residua molli
tate non
dant esse pro,
quoniam totū vi
tus profus ca
pitulos sunt.*

*Plethora quid
Cacochymia
quid.*

*Plethora cura
tur.*

*Cacochymia
curritur.*

*Crura phleg
monis affe
ctata sunt in
cranda.*

*Phlegmones
percrurum per
tiam quando
si curanda.*

*Reuulsio debet
fieri in contr
aria eorum par
tem, quæ phle
gmonem contin
et.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

*Phlegmones cau
sa sunt dolor et
membris calor.*

*Phlegmones
quando sit dige
renda.*

curtissimus: sed tunc digerere est tempestivum.

Quod si ex animalis punctu moriſive dolor incidit, à quo exorta fit phlegmone, duplex san-
di doloris ratio est, vel virus ipsum vacuū, vel
quod dolorē excitat, alterando. Ac vacuū fa-
ciē, eorum medicaminū ope, quæ vehementer
attrahunt: alterabis rursus quæ sunt contraria. Va-
cuant itaq; tum calciscientia omnia, tum quæ ad
se circa calcificationē alliciūt: vt cucurbitulæ, & cor-
nea quædā. Sunt qui & oreſino virus extrahant. 10
Huc pertinet & cauterium, & medicamenta quæ
cauteriis similiter cicatricem efficiunt. Alterū au-
tiorū genus est eorum, quæ qualitatē per con-
traria alterant. Variantur autem medicaciones,
pro laborantium particularum diversitate. Vna
quippe indicatio ex similibus sumitur parti-
bus, altera ex instrumentariis. At ea quæ ex simi-
libus sumitur, modum calcificandi, refrigerandi,
diſiccandi & homœtandi determinat. Quæ verò
ex instrumentariis, tum locū ipsum, per quem
vacuare oportet, tum vacationis rationē, tum
verò in similibus speciei medicamentorum vſu ip-
sum plura minorisq; modum. Porro vacuatio
nis indicatio in phlegmone, refrigerationis indi-
cationem vincit, contrā ſi in eryſipelate. In hoc
nanq; refrigerationis indicatio magis viget, q̃
vacuationis: est vbi refrigeratum eryſipelas est,
ad ea quæ digerūt medicamenta cōvertimur. At
in phlegmone tantisper refrigerandū est, quatenus
& ad incrementum eius ſuſtendū, iulubē-
dumq; eſt cōmodum. Quippe refrigeratio reper-
cūt it quod aſſiſit, & ex eo quod in laborante
cōtinetur particula, aliquid in proximās partes
repelit. Simili modo & quæ modicē exaltaciūt,
vitiā interdum ratione proſunt: quodd & dolo-
rem ſedant, & cōtenta in parte ægra digerūt. Si
quidem mitigando dolorē, augeri phlegmonas
vetant: digerendo, quod earū iam conceptū eſt,
ſolant. Si ſicur inflammacionē cōtrahere ceperit,
actō totū corpus æger in anihilonē, virtutisq; va-
lida ſit, atq; æger pubertatē attingent (puer enim,
quæ per diſſectam venam fit vacuacionem non
feret) pariter tum revellendus, tum educendus,
qui ad ipſum fluat, ſanguis eſt, interna in dextro
cubito inſecta vena: propterea quodd & dire-
cto, & ampla via, cum vena quæ cauſa dicitur, ſo-
ciatam habet. Hac nō apparere, mediā ſecan-
da eſt. Quod ſi neciſſa ſe oſtēdit, reliqua & ter-
tia incidenda venit. Ac modum quidem vacua-
tionis, ex redundantiæ modo, ætate, natura, an-
no tempore, regione, conſuetudinēq; atq; ante
lucē, ipſa laborantis virtute, invenies. Venæ au-
tem ſecandæ electio à parte laboris indicatur.

In viſceribus aut, quā longiſſimē à tēta ſua-
xione parte quod redundat revellere, nequa-
m ad eam trahere, convenit. Hac ratione, nec ſi he-
pat, aut ventriculū, aut inteſtina phlegmone
occupare iam ceperit, medicamine quodd aliu
deliciat, vti convenit. Eandem cum his indica-
tionem & vites ſortitur, ſicvti cum vrinæ vaſis
pudenda. At vomitu vti pudibundis laboranti-
bus, in diverſa revellens auxilium eſt. Eadem ra-
tione in omnibus quæ circa caput accidunt, alii
ſubduſſio in contrariū avertit. Si qua verò circa
faucē, & palatū, aut linguam, aut deniq;

in ore phlegmone laborare ceperint, in his om-
nibus cauenda ſunt, quæ plurius per os evo-
cant, Græci apophlegmānoſis appellāt. Sanus
nanq; tūc fuerit denariē ad nares, incidetq; lu-
metalē in manu vendit, ſi ea nō cernitur, me-
diam. Vbi iecur, pectus, pulmo, aut cor ſic af-
ficiuntur, interſi. In angina primas in manibus:
ſecundas eas quæ ſub lingua habent. At ſi quæ
tu occipite ſunt aſſectis, etiā eam quæ in cubito
eſt, necnō eam quæ habetur in fronte. Renibus
verò, & veficæ, & pudendo, & vtero ſic habenti-
bus, eas quæ in cruribus ſunt fixæ, ac potiſſimū
quæ ſunt circa poplitē. Sin minus, eas quæ ſunt
iuxta malleolum. Ac perpetuū quidem in omni-
bus, eam quæ ē directio eſt. Vbi iecur phlegmo-
ne in vadis, quæ in dextra ſunt manu: vbi lienē,
cōtrā. Itaq; ſubſta prima vacationis diverſitas
pro particularum diverſitate variatur: conſtat
commuē, quodd ſit vacuandum, indicationē
nō magis eſſe vilitatis quā noxæ cauſam. Por-
rō vbi pectus, aut ventriculus, aut partes circa
collum capiti vel laborant phlegmone, etiā exco-
gitatū eſt artus vincire. Quippe ipſum quod in-
feſtat phlegmone, haudqua-ſq; vincendū eſt.
Sed ſi in manibus ſit phlegmone abortu, crura.
Sin in cruribus, manus. Iam verò ne refrigera-
re inter iniuria, aut aſtringere, circa laboris par-
ticulæ indicationē, vtilians magis quā noxæ
ſunt cauſæ. Nam particulis quidd quæ iuxta ar-
tus ſunt fixæ, tuto miniſtrare poſſis frigidam ali-
quam fomentationē. Iecur vērò, ſi phlegmo-
ne infeſtat ceperit, non licet imponere actū fri-
gidum, aut fomentum, aut cataplaſma. Rurſus
aſtringens oleum, nec oculis, nec oris partibus
admovebis, ſi vbi lēx tentat phlegmone cepe-
rint. Anri verò, etiā ſi actum cum roſaceo in-
fundas, nihil offendet. Viſtus etiam pro parti-
ratione variatur. Quippe iis quibus glandulæ,
aut aliquid circa artem tenet phlegmone, tot &
talitā exhibenda ſunt, quos & qualia ſuſcitē cō-
coquent. At ſi iecur ventriculūve infeſtet phle-
gmone (cum manus eorū ſit toti animali cōmu-
ne) victu exquisitiſſimo eſt opus, qui videlicet
meatus aperiat detergentē circa roſonē, ac bre-
uiter omnis tenacitas ſit expers: qualis vique
in cibis eſt piſana, & in pharmacis oxymel, a-
qua diſtemperat. Ceterum dulcobone moribus
tum iecur, tum lien intareſcit. Iam verò aſtrin-
gentia omnis, mala iecinoris phlegmonis ſunt
incommoda, præſertim iis quæ in cauſo eius conſi-
ſtunt. Similiter ea quæ mordent, phlegmonas
quæ in cauſo ſunt viſceris, quā quæ in gibbo cō-
ſiſtunt, magis irritant. Iſs quippe quæ in gibbis
ſunt, mutata iam veniūt quæ aſſumpta fuerit: et
quodd prius concoſta ſint, & quodd ſanguini, qui
in iecinore prius erat, admixta. Cauo aut iecinori
phlegmone obſeſſo, protinus etiā venas quæ
in mēſenterio ſunt, vñ phlegmone laborare eſſe
necceſſe, cum ex vena portæ exoritur, protinuſq;
etiam, quæcunq; oſculus earum incidant, vim
magis offendere. Porro vbi iecur phlegmone ob-
ſeſſum eſt, mediocriter aſtringit per cataplaſma
miſte maritæ debet, quodd alitricis facultatis
principiū animalibus ſit, et venoſum ad hoc exo-
riatur genus. Vt autē iecinoris cauam per aliū

*Apophlegmaſis moriſus eſt ſi, vbi parva a-
nima ſunt inſerunt.*

*Phlegmone ex-
cepſit ore par-
ticulas, dicitur
ſi ad nares eſt
ſi, ſecundum
humorem in
manu venam,
aut mediam.*

*Vena ſecande
ſtatim in vena,
pulmo in pul-
mo, crura ſan-
guinem accipit,
crura veficæ, pul-
denti, & vtero
aſſectis.*

*Vitulus non eſt
ſi ſumit aſtrin-
gentia particu-
laritā, ſi ſi
quæ applicat
eſt.*

*Non eſt viti-
latus ſi phle-
gmone inſeſtat,
non ceperit, vel
alio frigidū eſt
applicable.*

*Aut inſtammē
tū ubi acci-
bit, vel ſi acci-
tum roſaceo in-
fundam.*

*Vel ſi pro par-
titione ratione va-
riatur.*

*Viſtus ſecundū
eryſipel, miſte-
maritæ cōvici-
tū.*

*Dalabur inu-
micit ſi ſunt
tam ſit.*

*Cauo hepati
phlegmone ob-
ſeſſo, vena me-
ſentericæ ſimili-
ter aſſigari.*

*Iecur phlegmo-
ne obſeſſum, aut
mediocriter aſ-
tringendū ſit
per cataplaſma
miſte maritæ.*

*Phlegmones à
punctu moriſus
animalis exor-
tati conſolati.*

*Vena à hepate
reſectū, quæ ra-
tione vacuati-
onem.*

*Medicaciones
variantur pro la-
borantium parti-
cularum diverſi-
tate.*

*Eryſipelas cu-
ratū.*

*Refrigerationis
vitiū in phle-
gmone.*

*Calcificandi
modū, debet
ſolanti, et cō-
tenta in parte
inflammata dig-
reſt.*

*Hepatū infla-
mati curatio.*

*Pueri ſecundū
tēta nō ſerūt.*

*Sanguinem in
cauſo ceperit,
ſi ab hepatē
ſi interna de
xtero cubito ve-
na.*

*Vena interſa
non apparere,
modū aut bu-
m crurum ſua-
dam eſt.*

*Reverſum eſt
modū aut bu-
m crurum ſua-
dam eſt.*

*Hepatis partes
per quas vias
ex quibus par-
gula remediis.*

purgatur, sic gibba eius, per ea quae modice vri-
nas mouent. Cuius generis apium existit. Proce-
dente autem tempore, vbi phlegmone iam con-
coquitur, etiam valentioribus vi licet: vt aroso,
Celitica nardo, phu, petroselinu, myrno, & meo:
sic vt etiam per ventrem vacuare, si cauum affici-
tur, amico cibus admisto, & vtrica, & mercuriali,
& episthymo, & filicula: omnibus praeterea quae
modice aluum deiciunt. Magisq in remissioni-
bus, tum his ipsis aduacius quam antè vendum:
tum verò quae us sunt valentiora, partim in pri-
fana incoctis, partim tuncis, ac in mollissimum
puluerem redactis. Exhibenda verò & haec sunt
vel ex pnsana, vel ex aqua. Ego namq etiam fili-
culae aliquid in pnsana aliquando incoxi, & ni-
gri vertari cortem. Sed clystere etiam ipsos vac-
quare expediet: inter initia quidem, vel sale, vel
nitro, vel aphronitio cum multa distemperatis
contentis: in remissione verò, potissimumque si
quid scirrhosum relictum è phlegmone est, etiā
valentiora medicamenta miscenibus nobis.

*Hepatis abscessus
phlegmone quae
in clystere con-
ueniant.*

*Scirrhus esse op-
portunissimum
hepar leni-
tissimum
nam quoniam he-
patis, esse ratio-
nem
tam crasso nu-
tritur sanguine
Remedii facile seu-
rbi contrahit.*

*Calculus quae se-
lone pignus
Calculus quae
medicamenta
congruant.*

*Hepatis infla-
mati oratio.*

*Lies nutritur
ex melancholica
sanguine, quoniam
expurgat ab he-
pate
Lies obstruitur,
aut inflatur,
qualia medica-
menta possint.*

Quippe hyssopum eo casu aqz incoquimus, &
otiganū, & colocynthida, & minus centaunum.
Opportunissima namq ad scirrhum sunt secur,
lieng, si qui, parum habita de his ratione, glutin-
osis cibus stratur. Etenim substantia lienis, tamet-
si rarior quam iecinoris sit (est enim illis sub-
stantia lutosā) crebrius tamē scirrhosis vitis as-
fligitur, propter nutrimenta, quo alitur, speciem.
Siquidem crasso nutritur sanguine, qui vel vili-
mus purioris est, facillimēq nigra bilis efficitur.
Renes etiam facile scirrhis deprehendi, atq idcirco
nephritis das alias omnino solui non posse,
alias egre solubiles esse, ratio docet: cum & cras-
sa substantia sint, & nō careant excrementorū vi-
no. Quo fit, vt qui crassi succi cibus vescitur, cal-
culi viuo vexentur. Medicamina igitur horū af-
fectum ea esse conitat, quae dissecant, dissoluūt
& frangant: quae viq ex eorum sunt genere, quae
obstructiones erunt atq detergent: ceterū vi-
ribus valentiora. Curatio autem vnā coindant,
virtus, natura, aetas, anni tempus, regio de-
niq, cōsuetudoq. Iecinore itaq laborante phleg-
mone, quae extrinsecus applicant, ea mixta esse
facultatis esse debent: idque non in generatione
phlegmones modo, sed etiā cū nec affluit am-
plius quicq, nec repellit quod in laborante parti-
cula cōtinetur, potest. Quo quidem tempore du-
plex nobis indicatio suggeritur: altera quidem à
phlegmone, sui evaporationē poscente, nimirū
digerentia: altera verò ab affecta parte, quae per
astringentia robur eius seruari iubet. Quare cō-
stantibus vnā contrariis indicationibus, compo-
situm quoq esse medicamentū oportet: nempe
astringens simul atq relaxans. Verū tuendi ro-
boris indicatio, in his tantum paribus est cōmu-
nis, quarum munus ex vsu est vniuerso corpori.
Igitur nec lienem tantū relaxantibus curare o-
portet, cū hic quoq ex iecinore quicquid limo-
sum & melancholicū est expurgat, propterea quod
licet, quod ex eo humore nutritur. Idcirco quic-
quid obstruēctio aut phlegmone, sed praecipue scir-
rhosis, in eum incidit, tum ea quae obstruēctio-
nes eximant, tum quae dissecant, vel ementiora exi-
git. Nam quale medicamentum iecinori abfyn-

thium est, tale est lienī capparis cortex. Quale
rursus iecinori est eupatoriū, tale scolopendriū
lienī. Siquidem similia genere medicamēta, quae-
admodum & nutrimenta, ambo viscera postu-
lant: ceterum tantū valentiora & acriora lien,
quantū crassiore vititur alimento. Iam verò cū
gibba iecinoris expurgari per renes oporteat, si-
cuti causa per inferiorem ventrem: lienī sanē per
renes nulla administrari potest vacatio, sed tan-
tummodo per intestina. Proinde vbi phlegmo-
ne premis, deiectionis ipsum medicamentum tum
detergemus, tum lacesimus, quod demittat de-
ponatq superflua. Est autē duplex ratio eiusmo-
di medicamentorū vsus. Nempe, vbi partes supe-
riores fixe laborant, per ea quae edunt bibuntqz
cū inferiores, per id quod sit per clystere istu-
fufum. Quandoquidem quae eduntur ac bibun-
tur, eorum vis, anteq ad inferiores partes perue-
niat, resoluitur. Quae infusa sunt, ea omnino ad
ieiunū vsq ascendere nequeūt. Porro gula (quae
stomachus proprie vocatur) affecta, cataplasma
ra super dorsū spinam imponimus: nō autē in an-
teriori parte: quod facimus, vbi phlegmone os
ventriculi vrgetur. Siquidem spinæ gula super-
lat, per collum & pectus deorsum vsq ad ven-
triculum exporrecta. Iam quemadmodū lien &
iecinoris causa, per intestina: gibba illius & renes
per vrinas purgati: sic pectus, vbi interna eius
tentantur phlegmone, per succingentem mem-
branam, aliq in mediū sui pulmonisqz spaci-
um transmittit. Id autē expurgari per eandem
quae pulmo viam debet. Propriā dā igitur vis qui
sic affligitur, sunt, quandoquidē ipsa inualefcit
phlegmone, medicamēta quae mediocriter vias
aperiant, & crassos humores dissecant: vt pnsa-
na & multa: in exquisita autē declinatione phleg-
mones, dum educi iam excrementa postulant,
quae id valentius moliantur: vt vineae semen, &
multa, in quam fur cōiectum paululum acrium
herbarum: quales sunt, origanum, hyssopum, ca-
laminthe, pulegium, & illyricae ireos radix. Oxy-
meli etiam quod ex marrubio conficitur, crassio-
ra pectoris pulmonisqz excrementa incidere po-
test. In vniuersum autē quae in alto corpore affli-
guntur phlegmone, ex partes paulo acriora, q
pro phlegmones natura, medicamenta deside-
rant. Resoluantur siquidem eorum vires, dum
altē descendunt. Hac ratione & cucurbitula (stre-
nuum planē auxilium) est inventa, tum vt foras
evocentur quae sunt in alto, tum vt eximantur &
eruantur, quae iam in scirrhum abeunt. Verū
vntendum cucurbitula in ipsa parte quae phlegmo-
ne vrgetur, inter initia non est, sed posteq vni-
uersum corpus vacuaueris, atq ex vsu iam esse
videatur, eorum quae in inflammata particula cō-
tinentur, aliquid aut vacuare, aut versus exte-
ra revellere. Proinde vbi affectus etiamnum in
generatione consistit, minimē ipsis membris
quae laborare incipiunt, sed his quae continua his
sunt, cucurbitula imponi debet, avellendi in con-
trarium causa. Sic namq ad mamillas cucurbitas
imposuimus, cū sanguis ex vtero profluit, defi-
xo maximē in ipsis cōmuniibus pectoris & vteri
vafis, eius ore. Sic fi è naribus sanguis profundit-
ur, praecordis maximas cucurbitas affligimus.

*Lies hepatis
multa nutriri-
ta in medicamē-
ta respuunt
Lies, etiam
virescunt ab aliis
non quibus hepatis
hepat per qui
regimen vacua-
tur.
Lies per singu-
la non vacuatur.*

*Clystere nō pos-
si vsq ad vni-
uersum ascende-
re. Gula afflicta,
cataplasma q
si applicanda
super spinam
dorsū.*

*Pectus per qui
regimen par-
tet.*

*Pectus phleg-
mone affligi-
tūa multo ali-
tā conueniant.*

*Inflammatio
alium fixa, ex
paulo medica-
menta acro-
potest, quoniam
pro ipsa ratione.*

*Cucurbitula
quoniam vires-
ca.*

*Cucurbitula
quando viden-
dam.*

*Cucurbitula
quoniam ad
maximas affli-
guntur.*

Sic &

to averſo deorum. Mox localib. remediis vten-
dum: nō tamē medicamētis iis quæ reperiuntur,
ac reprimant, ſed ponis iis quæ diſcunt. It̃, Igitur
ſceno græci decoctiōis infundendū eſt: quod o-
m̃ium maximē ſine offenſa digerat. Verūm tū
reliquoſ morboſ, tū phlegmonaſ, ſicvbi curas,
nullo evaporatē auxilio priuſ hident vtrūq, q̃
totū corpū, aut partē quæ excrementū tranſmut-
rit, vacuetur, aut cōtrariuſ qualitib. alteretur, ſi
aliquā intemperantiā ſortiatuſ, quæ ipſiuſ fluxio-
nionis exiſtat cauſa. Sic. n. diuinaſ oculorū fluxio-
neſ curamūſ, oculiſ ipſiſ diſmiſſiſ, atq; ad ca-
pinūſ cuſtodī cōverti. Plurimū aut̃ vel frigida
intemperieſ caput̃ vinit, vel humida: nec dubiū
eſt, quā enām amb̃b congregantur. Rarioſe
ſunt, quæ propter calorē, acrem oculiſ fluxionē
immittunt. In quibuſ oleo crudo, & Hupano, &
roſacco, vñ expedit: tum frequēti ex aqua dulci
in balneo lauanone. Quod ſi arteriæ, venæ
quæ iuxta oculoſ ſunt, imbecillioſe ſint reddi-
tæ, adeo vt aliorū vaſorū ſupervacuā recipiant,
aliqua earū parte exciſa, aut enī totūſ abvndē al-
tē præciſiſ, dura cicatrice quod̃ intereſt interci-
piemūſ. Cæteriū in reconditiſ vaſiſ hoc fieri ne-
qui, ac proinde eorū vini ægrē curationē re-
cipiunt. Vaſa verō cōſpicua, vel abſq; chirurgiā li-
cet cotrobore, illiſ medicamētis quæ robur
inferāt. Eit̃ & quādo calidūſ ſanguis, ac vaporū
plenuſ, ad caput̃ aſcendit, ac maximū in arte-
riis redundat. Cui vitio ſaluberrimū eſt reme-
diū, vt ex incidit̃ur arteriæ, quæ circa caput̃ & ca-
liδιοſe apparent, & maioreſ exhibent pulſum.
Quæcumq; verō & paruæ, & prop̃e cutem reſi-
dent, harū vel ſi partem aliquā excideriſ, velu-
ti facere in variobuſ crurū ſolemūſ, aptiūſ erit.
Quod ſi inter nudandū appareat tibi vaſ mag-
nū, aut magnū exhibere pulſum, tutiūſ fuerit
vinculo id priuſ excipere, mox qđ in medio eſt,
p̃cedere. Suntq; aut̃ eiufmodi vincula ex mate-
ria aliqua minimē putreſcibili, potiſſimū ſi iſ ar-
teriæ ſint excipit̃e. Etem̃ quæ caro in abſciſiſ
vaſorū partib. coaleſcit, ea p̃ operculo eſt, atq; i-
pſorū oſcula cludit. Quod quidē vbi factūſ iam
cernimūſ, decidere tunc tutūſ vincula poſſunt.
Ac ſic etiam variceſ curamūſ, quæ dilatare ſunt
venæ, potiſſimū circa crura & teſticuloſ.

GALENI PERGAMENI

de methodo medendi, lib. XIII.

HAudlōgē verō abeſt a phlegmone aliuſ
morbuſ eryſipelaſ dictuſ: qui quidem
ex ſucco biliſio ortuſ, tumorē calorēq;
quē cū illaſ ſortitur cōmunē. Diſident inter ſe
tamē affectuſ iſ, primū maximē colore. Quā-
doquidē ſi iſ rubet ſit, vitūſ vocat̃ phlegmone.
Sin palliduſ, ſauiūſve, vel ex pallido ſauiūſq; co-
lore miſtuſ, eryſipelaſ. Præterea puſillio eſt ma-
ioreſ phlegmonēſ propriūſ ſymptomata: quippe
quæ copioſo ſanguine in aliquā particulā procū-
bente, orta, altē magiſ in corpūſ dimittuntur: in-
biq; dolorē puſillūſ, cum reſſione & remiſſe ex-
citāt. Eryſipelaſ verō in cute potiūſ conſiſtit, ob
tenuſitatē ipſiuſ pallidiſ bilis. Ac corpore quidē
p̃ naturæ modo ſe habente, amareſ bilis fluxuſ
exhalat inſenſibiliter. Vbi verō iſ vel longē co-

pioſior, vel craſſior, qđ pro modo natureſ, reddi-
tuſ, vniuerſuſ ad cutem cōpūſuſ fuerit, etiam tū
perurit, tum in tumorē attollit, aliquid etiā ſub-
iecit̃e partiſ occupant. Hic itaq; affectuſ eryſi-
pelaſ nuncupatur. Qui quidē interdū cum exlice-
ratione ſupremæ cuticulæ accidit, vbi ſcilicet bi-
liſ ipſa craſſior ſimul atq; acrior exiſtit, interdū
aut̃ ſine hac incidit. Vbi verō nec plane biliſia,
nec ſanguinea fluxio eſt, ſed ex ambab. cōſtata:

vinūſ ab eo qđ in miſcella exyperiā, nomē tumorē
indatur, dicat̃urq; de eo id qđ præpollet, ſic vt
vel phlegmonē eryſipelaſiſ affectūſ ipſum
vocemūſ, vel eryſipelaſ phlegmonofum. Cæteriū
vbi neutruſ vincit, ibi vitūſ phlegmonēſ ery-
ſipelaſiſ mediūſ vocetur. Ergo omniūſ, qđ ſic
præter naturā cōſiſtunt tumoribuſ, cōmunis in
dicatio vacuatio eſt: quæ nimirū adminiſtrā du-
pliciter: vna repellentiūſ ad alias partēſ, altera p̃
halitū digerentiūſ. At quoniā eryſipelaſ nō quan-
titate modo aſſigit̃, ſed etiā ob vehementē inſi-
ſtantiāſ qualitate ipſa cruciat̃, requirit̃ amplio-
rem refrigerantiāſ qđ phlegmone. Cauendūſ ta-
mē eſt interm, ne in principē aliquod membrū
ipſam bilē repellat̃. Ac, p̃inde, quemadmodum
in phlegmonēſ curatione, poſt totiuſ corpōſ
vacuatiōnem auxiliuſ repellentiūſ. vnumq; ſic fa-
cies in eryſipelaſe: ſed p̃ ſanguiniſ miſione me-
dicamento qđ bilē trahat purgāſ, ipſam verō af-
ſuſcitā partē refrigerāſ. Cauſa ſanc̃ refrigerantiūſ
terminuſ eſto, ipſa coloruſ mutatio. Etenim
qđ purum eryſipelaſ eſt, ſtatim cum hoc cōquie-
ſcit. Quod nō purūſ, quodamōdo p̃ phlegmo-
noſeſ, ſi pluſculum refrigeret̃, luidūſ cutim p̃ſer-
fert: nignicat̃q; ſi magiſ. Quā ob rem ſanūſ fue-
rit, vbi laboriūſ particuleſ alteratūſ colorē vide-
riſ, a refrigerantiūſ. aſtringentiūſq; ad cōtraria
trāſire, priuſ qđ vel luidūſ vel nigraſ priuſ ſiat.

Refrigerat̃ porro, ſolanūſ ſempvūſ, p̃ortulaca,
ymblicuſ veneriſ, pſyllium, altercum, lactuca,
intybum, paluſtriſ lennacula, cerata ex aqua ad-
modum frigida, & alia id genūſ. Vbi verō inſi-
ſtiſ ægrotantiſ membrūſ iam deſiit, cataplaſma iſtū
li, priuſ quāſ lueat̃, ex hordeſ farina imponē-
re. Quod ſi luor iam occuparit̃, id incitiſ priuſ
cute imponatur, perfundendūſq; locuſ plurimūſ
quidē ex aqua calida. Sed & marina aqua, & mu-
ria cōducet̃ interm. Quinetiūſ ipſi cataplaſmati
eiufmodi aqua, vel acerū, vel oxalē miſceatur.

Nullum autem valent̃ calſcantiūſ eſt mede-
la eryſipelaſiſ, priuſ qđ id quod mutatur, deſinat
eſſe quod autea fuerat, atq; alterūſ iam, illiq; con-
trariūſ eſſeſcit. Interdū enā eryſipelaſ miſcet̃ur
edemati, dicat̃urq; eryſipelaſ edematofum: quē
admodum vbi ex nimia refrigerantiōe durūſ æ-
gryg ſolubile eſt redditur, eryſipelaſ ſcirrhoſum
vocabitur. Quod igitur ad curationēſ pertinet̃,
poſſimūſ contra exyperiāſ eſt pugnamuſ,
non neglectāſ interim alteriūſ indicatiōnem. Sic
vtrūſ ex biliſia fluxione eryſipelaſ, ita ex pu-
toreſ conſtat̃ edemata, exiſtenteſ laxuſ quidam tu-
mor & indolentiſ. Qui quidē in aquę inter cutim
diſpoſitionibuſ, necnon in phibō, ſolet etiā pe-
des aſſigere. In illaſ tamen affectuſbuſ, quum ra-
liſ tumor ſymptomata ſit, nullam ſcorūſ, p̃p̃riā
curationem requirit̃. Nam ſatuſ erit tunc perfici-
care

*Vasogæta deco-
ctum oculorum
transmutat. Oculi.
Dignitatem nō
eſſe videntūſ ſi
dicit̃ur p̃cipuā
vniuerſiſ corpo-
riſ, aut partē
quæ excrementū
tranſmutat
iſ, conſiſtiſ ſue-
rit.*

*Oculūſ vaſa ad
ſecuratiāſ præ-
ſtitiſ tunc eſſe,
dū imbecillioſe
re reſtata, alio
tū vaſorūſ excre-
menta recipiunt.
Vaſa conſpicua
poſſe abſq; chi-
rurgiāſ cotrobo-
rari, illiſ me-
dicamētis quæ
robur inferant.*

*Vaſa extendendūſ
ſunt.*

*Variceſ quæ ſe
habeant circa
crura.*

*Eryſipelaſ va-
de p̃cipuatur.
Eryſipelaſ quæ
nudo a phleg-
mone diſſertat.*

*Phlegmonēſ ge-
neratiōſ ex ſym-
ptomata.*

Eryſipelaſ qui

*Phlegmonēſ ery-
ſipelaſiſ.
Eryſipelaſ phle-
gmonofum.*

*Evacuatio in
tumoribuſ præ-
ter naturā, do-
plex.*

*Eryſipelaſiſ co-
ratiſ.*

*Eryſipelaſiſ in-
feriſtateſ rem-
nūſ ſit ipſa colo-
riſ mutatio.*

*Eryſipelaſiſ in-
feriſtateſ mobi-
litateſ ſol-
uta.*

*Eryſipelaſiſ ede-
matofum vnde
accidat.*

*Edemata eſt tu-
mor laxuſ et in-
dolentiſ, vnde a
poreſiſ. Edematūſ co-
ratiſ.*

care crura, aliis oxyrhodino, aliis oleo cū sale, aut etiam oxyrhodino sal habente. At si ex pitui roso humore in particulam influente edema cō stitit, abvnde aliquādo satisfaciit spongia rectē, potabili oxycrato madidata. Deligare verō īp sam debes, ab inferiore parte incipies, ac suprà deficiens. Si recentis copia non sit, antiquam de tergebis, expurgabisq; nitro, aphronitro, et aqua, laxina. Quod si sic edema non subsidat, vbi rur sus deligabis, pusillū aliqd aluminis cōiciēs, ac novam spongiā admoue bis: aut etiā ellychnion molle, madensq; ex posca, quē aluminis nōnihil receperit. Sit aut arcimasio mediocris, vel vni in of sis fractura. Ac primū quidē fasciē iniectiones, q̄ scilicet infernē incipiūt, magis arcitandē: q̄ deinceps sunt, sensim remittēdē. Idonē etiā medica mentū ad hęc etiā glauciū ipsum, liquatum in po sca: nostrūq; medicamē, qd ex eo cōficitur: qd q; nō edematā modō, verū multo etiā magis tū erysipelata, tū phlegmonas incipientes sanāt, ac potissimū calidas. Porro scirrhosis affectibus (q̄ d glurinosi, aut crassi, aut vtriusq; rationis par ticipibus humorib; trahūt ortū) nullū vehemen ter exalefaciēs, siccānsve medicamentum est a p riū. Nam quē eiusmodi sunt, digerūt quidē sub tilia: quod verō reliquū est, multo magis impin gūt. Quā ratione etiā calculi gignuntur in reni bus, alio scilicet in his crasso glurinoso succo. Quare ea tantū sunt ad mouendā tumorib; in duratis, q̄ mollidū digerere possunt: cuiusmodi sunt, tū ceruina medulla, tum vitulina, tū seuū hircinū, taurinū, & leoninū. Ad hęc, ammoni a cum thymia, & bdelliū vtrumq; sicvī etiā sty rax. Sed ex his, lumētiōra sunt præterēda. His igitur artētus indicationibus, etiā cōplicatō affe ctus sanare poteris. Ceterū si tendones & liga menta indurata fuerint, aliqd indicentiū emol lientib; admiscere oportet: cuiusmodi vel in pri mis acētū est. Equidem pyren lapidē, aut mola rem, sed candentē, in aceto quam acerrimō extin guere soleo: dein scirrhosum ligamētū, vel ten donem exponere, vt calenti vaporem excipiat, in eōq; dimoueatur. Postea verō medicamē qd emolliat impono, oleoq; aliquo tenui, ā princi pio cura novis, particulis laborantē phendo. Ita que curatio q̄ per acētū administratur, vtilis est vitio iam adulto: & quē preparata iam sub mollientibus pars fuerit. Ad ligamenta autem & ten dones, nec sepe, nec inter initia, nec longo tēpō re, medicamentis quæ aceto componuntur vt tendum est: quamvis in liene & carnosū muscu li partibus tutus eius sit vīus. Ac ammoniacū quidem thymiaa liquatū aceto, ad luti scilicet crassitudinem, compurescens leni imponunt: idq; solum ei curando sepe fuit satis. Induratis etiam muscularis, vbi emolliri per alia medicamēta iam fuerint, ammoniacum aceto liquatum maximū vīum præstat. Sufficit autem eo vno alterēdie vīos, rursus ad emolliētia reverti. Ego verō me dio tēpore cataplasma ex althea fusi vīus. Cuius radix seuo a snerino, aut gallina cō, aut suilo liquata, salutare ad emolliēdos scirrhos medi camē existit. Sylvestris quoq; malū, q̄ passim na scitur, folia, cum supradictōrū aliquo rursūa pro ficient. Meliora tū crudis sunt, quā modicē ante

sunt cocta. Variatur itaq; curationis motus pro differentis particularū. Quippe laborantib; præ cordiis edemate, nemo ex posca frigidam appli cutrit spongiā: nec absynthiū oleo incoquē, ge nu quiquam perfudit. At iecinori ægrotanti & lieni, cum maxima vilitate adhibetur. Vocali igitur scirrhū impresentiārū tumor durō & indo lene, nō tū omnino absq; sensu. Talis nō est fa nibilis. Reliqui o ēs, sicvī egrius sensibilem ipsam partē affectā reddūt, ita oīno insensibilē nō est scilicet: vtiq; si sensiblis sit natura. Ligamēta nōq; sci mus insensilia esse. Sed iā ad inflammationes nos cōvertamus, q̄ qd ex statuofo spiritu in aliqua cauitate collecto oriūtur. Dissert aut inflatio ab edemate, q̄ ille tumor sit laxus & digitis cedēs, vtpote ā pirata exortus: inflatio aut maxime re nitatur tangēti, sonitūq; veluti tympanū red dat. Scopus autem omnium inflatōnis cōmuni s est, vt quod præter naturam est, vacuetur, in quo cūq; id cōtineatur, p prius verō, vt tenuis imis & calidis potestate medicamentis. Atque in ventriculo quidem, inflatūq; visceribus, oleum quod tenuissimū sit partium, quodq; rursū habeat incoctū, aut semen cumini, aut apni, aut petroseli ni, id præstat. Aliquid verō & cucurbita ma gna bis tēre sine incisione medio ventri affixa. At in artubus & muscularis, qui sub cute, aut etiā membranis quæ ossa vestiunt, sunt, inflatione orta, si citra dolorem sit, lixiuū noua spongia exceptum, abvnde fuerit. Sin dolor quoque vr geat, vnguenta pars est oleo, quod relaxandi, remittendūq; vim habeat. Musculi verō simul & in flati & dolentes cō confusionem, satius est, vt in principio sapa cū vino & aceti paulillo, medio eriq; olei portione, omnibus vni modicē calsa tis, atq; plana succida exceptis, foueātur. Qudd si succida facultas nō sit, ipsius ærēpus iniciēdū supradictē miscellē est. Ceratum etiam qd ex æ sypo cōponitur, ad idē non idoneū fuerit. De bent enim contrā musculi leniri medicamento, cui multa facultas sit, quæ simul concoquat, dige rat, & modicē astringat. Quandoquidem si nihil astringentis fortitur, augeat aliquādo phlegmo nas, præcipue in iis corporibus, q̄ sunt plethorica. Igit si dolor vehemēs vrgeat, mitigatiua māgis medēdi ratione vtiēis. Sin verō ille absit, maiori vi cōtra inflationē instabis, p valētiorē me dicinā: cuiusmodi sunt lixiuū, acētū, & post hęc, vinū. Quoties ergo de mitigādo nōn labo ras, illorū plus in misuram cōiciēs. Rursus vbi repellere studes, vini nigri, austerioris, plus quā m ipsorū, immittes. Ad si digerere malis, lixiuū plū indeas. Acetum verō si his miscbis, ad ambo erit vtile, propterea qudd mistas habet facultates. Qudd si muscularis, prius sine dolore fir, licet in lixiuū penuria, pro illo aphronitrum immittere, idq; minime lapidosum, sed spumoso magis: Inflationes aut inveteratas, primū quidē aliqd ex iis q̄ ex lixiuo constant, fouebis. Secundū ve rō frigiditē gymnasiū fruscūctis, & mox colaris, pollinem calcis vixū in spergito, vsq; ad crassitudinem luti, ac tandem cataplasma id affe ctū sedi admovento. Salutare etiā his medicamen tum est, qd ex sycomoro cōficitur. Etā & alius infla tionis affectus, priapismus dicitur: quo dēctis,

Curationis mo do variat, pro differentis particularum.

Scirrhū quid.

Ligamenta esse insensilia.

Inflatio ab ede mate quomodo differat.

Inflationē for mē.

Inflationē vr gerē quomodo diffinitur.

Cucurbitula facta dicitur de cū idonea. Lixiuū est spongia applic ti. extenuatū partium statim diffinit. Musculorum cō confusionē q̄a cōstans.

Quā p̄p̄. Cūq; mīstis medicamentis q̄a nōq; esse debent.

Quā p̄p̄. Cūq; mīstis medicamentis q̄a nōq; esse debent.

Antum mīstis facultatib; forti tate.

Inflationē im mittere q̄a ratione curada sua.

Priapismus quid.

R. r. q.

Alumen videri natu deficiu.

Glaucium & diaphanum, admodum cry pelata, & glie gnosius sanāt. Scirrhū non cō reuans mōb; camenta vlti muer cūsa cūsa et sicca tate.

Calculi quomo do generentur.

Scirrhū sunt admodum, quæ molliorē digerere possunt.

Induratos ten dones quæ ra tione oportet curare.

Aceti vīus quō do induratuū firat.

Ammoniacū aceto liquatū leni induratu cōducit: nec al iter induratu mīscuū.

Althea radix seuo a snerino li quata, salutare ad emolliēdos scirrhos medica mentū existit.

vel in vitio, pudendum arrigitur. Etenim quum nervus propriis colis substantiâ constitutus, natura cauerosus exiit, vbi halitusosus spiritus implet, eiusmodi affectû excitat. At halitusosus spiritus in animalis corpore gignitur, ex succo semini excoactus. In primis ergo ea vacuatione vniuersum vacuandû est corpus, q̄ maximè videbitur ex vfu fore egrotanti. Dein verò imponendi ipsi laboribus medicamentum est, si ea calidior sit effecta, q̄d ad portionē caloris abvndantis refrigeret. Sin aliter, inter initia quidē, omnino q̄d modicè refrigeret: postea verò id necessarium nō est. Pari modo & q̄ circa lumbos sunt particule omnes, eiusdē facularis medicamētō cōprehendendæ sunt. Etia reliquis viciis exhibendus, qui & statim advenit, & ficit. Equidem quēdam adolescentem sic affectum carui, primum quidem sanguine misso: dein cerato, facto ex rosaceo simplici, imbutōq̄ aqua frigida, pudendo ac libus imposito. Simili modo & aliū, qui post missum sanguinem humido medicamētō, quod ex chamæmelo conficitur, eū vīus. Porro istis etiam nymphiæ aliquid potandum exhibeo, saltem in principio. Mox vitium semen: ac si traxerit adhuc vitium, iuxta semen copiose comedendum. Eū enim illud cōmune præceptū omnium ferme, quos vitiosus succus creat, morborum, quod iū sine calfacientibus & siccatibus sit vitendum: quippe hæc, quod reliquum humoris est, prorsus absumunt. At verò maximè tumefactam cuiusdam linguæ curauimus, carapotis ex aloë, scymonia, & colocynthide, vesperi datis, illam purgantes: lactuce autem succo ipsam linguam colluerat. Quod autem in priapismo vomitorius medicamentis potius quam subducantibus sit vitendum, in linguæ vitio contrā, id ex partium situ indicari peripicuum est. Nam avertionis in contrarium, non à substantia, sed à curandi membri posita, inventio præstat. Porro ex humorib. rubeus quidē, sabesse humorē sanguinem indicat: sicvri flauus & pallidus, perfimilē ipsi bilem. Subalbidus verò & laxus, pituitam. Sunt & alij tumores fusi, luidive, tactui admoldū renitentes. Quod si membrū fortianus evidētiores venas, exaltatas eas iuxta hosce tumores à crasso & nigro quodāmodo sanguine, videre licet. Qui humor, vbi in caluerit impetus, aut propter putredinem, aut febrem pilegmonodē, nigram efficit bilem, quam ne mutes quidem ipsi gustauerint. Terra quoq̄ ab ea raditur: ac partes quæ raduntur, omnes attolluntur in alium: vocaturq̄ affectus tum feruor, tum fermentatio. Est namque is humor talis, quale esse acetum docuimus: in vomitionibusq̄ nō raro percipitur acidus: vt amarus, qui pallida dicitur bilis. Quæ igitur verè dicitur atra bilis, aciditate cū, atque terram fermentans, omniū animantium iniucunda. Quæ verò vitralis fit est apta, ea dicitur melancholicus humor, vel nigra etiā bilis: ita tamen vt distinguatur ab altera quæ assatione oritur. De nonnibus tamen anxia disceptatione neglecta, nonnulli præter naturæ tumores ex eiusmodi naturæ succo proveniūt, cuiusmodi est fœx in vino, & amura in oleo. Qui quidē spatio temporis putrescere humore, pro-

pterea q̄ sit impactus in vasis, exulcerant. Atq̄ lūsumodo sanē affectû cōmuniter omnes cancrū appellant. Quod vitium, pennde vt reliqua omnia, plurimā habet in maioris minorisq̄ ratione differentis. Igitur cōmunis cancrū curatio, est melancholica succu vacuatio. Mox, plubito, ne de cetero talis humor collagatur in venis: particaluq̄, ne amplius redundantē succū recipiat, corroboratio. Soluimus aut melancholicū succum, drachmis quaternis epithymi, in sero lactis, aut mulla exhibitis: aut propinato medicamine nostro, q̄d ex duob. & triginta simplicibus cōstat. Post purgationē, dictū iam de omnib. eiusmodi affectib. est, q̄ vel repellere humorē q̄ in membrū, percubuit oportet, vel ipsum digerere: præterea q̄ in principio quidem tam in ipso purgationis tempore, q̄ ante id, repellere: vbi iam totum corpus exquisitè purgaueris, digerere. Vbi tamē mediocri tantum purgatio præceps ferit, missū esse q̄ applicabitur pharmacū, ex repellente digerentē facultate cōveniet. Cæterū ad discutiedos cancrōs, mediocriū vitii medicamentis est opus, quæ nec ppter imbecillitatē vincantur, nec ppter effectus vehementiū, ipsum sanguinē crassent. Quia verò ipsius vitii malignitas, ab is quæ modicè irritatur, & effertur: ob id vitig nō modō mediocri viribus, sed etiā minimè qualitate mordētia, eiusmodi affectib. sunt idonea. materia quorū, ex vitiis elonget me tallicis desumetur. Quippe quæ medicamēta ex his cōponuntur, ad sanandos incipientes cancrōs, magnā vim obtinent. Maiores verò fat fuerit, si his prohibeatur augeri. Cæterum si quidlo cancrum per diutius curare audebis, capisse quidem ab evacuatio purgationē melancholicū humore oportebit. Vbi verò q̄d viciatū est, totū prorsus exaceris, sic vt nulla supersit radix, fines effluere sanguinē: nec ppter eum inbibebis: imō premendo potius quæ circum sunt, venas, exprimes ex his crassiorē sanguinē: mox alius vicerib. similiter curabis. Est aliud vitii, carbunculus appellatus, q̄d ex humore crasso feruentēq̄ nascit. Incipit hoc plerumq̄ a pustula: aliquando verò & sine hac. Cæterum inter initia, quib. hoc insit, scabiis omnino particulis. Mox oritur pustula quæ dī, modō cineris colorē referēs, modō etiam nigrior: qua rupta, vlcus cū crusta gignitur. Omnibus præterea his circūposita caro, in summā pervenit inflammationē: colorē, magis q̄ phlegmone, nigricēs. Necessariū autē sic affectū febricitare: quare ab incisa vena incipienda curatio est, detrahendiūq̄ sanguis ad animi visū deliquit: nisi aliud aliquid obstat. Imponi verò sibi ægra particula, quod ad humorū inflammationē spectat, refrigerantia desiderat: propter crassitudinē tamē humoris, atq̄ etiam malitiā, nec fluxionē avertere vnquā poteris: & si quando id feceris, aliud quippiā, q̄d in alto fit corpore, offendes. Atqui nec assuere is permittendus est. Quin potius inquirēda remedia sunt, quæ quōd modicè reprimendo: etiā digerere possint. Tale affectū est tum caraplasma quod ex plantagine conficitur, tum quod ex coctā lente: scilicet miscentibus nobis his teneris micam panis, & miscellanei, & in cibano cocti. Etenim panis omni-

Halitusosus spiritus ex succo semini excoactus. Priapismo curatio.

Nympha. Vitium semen. Rata semen.

Inguam cuiusdam tumefactā quæ raditur curatio Galen.

A versio est melancholica in citra riam. Celer, humor, humoris a quo est oris, detrahit.

Atra bilis generatio, q̄ facit.

Fermentatio quæ.

Melancholicus humor, vel nigra etiā bilis.

Cancer generatio.

Cancer tumore.

Melancholicus succus purgatio.

Melancholica materia cancris (sunt) de incipientibus cancris idem. Cancro per diutius curatio.

Carbunculus simplex.

Carbunculus ab ipso feruore reprimi. Carbunculus a ratione.

Carbunculus a capite feruore & dolore.

Purior puri sub-
stantia in cuti-
mestib. haeret.

Carbunculus post
sanguinis mis-
sionem esse sic-
rificandum.

Cheradae.
Strumarum or-
tus.
Glandularum
natura est du-
plex.

Albuginis du-
plex genus.

Alburena,
Stearoma,
Melicera.

Albuginis qui
in visceribus de-
litescent, medi-
camentis qua ex
aromatizati co-
piantur maxime
sunt ex usu.

Tumores omnes
præter naturam
suo ablatum
indicant.

no puri substantia in cutis meatibus haerere est ap-
pta. Furfuraceus autem, crassiorum est partium.
Super ipsum verò vlcus valde aliquod imponen-
dum est medicamentum: cuiusmodi est Andronis, Pa-
sionis, vel Polydiplicarij: id cum vino aliquo
dulci ad sordium crassitudinem debet. Quæ au-
tem plasmata reliqua adhiberi vlcibus solent,
nempe quæ cōcoquant & pus moueant, ea nūc
adhibenda nō sunt, quando ita particula putre-
dinem auxerit. Scarificare etiam eiusmodi tu-
mores post sanguinis missionem alienum non est.
Sunt aut incisiones altiores mediocribus, pro-
pter instantis humoris crassitudinem. Inflan-
matione cessante, vlcus ad cicatricē similiter re-
liquis, est perducendum. Atq; hætenus de car-
bunculis. Nunc verò de strumis disseram, quas
cheradas Graeci vocant: quæq; sunt, glandulis
in scirrhum affectum mutatae. Est autem du-
plex ipsa glandularum natura. Quippe nonnul-
larum in quorundam vasorum medio, didu-
torum in varios ramos, ad tuncum eorum ro-
bur, sunt constitutæ: quarum haud magnus usus
animantibus est. Aliæ verò ad excipiendam sali-
uam, vel lac, vel semen, vel aliquem humorem al-
lum gignendum, sunt fabricatæ. Atq; harum
sæpi maior est usus: nec aliter sanande sunt, si cō-
traxerint scirrhum, quàm ceteræ omnes corpo-
ris partes. At quæ medium vasorum spaciū im-
plent, in his alia curationis indicatio præstat, qua
simul cum vitio etiam pars ipsa tollatur: id quod
duplīter, vel excisione, vel medicamēto quod pu-
trescat. Sed tempestiuum mihi iam est, vt nōni-
hil de abscessu etiam dicam: cuius duplex est ge-
neris. Vnum, quum phlegmone in pus veris, pus
ipsum tanquam in aliquo est sinu collectū. Alce-
rum, quū nulla præcedente phlegmone, humor
aliquis acris, itq; aliis specie alijs, statim ab ini-
tio in aliqua parte colligitur, circūposita corpa-
ra excoarctans. Frequentissima verò huius morbi
sunt tria genera: nempe atheroma, steatoma, &
melicera: id similitudine contentarum in tumo-
ribus substantiarum, sic appellata. Est etiam aliud
eorum vel vti seuum, aliud veluti mel, aliud pul-
ticulæ, quam atheram vocant, simile. Curationis
iporum indicationes sunt communes: nempe
id quod continetur, vel digerere, vel totū pu-
tre reddere, vel excidere. Aliqui igitur eiusmodi
tumorum triplicem curationis rationem admit-
tunt, quorūq; scilicet ex tenuiore humore con-
stant, vt melicera. Aliqui duplicem tantum, ve-
luti atheroma: quippe quod tum excidere, tum
putrefacere licet. Steatoma verò, sola manu o-
pera curatur, quum nec putrefieri possit, nec di-
geri. In his porro abscessibus, qui in alto corpo-
re delitescent, ac potissimum in visceribus, me-
dicamentis qua ex aromatizati componantur, ma-
ximè sunt ex usu: vt quorum vis collectum
humorem tum in halitū resoluat, tum digerat.
Theriacæ etiam, Athanasia, Ambrosia, medica-
mentū nostrum, ex Cretica calaminta confe-
ctum, vnicè commendantur. Quicunque igitur
ex tumoribus toto genere existunt præter natu-
ram, si sui ablationem indicant: vt, exempli gra-
tia, myrmecia, acrochordon, calculus in vesica,
hypochyma, & mola in utero, hoc est, caro que-

dam informis. Siquidē omnia eiusmodi summiō
uere in torum cōtendimus. Quorū verò etiā lo-
cus ipse affectus vna quæpiam naturā est par-
tium, prima indicatio est, vt affectus sanetur. Se-
cunda ab hac, si is insanabilis sit, vt vna cum vi-
tio pars quoq; ipsa excidatur: sicuti in cancro, et
vlcibus omnibus, quæ curationē respiciunt. E cō-
trario verò in suffusione, qd hypochyma vocat,
vitiū in prima indicatione, ad alium eam locū,
q minores sit momētū, trāferimus. Non desunt
tamē, qui hanc quoq; evacuare cōfentur. Iam ve-
rò humor q in hydrocele visitur, alienus a cor-
poris substantia, tota natura est: sicuti etiam quæ
in ascitis hydrotyp. cōtinetur aqua. Quarū cer-
te vacationē vel medicamētis quæ digerāt, mo-
limur, vel chirurgiæ: in hydrocele quiddē, immis-
sio siphone: in ascite vero, punctiōne adhibita.
Quemadmodum aut in us quoque autē cōprehen-
sa sunt, cum affectu ipso exciditur etiam affecta
pars, sic & in herniis aliquid peritonæi. Pari-
modo & columella aliquando vna cum vino am-
putat: itidemq; in crurib. & in testiculis vna cum
varicibus ipse veng. Ad hæc tunica in naso cum
polypo, & foratus dens cum foramine. Verū
ex his nullum est, qd ad naturālē habitum redu-
ci possit. In collumella verò id omnino est cōsi-
dum: nec properandū ad eam excidendam, sed
quando ad lori videtur tenuitatē redacta, tunc
auferenda est. Similiter & ex crescentia carnis
reducere ad mediocritatē oportet. Danda autē
in hisce semper opera est, vt tum breui tempore,
tum citra dolorē, tum quantitatissimē cures. Ve-
rū vt tutō cures, tribus sis intentus oportet.
Vnum primariū est, vt omnino absolunōne opus
sit cōsequari. Alterum, vt si vbi hanc nō conse-
quaris, saltem cub autē non lædas. Tertium, vt
vitium nō facili reuertatur. Ex horū autem con-
sideratione facili cognitur est, quando ipsius chi-
rurgiæ, & quando medicamentorū ope pugnan-
dum sit. At chirurgiæ quidem studium, in his præ-
sertim quæ nunc sunt proposita, ad interemptiō-
nem eorum festinat. Quod verò ex medicamen-
tis peritur, primū huc tendit, vt quod præter na-
turā est, tum vacuet, tum digeratur: aut si per mem-
bri uaruram, aut rebellionē vitij nō licet, vt id
tum in pus vertatur, tum putrefaciat. Similem
curationē desiderant his quæ cōprehensa sunt, etiā
ea quæ in numero & magnitudine convenientē
naturæ modum excedunt, quæq; in his ambobus
deficiūt. In quibus amputare quidem cōueniet
quod magnitudine redudat vel numero: resi-
quæ autem & fingere, quod deest, vbi videlicet
fieri id licet. Quintum namq; dignum non licet
medico gignere, sed vnus naturæ opus sunt om-
nia talia. Vt autem a prodigiōse copulentiæ cu-
ratione aufertur, si quis adeo obesus existat,
vt nec incedere, nec respirare possit, ei calidior
fictiorq; temperies (quādoquidē hæc corpus exi-
le reddit) est procuranda: adhibitis nimirū acutis
exeritationibus, tenuitate victu, & id genus me-
dicamentis, ac deniq; cogitationib. animi. Porro
quæ ad articularia vitia medicamēta adhibent,
quæ scilicet valent incindi faciliat: habent,
his tu quoq; quū nimis obestatis curabis, viti-
tor. Sunt autē talia, rutæ syluestris semen, aristo-

Hypochyma
transfusa.

Hydroceli cu-
ratio.
Ascite curatio.

Partes quæ vna
cū affectu au-
putantur.

Columella quæ
de se excidit.

Medici dandi
operam esse vt
cui citra dolorē
et quantissimē cures.

Chirurgia studium.

Natura opera
que.
Obesitas cura-
tio.

Extrema illi cor-
poris, vbiq;
articulorib. in-
moda medica-
mēta quæ sunt.

3al Theriacum
extenuat corpo-
ra.
Obsequium inani
qua vultu &
medicina ratio
ut extenuetur
Galenus.

Vina extenuat
do corpori apta
quod sunt.
Extenuata ter-
pora refrigerant
ratio.

Picatio macil-
lino condonit.

Profluvium ter-
minatur, dum re-
frigerare est au-
mentum, sit tamen
parum.

Cappari exoxy-
melite cisterni ob-
structioni servi-
unt.

Thapsia sanguis
aut attritu ad
partem quib. flu-
et applicetur.
Propagis refectio
do ratio.

chia rotunda, minus centaurei, gentiana, & pol-
linum. Præterea ex vrinis cientibus, ea quæ pollen-
tes habent vires, vt petroselinū. Sed & salquod
ex cōbustis fit viperis, potenter etiam extenuat.
Ego verō iuuenē quendā quadragenariū, oppi-
do q̄ ob esum percretaui, vīus tum aundoro, quæ
adversus articularia vīna est cōposita: tum sale
theriaci, ipsiq̄ theriacæ, ac reliquo extenuante
victu, & p̄ exercitatione, cursu veloci. Præparavi
item hominē ad cursum, perficendo primum
lineis asperis, quoad cūis ruberet: dein itam
cū oleo, q̄d in se digerēs aliquod medicamentū
habebat: qualia sunt sylvesteris cucurbitæ radex,
althæa, gentiana, aristolochia, panacis radix, po-
lum, atq; centaurei. Per hyemē aut etiam à bal-
neo revivisse hominē iam dicto oleo profue-
rit. Verū cibum exhibere non itam à balneo,
sed interpolito somno, expediet. Quidd si velit
rursus etiam ante cibū lauari, permittet. Magis
etiā ad rem pertinebit, si aquæ ipsi digerēdi facul-
tas, ante insita, aut etiā acquisita insit. Verisimi-
le autē est, aliquod ex multo simul oborto motu,
febris hominē corripit, quæ tamē ad rem, p̄posita
neutiq̄ erit aliena, vtiq; si medicus rectē omnia
pegerit. Sanē fugere in obesis curādīs cōvenit
vina quæ multum nutritiū, quæ generis crassa
sunt: vti verō, vel aquosis, id est, colore albus, &
substantia tenuibus, vel quib. aqua marina sit mi-
sta. At vbi eos qui extenuati sunt, reficere in ani-
mo est, iis vinū exhibebimus crassum, cibū verō
q̄ succū efficiat crassum, exercitationes pauca,
frictionē mediocrē, ac brevit̄ omnia iam com-
prehensibilia cōtraria moliemur. His verō enī pica-
ri est cōmodum, * idēq; trib. aut quatuor diebus.
Hoc quippe ad carnis generationē optimum est
præsidium, quum hūmectet & calfaciat, sanguinis
multitudine accita. Ergo nec absquē picari cor-
pus ægrotis oportet, nec quū oportet, super illi-
nere: verū in hyeme bis, in æstate semel id fecit
se est sanis. Itaq; quibuscumq; particulis bonā ha-
bitudinē reddere cupimus, has & fricare, & per-
fundere, & percutere, & picare oportebit, tan-
tis per dum intumescit. Hoc vbi factum est, p̄tinus
desistere cōvenit, prius q̄ digeri cœperit. Etēn
quæ calfaciūt omnia, sicuti attrahere, sic sunt e-
nam digerere apta. Iam lauari quoq; totum cor-
pus est extenuatū, iis lauari quoq; post cibū est
cōgruum: quāquam nunc iudicandum si est, ne secur-
eis obstruatur, potissimū propter ciborum spe-
ciem: quum nimirum aliter quoq; obstruere so-
leant, quæ succū crassum gignūt, si quib. his li-
beralius utatur. Incidit etiam ex tali victu diuinus
exhibito, calluū in renib. generatio. Quod si iis
qui dicto modo cibatur, grauiorē sensum in de-
xtis præcordiis aut circa lumbos percipiat, proti-
nus cappari ex oxy-melite in principio cibationis
donec cōstitit grauior, dabit. At mēbra verō
quæ grē resistebant, ac pluvulū iam refrigera-
ta erāt, vīus aliquido & thapsia sum, aliā ea ex
melle membrū illincē, aliā etiam ex cerato. Si-
quidē attrahit ea quoq; partibus quibus super-
posita fuerit, sanguinis copiā. Quibus autem e-
xiguū aliquid pudenti præpūdo de naturali
deest quantitate, iis nō raro sola tennone debi-
tum modum reficit, membranulā mollem, fir-

maim* ex charta, cuti gummi illine extrinsecus
circū voluens. Ex interna rament parte præpūdo
ipsi rotundū aliquid ac medio cre, aut ex plūbo,
aut ex charta, vel vti fulcrū, supponi prius oport-
rebit: q̄d videlicet, posteq̄ agglutinata membra-
nula fuerit, facili exumas. Porro imminuto præ-
pūdi, duplici chirurgie rationi subiaci, interm i
superna pudēdē parte ratiō incisa cute, quō vti
delect eius vinitate soluta, catēnes deorsum tra-
hai, quoad glandē cooperiat. Interim verō scal-
pro ex interna parte, qua glandis initū est, exco-
riata, mox deorsum tracta, ac deinde mollē vin-
culo deligata. Similiter q̄ in labiis, aut nariū alis,
aut aure deficiūt: (Græci colobomata vocant) cu-
ratur: primum quidē ex coriata vtrinq; cute: de-
in adductis, coniunctisq; inter se cutiōris, atq;
vtriusq; quod callosum est, detractō: mox quæ
reliqua sunt, alutis agglutinatisq;. Eiusdem ge-
neris sunt, & quas in maiori oculi angulo rhe-
das Græci vocit: vtiq; vel impēsius minuto, vel
prius perditō ipso angulo. At prius quidē per-
ditō eo, omnino in sanabile relinquit vitiū. Mi-
nuto verō, iis quæ modicē attingunt curat, si ra-
men totū corpus primum ante purgauerit, dein
cagat. Sunt mediocriter attingentia medicamen-
ta, quæ ex glaucio cōponuntur, & croco, & quæ
nardina vocant: in primis et quæ ex vino sunt
cōfecta. In summa verō, quib. aliquid perit sub-
stantiæ, maximē quidē curandū est, vt ei quā-
simillima substituitur. Si id fieri nequeat, salte ali-
quid q̄d eundē præstet vīum machinabimur: vt,
exempli gratia, producēs callum pro osse. Por-
ro venas sensibiles regeneratas aliquando vidi-
mus: verū has, non tam similes iis quæ antea
perierant, q̄ easdē renasci dixeris, vel vti in canis
viceribus carnē. Cicatrix verō quæ in hac calli
modo durata, gignit, ea curi quidē est q̄ similli-
ma, curi tamē non est. Nunc autē ad alia tran-
eamus morborum genera. Serpens vicius, q̄ lier-
pes dicit, eiusdē est generis cū exvicerato cry-
spelate. Ramex verō (quā sarcocele vocat) scie-
rius. Etēn herpetas buliosus, p̄ccat succus, sub
cute hærens. Quo fit, vt eatenus affectus is, eius-
dem sit cū eryspelate generis: atq; huius quoq;
magis etiā cum eo q̄d exviceratū est. Dissert autē
ab eryspelate, humoris tenuitate. Est em̄ admo-
dum tenuis q̄ herpetē excitat. Ex eo autē q̄ alter
humor altero fit tenuior, crassiorve, vicerū dis-
ferētia, quæ ex profunditate spectantur, prove-
niunt. Huius certē generis est, & quæ phagedæ-
na græcē dicitur, & exvicerat cicri. Quorū om-
nium communis curatio est, vt inhibeatur pri-
mū humoris cōfluxus, pōst sanetur vīus. Pro-
pria verō cuiusq; rum ex mēbris inventur na-
tura, tum ex humoris non solū specie, sed etiā
quantitate. At tenuissimus quidem in eiusmodi
humoribus est is, qui exviceratū herpetem ex-
citat: crassissimus, qui cancrum. Proximum ab
his locum occupat, quod ad crassitudinem at-
tinet, qui phagedænas producit. Harum species
quædam sunt, quæ Chironia, & Telephia di-
cantur. Si quæ igitur, toto prius purgato corpo-
re, mox quæ insistentem humorem reprimant,
eegerantq; medicamentis utatur, iam curauerit
herpetem. Sin neutrum horum fecerit, sed tan-
tum

Propagis vīus
randi dupli-
ratio durgan-
ca.

Colobomata.

Angulorum in
minutissimis
oculis quæ
modo sunt emide.

Venas sensibiles
in reperiatur
videt Galenus.
Cicatrix adma-
ta vīus ad illi
cutis.

Herpes autē
est generis cum
exvicerato cry-
spelate.
Ramex.

Herpes ab ery-
spelate quoad
differat.

Phagedæna.
Cancro vīus
rati.

Chironia vī.
Telephium.
Herpetis cur-
tio.

rum ea que cicatrice inducunt, adhibuerit, vtrique exulceratam cuticulam sic sanauerit: proximè tamē illi, quo minus exulceretur, non cōsuluerit. Postmodò verò illa quoque cicatrice inclusa, que ipsi cōtinua est, exulceratur: id est longo spacio, ceu malo ipso serpente, sit, donec humor, vnde oritur, sit manitus. Vacuūs itaque est per eiusmodi affectus semper si q̄ redvndat humor, aliquod medicamētō quōdā itaui parget bilē: sepe eo qd nigra: modò eo qd miſſe sit facultatis, quodq; simul bilem & pituitā educat: veluti in miliar herpete, qui nō protinus vlcus facit, quemadmodū alter: sed admodū exiguas pustulas ad speciem miliar, que ipsa interposito spacio in vlcus etiā degerant. Adeo non absq; ratione quibuidā est visum, in eiusmodi vitio bili esse aliqd pituitæ cōmixtum. Ceterū ad generationē vlcis, in iis que extrinsecus admoventur, exasperare debent, q̄ repellit facultatē habent. Vbi verò non amplius cōsistit in agrotantē particulā vitiosus humor, q̄ digerit. Si quidē exiguū viriosū humoris etiā si quis ad viscera reprimat, leue damnum cōmittet. At si eius quantitas sit momentanea, in princeps aliquid membrū aliquādo ꝑcumbit. Ac repellit quidē, non solum ea que astringūt, sed etiā que sine astringente refrigerat: digerunt verò q̄ calfaciunt. Porro ita ut quidē bilis vacuatio est facilis: pituitæ verò & nigre bilis, difficultior, quo magis purgātis medicamenti ope indiget. In herpete autē, quoniā tenuis est humor q̄ ipsum creat, ab vnde est etiā aliu soluisse: vel vti nā, per eā q̄ id modicē efficiūt, crasse. Quod verò ad acrochordonas & myrmecias curādas p̄tinet, nō deest Romæ q̄ eas apprehēdas primorib. dentib. exerat. Sed & scalpro ad myrtace folijs specit formatō, & ferramētō qd scoldopomachyon dicit, eas facit quispili excidere possit. Acque verò & valde aliqua pinna circulo myrmecie impoſita, ipsam educimus. Debet tñ pinne fistula esse myrmecie crassitudinis par, vt eam vndiq; ꝑrſus cōstringat. Quę postea circūacta, ac si rui deorsum impulsā, celerimē ita myrmeciam torā etiā cum ipsa radice educet. Iam verò, q̄ vehementer attrahentib. sarſum myrmecia vellet, & putrefacientib. enecabit, ratione ab aliquo in vētum est. Quum igitur interdum quedam partes deficiant, que adesse debuerāt: quēdā verò redvndent, quorū non erat opus: adimere quidē qd supervacaneum est, sanē haud difficile fuerit: aliud verò producere, qd simile ei sit, quod defuit, id in quibuidā quidē est facile, in quibuidā difficile, in alijs planē fieri nō potest. Si nāq; carnosum sit qd deest, haud magnō negotio id reficiat. Sin os sit, p̄sum quidē instaurare nō licet, q̄terū aliud pro eo durum efficere. Diximus autē redvndisse nos venas alias sensibilibiter generatas. At si dignus deſit, si reſtuit nō potest. Ceterū quę in naso, vel aure, vel labio sunt curta, ea quidem vt reſeciffe non licet, sic decorem aliqui habuere licet, si quis diuisam vringi cum, mox in vnum conductam queat agglutinare. Porro quemadmodū in sinuosis vlcibus generatio carnis, sic in capite & palpebris productio pilorum, opus nature existit. Etenim ex succis qui per cutim transpirāt, quod limosum est, id pilos

tum ā principio gignit, tum de cetero veluti facit crescendo auget. Hoc igitur, quoties vel prorsus perit, vel redditū est vniūsum, tones pilos corripit est necesse. Corrūpūt namq; & surſus ipſe duplici de causa: alijs numere succo deſertur, alijs nō idoneo viſc. Ac prorsus quidem perditio eo qui pilos alar succo, caluities oritur. Eodē viſc. natio, ophiasis & alopecia ꝑueniunt. In quibus & inhibere quod inſiuit, & abſumere & digerere quod iam occupauit languentem locum, conuenit. Ergo ceu in vlcibus illis purgationem nocētis succi primū adhibuit, eodem modo in pilis ipſis ab hac primū exordiēda curatio est: scilicet estimato prius cutis colore, cuius cerne corruptos pilos. Nam si is albidior quā ꝑ nature habitu sit, pituitosi humoris purgationē molietis: sin pallidior, eiusmodi bilis purgationem: non secus quā si nigror conspicitur, quę rugam detrahunt bilem oſiteres. Quū autē iam planē paratū ex purgatione corpus estimas, cum qui in cute cōtinetur humorē digerentibus medicamentis diſcutes: sic tamen vt in his caueas, ne adeo calida, acrisq; admovent, vt cutis exulceretur. Quin etiā ea que valenter ſiccant, cauere conuenit: ne videlicet cū viariū humore, vitilē etiam abſumas. Ego verò iis medicamentis quę alopecia sanarent, exiguum thapsie admiscui. Ceterū vbi vel tumefactum piluſculū, vel exoriatum ex ipſius vſu, pericranium conſpexi, illo quidem die ā medicamento abſtine: illi autem partem particulā, vel galli, vel anseris liquato seuo: deinde poſtero die, si niſil tale apparuerat, rurſus eodem medicamento ſum vſus. Iam eos qui bus periere ciliū pilū, ſimilibus genere medicamentis ſanabis: eutiquam tamē cōmites, vt medicamentū intra oculorum tunicas cōſtuit. Quare ſicca longē tutiora exiſtant. Porro pterygium, tamen ſi ā ſanitaris habitu ſit alienum, non tamen ſubſtantie ratione, quemadmodū arthroma & melancia, ā natura alienum exiſtit. Eua verò ſanatio, ſi quidem paruum & molle ſit, per ea medicamenta que deſerunt, perſicitur. Vbi magnū durūq; euaſit, chirurgiam poſtulat. Simili ratione & aqualarum que magnę ſunt, chirurgia curabis. Que parue exiſtant, ſiccantibus medicamentis curantur. At chalazion, quū toto genere ſit ā natura alienum, auferri poſtulat. Ad eundem modum & oculorū pus. Verū id pleuūq; medicamentis digeritur. Hypochyma verò iam incipiens digeritur: vbi diu conſiſtit, nō potest. Iuſtus medicus ſtate noſtra conſuſione capitis multos hypopios ſanauit. Manſit enim horū pus deorſum, propter grauitatem ſubſtantie. Hypochyma autem leuius quum ſit, nebula: ſimilius q̄ pus, haud ita deſicere poſteſt. Ceterū quod ſtrophioris nature eſt, id punſione ad præſena diſſectio: interpoſito tamen haud longo ſpacio, ceu vini ſax quēdā reuertitur. At quando pus oculorum digerere eſt animus, collyria que myrrham habent, maxime vtemur. Quę verò vehementer ſiccant, ad præſena certē valenter vacuant, ſed quod reliquū eſt, ita cōgunt, vt ægē reſolui poſſit. Mulrum autem puris vacuabimus, diuiſa tunica ceratoidē, paulū ſupra coronam. Sunt præterea ex genere eorum

Herpes miliaris
in dyspepsia.

Humores qui
sanantur & qui
dum vacuatur.

Acrochordosæ.
Myrmecia.
Verrucosæ cutis.

Carnosa refici
facili.
On instaurari
non potest.

Natura opera
sua.

Pilorum generatio
nata vnde.
Pilorum corruptio
vnde accedit.
Strophioris duplici
de causa curatio.
Caluities.
Ophiasis.
Alopecia.

Pilorum vitio
quomodo succurrendum.

Thapsia vbi
vnde Galenus ad
alopecia curandam.

Pterygi curatio.

Aqualarum
curatio.
Chalazion
curatio.
Oculorum pus.

Hypopios sanari
vnde Galenus
in thymiaſe.

Hypochyma
semita diſſectio
punctione, re
uocatio.
Oculorum pus
collyria ex myrr
rho deſectum.
Pus oculorum
vacuum diſſectio
tunica ceratoidē,
paulū ſupra
coronam.

Ascarides.
Helminthes.

Vermi perimū
tur ab amaris
medicamentis.

quæ tota substantia præter naturam dicuntur, & ascarides, & helminthes, siue ex rotunda sint, siue late. Quocirca expelli prorsus eas est corpore expedit. Expelles autem, si prius euacueris. Ene cabes amaris medicamentis. Ac teretes quæ abstinu perimere poterit. Late vellemētiōra medicamēta desiderat, si cūti & q̄ ascariis græcè vocatur.

GALENI PERGAMENI de arte curatus ad Glaucōnem, lib. I.

CAP. I.



Naturā cuiusq̄
propriam medi
cum agnosce
re oportet.

Errare inter
medicū quā
minimū posse.

Ephemerarum
causa.

Febres cum bu
bunc, si ab his
vires oriantur
sunt iusticie.
Ephemerarum
causatio.
Inedia tridua
na ex ephemo
ra reddita acro
ra febri.

On cōmūnē tantū omniū homi
num naturā medicū cognoscere o
porter, sed etiā vniuscuiusq̄ propriā.
Non tñ propriā singulorū naturā,
æquē atq̄ cōmūnē, possibile est scri
bere. Quī igitur ad rectē medendū plurimū con
ferre temporis occasio, & quātitas auxiliorū vi
deatur, hæc autē, propriā in vnoquoq̄ ægro se con
templanda obiciunt, nec quicq̄ propriū possit ser
mone explicari: ob id nimirū qd cōmūne est, scri
bere cogimur, q̄vis id sit vñ secundū. Et eñ quā
nim cuiusq̄ in a naturalē recessit habitū, ad rantam
morius magnitudinē pvenit. Distantiā verō re
cessus, facile deprehendēdis, qui naturalē vniuscuiusq̄
egri itatē exquisitē cognovit. Quod quidē
quā nobis non liceat, confugimus ad com
munes notiones, in quib. artifex plus aliquid, q̄
in certis, assequit. Porro qui omnia quæ secundū
naturam & præter naturam sunt, diuisione artifi
ciosa complexus fuerit, atq̄ ab iis omnibus, quæ
sufficiens diuisa erūt, in indicationes sumpserit,
solus is, quantū humanis pmitit viribus, mi
nimē errabit medendo. Atq̄ illos quidē quo
rum habebit notitiā, melius curabit, quā cæte
ros. Ignorōs verō, pxiimē illis, quoad fieri pote
rit, ad sanitatem perducet. Si quis enim primū
distinxerit differentiam ætatum: postea eam quæ
secundū temperaturas, potentias, colores, calo
res, habitudines, pulsū motus, assuetudines,
indutrias, animiq̄ mores habet: atq̄ his quoq̄
adiunxerit maris feminæq̄ discrimē, expēde
ritq̄ regionū, temporū, atque adeo ambiētis æ
ris tēperies, hic ad, propriam laborantis naturam
agnoscendā proximē accedet. Nunc verō de his
solūm ægronōs dicere proposuimus, quorū natu
ra, antequā morbū contraherent, nobis erat ex
quisitē p̄cepta. Cum quibus tamen reliqui om
nes intelliguntur, qui nobis erant ignoti.

De febribus ephemeris. Cap. i.

Primō igit de ephemeris febribus, vtpote sim
plicissimis differamus: quæ nimirū ob lapsitudi
nem, ebrietatē, itam, excausentia, macorem,
atq̄ alias vellemētiōni sollicitudines ex
citantur. Ex quarū genere sunt, quæ ab inguinum
inflammationibus trahunt ortum, præterquā si
ab his vlcere sunt manifeste: tunc siquidē & si
spectet sunt, minimēq̄ mites apparent. Vigiliæ
plerūq̄ in duxerunt simplicem febrem: si cūti
græfatiō, & ex vñ quādoq̄. Atq̄ hæc omnes fe
bres soluuntur facillimē, in hunc modum. Opor
tet enim ipsos cōstitit ducere ad balnea, dein
ad cōfectū victus rationē. Nam qui triduā
terminū ab his cibo expectat, sæpius actiores fe
bres efficiunt. Quī igitur ad ægrum accedes, pri

mūm & maximis quæ circa ipsum sunt, est cōsi
deratio in claudenda: deinde & ab aliis, ad eū vt nec
minimū quicq̄ omittas. Nā vt magis aut minus
ei q̄ sit ex maximis indicationi credamus, ex alio
rum sit adiunctione. Maxima quidē in omnib.
febrilibus, signa in pulsibus atq̄ vrinis cōstitunt.
His verō addere oportet, quæ cūq̄ alia circa fa
ciē scribit Hippocrates: accubitus quoq̄ & respi
rationē. Item ea q̄ ab ore excernuntur, atq̄ alui
sedimēta: & si qd aliud accidere circa aliquā cor
poris partē, aut operationē videris. Quæ omnia
cōmūnia sunt omnibus febribus. Postquā itaq̄ ex
pulsib. atq̄ vrinis febris naturā perceperis, quā
pulsus nullū inflammationis signū habuerit, neq̄
omnino inæqualitas in aliqua arterie cōpulsione
se ostenderit, aut si hoc adfuerit, omniō sit imbe
cille: vrinæ autē, aut prius similes iis quæ secun
dum naturā se habēt, aut nō multū a naturali sta
tu recesserint: tunc sanē & ad omnia illa quæ nu

per a nobis exposita sunt, accedere oportet: &
quī veluti choros quidā oia cōcinne loquūtur,
tūc certē fidere oportet, ac, si libeat, interrogare,
nunquid aliqua manifesta antecesserit causa. Si
quid enim iussu modi eger fateat, expectāta pri
ma febris solutione, itam oportet laiare: quū
tūc certior sit tibi facta cognitio, ex ipso solutio
nis modo. Nam arteriarū motus in hoc in totū
assimilatur ei, qui in sanis deprehenditur, quum
in nulla alia febre ad naturalē habitū reuertat.
Iam verō plurimis ephemerarū humidū qdā va
pores, & quibusdā etiā sudores vnles cōspiciū
tur, accessione cessante. Quo tempore etiā vrin
multo meliores, q̄ circa febris initia, videbūtur:
& si capitis aut alterius partis dolor simul inva
serit, neq̄ hic amplius p̄stet. Aegrotius quoq̄
in toleratō facillitas, magnū & ipsa signū, febri
suauitatē tibi indicabit. Et si dū lauant, nec hor
ror aliquis in solutō molestauerit, nec alia tristi
tia adfuerit, post balneūq̄ & deinceps bene se ha
bere p̄seueret, tunc ne veteris offerte cibū, & vi
num, adhibito tamē pro tempore modo. Cōmu
niter aut omnib. detentis ephemeræ, vrinæ rufæ
excernūtur. Adiungitur verō his qui propter tri
stinā febricitatē, accutudo potius q̄ ab vñ diūa ca
loris: quemadmodū ē diuersis iis, q̄ propter fu
rem. Sed & extenuatio corporis in iis quos tristi
tia aut cura vexarunt, cōspēctior existit: oculorum
præterea cavitās, & quidā in consuetū decolora
tio. Hæc quidē sunt & iis q̄ quis modo aliter co
gitatur, cōmūnia. Maximē itaq̄ ex oculis distin
guere oportet. Nam ex his etiam in sanis animæ
mores cōicere possumus. At eos qui diu vigila
runt, arguit quidā palloris forma, faciesq̄ sub
tumens, & necnō ipse oculorum motus, quo vix
palpebras, humore qdā imbutas, attollere pos
sunt. At qui tristantur, aut cogitationibus deti
nentur, iis exicantur palpebræ. Cavitās est com
mune accidēs omnibus, morori, vigiliis, cogita
tionibus, non tamen furori. In hoc enim, nec o
culorū cavitās, nec manifestus pallor, & plus ca
loris atq̄ celeris ex imo, p̄sumpt: nec pulsuum
magnitudo destruitur, quemadmodum in vigi
liis, tristitia, & cogitationibus. Eorum etiā qui
ex lassitudine in febrem inciderunt, cutis est sic
cior, quā in aliqua alia ephemeræ. Quæ autem

Signa maxime
in omnibus fe
brilibus a pulsi
bus et vrinis ju
tuatur.
Ephemerarum
signa.

Pulsus in feb
ribus febricitans
maxime ab his
tortum fieri
propter p̄sum
ptum in eph
emeris.

Diarrhoea fe
bricitans quæ
cedit.

Ephemeræ in
tristitia ex tri
stinis sub
citis extenua
tio corporis.

Mores animæ
ex oculis disti
nguuntur in
sa.

Cutis in feb
ribus quæ sic
cior.

*Ephemerata ex
denſata cute accidunt febres (denſatur enim
aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate aſtringen-
te) hinc quidē ſolē inter omnes febres paſſio aſtri-
cta exiſtunt: ac vel ſolo tactu noſcuntur, tum ob
denſitātē cutis, tum ob differentiam caloris, qui
mitis quidem in primo tactu ſentitur, acris au-
tem, ſi ſuſculum tardemus. Non tamē & ſus-
vringit ſunt ruſſi: neq; in oles corporis cōditi: neq;
oculi redduntur aut caui, aut aridi: ſicvni nec pul-
ſus minores, quemadmodum in mētoribus, cu-
ris, vigiliis, aut exercitiis immoderatis.*

ex denſata cute accidunt febres (denſatur enim aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate aſtringente) hinc quidē ſolē inter omnes febres paſſio aſtricta exiſtunt: ac vel ſolo tactu noſcuntur, tum ob denſitātē cutis, tum ob differentiam caloris, qui mitis quidem in primo tactu ſentitur, acris autem, ſi ſuſculum tardemus. Non tamē & ſuſvringit ſunt ruſſi: neq; in oles corporis cōditi: neq; oculi redduntur aut caui, aut aridi: ſicvni nec pulſus minores, quemadmodum in mētoribus, curis, vigiliis, aut exercitiis immoderatis.

De febribus ex inflammationibus inguinum. Cap. III.

Febres quæ ex inguinū inflammatione ſunt, pulſus habēt maximos, veloces, atq; frequentes: plurimūſq; illis calor in eſt: a poſtq; febris conſiſterit, ſtatim ex profundo quædā emergit lumiditas, calida quidem, ſed mitis. Atq; in totum facies rubicūda illis, & magis tumēſ, vringit ſubal- bide. Cōmonis autem omnibus huiusmodi febribus eſt pulſus æqualitas. Curare igitur oīes quidē oportet balneis. Cēſterum qui ex cutis dēſitate, aut inguinū inflammatione febricitant, ſi in aëre balnei immorari iuſſeris, haudquāq; nocēbis. Reliquos omnes quamcunq; oportet ab aëre ſequere. Si verō deſinus in aqua immorari voluerint, permittite. Oleo aut malo, & tepido, & manibus mollibus perficere quamplurimum, ſed eos præſertim, qui ex labore febricitant. Secundo autē loco, qui meani habēt aſtrictio- nem, quos nimium ſæpius laquare expe- dit. Cibū autem cōcoctū facili aſſumere qui ex labore febricitant, poſſunt multoties: nō æquē tamē, qui ex denſitate cutis, aut inguinū inflammatione laborāt, quorū etiā vtriſq; tenuis victus eſt vtilis. Sed & vinum potare quantum poſſunt convin- cere ſunt permittendi, quibus labor febris occaſio extitit. Menſuræ aut ratio, ex viriliſq; ætate ſumitur ægrotantis: necnon ex naturalis temperie, conſuetudine, anni tēpore, & regione, aliſq; id genus. Qui verō ex inguinū inflammatione febricitant, arcēdi ſunt à vini poru, donec inflammationeſ ſoluantur. At qui cutis foramina habent aſtricta, aut refrigerati ſunt, ſi quidem non multum hoc affectu laborent, nec pleni corpus habeant, non ſunt à vini poru prohibendi. Qui autē ſupra modum refrigerati ſunt, aut pleniore corpore, prolabere vtile eſt. Rurſus, qui ex vigiliis, aut aliquo animi affectu febrili, poſtquā balneaueris, cibo humido ac boni ſucci reſicere oportet: vinū verō omnibus iis qui vigiliā paſſi ſunt, intrepide offerre, niſi capitis dolore premat, aut pulſum venarū in temporib; ſentiant. Sed & iis qui ex ira aut morore aliquo, aut cogitatione febricitant, vinum eſt exhibendum: ſicut & illis, qui furore perciti fuerant, quando omnino perturbato fuerit refrigerata: nam prius ſanctē viſus vini eſt periculofus. Tentare autē oportet ſemper adſerre contrariū eī quod inſeſtat: labori quidem, quietem: vigiliis, ſomnum: iræ, furori & triſtitiæ, ſermonibus, actionibus, ſpectaculis, enarrationibus, animi incundatiōe. Sic qui ex cogitatione laborat, oſculo ratiocinationeſ omittat. Et qui ex inguinū inflammatione fe-

bricitat, eius curationi intendat: ac multo prius viceris, unde originē habuit. Atq; hæc tenus de eplēmerarū indicis, remediſq;. Reliquæ verō febres, nōnullæ ex inflammationibus, nōnullæ ex humorib; accidunt. Et quæ ex inflammationibus ſunt, ſunt veluti ſymptomata: quedam partium inflammationum.

De febribus putridis. Cap. IIII.

At q̄ ex humorū putredine accēduntur febres, ex & dicūtur putridæ, & ſunt nō morborū ſymptomata, ſed ipſæ morbi. Ex his verō nōnullæ quædam abſq; accidentib; accidunt, & miſiſſimæ ſunt: nōnullæ item cum accidenb; virgēt. Earū igitur quæ accidentibus carēt, paucæ quidem ad extētam ſui cognationem, diem quartū dēſiderāt.

De ſignis febrium intermittētiū. Cap. V.

Quæ igitur cum rigore invadunt, nō ab re ex earum eſſe numero iudicabis, quæ per circuitus inſeſtant. Tertiænæ enim atq; quartanæ in totum cū rigore acceſſiones faciunt. Sed tertiænæ quidem in primo inſultu cum nimio ſp̄e rigore incipiunt: quartanæ autem non vidimus cum vehemētī rigore incipientē, ſed procedente tēpore magnitudo ei ſupervenit, præter id, quōd nec ſtatim ab initio hæc febres vi plurimū ſolet invadere, ſed aliis quæ antecceſſerint, ſubſequi. Quartana itaq; ſolet errabundis febrib; ſuperenire. Quotidianæ verō, rarō accidit abſq; leſione oris vetriculi. Rurſus quartana ex male affecto ſplene gignitur: vi tertiænæ ex affectu iecinoris. Quæ verō cū valido rigore incipit, magis febris tertiænæ, q̄ aliqua aliarum febrilū fore ſperatur. Quōd ſi reliquæ etiā ſigna atreſcentur, hanc dubio procul in prima ſtatim die tertiænā eſſe cognosceſ. Etenim calor multus & acris ad eſſe debet: pulſus autē magni, calidi, vehementes, veloces, atq; frequentes, omniſq; inſqualitatis, præterquam febriliſ, expertes. Rigor porō, veluti ſi a re aliqua acuta, plus q̄ frigida, corpus perpungeretur, quum h̄ qui quartanā aut quotidianam intermittētem paſiuntur, potius frigidum rigorem percipiant. Tempus autem anni t̄ſtūū: ſicvni & locus, & præſens ſtatis calidus. Sit autem & ægrotantis natura calidior, & bilioſior, & ætas adoleſcentiæ: & exercitationeſ potius quā oſioſitas antecceſſerint: magiſq; deſtitio, q̄ frigefactio, & parciſ ſibi, potius quā crapulæ. Vigiliæ quoq; mētores, atq; labores, & intentæ cogitationeſ, ad eundem affectū perducūt. Quōd ſi multos alios eodem tempore laboranteſ conſpigerit tertiænā corripit febris, hoc quoq; maximum aliquod, præter ea q̄ nuper diximus, ſignum erit. Si igitur hæc ola aduerſerint indicia, aut ſaltem quæ maxima ſunt, & ſini quoq; vehemēſ adūlgatur, vomitūſq; bilis, aut ſudor, vel vtrūq; ſupervenierint, tunc nulla dubitatione reliſquatur. Quōd ſi inter hæc ſebris quærent homo, hac inquam quæ ex ſuo motu eſt omnibus nota, propina verō febrim inæqualitatem in arteriarū motu relinquatur, nūc ſi miter poteris eſſe tertiā febrim oſtendere, ac ſi tertio iam die acceſſionē feciſſe vidēſ.

De ſignis quartanæ. Cap. VI.

Dum riget qui quartanā tenēt, pulſus habēt ſatis tardos & raros. Quū autē conſiſtit febris, Quartanæ ſatis tardos & raros. Quū autē conſiſtit febris, indicia.

*Febres ex infla-
matione ſunt
ſymptomata
partium infla-
matarum.*

*Febrium putri-
dium differen-
tia.*

*Quartana nob
ſolet vi pluri-
mam ſtatim à
principio inva-
dere, ſed alius
ſubſequi.
Intermittentib;
ſingula, quartā
partium comi-
tetur laſiones.
Febrem tertianā
quæ arguo-
ant.*

*Menſura ratio-
nis exhibitiōeſ
alimenti per e-
phemerata fe-
bres, et quibus
ſomatur.
Vini potus qui-
bus convaleſ-
cent ephemerata.*

*Ephemerarum
cauſis contra-
riis eſſe adu-
liandū.
Ephemerata cum
habent inſe-
ſtantiā, ab vici-
oſis dant.*

atq; etiam augetur, necesse quidē est vt veloces fiant, atq; frequentes. Seruatur tamē & tunc propria ipsius tarditas raritasq; si additā velocitatē atq; frequentia in accessionibus medietas. Iam quæ omnib. cōmunis est febribus, in vno pulsu inæqualitatē, in hac manifestissimē licet cōprehendere. Multo namque velocius principium, si nēq; motus inuenies, q̄ medium. Præterea æstus, & deſtione, & quendā veluti seruoer, qualis in tertianis videt, in quartanis haudquam inuenies. Sed & ægro tantis natura inspicunda est, an atra in ea bilis abūdet: & tempus quoq; anni, an sit autūnus: & præsens status, an inæqualis. Sic verō & loci natura, et morborum pervagantiū vulgariter, & an lien intumuerit, febrisq; antecesserit inordinata, & ætas senior q̄ cōsistentiū, & an cum sudore febres definant. In his verō bulis saxe vomitus minimē expectandus est: quemadmodū nec in quotidianis intermittētib. Hoc etenim tertianarū est propriū signum. At quomodo febris cessauerit, si adhuc veluti quomodo febris remiserit, pulsusq; iis, qui secundū naturam rariore atq; tardiores fuerint, quartana proculdubio erit huiusmodi febris.

De signis quotidianæ intermittētis.

Cap. VII.

Quotidianā indicia.

Quotidianæ intermittētis calorem humidiorum cum quadam acrimonia esse oportet, non quā primum manus admoetur, occurrentem, sed per moram. Nam quadam fumosa caliditas cum multo vapore cōmita, perspirare videbit. Sed & his lōgē minores sunt pulsus pulsi, quartanarū, q̄ itarum pulsus pulsi sunt tertianarū. Rursus verō, tanto rariore sunt in quotidianis intermittētib. pulsus, his qui in tertianis, quanto illis pulsus quartanarum. At tarditas in vtriusq; eodem modo se habet. Minus verō siticula hæc febris est, tantūq; eam quartana excedit, quantum vitam tertiana. Humidissimum etiam totum corpus in his febribus est, & vomitus pituitosi. Quæcūq; autem excernitur per ventrem, frigida, humidiora, erudiora, & pituitosiora existūt. Et quidem ætatibus, naturis, annisq; status, & temperaturis humidioribus, hæc febres accidunt. Nam adolescentē biliosa & sicca temperatura, nunq̄ vidi quotidiana corrippe febre. Pueri autē, præsertim minores natu, & ex adultis pituitosi, & habitedinis crassie, atq; ocio plurimo dediti, necnon crapulis, ebrietatibus, balneis asiduis, post cibū præsertim, vires, faciliē à quotidianis capiunt. Loca etiā humidiora, atq; ex anni temporib. hybernū, ex statib. q̄q; humidioribus, hæc præcipuē scelerat febre. Quod si populariter etiā grassetur, hoc quoq; nō parum ad eam dignoscendū conducit. Non tamen haurum febrium declinationes, quemadmodū tertianarū & quartanarū, sudoribus terminantur: quare neq; ad integram quietem, exceptis paucis, perveniunt. Quotidianarū vrinæ sunt albæ, & tenues, vel crassæ & turbulente, vel rubicundæ. Tertianarum rufæ, vel subrufæ. Quartanarum variae quidem, sed crude omnes.

De signis febrium continuarum.

Cap. VIII.

Febres autem cōtinuās hinc cognosces, quod

nūllum eis adest signum, ex iis quæ adesse intermittētib. diximus: & quod intra quatuor & viginti horas nō cessent. Si verō inæquale incrementū habuerint, hoc quidem præter alia signa, longius etiam tempus ostendit: necnon si proprium febrium signum in pulsi-bus manifestum adit. Quod si inordinatio etiam cō inæqualitas ipsius vel incōstantia insit, & hoc etiā indicium simul magnitudinis atq; continuatæ. Si verō in hoc statu permanentes, tertio die maiorē accessionem ostenderint, aut excrēmēta & vrinæ omnino crudæ apparuerint, nō possunt huiusmodi febres ante septimū diem terminari. Ad hæc, si quarta dies tertie diei similis fuerit, & febris velvō devrens, nec facies, aut reliquum corpus collabatur quicquid, huiusmodi febris ad longius extendi tempus cōsueat. At tales quidem sunt differentiæ earum febriu, quæ accidentibus carent. Curatio autem cuiusq; earum deinceps scribetur: primum tamen intermittētium, dein cōtinuarum. Ex intermittētib. igitur breuissima mitissimāq; est tertiana. Longissima autē, & quantum in ipsa est, haudquaquā periculosa, quartana. Quotidiana verō, & longa, & nō sine periculo. Porro * vbi morbi existunt acuti, celeriterq; ad statum perveniunt, etiā valde tenuem victum exhibeas, non multum lēdes. Vbi verō sunt diuturniores, nisi ab initio cibo vberiore reficias, hominē simul cum morbo perimes, aut intempestivē victum modum commutabis. Neq; enim oportet ita accedente ossere largiorem cibum quā prius: sed contrā, ponis tenuissimum victum, qui in toto morbo exlubetur, in statum referatur. Distinguendum autē est, num exquisita, an minimē exquisita sit febris. Etenim exquisita tertiana, ad maximū septem circūbit. iudicatur, etiāq; minimē periculosa. Alteram verō non exquisitā, quandoq; vidi, quā in autem nō in cepisset, in vere deſisse. Quatuor autem hæc natura inter se differunt, tantūm rationabile est & rationem victus mutare. Ergo si quæ in principio sermonis tertianarū febrium indicia scripsimus, omnia adſuerint, exquisitis reddunt tertianā. Cuius accessionis tempus breue, quatuor, aut quinq; aut sex: ad longissimum, vnde-cim aut duodecim horas cōplectitur. Atq; huiusmodi febrium vrinæ, tertio die, aut ad summum quarto, cōſonionis signum ostendunt. Quibus fanē indicia exquisitis, à non exquisitis tertiana diſtingues. Eadem quoque ratione exquisitā quartanam & quotidianam. Cui enim omnia insunt indicia, quæ in quartanis febribus antea descripsimus, hæc vera & exquisita est quartana. Cui verō minimē spuria & nō exquisita existit. Quotidiana etiā cui omnia que diximus insunt, exquisita est: quæ autē eam naturā non habet, spuria. * Nō igitur quemadmodū exquisitæ quotidianæ & quartanæ, sic etiā non exquisitæ, sunt lōgæ. Nam quemadmodū exquisita tertiana est brevis, sic & quotidiana & quartana diuturnæ. Cæterum non licet nobis bene prænoſcere, nisi quæritatem morbi atq; virum accuratē expendamus. Etenim si vires adeo valide fuerint, vt morbum vincere possint, necesse est ægrorum evadere. Sin verō contrā, omnino morietur.

Tertiana est brevissima morbi æg.

Quartana est longissima, maximeq; periculosa.

Quotidiana est periculosa, neque valde periculosa.

Acuti & velocissimi morbi, brevissimi vbi rationē possident: vbi non possident, longissimi.

Tertiana exquisita ad maximam septem circūbitur.

Tertiana exquisita accessio, à duodecim ad novem horis cōplectitur. Exquisita intermittētis, à non exquisita quomodo diſtinguantur.

Prænoſcere illi nō licet, qui morbi & viri magnitudinem nō expendunt.

De

Quotidiana quæ præcipue febrem corripit.

Quotidianarū declinationes non terminantur sudoribus. Vrina intermit-tentium singula propria.

Febrium continuarū indicia.

De cura exquisitæ tertianæ. Cap. ix.

Exquisitam ergo tertianā, vt quæ ex flaua bile cōmota inualeat, q̄maximè fieri potest refrigere, atq; humectare oportet. Nam cōtrariorū cōtraria remedia sunt: quæ quidem q̄d superfluum est, reprimūt q̄d verd deficit, suppleant. At flauæ bilis humor, omnium qui in corpore sunt, aridissimus, calidissimūq; existit. Hunc igitur, quū ad ventriculū repit, per vomitum educere oportet. Quū verò vergit ad inferiora, eodē modo per aluum: id q̄d fieri solet spontē in exquisitis tertianis. Per vrinam quoq; & sudores oportet ipsum vacuare. Ac ventur quidē, mollibus clysteribus inanidus est: vrina verd, porionibus, in quibus apii, aut anethū maducit, p̄vocanda. Quod si tibi cōctionis signa monstrantur, iam cū fiducia aliqd ab sinthi exhibebis: q̄d alioqui summū est remediū, vbi infestauit bilis, si præsertim ex ipsius coma, quantum sit fatis, accipies, melicratō intinxeris. Balnea verò calida ex aqua potabili, p̄sunt: tum quia aliquid bilis educunt: tum quia sua qualitate & humectāt, & portia refrigerāt. At marinz aque salis, nitrosi & sulphurei, plus quidē bilis educunt, sed magis sua qualitate nocent, q̄ evacuationib; iuuēt. Semper aut oportet cōtrarias qualitates, illis quæ inualerint præternaturā, opponere: quū hoc multo plus iuuēt, q̄ quomodolibet evacuat. Hic itaq; in balneis scopus sit, vt corpus madaet, vty humectetur. Vbi igitur plurimum olei calidi inferderis, ad aquam perducere, ac madaescere oportet. Quod si in ea natare voluerint, quantum id facere possunt, p̄mittendū. At qui balneis admodū delectātur, si etiam bis in die lauari p̄miseris, nō aberrabis. Sed illud semper habeto in memoria, vt respectu id faciant. Si verò etiam cōctionis signa ostendantur, si scilicet laueris, nihil deliqueris. A vino autem, antequam morbus coquatur, p̄sus est abstinentum. Verū vbi cōcoquis is ceperit, dandum est ab initio tenue, aquaticum, atq; paucū. Vbi verd iam propē est, morbus solutur, amplius est offerendum. Cibi autem quicūq; humectant, atq; refrigerant, omnes viles sunt exquisitis tertianis. Ceterum quantitas in ipsis sit tāta, vt bene concoqui possint. Ex oleis quidem, atriplex, bilerum, lapathū, malua, lactuca, & cucurbita. Ex aliis verò, p̄sunt succus, forbinio ex alica, ex piscib; fixantibus. Ex volatilib; deniq; ea, quæ mollibus constant caribus. Quæ autem talia nō sunt, eorum alie: testiculi quoq; gallorum, & similes pedes, & cerebra. Patuorū verò si etiam dederis carnes affas, nihil nocabis. Sed & oua ad forbendum sunt offerenda, & præsertim vitelli eorum: nam hi facillius quam pars alba coquantur. Ex fructibus autem illos tantum degustent, qui nō sunt omnino difficiles cocti: Oportet abstinerē a melle, sinapi, salis & acris omnibus: sicvty & a vinis sans verusis & calidis.

De cura tertianæ notizæ. Cap. x.

In illis verd quæ nō adeo exquisitæ sunt, providendū est, ne morbus augeatur, nec egrorantis vires corrumpantur, quæ laborare longiori tempore debent. Quare operæ precium est scire, ad quam magnitudinem morbus ipse sit p̄uenerus, & quæ sint ipsius ægri vires: vt ad ea inspiciens

quæ maius auxilium p̄stulant, inedia quidē in valentioribus vtari viribus, & morbo cōcocto difficili largiori autem cibo, vbi vires sunt infirmiores, nec morbus admodū ad cōcoctionē cōtumax. Iam verò in tertianis nō exquisitis, nec statim circa initia balneare expedit, & d quū primum cōctionis signa apparuerint. Nec cibū quōtidie offerre expedit, sed alterius dieb; Quies verò & calfactio circa p̄cordia iuuēt, & forbiniones quæ concoquuntur faciliē, & clysteria nō admodum mollia. Quod si sanguinē mittere oporteat, neq; hoc quom̄ omitteridū est: sed ab initio statim tantum sanguinis detrahendum est, quantum præsens status exigit. Sit autē totius vitæ ratio, non quæ humectet, atq; refrigeret vniuersum corpus: sed quæ aliquē modum etiam assuemat, ad calfaciendū, incedendūq;. Petiūm igitur eos iuuēt p̄sunt succus pipere adiectus. Ad hæc, hyssopū, vel origanū, vel spicā nardi mulsū infundēs, & decoquens, ad bibendum p̄pina, & quæcūq; alia, p̄vocantia vrinā, exceptis illis, q̄ præter modum calefaciant, excōcantq;. Maximè verò post diem septimū danda eis iugiter est ab sinthi coma. Et quidem oxymel potione plurimos iuuat: & aliquid ex his quæ molliter ventrē subducunt. Vomitus enim post cibum, adeo his quibus hæc feris perdurauerit, vilis est, vt multos sciam solis vomitibus statim fuisse curatos.

De cura quartanarum. Cap. xi.

Quartanas ab initio mediocriter, ac leniter tractare oportet, nullū forte medicamē, aut evacuationem exhibentes: nisi forte sanguis vehementer superabundē appareat. Ceterum si vena incisa, is qui fuit, niger & crassus videatur (qualis in his præcipue visitur, qui hene laborant) audacius mittendus est. At si flauus, aut tenuis cernatur, subito suppressendus. Venam verò secare oportet, vel interiorē, vel mediam, quæ est in sinistro cubito. Victum deinceps insinuare sine statibus, ac optimum: ventremq; emollire, iis quæ vti tata sunt, expedit. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus vtendū est, a principio quidem mollibus, postmodum verò acronibus. Arcēdi sunt autē a suillis caribus, ab omnib; edulis quæ tenacia sunt, & tardū habent exitum, quæq; tum refrigerant, tum siccant corpus. Vino verò vtendum est albo, tenui, & mediocriter calido, & volatilib; q̄ boni sunt succi, nec in paludibus degunt. Pises sunt adhibendi, qui faciliē concoquantur, ac molles caribus, nulliq; tenax habentes. Vtendum est autem salicantis, & sinapi ac cetis diebus medicamē diatrion pepercon, vel diosporicū est assumendum. Quod si quondā piper tantū cum aqua biberent, recte etiam facerent. A frictionibus autē, ambulationibus, atq; balneis, nō sunt penitus prohibendi. Quāq; omnino possunt a balneo abstinere, solis cōtinenti frictionibus, inde plurimū iuuauerunt. Iam si quartana ipsa sit brevis, nec admodum violēta, nihil nocuerit si dieb; interiectis ad cōsuetā exercitia se trāsferant. Hæc igitur ab initio, & vsq; ad statum sunt peragenda. In statu autem subtilior victus ratio adhibenda est, q̄ ante, vel post. Statim verò ager cōtinendus in quiete est: ac visceribus providēdum vnguentis & cataplasmatibus.

Tertianæ exquisitæ a curatio.
Constrariarum eorum remedia sunt.
Flaua bilis quæ sit iuuor.

Vrinā quæ p̄uocent.

Ab sinthi esse remediū summa contra bilis molestia.
Balnea dulcia cur tertiana fore acribitur.

Alterare inualentes qualitates febiles, quom̄ vacuare, magis cōducit.

Vino corruptis tertianis p̄sunt dandum nō esse, antequā appareat signa cōctionis.

Tertianis exquisitis quæ viles ratio conueniat.

Saves pedes & cerebra conferre tertianis, nec non affas potest carnes.
Vitelli eorum facillius quam alba coquantur.

Tertianæ notizæ curatio.

Tertianæ notizæ viles ratio conueniat.

Tertianæ notizæ cōcoctis p̄sunt dandum p̄uocant post cibum.

Quartanas in principio esse tractandas leniter, antequā morbus mollior sit, fortis evacuare.

Quartanis viles ratio conueniat.

Diatrion populeum quartanā vilit.

Piper cū aqua fructu diuina bibet, ad quartanā facit.

Quartana detrimenda vnguentis & cataplasmatibus.

quæ mollires et laxare possint. Deinde medicamē-
tis vtendū, quæ cūda vrinā vim habeat. Vbi verò
coctiōnis signa apparuerint, tunc sanè purgare
oportet iis quæ leuiores atros inaniāt, nō semel
tantum, sed sæpius, si videat necesse. Vtendū autē
& vomitib. itam a cibo: & si nilul. plibuerit, el-
leborū album est exhibendū: primò quidē, per-
missum radiculis: quod si nihil profecerit, ipsū
per se. Ceterū qui nequeunt e vomere, h̄ velle-
mentius p̄ inferiora purgētur: ac postmodū osse-
ratur eis in potu, medicamē confectū ex viperis:
necnon quod succū cyrenaicū recipit. Qui cūq;
verò ab initio aliquid ex hūc medicamētis ex-
hibuerūt, aut omnino ante statū, quartanā quæ
erat simplex, duplicem reddiderūt: aut omnino
maiores, atq; difficiiores: ex duplici autem tri-
plicem, aut omnino ambas difficiiores.

De cura quotidianæ. Cap. x. 11.

Quotidianā autē quam volueris curare, oxy-
melite vntor post primos dies, & illis quæ pro-
be possunt vrinam citre: vniuersūq; totius vi-
ctus caput sit ad incidendū efficiacis. Circa sta-
tum verò, de ventriculo est habenda sollicitudo,
ac de ipsius ore præsertim. Deinceps iubendum
est, vt post radiculas & cibos assumptos vomāt.
His etiam quæ piruitam subducunt, vtendum.

De cura febrium continuarum, quæ carent
accidentibus. Cap. x. 11.

In cōtinuis autem febribus, quibus nō vltra
septimū futurus status est, si vires valde sint, &
ætas cōsentiat, admodū exquisitus & tenuis vi-
ctus est institutus. In quib. verò vel status to-
tus morbi longius abest à septimo, vel vires ro-
bustæ nō fuerint, vberiori cibo ægri sunt reficiē-
di: quem admodū prope statū tenuiori. Quū autē
iam adeit status, tenuissimū victū seruare oportet:
deinde rursus semper vberiorē. Sanguis ve-
rò mittere oportet, & ob morbi magnitudinem.
Quibus aut rubor multo intensior, quā p̄ natu-
ræ ordine, & maior, quā pro consuetudine,
totius corporis moles, ventis eminentes, exten-
sely fuerint, iis etiam est auferendus, nisi vires,
aut ætas, aut aliquid cōmemoratorū, prohibuerit.
Quod verò humidus victus in febribus acutis
omnib. iuuat, rectē iam dictū est. Cremorē
igitur p̄stantē, iis quibus nō accecit, exlibere o-
portet: & melicratum quibus non bilecit, & for-
bitiones ex alica, & panem ex aqua. Porro in fe-
bribus præter modum calidis, vrentib. q; quū
primū coctiōnis signa apparuerint, tunc auda-
citer aquam frigidam propinabis. Modus verò
in quantitate seruatur, quem admodum tempus
anni, regio, ætas, natura, consuetudoq; exigunt.
De curatione febrium cum accidentibus.

Cap. x. 11.

Quæ febres cum accidentibus vrgent, non s-
quæ simplicem exigunt curationem: sed pro viri
bus metiendum est, quanta sit ipsa febris, quan-
tūq; ex accidentibus imminet periculum: atq;
ad id quod vehemens fuerit & difficius, in-
tendendum, non possibilia omnino etiam alte-
rius cura. Etenim vbi simul cum ipsa febre senti-
tur circa os ventriculī anxietas, morsus, & imbe-
cillitas, prius sanè vacuandū humores non sup̄,
quā os ipsum ventris corroboretur, etiā si cru-

ditate aut cacochymia gger ipse laboret. Sed nec
si fuerit febris cū ventris proliuio, alia est opus
evacuatio. Verū h̄c sola sufficit, quāvis nō sit
pro ratione ipsius plenitudinis. Iam verò si quis
simul & distentione nervorū laborauerit, & san-
guinis egressus missione, neq; huius tantum semel
mittere oportet, quantum exigit morbus, sed alia
quid etiam accidenti est linquenda, cuius causa
sæpe sudores eveniunt, & vigilie molestant, & vi-
res ægri debilitantur. Ita etiā si vehementes vi-
gilie, aut dolor intensus ægri crūciat, cauē-
dæ sunt subitæ evacuationes, ac multæ. Ipsa præ-
terea ambiens aëris tēperies, loco accidentis cuius-
dam habēda est, dum exquisitè calida & sicca fue-
rit: qualis est tēpore medio inter Canis & Arctū
ri ortū. Si etiā valde frigida fuerit, tūc quoq; san-
guinem mittere formidandum. Ob h̄c etiā neq;
in loco admodum calidis, aut frigidis, sanguinē
mittere audemus. Quod si regioni temporis ita
tū cōsentiat, etiā omnino abstinemus: si verò nō
cōsentiat, evacuatū quidē, sed multo minus, q̄
si neutrum prohiberet. Tolerantia etiā ægri, ceu
dam accidens, expendenda venit: nec secus ipsa
tēperatura. Nam quicūq; calidi & sicci naturæ
sunt, hi omnes facili ab integris evacuationib.
offenduntur. Cōsuetudo quoq; nō parui momē-
ti est, quā ad omnia alia, tū præcipue ad eva-
cuationis indicationē. Quiddā enim nunq̄ prius fue-
re vacuari, & multis obis sunt vñ. Nōnulli cōtra
nec multis obis sunt vñ, & evacuationib. assue-
uerūt. Hos igitur intrepidè evacuare oportet, si
reliqua etiā consentiant: alio vō, ne si reliqua
oia id suaserint. Eodē panter modo & corporis
habitus considerandus. Nam qui dēsa & solida
carne cōstant, nō offenduntur facili. Quare non
oportet vereri ipsos vacuare ex toto, si quidē &
alia id iubent. At qui mollē, & tenellā, & disten-
tem carnē sortiunt, i mīrū in modum sunt ad pa-
nendū habiles. Quare vel si reliqua omnia fan-
guinem esse mittendū suadeat, non tamē id face-
re audendum est, sed vtendū aliis evacuationib.
moderatē. Eodē modo & in iis qui supra modū
crassi aut macilē sunt, ab incidēda vena super-
scedendū, cæterāq; integras evacuationes vereri
oportet. His etiā & ætas annueranda est, veluti
quoddā symptoma, q̄d prohibendū integrā va-
cuationem vim habet. Neq; n. pueri, neq; senio-
res h̄c sine noxa tolerāt. Hosce igitur omnes, si
dispositiones hortent, nō semel, nec ex toto, sed
paullatim oportet vacuare, inediū moderatē, fri-
ctionib., clysterib. mollioribus, perfusionib.,
atq; balneis. Quod si duo cōtraria symptomata
aut morbi cōstant, aduersus id q̄d magis vrgeat
instandū, nec interim alterū negligendū. Eas ve-
rò quæ habentur ex accidentibus & morbis indi-
cationes, non simpliciter, sed secundū causam à
qua singula sūt, cōsiderare oportet: qualla sunt
defectus animi, & exolutio: quæ duo nomina de
vnica re dicūtur, cuius plures existūt causæ. Sig-
dem nō solum p̄ vatos affectus corporis, sed et-
nā in velleminsimis perturbationibus animi,
nōnulli exoluti fuerūt: præcipuē senes, & natu-
ra imbecilli. Etenim plures eorum tristati, aut ire-
rati, aut irati, aio defecerunt. Qui aut magis ro-
busto sunt corpore, ex immo dicis evacuationib.

Febrium qua-
cum alia fiores
insufficiant. non
esse alia opus
evacuatio.

Evacuatio-
nibus ac mō-
la, quando ca-
uenda sunt.

Sanguis mis-
sione prohibe-
ret aëris consti-
tutionis empi-
ca lita aut frigi-
da.

Calidi & sicci
offenduntur ab
immolibus va-
cuationibus.
Cōsuetudine
plurimum possi-
ad vaccinationem
indicationem.

Habitudinem
corporum qua-
cum facili mis-
sione sanguis
non ferat, &
qua difficius.

Pueri senesque,
integras vacua-
tiones nō ferūt.

Animi vñ
molestiam esse
h̄c fiores præ-
cipui atq; imbe-
cilli exoluti.

Quartana de-
necet, esse plu-
rius purgandi,
sed apparuit
bus iam signa
colicæ.

Theriac in
quartana pri-
cipio exhibito
quid molietur.

Quotidiana
curatio.

Febrium conti-
nuarum quæ se-
ntia acciden-
tia insidit cu-
ratio.

Vitus hūmi-
ditas in febribus
omnib. acutis
sanat.

Febriū cum ac-
cidentibus in-
flammatiō cura-
tio.

bns idem panunt. Iam verò si abſceſſus quiſq; rumpat, vires vehementer le dir, acutum præcipue, eam materia ſimul tota ad ventriculū, vel ipſius os, aut thoracē deſluxerit. Quod ſi quādo enam nos abſceſſus ſecantes, totū ſimul emittere pua voluerimus, animi deſectū ſubſequi eſt neceſſarium. Nec verò laborantiū aqua inter cutē, tota ſimul humiditas (ſi vis ea præter naturā ſit) po teſt ſine noxa vacuari: ſed tunc quoq; neceſſum eſt, hominē deſicere animo. Ex dolorū etiā veie

Pur per ſectio nem abſceſſi, ſi totum ſimul vacuatur, vires ducit.

Id, dropia aqua nō poſſe totum ſimul vacuari, abſq; deliquio animi.

Dolor vehemens vires coarctat. Deliquium ani mi que inducunt.

Deliquio animi à vacuatione, curatio.

Profuſa moliebria ſecula cucurbitula vena membra appoſit.

Sanguinis fluxus in naribus cucurbitula præcordia admo uat compoſit.

Vinum frigida temperat, vi res exoluit ab immodica va cuatione re ſtat.

Vinum quibus non dandam.

Proſida poro quib; obveniat maxime, et qui bus ſit præſcribenda.

Partes per quas ſit fluxus, curatio.

Caput offendi gerendum, ubi ſanguis fluxit per aures.

ponedū. Porro balneæ in fluxionibus ad ventri culum quidem aptiſſimæ ſunt: at ſanguinis fluxum acriter tritāt. Et quicūq; ob ſudoſia copiā animi deſectū patitur, his etiā plurimū nocet: vt quæ ponas aſtringere oportet, atq; reſingere. His etiā vinū frigidum exhibendū eſt, ea oſit omnino calidū. Sed nec etiā artus ipſorū ligare oportet, neq; cogere ad vomitū, neq; villo modo mouere. At vennis reſingentibus aditū præparare; ærē quoq; domus alterare frigida & acida qualitate, myrrorū frondibus, & vitū capreolis, ac roſis pauimentū conſpergentes. Ni hil verò horū conſent, vbi fluxiones ad ventricu lum ſunt. At qui exoluit ab plenitudine, eorū artus ſplurimum perfricare oportet, caſſacere, ac deligare. A vino verò & cibis ſunt abſtinēdi, & à balneis ſi febrant. Sufficit autē, ſi eis dederimus melicratū potū, in quo bullierit thymus, vel origanū, vel pulegiū, vel hyſſopus. Conuenit quoq; oxymel. Qux ex matricelaborāt, atq; exoluit, non aliter ſunt curandæ, excepto oxy melite. Fricare autē ac deligare magis earum cru ra oportet, quā manus. At quibus vterus aut ſurſum, aut ad latūs reuclitur, iugulis & co xis cucurbitulas applicamus: & naribus quidē, ea quæ ſordidiſſimū habent odorem: matricibus autem odorata, & ea quæ laxare caſſacerēt po ſunt, medicamēta offeremus. Si verò ob imbeci litatē ventriculi, animi ſequat deliquiū, ea quæ roborandi vim habent, oportet emplaſtra adhi bere: quale eſt quod ſit ex palmulis, vino, farina hordei, croco, aloē, & maſtiche. Madaſcere autē iis quæ cōſtant ex abſinthio, oleo melino & ma ſtichino, necnō nardo, vino, & canante. Quod ſi exviantur, miſcere ex refrigerantiū aliquid cōuenit, veluti cucurbitæ, lactucæ, portulacæ, ſo lani, intybi, atq; vix acerbæ ſuccū. Aqua etiā frigida plerumq; iuuat malē affectū ſtomacho, ſi perceptū, hoc eſt, in declinatione, exhibeat: alioqui plurimū obest. Atq; his qui os ventricu li imbecillū habent, vinū calidū exhibere oportet, ſi nihil prohibeat. Plurimum verò iuuat eos qui ſic laborant, etiā friſtio extremorū. Quod ſi ex iis remedia nihil melius ſehabuerint, eos quidem qui ad vitū ſunt, quāprimū ad balneās ducere oportet. Qui verò aiquid frigoris ſentiunt, medicamē diatrion pepercon, iplūſimū piper ſolum, atq; etiā abſinthiū bibant. At qui exiſioſa humoribus os ventriculi merdantiū bus exoluit, hos poſt aquæ calidæ, aut hydre lici potū, ſic vomere. Vacuatia humoribus, partem laſam oportet modis omnibus roborare, partim ſi q; admovent extrinſecos, partim abſinthii poſitione. Caterū ſi humores aduic in ventrem cōſiſtant, minimē ſanē aſtingere, ſed tan rē cōcaſſacere oportet. Vbi verò multa pitui ra in ore ventriculi acerrata fuerit, fouere quidem plurimū oleo, in quo bullierit abſinthiū: poſtea meberatū exhibere, in quo hyſſopū, vel quod ſimile inſuſum fuerit: atq; oxymel, & piper, & diatrion pepercon, & diſſolpition medicamēta. Viſcus ratio in ſumma, incidendi vim habet. Qux verò ex nimia frigiditate eueniūt ex lutoſos, eodem modo curandæ ſunt, quo bu limū, omnimodo caſſacientibus. Vinum igitur

Deliquio animi ob ſudoſia coa tra.

Exoluit à pleni tudine quomodo ſunt curandi.

Vires ſuffocant an curatio.

Exoluit ab imbecillitate ventriculi curatio.

Vinum calidū propinquandi in breuē ventricu lo.

Exoluit ab pro noſuſſa, venter in inſiſſant, triquomodo ſan dendi ſunt.

Exoluit ab reſingentibus curatio.

eis exhibere oportet, calida temperatū: ac cibos qui calfaciēdi naturā habent: fricacēq; & calfacere adignē simul. Quē ex calore nimio accidit de liqua animi, iis quē refrigerandi et roborandi vim habēt, curant. Stranm igitur ipsos corroborebāt, si aqua frigida spāneris, & flabellaueris, et os vētriculi pfricaueris, & agitauesis, vinōq; & cibo refeceris. At qui ob inflammationē magnitudinē, aut vehemētis febriū malignitatē, animi defectū patiuntur, et in principis accessiōnū refrigerant, iis artus fricare fortiter, & calfacere, crurūq; ac manus alligare, & vigilia, cibiq; & potus omni modū abstinentiā precipere oportet. Optimū verō in his, quid futurū sit p̄cognoscere. Eos enī qui ex hīcitate in principis accessiōnē, defectū animi sunt incursum, optimū est p̄videre. Nam si duabus aut tribus horis ante accessiōnē exhibitō cibo cōcoctū facili, manus ac pedes cōstitūgi iusseris, nō interibūt. Quod si magnū imminere periculū suspicatus fueris, vinū in alicā elixam infusum, dare anticipabis: aut panē quoq; ex alica. At si mediocrius expectatur defectus animi, parcendū est vino: sed sufficit tunc mīla punicā, aut pira, obis ipsis miscere. In q; p̄ter expectationē in periculū incidēt, vinū calidum, & panis est exhibendus: pariterū aliquid cum eo alicā calidē. Qui ob p̄cipui membri obstructiōnem linquentur animo, iis oxytel dare oportet, atq; ex hyssopo, origano, pulegio, & melis porum: quibzq; incidendi naturā habētēs. Sed

nec detentus fuerit artus p̄fricare, deligareq;. Prodeēt etiam lūscē potibus viri, qui vinū sciendū vim habent: veluti qui anethum, fœniculū, apium, petroselinū, ammi, daucum, & spicam narē recipiūt. Quē vbi vbi manifestē iuauerint, iam vino albo & tenui, nec admodū annūq; est vtenādū. Fiunt verō & in huiusmodi dispositiōnibus, cum vehemētis fuerint, pulsus inæquales intercedētiq;. Qui ex abscessus disruptiōne, aut sectione exoluunt, aut ex superflua aque inter cutim inanitione, si quidem cōfectum optimis odoribus sunt fouendi, paulo aut pōst, forbinonibus cōcoctū facilibus sunt reficiendi. Si verō ob tristitiā, aut gaudium, aut timorē, aut iram, aut terrorē, exolui videantur, odoribus, & narium apphensionibus reuocandi sunt, cogendiq; ad vomitū. Eodē pariter modo, qui ex vulneribus, aut purgationibus, aut dolorib; qui in articulis, neruis, & musculari chordis eueniūt, exoluiūt, reuocandi statim ab eo affectu sunt: postmodum verō, cōueniens passiōni cura afferenda. Defectus animi qui ex intestini laxioris doloribus, aut ilei, aut similibus cruciatib; fiūt, ex patientiū locorū calefactione frictiōnēq; extremorū curantur. At qui ex propria imbecillitate virili, quæ regunt corpora, eueniūt exoluiōnes, ex intertempere videlicet ortæ, partiū si quib; vires proficiūtur, cōtrariis intertemporibus curandæ sunt. Virtus ergo virilis quæ ex corde nascitur, ex pulsū imbecillitate cognoscit. At quæ ex hepate oritur, et naturalis dicit, ex sanguineis egestiōnib; ab initio aquosius atq; tenuius, postmodū verō crassius, ad modū facit. Quæ ex cerebro originē ducit, quam animalē appellant, ex mortuū voluntariorū imbecillitate deprehendit,

De cura capitis à variis occasionib; lassi. Gal. xv.

Igitur si p̄tomarū causæ, cōgruam curationem ostendunt. Veluti si quis doleat caput, si multiq; fastidiat cibos, ex famēq; sentiat mordicationem, iubendū est vt evomāt: nam vel blem vomer, vel pituitam, vel vtrūq;. Porro qui cum grauitate dolores capitis fiunt, multitudine indicant. Qui autem cum mordicatione, vaporis humorisve acrimudinē. Cum pulsū verō, inflammationem. At cum tensione, si quidem sine grauitate ac pulsū, spiritus statulenti & crudi multitudinem. Si verō cum pulsū, inflammationē corporis membranosi. At si adde grauitas, multitudo intra membranas cōtenta significatur. Cū igitur omnia distinxeris, causam ex qua horum singula fiunt, cōsiderare oportebit. Veluti si multitudine vaporis atq; humoris continetur, auertere oportet, nōquid ob magnitudinē febriū humores distūti, ac veluti effluuies emittet, ac caput ascenderit, aut propter eius partis imbecillitatē, aut ob totius corporis plenitudinē: hanc enim totius corporis euacuationib; haud difficulter curabis. Eam verō quæ ex partis imbecillitate cōtingit, partim quidem in cōtrarium trahendo per totū corpus, partim ipsi capiti remediis adhibendo. Atq; in cōtrariū quidē trahens, elyptēb; acris, nexibus, frictiōnib; plurimis infernari partiū, & si expedit, sanguinis aliquā rula detractiōne. Partem aut sanabis eo tempore quo ad vniuersum corpus retrahis, iis vires asperginibus, quæ à capite vim repellēdi habēt: ac dein euacuantibus: postmodū deniq; corroborentib; repellit aut oleum quod immaturū dicitur, ac tum oxyrhodinū, tum rosacē, & quæcūque ex capitibus papaueris, & teneris oliuz germinibus, & hederæ corymbis, menthāq; viridi, & silymbrio fiunt. Vtendū verō ipsis, in multitudine crudioris & frigidioris, tepidis: in calidioris autē & biliosioris, frigidis. Euacuat enī dissolutiq;, oleum calidum, ipsum per se: & magis si antiquum fuerit, & Sicyonium, aut anethum feruēfactum in ipso fuerit. Quod si spondyliū, vel serpyllū, vel pulegiū comam, vel calaminthæ, vel menthæ, vel silymbri, intus decoxeris, ita etiam trasiores succos vacuaueris. Hæc verō ipsa, virium enī aliq; mēbro imbecillē adiciūt. Quod si etiā ex vīu videat, per nares atq; palatū expurgatio molēda est, sternutamentūq; excitandū. Si ad balneis hominē duxeris, siccis sindonibus caput est p̄fricandū, salq; & nitrū, & synapi, sine oleo imponendū. Hæc itaq; sunt ex particule imbecillitate, doloris capitis medicinx. At quando ex magnitudine febriū accidit, & medicamēta adhibere euenit, frigidæ qualitates ac vires, & quæ ex hydrelgō & oxyrhodino, & papaueris capitis, perfusionē cōstant, expedit. In dolore autē capitis, q; sanguinis fluxū, aut vomitū decretoriū significat, remediā inuestigādā nō sunt: cū nō a eisdē, sed talis dolor bonū exitū signū. Si quidē vbi natura excretionē aliquā, ac p̄cipue vomitū, aut sanguinis per nares fluxū molit, hoc in separabile indicat ei capitis dolor. Cōsiderandū igitur ad cognoscendū crīsm, primū quidē sunt febriū species, an calidæ sint, atq; virentes: nā hæc p̄ter excretionē iudicari cōsueuerūt: quæ ad modum

Capitis doloris per contrarium curatur.

Capitis doloris species variae.

Capitis doloris ob imbecillitatem contrarii, contrarii.

Reuolūtiōis modo de vīu.

Repletio humoris à capite, qua cōmodopopinat.

Vacare distinetque capitis humores quæ ad modum papinat.

Capitis doloris ex morbo admodum febriū ortu, curatio.

Capitis dolor, quare excretionem si signum insuperabile, admodum febriū cōsueuerūt iudicari per acce huerūt.

Evolutionis ob calore ortu curatio.

Evolutionis ob febriū, aut plūgmos magnitudinē, curatio.

Evolutionis ob locutionem seu re, p̄cipientis.

Evolutionis p̄ter expectatōnem oborta curatio. Evolutionis ob vīu p̄cipui obstructiōnis fa

Evolutionis ob immodica potus aut aquarū inter cūctacōnem, curatio. Evolutionis ob animi affectu ortu, curatio.

Evolutionis ob doloris intensioris, curatio.

Evolutionis ortu à vīu imbecillitate, curatio.

Facultas vitalis, naturalis, et animalis vnde proficiūtur, et quid dignetur curari imbecillitate possit.

dum quæ molliores sunt, ac veluti fumigantes, diu durat, & sæpius in abscessus cõdendur. Secundo loco, an morbus sit salutaris. Nam quis, obsecro, bonâ crism in morbo pncipio expectauerit? Tertiâ ad hæc totius morbi tempus considerandum. Nam si principij vel augmenti adsit signum, minimè aut statim, nec concoctionis signa in urinis, vel sputis, vel alui excrementis cernantur, nõ sit quod bonâ speres crism. Porro difficilius tolerantia antecedere omnè crism solet. Quæ quidem si in die accidat, crism sequetur noctu, si aut noctu, in die. Si igitur tale aliquid videas, considerandum est, quorū sit ægritudinis dies. Etenim septimus dies, eni ex paruo natura apparatur, ad crism per excretionē mouet. Sextus verò magno apparatu indiget, & sæpe neq̃ vlla in eo sit crism, nec sine periculo, nec fideliter acciderit. Ergo si dolor capitis statim ab initio nõ invasit, si vñ quoddã ipsius morbi symptoma, sed

Crism amari procedit diffis in tolerantia.

Septimi dies ad tura, Sexti deinde natura.

Sanguinis crism cum excretionē per nari, quæ indicant.

* in ipsa ante crism perturbatione: dein si collit etiam aliquid cõdoleat, & præcordia retracta sint, aut repẽt supervenerit difficilis respiratio, pulsusq̃ in tumorē subrid elati, nõ reciderint in parvitatem, neq̃ debiles fuerint, statim crism per sanguinis fluxu è naribus expectanda est. Si verò nõ modò nõ deciderint, sed eni in altũ atrolantur, & vehementiâ assumpserint, faciem iam ægrotantis inspicere oportet. Nam si quod in ea membrũ * palpet, aut venæ quæ sunt in temporibus pulsant, aut malũ, vel ita fusa, vel oculus rubidior sit factus, magis etiam talis crism est expectanda. Quodd si eni inuit illa clymẽt, vel imaginẽ se splendores cernere, ac nãres ipsas scalpant, tunc nõ iam fluxurũ, sed iam fluentẽ cõspicias sanguinẽ. Nec verò ex his perterrearis, si hominem desipiemẽ, aut resiliẽtẽ videris. Nam & hec humorũ repẽtũ ad partes supernas indicia sunt. Præterea si ægrotus sit adolescens, aut alioqui natura calidus, aut multo sanguine abundans, magis adhuc de hoc sperandũ erit. Quodd si sæpius eni antea illi sanguis è naribus fluere est visus, hoc vel solum sufficit fluxus sanguinis spem cõfirmare. Si verò & tẽpus anni æstas sit, vel calidus cõli status, & si plures co tẽpore crism ex sanguinis fluxu habuerint, ægriq̃ corpus plenũ existerit, & consuevit excretionē retente, hæc in quã omnia spem vehementius augebũt. Has itaq̃ & alias excretionē omnes prænoscerelicer, si hæc duo tantũ explorauerimus, & vnde nature motus agatur, & in quam partem. Si quidem quæ deficiunt adiuvabimus, & quæ immoderate feruntur, cõcerbebis, si ista novierimus. Veluti cõfestim sanguinis fluxus ex splene magnæ cucurbitæ similitris præcordiis insperosere, facili retrahunt. At qui ab hepate proficiunt, dextris. Qui ab aliis membris, eadem ratione.

Excretionē prænosces facili quæ vnde motus natura agatur, in quam partem, in vñ gerit. Sanguinis fluxus eni ab hepate, & ab splene, cucurbitæ admodum vivacibus retrahit.

GALENI PERGAMENTI de arte curativa ad Glauconem, lib. II.

CAP. I.

DEiis autẽ quæ in singulis corporis partibus sunt passionibus, deinceps sumus dicturi, ab inflammatione auspicari: qđ sæpius hæc accidat, plari max̃ ipsius sint differentię, ex quarũ singulis solent febres oriri. Cõmu-

nis igitur in omnib. est immoderata caliditas, & veluti quoddã effervescentia, vnde & plilegmones nomen de ipsius effere veteres conuenerũt. Propriam autẽ quandam in singulis differentiã invenies, ex qua eius speciem agnosces, & convenientem alieque medela. Porro prima in inflammationis differentia est, secundũ quã hanc quidem humidam, illam verò esse siccam cõtingit. Humidã quidẽ, quæ ex calida fluxione membrum occupate accidit. Siccã verò, quando nullo humore influente, calor naturalis effervescit. Hæc autẽ, vsq̃ ad aliquid quidem, veluti febris est membrũ. Cũ verò iam ad immoderatã caliditatem ac ficiatã pvenit, corrupto atq̃ extinctio omnimoda fit. Rursus illius differentie qđ cũ humorũ affluxu accidit, multæ species existunt. Nam fluente sanguine, altera: flava bile, altera amboabus simul, alia terna. Ex quidem in earum singulis, vel iam patuit id qđ influxit, vel in membro impactum putrefcit. Præterea vel crassum est, vel tenue, vel optimum, vel deniq̃ acre. Sanguine igit optimo ac mediocriter crasso ad particulã aliquã confluẽt, atq̃ ob multitudinẽ cõculcato, vehementes dolor arripit hominẽ, nisi hebetis sensus ipsa fuerit particula: pulsusq̃ in profundum permolestus sentit, tendiq̃ omnino & cõrundi membrũ apparet, cum vellemẽti incendio, renitẽtia & rubore. Quæ sanè passio totius generis nomen recipit, inflammationē vocat, ex omni ferè occasione pveniens. Quippe vulnerebus, distentionibus, disruptionibus, contusionibus, scissionibus, exercitorũ laboribus, excitationibus, ac præterea fracturis, & spontaneis viceribus advenit. Quinetiam si quando immodicam plenitudinẽ venę ipse cõtrahant, tunc id quod superfluum est, effundũ ad aliquã partem, quæcunq̃ eo tempore fuerit aptior ad recipiendum. Eadẽ namq̃ erit reliquis omnibus imbecillior, vel rarior, vel ad motum præclivior, vel minus nobilis. Flava verò bilis, quando propriam naturã seruans, vnã cum sanguine per totũ corpus deferretur, morbum regis producit. Cũ autem fecerit sola, in aliquamq̃ decumbit partẽ, herpetem gignit. Cæterũ si sit cõsistentia crassa, totam ex vicerat eum, vsq̃ ad carnem subiectam, quæ affectus herpes exedẽs vocatur. Si verò tenuior fuerit, id quod in superficie est tantum, veluti devnt: quæ species generis fortitur appellatiõẽ, quum simpliciter herpes dicatur. Nam ex reliquis speciebus duabus, * illa quidẽ culis nuper mentionẽ fecimus, vocatur herpes exedẽs: altera verò, miliaris, quod in ea pustulae parvæ ac multæ, per summã cutem similes milio, excidentur. Fit autem herpes huiusmodi etiã ex bile quidẽ, sed minus calida & acri, q̃ illæ species priores. Quod si ex sanguine & flava bile calidioribus quom oporteat, mista ipsa fluxio fuerit: aut ex sanguine quidẽ, sed feruido, & sub ita tenuissimò: erysipelas hic affectus vocatur, miltis inflammatione calidior, magisq̃ fluvã colorẽ referens. Non dolo tamen affectus huc, quemadmodũ inflammatio: nec vt aliqua inflammationis species pulsũ, aut cõpressionẽ, aut si mitem invehit tensionẽ. Cæterũ inrerdũ miscetur inflammatio cum erysipelate. Si igit in mi-

Inflammationibus omib. est communis caliditas.

Inflammationis prima differentia.

Inflammationes quæ cum affluxu humorũ insistant, multiplices differentie.

Inflammationis orta à sanguine indicia.

Inflammationis causa.

Receptores superfluum partem culæ, quæ nec cessario esse debent.

Regis morbi productio.

Herpes exedẽs vocatur.

Herpes exedẽs vnde accidat.

Herpes miliaris vnde vocatur.

Erysipelas vnde vocatur.

Erysipelas phlegmonodes quod dicitur acutus.
Phlegmone erysipelatodes quod dicitur.

Erysipelas folliculorum quod dicitur pagion.

Carbunculus generatim.

Bubo quod dicitur.
Phyma quod dicitur.
Phlegma.

Ophthalmia quod dicitur.
Pleuritis quod dicitur.

Synanche.
Peripneumonia.

Inflammationis causa una est fœvia.

Inflammationis curatio.

Evacuatio corporis que sine gravi causa fit.

Genus inflammationis curatio.

scella ipsa exveret propria erysipelatis accidentia, affectus in erysipelas inflammacionis participes nominatur. Si verò inflammacionis accidentia prepolleant, dicitur inflammatio erysipelatodes. At si accidentia vtriusque esse appareat æqualia, tunc erysipelas & inflammatio ex æquo misceri dicuntur. Exquiritur itaque erysipelas, cuius solius est passio. Non tamē ipsa inflammatio pertinet tantum ad cuti subiectas partes, sed ad has quidem præcipue: nonnunquam verò etiam ad cutim. At verò si sanguis influens calidus sufficiēter fuerit & crassus, quodcumque membrum invaserit, hoc exvrendo, vlcus cum crusta exoritur: quicquid autē circūiacet, in inflammacionē attollit effluēscentiæ, grauitatēque dolentē: qui affectus carbo appellatur. Similiter inquit, si sanguis influens niger extiterit, crassus & fæculentus, & feruens, simul adt & hinc quandā tenuem admittam habuerit, pustulas per summū cutis exoritur, similes in quæ ex igne fiunt. Quibus disrupis, crustosus quæ sub ipsis vlcus inuenit. Qui affectus etiā est carbo. Phlegmone itaque in hæc species vniuersales distinguunt, ad quas nimirum referuntur alie omnes particulares. Etenim bubo, phyma, & phlegmon, glandularum affectiones existunt: bubo quidē, inflammatio: phyma, quod statim augetur, atque ad suppuracionē festinat. Phlegmon autē erysipelas participes inflammacionis, aut inflammatio erysipelatodes participes nominatur. Si enī & ophthalmia, eius membrane quæ corneæ inhaeret, est inflammatio. Pleuritis verò, costas succingens membrana. Quemadmodū & synanche gutturis: atque peripneumonia, pulmonis. Eas igitur quæ in partibus apparentibus conspicuntur inflammacionis, promptū est quidem cognoscere. Quæ verò in occultis, & febres omnino afferunt, non tunc discerni possunt.

De causis inflammationum. Cap. II.

Est autem vna quidem apparentiū inflammationum causa, eam non vique adeo occultam, quæ fluxio appellatur: nisi quandoque eis coniungatur, quæ aliqua alia ex causa evidente, factæ videntur. Cum enim nulla ex his præcedente, repente membrum inflammationē patitur, ea quæ hunc affectum gignit causa, fluxio vocatur. Affectus autē ipse, dispositio rheumatica. In curatione cuius, duo magni committuntur errores, vbi statim in ipsis auspicis, vel nulla de toto corpore prudentia habetur: vel ipsum calidum, atque humectatum membrum. At qui rationē simul & experientiam sequuntur, in primis corpus vacuare quibuscumque evacuationibus. cōsultum: ipsam verò inflammatā partē, perfundere, ac superlinire eis, quæ id quod influit repellendū vim habent: ac denique quod in membro patitē cōtinetur, educere vimque ac robore adiungere his, quæ iam affecte sunt partibus. Verū ut rectē quis vacuatio nem vitaret, ætatem, anni tempus, regionē, præsentem aeris statum, robur eius qui afficitur, habitumque & consuetudinē, necnō ipsius morbi naturam contemplari cōsiderare. Ex his namque, quando vacuandū sit, aut minimē, et vnde, & quomodo, inuenitur. Si igitur ad genus totū ferat, atque id plurimū attollatur, præterea totū corpus sanguine plenū appareat, & validā laborantis vi,

tempusque anni sit ver, & temperata regio: æger verò sit adolecens, aut iuuenis sanguinis evacuacione ex superioribus partibus, indiget oportetque eius incidere in cubito venā, aut scilicet internam, aut mediā: cum semper fluxionis morum ad contrariū revelle oporteat. Ipsi autē la borant particulis, si quidem nō admodū doleant, emplastrū ex semperviuo, & cornibus punicorum maiorum in vino decoctis, & rhu, & farina hordei cōstans, est admodūdum. Hoc siquidem repellat quod influit, atque id quod continet exiccat, & circumiacēta membra corroboret. Cum magno autē dolore fluxio incidente, sufficit vehementis doloris lenire, cum aliquo ex his, quæ ex vino dulci, oleo rosaceo, & pauca cera, ni vtroque liquata, cōstant. Oportet autē hæc laxare pinguibus, quæ plurimū habent olei: & ætate quidem frigida, hyeme autē tepida apponere. Sic enī cataplasmata ex amargo, lenite, pane, & rosaceo oleo adlubere: paulo verò si præparentes particulas admovent spongiam vino austero intinctam, aut aqua frigida, cui mistum parum aceti fuerit. Quod si ex hac medicandæ ratione magnus vlcus sensiat, ut alicuius pus se ostendat, molibus medicamentis ad fluxiones vendum. Opus verò ex his sunt, quæ exaccandū & repellendū sūt, sine dolore vim habent. Quemadmodū ea quæ vehementer cōtendunt, atque idcirco dolore afficiunt, plus doloribus obstant, quæ exiccando proficiunt. Tale igitur sit medicamentum, quale est quod ex chalcide constat, remissum oleo rosaceo. Si verò lanam mundā videris acerbio humectaueris apposueris, plus iueris. Quod si pus se in particula ostenderit, cataplasma offere oportet semel aut bis. Plus verò ad præsens iuuat farina hordeacea. Ad iungendum tamē aliquid vel acen, vel vini. At postquam securis, & pus evacuaueris, canendum est deinceps, ne oleū aut aqua imponas. Quod si quando vulnus abluere oporteat, melicrato, vel oxycrato, & vino, & multo est vitendū. Superponendum verò, si adhuc inflammel, ex lente cataplasma. Si verò absque inflammatione fuerit, aliquid ex his medicamentis, quæ emplastica nominantur, & præcipue quod ex chalcide cōstat. Imponenda autē super hæc extrinsecus, spongia, aut lana vino acerbio infusa: ad quæ quidem opportunū est, quod aqua marinū recipitur. Vulneri autē, nullum ex pinguibus medicamentis est admoendum: quandoquidē exquisitē exiccare expedit. Ac sic facile sanare oportet inflammationes ex fluxione ortas. Quæ verò alia de causa sūt, humectare cal faceret, nihil prohibet. Quas quidē si perducere ad suppuracionē volueris, cataplasma ex farina trinita, quæ in oleo & aqua ebullierit, est apponendū. Quod si quando scarificare oporteat, ne hoc quidē vitendū est. Si verò eas quæ ex fluxionibus sunt inflammationes scarificaueris, magnū adferes malū, ac per inima præsteris. Quæcumque autē ex ipsis, iam inveterate existētes, post totius corporis evacuationē, quasdam durities atque nigrities retinent, ab his per scarificacionē sanguinē auferre nil phibet: & emplastrū ex farina hordeacea, & ceratum, & aliud aliquid medicamentum ex discutientibus admovent. Non tamen

Refluxus huiusmodi humoris efficitur in vitæ vlcus, cum influit in emplastum.

Genus inflammationis dolorum non quædam loca, hyeme autem frigida, ætate autem admodum frigida.

Repercutiuntur efficitur applicanda paulo supra partem parietis.

Fluxiones depuranda quæ medicamenta in venis.

Vlcus autem patitur, quod sit abluendum.

Suppuratio inflammationis conueniens causam esse et feruorem trahere, quæ in oleo et aqua bullire.

Influxum quædam scarificanda.

ex vena in talibus sanguis necessarîo mittendus est: sed ventrem tantummodo expurgare sufficit, medicamine quod bilem flauam educat: vel solo clysteri acris affectus ipse sit parvus. Quæ verò ex viceribus sunt erysipelata, & quæcunque adeo manifestas causas sortiuntur, si statim volueris cataplasma apponere ex farina hordeacea, & præsertim si ante scarificaueris, nihil nocebis. At inflammationibus quæ cum erysipelate sunt coniunctæ, & erysipelatis cum inflammatione, adhibenda mista curatio est: semperq; illi, quod magis præpolet, resistendū. Herpetes autem, quantum ad totius corporis evacuationem attinet, vt erysipelata curare oportet: quantum verò ad eam quæ patienti debetur particulæ, nō omnibus similis cura adhibetur. Nam qui exedentes sunt, refrigerata quidem desiderant, quemadmodum alij herpetes, & erysipelata: nō tamē ea ferunt medicamenta, quæ præter id quod refrigerant, humectare etiā sunt apta: sed sola admittunt refrigerata, quæ maximè exsiccare possunt. Quare superimponere ipsis oportet, ab initio quidē ex vite capreolos, & solia rubi, & rubi canini, & plantaginis. Post hæc verò & lentē adungere oportet, & aliquando mel, & hordeaceam farinam, quodq; antea scripsimus ad inflammationes quæ ex fluxione eueniūt cataplasma, dempto ab eo semper uiuo. Ipsas verò partes exviceratas in vngre medicamentis, quæ ad herpetas in pharmacæuticis libris descripti sunt: quæ quidē, vbi vti volueris, ex vino dulci, aut tenui & albo, & subaustero, minimè tamen acri, liquefacere oportet. Quod si posca aquosa vice horū aliquando vñs fueris, nihil deterius feceris. At in longum tēpus protrahis viceribus, ad id vina sufficenter austera cōueniunt: præcipuè verò nigra. Quo tempore ipsis etiā medicamēta congruūt, quæ ad Polyidam, Pasionem, Musam, & Androem relata sūt. Herpetas verò qui summa tantummodo exvicerat, nisi diu perdurauerint, nullo horum in vngere oportet (advrunt enim fortiter, & vehementer exiccat) verūm illis sufficiunt, quæcunque vim glauci habent medicamenta. Quæ quidem aqua diluenda sunt, vel aceto, si nil ex aqua profecerint. Quod si etiā solani succo in tinxeris, vel arnoglossa, plus etiā cōferes. In summa verò, omne vlcus exiccati possit, idq; medicamento neutiquā irritante, nisi vbi malignum, putrilaginosumq; ipsum vlcus fuerit. Talia liquidum, acriora medicamina postulant, & quæ igneas vires possideant: quale est misy, chalcitis, arsenicum, calx, atq; san daracha. Sepe verò vbi illa cesserint, admoenemus ignē. Eadē ratione vocatis carbonibus, super ipsam crustam, huiusmodi medicamentorū est natura cōueniēs. Nō tamen loca circumiacentia tangere expedit, alioqui dissolues ea, exvicerans quæ minimè expedit. Sed Androois trochisci potius vtendi est. Si quando verò invaleret rubor, plurimiq; inflammatio, medicamentū ipsum doli diluendum est, vel succo plantaginis: quem admodū si magnus tumor simul infestet, vino quidem acerbo in principio, postmodum verò & aceto. Cataplasma eōam ex orobi farina & oxychymē confectum, est appoendum: atq; ante hæc omnia,

statim ab initio tantum sanguinis auferendum, quantum sit satis, nisi quid aliud prohibuerit. Hæc itaq; sunt passioñū per genera curationes, quæ pro naturæ instrumentorū pancum varietate mutantur. Quatuor autē ab his indicationes sumuntur: ab eorum nempe temperē, à formatione, à situ, ac deniq; à facultate. Oportetq; in curationibus intentionem habere ad membri naturam: hæc enim, quovisq; infrigidandū, aut exicandū sit, docet. Nam si carnosæ partes inflammationē patiuntur, paulum sunt exicandæ. Venosæ quoq; quamvis sint carnosæ longē sicciores, nō tamen & ipse multū exsiccare desiderant. Sed quæcunq; natura arteriosæ sunt, magis venosæ sunt exicandæ: atq; his amplius nervosæ: & multo magis cartilaginosa, ossisq;. Etenim priusq; ad propriā naturæ particulæ redeat, nondum curationi est impostus finis. Porro sicciorē temperaturam in ducunt, quæ fiscalissima sunt: & frigidiorē, quæ frigidissima, & secūdum alias qualitates eodem modo. Ad mediocrē verò habitum referūt, quæ sunt in vnaquaq; mediocritia. Ac sic sanē partium temperaturæ, curationes affectuum variant. At formationes hoc modo. Nam quedam intra sese habent cautes: quedam extrinsecus, quedam vtrobiq; quedā neutra in parte. Quæ igitur neutra ex parte cautes possident, in quas fluxio recipi possit, eas partes forter exiccare oportet, vel si nō fuerint natura sicciores: vt n. eruo, & præcipuè qui in artubus sunt. At quæ in rus & extrā relaxare aliquid possunt inflammationis, nō multum huiusmodi forter exicantibus egent: si præsertim laxam carnē habuerint, quemadmodū pulmo. Indicatio autē ex positis, loca per quæ sit vacuum, & quo pacto, demonstrat. Fluentum ergo humorum, reuulsio medela est: deriuatio autē, eorum quæ iam obfederint membrum. Vtrūq; autem evacuationis genus per cōmunes venas molendum est. Siquidem à matrice reuelles, si eam quæ in cubito est, venā secueris: aut à iuxta mamillas curcubitis admoueris: vel manus cōcalfeceris, fricueris, d. eligaueris. Deriuabis autē, si eas quæ in poplitibus sunt, aut in talis, venas diuiseris, & feminibus curcubitis admoueris, & crura calfeceris, perficaueris, atq; vinculo exceperis. Et si quidem in parte dextra matricis ipse affectus consistat, à dextra manu, vel crure, sanguis est detrahendus. Sin verò in sinistra, à membris quæ illi è directo sunt. Ceterum iustiores venas tūc incidere oportet, quod vicinores, magisq; è directo sint pauciores membra. Similiter si liene inflammatione sanguinē vis detralire, in teriores in manu sinistra venas secato: vt si hepate, eadē ratione in dextra. Si quid verò ex superioribus inflammationē patiatur, veluti in ophthalmia, & angina, in ceterisq; infestis caput, eas quæ extrinsecus sunt, atque è directo, pertrahito. Si verò artus patiant, à coniugatis membris sanguis detrahendus est, siue reuelles, siue deriuare sit animus: præterq; vbi passio fuerit in veterata: tūc quippe à membro ipso patiente detrahimus. Sic ergo in angina eas quæ sub lingua sunt venas incidimus, vbi totum corpus vacuum cum sit, * producit ipse affectus. Sic

Indicationes
quatuor sunt
ab affectu partium,

Natura partis
affecta quid in
ducit.
Porro inflam-
mationem quan-
tam magis, &
que minus sint
exicandæ.

Temperaturæ
partis, curationi
aut affectui va-
riant.

Formationes
particularum
quomodo cura-
tiones variant.

Sicut partis af-
fectus quæ indi-
cationem exhibeat.

Reuulsio est fluxio
entis humoris
medela: deri-
uatio, entis qui
iam obfederit
partem.

Reuulsio et de-
rivationis quib. fiat
modus.

Liens inflama-
tus, iustiores in
sinistra manu
venas secandas
esse: vt in dexte-
ra, si hepate af-
fectum fuerit.
Superius parti-
bus inflatis, et
externas vinas
directas esse in-
candam esse.
Artubus infla-
tatis, à coniuga-
tis membris
sanguinem
trahendum
esse: passio
fuerit in veterata.

*Scarificatione
quando riteo-
dam.*

*Vacuaria
quem modum
singula parti
debeant.*

*Alia recondi-
ti affectus va-
lentiora medi-
camenta exi-
guant. quam si
in superficie co-
hsuerint.*

*Ventriculo sto-
machique affe-
ctu, solo talia
exhibentur, qua
lia ab affec-
tibus exiguntur.*

*Partium diffe-
rentia.*

*Principia san-
guinis vniu-
erfo corpori sunt,
hepar, cor, cere-
bra atq. iugla.*

aliud quodcumq; membrum affectum scarifica-
mus, si non amplius humores influant (tunc e-
nim magis irritaueris, ipsiq; duplicaueris ma-
lum) verum vbi vniuersum corpus iam expurga-
tum fuerit, nec quicq; praetera influat, sed quod
prius influxerat, iam haeret in membro impa-
ctum. Et quidem laborantibus convexis hepa-
tis partibus, quod per vrinam trahere oporteat
concauis autē, per subductionē alui, situs ipsius
visceris indicat. Atque etiam thoracem, pulmo-
nemq; per rilles expurgari debere: venterum &
& stomachum, per vniuersum intestina per de-
fectiones: quemadmodum per vnnas, & splenem,
& renes: matricem autē, per menstrua: cerebrum
atq; eius membranas, per palatū, gargareonem,
nares & aures. Sed & quod his quae in superficie
sunt partibus, talia medicamēta apponere opor-
teat, quolibet eget passio: ut autem quae in pro-
fundum sunt sit, & quas per multa interpolata de-
bent eorum virtutes attingere, non qualia nunc
sunt, sed qualia futura sint, ex sita membrorum
agnoscimus. Tantum quippe aduentū robori-
s adiungere oportet medicamentis, quamvis
in transitu exoluitur: vt quod relinquere, nequa-
le remaneat ei, quod tacta iuuat. Ob id igitur in
thoracis inflammationibus, quae in superficie
constitunt, ea quae solum laxare possunt, suffi-
ciunt: intrinsecus autem, sicut in costis cingen-
tis membrana, requiruntur aciora. In vniuerso
autem visceribus eadem habenda est ratio. Scir-
pius enim ex medicamentis impositis viceratur
cutis, quamvis durius, minusque ad patiendum
habilis sit, quam viscera. Quod si ipsis visceri-
bus medicamenta applicare possemus, quibus
frequenter indigent, tantō molliora oportere
esse, quāto ipsorum natura, vt afficiatur, est prom-
ptior. Quia verō hoc nequaquam nobis datur,
ob id aimirum, quae eduntur ac bibuntur medi-
camenta, conferentia affectibus viscerū, ea mul-
tō aciora & potentiora esse cōueniunt, quibus
indigent ipsae partes affectae: exceptis tamen il-
lis, quae ventriculo stomachoq; auxiliantur. Hic
siquidem sola talia exhibentur, qualia a passio-
nibus exiguntur. Reliqua verō omnia, aciora
& fortiora sunt, & praesertim quae vel renem, vel
pulmonis occasione sumuntur. Sed indicatio quae
ei facultate sumitur, etiam curationem immutat.
Nam ex partibus corporis nonnullae ab influen-
tibus virtutibus gubernantur, quaedam verō si
propriis atq; natuis. Atq; ex his ipsis, quaedam si
biipfis duntaxat, quaedam etiam aliis fons & ori-
go sunt facultatum. Et aliae quidem opus pecu-
liare habent, aliae autem cōmune. Permutare ita-
que opus est curationis formam, pro ratione ha-
rum omnium differentiarum. Nam praeterque ex
remediis dictis, morbum quidem finitur, sed na-
tuas membrorū facultates offendunt: quae quid-
em offensus ad totū pervenit corpus, idēq; rati-
one dupliciter vel quia membrum est alicuius vir-
tutis origo, omnibus partibus cōmunicant: vel
quia ipsius opus vniuerso corpori est vtile. Bre-
uim hepar, cor, cerebrum, atq; testes, cōmuniter
vniuerso corpori principia sunt facultatum. At
ventriculo matricēq; proprias facultates insunt,
nulli alteri parti cōmunes. Opus tamen ventris

quidem toti corpori confert, matricis autem ne-
quaquam. Quae igitur immodice laxant, exol-
uunt robur, quare & facultatem particulā. Quae
autem supra modum refrigerant, natium calo-
rem extinguunt, qui fortassis substantia faculta-
tum exiit, aut certe primū & maxime necessā-
rium instrumentū ipsarum. Nonnullae etiam aliae
qualescunt * immoderate, facultates exoluere
possunt. Ad hanc autem indicationē, quilibet
reterre posset & facilem & difficile sensum. Ete-
nim quae facile sentiūt partes, acia medicamen-
ta non tolerant, sicut neque acres humores. Ob
idq; os ventriculi, atq; eo magis oculus, infesta-
tur ab erodentibus medicamentis. At quae sen-
sum obtusum habent, caraplasmata grauius susti-
nent, atq; medicamenta mordacia. Qui igitur se-
cundum solam, nudamq; intemperiem atq; hu-
morum affluxum sunt morbi, per contrarias qua-
litates curantur: vt (exempli gratia) calida intem-
peries, per refrigerantia, siue primū, siue ex acci-
denti refrigerent. Perfusio siquidem frigida, cal-
facit ex accidenti, vbi caloris reuocationem fece-
rit: calidumq; refrigerat, vbi calor em naturalem
discussit. At quae ob materiae influxum labo-
rant, si quidem fuerint optimē temperata, solam
evacuationem desiderant: si verō distemperata
sint, vna cum evacuatione, per contrarias qua-
litates alterationem possunt. Sed iam dicamus
de oedemate.

De oedemate. Cap. III.

Oedema est mollis quidam tumor, atq; dolo-
ris expertus, ex pituitosa substantia, vel spiritu va-
poroso ortus: qualis in cadaueribus, & pedibus
hydropicorum & tibi dorsū plerumq; cernitur. In
hūc tamen morbus oedema symptoma est, pro-
pria curatione nō indigens. Sola quippe frigus
ex oxyrhodino, aut ex sale & oleo, compellit
ipsum. Cū verō propter influxum pituitae in ali-
quam partem gignitur is affectus, spongia re-
centi, imbura oxycrato, quod possit bibi, eum
sedat. Quod si ex his non discutatur oedema, a-
luminis parum est adiciendum. Si verō in ali-
quo artuum tale fuerit oedema, inchoanda liga-
tura est ab imis partibus, sinuenda verō in aliis
partibus: vniuersam mictionē & compressionem
facientibus nobis, veluti in fracturis. Quod si
morbus dictis remediis non cedat, aliquid for-
norum medicaminū adicere oportet, cui discuti-
endi simul & contrahendi facultas insit.

De scirrhus. Cap. IIII.

Exquisitus scirrhus est tumor praeter naturā,
insensatus durisque. Non exquisitus verō, non
omnino insensibilis est, diffculter tamen omni-
no sentit. Porro insensibilis scirrhus minime cu-
rationem recipit, Qui verō cum diffcultate sen-
tit, nec incurabilis est, nec facilem curationem
admitit. Fit autem ex humore viscido & crasso
& tenacissimē partib. indurans in fixo. Scirrhus
itaq; interdum ab initio concreuit, atq; auge-
tur paulatim. Crebrius verō in scitria medicorum pa-
ratur, vbi vehementer erysipelata & inflamma-
tiones altius gubul refrigerantque. Quod si quis
fortiter discutienda indurans medicamenta ad-
hibeat, digerit quidem tenuiora: quod verō reli-
quū est cōpactum, lapidis instat, relinquat non
igitur

*Lexilia immo-
diū, exoluant
robur, atq; fa-
cultatem parti-
cula.*

*Oculus natium
quod.*

*Sensu acutissi-
mo praedita, a-
cra medicamen-
ta non tolerat,
vt ea quae sen-
sum obtusum ex-
olunt.*

*Intemperat
simplici per cito-
rius qualitate
curantur.*

*Frigida profu-
so calfacit ex
accidenti.*

*Calidum ex ac-
cidenti refrigerat.*

Oedema quid.

*Oedema in qui-
bus symptoma
existit.*

*Oedematis ex
influxu artu, co-
ratur.*

Scirrhus quid.

*Scirrhus insen-
sibilis, immo: cu-
rationē recipit.*

*Scirrhus mole
concreuit.*

*Scirrhus quod-
dam ob inopel
rationē cōtra-
tur.*

pore, ad ea quæ cōcoquendi, suppurandiq; vim habere dicuntur, trāsserri oportet. Stant igitur aqua abyndani in qua fuerint decoctæ altheæ radices, perfundere, atq; oleo calido partem inflammaram conspergere, necnon ex farina triticea, quæ in aqua & oleo moderatè ebullierit, cataplasma imponere oportet. Si aut suppuratiōnem prohibere sit animus, panē in oleo & aqua plurimum ebullire permittito, postea vērō subi-
gens admovento. Sit tamē aquæ ad oleū propor-
tio multiplex. Pius aut quā hōc suppuratiōnē
prohibet hordeacea farina, similiter preparata.
Si verō per summā cutis in parte inflāmata ten-
sio valida fuerit, multis ac mediocribus scarifi-
cationibus in superficie incidere oportet: ac post-
modū ex farina hordeacea (vt diximus) & elaxata,
cataplasma apponere. Ceterū in quib. difficul-
tat ad suppuratiōnē pervenit, nec facili discuti
tumor potest, sed suspicio est humores cras-
siores & tenaciores ibi impatiētes existere: in iis tan-
tis dispositiōnib. convenit ea quæ sit per pro-
fundiores scarificationes curatio. Convenit et-
iam id quod ex caricis pinguibus, dulcibusq; &
decoctis, cōsistit cataplasma. Quārū sinē deco-
cto, aliquando hordeaceæ farinam adiciamus:
aliquando panē syncōmistiū, hoc est, miscella-
neum, sed quā ex generoso cōcoctis sit tritico.
Porro farina triticea maximē ad suppuratiōnē
promouet: hordeacea verō resolut plurimum.
Si igitur resoluatur tumor, minus tamen quā
opres, cum caricis hysopum et organum simul
coquere oportet. Quod si vehemēns exicare
torem volueris, sal decoctiōni adicias: dein
farinā hordeaceā, detractō prius fursure, insper-
ge: & postquā plurimū ebullierit, appoe cata-
plasma. Si veteraris ne tumoris reliquæ in scri-
tum durescit (quod cōtingit, vbi quis fortiter
exiccat. vtiur) radicē agrestis cucumeris, aut
bryoniæ, aut asari, in aqua decoque: sæpius qui-
dem per se solas, nōnquā quæ caricas pingues ad-
iciens. Deinde aquæ farinam admisce, iniiciens
aliquid adipis anserini, vel gallinacē, vel etiam
suili. Ex dem quosq; radices, atq; etiam quæ pro-
ducit altheā, si post moderatū decoctiōnē cum
pane & adipē cōfunditur, huiusmodi discutiū-
t tumores. Fortior aut hūc omnis est dracō-
niradix. Verū fortiter resoluentibus medica-
mentis semper sunt miscenda emollientia, ne tu-
mores ipsi in pertinaces scirrhus degreant.

De tumore suppurato. Cap. vii.

Porro vbi suppuratū tumorē amissa spes est,
ex farina triticea viere cataplasmat. Dein ve-
rō postq̃ suppurata secueris, si videris ea q̃ circa
sectiōnē sunt omnino ab inflāmatione libera,
emplastica medicamēta vtiur, sed quibus ex-
candi resoluendiq; citra mōrsum facultas insit.
Eiquidē sæpius in huiusmodi vīus sum medica-
mentū ex fermenō & ostreis cōbustis cōfecto. Si
verō pars aliqua circa sectiōnē iostāmata videat-
ur, quod ex chalcidi cōstitit, liquabis oleo: atq;
vbi sensim refrigeratū fuerit, infundens vinū, in
mortario emolles & subiges, ac deniq; vīui ac-
commodabis. Vbi verō cutis per suppuratiōnem
plus q̃ par sit, colliquata & veluti lacerata fue-
rit, nō facili subiectis corporib. agglutinat: qua-

re necessū est vt p lincinia laniora vulnus ipsum
curetur. De sinu. Cap. viii.

Sin autem amplius agglutinandum cum subie-
ctis partibus creuerit difficultas (qui sanāse
ctus vocatur sinus) satius est fistulā darecē per-
foratā, vel ex gre, vel ex cornu factam: habere in
promptu: aut etiā aliquod ex iis instrumētis, qui-
bus pus extrahi cōsuevit, quod foramē latissimū
habeat: ac per id, exiguū medicamenti nō
stri, qd ex charta cōbusta cōstat, liquatū oleo ro-
saceo in ipsum sinū infundere: ac deniq; linamē-
to cōcepto, ipsius os claudere. Ceterū quæ sic li-
quantur medicamēta, oportet vt sint acriora, q̃
quæ linamētis excepta illinunt: qualia nimirum
sunt quæ omnib. sunt io vīa, colore viridi. Nam
cum hęc ipsa oleo rosaceo nō pauco solvere ex-
pediat, vt iniici possint in sinū, necessariū certē
ipsorum virtus exoluit. Quæcumq; igitur medi-
camenta exquisitē emplastica, quale est Machæ-
ronis, Epigoni, & quod līs cognominat, vbi
ad emmōtorū vīum perducunt, ceram indigēt
ad mīstione, eadē etiam ad curandos sinus sunt
cōmoda. Si quidem quia ratione ipsi ceratū mī-
scerit (sempe quod vires mordaces haberent,
si per se sola liquecerēt) eadem sunt ad sinus vti-
lia. Vbi verō sinus mediocriter fuerit oppletus
carne, tunc agglutinantia medicamēta appone-
re oportet: veluti si recti, & sanguinolenti vul-
neri medicarieris. Sciendum autē est interim, om-
nia metallica medicamenta subtiliorū partiū ex-
stere: fortiorū maiorē vim exiccandi, vbi pluri-
culum ebullierint. Quāto verō subtiliora medica-
menta fuerint, habuerintq; maiorē vim exiccan-
di, tanto plus in sinū operabunt. Porro cum ad
superiorē locū ipse sūs extenditur, facile per
os humor vinatus elabitur. Si verō ad ima decli-
net, cum retineatur intus, partem aliquam cōbu-
nctam erodit. Quare in huiusmodi sinibus, ni-
si prius ad effluxum sectiōnē feceris, nihil profici-
cies, nec cum cariem gignere, nec cum agglu-
tinare volueris. In aliis verō oō est opus sectiōne,
si modō cōuenientem figuram in patiente parte
seruaueris. Ex qua figura potes aliquid dō sinum
ad partem superiorē vergentē, facere vt deorsum
inclinet: sicut & vergentem ad ima, conuer-
tere ad superiora. Adverte autem melicratū esse
aptum ad conglutinandas penitiores ipsius si-
nus particulas. Post cuius vīum, prius quā aliud
glutinans medicamen adhibeas, aliquan-
do vino solo, aliquando vino mīsto, ipsum so-
leo sinum abluere. Etenim ad abstergendū, ex-
purgandūq; adherentem saniem, melicratum
est præsantius: ad cōglutinandum verō, vinum
est melius, & efficacius: præcipue quod in me-
dio dulcis & asiteri cōsistit. Et quidem post me-
dicamenti agglutinantis appositionem, spon-
gia recens ex mīsto, aut vino, circumiciatur,
quā mollissimē fieri possit. Arque alligatio quā-
dem incipiat a fundo sinus: desinat autē ad os.
Liorcorum verō circumductionses constringant
quidem in fundo sinus, sed non ita vt dolo-
rem inferant: paulatim autem laxentur, vsq; ad
os sinus: quod quidem habere laxam alligatio-
nem, emplastrūq; quod ei extrinsecus admo-
nueatur, adeo discissum forficibus, vt ex ore ipso,
humores

Scarificationes
profundiores
quando conue-
niant.

Emplastrū ex
caricis.

Farina triticea
quidem, maxi-
mē ad suppurā-
tione promouet:
hordeacea verō
resolut.

Tumorē in scri-
tum abstrahi
curatio.

Dissectiōnibus
fortiter, cur sine
perforat mīstis
de resoluente

Tumorē suppu-
rati curatio.

Sinus quid.
Sinus curatio.

Medicamentū ex
charta cōbusta.

Sinus curatio
vbi moderatū
mīstis quæ sunt.

Metallica me-
dicamenta fortis
vim exic-
candi, vbi plu-
culum ebulli-
erint.

Effluxus parti
esse faciendum
sectiōnē optā.

Melicratum qd
est aqua sine d
glutinanda.

Sinus quid
abstrahi de vīo
no.
Vini sine d
glutinanda.

Sinus quid
delegandus.

humores vitiosi, si qui excernuntur à sinu, facile effluere possint, paruo aliquo alio ipsi imposito emplastro, usq; ad solutionē: quam tertia quaq; die faciēs, auferēs hoc ipsum, quod veluti operculum haeret: id quod per totū sinū circumiectū est medicamentū relinquēs. Iam verò ex quantitate, & qualitate emanantis humoris, præterea ex dolore, vel indolētia, tumore, vel depressione partis affectæ, cognosces num pars ipsius sinus profunda sit probe conglutinata. Siquidē si

Sinus glutinosus cum sit ex quibus signis colligi possit.

Medicamenta sinui circumnectenda, esse debent vehemens siccatia.

Cavitas lacera in abscessibus medicata.

neg in ipso sinu dolor sentiatur, neg tumor appareat, sed totus locus depressus, siccus, atq; ex parte doloris exsistat, viderisq; ad osculū pus ex alē concoctū, necnō quantitate paucū, bene sperandum est de sinu glunatione. Si autē contraria te ostendat, non dū sinūs cōglutinatur. Sit verò medicamentū quod circūlinatur sinui, vehementer siccans, citra tamē mordacitatem: quale virg nostrum exsistit, sine cera confectū ex metallicis medicamentis elixatis, & oleo cicino, & acetorum: quod iuniorū vulnera cruenta cum conglutinatur, sinūque sine molestia facit, si lixiuo prius sordes ablute fuerint. Porro vbi qui abscesserūt tumores tardē sedati fuerint, cutis ipsa admodū extenuatur, reddaturq; laxa et vestī permissilis. Quo tempore veni dum medicamentis est, subtilia, nam quidem humidis, potētia autē siccis: quale est quod cōstat ex lithargyro, & sulfo adipe antiquo, & chalcidē, quib. additū sit vetustissimū oleum. Confert etiam in lacera cute non munia meli, si ysis ad consentitū emplastrū elixetur. Satis tamen fuerit ei myrrham subtiliter tritam, aut aloē, aut thias, aut aliquod ex his, vel omnia simul aspergere, tum præcipue, cū linteo inunctum humidius appareat. Vius etiā sum aliquando & tenui centaurio, qd mirū est ad eiusmodi medicamē. Post ipsum verò & symplectū vtile est: deinde treos lilyncē ta dix. Postea farina ex orobis: omnia hæc & per citrū subtile transmissa, & inpersa meli, dum ab igne amouetur.

De gangrenar. Cap. x.

Nunc verò oportuum videtur de gangrenis aliquid dicere. Sic enim vocant mortificationes eas, quæ ex magnitudine inflammationum sunt, non dum tamen absolute sunt factæ. Erenim cum ita membrum effectum est mortuum, vt nec punctio, nec sectio, nec etiam vitio nent sentiat, statim ipsum recidere oportet, quā vicinam sanam partem attingit. Ceterum quod sic afficitur, denigratur. Quod verò in medio consistit vt ad mortem proficiat, appellatur gangrena. Curatur autem, evacuandibus quidem nobis plurimū sanguinibus, qui in patente membro compinguntur (cuius causa mortificationes sunt) reliquo autem, exhibentibus transpirationē. Igitur autem cutem vniuersam multia sectionibus profundis secare oportet, vna cum subiecta substantia: aut plurimis scarificationibus profunda incidere. Vbi verò sanguinem effluere permiseris, imponendū aliquid medicamentū est, ex his quæ ad putrescentiam conducunt: cuiusmodi est ex oxymelite farina orobi, lolive. Si verò talia non adsint, fabarū farinā adhibe, atq; ipsum oxymel solui. Quod si fortius medicamentū apponere vis, adice sal, aut ex trochi-

Glycena quid

Membrum mortificatum, quatenus sit abstinendum.

Gangrena curatur.

Putrescentiam apta medicamenta quæ.

scis aliquē exquisitissimē tritum, qualis Andronis, & Polydri, & Psionis, & Musæ exsistit. Verum qui duras natura carnes fornūt, q fortissima medicamēta desiderant: mollia verò, qui teneras. Ad maiorem autem securitatem, quando absconditū aut circumcidit id quod iam putruit, satius est ipsius mali radicē, parti sanæ coniunctā, advertere, vti sapius cōsuevimus in pudendis facere, nōnunq; ipsius affectus partibus ad mouentes cauteria, nōnunq; linamentū interponentes. Facta verò adfusione, solemus vti succo porri, aut, si le non adit, recitatis trochiscis: ad detrahendam autē crustam, medicamentū dicto Cephalico, ex melle vtere: aut pane ex hydreleo decocto. Lauat etiā hordeacea farina simpliciter præparata, aut cum ipsa triticea mista, illatq;. Præterea tetrapharmacum, & Macedonicum nominatū sunt crustarum suppurationibus, atq; earū excellentiis acerbissimis: & quæcumq; vim habent perducendi ad suppurationē. Panis etiam cum apio, vel ocymo tusus, optimē crustas dirumpit, & à sanis partibus eximit. Ex simplicibus, autem medicamentis, iris, vel radix panacis, vel anisodolux, vel acori ex melle. In mollibus verò corporib. sat est farina orobi, cum melle, vel thure. Auster etiam crustas Machæronis medicamentum. Cū verò exciderit crusta, atq; huiusmodi vlcera idoneis medicamentis carne repleta fuerint, debet induci cicatrix.

De Cancro. Cap. x.

Carcinosi tumores in omnibus consueuerūt fieri corporis partibus, sed præcipue in mammilla mulierū, quæcumq; naturalis sua purgatione priuantur. Nam quandiu hæc, vt oportet, adfuerit, tū diu mulier integra sanitate hietur. Hi verò tumores omnes ex atra bilis recremento gignūt. Qui humor feci vinitatis similis, dum sanguis in hepate sit, ab splene expurgatur, cui est nimirū nutriendo. Cū igitur naturalis temperatura hunc humorē paucū genuerit, optimāq; victus ratio præcesserit, & ex ipso qui generatur, splenē abvnde satis attraxerit, nulla huiusmodi superfluitas coaceruatur in venis. Si vero contraria acciderit, tunc succus is melancholicus multiplicatur in venis, à quibus nonnunquam, facultate expellendi extranea præditis, per hæmorrhoidas excernitur. Sapius autem & ad varices decubit. Quandoq; ad eum vniuersam expellitur, vbi gignit elephantiasim. Est cū aliis corporis partibus, quæ cæteris imbecilliores sunt, humor iste decumbit. Quō tempore evidenter apparent quæ in loco affecto sunt venæ, crasso & nigro sanguine imbutæ. Qui quidem quāto crassior fuerit & nigrior, tanto deterior est passio. In mammillis autē sæpe vidimus tumore figura animali cancro per similes. Hunc igitur morbum per suam inna sæpe sanauimus, medicamentis quæ atram bilem educerent. Vbi verò in molem insignē attollit, curam sine chirurgia non potest. At scopus in huiusmodi curatione est, totū qui circumstat tumore præter naturā, quā partibus sanis adiret, abscondere: ob valorem tamen magnitudinem, præsertim si fuerit arte rix, plurimū sanguinis statim periculū imminet. Quod si liquis ipsa excipias, & per consensum

Adverū esse radit parvū in parvula.

Escharam quæ detrahant.

Caricini vbi ex quo humor generatur.

Atra bilis expurgatur à splene, quomodo alit.

Atra bilis quæ morbum excitat.

Cancro duplex curatur.

Cancro medicatio pericula.

efficient cōtinuè particulè. Si verò radices morbi exvire animus sit, neq; huic rei maximū periculum deest, si prope loca principalia insignis advitiō fiat. Porro in Alexandria plurimi, ob crasam victus rationē, atq; regionis feruorem, elephantiasis corripitur. At in Germania & Myſia, rarissima hæc passio videtur: & apud Scythias lætis potatores, nunq̃ ferè apparuit. Huic igitur morbo melancholici succi conferunt purgationes. Quod si ætas atque virtus permiserint, sanguis prius mittendus est. Sed neq; in cancro invtile est, vbi nihil prohibet, primò sanguinē mittere, ac dein purgare evocarēq; mēstrua, si sunt mulieres, nec attigerint quinquagesimū annū. Ipsi autē patienti particulè, succus solani imponat, vel medicamen ex pompholygē cōstans, quo vitor ad cancores exviceratos: vel etiam quod ex chalcinde fit, si copia illius nō detur. Quod pertinet ad victus rationē, succus ptisanæ abvndanter est exhibendus, & ferū lætis: at ex oleribus, malua, atriplex atq; blitum. Cucurbitis etiam, si

occalio ferat, vtendum, & piscibus saxatilibus, aubusq; omnibus, exceptis palustribus.

De elephantiasis. Cap. xi.

At is qui elephantiasim patitur, mirabile auxilium est viperarū esus. Quas quidē, vbi caput, caudamq; vique ad digitos quatuor abscideris, excoriatuſq; ac deniq; interanea exemeris, in olla prius ablutas coques, donec exquisitè molles reddant. Adicere tamen debes aquæ, in qua illæ elixantur, porro, anethumq; & olei nōnihil. Ipsum etiam medicamentū confectū ex vipera, confert in potu exhibitū, iis qui huiusmodi morbo laborant, vel cuti etiam illi. Porro ad sanandas strumas, optima sunt quæ astringerē & exsiccare, & pus etiam facere possunt. Ad meliceridas autē, quæ ipsas dissoluendi vim habent, & quæ pus discutiunt medicamenta. At verò curatio hydropi, ad has tres reducitur intentiones: vt sanemus durū tumore, quo viscus astringit: & apponamus ea quæ humiditatē dissoluant: & propter medicamenta quæ moueant vrinas.

Elephantiasis in Alexandria vulgaris plurimum.

Cancro exvicerati remedia.

Cancro vitæ ratiō cōstans.

Elephantiasis dicitur videri in Viperæ conuulsione.

Theriac de phlegmate cōfusa, astringit.

Hydropis curatio supra.

ILLVSTRISSIMO ET SAPIENTISSIMO VIRO,
D. D. IOANNI FVRTADO A MENDOZZA, A-
PVD VENETOS ORATORI CAESAREO LONGE DE-
guisimo, Andreas Lacuna Secobienſis, Doct. Med. miles
S. Petri S. D.



Ex maximā inopritudinis notam, aut declinare, aut eluere, semel iniustam, possem, vt illustriſſi, si ex lucubratiunculis meis, sub vmbra amplitudinis tuæ ad absolutionē perductis, portione aliquam tibi nō impertiret. Nam cum ex mercimoniis singulis, quæcunq; inter subditos Caesaris in hac Venetorū vrbe splendidissima cōtrahuntur, ad egeriū cōsulareſ virum Thomam Sornozzæm, vel Caesareo decreto, nōnihil frugis pertineat, quod perpetuò illi patrocinetur, eorūq; vniuersas lites cōponat: multò magis, mea quidem sententiā, rationi cōsentaneū videtur, vt optima quæq; ingenia, quibus cōiigit huc suos labores aduhere, ex meditationibus suis aliquod dignationis tuæ literariū etiā tributū pendant, à qua nimirū fountur, aluntur, locupletantur: cuiusq; in studiosos omnes patrociniū atq; benivolentia sum ipse omnium maximè expertum. Consiliū impresentiarū est præterire silentio immortales illas virtutes tuas, prudentiā, temperantiā, cōtinentiam, cōstantiam, animi magnitudinē, multiplicitatēq; doctrinā, quibus totus splendes: ne aut earū sublimi ac claudicante oratione nō assequar: aut relictari videri singulari modestia tuæ, quæ vt popularem semper auram cōtempſit, sic nihil magis exosum habet, quàm huiuscemodi encomia. Ampliſſimū quippe integratū tuæ, vel me tacente, argumētū est, quod CAROLVS V. Imp. præter expectatōnem vocaueris, vt in hac tam angustā Repub. vires suas pereres, grauissimāq; administrares negocia. Cum igitur minimè cōtemnēda artis medicæ pars, in vacuatiōne redūdantiū consistat: ac vacuatio quidem ipsa, partim per venæ sectionem, partim per purgantū pharmaci exhibitionem, partim per hirudines, cucurbitulas, atq; scarificationē solet administrari: haud ab re me scēturū exultauī, si Galeni tres cōmentarios de phlebotomia, quorū primo titulus est de venæ sectione aduersus Erasistratū: secundo, de sectione venæ aduersus Erasistratū eos Romæ degentes: tertio, de curandi ratione per venæ sectionē ac præterea alios tres, vnum de hirudinibus, cucurbitulis, & scarificatione: secundum, de purgantū medicamentorū facultatibus: tertium deniq; in quo docetur, quos nam purgare, & quando, qualibiq; medicamentū oporteat, offerrem amplitudini tuæ: hisq; etiā de luti aut ſtarni quoddam adiungere libellum de ptisana, consiliūq; à Galeno conscriptum puero cūda epilepsia laboranti. Quod ergo iam superesse videtur, nisi vt ipse, Pater obseruandis hosce octo cōmentarios, puſillos quidem, si chartularū tantū ratio habeatur, sed mortaliū vitæ admodum salutareſ, pigra quædam officij erga te mei, quam benigmissimè excipias, muneraq; tenuitateſ non aspērneris, memor eos qui thure carerent, fuisse olim diu mola salsa lare solitos. Vale, miſerū hōspitium ampliſſimum. Venetiis, ex ædibus tuis, III. Idus Aprilis, M. D. XLVIII.

GALE.

GALENI PERG. DE VENÆ SECTIÖNE ADVERsus ERASISTRATUM, lib.

YNNUS.



*Erastrotatus ne
monem quod
dem firmam
fieri de sangui-
ne detractione*

*Phlegmonas va-
cuam facillimè
promittimus;
per sanguinem
detractionem.
laudo vi eva-
cuant phlegmo-
nem, longè tem-
pus desiderant,
et aquam rui-
nosam curam
inaniunt.
laudo longè
que inveniunt
de phlegma super-
veniente.*

*laudo vacua-
re, sed longè ar-
pere. Et cum pe-
riculo.*

*Natura pluri-
mos morbos sel-
tè per curatio-
nem sanguinis.*

*Naturam non
esse impedi-
endam, sed inuen-
di, mox Hippo-
crati.*

Mhi quidem illud inquisitione quidli-
genissima dignum esse videtur, cur
nam Erasistratus, cum cetera que
ad artem spectant omnia, etiam mini-
ma quæque, sans superstitione tracta-
rit, de venæ tamē sectione, presentaneo illo vni-
cōq; remedio, & quod apud veteres fuit maximi
ponderis, ne minimū quidem, nisi obiter & per
tentionē, sermonē fecerit. Nam dum ait, in illam
manones (exempli gratia) q̄ vulneribus super-
veniant, vacuatione quæ per inelationem fit, esse cu-
randas, miror sane, quod auxilio expeditissimo
omisso, ad tardissimū, minimūq; rurū cōfugiat.
Ego verò, quandoquidē per inelationem nec-
cessaria vacuatio est (vel Erasistrati testimonio)
eam omnium facillimè promittissimūq; venæ se-
ctione perfici arbitror, vtpote per quam ipsas enī
phlegmonas solas, celeritē curare possumus:
cum & diuerso incedit, præterq; quod longū tem-
pus requirant, æqualiter enī vniuersum corpus
evacuatur, id quod certe nō est expediens: vt in-
terim alia reticemus incōmoda, que in edias* lō-
gas necessariū sequuntur: cuiusmodi sunt virtus
defatigata, ut cū baliosiores atq; amaruliores
effectus, morbus cordis frequētes, inquietudines,
deiectiones suppressæ, ac bi exiter, omnia recem-
ta* mordaciora & aciora redditā. Quorū
Erasistratus nihil animadvertens, ecorū more,
qui amplam cōpendiosissimq; & planam viam in
propinquo habentes, sæpenumero angustā, pro-
lixam, asperūq; errabundi inveniunt, & ipse pro-
pinquam admodū, satisq; expeditā & amānā se-
mitā aspernatus, ad impediri illam, habebrosam,
& longam se cōsulit: quippe qui hoc tantū con-
siderauerit, num quō ipse contendit, viā eo ver-
gat: nō autē, an cōpendiosē, & sine periculo du-
cat. Nam quod vbi inedia ad plenitudinem vacua-
tionem cōferat, ego nō eo inicias: verū lōgo
tempore, magnūq; cum nocumento, eam elice-
re id profiteor. Iam verò cum Erasistratus per-
petuū admiretur naturā, cū artificiosam, provi-
damq; animalū gubernatricem, vbi quā tamē
eam imitatur. Aut cur illā plurimīs morbis san-
guinis evacuatione non medetur? cernens, ne in vno
quidem, ipse tali præsidio vitur? Itaq; mihi aut
modis omnibus demēs, aut in naturæ operibus
quāvis imē veritas esse videtur. At omnium bono-
rum, quæ ad medicam artem spectant, nobis
autor Hippocrates, nos monet accuratissimē (id
quod etiam Erasistratus nos monere debuisse)
vt quandoq; natura foris atq; vegeta existēs, se-
se ad crism accingit, nō perturbemus quidē mo-
tum ipsius, perficiamus autem ea, quæ superata
morbofarū causā viliementia, nō potest ad in-
tegritatē perducere. Quæ iudicatur, & indicata
sunt (inquit) integrē, nec mouere, nec onare,
sed finire. Illud quidē habet propriū naturæ in-
tegrē mouentis præceptū. Quod verò luic suc-
cedit, naturæ & ipsius, verū diminutū ad crism
mouenti congruit: eamq; ob rem vt illi simus au-
xilium iubens, ait: Quæ ducere oportet, hæc quō

maximē natura vergit, p loca cōferentia, ducen-
da sunt. Natura siquidē tum temporis expellere
adversū conatur: cū autē præ imbecillitate
imponere operi suū nō possit, auxiliū nostrum
implorat. Propterea enī laborantes dolor & late-
ris, iugulū affligentes, aut regionē que supra præ-
cordia est, secta interna cubiti venā dicit esse va-
cuandos. Vbi verò dolor sub septo transverso
fuerit, vt subdual alius vel nigro veratro, vel
peplio, cōsultat. Similiter in quopli tenū affectu,
venam quæ in poplite est, incidendam censet.
Idem enī Marge tamulam, cui ob contortū ad
vertebras coarctatū, vteri purgatio suppressa e-
rat post partum, atq; inde grauis dolor secutus,
restituit, venam prope malleolū secans: quæ tū
mores totū corpus iam occupassent. Sed neq; ex
his qui rationalem empiricūq; sectam amplecti
sunt, quisquā ad venæ sectionē abstinuit. Vt autē
naturæ opera producamus, an nō ipsa cunctas
mulieres singulis mensibus, quod ob ignauā &
ociū, multitudinē humorū coarctatē, superfluo
sanguine evacuat? An nō etiam idem post partū
molitur, quæ futura ipsa quædam species vacua-
tionis existat? Ad hæc verò, postquam fuerit
aditus est in lucem, lactis generatio in mamillis
non parua & ipsa evacuatio plenitudinē existit.
Vna quidē & lactis & mensitiorum substantia
est: amborumq; (vt quispiam dixerit) tuorū
fontes cōmunes, sunt venæ. Quamobrem qui-
buscūq; per artem menses fluere cessant, ut
neq; in mamillis lac amplius gignitur. Quæcūq;
etiam purgandi tempora adhiuc habent, atq; in-
terea lactant, ex nō purgantur. Præterea cum la-
ctant mulieri sanguis per locos erumpit, illic
huic lac evanescit. Insuper quæ animalia non ge-
runt vtero, his neq; lac vquam adit: rursum qui-
bus id suppetit, illa enī ad cōcipiendum idonea
sunt. Porro si mulier per excretionē illam men-
struū probē expurgat, nec podagris, nec articu-
lorum doloribus, nec pleuride, nec peripneumonia,
nec aliis deniq; ex plenitudine affectib; infestatib;
At mēstruis retentis, eam cuiuslibet malo
implicari facillē est: huicq; rursum evacuatio-
nes medent. Ex hominibus enī, quibuscūq; pro
consuetudine superflua per hæmorrhoides vacu-
ant, q̄ omnes vitā morbis minimē impediant
agūt: quibus item supprimunt inanitiones, hi in
perniciossima quæq; labiunt. Ac proinde cum
vel in tremorē, vel in hydropem, vel in aliū af-
fectum frigidum, mas quidem ob hæmorrhoidū,
mulier verò ob mēstrui retentionem, inq; dicit,
Hippocrates cōmendat mēstrui evacuationē san-
guinis, per cōvenientia loca, cū nimis cōtra-
norum contraria remedia existāt. Natura quip-
pe (quā ille vt imitatur) inedia adiectione, re-
pletiones evacuationibus, frigus calfactioni-
bus, calorēq; refrigerationibus curat. Nam (vt
alia multa subnectam naturæ miracula) frequen-
ter cōspiciantem sese provocantem ad vomitu-
rum. Vidi & aem Egyptiam, quæ clystū imi-
tabatur. Grues enī, a quilibet, prælongo vsq; ad
vltimos terrarū fines volata, partim frigus, par-
tim æstus virantes, quō cōtraria cōtrariis pro-
pulsent, videre licet. Sectio itaq; venæ (vt ed
vnde digesta est, nostra reuocetur oratio) ob

*Plurima quo-
modo sui rati-
ocandi ex do-
ctrina Hippo-
crati.*

*Mēstrua cū
molestis, pro-
fusa singula
mensibus.*

*Lactis q̄ mē-
struorum vna
substantia est.
Lac in non ge-
runt, quibus
lactis cessat.
Lactantes non
purgantur.*

*Lac in non ad-
it, quæ non ge-
rant vtero.
Mulier qui men-
strui probē fluat,
quib; morbis ad-
infestat.*

*Hæmorrhoides
fluat suppressæ,
atq; quæ bo-
norum atq; mē-
strui expleant
causā.*

*Contrarium
esse cōtraria re-
media.*

*Bruta sibi ipsa
natura docet,
medentur.*

*Sanguis de-
trahendi men-
surā, quā alia-
rum auxiliis
multis facilius
deprendendi.*

*Sanguinis eva-
cuationis signa
de, medicum ha-
beret liberam po-
testatem, aliter
aut nequaquam.*

*Purgatiois su-
per venis dis-
positio.*

*Cibi in mensu-
ra errata, gra-
uissima inco-
moda adducit.*

*Inedia, primo
tunc fit, nec
nutritur, nec nu-
trire potest.
Interisse ob ci-
borum inopiā
necesse.
Lactis ab-
cibo durare.*

*Inedia non, sed
raritas cibi
vitiare.*

causas dictas perpetrā ab Erasistrato omittitur. Quod autē mensura in venæ sectione multo fa-
cilis deprehendatur, q̄ in ceteris quibusvis au-
xiliiis, hinc declaratur. Nam & coloris mutatio-
nem, nunc quidē in ipso fluente sanguine, nunc
verō in ægrotantis corpore, discipere licet. Ani-
mi quoq̄ defectio in plurimis affectibus vacua-
tionis terminum obtrinet: quemadmodū sangui-
nis fluens vigor languescens, & pulsus mutatur.
Adde quōd & medicus huius solius evacuatio-
nis liberam habet facultatem sistendæ, quando-
cumq̄ illi placuerit: aliarum autem nullius. Nam
ubi propinandū sit aliquid medicamen, prima
exhibito in tua potestate sit esse: cetera verō,
fortuna administratrice obtingunt. Ingens præ-
terea in propinationibus pharmacorum pericu-
lum est, cum vel non commoneatur purgatio, vel
quod in aliu attrahitum est, nō facili excernitur,
vel cum dolore, torminibus, refrigeratione, pul-
sui evanescencia, ac defectu animi exprimitur: vel
cum corpus vehementer perturbatur, interm-
paulum admodū evacuat, aut evacuatione mo-
dum excedit: id quod sæpius, ceteris extremis malis,
coningit. Neq̄ enim vi venæ incisæ fluxū mox
digito superposito sistes, sic sistere alui, p̄suis
poteris. Cibi etiam cuiuscūq̄ in mensura erratum
grauissima incommoda inducit: vt in homini-
bus extenuatis & imbecillibus cōstat. In quibus
si quid minus, q̄ par sit, nutrias, virtutem tabidi
reddet. Si verō modum exsuperet, naturæ potius
onem, q̄ nutrimento, fuerit, illiusq̄ penitus & ex-
tinguet & suffocabit. Vt autem funditus Eras-
istrati opinione veritatem, solam instructis inedia-
m, ad evacuandas omnes inflammationes, ne-
mo ignorat, mea quidem sententia, inediam ip-
sam priuationem quādam existere, ac proinde
nec nutrire, nec evacuare posse, cum inter inaniti-
onem & vacationem sit media. Nec verō exi-
piam modum est, alique iniquam peniis ob ino-
piam ciborum: a quoque inanimata delitescencia
in latebris sine ciborū copia, perdurare nequa-
possent, quemadmodū certē perdurat: quia nu-
trimento non indigent: quandoquidem ob de-
fidiam atq̄ torporem, in quo verantur, nec non
ob astrictam cutem, nihil ab eorum corpore ex-
halat, quod cibo instaurari possit. Itaq̄ nō ine-
dia, sed raritas cutis evacuat: quam si frigore &
quiete densaueris, quid commodi fuerit ex fa-
me expectandum? Ceterū dum Erasistratus cuiq̄
instruere inediam contendit, videtur mihi ipse-
met affectuum qui inedia opus habeant, auctor
& promotor existere.

GALENI PERG. DE VE- næ sectione aduersus Erasistrateos Ro- ma degentes, lib. vnu.



*Inflammationes
omnes facit inedia
& vacuatio
esse cōstat Eras-
istrato.*

Vm Romam iniri venissem, incidit
in medicos quosdam, qui a venæ se-
ctione tantopere abhorrebant, vt
cum aliquando eger quæspiam pro-
pter plenitudinē iam prælocaret, ne-
tum quidem hoc auxilio vti vellent: idq̄ secri
Erasistrati, qui nūquā venæ sectionē probans,
omnes inflammationes sola inedia evacuandas
esse censebat, Quia in re quætopere vir ille halu-

cinatus fuerit, quis non cernat? Etenim ob id in-
edias probamus, quōd vacuatis pereas venis,
affectū minui cōtingat: multo hercle cōmodius
fuerit, vt semel adhibita evacuatione, portusmū
quæ per sectam venā administrat, ab inedia ab-
stineamus, vt quæ & ægrotis ingenti molestia so-
leat afficere, & vigilas, & inquietudines, affli-
ctionemq̄ oris ventriculi, tum corruptionē suc-
corum, necnō alui, atq̄ interdum vrinæ suppres-
sionē inserat. Quam obrem nōnulli in Romana
vrbē medici, præcipue qui medebatur mulierib.
cum explorasset infelicē cuiusdā puellæ, ab nō
sectam venā, successum, in quibus sanguis fere-
batur ad superiora, tempore quo eruptio men-
struorū expectabatur, venæ sectionē iam viurpa-
bant. Nec verō querē, nec inedia eis iniūgebāt,
sed melicratū propinabant: victūq̄ humectante
ac laucris assam vt eis permittebāt. Ab his e-
nim, si vel mediocri quāitate sanguis fuerit de-
tractus, purgationes exoriri cōsuevit solent, præ-
sertim si infra poplitē, aut iuxta talum venæ se-
ctio fiat. Sin autē quis vena secta iniunxerit ipsi
mulieri inediam, menses prius fluentes cohibe-
bit, inculpabilēq̄ reprimet purgationes. Sanguis
namq̄ ciborū copia arefcit, ac deior seipso red-
ditur: eamq̄ ob rem, ad fluxum ineptus evadit.
Quæ igitur tum lotæ fuerint, melicratūq̄ & ci-
bos idoneos sumperint, ac vinum neq̄ austerū,
neq̄ crassum biberint, his purgationes procul-
dubio cōtingent: ob idq̄ ego inedias post venæ
sectionem nō frustra tantū, verum etiam adhibe-
re cum magno damno proficere. Iam verō cum
nostra hac tempestate mulieres quardam Roma-
næ frigidissimæ ex niue potarēt, ob idq̄ aut nullo
pacto purgarentur, aut diminutæ: eas tamē
medici sectione venæ adco incolumes seruane-
bant, vt nec sanguinem spuerent, nec pleurinde,
peripneumonia, aut angina vnuq̄ corripentur.
Porro in auspiciis inflammationum, omnis
forbitionū ciborūq̄ adiectio subtrahenda est:
vitendum verō venæ sectione. Siquidem inflam-
mationes quæ febres facit, vt plurimū ex pleni-
tudine fiunt. Quam obrem si vasa nutritōe im-
pleantur, maiores ac vehemētiōres ipse inflam-
mationes reddent. Ceterū si adolescentes qui neg
de sanguinis detrahendi mensura, nec de vena-
rum secundarū ratione quicquā audiuerint, ad
præsidium hoc sese accingant, ægros in exitum
perducunt. Plures namq̄ ob perpetrā sectam ve-
nam perierunt, q̄ quibus adhibuit id auxilliū nō
fuerat. Quippe seniores medicum tum tēporis ve-
nas secantes, vtabant aliis evacuatoriis auxiliis,
quæ idem q̄d & venæ sectio, verū longiore tēpo-
re, efficere poterāt: nisi quōd quandoq̄ ob prin-
cipem partē affectū, aut ob plenitudinis expe-
rantiam, æger morte præoccupabatur. Verū qui se
breves cunctas in principio venæ sectione indige-
re autumant, nō mediocri etiā noxa ægros affi-
ciant. Itaq̄ minus aberrare eos consentaneum
est (vt Plato ait) qui nō aggrediunt illa quæ igno-
rant, quā qui ea tractant, quæ didicerunt non
quam. Porro quōd vas aliquod ruptum possit
absq̄ inflammatione coalescere, dummodo non
extera rite administrauerimus, sanguinisq̄ quan-
tum nobis visum fuerit, in tempore evacuaueri-

*Inediaque
doctore solius
Symptomata.*

*Mensis vrui
vna secta
a poplite
ad talum.*

*Inedia post
venæ sectionē
magis dam-
nosa
alioquin,
Menstrua qui-
bus suppres-
sa ob vena pri-
uationē fuerit,
venæ sectione
restituuntur
facilius, etiam
ceteris.*


*Vena sectione
perperam adhi-
bita, etiam
si plures, quā
quibus adhi-
bita non fuerit.*

*Febres ex
suo principio
non venæ
secta.*

*Præcæ
plures aut
doctores.*

mus, liquido conficit. Frequenter siquidē vidimus, quō quibūdā pugnantibus singulari certamine* torū crura brachiūq; dissectū esset, co aluisse tamen vulnus, antequā inflammatio oriretur: quōd autē multo magis cōtinget, (si vt Hippocrates ait) illico sanguis copiosius fluxerit. Saepius etiā vulnus in causā thoracis partes illatum, tridū cōglutinātū vidimus. Quōd autē Erasistratus nūquam fuerit vīus venę sectione, hinc perdiscere licet, quōd in plenitudine omni semper inediā inungatū quod nec rīquū factū esset, si eam sanguinis detractio- ne vacuaret: quom̃ minime cōsistentem rari- ni fit, vt quīs circa vnum eundēq; xgrī, vtra- que auxilia, nempe inediā, & venę sectionē, vsurpet. Nec verō existimandum est, plethorici omnes sanguinis esse detractioē vacuan- dos. Prius siquē dem distinguenda natura plenitudinis est, habitudoq; & xtras xgrī expēdita: tempus item, regio, & aēris constitutio conside- 30 randa, necnon quęcumq; antecesserunt, quāq; ipsum xgrum enīam in se hētā symptomata. Et converso alios plerōsq; tibi ob oculos ponā, quī absq; repletione quom̃ sint, nihilominus ve- nę sectionē opus habent.

GALENI PERGAMENTI DE
curandi ratione per missionem sangui-
nis liber unus.

 Vi de sanguinis missione speculan-
tur, primo quidem intelligere de-
bent, quamam corporis affectio-
nes evacuatione indigeant. Secun-
do, quæ illa, quæ per sanguinis sic
detractiōe. Tertiō, qui innoxie hanc ferre pos-
sint evacuatione. Quarto, quonam potissimum
tempore ipsa molienda sint. Quinto, quæ ex
venis scire oporteat: quū nimirū laud parū in-
terferit, hancne, an illam incidas. Porro hæc quoque
cōtemplatione absoluta, succedit de scopis oratio.
Quibus mentē adhibens, quæ, vacationis
modū facit per cōiecturam inuenit: necnō in
quibus semelauffer præcitet, & in quibus repe-
titam ablationē molitur: tum in quibus nam inani-
re vsq; ad animi expedit deliquit: & in quib;
id, ceu summū malū, vitare. Cū aut per omnē
vitam, omnia quæ in quæstionē veniunt, duo in-
vennonis organa obtrineat, nempe rationem &
experientiā: necesse esse arbitror & nunc quoque
me, aut ratione sola, aut sola experientiā, aut utrius-
que ambabus, quæ propolita sunt, scrutari. Si
quis ergo affectiones quæ vacatione indigēt,
vel experientiā collectas exponere, sola opus
est ad explicandā memoriā. At si viā rationali
id efficere instituit, necesse est, ut prius cōmune
ac generale inueniat, ex illiusq; deinde in species
differentiaq; sectione, vsq; ad species vltimas,
affectū numerū, vacationē desiderantiū, inve-
niat. Etenim ratio ipsa, hæc quidē, ex cōmuni-
tantiū, p̄gressis nonionibus, inuenit & demō-
strat: hæc aut, enā quæ ex istis inuēta sunt, ad de-
mōstrationē adhibet. Ac prius facitatione, om-
nes artes, omnēq; homines viā solēt. Secunda
Verō, nō omnes homines: nam propriē ad artifi-
ces p̄tinet. Eam igit nō impræfentariū sequitur,

vtremur multis, quæ in aliis cõmentariis sunt de
monstrata. Nempe cõplures esse facultates quæ
animalia gubernat: quarũ alias naturales, alias
animales vo cari. Generationis aut principijs .p.
materia, quatuor elementa subici, eaq̃ tota per
sele multo miferet effluuio in se agere nara,
etip per qualitates suas effectrices, caliditatem, vi
giditatem, humiditatem, & siccitatem: ex quibus vtrius
omniũ temperamenta cõstantur. Præterea dari
duplice plenitudinem, nempe secundũ vasa, &
secundũ vires: primarijs actiones, à similari
bus corporibus perfici: vt secundarias ab in
mentariis. Qum igitur plenitudo bifariã & fiat,
& dicatur: vno quidem significato, vt ad vires:
altero, iuxta laxitatẽ continentĩ vasorũ: vtrius
lanẽ opus est vacuacione, siue ea in homine va
lentinario, siue etiam in valente cõtingit. Vo
cẽ enĩ plenitudinẽ iuxta vasa, magnã humorũ
colluuiã, ipsa vasa tendentĩ. Iuxta vires autem,
eam quæ vel minimẽ vasa distendat, vires ta
men grauat, & premit, hominẽque reddit ad
monones pigrum & tardũ. Quod si simul addit
vicerofus etiã aliquis sensus, ac potissimũ du
mouemur, figurẽ aut affectũ ipsum vino si
fucci esse fobolem. Quandoq̃ autem & in partibus
quibusdam corporis, nõ in tota mole, plenitudo
ens adfuit similes lux, quæ vniuersum corpus fo
lent opprimere. In omni, igitur id genus affectu
bus, maximẽ ex vĩa fin vacuacionis humo
rum, aut vaporũ, aut spiritũ peccantiã: mini
mẽ tamẽ semper festio venæ desideratur, sed sus
ficiet interdum purgatio, frictio, balneum, in
victio: ex aliquo digerente medicamento. Quæ
utem affectiones venæ sectione indigeant, de
inceps dicemus. Non solum nutrimentũ animã
nis p̃urius præstat sanguis, sed calorẽ etiam na
turalem conseruat. Itaq̃ ipsius cordis calor in
terdum quidem frispio minor efficitur, aut pro
pter sanguinis copiam, à qua nimirum extingui
tur, aut propter ingentem inopiam, aut propter
frigidam qualitatẽ: interim verò maior, aut pro
pter calidũ sanguinis qualitatẽ, aut propter ex
iguam inopiã. Quicquid autẽ cor in caliditate
rigiditatem perperit, eius quoq̃ & alie cor
pis partes protinus participes sunt. At quæ mē
bram accidunt caliditates, aut frigiditates, eas
quæ parũ quidem affectũ vicũ sunt, vnã alte
rant, in totum tamẽ extendi corpus, prouisum
corrimutent, non possunt. Ceterum quandoquĩ
quidẽ omnia simul calida & humida * crassimẽ
computrescunt, vnde si quod nutrimentũ fugge
ritur à ventriculo ad hepar, à natura non super
tur, inip probam sanguinem non conuertatur,
alias aliam perpetiatur putredinem. Qum au
tem quæ ex materia putrescunt calida, quã an
ea calidiora reddunt, calidiora profecto etẽ
le p̃e sanguis putrescit, ac p̃inde enat particula,
in qua cõ putrescere congerit. Quia verò ab in
signitẽ calidis, simul quæ vicina sunt in calefactũ,
vique calor ille acris & mordax (qualis à putre
dine oritur) illis quæ vltierius sunt, comunica
bitur. Ergo si pars quæ hoc pacto incaluit, in
signis sit, aut calorem suum in cor extendere va
leat, vnã & ipsum accendet, vt quod d natura ca
lidissimũ sit. Quod si semel illud accen sum fu

Facultates cui
mal diffusus
est sunt plures.
Elementa qua
tuor subno
principio gene
rationis, cuq
ta per tota mi
sera.

Plumade est
duplex: arripe
sola vna. &
sola vna.
quatuor vna
est etiam
na.

Piramide in-
sa vasa quid.
Piramide in-
sa vasa quid.

Sanguis non fit
in alio animal,
sed calorē eius
naturalem con-
vertit.

Cordus calarvus
de minor aq;
maior reddi-
tur.

Cordia alliodora
Rici protinus ca-
tera partib. ob-
municantur.

Totocăut miș-
sime caldă &
bună.

Patrocinia red
de caldiere
quidm autr.

T

Febre quid.

rit, facile totū ipsius iam corpus simul excalescit: qui affectus vocatur febris. Nonnunquā verō, prius quāvis cōputrescat sanguis, ingens ipsius vis decūbit in partē aliquā: quum aut exstinguitur omnino, ita ut actio ipsius pereat: aut illi certē noxam nō contemnendā infligit. Hoc siquidem pectō apoplexiæ pvenit, multominus sanguis ne incumbente cōstet in animalis principii. Quod si in aliam particulam ruat, tumorē inibi præter naturā excitat. Cuius generis phlegmone existit. Verūm si crassior sit, atrax bilis magis naturā referat: q̄ decubuit sanguis, scirrhorior tumor efficitur: sicut si pituitosior sit fluxio, laxius: et si biliosus, tumor erysipelas dicitur. Quum itaq̄ plenitudo (quemadmodū exposuimus) sit duplex: ex ipsa, ea quidē quæ ad vires refert, facile in putredinē abeat, interdūq̄ in partes quasdā ingruēs, inibi tumores præter naturam excitet: altera autē, quæ iuxta vasa dicitur, sæpe etiā in partes quasdā decumbat, tumoresq̄ & apoplexias, venarūq̄ ruptiones moliat: vtrāq̄ celeriter evacuari tentandū, prius quāvis aliquid permittit conciliet. Si igitur qui plenitudinē grauior, aut tenditur, nec puer sit, nec senex, an illi venam secare oporteat, expendes, præ oculis habens hosce principales corporis plenitudinis nempe tum quantitatē, tum qualitatem: virium robur, atq̄ earundē infirmitatē: naturalem totius corporis habitū, tempus, regionem, anteaq̄ vitam: tum, an cibi potusq̄ copia, & præcipuē assatum nutrimentū, qui sic affectus est, fuerit vltus ad hęc, cōsuetudinē, & res præter consuetudinē actas: quo vsq̄ motus exercuerit, quas excretionē habuerit, aut præter solitum compescuerit. Præter omnia sūt hęc, num gracilior, aut crassior evaserit. Porro vtriusq̄ plenitudinis quantitas, ex propriō signorū magnitudine definit. Quāto enim gravior sibi homo videbit, tantūm plenitudinē quo ad vires creuisse constat. Ad eundem modum, quantūm autē fuerit tensionis sensus, tantūm & cūctā alteram plenitudinē, quæ secundū vasa vocal. At vtriusq̄ plenitudinis qualitatē, partim ex coloris iudicibus, memor colorem humorū esse, si quidē ab externo calore vel frigore totum corpus haud immodicē affectū fuerit: partim ex iis, quæ humorū naturæ cōiuncta sunt. Etenim calidiores, calidior totius corporis sensus sequit, ut frigidiores, frigidior: tum eos qui in venis quidē æquant humores, vasorū tumor atq̄ distēsiō: qui verō in carne, sensus in ea vel grauior, vel tensionis, vel etiā caliditatis. Porro dispensantiū nos facultatū infirmitas vti robur, propriis indicant functionibus: voluntarius quidē, illius quæ in nervis cerebrōq̄ constitit: pulsificis autē, eius quæ irreorde ac per arterias mouetur. Nam secundū bonam nutritionē aut abolitam, & colorem probum, aut praui, tertia facultas, quæ utrix est, & secōdo proficiat, cognoscenda venit. Vbi ergo extantib, plenitudinis signis, valentes facultates existerit, in cides venam: videlicet si tensus quidē sit ipsa affectio, nihil distinguēs: magisq̄ etiā in phlegmonode: fin verō degrauians sit plenitudo quæ infestat, haud semper sanguinis molienda detractio est. Nam si-

ri potest, ut crudus per corpus collectus sit humor, a quo talis effectus gignatur. Quem succū sanguinis missione vacare non expedit, sed fritionibus, vntionibusq̄ medio criter exsiccantibus: necnon potuonib, cibisq̄, & humoris crassitudine in cidentibus, & calfacientibus modicē. Siquidem quæ valent exsiccantur, nimis subito vires deiciūt, sæpe etiam vires adaugēt. At verō qui sanguine repleto ex pectore, in præsens quidē curati, ceterū eam sortiti sunt fluxio: raris pulmonisq̄ structura, ut vel pauculo plus collecto sanguine, protinus aut vasis siliatius osculum referretur, ut ipsum rumpatur: ite, vel si nullum in corpore etiam ad huc fuerit symproma, incunet tamen vere sanguinē mittere oportet. Similiter in iis qui promptē morbum comitialē, aut apoplexiam, aut peripneumoniam, aut pleuritidem, aut anginam incurrūt, eiusmodi effectus antevētiendū sunt sanguinis detractio. Eodem modo quibus hæmorrhoides retentæ sunt, potissimū si natura sint atrabilialis, quæ quoniam æstus plethorici morbis corripit assolent, & hos quoq̄ veris initio vacuare expedit: nec secus eos, qui ipso etiam vere illiusmodi malis vexant. Ceterū intemperantē & vinolentos, ventrig & gulæ deditos, nec purgatione, nec missione sanguinis magnopere iuvetur: nam per vitæ intemperantiā rursus in uolūto humorum copiam quamocysimē colligunt. Quare iis ne manum quidem admoueas. Eis verō qui præceptis salutaribus obsequuntur, summo opere, phueris, si principio veris primū quidē evasueris: dein autem ad exercitia, quibremq̄ victus rationē perduxeris. Sed nec tantūm vbi adest plenitudo, siue ea secundum vires sit, siue secundum vasa, mittitū prodest veng seclio: verum etiam citra plenitudinē initio phlegmones, quæ aut propter æctum, aut propter dolorem, aut partium debilitatē provenit: quippe dolor sanguinē ad se trahit, & sæpe partium debilitas phlegmonē, vbiq̄ corporis plenitudinē, contrahit: quum videlicet partes fortiores, per venas, ceu per censeles quosdā, propria excrementa semper ad imbecilliores expellant, donec tandem ad partem imbecillimā omnium de fluxerint, & quæ se se amplius propellere, quod in ipsa redundat, nequeat: id quod accidit illis partibus, quæ vim excreticā vicinis omnib, imbecilliorē possident. Quamobrem omnū primū infirmiores partes corripitū excrementis morbie: quemadmodū glandulæ, quæ sunt fluxionibus excipiendis idoneæ, tum ob substantiæ laxitatē, tum quia inter omnes partes minimē robustas naturales facultates (excepta atrarricē) sortunt, sicut & pinguitudo. Post glandulas sequit pulmo, fluxioni recipiendæ promissus. Nam & hic res facultates infirmas possidet, corpūq̄ laxum. Deinde est lien. At cerebrum, aut perinde ut illi, aut etiam plēs, excipiendū fluxui est habile: cōtūctiōnē tamen habet sciendū iis quæ recipit, appositissimam. Quibus ergo carnofo genere pulmo, lien, ac cerebrū, natura sunt robustiora, in iis ad glandulas carnoq̄ pvenit fluxiones, vbi totū nimirū habet infirmū fuerit, veluti in rheumaticis affectibus

Crudus humor
quæ ratione va
cua dant.

Sanguis de
tractatus quib
sit profici
endum iuxta
et 799.

Intemperantē
bus car modē
dant non fa.

Phlegmonē in
operare, etiam
si plenitudo nō
adest, ceteris san
guinis missio.
Dolor sanguis
trahit.

Imbecillior
particula a for
tioribus huma
res recipiunt.

Imbecillior
partes car om
niū prima
recipiendæ
mestimonibus.
Glandulæ car
pripit excipiē
fluxiones.
Pulmo.
Lien.
Cerebrum.

Apoplexia sūt
malis sangui
ne incubante in
animalis prin
cipium.
Phlegmonis ge
neratio.
Scirrhus.
Oedema.
Erysipelas.

Plenitudo iux
ta venam facili
in putredinem
abest.

Sanguinis
detractio quæ
sunt prius ex
pendenda.

Plenitudinis
viresq̄, quæ
tas qualitatē
quæ, signis sit
definienda.

Calor humoris
iudicat.

Facultatū nos
dispensantiū
robore imbecilli
tatisq̄, ex pro
pria indicat
functionibus.

Sanguinis de
tractio quæ
d sit plenitudo
vacuanda.

60

subus accidit. Merito igitur in his curandis scopus est, nō evacuatio, sed totius corporis roboratio: quam vis tamē curatiois inini illis oriat a misso sanguine, & si excrementa prauā qualitate habuerint, vni etiam adhibetur purgatio. Recte autē admonemur in libro de victus ratione in acutis morbis, vt si magni sitis morbus, & uget florere etate, adstringat robur, sanguinē de trahamus. Ceterum principes scopi mittēdi sanguinis, sunt duo: nempe magnitudo morbi præsentis, imminētis uicē, & cum ea uirū robur: quibus si adiciās etiam florētē etatē, nihil sermōni defuerit: modō sub etate florētē, præcedens sequensq; illam intelligant, expianturq; diuturnitē, tamē senilis atq; puerorū etas. Quamvis etas senilis in uirum uerbo cōprehendi potest, quom eorum nulli adstringat robur. Si itaq; magnum fore morbum timemus, aut iam præsens est, aut incipit, uenā secabimus, uirum habita ratione, tantūq; ex oratione exēptis pueris. Nec uero ubi tanta humorū crudorū copia accumulata est, vt fecandam uenam * prolubeat, sermo hic eedarguitur, quū ipsi uirū robur non adsit. Bistq; hoc cinditū coa haud possē sanguinis missionē perferre, * quod præter colorē tonus corporis, degenerantem in ipsi ab eo, qui solet sanguinis copiam ostendere, etiam ipsorum pulsus inæqualis in uoluntate & magnitudine existit: præpollentibus secundū ipsam inæqualitatē, imbecillis simul & paruis. Itaq; ex morbo, etate & uiribus, minuēdas esse sanguis cognoscitur. At uacuationis quantitas, cum ea ista, tum etiā ex plethorica uocata syndrome, æris nōs ambiētis tēperie (que in tempus & regionē diuiditur) antea: ut uictus ratione, excretionibūq; factis, aut impeditis, cōmodē deprehenditur. Igitur ad hæc omnia respiciens, tum podagricis, tum arthriticis, tū morbo comitiali obnoxii: præterea melancholicis, quiq; sanguinē antea expuerunt, aut thoracis structūrā fortis sunt ad id ma-

gnū idone: uirginosis etiā, quiq; a suis uicē corpori solent angina, peripneumonia, pleurinde, hepanide, ophthalmia uelamenti, ac breuiter morbo aliquo insigni, sanguinē detrahēre consueui. Porro in redundā melancholici humoris, sanguinē minere oportet, aut cerē medicamento vt expurgāte atram bilem. At ubi crudi succi expērit, anteq; morbus inuaserit, cautē euacuabis: ubi uero iam consueperit febris, nequaquā. Indiciū autē crudorū humorū est colore plumbeus, aut rubus pallidus, omniāq; potius quā rubus: tum inæqualis pulsus. Verū si ob hæmorrhoides suppressas cumulatū aliquid sit sanguis in corpore, audacter uenā incidēs, etiam si antea expertus graui morbu non fuerit. Sed nec euacuatio si proroganda est, quibus restitit menstrua purgatio. Non tamē necesse est, illis semper secare uenam, quō malleolorū scarificationes quandoq; superfluitati uacuandæ sint satis. Plethitidines tamē si suppressis mensib, or-

tas, omnino p crura euacuabis, siue uenā secare oporteat, siue etia scarificare. Scetq; quippe in cubito uenā, muliebri purgationē reueliunt. Vni uero que ex mulierib, albidiores sunt, ac ceruæ tenuem sanguinē solent: quocirca scarificatio-

nibus malleolorū adhibitis, maxime solent iuuari. At que nigriores sunt, eas uenā secta curabis, quom tales crassiorē sanguis, ac magis melancholicū gignit, præcipue uerō si magnas habere uenas apparent: id quod accidit illis, que graciliores simul atq; nigriores fuerint. Etenim carnosus & candidus parax insunt uenæ, ac protude ipsi malleolorū scarificare, q; secare uenam; præterit. Porro validū sanguis erumpentem, uenæ sectio solet sepe cōpetere, tanq; reuulsio-

sum auxilium. Secare autē in cubito uenā, si ex dextra nare protrūpat sanguis, in brachio dextro ex pedit: sin ex altera, in sinistro: minime tamē usq; ad lapium uirū detrahendus est sanguis. Simul autē, quū agis, artubus uincula inuicta, aut ex lana, aut canabe, hypochondriacis directē supposito, eucurbitulā admooue: quandoquidē his remediis semper erumpentem etianbus sanguinem cōpescimus: quom antea q; inferunt in nare, atq; fronti illinuntur, infirma omnia cōpēremus. Nihil autē quā artem medicū in agendo cōiecturalem efficit, ut cuiusq; remediū quantitas. Siquidem interdum exploratū habemus, quid nam uero, quale, & quid sit exhibendi: at quantum exhibere oporteat, non nouimus. Hoc tamen summum bonum in sanguinis missione habetur, quod potes sistere euacuationē, dum opportunum uidetur: ac rursus si quando animus sit, sinere ut fluat, quo usq; videbitur tibi rectē se habere negociam: id quod nō licet in purgantis pharmaci exhibitione. Nam quod semel in uentrem deuoratur etia medicamē, quo minus omne sit deuoratur, fieri non potest: nec possibile est, ubi plus quā conueniat, purgare, uenæ oblati auferre. At uerō dum aliquid sanguinem mittimus, uis quid uigreat, præstat priori missione minus detrahere, iterūq; illā repetere, imō, si lubet, tertio. Vbi igitur multa euacuatione est opus, sed vires sunt imbecillæ, in iis euacuationem parui expedit, ut & me fecisse uidi, in iis quibus crudorum inerat humorum copia. Nam detracto paululo sanguine, paruius exhibito melicratum, probē coctum, cum incidentium medicaminū quopiam uelut hyssopo, origano, nepita, pulegio: ut autē cerē melicrato oxy-mela, aut oxyglycyra: effice cū sanguinem minuo, vel ipso eodem nonnunquam die, interdum die postero: in quo rursum exhibito propositorum medicaminū quopiam, ut quid de sanguine aufero: ac rursum tertio die similiter bis. Ceterū ubi seruicentis inest sanguinis plenitudo, acutissimū febrem accendēs, subito ac simul uacuare expedit, tamq; priusq; in principē aliquid partem ingruat, inanite tentandum, vel ad animi usq; deliquiū uirū tamen inspecto robore. Quare nec per noctem sanguinem detrahēre uideatur. Utile autem fuerit, si uetere etiamnum sanguine, expendere pulsuum diminutiones: ut uideat, nobis non aduertentibus, pro animi deliquio more hominem occupet. Quineriam & reuulsionē, non leue & ipsam auxilium, quodque sepe secta adhibetur uenæ, quando maiorem in numerum particulares au-xeris detractiones, tantō efficaciorē effeceris. Ergo si magnitudo morbi, missione sanguinis

scarificatio quibus sit etia breuia mulierib, ut quib; sit etia uenæ

Venā quibus la-tet, quib; uenā que uisus mulierib,

Sanguis erumpentis uenæ solet cōpescat, Sanguis erumpens per nares quæ ratione con-uerenda,

Quantitas reuulsorum præcipue reddat ut rem mediis ob-licetur.

Sanguis detractio quæ cum medicis infit,

Purgatio phar-macei uis deuorata simul in uentrem sunt, reuocari non posse,

Euacuationem quide partiri expedit, Sanguis missus, in quibus adest crudorū humorū copia detrahenda,

Sanguis quando multatus sit ad animi ut que deliquit,

Sanguis dem-issus, pulsus effe-ctus, Reuulsio per se sit uenā, quā sit effecatur

Sanguis mis-tendi principes scopi qui sunt,

Sanguis uenæ secare robore, Pueri secandū non esse uenā, Crudi succi expērit uenā secandū, quia carcat robore,

Vacuationis quantitas ex quibus mitti de sit,

Sanguis quib; sit detractio,

Crudi succi quando uacuare oportet, Cr quando mitti de sit,

Crudorum humorū indicia, Hæmorrhoides, aut mens-trua suppressa, sanguinem detractio de sit,

Menstrua effe-ctus, uacuandæ per crura: reuulsio de per uenā in cubito sit,

*Sanguis de
trahendus fup.
Vacuando qui
fuit liberatus,
Et qui parum.*

*Vires ante
quarundam mor-
borum sangui-
nem non effe aut
laudari.*

*Vires robur
quoniam pul-
santur in-
dunt.
Septemquarun-
dam fanguis.*

*Sanguis flu-
tum per secula
venam fup-
pedit effe, quoniam
alteratur per
fua.*

*Sanguinem de-
trahendum per
infirmitates,
effe, dicitur ra-
tione, fanguis
autem, fanguis
conficitur.*

*Sanguinem mo-
tatu poffe
venam, quan-
do expectanda
non fit.*

*Gallus parum
fanguis de-
trahendum.*

*Sanguinem effe
parum de-
trahendum fub Ca-
ni, Et in re-
gionibus calidi-
fima fit, ficut, ut
in frigida et
caliditate.*

*Sanguinem fere
liberius totum de-
trahendum fuffe.*

postinet, adfuit viriū robur, nulla poffet effe tan-
ta crudorū humorū copia, q̄ inlubere id auxili-
um poffat. Cūterū quib. amplius funt venæ, quig
modice graciles funt, nec candidæ, nec teneræ car-
ne præditæ, eos copiofius vacuabū: cōtrarios autē
parcius, quō exiguiū habent fanguis, carnēq;
facile transpirabū. Qua ratione nec pueris per-
tandens venā, ante quartumdecim annū. pōt
quē, fi multus cōgētus fanguis appareat, repū-
que anni fit vernū, & regio tēperata, puerū natū
ra fanguinea, aut albus acutus morbi difcrimē
impēdeat, fanguis minnes, in puerū quidē ad
coryllī vīq; q̄ fi poftea vires validæ pmanere vi-
deatur, diuiniū eius adiciēs iteratā mīfione.
At vechemē, equalis, & magnus pulfus, incor-
pū viriū roburātū eū fignū. Quare fi in feptua-
genariis is addit, affeētūq; iubeat, etiā fecabes ve-
nā. Proinde nō tantum annorū numero, fed cor-
poris etiā habitū animus intenden-
dus eſt. Ad hęc, ubi incifa venā effluit fanguis, mutatio ē ei-
us, & maxime quō ad eū phlegmonē, labacēq;
fluxionis robur, expendere oportet: fcd potiffi-
mū alterationē pulfū: quib. quid ē alteracōni-
bus, aut in magnitudine, aut in quavis iniqua-
bitate, cōtinuo quiefcendū eſt. In quib. aut lux-
ta fecit venā phlegmonē eſt in gēs, optimū eſt
fanguis, & in colore, & in cōfiftentia expecta-
re permatationē. Id qd fennēs Hippocrētē in
curatione pleuritis, ait: Secūda verō in cubito
vena interna. Nec veraciter multum detrahēre,
donec rubrior, flaviore multo effluat: aut p pa-
ro ex rubro liuidus: vtrūq; n. accidit &c. Eius fi-
quid em tūfumpcionis, qua nōnīd fanguinis a
parte phlegmonē obfcula rapit in vulneratē ven-
nū eſt, cōfiftitū fignū, ipfius fanguinis mutatioē.
Quē tñ nō omni ex parte expectādā eſt, quō ali-
quādo, pūmūq; duplici fanguis mutet, cefandū fit,
nimirum ipfe nōmē: vel ob vires infirmas,
vel ob malignitatē phlegmonē, ū qua interdū
nīd emittit, fed inibi fomite impaū eſt fanguis.
At fi ex vacuatione vires minime refolui vl-
deantur (id quod ex pulſu cognofces) æger au-
tem fit ætate florēt, expectandā mutatio fanguis
nū eſt, potiffimū fi ambrens fit temperatus: Mi-
nus autē detrahimus, quā pleniūdo cōmmo-
net, fecundum ætates quidem, in pueris: fecun-
dum corporū habitus, in cādidis, & carne mol-
libus, cuiusmodi Gallī exiūnt: fecundū tempo-
ra verō, ſub Cane: ac fimiliter fecundū regionē,
cōfiftitū eſt, in iis que calidiores iuxta & fci-
iores exiſtunt, quō nimirum hæc omnia, quā
maximē ad refolutionē ſint apta. Aliis autem ra-
tione in contrariis, hoc eſt, temporibus & regio-
nibus frigidis, largam fugimus vacuatiōē, pro-
pter inſequentem refrigeratiōē. Quare vnum
vacuationis modum in diftorum fingulis deſi-
gnare nō licet. Memini enim quibūdam ad ſex vſ
que libras fanguinem fuiſſe detractum, ita vt fe-
bris proinus exingueretur, citra vllam virium
iacū: quibūdam verō ſequilibram tantum, 60
nec id abſq; inſigni damno. Porro ex venis quæ
ad magnos oculos angulos cōſpiciantur,
aut ſub lingua, quod certē mētiōe ſit dignum,
effluere nō ſolent: ſicvī nec ſi quis ſumma in ma-
nu, aut pede venam ſecet: quæmadmodum pu-

rant ſi; qui lienē curari aiunt, a ſectiōne venæ ſi-
te iuxta ſecūdum ex digitis parius. Quod verō
ad differētiā venarum pertinet, quibūcūq;
hæc ſpō, hoc eſt, ē directio eruptio fanguinis acci-
dit, ſummum ad cōmodum laborantibus ad-
fert. Quibus autē contrā evenit, nihil iuvat, aut
etiam interdum nocet: quōd vires ſcilicet, citra
morbi trahemē, deiciat. vt, ſi lienē turgēt, dex-
tra nare ſan-
guis effluat: aurēq; hepatē, ex ſiniſtra.
Dextra igitur nare fanguis erumpēs, ad dextrū
hypochondrium fixa cucurbitula, dare, cele-
ritēq; ſiſtēt: ſicvī ad ſiniſtrum, ſi ex ſiniſtra pro-
fluat. Similiter ſi venā revulſionis ſtudio ſecet,
fecundum rectitudinem quidē ſecta, oppoſitis
ſan-
guis erumpit: ſi cōſiſtēt cōſpicuum vi-
tūtatē adferet. At ſi cōtrā ſecet, nihil ſanē pro-
fuert. Quare lienē affecto, perinde admiſerit vi-
na ſecta in ſiniſtra manu, iuxta annularem digi-
tum, ac ſi interna in cubito venam ſecueris. Pluri-
mus nanq; iuvat adhibētū lienē, fanguis ex
ſiniſtra manu interdum vique ad libram vnam,
detractuo. Præter autem nō ſemel quantum cō-
veniat, detrahēre: ſed in duos dies ſipam evacu-
ationē parti. Pleuritici etiā, que ē directio la-
borātis lateris adhibita fuit fanguis mīſio, cla-
riſſimam ſepe vitūtatē attulit. Quæ verō ex bra-
chio oppoſito, aut omnino obſcurat, aut certē
poſt temporis intervallū. Ad hæc, oculos perſe-
quēdo lores grauiſſimos ē directio venæ hume-
ralis ſectio, aut medianæ, quæ ab ea derivat
eſt, intra horū vnius ſpaciū cōſpiciunt. Conari igitur
in omnibus affectibus præſtat, poſt modicū
mīſionē fanguinis, iteratō mittere, interim co-
dū interim poſt ridē: niſi quando ad animi vīq;
deliquitū, vacuatiōē ducere oporteat. Ad do-
lente latere aut pulmone, aut ſepro tranſverſo,
aut liene, aut icore, aut ventriculo, ſecta vena,
que per aſillas ad cubiti iuncturā pertingit, aut
etiam quæ illi & humerali eſt communis, luculē
tam vitūtatē adfert. Sunt etenim eptēs venæ,
ex quibus in cubito mitti fanguis, interior, ex-
terior, & media. Inter quas ſanē interior viliſ-
eſt, inis quib. inferiores collo partes panunt. Ex-
terior verō, in iis quibus, q̄ ſus ſuperiores ſunt:
vt facies, aut caput. At media, medio genere am-
bigue, quum inter vtrag, verſus anteriore mā-
num, ſuos ramos producat. Quare ſi vena quæ
parti affectū propria eſt, aliquando fuerit obſcu-
rior, cōgaſq; ob id aliquam mediaram incide-
re, conare vt quæ a propria diducit, eam po-
tius pertrādas. Interdum etiam, eas quæ in ſe-
riore flexura cubiti ſunt, nempe que in vlna cōſi-
ſtūt, nihil prohibet venas ſecare, ſed ramē recto
tramite particulis affectibus cōreſpondentes: idq;
ubi venæ quæ in cubito ſunt, non appareant. I-
quidem diutius cuiusdam economum, oculo-
rum maxima inflammatione, atq; fluxione a ſi-
ſtēt, quæmocuiſſimē in priſtina ſanitate re-
ſtūi, detractis primū ex humerali vena, libris
fanguinis ternis: ac dein, modico interpoſito tē-
pore, alia. Quæ ratione, ſoluta phlegmonē, po-
ſtea in palpebris reliſta aſperitatem abſterſi, al-
quo ex medicā ſecis mordacibus: quod neunq;
egret ferre potuiſſet, niſi fuiſſet prius evacuatus.
Siquidē acia omnia medicamenta parti cuius
admota,

*Sanguis in
q̄ applicat
difficilis est
ut curat
non.*

*Sanguis in
primis ē
doleſſe, ut
vlna laborat
etiam, clauso
non ſanct.*

*Sanguis in
vlna per nare,
quoniam p-
primis.*

*Liens affecti
conſiſtēt n-
ad ſe ſup-
mano cura
annularem di-
gitum.*

*Vacuati qd
ſe ſi in
dū poſſit.*

*Morbus q̄
ſecundū vln-
in cubito po-
teſſe.*

*Quoniam lib-
ro cōſpici-
liberatus eſt
fanguis in
venam.*

*Venerat ali-
i quæ in ph-
aſſiſſima ſit
ſecunda.*

*Vena in in
bilio cōſpici-
tar, iuxta re-
tenu, quæ lo-
mordet q̄, &
media.*

*Vena cubiti
ſecunda poſſi-
in vlna ob
diducit ſunt.*

*Vena in in
bilio cōſpici-
tar, iuxta re-
tenu, quæ lo-
mordet q̄, &
media.*

*Vena in in
bilio cōſpici-
tar, iuxta re-
tenu, quæ lo-
mordet q̄, &
media.*

Arteriam inter
indicem polle-
cine: quoniam fo-
cuffus Galeam
ab infomnis
monitus, libera-
tus est dante
ne praecluderet
dolor.

Arteria in mal-
leolo diffecta,
durum causa
doloris fuit.

transversim fecantes. Ego verò aliquando moni-
tus per quendam infomniā, secui dextrae manus ar-
teriam, inter indicem & pollicem sitam: permisi
ut inde fluere sanguis, donec lusteri sponte: sub-
itoq; durum mihi extinctus est dolor, qm
illa maxime parte erat fixus, qua iecur sepro tras-
verso committitur. Minus etiam de Perga-
mā, i diuino cruciatu lateris, similiter liberatus
est, arteria in summa manu incisa, idque monitu
infomni. Porro alteri, cui ex vulnere in malleo-
lo inflecto, diffecta fuerat arteria, sanguis qui-
dem cursus haud quiescit, donec ipse dissecui to-
tamque medicamentis ex aloē, māna, ouorū albu-
mine, & leporis pilis imposito vsus, absq; ancu-
rariare viciū ipsum curauit. Vix aut ille proflus
sanus relictus est a cox dolore, quo iam deu fue-
rat exiguis temporum intervallis vexatus.

GAL. DE REVULSIONE, CUCURBITULA,

de hirudinibus, revulsione, cucurbitula,

& scarificatione, libellus.

DE HIRUDINIBUS.



Hirudines af-
ferendo, alen-
do, & applican-
do ratio.

Vx hirudines sunt recte capte, eas
diem vnum aliterare oportet, pau-
culo sanguine in passum exhibitio.
Sic enim, prius earū venenū ex-
primitur. Pars autē cui iam admo-
neri debet, nitro prius perficitur, aut vnguibus scilicet
patur: nam sic propius eam apprehendent. Inu-
ciendae autē sunt in aqua tepida vas parum, la-
tisq; oris: deinde spongia eas comprehendentes,
viscositateq; ab eis detergetes, tandē manū ap-
plicabimus. Vbi autem adhaeserint, infundendū
particulā oleum tepidū est, ne scilicet refrigere-
tur. At si manibus aut pedibus admoventes sint,
ipsam partē, aquae cui insunt sanguisq; immit-
tere oportet. Quod si parum depascatur, for-
sice caudam praecidit, secundū rectitudinem si-
lamentorū. Nam effluente semper sanguine, tra-
here non desistent, donec saltem, aut cinerē, ipsa-
rum ori insperferimus. Vbi verò deciderint, cu-
cubitū venenū est avellendum, aut pars fouen-
da ex spongia. Quod si particulā emorfa lachry-
met, cumini, aut isarinā in spargito: superq; lana
madidatā oleo paulillo, involuit. Sin sanguis
erupit, lintea ex aceto iniuncta, aut gallam visā,
aut spongiā liquidā pice madentē, posteaq; vi-
strā imponito. Sciendum autem est, hirudines
haud eum qui in profunda est sanguine, sed tan-
tum quo caro est imbuta, exvgerē. Vtriusq; p
cucurbitulis: detrahimūsq; ipsas, vbi dimidiā
sanguinis partem iam extractā cōsumimus. Pro-
hibemas autē, & nō permittimus effluere, quo-
visq; quod satis est evacuetur: quandoquidē par-
ticulā tū a sanguisq; ipsi natura frigida, rum
ab aëre nos ambiente refrigeratur.

De revulsione.

Vehementissimos humorū influxus remediis
revulsivis prohibemus. Quālia sunt, incombē-
te in pectus aut in ventrē humore, ad manus re-
tractio. Vomitus, vbi deorsum decubuit. Sicut in
vomitu, p aciores clysmis revulsio. Duo verò
hæc momenta, quæ ad superiōrē inquam ven-
trem, & inferiorem vergunt, ad vrinā, sudo-
resq; revelles. Quin & vrinā, ad sudores, & deie-

ctionem trahitur. Revulsorū quoq; auxiliū est,
iuxta mās cucurbitula admoda. Ceterū
hypochondriis affixa, sanguis ad nares impē-
tū revocat: sicut & immo dicū ex vtero effluxū.
Porro vergētes ad caput aut viscera humores ex-
trahunt acia in sinus imposita medicamina. In
summa, revulsio mōdiē est, humorib. sursum
fluentibus, deorsum: deorsum verò, in contrariū.
Rursus, intrō vergentibus, foras: sicut si foras
raunt, ad interiora. Similiter si ad dextram inci-
dent, ad sinistram: ad sinistram verò abeuntibus,
in partem adversā. Sic quæ retrō eodemq; ante-
riorē verò ante, retrō revocabis.

De cucurbitula.

Cucurbitulae iis qui antē evacuatī sunt, cōve-
niūt. Nam in plethoricis, minimē sanē ipsi vti-
mur. Eadem ratione neq; in cerebri aut menin-
gū phlegmonis incipientibus vtiur cucurbitu-
lis: sicut nec alia in parte vlla phlegmone obfec-
ta: verū vbi nihil præterea etiā iussit, facitq; to-
tum corpus antea vacuārū, atq; opus nobis tam
sit, aut movere, aut amoliri, qd in phlegmone
obfecta particulā infixū est, aut deniq; foras ex-
trahere. Porro dum affectus etiā molli sūt, haud
in ipsis iam laborare occipiēb. patitur, sed in
eis q illis continū sunt, revulsiois causa est cu-
cubitū imponēda: in pectus aut vtrūq; repel-
lentib. est. Cucurbitula potius est evacuatē materiā,
dolorē solvere, minuire phlegmonē, inflationē
discutere, revocare appetitū, ventriculo infir-
miorib; recuperare, animi liberare deliquio,
ab alto fluxione transieritē resiccareq; sanguinis
eruptiones cohibere, facultates mentium corru-
ptices extrahere, ac deniq; mēses ipsos levare.

De scarificatione.

Scarificamus partes corporis aut phlegmone
scitrhove tentatas, aut tensas, aut dolore vexa-
tas, aut fluxione affectas, sed q iam resunt: aut a-
cri imbutas materia, aut vbi extrinsecus aliqua
vulnera facultas in corpus incidit, aut vbi mate-
riā ex alia parte in aliā traducere est animus. Vel
tutura scarificamus affectū caput, aut materiā
in corpore exvndantē minuire statutes, ponēsi
mū vbi exvndatis, pvenit a sup pressa materia,
q solēnter evacuari cōsueverat. Sic suppressas le-
morrhoidib. scarificamus crura, prius ea per spō-
giam fontes calida. Nam si prius venā incide-
re in anno, haud expedire arbitror, quū vna cū
sanguine viralis exhausta spiritus. Prodest autē
scarificatio & oculis diutina fluxione afflicti:
capitis affectibus, quicq; pectori atq; dorso eve-
niunt: ad lix angis, atq; impactus humoribus.

GAL. DE PURGANTIVM medicamentorum facultatibus libellus.



Adem de causa medici vetustissimi
pauas opinionis reliquie irrepre-
hensas vident, quā gravissima etiā
delicta antiquissimē legatos im-
punia fuerūt. Quū n. eo tempore
minor esset malitia hominū, ut qui nec maxima
crimina perpetrare aggrediebantur, nec man-
ifestissimis impudentē contradicere, quomodo ali-
quis punitionē iis quæ nondum admitta erant,
prescriberet, vel redargueret ea quæ nemo pro-
fus

Cucurbitula
hypochondriis af-
fixa, sanguis
ad nares impē-
tū revocat: sicut
& immo dicū ex
vtero effluxū.
Porro vergētes
ad caput aut vis-
cera humores ex-
trahunt acia in
sinus imposita
medicamina.

Cucurbitula
vtriusq; est
corp' est ali-
di tractatus.

Cucurbitula
vtriusq; est
corp' est ali-
di tractatus.

Scarificamus
partes corporis
aut phlegmone
scitrhove tentatas,
aut tensas, aut
dolore vexatas,
aut fluxione
affectas, sed q
iam resunt: aut
acri imbutas
materia, aut
vbi extrinsecus
aliqua vulnera
facultas in corpus
incidit, aut vbi
materiā ex alia
parte in aliā
traducere est
animus.

Scarificamus
crura, prius ea
per spongiā
fontes calida
aqua. Nam si
prius venā
incidere in
anno, haud
expedire
arbitror, quū
vna cū
sanguine
viralis
exhausta
spiritus.

Hirudines ut
depascantur in
exhibito, ut
pascantur in
tenda esse,
Hirudines autē
lib, sale aut cū
re ipsarū are re-
spert.

Hirudines iam
delapsa, cucur-
bitula est parti
admoventi.
Hirudines san-
guinem lārim
eodem surgere.

Hirudines na-
ture esse frigi-
das.

Revulsio me-
di danti.

Delicta gravi-
sima erant
quæ nemo
proferret
la reprobos.

*Præstatum in
de v. res. ff.*

sius dixisset. At quia temporis spacio eò crevit
hominū prauitas, vt nihil nō aut facere, aut dice
re auri sint, legū quidē latores multas punitio
num rationes nouas adinueniūt, quibus facio
rosos plectant: veritas autē studiō, varias con
tra sophistas reprehensionū species excogitat,
quib. ipsos coſtreant: id quod nō impræſentia
rum quodāmodo facere cogimur, improbanū
eos, qui medicamētis purgantib. vim attrahē
tricem humorū quos euacuat, in seſe negant: muta
tricem verō quāddā omnium ex æquo illorū, quē
ipsis appropinquat, eis tribuūt. Oya nimirū ſa
lutaritate aiunt medicamentū quod ſtaū efficit bi
lem, quē cum humorē contigerit, hunc in pro
prium ſui ſpeciei mutare: vocariq. medicamentū
id cholagogū, quod bilem ſtaū & efficit, & mo
ueat: aliūq. ſimuliter medicamētis ſua eſſe iudi
cata nomina, nō quidē ab humorib. quos natura
liter vacuant, ſed ab iis, quos ſuo contactu effi
ciunt. Ex cuius ſanē opinionis aſurditate ſequi
tur, ſiue bilem ducē, ſiue pituitā, ſiue atrā bilē,
ſiue ſeroſam humiditātē, aliquis medicamentū
uſumperit, vniuerſos ex venis humores vacua
ri. Neq. alia ratio purgatio ab huiusmodi me
dicamento petita, diſſert a ſanguinis euacuatio
ne per venę ſectiōnē, quā quod in hac quidē,
ille quilibet prius erat, excernit in purgationibus
aut, inalteratur, nō colore tantū, ſed etiā conſi
ſtentiā: id quod maxime ridiculū ē. Siquidem
per detractiōnem ſanguinis quāliter omnes,
qui in venis ſunt, humores vacuant. Per purga
tionem verō (quę ſcilicet ſanguinē ipſum purifi
cat) non quē omnes, ſed unus aliquis, præci
puūq. iſa, ad quem naturaliter educendū medica
mentū ipſum eſt aptum. Atq. hæc ſana exiſtit opti
ma Aſclepiadæ ſententiā, cui etiā ratio ſimul et
experientiā patrocinant. Nam ſi ex tribus ab ſyſe
ſe laborantib. morbo arquoat, vni quidē ſan
guinem detrahās, alteri autē medicamēt quod a
tram educit bilem exhibeās, tertio deniq. prop
rie pharmacū eliciens diſſuſam illam bilem per
corpus, certē duo illi priores longē deterius ha
beant: tertius autē, cui exulſum medicamen
tū fuerit familiaris ſucca attrituū, nanctum co
lorem recuperabit. Atqui iuxta illorum inſatiā,
perinde erit ſiue miſſione ſanguinis, ſiue me
dicamento quod bilem ducat, arquoat morbo la
borant in ania. Idem etiā & in reliquis mor
bis eſt in eundē iudiciū. Igitur opinio iſa, ipſorū
valere iuſſus, ſingula medicamēta purgantia in
tū familiarē humorem trahunt: poſtea verō il
lum qui vt ſequatur, habilior atq. aptior fuerit.
Exempli gratiā: medicamentū quod ſtaū bili du
cendū eſt, primo quidē illam expurgat: dein a
quoſam humiditātē: pituitam tertio: mox atrā
bilem: vltimō deniq. ſanguinē, quod ſit in anar
te familiarisſimus. Reperit tamen aliqua me
dicamina, quę ſtatim ab iniſio ſanguinē ducant:
ceterum iſe nemo vteretur, quādo quidē hoc iu
gulare eſſet hominē, non purgare. Siquidē pur
gantia, hoc nomine talia dicuntur, quod repur
gent ſanguinem ab illis recrementis iam dictis.
Quare inter deleteria, id genus omnia medica
menta annumerant, quę ſanguinis euacuatio
nem, per venas ventris, & inſtillationē, moliant.

GALENI PERGAMENTI, QVOS purgare, quælibet medicamentum, & quan do oporteat, liber vñus.



Vi ſano ſunt corpore, purgationē
grauiter ferunt. Nam quū purgans
medicamentū familiarē ſibi humo
rē attrahere deſideret, ſanctum eo
deſtituitur, ſanguinē & carnes eli
quat, conſumitq. vt quod illis, propriū eſt, trahat.
Poſtq. & ſani quidē ſunt, prius ægrotauerūt, niſi
fuerint vacui, in anin vere inſerere debent: idq.
vel ſanguinis detractiōne, ſi plethorici corn
pant morbis: aut purgatione, ſi facti ex corrup
tione aſſigant. At melancholia, cancer, elephā
naſis, ceteriq. id genus affectus q. ab humore a
tro proficiunt, atrę bilis purgatione indigent:
quā non vere rantū, ſed autēno etiā ipſe moliri
coſueui. Iam comitiales morbi, apoplectici, lu
pinofici, vacuationē pituitę poſtulat. Articula
res affectus, qui quidē val cum inſigni calidita
te aſſigunt, bilioſorū: qui aut cum tumorib. frigi
dis, pituitorū vacuatione iuuant. Quādiſti
uo tempore tertianis febrib. ſemper coſueui ſoli
tus, iam multis annis nō febris circuit, quid bilis
ſtaū purgatione ad finē veris a nobis admini
ſtrata, illi proſpectū ſit. Sicu. ſatus eſt tales va
cuare: quemadmodum cominales, articulares,
melancholicos, quib. ob humores craſſos ægro
tant, in eunte vere melius vacuant. Ceterum lu
mores craſſos & viſcidos prius attenuare et inci
dere oportet: meatūq. p quos tranſiunt, atq.
trahunt, aperire, ante medicamēt purgatiū, ſi
purgatio modis omnib. optima ſit futura, præ
ſertim in iſis q. veratrū aſſumit. At verō q. ægrę
ſuperiora purgant, niſi prius reddantur habi
les, præparentur ad vomitū, minimē aſſumit
veratrū. Præparabunt aut medicamētis vomito
riis mediocrib. necnō cibo vberiori, & quiete.
Etenim nos radicula ex oxymelite propinqua
tas, quas ariditate pforatas, ac ramulis veratri
albi tranſfixas, p totū diē utq. noctē reliquimus,
Arque eiſumodi ex elleboro facta purgatio erit
imbecilla. Verū q. anguſtū habent pectus, eoq.
etiā cōpreſſum, inepſiſſimi ad purgationes exi
ſtunt, quę p vomitoria medicamēta ſunt, ac po
tiſſimū p albū veratrū: ſiquidē thoracis aliquod
vas, ipſis rumpitur. At bilis ſuprā, pituita p infer
na vacuari debet. Eſt quidō cōtrario modo acci
dat, ſi quidem in ventriculo pituitofus, bilioſus
aut in inteſtinis humor reſidet. Melancholicū
verō ſemper p inferiora vacuare oportet. Sic æ
ſtate quidē ſuperiores venient, hyme verō infe
riores mouere cōuenit, vt auctor eſt nobis Hippo
crates. Sed regionis etiā, anni tēporis, ætatis, cō
ſuetudinisq. nō exigua ratio eſt habēda. Siquidē
quæ (gratiū exempli) vomere ſoliti ſunt, facili
us purgationes ferūt p ſuperiora: quōd aſſue
runt, haud citra periculum: magisq. ex veratro.
Morbis etiā ſpecies examinanda ſit. Nā in hydro
pe, leucophlegmania, medicamētū qd pituitū du
cat, egemus: prius ſanē p inferiorē ventrē, dein
per vomitum, tertio per apophlegmatifmos. Vbi
nō, id quod redvadat, per vniuerſum corpus
diſperſum eſt, omnes vacuationes ſumemus.

*Sanctum purga
tionē grauit
ferant.*

*Vacuandi qui
ſunt vere inani
et, quomodo.*

*Arre bilis pur
gatione qui of
ſitue indiget.*

*Vacuandi qui
tūa qui mor
bi poſſunt.*

*Craſſis ſuſus
prius tenuis de
ſe quā cras
centur.*

*Vomitū quali
ter præparat
ægrę debent.*

*Vomendi tū
pi qui ſunt.*

*Hæc bilis per
ſuperiora vacua
ta p inferiora
moueri expor
tet: tūc autē
debet: vt aſue
la ſemper per
inferiora.*

*Hydropicū
vacuandi ratio.*

Institutiōis atq; id genus alia, quæ vehementer commouet atq; perturbat corpus, & morbi tum memoriam inuoluat, tum eius accessionē accersant. Quare omnia id genus multo ante sunt præcauenda. Quod si quando vbi illa præcesserint, subsequat dem morbi accessio, tum temporis puer peritus ab omni motu se abstineat, domus se se comminuat, ac victu valde tenui utatur, quo visq; corporis exacerbationis molestia prorsus destruat. Igitur inter veris incita (tunc enim prope cōnngit egs morbos moueri, qui per intervalla se deunt) puerū purgandū censeo, idq; purgatione mediocrī. Post purgationē autem, hæc victus ratione utetur. Mane quidē, vbi e lecto surrexerit, priusquam ad præceptores accedat, modicē inambulet, nō admodū tamē citato gressu. Dein vero visq; ad palestræ tepus, discipulis sitis ac eius more incumbat. Cūprimū autē illinc discesserit, vbi rursus inibulauerit modicum, sic ad prudentē pædotorib; committet. Quip pædotoris curatiois summa in hisce duob; est sita: nempe visū medicamentū olim tibi a me dati, et idoneis exercitationib;. Reliqua verō, tanq; præparatioes quæ dī ad ista existūt. Ceterū exercitatiois scopi, quo ad eā modū, sūnt hinc in pe vniū quāsi tangitur puer, quiescat: visq; corpus illius cōstet, necnon moderatē eructet. Quod si vltra hos terminos producat exercitatio, nō nihil tam attingit solida corpora, atq; labiliūdinē ipsam colligat: in articulis aut potissimū, atq; in musculis, colligationes congregat: vnde virū infirmis sequit: deinde vlcerosus sensus, quando æger cōtatur aliqua mouere particulā. Atq; hoc est, quod lassitudi appellatū. Scopi autē exercitiorū, quo ad qualitatē, in eo præcipue cōsistunt, vt inde omnes corpōis partes, & caput præsertim, & ventriculus, roborent: potissimūq; illar partes, quæ ad os ipsius pertinent. Quum igitur vehementes exercitationes caput replent, ad illū illud abstinere præcipio. Quibus si quid o sit opus, erecto capite cōstitutus partes inferiores cōmoueat, & potissimum crura. Verūm a paruis tardisq; motibus pædotori ba orsus, ad vehementiores & celeriores ipsū puerū conducatur. Sed & frictio exercitatio quædam existit, imbecilliorib; præsertim corporib;. Imō nonnūq; si sola æ decenter fuerit administrata, nullis alijs præterea morib; indiget. Proinde primū linteis corpus rubefacere oportet, a superioris ad inferiora sensim manus deuehentes, a brachijs manib; sumpto initio: ita dein de ad pectus & ventrem est procedendū. Postea verō & crura exactus fricanda sunt, vbi aliquid huc a superiorib; deluatur. Vltimō denique ipsū caput est perfricandū, si absq; aliqua pingitudi ne admittet frictio. Nam ad ipsū statim accedere, admodū periculosū existit. Si verō oleum in frictione admooueris, nihil prohibet caput simul cū alijs membris fricari, ita vt hic quidem caput fricet, aliq; verō duo pectus & ventrē, 60 duo item aliq; crura: atque eodem pariter modo post exercitatiois: imō & sic magis simul membra omnia fricare cōuenit. Nam citius hoc pædoto cōquiescit corpus, & minus refrigeratur: cuius est non leuis habenda cura. A laucris autem vt

plurimum abstinere cōuenit. Nec palestram cōsistim puer ab exercitatiois egressatū vbi ipiritus exacte cōquiescit, & quæ exercitatiois sequis perturbatio prorsus sedata fuerit. Tunc vero caput linteo diutius est cōfricandum, sepiusq; pectine vtendū. His sic peractis, ad prandium debet accedere, in quo aliquid olerū ventrem molliendū, aut falsam toror, aut pisanā, aut oliuā, vñ cū tertia panis parte ipsi offeratur: in censā tertias duas partes reliquas cū valentiorib; opsonis reponentib; nobis. Ex oleis itaq; nec lactuca, nec malus, nec amplic; nec bito, vt prorsus abstinere, inbeo. Verūm nō semper idem, sed modō hoc, modō illud, moderatē sumendū est: nec diutius eorū visū assuescendum. Huius autē generis est & betā, & brastica. Nam & hæc modicē degustare opus erit. Pari ter & porrū, & apium, & smyrnā aliquando cōducet seringere. Ira ex aummalib; etiā fructibus, quicūq; non omnino quidi, & natura cōstitū diffciles sunt. Igitur mora, & quæ præcocia appellant, & ficus, & si qua alia id genus sunt, citra nullū descendū: ad līx & sanua cucurbita, mollis molliū olerum est inferior: parimodo & scyiopepones. Præterea & vuis maris, & mātis, & piris, & palmulis potest vesi nō nunquā puer: parē tamē, & rareo. Quos fructus in arborē, & domi maruisse priusquam edantur, oportet. Pituitosa aut cibaria summopere illi vitanda sunt. A fungis etiā vt omnino abstinere, consulo: quem admodū & a rapis, & a reliquis alijs, quorū radix est esculenta. Sunt enim hæc ex his quæ crassiores humores pignit, & per diffcultate intra corpus elaborant: ex capris quib; dī, quæ non nihil aeris & calidi in seipis cōtinent: quæ admodū pabinae & raphani. Verūm raphanos ex aliquo dieiā intervallo degustare nō prohibeo: horro tamē, vt prō vinib; a pabinae abstinere: & magis etiā a rapis. At eorum cibariōis copiosius vias, salubres erit, quicūq; acris quippiā atq; incidentis obstitit, citra insignem paul succi notam, aut odorem ali quem, capiti adierit noxam valentē. Sunt autē & in hoc genere, quæcūq; ob caliditate caput replent, si vt vinum, sinapi, petiofellū, pabina ca, cypa, & smyrnium. Hæc siquidem plus quā par est, excalciasit, vitiosioq; succos producat: At oxymeli audeat vtendū est: ex quo etiam capitis potest sumi, paululo olei infusitū. Quod si acetum ipsū scilicet fuisse, oxymeli longē magis inabit. Ceterū si oxymeli bibere puer velit, temperet copiosior aque: & hyeme quidē, calidum: ætate autem, frigidum offerat: sic siquidem præter cetera, maxime si alim sedat. Permittere autem ei pāllam & in tempore cōuenit, quæcūq; nō insigni noxa ipsū possint afficere, ne cū atque intemperatē eis potius, multo magis lēdat. Quippe voracius & largius implent us quæ desiderant, qui palmis eis vñ prohibēt. Porro a prandio, vbi modicum quid interquiescent, priusquam ad studia literarū accedat, non nihil ipsū lenē inambulatione ptecipio. A quibus vbi redierit, rursum ante cenam deambulet modicē: ac deinceps panis offerantur portiones reliquæ: aliorum verō

*Epileptici est
abstinenda a la
uacris.*

*Morbi qui per
interualla re
deunt, vere præ
cipiō moueri.
Epileptici esse
autem vera mu
ta purgandos.
Epileptici po
tius uictus ratio
cōuenienti.*

*Exercitatio re
cedens a modis
et aliquot capu
ta.*

Lassitudo quid

*Exercitationes
vehementes ca
put replent.*

*Frictio est exer
citatio, imbec
illiorib; præter
ea: a superiorib;
fricanda epila
pota ratio.*

*Fructus epila
pota a quidi*

*Fructus epila
pota a quidi*

*Fructus epila
pota a quidi*

*Cibaria epila
pota a quidi*

*Oxymeli epila
pota a quidi*

*Oxymeli epila
pota a quidi*

*Pueri ut per
modum sit
visu alio, quod
nō infirmis la
dunt.*

*Epileptici qui-
bus vesio carnis
bus debeat.*

*Sau extremas
partes conferre
epileptici.*

*Conditum
simplex ex quo
bus confit.*

*Legumina con-
grentia quilo-
pice qua.*

*Medicamentu
scilla ostellum
offerre epilep-
ticu.*

*Oryzites dif-
formitas.*

*Scilla facit
expandi ratio.*

*Scillium me-
dicamentu
epileptici.*

*Scilla ante in-
fectum, off-
monea utraque*

vnumquodq. Verum carnes omnium ferè vola-
tilium conveniunt, exceptis iis quæ in stagnis de-
gunt. A quadrupediis autem omnium carnibus
abstinere debet. Quod si & quodcumque huius opus sit
viti, suis quidè domesticis extremis atq. ventre ve-
scarur. Sed sylvestris etiam suis carnibus vti po-
terit. Hædæ etiam gustare licebit, atq. nonnun-
quam lepores, probe tamen conditos, aut citra
nidore assatos. Simplex condimentu sit ex aqua,
quæ anethum, porrum, oleum, atq. saleem recepe-
rit. Quantu verò ad marinâ pertinet, o omnia res-
tus intesta sunt perniciofa. Ex piscibus autè, sa-
xatiles ceteris omnibus præstant. Torpedo au-
tem sola ferè ex cartilagineorum genere illi con-
veniens est. Inter legumina, ptisana quidem pri-
mum locum obtinet: deinceps lentes, alica & pi-
sa conveniunt: reliqua noxia existunt. In vniuer-
sum autem, quæcumq. glutinosa sunt, & crassa suc-
ci, quæcumq. infans, & excrementa gignunt, necnò
quæ ægre coquantur, ea prorsus vitare debet. At
verò medicamentu confectio ex scilla, post purga-
tionem, quæ adventante vere molendi est, vte-
rit singulis diebus, priusquam palæstram acce-
dat. Et sanè, nisi valde rebellis sit morbus, spero
quædraginta diebus spatio ipsum, sola eius me-
dicamentum ope, prorsus solum iri. Post purgatio-
nem tamè, antequam eo medicamento vitatur,
abstinthium & semel & bis in portu accipere cõve-
nit. Ceterum oxymel quod acidissimum quidè
est, quartu ad mel aceti portionem habet: quod
verò dulcissimum, octavam recipit. At crassus &
glutinosus existensbus fuscis, acidior atq. mera-
rior est vtendum. Sin autem minus sint tales, di-
lutioni, atq. dulciori. Quo pacto autè ipse scillæ
succum excipiam, iam adiciu. Primum vase me-
liore præparato, in ipsum scillam frustatim ma-
nibus cõmunis iniicio: deinceps angusto oper-
culo, cooperiens, & extrinsecus corium vniuer-
so corpori vasis circumducens, & diligenter li-
gans, in locum omnino ad meridiem cõversum
repono: ita tamen ab aquilonis flatibus cõmu-
nitum, vt nullatenus ab ipsis perficiatur. Id autem
eo anni tempore efficio, in quo exoritur Canicu-
la: nempe ante illius quidem ortum, viginti die-
bus, postq. ipsum etiam totidè. Tunc igitur per
aliquot dies paulatim sitū vasis permuto, vt æ-
quæ quacumq. sui parte incaleseat. Quo tempore
exacto dissolvens vas, in eo scillæ corpus perim-
de ac decoctum in venio, atq. adhuc ex ea humo-
rem quandam effluere, quem excipiens optimo
melle condio. Erhuius quodidè plenū cochlea-
te vnum, infansbus quidè paruum, & adultis ve-
rò magnum, exhibeo. Quinetia quod totius scil-
læ corpusculum superest, exquisitè contundens,
& cum melle lenigās, eius quoq. cochleare vultu,
vt prædictum est, porrigo: istud tamen viribus
est longè inferius. Qui verò scillā in aqua coque-
ret subiguit, plasmā illius vires dissoluūt. Quemad-
modum quicunq. ex aceto eam decoquar,
calidum quidem medicamentum
abvnde efficiunt: at nervi
sanè non inno-
xium.

GALENI PERGAMENTI de Ptisana, liber unus.



Vandoquidem cõposita quædam
res est tum ptisana, tū eius cremor
(ex hordeo enim probe decortica-
to, & aqua, & certa quadā cõficio-
ne cõfictur) prius de illius partib.

summariu aliquid dicere est animus, q̃ de eius
cõpositione atq. vñu differā. In primis igitur ad
conficiendā ptisanam, aquam optimā deligere
oportet, quæ nimirum nec olfactu, nec gustu,
vllam extraneā qualitatē referat. Præterea sit pel-
lucida & pura, operæ precii est: minimèq. limo-
sa, sed veluti exactè colata. Porro huicmodi
aqua, quo ad vñum quidè, sans erit accommoda:
natura aut ipsa, neq. hoc pacto prorsus syncera
suent, sicut nec vllum aliud sensibiliu elementu
rum. Erit tamè tenuiui partiu, atq. ad cõfictio-
nem, distributionemq. prõpta: nec tantum à na-
turali calore alterabitur facili, verumetiam igni
externo admota, pronius calebit: quod etiam
testatur Hippocrates, aquā quæ calit citò, & ci-
tò refrigerat, leuissimā esse existimas: idip̃ non
æstimatum pondere, sed quod partiu tenuitate
prepolleat, faciliq. cõeratas qualitates recipiat.
Itaque huicmodi aqua, frigida & humida,
proprieq. omnino aqua censenda est. Hordeum
aut ipsum, refrigerat excipere: habet tamè pñi-
hil detergens & statuosu. Quod si infusiat par-
ticulatim, illius extremus cortex fursura ceus, &
siccior existit, & magis detergendo accomodum.
Quod verò intus, eui carnis vicem gerens, atq.
nutritio idoneu habet, deterget quidè & id, sed
fursure longè minus, & pariter quippiā statuosu
in se cõtinet. Quomobrem fursure quidè absterge
minus, valentius aut hordeum. At verò, quod hor-
deum ad ptisanā conficiendā eligimus, esse ple-
num oportet, nec admodu recens, neq. antiquu
valde, & quod omnis asferit: qualitas sit ex-
per: in tumoremq. dum coquit, attollatur in-
gentè. Vbi aquā & hordeu delegeris, ipsum hor-
deum crudum in aqua præmacerato: dein de ita
manibus versato, quovisq. deglutit tenuis mē-
brana. Postea rursus valentius etiam manib. eo-
visq. cõfricato, vt quicquid paleaceu inest, deci-
dat: nisi quis forte velit eam magis detergerentem
efficere: tunc siquidè sanius fuerit ipsum vñu cū
membrana decoquere. Ipsius aut decoctio sit ta-
lis, vt primū quidè ebulliat plurimu: postvires
aut lenio igne, quovisq. abvnde in succum verita-
tur. Hac enim ratione percocta ptisana, quicquid
inerat statuosu, deponit, resinguit sitim, deter-
get, & bluit, facili coquitur, atq. absq. asferitione
aliqua humectat. Iam verò quum cetera vñi-
da quo ad gustum nullam sanè suavitatē obti-
neant, ptisana gustu nescia quid suavitatis & blan-
dit affert, & præsertim ægrota. Facili etia in tho-
racis partes descendit: atq. ad deiectionem, atq.
distributionem, accomodata. His de causis maxi-
mè ex vñu est ardentibus febris: quod nimiru
eis quacumq. ex parte obstitat, refrigerans & hu-
mectans, necnò putridos humores detergens,
& corpori non exiguum nutrimentum suppedita-
ns: eos verò humores qui ex dimidio putru-
runt

*Ptisana ex qua
bus confit.*

*Aqua optimā
quale nam q̃
si debeat.*

*Elementu mol-
liu esse prorsus
sincrum.*

*Aqua quæ sit
lenissima.*

*Hordeum refri-
gerat, excipitq.*

*Hordeum cõf-
ectio ptisane
apit, quale ad
esse debeat.*

*Hordeu deter-
gendum ratio.*

*Hordeu bland-
quænam de-
corticat ptis-
nam magis ab-
stergenti efficit*

*Ptisana sanā
sua.*

*Ptisana maxi-
mè ex vñu est
ardentibus fe-
bris.*

runt concoquens, atq; in optimum succum permutans. Præter has itaq; vires omnes, nullam habet aut astrictionem, aut stomachi subversionem ptisanam. Nam astrictio quantum ad ventriculū roborandū idonea est, tantū ad inrastrandos humores præp̃a: at ea humiditas quæ quoddā crascescat non habet, facili subversione molitur. Pti-
 sanæ sic cōfectæ, læues, æquales, atq; ex æquo omnes partes continuæ & vnitæ existunt. Ceterū nec eam iis qui in discrimine sunt, porrigere cōuenit: nec iis q̃ veng sectione, aut purgatione, aut clystere, aut fomento indigēt: nec eis qui excrementa plurima in regione ventriculi con-
 gesserūt, aut ingenti dolore vexantur. Sed neq; in sicciſsimis etiā morbis eam dare cōuenit: quoddā scilicet valēioribus egēt potionibus quā sit ptisana, vt humectentur vberius. Tempus forbi-
 tionis opportunū tunc fuerit, quando æqualiter dispositum corpus redditum est: id quod rēritm morbo inclināte accidit. Porro morbi sicci sunt, lateris pulmonisq; inflāmationes, atque adeo quæcumq; morbi in thorace sunt, si nihil per excreta-
 tum excreant. At morbi qui circa iecur, & ven-

triculum, & intestina accidunt, tunc sanē sicci dicuntur, quum nihil excreant, aut dura, & non vt necesse est, neq; efflata digna. Siccitates verō q̃ in venis & arteriis consistunt, ex lingua & exte-
 riori cute noscuntur: pariter & affectus qui in ca-
 pite sunt, si nihil per palatum excreantur, aut na-
 res. Eadem etiā ratione, & inflāmationes & vlcera esse coningit sicca, ex quibus nihil per sa-
 niem excremitur. Igitur in huiusmodi morbis
 10 ptisanam minimē propinare conuenit, quoddā fa-
 tis eos humectare non valeat. At verō quando
 corpus humidius extiterit, aut ex pulmone ali-
 quid excreatur, tunc eis semper forbitionem au-
 gere, atq; adiicere oportet. Verū neq; ipsam sta-
 tum ptisanam offerre expedit, sed prius sanē eius
 cremorē solū, aut cremoris quiddā plus, ptisanæ
 aut parum, mox vtriusq; æqualiter: deinceps &
 solam ptisanam: idq; non ignorantes, ad corpo-
 ris robur & nutritionem, maximē conducere pti-
 20 sanam: ad faciliē verō cōstitutionem, atq; in corpus
 distributionem, cremorem ipsius.

*Siccitatem parti-
 colarem quibus
 nota deprehen-
 dantur.*

*Ptisana cur in
 sicco morbo ab-
 danda.*

Ptisana cremor

SECTIONIS TERTIÆ FINIS.

EPITOMES OMNIUM GALENI OPERVM SECTIO QVARTA.

ILLVSTRISSIMO ET REVERENDISSIMO D. D. PETRO
 PACHECO, GIENENSI EPISCOPO, ATQVE S. R. ECCLE-
 SIAE SENATORI VIGILANTISSIMO, ANDREAS LACV-
 NA, Secobiensis, Doctor Medicus, Mules San-
 cti Petri, S. P. D.



*I*n corpus cretum sortitur homo, sic animum ad sublimis erigeret, neutiquā caduca-
 rum (vt solet rerum teneretur admiratione, Pater observandū, sed perpetuū & diu-
 na suspiceret, & assidue in eorum exerceretur meditatione. Ceterum quum ita sit natu-
 ra comparatū mortalibus, vt pars quiddā viciū, ac veluti captiui ducti à suis cupiditati-
 bus, illi tantum inferuant: pars autem adeo ipsam stupidiq; sint, vt animā habeant nec ne, ignorent
 penitus: cōiungit sanē, vt per pauci eorum sursum aspiciere queāt (lux enim lippos maximē offendit)
 sed omnes ferē humi serpāt, instar crocodilōrū. Id quod certē est in causa, vt si quando videant canē
 transilientē per circulum, aut tripudiantem simiam, aut deniq; fœdissimū Scythiam supra funem sal-
 tantem, vniuersi sui ipsorum obliti, consertim ad id genus spectacula consulant, atq; ea quiddā admi-
 rentur stupefacti: negligant autē & alpernentur cōditoris illius nostri opera: quæ si, vt decet, expen-
 derentur, omniū spectatorum animos in maximā admirationem sui, cōmendationēq; conuertere-
 rent. Nam vt impresentiarū præterea ordinatas illas orbium celestium lationes, constantissimos or-
 tus syderum, vicissitudines temporū, animaliumq; generationes & incrementa, quæ capium huma-
 num superant, de iis autem disserā quæ in diēs calcantur pedibus, quid obsecro admirabilius possit
 inquam cōtingere, quā ex eruce, nasturtij, aut alio vix perceptibili semine, oriri herbas bicubitalē
 ex nucleōq; aliquo exigno, nasci prodigiōse magnitudinis arborem? Etenim posteaquā semē in ter-
 ram, veluti in matrice quandam, coniectū est, attracti humorū copia intumescit, intumescēsq; rū-
 pitur, ac duo de se emittit germina: vnum quiddā, quo terræ adhæret, ab eāq; sibi alimentū sugit, quæ
 est radix: alterū verō, quoddā solem versus, à quo viuificatur, erumpens, ab vno caudice in varios tan-
 dem ramos diuiscitur. Atq; hic sanē plantarū est ortus: quas quidem vniuersi Philosophi & Me-
 dici, animatas esse dicebant, neq; id iniuria: quoddā numerū animantiū ritu gignantur, crescant, viuāt,
 atq; senio absumantur. Primō si quidem sunt molliuscula, ductilēsq; & tractabiles, vt infantes. Dein
 processu tēporis adulescūt, suāq; articulus roborantur. Postea verō iam cōsistentes, ubi crescere desi-

terunt, & remittuntur trahenti, & solida fructuum vbertate pinguescunt: donec tandem concedentes nature, hominum instar emescunt, atq; satiscetes dehiscunt. Reperitur etiam, vt in animalium generatione, sic sexus uterq; in stirpibus. Discernitur autem à semina masculus, quòd folia huius prius perminit, folijsq; semina sint minora. Quòd si masculus adeò còmmixtus sit seminae, vt folium mutuo se se còmpingant: aut si ex fragrantia masculi portio aliqua ad seeminà, venitori beneficio peruenierit, ipsius seeminæ fructus citò ad maturitatem perueniunt. Sunt aut stirpes vt cæteris rebus omnib. longè amoeniores & iucundiores visu, sic earum usus mortalium vitæ multis numeris necessarius: vt pote à quibus non modò alimenta ipsa, sed etià medicamenta, quibus vitamur ad profligandos morbos, multaq; alia pertinetia ad vitæ comoditatem, proficiantur. Vnde nò immeritò Marcus Curius, Lucius Quintus Cincinnatus, Marcus Valerius Corvinus, Cyrus Persarū Rex, aliq; viri grauisissimi, electi plantarū amoenitate, plurimū agriculturæ indulserunt. Quum igitur vndecim còmentarios Galeni de virtutibus medicamentorum simplicium: septem, de compositione pharmacorū secundum genera: ac deniq; decem alios de compositione medicaminū iuxta singulas nostri corporis partes (in quibus non modò vniuersæ dotes, ac facultates plantarū, sed varia etiam morborū genera, eorūq; absolutæ & curationes exagitantur) superiioribus duobus ad præcorū exemplarium fidem restitui sem, restituiq; contraxissem in methodum vt breuiorem, sic multò studiose aptiorē: statim equidè hos ipsos vngenti-octo còmentarios, Naturæ thesaurus quosdam opulentissimos, tibi, Annistes Reuerendissime, nuncu-pare idq; nò vt ex hac ipsa dedicatione aliquid splendore accederet tuæ Celsitudini, quæ iam pridè ob insignem prudentiam, variam eruditionem, raram incredibilēq; clementiā, ac deniq; summā pietatem, conciliari sibi omnium bonorū animos, atq; extra omnē ingenij alacritatē posita: sed vt tui nominis fulgore illustrati, inirent multò maiore gratiam eruditōrum hominū sub tuoq; patrociniō, veluti sub clypeo Atacæ delitescerent, nò tam faciliè impeterentur à virulentis quorundā morsibus, quibus aliene famæ detrudere, & exercitiū, & summa voluptas est. Si quidem quum olim summi Imperatores & Principes, aduersus impendentes fluctus & tempestates fortune, còmunirentur literis: nūc ingenij artes & discipline, vt tuò prodire possint (proh dolor) fautoribus & Mecænatibus egēt. Ceterum si T. C. hasce nostras lucubrationes defendēdas suscepit, nulla inuidia, aut calumnia, in nos quicquā moliri poterit. Quòd si quæ barbarorum ac sophistarum cohors (hi namq; præcipui sunt, infestissimiq; bonarum disciplinarū hostes) accedat propius, vt facessat nobis negocium, consensit in pedes se conferet, vel solus nominis tui fulmine perterrefacta. Aded si quidem heroicis illas ac nonndū fatu laudatas virtutes tuas, quadam severitate gravitatēq; prudentissimè adornas (quod passim de te oēs prædicant) vt non minus tetris ac flagitiosis hominibus, terrori ac formidini sis, quam ingeniu omnibus admirationi. Quibus quidem rebus adductus Diuus Carolus V. Imp. Tridentinæ synodo te vnum inter alios omnes præfecit, vt singulari sapientiā tuā Ecclesiæ causam tuereris: sibi nimir per-suadens, te præsentē, nihil transactū iri, quod non pium, non æquum, non sanctum, non deniq; vni-versæ Christianæ Reip. maximè salutare futurū esset. Quam prouinciam adeò alacriter suscepisti, eaq; fide & pietate suam pacem, religionēq; Ecclesiæ restituendā curasti, vt. S. D. N. P. III. P. M. te inter purpuratos illos Patres censuerit tandem annuerandū: sentiens haud dubiè se nò minus accessu tuo illustratū Senatū illum Patrum amplissimorum, quam exornaturum amplitudinem tuam tam splendide, tamq; iusta pietatis tuæ, atq; integritatis corona. Quocirca Illustrissimi illi, Reuerendissimi, omnes collegæ tui, summo desiderio tenentur viderēdā T. Celsitudinē, in eaq; suos passēdū oculos: sed inter omnes præcipuè Illustrissimus & Reuerendissimus D. D. Franciscus à Bonadalla & Mendozæ, Cardinalis Cauriensis, mensq; Mecænas maximus. Qui quidem tuarū virtutū præco, vt est studiosissimus tui, iam velle vt morā rumperes, quòd liceret sibi ac cæteris fratri suo còspectu tuo, splendoreq; illu tam exoptato. Cui nec potuissem equidem (quod certò scio) rem vnam gratiorē facere, quam si hosce labores meos, futuros ceu testimoniu quoddam ærētissimæ illius necessitudinē, quā inter vos mutuo alius, consecrarē tuo numini: nec poterit Tua Celsitudo, quā si ipso singulari suo patrociniō dignetur. Deus Opt. Max. amplitudinē istā tuā, Annistes obseruandis. dum nobis quam florentissimā fruet, vt tum pietas, tum religio, tum bonarū literarum studia, sub tali coryphæo & protectore inualeant. Vale. Venetiis, ex ædibus Illustrissimi & sapientissimi Viri, D. D. Ioannis Furtadi à Mendozæ, in hac Rep. Oratoris Cæsarei vniuersissimi.

GALENI

PERGAMENTI DE SIMPLICIVM
medicamentorum facultatib. lib. I.

CAPVT. I.

*Simplicia me-
dicamentorum
exquisita ad
quod conferat.**Medicamentum
quid.**Nutrimetum
quid.**Medicamentum
plex quid.**Facultas quid.**Facultas est de
plex. Alia solu-
et et potestas.**Medicamentum
singulis pro-
pria quodam
facultas inest.**Efficitur facultas
sua quod
latet ex quib.
corpora con-
stant.*

Edicamentorum simplicium facultates exquisitè cognoscere, cum ad variorum compositionem, tum ad inventorum opportunum usum, admodum necessarium est. Porro medicamentum omne id dicimus,

quod alterare nostram naturam potest: sicuti nutrimentum, quicquid substantiam augere. Refertur enim vtrunque ad aliquid. At verò medicamentum simplex, & ipsum per oppositionem ad compositum nuncupatur. Estque id quod secundum naturam suam, syncerum est. At facultas, causa quaedam est effectrix: eamque partim actum, ut calefaciendi in igne, partim potentiam, siue futuro tempore: quali nimirum calefaciendi pyrethrum. Cum autem lingulis medicamentis propria quaedam effectrix facultas inest, aut purgatoria, aut vomitoria, aut alterius generis alia: nōque alibi demonstrauerimus, ex calido, frigido, humido, & sicco, corpora vniuersa constare, citè facultatum effectricium essentias (de quibus neque inter medicos, neque inter philosophos convenit) tum in alijs omnibus, tum in medicamentis, has ipsas qualitates statuimus.

CAPVT. II.

*Facultas indicanda reperi-
mentum sumi-
dum esse ab ea
re, ad quam di-
citur.**Aqua frigida
calfacere acci-
dit, in calida
superrefrigerat.**Calida & fri-
gida facultate,
que dicuntur.*

In primis autem ac maxime sumendum est iudicanda facultatis experimentum ab ea re, ad quam dicitur. Nam quā vim in homine aliquid medicamen habet, in alio animali eandem non necessariò sortiatur. Proximum est, ut quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primariò & per se. Nam aqua frigida calorem quandoque reuocat, cutem refrigerando contrahendoque: ad quod sanè consequitur reuocatio caloris. Rursum calida quoque ipsa refrigerat sæpenumero, digerendo excalfacientem humorem. Quæ igitur admota corporibus nostris, primariò ac per se excalfaciunt, ea sanè facultate dicuntur calida: si verò contrà refrigerent, frigida: non autem quod alba vel rubra sint, talis facultate sunt prædita.

CAPVT. III.

*Remini modi
candoris quid
regatur.*

Etenim quod ab initio ad finem vsque dum applicatum est, magis semper calfacit, aut refrigerat, id nō ex accidenti, sed ex sua natura est tale. Danda autem opera est, ut quodcumque medicamen in iudicium vocare velis, diutius hæreat applicatum, omnique sit alienum tum frigiditatis, tum caliditatis expertus, ne natiuam facultatem illius ascitina adulteret qualitas. Porro quædam tota substantia in sese mutuo & agunt, & patiuntur: quædam vna duntaxat, aut duabus qualitatibus. Ad hæc, alia quidem tenuiū partium sunt, alia crassarum: tenuium quidem, quæ faciliè in tenues comminui partes possunt, crassarum verò, quæ contrà.

CAPVT. IIII.

*Aqua omni ad
vniuersam
naturam.*

Si igitur primò aquam, quæ & cōmunissima vniuersis hominibus tam sanis quam ægris est, & ad vitam maxime necessaria, nec frigidam in-

signiter, nec calidam, corpori temperato applicueris: dein iis quæ natiua sint imtemperata: terribid, quæ aliquo affectu tenentur: temperato quidem admota, plurculo tempore omnino ipsum refrigerabit: imtemperato verò, citius quidem refrigerabit id quod frigidius natura fuerit, tardius autem quod calidius: semper tamen refrigerebit, cum videlicet talia existens, nequeat reuocare calorem, quem admodum summè frigida, quæ si quadrato, aut iuuenilis corporis nature paululo fuerit tempore admota, caloris molietur reuocatio nem. Sin aliter vtaris, semper refrigerabit: id quod etiam facit admota iis, qui simpliciter laborant affectu. Nam vbi affectus composiuit fuerit, contingit aliud primariò ad medicamentum fieri, aliud ex accidenti: ut licet cernere in phlegmone, quæ calidæ copiosæ fluxionis est ioboles. Siquidem quæ mo diè excalfacient pharmaca, dum superfluitatem evacuant, id quod affectum est, protinus frigidius efficiunt. Aqua itaque potabilis vtrouique videtur frigida: id quod non licet de iis asserere, quæ fulsures, bituminosæ, atque nitrosæ existunt. Imò verò neque marina ipsa, priusquam ascititium frigus summū acceperit, admodum refrigerare conspiciunt. Ergo quæ exactè ac syncerè aqua est, omnis alterius substantie missione vacans, ea necessariò ex sua facultate est frigida. Si qua verò per loca bituminosa, fulsura, nitrosa, aut aluminosa ita distillant, aliquid se cum eius substantiæ absterferit, mista iam ea est, nō autem exactè aqua. Quod si etiam ipsi aque potabilis igneam aut essentiam, aut qualitatē adieceris, sit etiam quodammodo compositam illam effeceris. Quinetiam aqua limosa, quali apud Aegyptum vniuntur, composita quadamtenus est: sed exasperata siccilia vasa optime percolata, quam purissima efficitur.

CAPVT. V.

Iudicat autem aqua gustu, visu & olfactu. Siqui dem gustu est pura, si omnis qualitatibus experta videatur. Visu, si syncerè & pellucidæ fuerit. Sic nec sapor, nec olfactus, odoratu vllam præ se ferre qualitatē debet, ut sunt quædam prauitatis extreme, quæ aut aciditatem, aut acrimoniam, aut falsedine, aut putredinem præferunt. Igitur aqua, quæ absque his est omnibus, vt ad naturā certè, ne ipsa quidem ad amarusimam syncera fuerit, sicuti neque aliud vllū sensibilem elementorū, sed vt ad sensum & visum, syncera est. Quæ itaque examinanda venient medicamina omnia, omnes extraneæ qualitates valentissimè aliena sunt.

CAPVT. VI.

Quod autem omnis aqua dulcis manifestè refrigeret, hinc discas licet, quod si cerè oleo liquearis, humidiusque ceratum confeceris, ac postea ipsum refrigeratū, largioris affusione frigide ablutum admoueris, valenter eos qui febre vrunt refrigeret, si hypocondriis supponatur: nec non omnem phlegmonem, herpes, carbunculos, erysipelata, phygetila, & breuitur omnes calidos morbos: id quod non contingeret illi per aliquam nuper dictarum aquarum, quæ calidis aduersantur affectibus, calidæ nimirum cum sint.

CAPVT. VII.

Ceterum quod aqua quoque potabilis sola sit

V u

*Aqua summè
frigida in quibus
calorem re-
uocat.**Aqua potabilis
frigida ex illis.**Aqua omnis
syncera, et na-
turaliter frigi-
da.**Aqua mista
quædam.**Aqua limosa
apud Aegyptum
vniuntur.**Aqua debet in-
dicari per visu, vi-
deatur.**Elementum pu-
rum maxime re-
fertur.**Aqua omnis
dulcis refrige-
rat.**Ceratum humi-
dum ablutis si-
gide, calidus o-
mnes affectus
refrigerat.*

*Aqua potabilis
sola est humida*

inter propolitas humida, ex eadem discis methodo. Nam si vlcera supra modum sicca, hac ita riges, statim admodum humida & mollia reddentur, cum alia aquae vniuersae vlcera deficeant, nonnulli quae enā ob scirmonia exasperent. Quin etiam sine ita, ductis aqua remedium est: ceterae vero, acerbior etiam istum relinquunt. Tum aqua inter cutem laborantibus aduersissimū est & poculum & lauari aque dulcis. Salis arum verō, nitrosarum, sulfurearū, bituminosarumque omnium, fauē peruitile. Inuitari aut potes, sicuti marinam, sic aliarū quamlibet, substantia videlicet admissa, quae in quaque vincere cernitur.

CAPVT VIII.

*Aqua natura.
Aquam feruē
bunt calore.*

Aquae igitur propria natura humida & frigida est. Ceterū summe quidem humectat, siue tepida, siue temperata ea sit: non aut calacit summe, nisi quae extremē ferueat. Quod si corpus aliquod eucratū, calida moderate perfundas, in ipso quidē perfusionis tempore, calidius simul atque humidius efficiēs: paulo verō post, id seipso evadere frigidius, nō tamen frigus, conspicies. Nam tamen humores qui in vasis, aliisque communibus spaciis sunt, per id genus perfusiones vniuersi exsiccantur, ipsa tamē valiorum corpora & vniuersum genus carnosum seipso humidius reddit. Quale exemplū, quibus ratione diuersa, licet videre in febribus: cum genuinas partes, quāquam adolescentes, magis liccas fortant, pluribus tamē excrements redundat. Hanc itaque humectandi vim solā, nunquam aqua deponit: neque, siue feruēs sit, siue enā extremē fugida, parte cui affusa fuerit, sicciorē efficit: quāvis ob evaporationē quae a calida perfusione excitari solet, perfusa particula nonnullis longē siccior videatur, cum praesertim vapor, humor sit extenuatus.

CAPVT IX.

*Scari partibus
quidem solida
sunt fieri, quare
materia autē
copios humida.*

Nec verō vique adeo absurdū fuerit, quod facile in ignem vertit, id calidū facultate putare. Vnū quippe ex his quae facultate talia dicunt, est id quod ex propria eius quod dicit materia, tale est facultate. Vt, si quid facile in ignem vertitur, id non actū, sed facultate est ignis. Nam hoc quod est facultate, ex aduerso est diuidi, quod est actū: sicuti & quod est per se, huius quod ex accidēt cōtingit.

CAPVT X.

*Vapor humor
est extenuatus.*

At quibus cōsiliū est, tutō a rebus extraneis, ad corpora transire animalū, videre primū debent, an tenuis sit essentia, an crassa, quod explorā dnm venit. Secūdo, an sibi continuū, denūque ac solidum: an intervallis interceptū, an rarum.

CAPVT XI.

*Ignis potens
est, quod facile
in ignem verti
tur.*

Eorum autē quae in consensio est facultate esse calida, nullum omnino apparet nos calfacere, priusquam in tenuia sit cōmutatum. Nam si quis piper integrū cuti inspergat, nulla planē caliditate percipiet: si verō pollinis instat cuti inspergat, aut linguae, excalciet vitig, ac potissimū si frueris. Quare multa quidem facultate sunt calida, faciliē in ignem vertunt, quae non tamē haud facile excalciant. Ignis siquidē, ut qui omnino tenuissimus & calidissimus sit, minimo negotio penetrat illa, atque vincit. Nostra autē caliditas, praeter quod crassē est essentia, halituosaque, adeo exstit infirma, ut atque quod cōtingit per-

*Calida potens
est, ut non calfa
care possint, de
bitum in te
mora timentis.*

mutet. Quare nihil eorum quae calfacere nos videntur, perinde de vigrinis calfacere potest, sed tantum materia quae accenditur facile. Si quidem mutationis principium a nostra caliditate accipimus, ut calami aridi ab igne, nos cōtra recalciant, et veluti partes sunt quaedam natui caloris, ut vigris illa. Quare mirandū non est, si quaedam medicamenta primū quidē mutationis principium a nostro calore nata, inde iam pergant, eum quoque qui mutabat, vincere & superare.

*Piper calfacit.
Ignis omnium
tenuissimus &
calidissimus est,
ob idque facile
penetrat.
Caliditas nostra
crassa est &
ficta.*

Quamvis aqua ipsa tenuis substantia sit, non tamen ob id ex sua natura nos calfacit: nec propriū est ignis nutrimentū, sed ponis extinguit illum, ut quod illa sit aduersissimū. Nec mirum si cū igne tum calidissimo, tum sicco sumo pugnet aqua,

mutet. Quare nihil eorum quae calfacere nos videntur, perinde de vigrinis calfacere potest, sed tantum materia quae accenditur facile. Si quidem mutationis principium a nostra caliditate accipimus, ut calami aridi ab igne, nos cōtra recalciant, et veluti partes sunt quaedam natui caloris, ut vigris illa. Quare mirandū non est, si quaedam medicamenta primū quidē mutationis principium a nostro calore nata, inde iam pergant, eum quoque qui mutabat, vincere & superare.

CAPVT XII.

Porro cutis omnis in primo statim ortu sibi continua cum sit, temporis spacio pertundit, sic ut vniuersum corpus fiat perspirabile, arteriaeque ipsae (quae in cutis meatus, quemadmodum venae, aperuerunt) vndequeque se dilatant, per poros attrahant, non aere modō, halitumque, sed quicquid enā trahi facile potest, ac prae ienuitate sua, motum ipsius spiritus consequi. Quamobrem quicquid piperis ad exalissimū fuerit redactū pollinem, verisimile est, simul cum ambiente aere, ab ipsis arteriis attrahi, pronusque a calore natui alterari, idque tum ob paruitatem, tum ob ingentiam ut & calore alteretur aptitudinē. Quod quidem si semel illi insit, per totum corpus, temporis progressu, peribitum, ipsum recalciet prius tamen calfacit: ubi proximioribus particulis. Vnde liquet, crassiorū nullum, priusquam ad vnguem cōmutatur, neque ipsum a nostro corpore quicquid perpen, nec rursus in nos posse agere. Quod verō in pipere adduximus exemplū, idem licet ad alia transferas, siue ea calfaciūt, siue etiam refrigerandi facultatem fortiantur.

CAPVT XIII.

Considerandū autē est, non solum, crassarum ne sit partū, an tenuiū, explorandorū medicamentorum substantia: verum etiam, raritatem an spissā, densāve. Voco sanē rarā, cuius partes iuanibus spaciis sunt interceptae. Vbi igitur spaciis eiusmodi minis, quae plena semper sunt aere, corpus fuerit distinctū, facilius quippe ipsum accendit, enamque calidius illo non fuerit. Nam qui in his spaciis cōtinetur aer, primo statim ignis occurrit accenditur, atque inflammatus (aer enim accensus est flamma, quemadmodum terra, carbo) vni verō secum corpus vniuersum accendit. Sic itaque calamos aridos ignis exurit celeriter, tamen si minus alia flammā calidos, idque ob meatuum multitudinem, quos prius aer occupabat, quorum arguentū summū, calamorum leuitas est. Nam sicca natura corpus, leue esse alioqui non posset. Quarecūque aut situlosa sunt, multumque vacui obtinent, pondere exstunt leuia. At calamus a nostro corpore atque calfieri potest, quod essentia sit crassa. Si igitur alius medicamentū substantia tenuis sit & cōtinua, eandem in nos naturā ostendet, quam prius in igne. Sin autē rara sit & crassa, fieri poterit ut ab igne quidē alteretur perscalle, non tamē a calore nostro, ac proinde nec nos recalciant.

CAPVT XIII.

Quamvis aqua ipsa tenuis substantia sit, non tamen ob id ex sua natura nos calfacit: nec propriū est ignis nutrimentū, sed ponis extinguit illum, ut quod illa sit aduersissimū. Nec mirum si cū igne tum calidissimo, tum sicco sumo pugnet aqua,

*Calfaciunt
corpora, ab eis
tenuis calorem
assumere.*

*Corpus vniuersum
fieri perspirabile.*

*Medicamenta
omnia quae
partes in corpore
sunt vniuersae
exant.*

*Rara quae sunt,
leuia quāquam
sunt, facile accen
duntur facili
ter.*

*Flamma est
aer accensus.
Carbo est terra
succensa.*

*Stibula omnia
sunt leuia.*

*Aqua igni ad
uersissima, ni
morum frigida
& humida.*

*Oleum quo ob-
fervat non califi-
cat.*

*Aqua frigidu si-
mil cum oleo,
citius quàm il-
lud absumitur.*
*Calidius a flu-
or passio, vni-
quodq; dupli-
cat distat.*

*Concreviscentia
in glaciem fac-
tū, si per se aut
si sunt frigidi-
tate, si vtriusque
eandem consis-
tentia insit.*

*Tenuia corpo-
ra promptè in-
calescunt, atq;
refrigerantur,
denique non conge-
latur.*

*Aqua quæ dicitur
tenuissima.*

*Lac non effi-
malare.*

Fax.
Amurca.

*Acetum maiori
ex parte frigi-
dum quàm cali-
dum existit.*

aqua, frigida & humida existens. Porro oleum, tametsi in flammâ verat facile, nō tamen admodum celeriter, nec manifestè non calfacit, ob lentorem substantiæ, quo tenaciter inhaeret us, quæ semel cōtingit: necq; ambambiē facile ad extenuari, aut augeri valens, nec prōptè intus in corpus transiit. Aqua verò & celeritè in lialitū soluitur, & expeditè digerit. Quod si in idem vas conlectam aquā, oleumq; decoquas, prior aqua absumetur.

CAPVT. XV.

Vt autem calfacientium, aliud est simpliciter calidum, vt ignis: aliud experitū, vt qui in nobis est calor: sic eorum quæ facultatē sunt calida, aliud quidem ad id quod primò & absolute est calidum, aliud verò ad id quod per experientia refertur. Non ergo quod citius accenditur, protinus ad nos simpliciter apparet calidius.

CAPVT. XVI.

Sed neq; citra limitationem, ex eo quod ali- quid in glaciem cogatur, debemus frigidum esse colligere. Nam in us quæ eandem habent aut tenuitatem, aut crassitudinē consistunt, quod ocyus à frigore cōgelatur, temperamenti est frigidiōris. Si verò alterum sit tenuius, puta (exempli gratia) vinum: alterum crassius, vt oleum: nō est necesse aut citius aut magis cōferre quod est frigidius: nisi frigiditatis excessus, quæ huic inest, excessum crassitudinis, quæ inest alteri, superet.

CAPVT. XVII.

Est autem refrigerari, frigidam qualitatē recipere: at congelari, durescere est præ frigore. Quæcumq; igitur corpora tenuis essentia sunt, promptè tum incalescunt, tum refrigerantur: at non aquæ congelantur, vt aer & ignis. Nam hic planè non congelantur: ille autem, nempe aer, nō perit de vt vitrum, pax, cera, resina & bitumen: cuius quidem tamen calidissimū sit, terretitas tamen crassitudo, ad congelationis celeritatē adiuvat. Porro æquam quæ celeriter & incalescit, & refrigeratur, meriti leuissimè esse dixit Hippoc. Nam quāto tenuior fuerit, tantò pati erit prōptior. At qui quæ tenuior est, minimū habet illi terrestri. Non ergo absolute ex materiæ passionib; ad ignē, cōducere eius ad nos facultatē oportet: cum multo securius sit hoc iudiciū, quo ad nostrū corpus quippiā examinamus. Quod lac simile nō sit, nec vnde quæq; sibi simile, coagulano indicat, quæ serosa partes à caseosis facili separant. In vniuersis etiam liquoribus, qui à fructib; exprimentur, crassum dēscitur quippiā, quod spacio temporis subidet, vocaturq; fax in vino, in oleo autē amurca. In aceto verò est eius modi quippiā, ac forsā ipsum est, qd calor est percipiente. Nam quod frigidior, id qd tenue est. At acetū maiori ex parte frigidius est, q̃ calidius.

CAPVT. XVIII.

Perperam igitur faciū, quæ visque adeo calidū esse acetū pronuntiant, vt cauterio illud assimilet: cum tamen nec tantā sensu percipimus in aceto caliditatē, nec ipsum crustas, instar cauterii, excidet. Constat siquidē, vbi per cauteria cōsiliū est sanguinē fringere, crustam relinqui haud exiguā, quæ veluti operculū sit corporibus sanguinem profundentib; ac prouide illis cauteria planè candentia applicamus, quæ haud quidem

quod calfaciant, sed quod vrant, atq; subiectis partibus operculum, quā Graeci vocant, efficiant, relinquunt, fluctu sanguinē supprimunt. Itaq; acetū, haud perinde vt crustas facientia medicamenta, sed potius vt asstringentia, citra crustam, sanguinis fluores cohibet: quæ ratione nō ex calfacere, sed refrigerare potius ipsum existimandum est.

CAPVT. XIX.

Si verò idioram aut plebeium aliquem (nam horum in istiusmodi rebus in corruptū est iudiciū, quia nulli dogmati seruiliter sunt additū) tēperato aceto ex spongia fouerimus, dem autē interrogauerimus, num calorem an frigus percipiat, fatebitur quidē se, primò sanè frigus percipere: postea autem, nempe spongia sublata, sensum nascentis in parte quandam caloris phantasia sentire. Vnde perspicuū est, omnino quidē frigidum esse acetum, obtinere tamen quēdam calorem, qui acrimoniæ ratione per accensum excessu temporis corpora calfacit nisi forte vbi laxus ac doloris expertus tumor inest. Si quis etiam illo ab illata thapsia vtrā, ardor aceto resinguitur: non quod acrimoniā & mordacitatē obundat, vt oleum atq; rosacē, sed quod evidenter refrigeret. Quare nisi molesta facultatis aspectus illi inesset, non alio vtendum ad refrigerationem foret.

CAPVT. XX.

Cum autē alij ob acrimoniā ipsius, calidissimum esse acetum contendunt: alij contrā, maximè frigidum, quod putant ipsum grumos contrahendo dissoluere, verisimile est id iuxta medium cōsistere. Quippe si longè ab extremorum vtroq; distaret, non tanta inaciditē de facultatē ipsius controverti.

CAPVT. XXI.

Quia verò quæ neutra sunt, dicuntur tripliciter, secundū diuisionē Herophilī, partim amborum extremæ participatione, partim neutrius, partim nunc illius, nunc huius: mihi sanè tum acetum, tum etiā rosacē, vtriusq; extremi necessitudine, esse neutra videtur: & quod nūc quidē sensibiliter calfacere, nunc refrigerare cernitur.

CAPVT. XXII.

Quod verò ad aērē spectat, iudicatur eius tenuitas, ex sola in tenuia diuisionis celeritate. Ceterū si ea ratione ignis sit tenuis, haud omnis ignis tenuis existimabitur, cum es & ferrum fiat ignis, nō tamen q̃ antea tenuius. At stannū, cum aliud sint ignis genus, reuera tenues existunt. Quocirca nō omnis ignis est tenuis, nec quicquid tenue, protinus & ignis fuerit. Nam prunā ignis quidē est, & nō tenuis: & aer tenuis, verum non ignis.

CAPVT. XXIII.

Quocirca minimè cōcedendum arbitror, acetum, quod mordax & tenue sit, calidū continuò esse. Nec enim quicquid mordax fuerit, id & calidum est: forte verò, nec quicquid mordax fuerit, & tenue.

CAPVT. XXIII.

Eorū igitur medicamentorū quæ vehemētè aut refrigerant, aut calfaciūt, nō sunt facultates ambiguae. Verū ea de quibus dubitare cōtingit, neutra omnino esse necesse est. Pleraq; autem, vt ad sensum simplicia, ex pugnantibus facultatib;

*Cauteria san-
guinem supprimunt, quod re-
linquēdo quæ-
ram.*
*Acetum quæ ra-
tione fluorem
sanguinis siliat.*

*Idiotarum iudi-
cium est inaccu-
ratum.*

*Acetum est frigi-
dum, quāquā
calorem partem
repi-*

*Acetū ardorem
à thapsia exci-
tat, ideo refri-
geratione vtrum-
que.*

*Acetū siperata-
tam non inueni-
at media distan-
te.*

*Neutra dicitur
placet.*

*Acetū quæ ra-
tione dicitur
neutrum.*
*Rosacem quæ
ratione dicitur
neutrum.*
*Aer tenuitas
vnde indicatur*

*Ignem amorem
nō esse tenuem.*
*Tenuia amurca
non esse ignem.*

*Mordacia omnia
non esse ca-
lida.*

*Neutra esse de
quibus dubita-
ri cōtingit.*

cōstant: ob quas quidē fieri potest, vt acetū vim illam obscurē calfaciendi, quam ostendit, fortia-
tur, existens aliquo tenue, refrigeratoriū atque
exicatoriū medicamentū. Etenim quidē efflore

Aut faciat.

scere rubor in partib. ab aceto irritatis cōspicit.
CAPVT XXV.
Ceterū nō fat est generaliter vires medica-
mentorū cognoscere, quod hoc videlicet calfa-
ciat, illud autem refrigeret, nisi etiam ipsarum fa-
cultatum excessus & gradus, accuratissime didi-
cerimus. In qua quidē cognitione, tum artificia-
lis simplicium vltus est constitutus, tum ratione
proficiens ac methodo composino: ipsorumq;
compositorum recta vsui accommodatio.

CAPVT XXVI.

Perperam autē superioris seculi homines a cō-
positis orū medicamentis, eorū quæ in illa ingre-
diuntur medicamentorū simplicia vires diudi-
cabant, cum nō liceat rectē cōposita ipsa cogno-
scere, priusquam simplicia sigillatim examinari-
mus.

CAPVT XXVII.

Atq; hi quidē, cum citra iudiciū simpliciterq;
compositis omnibus facultatibus fidem habēt,
vt Empirici ipsis reprehensionis locum & oc-
casionem exhibent.

CAPVT XXVIII.

Cum autem non aliunde ignem calidum es-
se, ac glaciem frigidam cognoscamus, quā ex
sensu ipso: omomō stupidi sunt, qui sensus esse
contemnendos existimant.

CAPVT XXIX.

Porrō æstiuo tempore oxycrati potu, quidē
planē refrigerant, atq; suis expertes permanent.
At nōdum constat, an id a certi causa cōtingat. Di-
xerit tamen aliquis, aquā, tardioris distributio-
nis cum sit, ab aceto, tanq; vehiculo, duos digere
in vniuersas partes. Sic etiam si cum vino bi-
bat aqua, sitis efficacius extinguit, q̃ si sola. Re-
frigerationē itaq; sitisq; sanationē ab aqua pro-
venire, vt que frigide humiditatis naturæ sit: ceter-
um adminiculo esse, ac veluti alas illi, ad om-
nes corporis partes permeandas, tum vinū, tum
acetū: quæ ipsa nequaquā frigida sunt & humida:
alioqui ad restringendam sūm, præstaret ea so-
la, q̃ cum aqua, exhiberi. Porrō vt a vino appar-
et homini semper sitim incrementē, sic ab aceto
epoto, interim quidē augeri, interim vero sedari

CAPVT XXX.

Cum igitur sitis, partim humoris inopia, partim
caloris copia proveniat: neq; si sicca disposi-
tione provenient sitis, neq; si calida & sicca, e-
porum sanare inquam potest acetū. At si quan-
do in vinū cōstant humiditas atq; caliditas, eius-
dem sanē sitis, acetū medela optima exiit. Siqui-
dē humectare neq; ut refrigerare, nō inritentur.
Verū sitis q̃ ex cōposita affectione, videlicet ca-
lida & sicca, nascitur, composita medela est oxy-
cratum, quod ex aceto consistat tenuium partiū,
atq; refrigerante: & ex aqua, quæ non modō re-
frigerat, sed humidiorū etiam omnium est humi-
disima. Nihil enim aqua est humidius.

CAPVT XXXI.

Per se autē solum, quod iudicandū est, expen-
dere oportet, tum in sanis temperatisq; corpori-
bus, tum etiam in intemperatis: ac præterea in ius

qui alicui sunt morbo obnoxii. In tēperatis qui-
dem, vt suprà: in intemperatis autem, si cū dixit
Hippocrates: Naturæ picrocholus vtilissimū ef-
se acetum, at melancholicis ad vtilissimū. Porro
in morbo aliquo affectus, si simplex fuerit, in sim-
plici exploratur affectu: si mixtum alicui, neces-
sum est id cui miscetur, temperaturæ si medium.
Siquidem quod medio coniunctū fuerit, ipsum
eorū quæ perficiens, existet causa. Quare si acetū
simplici cerato cōmiscas, cerato ipso longē fri-
gidius medicamen effeceris: eritq; tibi id reme-
dium vel optimū, ad erysipelat, phlegmonas,
herpetes, & carbunculos. Sin autem quod mixtū
est, tanq; simplex expendas, hallucinaberis. Nam
quemadmodum ærugo nequit carnem produ-
cere, sed ceratum quod illam recipit: sic vicerum
glutinatorum, non acetum, sed oxycratum est.
Quippe acetū per se, vlcera erodit & mordicat.

CAPVT XXXII.

Tam verō cum liceat ex astrictionis complura
offendere, quæ minimē sanē conglutinent: ficti
ex cōglutinantibus haud etiam pauca, quæ mi-
nimē astringentia videntur, falluntur: q̃ absurdū
simē, qui astrictionis omnia cōglutnare, cōgla-
tinantia omnia astringere proficiuntur.

CAPVT XXXIII.

Miserē etiam hallucinantur, qui astringentia
omnia refrigerare dicūt: eōdē in nihil aliud, sal-
tem chalcitis, chalcantilis, & misy, quæ valenter
astringunt, tan tam assequata sunt caliditatem, vt
nos etiam exviant.

CAPVT XXXIII.

Herodotus autē & Dioscorides, quod medi-
camenta quorū profusius alui, atq; dysenteris in-
medeantur, ob id astringentia ea esse colligunt:
eōdē ramen ne minimū quidem astrictionis for-
tiantur, sed potius rarfacientia & laxantia sint.
Nam (exempli gratia) caprinus adeps, omnibus
quæ & gustu & facultate sunt astringētia, adver-
sissimū est: his ramen que acris & mordacis per
alium sunt, manifestē efficacia cōtra auxiliiar:
quod scilicet concrecat facit, invngaturq; inte-
stinis, ac plurimo tempore inhærent, illa demul-
ceat & foueat: cum videlicet condensare, con-
stringere & consistare, opus sit astringentium.

CAPVT XXXV.

Vnaquęq; sensibilū natura, priuatim sobie-
ta est, tractū quidem caliditas, frigiditas, duri-
tias, atq; mollities: albedo verō, nigredo, atq; vt
summanim dicam, vniuersum colorū genus, vi-
sui: amaritudo, dulcedo, austeritas, acerbitas, aci-
ditas, salcedo, acrimoniæq; gustui. Planęque de-
mitas viderit, si quis gustu colores iudicare ten-
ter, aut sapores visu: similiterq; & de aliis sensib.
Siquidē tactu iudicando sunt differētia tangibi-
les, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Om-
nis autē inuisionis demonstratio: principia
sunt, quæ sensui atq; intellectui evidētia exsūt.

CAPVT XXXVI.

Porrō Plato in Timæo, sapores (quos Græci
ῥαῖα appellant) duos primū asignat, eōsq; vt
species eiusdē, sic ratione maioris & minoris in-
ter se differētes. Quorū sanē alterū austerū, alterū
acerbum (qui ex illius intentione procedit)
nominat. Secundam speciem facit, eorū qui illis
opposita

*Autem illius
esse vtilissimū,
ad vtilissimū
melancholicum.*

*Ceratum sim-
plex autē obis-
tem, caetera ta-
men calidiora
opemū esse præ-
stidum.*

*Oxycrati val-
de glumiat.*

*Astrictionis om-
nia haudqua-
quam conglu-
tina, q̃q; q̃q;
mixta omnia
astringere.*

*Astringētia om-
nia haudqua-
quam refrigerare.*

*Dioscoridum
signat Galen-
um.*

*Caprillū adeps
dicitur fieri ca-
pissio a credendi
ten, ac sit salu-
tare præstidum.*

*Astringentium
opem.*

*Tangibiliaque
sunt autē.*

*Visui quæ sobie-
tiantur.*

*Gustui quæ sub-
iunguntur.*

*Saporum diui-
sionē ex doctro-
na Platoni.*

*Facilitas me-
dicamentorum
excessus & gra-
du descendit
esse.*

*Composita co-
gnosci nō possū
simplicib. iuge-
rari.*

*Sensus cur non
sint contemnendi.*

Oxycrati vires

*Aquam ab aceto
seu dulci pro
vniuersum cur
pm.*

*Aqua vino per
mixta, quā
sola, cur effica-
cia restringat
sitim.*

*Viam semper
ad augeri sūm.*

*Sitis unde cau-
satur.*

*Acetum cui sit
remedium sit.*

*Oxycratum ex
aqua & aceto
constat.
Aqua humida-
rum enūcū est
humidissima.
Medicamenta
quæ indicare
volumus, qua-
liter expendere
oporteat.*

opposita sunt, nitroforum videlicet, salforum & amarorum. Et in his quoque amarus ex nitroso provenit intentione. Salis vero, aut nitroso imbecillior est, aut astrictioris quoque assuens aliquid. Deinde à Platone acris expositus est: mox acidus postremo dulcis. At à Theophrasto additus est vinctuosus, quem nimirum omisit Plato, ut qui ad gustum nihil attingeret.

CAPVT XXXVII.

Sapores exacti exponere esse impossibile.

Exponere autem hos sapores exacte, impossibile est: quandoquidē neque aliam vim sensoriam passionē: cum tamen qui tali sensu communicat, recordari fuerit possibile. Igitur quando quod linguae nostrae fuerit admodum corpus, vehementer deficiat, contrahatur, & in multam profunditatem usque illam exasperat, sicuti pira sylvestria immatura, & coena, eiusmodi omne appellat acerbum, ab austeris tantum intentione ducendum. At quod astringens vocamus, idem videtur significare quod austerū, aut etiam commune esse genus totum huius, tum etiam acerbū. Quae verō linguā, dum cōtingunt, non cōtrahunt, neque cōstipant, sed defringunt potius & abluunt, etiam si astringentium quippiā permixtum habeant, hac omnia salia cognominamus. At quae lusa etiam magis deteguntur, ita ut etiam molestē exasperent, amara vocantur. Porro quae mordicā roduntque, idem cum valida quadā caliditate, dicunt acra: si in hac absit, acida: exterum hac fermentandi quoque vim obtinent. Rursus, quae veluti invngunt atque implent, in statum suū restituit exasperatā ac veluti et osas linguas particulas, haec si cū voluptate manifesta cōtingant, dulcia: si in hac sine, pinguis vocantur. Quod si ex calido, frigido, humido & sicco, cōtinnibus, vniuersa consistunt, verissime profecto est, dictarum quoque qualitarum, ex horum etiam miscella constare.

CAPVT XXXVIII.

Verum nō quale vnumquodque ex se sit, & ad totam naturā, sed quale secundum corpus nostrum, cōsideramus. Alioquin nec acerbū, nec marinā aqua nos exicare possent, sicuti nec sicca dici, cum vtrunque illorum sit actū humidū. Ceterum si nos exicare appareant, sicca dicent, ad nos videlicet, & nostram naturā, parē simocant vim obtinentia: de ceteris quoque qualitatibus, idem est ferendū iudiciū. Quare facultatum omnium quae medicamentis insunt, experientia erit certissima indicatrix. Quam qui relinquunt, nō solum falsa pro veris ducunt, sed tractationis etiā vilitatē destruit. Idcirco prius delendi sunt dispungendique omnes paralogismi à dūcendum animis, quā verā disciplinā imbuantur. Nam quemadmodum corpora imparia, quantū magis nutriti, tantū magis laedus: sic quoque si impuri animis nutrites sermones offeras, nō modū nihil proficiat, verum etiam magnopere obfuerit.

GALENI PERGAMENI

de simplicium medicamentorum facultatibus lib. II.

CAPVT I.

Non desunt qui nobis, mortales cūm simus, à sensibus suspicandum esse contendunt, ad facultates omnes examinandas:

in illis tamē perpetuū immorandū non esse, sed ad partem diuiniorē accedendū, nempe rationem. Sensum quippe & animantib. inelle rationis experiri: rationē autē solam, hominibus esse cum diis cōmunem. Qui sopiuit nō sentit, si à sensibus recedendū sit, demonstratōnis primordia futura esse longe incertiora, quā ea quae demonstranda veniunt.

CAPVT II.

Equidem optatim nullas nō res clarē sub sensus nostros cadere, nec quicquid esse quod illos fugerit. Hoc n. pacto nihil ambigui vñquam aut anceps foret. Verum quoniam illos quaedam eūsiunt, rationē ipsi superinducere conaudi est, sic tamē ut nec cōfusa, nec inīnita colligamus, sed ante omnia, nōminum significata diligenter definiamus: deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidē, separare. Irrendi autem merito sunt, quid de olei aut rosae colore nimis anxie ratiocinant, cūm rebus ipsi variē vñ liceat, de illisq. periculū facere. Actales mea quidē sententia, perinde faciūt vident, atq. ij qui ex aliqua imagine cognoscere quempiam conantur, quem etiam viuū in tuert, in axum illis est licitū.

CAPVT III.

Tribus ergo modis in sermone peccant, qui aiunt rosas temperata esse calidas, & sine rubra. Primum, quod nō demonstrata hac propositione, Omnis ignis ruber: convertere ex hac alia, videlicet, Omne rubrū est ignis, tanq. veram conantur. Secundo, quod nesciunt, propositiones quae ex mutuo veris conuertunt, non aut simpliciter conuertere, veras existere. Tercio, quod etiam si mutuo conuerterent, non tamē omne qd colore sit rubro, calidum esse, ex mutua illa conuersione sequatur, sed rubrū omne esse ignē: id quod minime investigamus. Eodem errore tenent, qui ex odoribus, medicaminū facultates cōiūctunt. Nec n. quicquid bene redolet, calidū est: nec quicquid calidū est, bene olet. Quin etiā nec si quid graueolens est, calidum etiam fuerit, nec si calidum, etiam graueolens. Sic nec si quis, quicquid graueolens oleat, frigidū dicat: nec si quicquid frigidū sit, olere graueolens, verū dixerit. Si quidē calidorū innumera sunt, partim bene olentia, partim graueolens, partim neutra: atq. frigidorum similiter. Quāvis quid calida dicat, ac frigida, cūm dicere debeam nos caliscentia, & refrigerantia: Etenim aliud est facultate calidā, aliud actū. Et huius quod actū calidum est, aliud absolute dicitur calidū, aliud per experientiam, aliud à symmetria sui generis, aliud ad quidvis obuium collatū. Homo autem non absolute calidus, quemadmodū ignis, sed experientia calidus dicitur: quod maior in eo porto calidi sit, q. frigidū. Ergo & quicquid ad hūc modū dicunt calida potestate, illi dicunt ex calfacere: faciliē de ipsi iudiciū sumunt per experientia solam, cū aduixeris paucos quosdam epilogismos. Quare nec à calore, neq. ab odore, neq. à consistētia, aut huius generis aliquo, de medicamentorum facultatibus est opus ratiocinari.

CAPVT IIII.

Taceo sopiitis minimū quidem rationibus scientificis vñ, sed aut inductionibus, aut ex tunc

Ratiocinatio
lem esse nobis
communi cum
dijs.

Sensus discernendi
non esse.

Ambiguum nihil
esse, si omnia
sub sensu
eaderent.

Ratio cur in
sensu possit a sensu
fieri.

Rosae quid rubra
sint, calidas
esse dicunt,
quod tripliciter
potest.

Propositiones
quae ex mutuo
veris conuertunt
sunt verae.

Odori non indicant
facultates
in medicamentis.

Calidū multum
pluriter dicitur.

Homo non absolute
calidus, sed per
experientiam
calidus dicitur.

Calor non facit
est ad indicandam
medicamentorum
viem.

Sophista reuocat
inductionem
& explet.

plis. Differt autem, ex exemplis quippiam fadae, an ex inductione. Siquidem qui ex exemplis fidem facit, vnum aut duo generis eiusdem affert, aut certe plane paucula, plerisque ceteris praeferit. Qui verò ex inductione, omnia comprehendere nititur, quae per experientiam sunt cognita. Quare talis inductione vehemens est, ac plurimum persuadet.

CAPVT V.

Quod verò ad olei spectat (quo de multa Ar-
didamus citra demonstrationē atque ineptissime
prodidit) quae in ipso coquuntur omnia, sicca &
friabilia efficit, contra quā in aqua contingit:
quae verò sunt illo imbuta, magis propriam hu-
miditatem conferunt, si eo madidata non es-
sent. Quin etiam scillae & vrticæ morsus olei per-
sanat & cum triliqui vniuersum corpus demul-
ceat, tantū oculos mordicat, necnon gurtur exa-
sperat. Subducit aut aluum, lasitudines tollit,
tuerdque in vinctis frigore, atque lora emollit, in-
secta animalia perimit. Quorū omnium causam
reddere debuisset Archidamus. Porro cocti oleo
num carnes, tum pisces, interim dum assant, obli-
nunt, quod sicce ad vltimū eximie eorū reddant
partes, si assentur citra talem vñctionē. Athletas
etiā oleo gymnasticū in vngtū, quod praesentē qui-
dem lasitudinē soluat, occurrat autē futuris: ac
breuiter frictionem tum aequalem, tum mitem
efficiat, corpūque ad motus futuros praeparet.

CAPVT VI.

At Archidamus nō solum qui in mulis per-
spicue apparere cōtemnit, sed hac etiam parte in-
re taxandus est, quod dicat, meliorē esse frictio-
nem siccam ea quae cum oleo adhibet, quia cor-
pus durius & siccus iis qui in vngtū, evadat
mollius aut iis, qui fricantur sicci. Falsi praeterea
mihi in hoc videtur, quod similiter affici puer
tum ea quae in illo coquunt, tum eos qui frican-
tur. Neque enim eadem agere dixerim oleum ca-
lidum, frigidum, temperatum, tepidum, aut fer-
uens, sicut neque aquam ipsam. Nam qui obcu-
ro simile fuerit, herbas in oleo feruente coque-
re, ac exercitantū corpora oleo temperato frica-
re? Etenim si quis velit expēdere oleum, ab om-
ni prius aliena qualitate (i qua semper propria
obscureatur) ipsum liberum reddat, atque ita de-
tinum ad explorandum se accingat.

CAPVT VII.

Praeparare olei solemus, nō aliter atque aquā,
nempe prius excalfaciētes, ac deinde in aquam
mergentes summe frigidam. Quod si enī sors
in ipsum cum strepitu decidat, vasculo cui inest
oleum, antē diligenter occluso, magis quoque ac
magis ita reddetur frigidū. Multum item frige-
re, si percausum ita in puteum demittas, ut
aquam contingat. Ac sic oleum reddimus frigi-
dum: contra etiam modo, calidum. Quo fa-
ciē vnum in refrigeratis corporibus, in alueum
olei calidi demittentes, quibus pars quae prius ob-
stipuit, aut qui tremuli sunt, aut cōvulsionē, aut
tremore, aut motus sensibile obixione tentan-
tur. Porro fructus ex quo premitur olei, oliua
nuncupatur & arbor, olea: atque hoc quomodo sim-
pliciter & primario oleum dicitur, reliqua autē
omnia per abysum & translationem.

CAPVT VIII.

Ceterum veri olei plures sunt differentiae. Se-
cundum aetatem quidem, cum aut recens est, aut
aetate vigens, aut in veteratū. Secundum prepa-
rationis modum, cum simplex atque impermixta
fuerit, aut praeparatum cum sale. Secundum fructus
diuersitatem, cum is aut immaturus, aut ma-
turus extiterit. Secundum inductionem arte altera-
tionem, cum ut ab initio fuit, sic relinquitur, aut
candidum redditur.

CAPVT IX.

Experiri autē solum oportet, quae impermixta
sunt, & ab omni extranea qualitate aliena: eaq;
primū in optima corporis constitutione, deinde
in intemperans, demum in morbis simplicibus.

CAPVT X.

Arnonnulli medicorum nō solum in explo-
randis medicamentorum viribus hallucinantur,
verum etiam in opinionibus quas habent de af-
fectibus. Nam olrum quod lasitudinis reme-
dium sit, omnes propemodum confiteantur, ex-
terum quis affectus sit lasitudo, nō consentiūt:
ac proinde secundum ipsorum doctrinam, nihil
certi de olei facultate colligi potest.

CAPVT XI.

Nec verò parū interest, an iniiciatur in ventrē
pituita scatenē oleum expers salis, an quod pla-
rimum accepit salis, in ventrem purum. Vtrumque
enim alium subducit, facultatibus tamen diuer-
sis: nempe illud quod sale vacat, in pituitoso vō-
tre per lubricitatem: quod verò salem habet, in
puro per acrimoniam, perinde ut mutia, & mari-
na aqua. Idcirco sanē hoc raderet, alterū nō raderet.

CAPVT XII.

Nonnunquam autem mordicationes ex acciden-
ti quod saluginosum est, sanauerit, vnā secum
educens acres & mordaces humores, perinde ut
cetera omnia quae abluunt. Sed non itam vbi
immissa sunt id genus medicamenta morsus san-
nant, quin potius tunc etiam magis exasperant.
Siquid evacuationibus, haud multionis ratione,
sanationem moliantur. At ceratum ex rosaceo &
adipe infusum, septenumero moribus continuū
succurrit, idque cōmissionis ratione. Oleum etiā
solum, sed dulcissimū, idem frequenter praestitit:
sicuti certē adeps hirci, aut succus chondri, aut
ceratum ex oleo dulci. Nos autem septenumero
quibus ex frigore torquebantur dolore inter-
na, iniectio olei calido liberauimus: atque vbi ma-
ius esse frigus cōieciimus, addidimus & anethū:
si verò adhuc enam maius, rutam quoque & bini-
men. Ceterū occurrunt interdum quaedam affe-
ctiones permixtae, ex intemperie videlicet atque
mordicatione, in quibus consueuimus nos an-
ethū, aut rute oleum infundere, asserio in eo
liquato adipe: si non adsit, saltem gallinaceo,
aut aliquo aliorum, aut cera mordacitatis expe-
te, qualis nimirū est lora. Vnumquodque autē me-
dicamentorū temperantium, vbi valentius eua-
sit humoribus mordicantibus, morsum eorū re-
tundit. Verū si aut valentioribus facultatibus,
aut multis, paucū permixtū fuerit, vnā & ipsum
cōsumpuit, aliter cacochymiam. Quam obre-
propterea euacuandi sunt, qui ab iis quae tempe-
randi naturam habent, exasperantur.

CAPVT

Inductio quā
exemplum va-
lidior.

Olei officina
varij.
Oleo in cōlla
redditur sicca.

Oleum oculis
mordicat.
Oleum alium
subducit.
Oleo in cōlla
perimit.

Oleum lasitu-
dinem lenit.

Archidami opi-
nus ei videtur.

Olei vici qua-
litate expenden-
da.
Qualitates pro-
prias ab aliena
obscureari.
Oleo refrigeran-
di ratio.

Oleo perfuso
calidi, quibus
omni viciat.

Oliua. Olea.
Oleo simpliciter
et per abys-
sum duci.

Olei differentia
complanari.

Experiri qua
et quomodo in-
dicantur a de-
brantur.

Oleum lasitu-
dinem confert.

Oleum expers
sale, et salum,
qua ratione
subducantur ali-
mentum.

Saluginosa me-
dicamenta vnum
quam mordica-
tionem sanant.

Dolentibus in-
iunctum quae si-
lente operantur.

Cera dote est
mordicationis
expers.

Vacuanda pro-
pterea esse, qui
ab iis quae tem-
perandi naturā
habent, exasperantur.

CAPVT XIII.

Sic fanē lac frequenter simulatq; sumptū fuerit, aliis accefci, aliis in nidorē vertit, prorsuq; probē cōcoctū, corruptionē temperet. In quib. vtrūq; primum cacochymix pars evacuari debet; atq; inde fomesdus chondrus, & pifana, & lac, & alia: quæ vbi probē fuerint cōfecta, confectū ad boni fucci generationē. Porro pifana, ex sua propria natura boni quidem est fucci: verum in terdum vniū cām iūs fucci, qui excirāt mordicationes, compulsi, atq; ipfū auzet fymptoma.

CAPVT XIII.

Ceterum cacoehyma, nō temperando, sed id quod mordicat educēdo, mordicationes sanat. Ac proinde, donec vacuent, hominē mordicare non desinunt : & insuper evacuatā, in partibus asperis sensum relinquūt, aliud medicamen desiderant : quod non faciunt, quā boni sunt fac-

CAPI T XV.

Lauanda porro est nō modo cera, sed pix, resina, & oleū, omniūq; breuiter, quæ calidæ & fundit cūm posita, æque miseri nequeunt. Singula igitur modicè calfacta, in vas laticius orificij & magnū, cuius inlit æque copia qualitate experientia infundito. Dein rōndior & fragitio, manibus impet subigito. Postea effusa priori aqua, rursum ad abluat exalta cisa, in aliam æque fyncratam aquā iniicio: rursum in aliam & aliam, donec aqua nullæ ex eo qualitatē recipiat: quid quid gustu datur cognoscet. At si quæ sunt lapidosa & dura, vt cadmia, & æris squama, & æs vitium, ea ebullientes exacte in tenuia plurimū terere, in aqua fontana & purissima oportet, idq; fapius aqua priori effusa, alioq; denuō infiltrata, donec nihil in eo innatet, maneatq; aqua prorsus à contrariis medicamina qualitate immunia. Sic itaq; abluta omnia quæ elui possunt, experientia mordacitas reddunt. Ac præter id sanè, & oleum etiam candidius reddit: mitius ramē id verberari, alia, debet, ne videlicet ad ipsi aqua miscetur. Vt ære postea secerni possit.

CAPVT XVI

Oleum aut quod immaturū nō fuerit (hoc ē. afringit) nec preparatū sale, nec recens, ac velviti etiamnū feruens, ad hęc adamusim lotū, id neq. epotū, neq. infusum, excitabit mordacitatem. Quod si guttur ad rufum impetū, (pvoct, nō idcirco mordax dicendū est. Nam quicquid mordax est & acre, ad rufum incitat: nō tñ quicquid ad rufum incitat, existit mordax & acre: cum & pinguis mouere impetū ad rufum appareat. Sequitur itaq. si quid nō ciat ad rufum impetum, id haud quāq. mordax existere: nō tamen perinde cōsiderat, quicquid ad rufum impetum moueat, continud mordax esse, nec si categorici, nec si hypotherici cōficiamus propolitiones: quod scilicet ex duabus vniuersalibus affirmatiuis, nihil concludi in secunda figura possit, nec conlatio esse necessitate sit vera.

CAPIT. XVII.

Natura hominibus sternuendi vim indidit, ut prædico ipsum, quæ in naribus infesta molestæque sunt, propulerent: tñsienti vèrò, ut quæ in gurgite. Contingit autem hæc affectio dupliciter: aut reificata exasperare, quæ in arteria est membrana: aut à delato corpore, inæquali rursus. Hinc et nuda macula, aut alterius cuiuspiam edulij, nobis inuitis in spiritus meatu detecta, tñsire adigimur: seu si bibentibus affirmis ipsius potus quippiæ ed infusus, similiter ad rursum cõpelliimur. Percolat tamè per aspera arteriam perpetuò in pulmone ipsa potus tam exilis quippiæ, ut pro vicia ad instrumenti rapit, perficiale quocunq; distribuat, nec animal ad rursum irriter. At vbi vel id ipsum plufculum, vel aliud quodpiæ seu liquidu, seu solidu corpus, per aspera tam defertur arteriæ: iam inde tñsire est necesse, donec à spiritus vehemètia molesti id excutiat. Mordacia itaq; gurgitis exasperatione: oleosa verò & pinguis, illius, inæqualitate, & ad rursum impetum facit. Spiritus siquidè in emmentia quædam impingit, efficit inæqualè confusione in gurgite, ad rursum animal provocat. Cæterum non cõ inficitia, ex olea est mordacitatis pleraq; qualia non falsa, nam recentia videntur: atq; hæc quidè non apria essentia, sed quod omnibus plantarum fuccis geminis excrementis infit, alterum crassius, tenuius alteru. Quæ ambobus cum reperiant etiam in oleo, ad cõcoctione & differeñte tempus fani possunt. Procedente vero tempore, quod crassum quidè est, nunc parè à murca, subfidit: quod verò tenuius & velut aquosius, & ipsum compositu quodammodo est, ex acris scilicet essentia, & tenui lerosa.

CAPVT XYALL

Ceterū serofum istud rube colorā est, et crassū illo scilicet qualitate absterfa. At oleum ipsum, ut minime mordax, tum candidū sua natura exsistit. Quapropter ubi tenue hoc excrementū secretum fuerit, candidū & dulcior reddet. Separantur autem ipsum, aut insolanter oleū, & chrysae tollentes in alū, aut vasculū in quibus est oleū, talidos subicēntes cineres, aut olivum nucleos, aut frumentū circa ipsa apponētes, aut denique medicamenta in vasa ipsa iulicētes. In summa, quod aequum est consumere, reliquum vero

Olivera, 1997a
Olivera, 1997b

Tasium exire
Id non esse ne-
cessario moris

Tu sim animi
me provocan-
tia, esse morda-
cia me possim.

Derivation
 v/m.
 Taylor v/m.
 Taylor can/c.

*Patience distill.
Laze fomer all
quid in pulmo
m per artura
afferam.*

Saccis plantas
cum perispermis
duplex excre-
mentum inesse.

Olivi e altri.

Osteo repurgata
de rostris.

44-38872-1

100

10

100

reponunt. Tale igitur oleum, si salis expert, locutus sit, medicamentorum omnium minime mordacum erit, maximeque humectat & mollit, si nec summe frigidum, nec calidum applicetur. Porro cui insectus sal est, nonnulla quoque necessaria mordacitas inest. Frictio itaque ex oleo, magis quam sicca, lassitudinem tollit: emollitque corpora, colubas occludensque quicquid & nobis foras effluere est natum, haudquaquam digerens & exiccans.

CAPVT XIX.

Quæ autem ex oleo sit frictio, prorsus æqualis existit: inæqualis verò quæ sicca. Cutis siquidem per siccam frictionem manus coaduncat, ac veluti duplicat, violentique ac præter naturam complicant. Deinde ubi non amplius prior veluti duplicatio labentes sequi manus potest, ipsa quidem recurrit, atque ad cõtinuum reuolvitur: manus autem semel ac vno impetu in alteram cutis partem transeunt, inferiorem transgressæ ipsius duplicationis partem: ac proinde inæqualem, duram & laboriosam talem frictionem sentimus. Quod si lævis lubricaque exacte sit cutis, nec duplicari facile poterit, nec inæqualiter admittit ipsos manuum decursus. Quare externo aliquo medicamento indiget, quod rugas impleat, manibusque lubricitate cõducit: quas ad res oleo nihil aptius inuenias.

CAPVT XX.

Cum autem liceat in hominibus de ipso oleo periculum facere, nescio equidem quanam occasione ducti cõplices veteres, ad diuersa alia vertuntur, ut illas facultates explorent.

CAPVT XXI.

At recta experiri ratio, in primis quid ea sit, quæ in corporibus sit temperata: deinde ea quæ in temperatis: mox, ut sex numero antea monuimus, quæ in simplicissimis sit, hoc est, calida, frigida, humidis atque siccis affectibus: distantibus. Semper nolui id quod per se fit, ab eo quod ex accidenti. Curandum etiam est, ut oleum de quo experiri sumitur, aliene qualitates sit expert: ad quod est in omni medicamento obseruandum. Si igitur ita oleum adhibeam, manifeste cõperiet, refrigerare ne, an sit calfacere natum. Atque licet quidem summa est ratio. At opus ipsum quod perfitur, experientia cõmonstrat. Nam qui ardore tenentur, tantum abest ut à calore liberentur, ut etiam magis & resurgent, & processu temporis calidiores evadant. At algentibus ex olei inunctione, perspicua nulla aut nota, aut utilitas conspicitur. Ex quo liquet, calfacere quidem ipsum, non tamen admodum, nec evidentem, ut resina, pix, & bitumen, quæ videlicet sponte fluunt. Nam quæ sicca sunt, ut eis inungi non possumus, sic nec simplicia, nec sponte nata medicamenta existunt. Cæterum in ardentibus, si salis sit expert oleum, persundantque frigidum, nonnullum sane solatium adest. In erysipelatis autem, si cui in omnibus quæ pura bile sunt fluxionibus, quantumvis sit frigidum, vel maxime lædere est natum. Quæ verò ex sanguine fluxione misto cum bile, eas fluxiones minus aliquando affligit: videturque calorem parum eis quibus applicatur, accendere: quandoque modice calida, caluit mediocriter: immodice autem illa, quæ magno ardore resurgunt.

CAPVT XXII.

Igitur medicamenta omnia quæ facultate dicuntur calida, caloris sui à nobis accipientia principium, parum similiter nos recalciant, parum valent. Atque ex his sanè quæ nos æqualiter recalciant, oleum esse mihi videtur: ac proinde nec cõvulsionem, nec tremorem, nec febrem tum difficile, tum deperditum magnopere aut iuvare, aut lædere potest, nisi ascitum sibi comparaverit calorem: tunc siquidem plurimum proderit. Unde merito veluti materia quædam cæterorum medicaminum fuerit. Nam si frigida illi commisceas: frigidum efficiet quod mihi erit in calidum, calidum. Quippe quod ex media temperie est, utriusque summus inferius. Porro non calfacere oleum hac ratione quis dixerit, quod caliditate quam tepet, non augeat, sed confusuram videatur.

CAPVT XXIII.

Calfacere itaque nos dicunt, & quæ energia, siue actus, sunt calida, ut ignis: & erit quæ potestatem. Hæc tamè partim aliena sunt, partim medicamenta, partim tegumenta. Sed & calidum actus est, quod simpliciter calidum est, ut ignis: & quod per experiantiam, ut animal: quod ad sui generis symmetriam comparatur, & quod ad quidvis obviatum. At quod potestatem dicit, primo quidè distinguitur ab eo, quod ex accidenti est. Deinde totidem habet significationum differentias, quot actus calidum. Etenim cum sit veluti quædam apta materia ei quod est actus calidum, partim ad ea quæ absolute calida nuncupantur, partim ad ea quæ per excellentiam quandam, tum ad quiddam sui generis, aut speciei demum, & ad obviatum quiddam collatum, propria fuerit materia. Quocirca cum ea calida quæ ad hominem referuntur expendimus, ut alia omnino omittamus, æquum existimamus.

CAPVT XXIII.

Accidit autem fortassis oleum, ut tanquam alimentum nos excalfaciât, vbi intro in corpus assumitur: tum quæ phobis medicis quibusdā videatur, sicut ut ex cibis, ita ex oleo fieri corpori apposuimus. Accidit etiam illi, ut tanquam medicamentum, sit mediū inter nos calfacientia, & refrigerantia: tum ut ipsum nos veluti tegumentum excalficiat. Nam quemadmodum vestimentum à nobis excalfactum, nos excalfacere cõsueverit, ita & oleum. Et quemadmodum illa excalfacit corpore calidiora minime evadit, ita quoque neque oleum. Medus quidem æris nos ambientis temperaturæ similis est tum qui à vestimentis, tum qui ab oleo proficit calor. Quamobrem tum vestimenta ipsa, tum oleum, calfacere nos non proprie, sed per abyssum ducunt, quod frigori obfistant. Quemadmodum si duos æque temperatos adolescentes, qui contingantur mutuo, sese dixerimus calfacere, tamen si haudquaquam excalficiant, sed duntaxat arceant frigus ambientis. Quæ enim similia vndeque corpora sunt, à se mutuo nullam mutationem accipiunt. Responderit itaque calidiori aëri pyrethrum, & piper: moderato autem, oleum & pinguis: aëti tamen aëres sunt calidi, potèntia verò, medicamenta. Siquidem à nobis accipientia excalfactionis principium, partim nos recalfacere sunt nata, partim plus, partim minus. Oleum igitur ex genere eorū, quæ æque

Medicamenta
facilitate calida,
quomodo
nos calfaciant.

Oleum est veluti
materia veluti
quorū medicamen-
tum.

Medium tempe-
rat, utriusque
extremi inferius.

Calfacere nos
qua dicuntur.

Calidum facit
tate et alio, ut
trunc quoniam
piper accipiat
tur.

Oleum multi-
tatem dicitur
nos calfacere.

Vestimenta à
nobis calfacientia
nos recalficiunt.

Oleum cum vesti-
mento collatum.

Oleum ut vestres
non proprie nos
calfaciant, sed
obfistant frigori.

Similia corpo-
ra à se mutuo
nullam muta-
tionem accipi-
unt.

Medicamenta
quomodo nos
calfaciant.

recal-

Olei dulcis na-
tura & vis.

Frictio ex
oleo vis.

Frictionem ex
oleo quidem æ-
qualem, sicut
vis in æquale.

Oleum frictio-
nem actionem
demonstrat esse.
Oleum experi-
endum esse in
demonstrat.

Experiri ratio-
nem dicitur.

Medicamenta
quæ experiri
volunt, debet
esse aliena qua
licet experiri.

Experiri ratio-
nem dicitur.

Oleum calfacit
quidem, sed non
evidentem ad-
modum.

Oleum quibus
fit maxime fluxio-
nibus.

Oleum videtur
calorem parum
eis quibus applica-
tur accendere.

recalcificat non, existens, duplici ratione vt exal-
facere videatur evenit, q̄ nimirū instat vestimē-
ti, aut munimentū illinat: & quod meatus infar-
ciat, prohibeatq̄ foras effluere magnam vaporū
intra calorū partem. Cal ratione, quos largi-
gius sudare volumus, nō protinus ubi ab initio
admoveamus oleū. Verū eos quidē qui morbo
laborarūt, ubi sudare inceperint, tū exalcalisto
perfundimus: eos verō q̄ etiamnū laborāt, ubi
abūdē iam satis sudaverint. Porro sanis quavis
occasione exhaustis, invngi & ante sudorē per-
mittimus. Verū quib. cruditas in est, aut corpus
laborat plethora, his neq̄ in balneo invngi con-
cedimus. CAPVT XXV.

Quemadmodū iuter calfaciētia & refrigeran-
tia, sic oleum mihi inter humectantia nos, et sic-
cantia, mediū esse videtur. Atq̄ humectat qui-
dem: quos exicat verō nūm laurini, tū cedri-
num oleum. At expers qualitatū alienarū oleū, ta-
lem feruat nostrā temperē, qualem scilicet acce-
pit, vaporosas omnes expirationes vel maximē
prohibens. Quod si pluscūlū membra oleo fri-
ces, cōparabis asitentiū calorem: qua ratione las-
fos non parum iuvabis, q̄ videlicet in minores
corpora meatus pingue ingreditur, ac sic quē du-
rata sunt, molliat: & quod acū & subtilē humi-
diratē, quæ latebat sub cute, per hāc itū digerat.
Nam cum in lāsitudine similes quidē animā-
lis partes siccet, spaciola aut vacua, tenui, acris
& mordaci humore impleant, ea certē corpora
remediis indigent, quæ & siccitatē irrigent, & hu-
morem acrem disculant. Cui negotio aqua per
se sufficeret, si inhaerere posset corporibus. Quia
verō facile diffinit, ob id nimirū illi cōmodissi-
mē oleū miscet: maximēq̄ ex vtroq̄ frictio auxi-
liatur siccis aequalibusq̄ corporibus, cum ipsius
olei ratione diutius aqua adherescat. Quare hu-
mectantū & exiccantiū, sicuti calfacientiū atq̄
refrigerantiū, oleū veluti materia existit. Nam si
exiccanti cōmiscas, totum effeceris exiccis: sin
humectanti, & ipsum humectās, ac plerūq̄ magis
q̄ antea reddideris: vt in aquæ exemplo docu-
imus. Cū itaq̄ omnibus quæ sibi cōmiserit
subseruiat oleū, recta ratio neq̄ vti omnī mā-
teria exilit: nam licet eorū necessariū propriam
actionē retundat, ac minuat, nō tamē vitiat: tū-
simō est ubi eam quoq̄ adaugeat. Quippe cōtus-
sa cum oleo aqua, magis auxilio est lāsitudinib⁹,
q̄ si esset sola: non sanē q̄ intendat virib⁹,
sed quod iis quibus opus est, diutius inhaereat.

CAPVT XXVI.

Quod aut, nisi mediā habeat temperiem, id
quod ea quæ primariū affectib⁹. auxiliant veluti
devinciet, expenūmero ipsorum repugnabit ac-
tionibus, generatim quidē ex ipsa rebus om-
nium naturarū speciatim sūt, ex medicamentorū
historia licet addiscere. Etenim generatim, quoni-
am id quod miscetur, si in contrariū retrahat,
admissi sibi facultatem medicamēti vincere in-
terim poterit, & in alteram planē speciem id qd
ex ambob⁹ miscetur, transferre. At speciatim,
sic etiam id ipsum cognoscere. Nam si exalcalisti-
cum rescicantiūm medicamentorū cuiuspiam a-
quam miscere velis, non modō nihil eorum quæ
agere nata est, fieri videbis, sed omnino obscura

tam esse, perinde ac si admista nō esset. Omnino
ergo constat mediā obtinere temperaturā de-
bere, quod vtriusque extremis tanquam materiā
inseruat. Quem in ordinem si oleum statuās, v-
triusque nihil peccaverit.

CAPVT XXVII.

Cū igitur oleum veluti mediā quædam ma-
teria sit medicamentum calfacientiū atq̄ refrige-
rantium, consistit tantūm ex oleo & rosis rosā-
ceum (quod saltem exactum & simplex est) vtri-
que & ipsum talis temperaturæ fuerit, qualis ro-
sarū succus existit. Quare illos qui ad vitiū re-
stantur, experieris ab eo refrigerati, protinusque
aliquam vtilitatem percipere: qui vero refriger-
rati sunt, omnes ledi. Non tamen valida in ipso
apparebit refrigeratio, sed quæ in primo refrige-
rantium gradu collocari mereatur.

GALENI PERGAMENTI

de simplicium medicamentorum facul-
tatibus, lib. III.

CAPVT I.

Corporū vnumquodq̄ aut calidū, aut
frigidū, aut humidū, aut siccū, & di-
citur & apparet, interim quidē ex sua na-
tura, hoc est, primariū, & per se interim sūt ad-
venientes qualitate assumpta, quod est per acci-
dens. Porro eorū quæ propria sua natura calida,
aut frigida, aut humida, aut siccā dicant, quidē
actū siue energia talia existunt, quædam poten-
tia. Sed & eorum quæ actū dicuntur, aliud quidē
absolutē est calidum, frigidū, humidū, sic-
cum, veluti elementa: aliud excessu, vt homo, e-
quus: aliud ad symmetriam, seu generis sui, seu
speciei, vt leo cum homine cōparatus, homo au-
tem atate florens cum puero: aliud ad quidvis
obvium, vt Dion ad Theonem. Quin & corpora
quæ potentia talia aut talia dicunt, vniūquod-
que vt ad id quod est actū relatum dici necessa-
riū monimus: id quidem quod facile accendat,
ad id quod actū est absolutē calidum: hoc verō
quod alia calfacit, ad id quod per exuperantiū.

CAPVT II.

In eo igitur corpore periculū est sumendū, ad
qd vnumquodq̄ tale & est & dicit: si exterior autē
recedendū. Elementa namq̄ huiusce tractatio-
nis, in primariū quatuor qualitatū, videlicet cal-
ditatis, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis co-
gnitione cōsistit. Porro alimentū a medicamē-
to differt, quōd hoc quidem alteret in qualita-
te, illud autem substantiæ corporis assimilatur.

CAPVT III.

Verū cū duplices sint in genere alteratio-
nes: alie specificæ, quæ propriæ sunt & primariū
dicunt alterationes: alie verō quæ cōtundunt &
cōtrahunt corporis nostri particularē, quas vtriq̄
per abvitiū potius quā propriē alterationes
cognominant: in primo sanē genere cōtineri vi-
res medicamentorū censemus. Nec enim quicquid
mutari ex specie in speciem possit citra
exalcalitionē, refrigerationē, humectationem,
& rescicationē, etiam si cōstringatur, contunda-
tur, cōvulsetur. Dico aut mutari ex specie in spe-
ciem, veluti cū ex pane sit sanguis, aut ex hoc

Medicū esse de
bere, quod v-
triusque extremi
cū fuerit ma-
teria.

Rasacum ex
oleo et rosi con-
sistat.

Rasacū tempe-
ritū est, quāvis
sacra rosarū
sunt.

Rasacū in pri-
mo gradu rosi
gerat.

Oleum corpori
eodem, calore
& sudore efflu-
atū probetur.
Oleo vnguentū
quod fuit, & quod
minuatur.

Oleum esse me-
diū inter hu-
mectantia & sic-
cantia.
Oleo lauro fer-
uat nostrā tem-
periem, quāvis
aliā autem.

Lāsitudine de
fuerint, quāvis
humida.

Frictio ex hy-
dris et vtroq̄
corporū ac-
tione.

Oleum qd alio-
rū medicamen-
torū materia.

Calidū frigi-
dū, humidū, sic-
cū, quod ma-
do vniūquodq̄
corpus dicatur.

Calidū, frigi-
dū, humidū, sic-
cū, quod ma-
do vniūquodq̄
corpus dicatur.

Alimentum a
medicamento
quo differt.
Alterationes
sunt duplices.

Medicamentū
res vtriusq̄
quibus continet
autem altera-
tionibus.

caro. Itaq; nō ab alio q̃d calore, frigore, humidi-
tate, siccitate specificas alterationes singuli cor-
poris affectus accipiūt. Quā ratione quatuor ee
qualitates elementares, primæ & specificæ no-
minantur. Earū igitur quā vnumquodq; medica-
mentū in mīstura polente fortitur, investi-
gamus.

CAPVT III

Cum autem de his nature respectu bifariam
vnumquodq; dicatur calidum, frigidum, humi-
dum, arq; siccum, partim absolute, vt singula ele-
mentoru: partim per exuperantiam, vt homo, e-
quis, & bos: minus profecto non medici inve-
tigamus, an in aqua marina humidius simpliciter
plus sit quam siccis (id enim clare cōspicimus) sed
an corpus humanū facilius ita ex æqualiter refre-
scent valeat. Cuius sanè rei sumemus periculum,
sicam admoveamus corpori, per fermenta aut
emplastrā id quod ex accidenti, ab eo quod pro-
pria medicamentis vi proficiunt, distinguetur.

CAPYT V.

Ceterū quod per exuperantiā dicitur, id philoſophi accipiunt dupliciter : aut enim ſecundū ſubſtantie molem, aut ſecundum qualiſatē effe-
ctum. Atq; hi quidem calidum vincere in omni-
bus planis, pronuntiaūt, ob incrementa earū &
germinationes iudicantes. Quibus ſane, cū de
rota natura ſcrutentur, recte licet & ſimilia alia
dicuntur medicis aut non recte. Si quidem nūlla
planta, quod planta ſit, calida eſſe debet, ſed
quod hominē calfaciat. Si enim et ſalugandū,
et cūctū, ad hominē frigida eſſe dicemus: qua ra-
tione ſunt alia omnia etiā diiudicanda. Nam ci-
tuta nō modo ſtuſus non refrigerat, & enecat,
vri nō, ſed aliſque, ob idē nūmū etiā & cal-
facit. Inſunt quippe omnib; rebus amicitie quod-
dam, & qualitate pugnantie. Præterea quod
familiare eſt, promiſſimè aſimilatur : quod ve-
rò contrarium, ad intermicionē cū dicit, tum ani-
malia, tum plantæ. Ceterū familiaritates illæ,
ætonus ſubſtantie proprietate exorinunt. Porro
cū ætatum & roſacum non primariō & per ſe
refrigo erent, nemo eā calida dixit.

CAPVT VL

Quod applicitū nobis videt actū esse calidū,
eodem gradu quo nos, aut ex contractu similiter
calidi reddi, id ex media est temperie, nobiscū
collatum: ac per se etiam calidum secundum ex-
perimentum, quemadmodum nos. At si quid no-
dum adeo calidum esse scivimus, nec tale admo-
dum redditur, id temperie humana frigidius est,
quantumcumque in eo caliditas experiet: ac pro-
inde admodum nostrum calorem minuet.

CAPVT VIL

Ea autem et communis alterabilium corporū
 omniū natura, ut in eis agant & parantur admo-
 di: quod minus esse calidū, & magis calido calidi-
 tas reddatur: quod vero magis calidum, & mi-
 nus calido remittatur. Nam id vel ex ipso tactu
 clarissime discas. Etenim adde subinde illi tum
 calida, tum frigida esse videntur: calidior quidē
 tacto, frigida: frigidiore vero, calida. Quæ sane
 causa est, ut in balneo quidem frigida videretur
 nobis vrina, foris verò calida: cum tamen sem-
 per ipsa reddatur tepida. Similiter dum rige-
 mus frigore, aqua ex puteo profundissimo liu-

fiat, calidam iudicamus: quæ eadem nobis in balneo, atq. balneum egressæ, apparet frigida. itaq. tactum calidi frigidiq. dignoscendi in normalibus, ponentes, atq. eius dispositioni cuius iudicium omne tribuitur, merito sanè crebro fallimur: ut quod quod haud ex se est frigidum, id frigidi esse dicamus: quod verò calidum ex se nō est, id calidum pronunciamus. Absolutè autē & vrinæ, & aqua putealis, qualis ad nos optimè temperata, atq. ab aliena qualitate immunes videtur, talis profectò & est, & quæ etiam potest.

CAPVT VIII

Cum igitur nec an absolute vnumquodq; calidum sit, vt ignis: nec an per experiant, vt fan-
guis: nec denique an cum symmetrio sui generis
aut speciei collatum, considerare nobis propo-
situm sit, fed ad hominē sit tale vel tale: nec rur-
sum ad hunc, tanq̃ id quod ad aliq̃d aliud co-
mparatur: sed an ad motum ipsi, eam partē quam
tenget, reddat aut calidiore, aut frigidiore, aut
humidiore, aut sicciorē: certe in experiē-
tia omnis iudicandi & dignoscendi cōsistit ra-
tio: per quam nimirō decemur, vt rosas (exem-
pli gratia) & rosarū succū evideret refrigerare.

CAPVT 1X.

Sive enim in iis qui inculpata sanitate fruantur, siue in iis qui laborat simplicissimo affectu, videbitur plene olcū quidem in media tempe-
rie existere: quod verò cōponit ex ipso rosacēū,
ex primo esse ordine refrigerantiū. Si quidē ro-
sam succus frigidiore nature est q̄ oleum: si
nō ita multo, cum tepidam quandam in se cal-
ditate possideat. Eiusdem cum illo ordinis est,
quod ad calore quidem tepidum attinet, in-
dispersione: ab eo tamē laud minimum tenuitate
relinquitur. Nam rosarū succus est exquisitē te-
nuis essentia: proinde q̄ celerissime arefcit, odo-
resq̄ aliorū vnguentorū exoluit. Arē & cham-
emelum senitate quidem, rosā perfimile: calore
verò, ad olei vires niagis accedens, homini tum
familiare, tum temperatū. Quapropter laetitu-
dine, vt si quis laud, in primis cōfert, dolorēq̄
sedat. Præterea tensi remittit & laxat: medio cri-
ter dura emollit, cōstipatiq̄ rarefacit. Ad lix fe-
bres quæ citra viciore inflāmatiōe infestā, cō-
coctas dēficat ac humilior: & portissimē quæ ex
cruca densitate & dissolutū biliosū pvenit: ob-
idiū Soli & spississimis Aegyptiorū est cōsecra-
tum. Est aut̄ hypochondriū gratissimū. Quibus
enī lini semē est gratū: minus tamē q̄ chamē-
melum, cum & minus calidū sit, & effenacē cras-
sior. Cæterū ad ascensū, augmentūq̄ inflāmatiō-
num, chamemelo rosacum præfertur, cum hæ-
tepidā caliditate cum leui affricione indigant.
In principio siquidē, quæ refrigerant atq̄ astring-
unt: per incrementa verò, tepida, & medio cri-
ter conflingenda: at in vigore ac statu inflāma-
tionum, quæ cumq̄ tum moderatē calescere, tum
laxare possunt, magis cōpetunt: siue in declina-
tionibus, quæ valenter calascere & discutere

CAPVT 2.

Ceterū quæ mediz temperaturæ sunt, & quæ vitæ in partem declinant leuiter, interm calfacere videbuntur, rurſūſque refrigerare: interm talia ſeruare corpora, qualia in principio accep.

Qualitates spe-
ciales quæ sunt,
et earum sic dicantur.

Tantum debet
esse ab omni a-
liena qualita-
te immensum, si
sensibile sit ve-
lie indicatur.

Medicamenta-
rum facultates
in quod modum
examinantur d

medica.
Res refrigerans
facit, et debet
refrigerare.
Cicuta esse me-
dicum temperia,
Res refrigerans esse
primo refriger-
randum ordinet.

Basium sacrum
regidū quandū
caliditatē pos-
sidet, odorūque
adurū vniuersū
sacrum emittit.

Chamaeleon fa-
ciliatus inf-
par.

Chamaeleon Is
is ab Arg yron
off collecta. L.
Ling. 1790.

Inſt. I. m. a. Nomen
 quatuor modis
 nomen deſiderat

Salomandra est
frigida respo-
dit hominem.
Cuncta flumina
alio et calfacit.
Confrigus quo-
dam et disre-
pans qualita-
tem nasse va-
uersi rebus.
Familiariater
vnde exorta-
tor.

Media rēpē
pradatum, qu
modo cognosc
tur

Alterabilis
perinde nati-
va quæ sit.

Urina cor ap-
paret nudo frige-
da in bal-

Poculis aqua
car apparet in-
gulus frigidus

exerant. Nam quò sit impossibile ut ita interficiant, nisi prius cor refrigeret, necessum sanè est, ut intro còmuniter ingreditur. Ad quod ex sua natura præstat nequeunt, crassa & inepta ad motum quum sint. Quare ascitiam caliditatè requirunt, quæ in minuta extenuet, ac veluti manu ducat in subiles meatus. Itaq; si quando ea ablit, cunctantur, in maioribus laxentur meatibus, in ipsiq; fluctuina arteriis & venis, tēporis spatio aliquid perpetuunt. Siquidem qualitates omnes quadantenus in sese agunt. Nam & lapis ab assiduo illacido excauat: gladiūq; ceram fecat de libefcit. Quādiu igitur solidæ partes (à quibus perficiuntur actiones) à refrigerantib; medicamentis nondū refrigerant, taudis animas suplit, est nec cessariū: refrigerari aut nequeunt, priusq; illa subierint, p̄prios larū meatus, id quod sua ex natura nō possunt. Deducit ipse fucos, ut causa quidē primaria, arteriarum attractio: ut secundaria verò & materialis, ipsorū tenuitas: quæ de-

stituta quā sint, frigidiora & crassiorū partiū medicamentis ut opus habet, q̄ præbebit. Cæteri cor pora frigidiora tractū arteriarū imbecilliores possidēt, medicamentorūq; substantias cōtinuare nequeunt, p̄inde medicamentis ipsa cunctari est necesse, p̄cessūq; tēporis rui immutari, tum cōcō qui: qd soler fucos lactuq; q; si integer ad cor perveniret, uō secus ac cicuta petiri eret. Hæc igitur & similia, nisi celeriter permittit, nullius tādē effectus reddidit. At quæ aut erosione aut putredine ceneant, iis ut tempore vires acquirant, accidit. quū temporis spacio putrescant omnia, eōq; magis, quo fuerit humidior atq; calidior locus.

Merito ergo fit, ut quæ frigore suo noxi inferūt, iis actionis celeritas ad perniciē p̄ficiat: quippe quæ alioqui spacio exaltescat, vim per quā agebant, deperdit. At quib; in putredine actio cōsistit, iis tempore actionē adauget, quoniā et putredinem. Nullum autē animal interire potest, nisi cor ab agendi munere cesset: at fieri ut cesset nō potest, cura maximam intemperie. Cicuta itaq; hominē ē medio tollit, tum ob meatuū amplitudinem, calorūq; multitudinē, tum ob validā arteriarū in attrahendo vim, v̄sq; ad cor ipsum pervenit. Sturnos verò ob causas cōtrarias haud enecat, ut puta quā & retinet, & cunctet, ac sese temporis tractū concoqui, preparariq; à corde paratū quemadmodū & in ipsiū lactus accidit, quæ moderatè expressū, alunt homioem; si verò quispā expressum eorū succum largiter

hauriat, nō secus proculdubio morietur, quā quā aut cicuta, aut papaver fumpserint. Ad eundem quippe modum cicuta hominem quidem celeritate distributivus interficit: sturnos autē tarditate ipsa, nutrit. Sia aut exiguum quispā sumatur, mortem homini haudquāq; inferat: quod anus illa Atheniensis experimēto docuit, quæ ab exigua cicuta porthone auspiciata dolo, detrimento ad permagis progressa est copiam; adeo cōsuetudo videtur esse adscitina natura.

CAPVT XXII.

Eorum ergo medicaminū quæ frigore interiunt, nullum genere laterale est, sed sola quāritate: quib; si exigua portione sumant, mortē nō inferant. At in erodētib; putrefaciētib; & cal-

faciētib; haud ita res sese habet. Ad hæc, quæ admodū frigida medicamenta, nisi calorē obiciant validū, qui cōmunat atq; deducat ipsa, nō permunt: sic ita quod cōtinuat deducit, multo valentius fuerit, devincet prius, mutabitq; ac alimento ut sibi sit medicamentum, efficiet.

CAPVT XIX.

Quum igitur niedimenta refrigerantia quadantenus à nobis accipit suā refrigerandi vim, scivti & calfacendi calida (neq; enim quicquam moliri possent, absq; corporis panētis auxilio) inire potestate dicuntur frigida. Nam ut actu nos refrigeret, non prius ex sese obtrient. Ea propter meconii & cicuta, si cum modico opoq; minimè generoso vino bibantur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum. Verus generosumq; calidum auxiliabit. Cæterum quod tenui pelliculæ subtilitāte ætq; colore vermiculo aut flavo, odore gratū, quodq; multam atq; multam postulat, id tum admodum exaltescat: est natum, tam facile v̄ndiq; per corpus vivensum deferret. Tale ergo natura vinū, ætate vetus, multū atq; impermittit, non modò perfrigeraturum omniū, fed eorū etiam qui aut ex oris ventriculi, aut cordis dolore, animi deliquiū patiuntur, præstantaneum remedium exalbit.

CAPVT XX.

At eorum medicamentorū quæ erosione atq; putredine interimunt, pleriq; sanè penurde ut illorū quæ potestate dicuntur calida, actu etiam calida existūt: sed idcirco nos fugiūt, quoniā aut ipsi plurimū habemus calorū, aut crassa est ipsorum substantia. In balneo quippe vrina nobis videtur frigida, quemadmodū algenbus hyeme, aqua putealis calidæ: cæteris aut frigida. In summa, n. pro suo vñquodq; affectu, admoda cōsuevit sentire corpora. Sic ergo si maium habens frigida, eam in truci acerrū immittis, luculenter calorē percipies. Sin calidi nequaq; At si columbino stercore accumulato, potissimū columbiarum sylvestrium, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatē. Sic myi, fori, chalcini, ærugo, calx, aliq; ad gētras innumera, si illis acerrimis manū aut inuicias, protinus videbunt exaltescere. Cæterum si bolum ex eis vnum acceperis, cuius extrema superficie ab ambientis fuerit refrigerata, meritò nullū percipies calorē. Quam ob rem fieri etiā potest, ut quæ respectu nostri sunt potestate calida medicamenta, ea secundum alterum animatum genus calida esse actū videantur.

CAPVT XXI.

Quæ igitur nos contracta per putredinē aut erosionē enecat, ea recta quidem ratione deleteria huiusmodi naturæ toto genere existimant, nō ut refrigerantia, quantitate duntaxat. Hæc equum interdum vinū curat, & nutrimentū animali redduntur: putrefaciētia autem, vel si sumant portione minima, omnino tamē corumpūt, quod videlicet quæ putredini obnoxia sunt, calore humidatateq; putrescūt, calidos autem humidatateq; sit sanguis. Proinde longius enā possit tempore à quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potius-

Qualitates omnes qualitates in se mutuantur.
Lapis ab assiduo illacido excauat.
Gladius ceram fecat de libefcit.
Quamdiu igitur solidæ partes à quibus perficiuntur actiones, à refrigerantibus medicamentis nondum refrigerantur, taudis animas suplit, est nec cessariū: refrigerari aut nequeunt, priusq; illa subierint, p̄prios larū meatus, id quod sua ex natura nō possunt. Deducit ipse fucos, ut causa quidē primaria, arteriarum attractio: ut secundaria verò & materialis, ipsorū tenuitas: quæ de-

La'teca fuit, si ineger, ac cor perveniret, non fecit ac cicuta petiri eret.

Deletoria quæ putrefaciētia erodunt, quomodo ab eis differant quæ sua extingunt frigida.
Interire nullū animal possit, nisi cor ab agendi munere cesset.

Cicuta cor minus fucos erodit.

La'teca fuit liberaliter sumpta est letali.
Verina quæ ad Atheniensis alebatur cicuta.
Cōfuetudo est adscitina natura.
Necentia frigore non generat, sed sola quantitate dicuntur letalia, eorū quæ ea quæ putrefaciendo aut erodendo interimunt.

Medicamenta calida ut frigida à nobis jam mutuantur in aliam suā, ac prout potestate dicuntur letalia.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

Cicuta si cum modico et minimè generoso vino bibatur, modico quidē interimunt. Si quæ verò papaveris succum, quantum interficere potest, hauserit, ac etiamnū tantū superit, luic largè eporū vinum.

miū quæ crassa terrenâq; essentia sunt prædita.

CAPVT XXII.

Erodesia.

Interdū aut ipsa erodentia medicamēta aded exigua sumunt, vt externi cum excrementis possint, prius quam iniuria corpus afficiat. Interdū etiā q̄ illa sumptū, opportunitus remediū vsus, asseruit. Nam vbi grauis ab his noxa illata est, malum ipsum fisti nullis præfidiis potest. Cæterum cātharides medicamētis diureticis cōmodē permiscēntur: sicuti alexipharmacis alia plerūq; leuolija. Feruntur. n. alioqui spōte sua per vrinā ad vesicam cantharides, ac sic rodendo illā exulcerāt, nisi vbi copia modica indūratur. Ex quibus patet, quæcūq; frigiditate interimit, si exigua sumantur, nutrire corpus posse: at quæ putrefaciendo, nequaq̄, quum naturæ humores aduerſentur.

CAPVT XXIII.

Medicamentis multis diuersi generis substantiis esse immixta.

Vt igitur in alimentis mīfos esse varios sapores diximus, sic in medicamētis intelligere oportet, multas diuersi generis mīstas esse substantias: id quod in venias facile, si consideres granum cni-dium solum hoc à crico differre, quod plurimū libet caliditatis. Porro attractio q̄ in ipsis cernitur, q̄ qualitatū proprietatibus, quæ sunt in substantiis, perficitur. Idcirco purgantia medicamentorum, vbi fortē purgatione frustrantur, quædam præter q̄ quod noxam corpori nullam inferunt, etiam alimentum corpori præsentalia verō in corruptionē ac venenum vertuntur. Om-nino siquidē medicamentū purgans, vel cum vno salte humorum, qui in nostro corpore sunt, si militudinem habet: non autem perpetuū mīsta esse vit virosa. Quamobrē nec perpetuū, licet nō purget, iniuria afficiet, verūm & concoctionem admitteret, talēq; produceret humore, qualē erat natum educere.

CAPVT XXIIII.

Purgantia, vbi à natura vincta sunt, talē ty-guant humore, qualem doctrina erant.

Plerūq; itaq; attractiones sunt qualitatū familiaritate: ac, p̄inde singulæ animalis particulæ familiarē sibi alimentū attrahūt: ad q̄ sententiā sequitur, medicamenta purgilia familiaria esse purgatis humoribus quodāmodo efficaciora, valēntioraq;: sicuti magnes ferro, quippe q̄ ad ferri naturam accedit, repertiū in ferri fodinis, eiꝝ specie magno pere sit persimilis: verūm forti or est quodāmodo, vt attrahere sit aprior, quātrahi. Cnicus etiam (quem carthamum vocant) colore quidē pituitæ similis, calore illi superat, sic vt trahere quātrahi sit, p̄mprior. Ad eundē modū granū cni-dii, si quando à corpore nostro vincat, vice purgationis alimentū efficit: veluti veratrū semper conuincit. Verūm vero quoniam attractiones, substantiarū similitudine fiunt, necessum est vt si q̄d purgat pituita est, id q̄d trahit sit non pituita, sed p̄nurosum. Dissert siquidem similitudo ab identitate.

CAPVT XXV.

Verumtamen alia entinnici. Attractio humore si substantiarū similitudine. Similitudo differt ab identitate.

Ad hæc, purgantia medicamentorū quædam iam actū possident idoneam ad attrahendum si militudine: quædam ab animantis illi corpore accipiūt. Præterea in vnoquoq; medicamēto, permixti similibus sunt alq; succi dissimiles, qui parim quidē medicamentosi sunt, parim minime. Quare vbi purgationem haud assequitur, quædam in perniciē, quædam in alimentū vertuntur.

CAPVT XXVI.

Verumtamen alia entinnici. Attractio humore si substantiarū similitudine. Similitudo differt ab identitate.

Cæterū vbi purgans pharmacū visque adeo inualuit, vt in valorem ad ventrem pertinentiū oculis mordicanem apertionemq; multā relinquit, assidueq; irritans, cōuolensq; corpora, vasorū facultates dissoluat, vacuationes immo detrahe contingunt-ira, vt si quod pituitam educit medicamentum exhibitum fuerit, prima quidem omnī ipsa evacuet, dein flaua bilis, mox atra, quarto deniq; loco sanguis. At si quod flauā bilem detrahat, pituita consequetur: post quam atra bilis, quartus demum red detur sanguis. Sin atram bilem purgare sit natum, eam quidem primam eliciet: post quam, flauam: deinde pituitā, ac omnium vltimū sanguinē, tanquā ex manibus vasīs effluēt, vt q̄ summa iam imbecillitas occupet, quēq; ad extremam osculorum apertionē perueniet. Ex quibus manifestū est, postremū in immodicis purgationibus vacuari humore qui familiarissimus est: aliorum autē fungios, pro vt crassi existunt, ant tenues.

CAPVT XXVII.

Quum igitur vasa non amplius in se continere succos possint, & oscula eorum reclusa fuerint, neq; irritare medicamentū desinat, nec possit amplius familiarem succū attrahere, necessū est reliquos quoq; q̄ diximus ordine, sequi. Fit autem orificiorum apertio, ob medicamētū violentiā, ob quam videlicet mordicano etiam poruenit. Vasorū autem imbecillitas, tum ob ingentem defatigationem, tum ob intemperantiam, q̄ immodicas purgationes præcedit.

CAPVT XXVIII.

Quum igitur vasa non amplius in se continere succos possint, & oscula eorum reclusa fuerint, neq; irritare medicamentū desinat, nec possit amplius familiarem succū attrahere, necessū est reliquos quoq; q̄ diximus ordine, sequi. Fit autem orificiorum apertio, ob medicamētū violentiā, ob quam videlicet mordicano etiam poruenit. Vasorū autem imbecillitas, tum ob ingentem defatigationem, tum ob intemperantiam, q̄ immodicas purgationes præcedit.

GALENI PERGAMENTI de simplicium medicamentorum facultatibus, lib. IIII.

Constat igitur vniuersas corporis partes p̄peti afficiq; ab alterisq; qualitatibus, quemadmodū lingua afficit: sed passio-nem sensum nō exactē percipere: at lingū ob gletonem quam habet sensus, posset naturas earū omnīū dignoscere: tamen si passioni similitudinem inuenire sit etiam in aliis partib. vniuersis, ac p̄cipuē in exulceratis: quandoquidem cutis durtas densitatēq; prohibet, quo minus foris incidentium facultates intrō in carnem penetrēt.

CAPVT I.

Sic enim & illud ab Hippocrate dictū est, Viceribus frigidum mordax: tamen si cuti prius q̄ exulceraretur, mordax nequaq̄ esset. Porro quæcūq; frigus contingit, eorū & contrahat, & con denset, & contringat substantiam, primūq; te nues tum excernantur humiditates, sicuti ex oculis lachryma, ex naribus mucus, necesse est: postea vero etiā mordax appareat, licet alia ratione, q̄ in calido. Nec enim erodendo quod continuum est, sed diuelliēdo, mollēscq; substantiam in artū contrahēdo, ac breuiter ipsius partis cōtinuitatem per diuisionem soluendo, moleſtis, ac mordax est frigidū. Cæterū vt in his prostratis contractionis cōdensationisq; sic illis quæ calore suo mordicant, dissolutionis et fusionis sensus percipitur. Ad hæc, in refrigerantibus quidē utcūq; rardior est atq; cunctāior mordacitas: in exalcalificantibus verō quāmeliorē penetrat,

Vacuatio immoderata quando & quomodo accidit.

Sanguis vacuatur omnino vltimū, eo na-tura famulatur sum.

Vasorum refectio imbecillitasq; vnde acci-dit.

Viceribus frigidum mordax.

Frigidum quo ratione sit mor-dax.

*Mordicantium
alio sunt facul-
tate calida, al-
ia frigida.*

trat. Quam ob rem medicaminū mordicantiū,
alia sanē calida facultate, alia necessariō sunt frigi-
da. At q̄ moderate calida sunt, quicq̄ tempera-
ta potius quā calida dici debet, vt poculum
arḡ balneū, dum mediū temperē fortuntur, no-
bis grata & amica existūt. Funditur enim per ea,
quod in corporibus nostris consistit atq; con-
cretum fuerat, vnde animi tibus voluptas maxi-
ma oritur. At si quis in eis immoret diutius, sen-
sim quidē & ipsa molesta evadunt, idq; nō quod
mordicatione infestent, sed quod substantiā no-
stram soluentia digerentiāq; deliquiū animi, ac
tandem mortē inducūt. Quæ autem his calidiora
sunt, secant, distrahuntq; substantiā, quare nec-
essariō mordacia vident, vt gum aqua feruens,
tum ignis. Igitur subiectam materiā contrahere
condensareq; frigida semper est propriū: fundere
autem atque liquare, calidi: virtutisq; vero im-
moderatus aucti, communis est mordicatio. Vē-
rum quæ à summa frigidityte, aut caliditate ab-
sunt, minimē cutem mordicant. Plurimū autem
ad id genus affectiones facit essentia medicamē-
torum vel tenuitas, vel tenuitas. Siquidē frigi-
da quæ tenuiū partū sunt, quā magis in pro-
fundum transeant, vehementius mordicant. Ca-
lida verō q̄ crassiarum sunt partium, quoniam plus
vicerant, vehementius idcirco affligunt. Tenuio-
rum itaq; partium aer est: crassiorum terra: me-
dium eorū tenet aqua. Sed aer accensus fit flam-
ma: terra autem pruna: at aqua vehementem sa-
lū caliditate recipit, sed nec flamma nec pruna,
propter innatam humiditatem, efficitur. Siqui-
dem flama & pruna ignis sunt genera: ignis au-
tem omnia, calidus est & siccus: aqua sicca vt
fit, fieri nequit. Nullum autem est adeo calidum
pharmacum, vt flamma, aut pruna, at aqua ser-
uens. Procedit tamen visq; ad visionē ipsa medi-
camentorū caliditas, vbi in crassa consistit essen-
tia. Quæ verō subtiliū partium sunt calida, non-
nunquam omnino nō mordicant, sed calfaciūt
duntaxat. Est vbi mordicent, non tamen vrant.

CAPVT II.

Porro quæ celeriter in tenuia solūntur, tenuiū
dicuntur partū: quæ id perpeti nequeunt, crassa
rum. Quod ergo ea solūntur, calor animalis, cui
applicantur, est causa: quod in tennes crassave
partes comminuantur, id à propria natura ob-
tinent. Quocirca refrigerantiū medicaminum ea
quæ crassiorū sunt partium, mordicare nequeūt,
quod extrinsecus cutis superficiem penetrare non
valeant. At quæ tenuiū sunt partium, maximēq;
si inæqualem temperē fortuantur, valenter mor-
dicant. Sed suprà demonstratum est, inæquabilia
esse propemodū omnia: vbi ostenderemus, & in
vino, & in oleo, quatuor reperiuntur succos diuer-
sos, in summāq; vniuersa medicamēta facultati-
bus contrariis consistere. Enim verō acetū, tamersi
ingenitū vini caliditatem amiserit, ex putredine
tamen sibi aliam adeptū est. Quippē vinosa vini
partes, dum ipsum in acetū transtū, refrigerantur:
atque remeantū putrescens, asciscitū calidi-
tate acquirat, velut quæ putrescūt omnia: frīgū
acetum quiddā ex contrariis facultatibus mistū,
partium refrigerantibus, partim calidibus: sicvti
vistorum lignorū oēs cineres, qui ex aduisione nō
nullas partes igneas conseruant, quas macerati

postea solent in aquam deponere. Hanc enim a-
quam marinā & muricā per omnia correspondē-
tem, vulgō lixiuium appellat. In vniuersum
autem, quod tantum est acidū, quicquid id fue-
rit, planē frigidum est, eōq; vt cōtra omnes cali-
dos affectus cōmodissimē poterit, vt omplacitū
succo. Qui quidem quū omnino acidus sit, per-
fectē etiam refrigerat, vnicūq; ardoris p̄desti-
nimicus affectuonibus frigida, quemadmodū
omnia exquisitē refrigerantia. Ea aut quæ quū aci-
da sūt, habent etiam saporem quendā acē per-
mixtum, qualis planē inest aceto, haud dubiē nō
nihil caliditatis possidet. Verūm si frigidatam a-
stringit cōiuncta sit, alud est frigiditatis genus.
Quippe acida frigiditas tenuium est partium: at
astringens, crassarum.

CAPVT III.

Non igitur sola ratione per methodos logicas
nos exerceri oportet, sed exercere etiā sensum in
saporibus linguis: quod fieri, si omnia ea sedulo
experiamur lingua, quæ vnamquēq; qualitatē
præ se ferant manifestissimam. Vt, si acrimoniā
cognitione complecti velis, in alio, carpis, atq;
his similibus, ea sepe gustando te exercere opor-
tet. Sin astringentem, in galla, ribū, & similibus. Si
amaritudinem, tum in nitro, tum felle. Si quali-
tatem saporis expertem, in aqua immuni ab om-
ni qualitate astringentia. Nam hinc exoritur, prom-
ptius ad aliorum obscurorū omnium saporum
cognitionem pervenies.

CAPVT IIII.

Sin autē quāle præbet sensum aqua planē om-
nis qualitatē vacua, talē in re aliqua sicca inven-
ias, ea nimirū modum constitutionem fortie-
tur, aut certē ad frigidius paululum inclinabit.
Quod si talis quum sit in calorē & frigoris dis-
crepantia, insuper consistentia nacta sit siccam, terre-
stris sit, ac citra morsum deficiat, est necesse. Atq;
huius generis medicamēta omnia, medici appel-
lant emplastica.

CAPVT V.

Duplex autem est emplasticorum natura: alte-
ra exactē terrea & sicca: altera viscosa quidē om-
nino, sed ex aqua & terra, & plerūq; etiam aere,
commista, sicuti oleum dulce. Hoc siquidem ex
aëre, terrea, aqueiq; essentia cōstituta. At omni-
bum ē, ex iisdē quodāmodo, sed magis terrea est
oleo. Quin & quod lactis est calcosum, emplasti-
cum quoq; est: & suillus adeps. Nam tauri, & hie-
ci pinguedo, acrimoniā & multam, & igneam
possidet: bouis itē, omniq; adeps acris existit. Por-
ro anseris & gallinæ calidior est pinguedo,
& sicior quā suum: ne non subtiliorū partū,
& minimum terrestris, sicvti & auium omnium.
Quæcumq; ergo pinguedines vñdum vllam na-
turā sunt acrimoniā, emplastica & alinendi po-
ros possident facultatē, eamq; tantō efficaciorē,
quantō sicciores, magisq; terrene fuerint. Huius
modi enim est cera elota, quæ ex melle tū aquo-
sior, tum minimē mordaci consistit.

CAPVT VI.

Astringēna porro terrena sunt, & crassa corpo-
ris consistentia: qualitate verō frigida. Acida au-
tem, tenuitate pollent corporis, sed perinde vt
astringēna refrigerant. Etenim arborū fructus,
quōtq; nobis, vbi maturaverūt, dulces apparēt,

X x ij

*Lixiuum.
Acida omnia
sunt frigida,
quoniam acida.*

*Omplacitū fa-
cultas.*

*Acida frigiditas
tenuum est
partium,
Astringens frigi-
ditas crassarū
est partium.*

*Sensum quoque
sensu exerce-
re.*

*Alit accensus fit
flamma.
Terra accensa
fit pruna.
Ignis generat
flammas et
pruna.
Aqua esse sicca
non potest.*

*Tenuium &
crassarum par-
tium quæ effi-
ciuntur.*

*Mordicare quæ
valeant.*

*Medicamenta
omnis facultatis
omnes consistunt
contrariis.*

*Acetum ex con-
trariis facultati-
bus constat.*

*Emplastica me-
dicamēta quæ
dicuntur.*

*Emplasticorum
natura duplex.*

Omni partem.

*Adipem differe-
ntia.*

*Cera elota est
emplastica.*

*Astringentium
natura.
Acidorum na-
tura.
Prunorum sapo-
rem.*

nuper enati, a cerebri sicco sunt cōstituta: progreſſu verò tēporis, humidiores reddunt, acquirūtq; ad acerbitate, aciditate quādam: quam excoctes ſenſim, poſtea dum perſicuntur ac matureſcunt, dulces evadūt. Sunt quidē in arboribus; ſed poſtea quā re poſiti aliquandiu fuerint, dulcedinem indipiſcantur. Alij nō intervenire acidiſſitate, paulatim in dulcedinē tranſeunt. Omnes tñ coquantur & matureſcunt calido: quod quidem duplex exiſtit: alterū nempe & propriū, & cuius in genitum: alterum externum, a ſole videlicet, ſed naturæ ipſorū conueniens & familiarē. Si igitur quum initio acerbū eſſent, tēpore maturiſcentē dulceſcunt, ſequitur ex calore ipſis pervenire dulcedinē: acerbitate verò acidiſſitateq; ex frigore. Ad hæc etiam, initio quidem lignoſi quē ſunt, nec non ſiccū & acerbū, poſtea vero lumine adveniente tēddantur acidi, paſſim eſt, ſaporem acerbū acido magis terrenum exiſtere. Quin etiam, ſi ab acerbō ſapore manifeſtē linguam cōtrahi, ſiccitē, aſperitatem contingit (que vniuſ frigidiſſima ſunt opera) liquet planē frigidum eſſe ſaporem acerbū. Quoniam verò itaq; quālibet etiā deſiccet (id enim eſt quod exaſperat) fuerit vniq; omnino etiam terrenus: nam aqueus, omnia æquabilitē penetrat. Præterea, velle quādem acidiorū ſupiorū tranſitus in partib; ſit ſentientibus, acerbiorū autem tardus: tum ad ea quidē in alto magis agere apparēt, in ſuperficie autē acerbiora. Quæ omnia, craſſarum eſſe partium acerbiora in dicant: acida verò tenuium. Ceterum vitæ dicuntur aſtringere, tum quæ acerbiora ſunt, tum quæ auſtera: ſed in maioris minorisq; ratione differant. Inſunt autem ipſis medicamentis qualitates complures, non diuerſi modō, ſed pugnaſtes etiam, atq; interim ſubcontrariæ. Quæ ubi aſtringentiū (exempli gratia) diligenter explorare actionē contendis, ea tannim diſquiras, quæ guſtū exquisitē acerbiora videntur, nullamq; ſiletem manifeſtam habere qualitatē admiſſam. Quæ quidē ubi nactus fueris, tum in optima ſanorum corporum conſtitutione, tum in affectibus ſimpliciſſimis, de illis facies periculū. Nam ſi corpus ſanum manifeſtē cernatur refrigerare, & calidiſſis pſit affectibus, intrepidē ſine poteris de aſtrictione ipſa, q. refrigerare, pronuciare. Sin cōtrā appareat, talēq; medicamentū acerbū in illas conſpicuam caliditatem inducat, calidā naturā putandū eſt, in ceteriſq; ſapōnib; pari iudicio experiendū. Ego verò, eſt facultates medicamentorum, vel citra ſapores, ſola experientia noſcitur.

Aſtringent omnia exquisitē aſtrigenda.

Dulcium eſſe magis frigida. Amara omnia calida.

Acidiorū corpora exilis tripliciter.

Auſterius igit ſapor, exolutus acerbus eſt. Quſi autem corpus acerbū, terrenū ſit atq; frigidū, tripliciter neceſſariō exoluitur: nēpe a ut incale-

ſcent, aut humeſcent, aut vtriq; ſimul perpetiſcent. Si ergo incaleſcat duntaxat, ſolidam dulcedinē contrahet, quib; caſtanis ineſt. Sin tantū humeſcat, ſi quidem ea craſſarum ſit partium, & aquea humiditas, auſterū evadet: ſin verò æterā acceſcit. Si pariter humeſcat & calliſat, humiditate quidē aquea, in dulcedinem: æterā verò tranſibit in pinguiſſitudinē. Ac ſane ſecundum proportionem qualitatū miſturas, varias fructus mutationes formant. Ceterū acerbiora ad extremū perſeuerat fructus illicis, arbuti, ſagij, & corni. Acerbiora ſimul & dulcia, myrti fructus eſt, piri agreſſis, & roboris. Auſterius vniū & dulcia palmarū fructus. Pinguiſſi eſt, tū fructus, tū ſuccus oleæ.

CAPVT VIII.

Quoniam ergo fructus oleoſi diſtinxerunt, addendū ſunt, & dulces. Quib; verò altera ſcientia amarior aduenit, hēdi non poſſunt. Quippe amarum omnē eū nequirit talēq; eſſicatur a caloris exceſſu. Verū dulce omnē calidū eſt, nec immodicē calore noſtrum exuperat, ſed intermiſtes ſe cōtinet fundentis, leuigantis, molliſtis; Quib; autem quedam ſint quæ vna, quæſi quæ duabus in ſe ſe qualitatibus & agunt & pariunt, quæſi verò etiam totis ſubſtantiis ſint: in horū certe numero medicamenta nōn pauca ponūtur, ſicv & nutritia vniuſia: quorū duplex eſt genus. Si quidē quedam ſunt pingula, vt ipſa pinguedo: quedam dulcia, magis minūſve, vt omnia illa quibus nutritia.

CAPVT IX.

Est tamen & pingue ipſum, & quicquid nutrit, dulce. Nam quū nutrito vacuati repleto ſit: quod evacuatum autem eſt, familiarē & benignū eſſe: certe etiam id qd nutrit, familiarē, iucundū, & amicū ſit eſt neceſſe: ac proinde calidum modicē, reſpectu illius qd nutritur. Sed in hoc non parua eſt maioris minorisq; ratio: quādo quidem nec ad cibos accedimus exaſtē ſecundum naturam affectū. Corpus ſiquidem totū quū cibos appetunt, ſit duntaxat inanitum oportet, ſi ad ſoluti futuri ſint familiaris iſporum qualitates cognitores. Nā ſi præter id calidiores q. cōueniat, aut frigidioreſ evaleſcant, non ſolum quæ nutrant, verum etiam quæ refrigerent aut calfaciant, poſtulant. Quocirca cibi quorū illis aliis alij iucundiores videntur. Nam quū duplex ſit genere iucundū: alterum quod impleat id quod vacuum eſt, cuiusmodi eſt nutritum: alterum qd medatur ei quod alteratū eſt, id quod medicamentum exiſtit: evenit vniq; cibis, ubi nō modō vacuati exhibentur corporibus, ſed etiā qualitate aliqua mutatis, vt duobus nominibus deſcribit, vt cibi ſcilicet, & vt medicamenta. Quæ obrem nec eduliorū nec medicamentorum vna eſt animantibus. omnibus ſpecieſ: quidē pro ſua vnaqueq; familiari ſubſtitia ſimul & aſſeſione, tū deſcitant, tum iuvant ab vtriq; Sed ſi hæc ſic habet, id quod in cibis minus erit dulce, minus quoq; erit calidū: quod dulcius, tantū nimirum erit calidius, quāto videlicet dulcius: ſin ad immodicū recidat calorē, nec cuiusmodi dulce erit, ſed iam apparebit amarum.

CAPVT X.

Etenim vt a moderato calore biſariū cuiq; corpori dulcedo pvenit: partim enim ſunt proprio

Acerbitas in alio qualitates motu.

Saporum differentia in variatione in fructibus.

Fructuum qui non ſunt ſocii, ei qui manent. Amara edo non possunt. Dulcis saporis natura.

Nutritivum duplex generis.

Nutritivum omne eſt dulce. Nutritio quid.

Nutritiva eſſe medicamenta calida.

Inciduum eſſe duplex generis.

Dulcedo a moderato calore provenit.

& infuso calore dulcia, partim vero asceritio: ad eundem modum amara. Alia namque sunt, quæ suapte natura ex caliditate alius aut id accidit ab acquisitione calore accensis. Porro dulcia oīa proxime accedunt ad naturam eorum quibus apparet dulcia: idque ut proprio calore, ut melior acquirunt, ut sunt omnia quæ ab igne præparantur. At mustum non suo modo, sed etiam asceritio calore dulce esse videtur. Siquidem haud parum veluti ardoris ex solari calore rō acinis, rō aliis inest fructibus, à quo id quod illis aqueū ac veluti semicoctum inest, ad concoctionem ducitur. Nam ex quibusvisque pomis, si succum exprimas, eum protinus non secus atque mustum feruere deprendes: tanto tamen feruoris discrimine, quantum erit vnus fructus ab alio in calore diuersitas. Ceterum ubi quod semicoctum erat, transfusum iam fuerit, evanueritque is quod excitabat feruor calor, iam tum denique syncerum succū proprietates cernunt, propriamque vinorum naturam agnoscunt. Iam vero quæ inveterant vina omnia calidiora redduntur: ac primum quidem quandam dulcedinem acrimoniamque asferunt: quæ vero prius inerat illis asceritio, auferiturque, tempore ipsam deponit. Dein rursus acrimonia increfcere, dulcedinem indes abicitur, paulatimque amarescunt. Unde constat, dulce esse calidius austrore, sicuti & dulci amarum. Atqui si verū est dulcedinem pervenire à moderatione caloris, patet asceritionem à frigido vincente perfici.

CAPVT XI.

Ut igitur vinū acerbum, tempore dulcius primum, mox acius amariorque, vltimō vero planē amarum naturaliter reddatur: ad eundem modū quod veluti rigorem præter naturam perperam est, protinus acidius efficitur: ac si prius refrigeretur, accefrit penitus. Præterea quod in vindemia ipsa per absidū pluuiam, aliena humiditate fuerit imbutum, leui occasione accefrit. Cōtra vero accidit eis quæ ralia quum sint, igni admouentur: nam & protinus, & profressu temporis dulciora reddunt: tandemque si perdurauerint, aliis similiter amarescunt. Quum itaque omnia sit acida, vna vero dulcis, ac fructibus omnibus maturatio à solari calore proveniat, planum est, imperfecit & frigidus esse quod acidū: perfectius vero & calidius, quod dulce fuerit. Ceterum duces sit vinibus acrum atque succus omphacis constant. Nam acrum proprio quidem vini calore, est frigidum: asceritio autē, contra quod ex putredine, calidū. At omphacis succus calorē non habet, ac proinde nec acrimoniam. Præterea omphacis succo acrum tenuius est. Quamobrem frigiditas quæ ab aceto indigitur, excellit eam quæ procedit à succo omphacis, idque vellemētia, & mīssione. Nam tamen si succo omphacis ne minima quidē caliditas infir, acro autē acrimonia quædam ex calfaciens: hæc tamen satis non est, ad superandam ab aciditate provenientem frigiditatem: sed potius veluti sternētia viam, atque perit meatus, illius celeritatem promouet. Caliditas siquidem quæ à præcedente aceti acrimonia oritur, protinus à frigore insequētis aciditatis extinguitur, ita ut multo maior ex aceto frigiditas percipitur. Ad hæc autē, si pari mole aceti mellis permisceas, aceti frigiditas superabit mellis caliditatem.

eōque magis, quō fuerit maior aceti copia. Quod si multo plus mellis quam aceti indideris, parē calorem atque frigiditatem in ea mistura percipies. Siquidem multis numeris acrum plus ab eis quæ moderate sunt calida, ad frigiditatem recessit, quā mel ad caliditatem. Porro omphacis succus, quod & ipse (ut omnes fructus in pristino sui ortu) est acerbior, ad ardentia hypochondria longē præstiterit, quā acetum: quod nec violentiam, nec ferentem, nec mordaciorali lunctam frigiditatem sortiatur.

CAPVT XII.

Porro quod vna quædam invalida Verē atque ferate accefunt: quodque vehemētius mora, in meridianis locis reposita, idem etiam parantur: cōtra vero hyeme atque versus æquilehem defossa, integra & secunda suas vires seruat: nonnulli à calore nasci aciditatem existimant. Se autē si falsos esse deprehendunt, ubi videntur nō calida & vetera vina, sed quæ principio sunt frigidiora, sic per calorem accefunt.

CAPVT XIII.

Per simile autem quid vinis accidit, quæ naturā frigidiora aquosiora sunt, quales sām exiguus & imbecillus. Quippe si eas ad feruidū soli exponas, prius obfcurari, aut etiam extingui conspicias. Quod si valido etiam statu concutias infirmis, ac parum flammæ, citius illis extinxeris quā inani xeris. Natura enim infirma, validi nec mortum, nec calorem sustinet. Ceterū multis in locis fortiora vina ex industria commouent & transportant, necnō soli exponunt, & calfaciunt, ac denique ad meridi obvertunt cellas, ut citius sic rarefiant, & potui idonea evadit. Nam quod multo tempore aliis, hoc iis quæ sic calfacita sunt, breuissimo accidit. Quænammodū igitur exercitia valida & sol, calida & robusta corpora, etiam validiora efficiunt: proferunt autem, digerunt, & refrigerant quæ non sunt eiusmodi: sic vina naturalia calida, mortis veluti ventris, sol calfaciē, flammæque iuxta ardentis, celerius concoquantur: quæ vero frigidiora & aquosiora existunt, eorū arguit omnia id genus imbecillitatem, celeritatemque perpeti cōgūt, quā alioqui possent passura essent: quā nimis res quælibet in propria natura seruet calore, proprio: corrumpatur autē ab immoderatione extrinseca, nō minus caloris, quā frigiditatis.

CAPVT XIII.

In vniuersum autē aciditas nascit calore quidē mutante, non autē vincente siue alimentum, siue medicamentum: quemadmodum videre est in acidis rusticis, qui à semicoctis cibis oriuntur. Quod autem opus sit calore alterante, arguēto sunt lac, & prunæ succus, quæ tempore æstiuo citius accefunt quā hyeme. Quum enim saporis acidi sint essentia simul tenuis & frigida, quæ admodum constitutio borealis, nasci certe sine calore nō possunt, sicuti nec ille ipse acris: ac pinde licet frigidi sint omnes saporis acidi, nulli tamē eorū quæ extreme refrigerando enecant, ac dum est. Exploranda porro acidi saporis natura est in oxalide & oxyphario, ut in quibus reperitur maxime syncerus & simplex. Etenim quod proprie in saporibus appellat acidū, à sola lingua percipi potest, sicuti & acris: ceterum quod vtrique est commune, nempe mordacitas, etiam à tactu sen-

Generatio
omnium cor
pō ex quatu
or elementis
fit.

titur. Porro ex quatuor elementis impari mixtura
coënnantibus, particulatim omnium corporū con
stant generationes. Ex ea autem imparitate per
ficiuntur proprietates corporum particularium.
Quippe ex elementorum inæquali mixtura, plan
tarum, ex platis autem, animalium proprietates
oriuntur. Ac trāscent sanē quædam protinus in
se mutuo: nonnulla mediocribus aliis: veluti ter
ra in triticum, hordeum, & alia id genus rursus
horum singula in carnem humanam: quum ta
men ipsa terra caro vi fiat sit impossibile, transi
entem eam quæ in medio est mutationē. At eor
um quæ in se mutuo trāscent, quædam cele
stem, quædam diuturnā alterationē obnoient. Ve
rum quæ maximē sunt inter se similia, celerē quæ
dissimiliora, tardiorē. Lingua igitur ex acutissi
mo sensu prædita, oēs qualitates diiudicat, nec
non familiaria & similia, ab iis quæ sunt contra
ria disternit. Cuius usus gratia in hanc solā par
ticulam complures nervi inferuntur: quū in alia
singulas inferatur aut vix rāntum, aut al
ter, nec is magnitudine insignis. Quum igitur
quædam nature nostre magis sunt familiaria, quæ
minus: atque hæc quidē tēperamento huic, illa aut
illi: necessarii plures qualitates ipsius gustus exi
sunt. Cæterum omnium quæ nutriunt cōmunis
dulcedo est: quandoquidem quicquid nutrit, ne
cessario plus aut minus sit dulce oportet. Quæ
verō nō nutriunt, ex aut nō dulcia, aut salia esse,
est dicendum. At verō id quod cuius rerum fami
liare est, vix cōtinetur & natura eius est vix: quæ
autem aliena, complura, partim plus, partim mi
nus substantia eius dissidentia. Porro quæ dul
cia simul & acerbiora sunt, ex crassioris essentia
sunt, & temperaturæ frigidæ. Quæ acida simul &
dulcia, tenuiora sunt quam acerbiora, refrigerat
et ipsa. At amara, calida sunt: sed acris his calidi
ora. Nutriunt ergo hæc oia, si iunctam habeant
dulcedinem. Per se autem nullum dictorum nutri
tur, quorum saporum missiones minimē quidē
sunt subitose: in alteratione cōsistunt. Nam iis
quæ a natura mutant, sensim sunt alterationes.
Sicuti igitur quod est summē dulce, aptum efui
est: quod verō exquisitē amarū, ineptum efui: ita
quæ in medio sunt eorum, nutriunt quidem, ve
rum minus quam dulce. Eadē ratio est in cæteris
qualitatibus. siquidem præter dulcem, nullā nu
trire potest. At elementa multo sanē etiam minus
nutriunt, nullāque gustui qualitatem offerunt.

CAPUT XV.

Sed quemadmodum edulia quæ nutriendū
nature quam similia sunt, ea & dulcedinē præ
se ferunt, nec vllam præparationem requirūt: sic
quæ temperaturam natā sunt remotionem, alia
condimentis, alia coctione, alia vtroque indigent.
Etenim condimenta, quæ ex se edendo non sunt,
suavitatem tamen iis quæ per ipsa præparantur,
cōciliant, quod illa reducant ad medium. Appa
ret etiam natura calidi, quibus ad modum fuerit, ea
celeriter alterare, atque in aliā mutare speciem. Quæ
dam tamen fusiora, quæ diutius iustiora igit ap
plicata redduntur: sicuti & quædam longo tem
pore, quædam minime, vt coquant, indigent. Ete
nim quæ nutriendum corporum temperatur
is similia sunt, ea vel citra coctionem, aut præpa
rationem, iam dulcia apparent. Quæ verō dissi

milia existunt, omnia insuavia sunt, antequam præpa
rentur. Atque ea quidē quæ nimis calida sunt, frigi
do corrigi debent: quæ verō impensē frigida, ca
lidorum mixtura obnoientur, & igni. Ad eundē
modū humiditate, quæ terra sunt & sicca: succi
tate, quæ humidiora sunt quam expediat. Maxi
ma eorum quæ dicta sunt, faciet fidem, quæ in
ore fit transmutatio. Nam qui pisciculū sustine
re ieiunio, iis salua salia reddidit: qui verō plu
rimū, amara. Sic etiam vniuersum corpus bilio
sum reddit. Est aut ipsa flaua bilis amara: atra au
tem, acida: sanguis qui secundum naturā est, dul
cissimus. At pituita linguam contingens, nunc
dulcis, nunc acida, nunc salia videtur.

CAPUT XVI.

Nihil igitur mirum, nec cur rem omnium dul
cissimū mel, succū generet amarissimū: nec cur
id maximē ætate florentibus & calidis natura, &
frigidioribus accedat. Nam vt foris quam piscu
lum igni admoetur amarū efficitur, ad eundē
modum in animalium corporibus, vbi syncerū
validūque natum calorem fuerit, biliosum fru
gum procreat. At in temperatis & æstibus, fri
gidioribus, facilius in moderatam sanguinem ver
nit. Nec verō ab alieno rari calore, sed a suo
est proprio, mel amarū tempons spacio reddit.
Porro lac, etiam si gustu sit dulce, ex se tamen ni
quam amarum efficitur. Vincitur. n. in eo calidi
tas & frigiditas, ex proinde accedit repositū. Cō
stat autē ex tribus substantiis, qualitate diuersis:
prima quidem crassa, ex qua caseus coëscit: se
cunda pinguis, ex qua butyrum: tertia aquea, quā
nominamus serum. Ex quibus pinguis quidem,
maximē temperata est: crassa verō, paululū ab ea
declinat: excrementum autem illud ferofum, fri
gidum est & humidum. Si igitur gustari lac pos
set, vbi in ventre & per venas coëctum est, ipso
melle dulcius inueniret. Nam quod foris & ex
se se mel obtinet, id dum coquitur lac accipit. Et
quum admodum ingens calor in animalie exti
terit, tantam acquirit lac dulcedinem, quantam
deperdit mel. Recte itaque id ratione evenit. Etenim
quod summē dulce est, ac proinde nihil apponi
ad eius dulcedinem potest, id vt in cōsequenti
verti pergat qualitatē est necesse. At cui quid
deest, id per coctionem acquirit. Verum lac
vbi cruditatem in vêtre perpenit, in frigidiori
quē accedit, in calidiori nidorosum amaritū effi
citur: nunquam autem inter coquentiū mel acriditatē
contrahit. Porro vtraque, tum quod acidum est,
tum quod amarum, linguam mordicant. Cæte
rum mordacitas ipsa, si tactu proprie, non a gu
stu sentit: tribus istis saporibus, acido, amaro,
& acris, est mordicatio communis: verum acido
quidem, vt frigidio simul atque subtili: amaro verō
& acris, vt calidis.

CAPUT XVII.

Quod sapor acer sit calidus, non est cur in de
monstrando sim anxius: quando quidē id nemo
addubitat: & evidētia sensus, demonstratio si
dem prævertit. Porro quæ ex acris, idonea sunt
efui, dulcem quandam, et si obscuram, necessariū
habēt qualitatē admixtam. Proinde multis ipso
rum, p obfusio vniuersi: multis verō vt cōdime
tis tantum: at vt cibo, ipso rō omnino nullo, idque
ob virum vehementiū, eorum autem quæ non
eduntur,

Alimenta inter
perata quomodo
corrigenda.

Humorum qui
in corpore sunt
sapor.

Mel quibus in
bilis vertatur

Mel pisculum
igni admoetur,
amarum.

Mel temperis
spacio amaro
fit.

Lac subitū
amarum efficitur.

Lac ex tribus
substantiis con
stat.

Lac incidit in
ventriculo in
ferum calidū, tan
tum dulcedinē
contrahit, quā
et amittit mel.

Lac quomodo
in alienis qua
litatibus mutatur

Mordicatio rō
de amaro, &
acris saporis est
communis.

Acer sapor est
calidus.

Acria efusiva
necessariū ha
bent admixtam
dulcedinem.

Generatio
omnium cor
pō ex quatu
or elementis
fit.

Similium faci
liorem esse trās
centem in se in
ter
Lingua facul
tati.
Lingua corpū
per nervos tribu
it.

Dulcedo est el
ementis cōmuni
quæ nutrit.

Familiaria cui
que isti viciis
altera autem,
plura.

Acris amara
calidiora.

Elementa nec
nutriunt, nec vi
lent gustui qua
litatē offerunt.

Condimentis
indigent.

*Acrium medi-
camentum diffi-
cillimum*

eduntur, alia mortifera sunt, alia simpliciter me-
dicamenta: oia* tamen cum nocte imposita, ce-
lester vlcus molitur. Sunt & quæ ne guttare
quidem audeas, cuiusmodi sunt cistaria rdes, rha-
pia, & ea quæ erosione aut putrefactione interi-
munt. Multa verò etiã ipsò statim odore pugna-
tiam cum homine indicat: veluti & lincipia quæ
hunc diximus, & ex summe ætheris fructibus, quæ-
te, papaveris, mandragoræ, lycoperij, & lyo-
scyami succus. Terminus autē siue finis saporis

*Staphyrum suum
sorb quæ sit
si in aut terro-
rum*

*Amarum saporis
finitur
Amarum quibus
morbus conue-
niunt*

*Staphyrum agria
erogant car-
nem*

*Acrium saporis
facile*

*Acres saporis
quomodo ab a-
maro differat*

*Incidentia qua-
lia esse debent
Evidentia me-
dicamenta fer-
ro esse ignita si-
milis
Evidentia spe-
cie varia*

sunt, calx, cantharis, lepus marinus: necnō aristo-
lochta, & uis: quæ quidē hæc vinna duo, & ma-
gis sunt illa acra, minimè deleteria existunt.
Canthariz autē modicè sumpta, quibusq̃ oportet
admissa, nō modò nihil offendent velicam, sed
tenes etiam expurgant.

*Canthariz cum
modicè velicæ
expurgat rem*

CAPVT XIX.

Quod itaq̃ amarus sapor siccus temperie cor-
poribus insit, huic colligere est, quod & maximè
omnium amara putrescant, minimèq̃ tum ver-
mes, tum animalcula illa, quæ in radicibus, her-
bisq̃ & fructibus putrescentibus oriri solent, pro-
ducant. Maximè itaq̃ videmus in humidis na-
sci corporibus vermes ac putrilaginē. Quamobrē
quæ exactè amara sunt, animantibus propemo-
dum vniuersis sunt elui inepta: quò nimirū ani-
mal omne sit humidum. Porro abstinuum nō
solū amari est, sed astringit: marina verò aqua,
salis potius est, quàm amara. Ac aqua quæ est in
lacu Syriz Palæstina, quem alij vocant mare mor-
tuum, alij itagnum bituminosum, aliq̃ deniq̃ so-
domenū, gustantibus nō salis modò, sed ama-
ra videtur: itaq̃ adeo grauis & corpulenta, re-
spe-ctu aliarum, vt ne si coners quidem insulens, in
pfundum deferri possit. Inest enim ei salis sub-
stantia admodum grauis & terrea: ac proinde tū
tū est aqua quæ in eo lacu est, marina grauior,
quarō marina fluuiali. Poteris autē ipse aquam
maximè efficere, colloquato sale in aqua fluuiali:
cognoscetq̃ simul quāto grauior reddatur a-
qua eiusmodi, quā sit dulcis. Quin & modum
iam inueniunt moderatū ad saliedū conficiē-
di salisuginē, si in ea oīū natate videatur. Quid
si decoquere salisuginem ipsam velis, pronus
amarior reddetur. Nam quicquid salisum plufcu-
lum exalfeceat, amarum evadet. Ergo in eo Sy-
riz lacu, quod nimirum aqua quæ in eo est amar-
rior, nullum neq̃ animal, neq̃ planta inesse con-
spicitur. Imò quid duo in eum longè maximi flu-
uij conflant, piciūq̃ copia scatētes, præcipue
qui prope Ierichonē fluit, quem Iordanem ap-
pellant, nullus omnino piscium fluuiorum ostia
excedit: & si capios quæ in lacum iniiciat, celeri-
ter eos mori cōspicit: adeo est omnibus tum ho-
minibus, tum plantis aduersum, quod amarum
existit. Omni autem salu obscura quardam astrin-
gendi vis inest, quæ eas quæ conduntur carnes
construigat ac densat, ponisium vbi durum, &
minimè fragilis fuerit. Talis est exactissimus q-
deni solis sal: ferè omnis: minus autem illo, mari-
nus: tum q̃ multis in locis aqua leuiter salis a-
rescentibus pro venit, tertium locum obinet, ab-
stergere magis quàm astringere cōtrahereq̃ po-
teris. Proximas his vires Sodomiticæ habet, æ-
quæ atq̃ marinus durus.

*Amarū sibi
in omnium po-
tissimum*

*Amarū cur autē
malibus vni-
uersis sit quā
insipia
Amarū omne
esse humidum:
marina mortua
aqua calissima
de sit*

*Quid sit
quid sit*

*Salisuginē con-
fice ad saliedū
modum optime,
cum aqua inua-
tate videatur*

*Salis amaro-
rior amplius
exalfeceat
Mare mortuū,
cur nec plantæ
nec animalia
vbi aliat*

*Amarū esse ho-
minibus atque
plantis aduer-
sū
Salis vires q-
differencia*

*Salis & amari
saporis dy-
namis
Salis grauior*

CAPVT XX.

Propinquus est sapor salis amaro, quum ter-
reni sunt ambo, & calidi: nō obscura tamē diuer-
sitate distat: quod videlicet amarus a calore a-
rido magis sit extenuatus, & elaboratus. Sic in
genere salis, q̃ durior, dērior, atq̃ terrestrior est,
qualis ferè est vniuersis fossilis, minus existit ca-
lidus, sublimiq̃ minus partu: q̃ verò rumpi sa-
cilis, laxiq̃, tenuior simul atq̃ calidior est: in q̃
genere & subamarus consistit, mediū naturū in-
ter salē durum & aphronitū obtinet: At verò

Xx iij

spuma nitri omnium est iam dictorum tenuissima: veluti & Asipetris flos, qui aphronitro tamē minus est calidus: quare hic exerceatē carnū in nori cruciatu colligat. Porro verō eas nieri flos siue spuma: mordicat etiā tum aphronitru, tum nitru. Ceterum que sunt crassa essentia, plus rodunt, ubi quendam fuerint calorem naeta.

CAPVT XXI.

Plerique odores similiter saporib. nos afficiūt. Siquidē acida omnia, & precipue acetum, similiter odoratu gustumq. mouet. Tum acria quoq., veluti alia, cepx, & ipsa nō minus quā gustū, odoratū offendunt, mordicantq. Itaq. non nullo- rum corporum, etiam nō gustantē, qualitatē cognoscimus, veluti simi: pinde negustare quidē aggredimur, quod maxima fides odoratui habeat. Quinetiā si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta, odore nos offendant, ne gustare quidē illa dignamur: serēq. in omnibus muris cōsentiūt odoratus & gustus. Atramē in odore suauissimū, veluti rosa, plurimū sanē diffundit. Tantrū. n. abest vt gustantibus suauia sint, vt amaritudinē nō vulgare exhibeant. Tamen si quod amarum est, nunquā sit odoratum. Siquidē generatio amari saporis ex dulcibus proficiscitur a calore extenuans: ac proinde amara ca- lidiora simul & tenuiora sunt dulcib. Porro sensus odoris in cerebri colloca- tur ventriculis an- terioribus: odorabiliūq. vaporosa est substantia. Ea quippe quæ a corporibus desiliunt, aēri ambiēti permista, in cerebrūq. per narium in- spirantōē delata, sensum mouēt. Recta ergo ra- tione odorata omnia, eadem & calida sunt qua- dantenus, quā vaporum copia a calore excite- tur. At non quicquid odoratum est, siue conti- nuū erit: siquidē non omne id spiritui contēto in vetriculis cerebri, familiare existit. Iam verō in benevolentia & graueolentia odorabilem plerāq. redncimus, appellatē beneolentia quidē proportionē quadā ad ea quæ lingux sunt dulcia: graueolentia autē, ad ea quæ omnino insuauiā. Ceterū ab us quæ exactē tum falsa, tum acerba sunt, aut nihil, aut omnino parum vaporis desiliūt.

CAPVT XXII.

Itaq. haud solida res est, ex odore de sensibiliū temperatura conicere, peninde vt gustu: nimirū ob substantiarū iuxqualitatem & differentiam. Etenim que odore carent, crassam quidē essen- tiam obtinent: ceterāq. que sit eorum in calore & frigore cōstitutio, id nondum constat. At que odorata sunt, tenuia vni sunt quadatenus calida. Porro quā in rose succo (præter ipsius rose corpus durum terreūq.) tria excremēta inue- niantur. vnū crassum, quale est in vini spx: alterum aërium, quod vini flori respōdet: tertium aqueum, quod in omnibus bullitionem corrup- tionēq. molitur: certē gustus id genus omnia diiudicat. Siquidē rosam gustantibus aliud quidē acerbum est: id quod terreum vt sit, & cras- sum & frigidū, est necesse: aliud verō amarum, quod tenue est & calidum: tertiu deniq. aquēū, necessariū quidē frigidū, sed in tenuitate cras- tudinisq. oppositōne, & quodāmodo extremō- rum, quorum vires exoluit, medium. Hæc itaq. omnia de succo rose per gustū ipsum discernas:

at per odorē, haud æquē: quā nō perinde om- nes eius partes evaporēt, nec pinde sensum mo- uēt. Maltrō minus ex coloribus & viribus medicamentorum licet ratiocinari: quā in colori- bus singula, calida, frigida, humida & sicca repe- rias. In particularibus autē seminum, radicū, aut succorū generibus, aliquā ex coloribus li- cet fumere indicationē. Vt si dicas, cepx, scilicet vinum, quāto fuerint albidiora, tantū & minus calida: quæ verō subflaua salsūq., calidiora. Idē vsu venit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri, li- reos radici, asphodello, & aliis compluribus. In quocūq. enim genere in vniuersum sulua, flaua, ru- brāq. omnia, albis sunt calidiora. Itaq. etsi hinc quod coniectura fieri queat, optimū tamen fuerit per experientiā discretam facultates inue- nire medicamentorum. Siquidē in hac falli non posis: licet prius quā experientiā virtutem ag- noscas, gustus plerāq. indicet, pauculum etiā approbas ipso odore.

GALENI PERGAMENTI
de simpliciū medicamentorum facul-
tatiū, lib. V.

Vnt ergo (quatenus dictum est) qualitatē primæ, caliditas, frigiditas, humiditas, atq. siccitas. Quæ verō ab illis denominant cor- pora, ea sunt tum cōmunia omnīū elemēta: tum ea quæ per harum excellentiam, calida, aut frigi- da, aut sicca, aut humida nuncupantur: tum ea quæ ad cōueniētiā siue symmetriam generis eius- dem, aut speciei cōferuntur: quæq. ad quidvis obuium. Diximus præterea nutrimentum vitici ab eo quod nutritur: medicamentū autē vince- re ac superare alteratēq. corpus cuius fuerit me- dicamentū: idēq. aut vna qualitate, aut coniuga- tis duabus, aut vniuersa substantia, vt complura letalium medicamentorum, nec pauca etiā a- mulictorum: tum purgētia omnia, & plerāq. eo- rum quæ attrahētia vocantur. Quæ verō vna a duabusve qualitatibus in vniuersum nostrū cor- pus agūt, ea hoc in libro exponemus, hinc sum- pra hypothēsi, quod simpliciū medicamentō- rum plerāq. dissimilium sunt partium, rēq. ve- ra cōposita, tamen si appellentur simplicia, quod cuiusmodi sint, ita natura sint, nec quicquam ex nostra industria assumpserint.

CAPVT I.

Medicamentis frequēter vtunt homines, tum ob alterationē q. qualitatibus primis molitur, dum videlicet calfaciūt, refrigerant, humectant, & siccant: tum ob eāq. que a secundis proficiūt tur qualitatibus: quarum nimirum rationē, alia emollientia dicuntur, alia tendentia, alia laxa- tia, atq. alia deniq. aliter nominantur. Siquidē quā particulatim vnū quodq. medicamentō- rum non pari modo ex illis primis qualitatibus suam temperaturā acceperit, inde fit, vt hoc quidē ex iis vim laxādi, tendendi illud, aliud aliā facultatem fortiaur. De quibus sanē siue secun- dia, siue tertis facultatibus, agere in hoc quinto cōmentario est animus. Porro ad simplices mē- peries faciliēq. affectus pellēdos, sepe natura du- ce pleriq. idiotarum ipsa remedia inueniunt. At phlegmones, scirrhi, ordemaris, erysipelatīq., nullus ex illis sibi remediū ducit perversigandū: tanquam

Calores ad me-
dicamentum vo-
ri designatōes
parū confusis.

Calidiora sunt
albi sulua fla-
ua, rubrig.

Qualitatē pri-
ma quæ sunt.

Nutrimentum
vici ab eo
quod nutritur.
Medicamentum
vincit alteratē
que corpus
cuius medicamen-
tum existit.

Simplicium me-
dicamentorum
plerāq. dissim-
ilium sunt par-
tium.

Medicamen-
ta vici
quorum vici
tendunt homines.

Medicamenta
vici ita in a-
genda dīstī-
ctā vnde pra-
tice.

Odores plerūq.
similiter saporē
huius nos afficiūt.

Amara odorata
ita non esse.

Odores sensum
in cerebri ven-
triculis anteriori-
bus moliantur.

Odorabilem
esse vaporosam
substantiam.
Odoratum autē
non esse odorabile.

Oder aut perinde
de vt sapor
sibiūm tempore
vni indicat.

Rosa inesse ex-
cremēta tria.

Rosa partium
examinat.

inquinatum vnumquodque eorum maius iam sit, quod caput hominis plebei, ac scientia requirat venarum viliores, quam Medicinam appellat, sicuti & illius professor, Medicus. Atque huc vires & ipsi procedunt, ut sciantur vires causam impleri carne, fordidum purgari debere, quod quabile cicatrice induci non tamen norunt, quid carne impleat, quid purget, quid cicatrice inducat: sed ea invenire, vnius opus est Medici. Ceterum quod ferè numerari oqueant omnes particulatum vires medicamentorum, si secundum singula que ab eis perficiuntur, dum huc aut illi morbo auxiliant, impropria ipsa deflexa nomina: multo sanè prædarius videtur, multa omni plixitate, commodos speciebus coppositas definire ipsorum facultates coppendiosissime, sub quibus ceteræ omnes que dici possunt, comprehenduntur. Vt si dixerimus, non puris morandi, aut dolosis sedibus in trinceæ farinæ caraplasta, (exempli gratia) facultatem ineffe, sed modicè tum humidam, tum calidam.

CAPVT II.

Quæ in commentario hoc discutienda veniunt, his quæ in alius exposita sunt, magis ad medendi rationem pertinent. Igitur ab emollientibus & pus mouentibus oritur, dicamus utrague calida & humida exsistere: ceterum hanc quidem, ceu simillimum corpori in pus mouendo calorem producente, absque vlla exsistentis in eo humiditatis aut consumptione, aut adfectione illa verò, ceu maiorem quam pro natura accendentes, non habili humiditatis contralientia. Est autem suppuratio idem quod in pus motio.

CAPVT III.

Sed nec de emollientibus medicamentis, nec de ipsa emolliatione, simpliciter loqui licet: quandoquid nec de corpore duro, vel molli. Siquidè partem absolutè duram dicit, ut terra: partem per excessum, ut vnguis: partem ad symmetrū sui generis vel speciei, ut elephas nimirum ad Herculem: partem ad quidvis obuium, ut Diogenes ad Aristotelem: ac de molli partem iudicio. Omnis tamè significatus ceteris, de mollioribus duris, ut ad ceterum hominis temperatissimi, contemplerur: quod sanè regulam & mensuram statuimus, omnium que ita discuntur. In idem autem recidit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic durum molliorè appellat: quandoquidè medium quoddam est tractus nostri, ut & Aristoteli visum est, & Plato quoque sensisse videtur, ubi ait: Durum quidè, quibus caro nostra cedit: molliorè verò, quod cedunt carni. Quod verò in comparatione ad quidvis obuium durum ac molle est, id in eo quod magis minusque cedat, iudicari videtur. Porro corporum præter naturam induratorum ad ita tum naturaliter rediens, emollior est.

CAPVT IIII.

Verum quid variè quidè efficiat durius, neque aut succescens, aut concretescens, aut nimia repletionem, sic ut vehementer tendatur, aut denique alia qua coniugatione: sequitur ut & propria suaque cuius emolliendi sit ratio. Ceterum quod in cedat, molle est, si quidem corpus id simplex fuerit. Nam quod ex pluribus consistat, ac sese invicem contingentibus, ut truci acutus: aut invicem implicatis, ut lana, simul & cedere potest, nec tamen esse molle. Contra, in eis que summe plena

sunt, ut vires, neutrum latius in se cedit: nec tamen quod continetur est durum, sicuti neque id quod continetur, quam antea durius, etiam sit tenuius effectus. Ac talia sanè non dura, sed reuertia appellamus. Vt autem non est vna induratorum natura, ita neque vna medela. Nam quod a siccitate induratum est, humectari postulat: quod a congelatione, exallicieri: quod a repletionem, evacuare: quod a siccitate simul & coctione neque, humectari simul & incalescere, per ea scilicet quod tantum sunt calidiora & humidiora, quod ipsa interperies fuerit frigidior & siccior: quod a congelatione simul & repletionem, pariter & calidari & vacuari. Sicantur porro corpora citra congelationem, tum in validis exercitiis, tum in sole feruent, tum in ingenti inedia, tum in ardens febris, & medicamentis que ita siccit, ut non refrigerent. Congelantur a vehementi duntaxat frigore, sicuti & impletur a largi tantum humoris affluxu. At siccantur simul & congelantur, coctionibus que simul convenire possunt causis: ut si quis supra modum laboret in frigore. Sic quoque repletur simul & congelantur ab influxu frigido ac partitis refrigeratione. Frigoris rarius causa triplex est: vna, a foris incidentibus: altera est propria particulæ patientis temperies: tertia ab influente in ipsam humore pervenit. At emollientia pharmacæ peculiariter congruant, quæ coctionem induerit, magis si in eis collectus sit humor præter naturam, vel uti in scirrhis. Nam si a siccitate induraverint, humectanda, non emollienda sunt. Similiter que sunt impleta, non molliri, sed evacuari postulat: itaque ut refrigerantibus, aut calfacientibus, aut resiccantibus. Vacuant siquidem frigida repellendo, similis cum calore exprimendo vapores plurimi: exallicientia autem, humorem contentum dissolvendo in vaporem: quæ verò propriè siccæ appellantur, in huiusmodi digerendo: idque aut ebibendo humores, aut toram alterando particulam. Porro olea & aqua calida humectant simul & calidant, idque multo magis, in vno coeuntia, quam si singula per se adhibeantur. Idem efficit edulorū qualitas, si similiter habeat. Quæ quidè ob id famè canis auxilium, quæ affectus si sit rigida siccitati coniuncta. Ceterum caraplasta ex farina triticea in teperranis naturis pus mouens, nec naturaliter partium humiditatem minuit, nec quicquam illam adauget: sicuti nec calorem intendere potest, nec hebetare, sed istum illius substantiam augere. Id igitur genus medicamentum humidum & calidum dicimus, ceu similem habere nobis temperiem, quæ calida existit & humidum.

CAPVT V.

Medicamenta igitur que pus mouent, substantiam similiturè particularum secundum naturam se habent, tueri potius quam alere sunt natura, quum nimirum eis similem temperaturam obtineant: humiditatem autem ipsam que in vacui hebetat, atque adeo etiam contusam carnem immutat. Etenim quum tres in animalium corpore fiant alterationes, vna planè secundum naturam est, qua cibi in cremorè nutritioni aptum vertuntur: altera contraria huius, præter naturam, qua coopturescunt omnia: tertia ex utraque mixta, & media est, partim quidè cum prima illa communi, partim autem cum hac secunda, quæ præter naturam dicitur. Si quidem alterationes secundum naturam, duo hæc insunt,

Emollientia quæ induratori vna in molliendo reuertuntur.

Frigoris causa triplex.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Vacuatiuum modo dicitur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Emollientia quæ huiusmodi reuertuntur.

Idem quod quæ huiusmodi reuertuntur.

Medicamentorum vniuersum particulatim nomen non possit.

Idem quod quæ huiusmodi reuertuntur.

Pus mouentibus ab emollientibus quæ huiusmodi reuertuntur.

Suppuratio quæ huiusmodi reuertuntur.

Casti hominis temperatissimi esse regulam statuimus, omnium quæ huiusmodi reuertuntur.

Tallus hominis temperatissimi esse regulam statuimus, omnium quæ huiusmodi reuertuntur.

Mollior quæ huiusmodi reuertuntur.

Durior quibus modo reddita aliquid mollior rationi placet.

Collata omnia non esse mollior.

et vt & ex familiari materia animantis nature alteratio fiat, & materia ipsa a calore ingenito superetur. Et verò quæ præter naturam est, & ab aliena caliditate mutatio accidit, & ad nihil vitæ. At media earum, quæ comitantur suppurationes, ab ingenito quidem calore fit, sed non plane vincit. Præterea nec ex materia profus benigna peragitur, nec etiam omnino aliena. Itaque quemadmodum naturales alterationes, quæ ab innato calore perveniunt, à simili iuvantur extrinsecus (nam quid æquæ cōcoctioni ventris conferre nouimus, quæ ille humanum corpus ad mortem vnde nonnulli tum pueros tum catellos, per quietem vtrius imponunt) pari modo & quæ in mouendo pure conspicitur. Cæterum tale esse debet quod mouendo puri adhibetur medicamentum, qualis est in naturis temperatis calor natus. Quare si infuso calidior natura fuerit, in eo corpore, medicamen quod pus mouebit, cōtra oportet sit temperato calidius, quāto & natura eius temperatam in caliditate exuperat. Quare cuiusque singularium hominis sui proprium est mouendo puri medicamentum. Explorandum aut sunt vniuersæ facultates medicamentorum iuxta hominem optimè temperaturam: quo quidem proposito canone, quæ mouendo sunt puri, calida & humida dicimus, quæ illius calidæ & humidæ temperatæ sunt cōsimilia: scilicet calidiora multo, quæ indurata emolliunt.

CAPVT VI.

Scirrhus quemadmodum fiat.

Initium autem sumit induratum affectio ex fluxione viscida & crassa, paruis particulæ portis impacta. Digesto verò per halitum quod in ea fluxione est tenue & subtile, ac deinde quod reliquum est refrigerato, ac veluti cōcreto, vocata sequi scirrhus. In qua quidē quoniam cum frigidityte humor redudat superfluous, idcirco etiam cōpositam eius esse oportet medellā: ob refrigerationē scilicet ex caliditate poscitur affectus, ob supervacaneam autem humiditatem, vacuam. Quia verò quæ immodice tum calfaciant, tum siccant, fluxionem ipsam magis impactū reddunt, manifestum est sola ea quæ non admodum calfaciant, quæque non magnopere exciccat (vocat enim talia emollientia) eiusmodi affectus posse sanare.

CAPVT VII.

Emollientia & pus mouentia quemadmodum differant.

Quapropter calida sunt id genus medicamentā, nec admodum siccā, à pus mouentibus edidit denia, quod calidiora sint & sicciora. Talia enim cognata ac simillima corporibus nostris caliditatem possident: emollientia verò, licet validiorum habeant, non tantā tamē, vt attractionis violentia desiccant reliquum. Præterea quæ pus mouent, humorem qui præfuit in partibus induratis absorbunt: emollientia autē, paulum quidem eius absumunt. In summa, illa quidē quæ sitate potius quæ qualitate caloris agunt: quæ verò indurata molliunt, qualitate potius quæ quantitate. Itaque si in parte quæ suppuratione indiget, assidue impositas licet seruire manus, celerimē suppurationē persciat. Porro iuter emollientia cōnumeratur bdellium, styrax, galbanum, ammoniacū thymizma, medulla tum cernua, tum vinulina, adeps capri nūs, taurinus, & quæ eiusdem sunt generis.

CAPVT VIII.

Pus mouentia debent esse emollientia.

Quinetiam quod emplastū esse debet id genus medicamentū, vt exatē puri generatiuum

sit, liquidū constat. Nam si substantiam innatā caloris augere, non intendere qualitatē ipsam conueniat, poros corporis obstrui est necesse, quod videlicet halituosos transpiratus includit. Si quidem ea cataplasmata quæ aut detergentia, aut validius exalciaciunt halitus diffusi permittunt, excicant quidē, sed pus non mouet. Talis est hordeacea, cicera, fœnigræci, fabacearū farina: amplius etiam xerina, eruina, panici, lupinorū, milii, omniumque similiter excicantū. Per detergentia quippe, quod meatus referret, particulæ calor evolat: ab immo dicē aut calfacientibus, etiam natui caloris substantia minuitur, sed qualitas ipsa intenditur: quāta men halituosus quidē exuberantissimus spiritus desideretur, caliditate tamē cōmoderatus. Qui quidem quū in pueris copiosissimus sit (quod nimium intellexit Hippocrates, crescentia ductis plurimū habere calidi innati) eorū omnes actiones naturales adauget. Verū nihil prohibet, sanguineam substantiam, similis aeris, vni cum spiritu, calidū inaudire in narā. Qui spiritus in omnibus animantibus cōtensus partibus, licet non vndequeque sui similis, si non sit essentia animæ (vt Stoici quidē existimant) at certe primū eius est instrumentum. Continetur aut in spaciis inanimibus quædam veluti spiritus ipsius materia, etiamnō mutationem expolē leuicā, vt spiritus innatus evadat, nihil secus est conducens admodū ad naturalia opera: ex quibus vni est quæ in pus fit cōversio, quū in ipsa quædam etiam perficitur cōcoctio. Quā igitur aliquid cōcoquere nobis consilium est, quamplurimū spiritū intus feruare oportet, non autē discutere: quod faciūt illa quæ nuper commemorauimus. Porro olim ad pus generatio nem aptissimū est, ex his quidem quæ irrigantur, aqua temperata, aut hydreacis: ex his verò quæ perfunduntur, oleū temperatū. Ad ex his quæ hydreacis illinuntur, farina triticea, & panis ipse, quod videlicet modicū est coctus. Nā qui plurimū coctus est, quādammodo siccior est, aptius phlegmonis, quæ ægrius cōcoctionē admittit: quæ verò minus, his quæ feruēt sunt. Et sane quod ex pane cōfici cataplasma, difficulter cōcoctioni cedentibus phlegmonis idoneū est. Siquidē panis, tum sal, tum fermentū miscet. Quod verò ex triticea farina preparatū est, calidioribus vitilis est. Et ipsius etiam triticeæ farine quæ pura est, tum panis quodque qui purus est, puri mouendo cōgruentior existit: qui furfur & minus fit calidum, & magis deficit. Farina autē pura, humida est & calida: qualia certē ad pus mouendum conferunt. Itaque medicamentā quæ phlegmonem tentantis imponuntur partibus, si calida sint & humida, ad pus mouendū cōducunt, vni adeps suillus & vitulinus. Nam taurinus caprinusque illis acrior existit: quod obrem phlegmonis tum frigidioribus, tum durioribus, magis cōgruit. Et adeps gallinaceo tum phlegmonis coquēdis familiarissimus, magis enim anferum: quodammodo tamē ad digerendum potenter. Ad agrestium omnium animalū adeps, multo acrior est siccior est, quādo methocori, maximeque pardalis, atque leonis. Quare horū nullus mouendo puri est idoneus. Porro pus mouet & pix, & resina: ad feruētes quidem phlegmonas, ex rosaceo: ad frigidiores vero, ex calfacientū aliquo oleo liquat, vtpote cicero, rapanino,

Pus inesse plurimum trahi tunc spiritum.

Innatus calidus. Spiritum esse aut facilius animæ, aut prius alioque instrumentum.

Pus mouenda quæ cōgruant.

Furfur facilius.

Adipem differre.

phanino, veteri, aut scyonio. Quā autem cera per se minus fit calida, quā vt pus mouere possit, folis feruentibus phlegmonis apta est, ex callidior oleorū quopiā liquata. Igitur quæ pus mouent, naturā modicē excalescentē & humectant temerantur. Ceterum medicamentū puri mouendū idoneū, facultate quiddē est tale: vbi verō corpori nostro est admodum, sit actū tale, siue energia. Ergo scirrhi vocantur tumores præter naturā, doloris vacuū, sed durū: interdū etiā sensus expertē. Oritur scirrhos ex humore crasso & frigido, quales sunt duo dūræzæ: bilis videlicet atra, & superexicata pituita. Proinde tumores scirrhi omnino aut pituitosæ substantiæ sunt, aut atrabilariæ, aut ex verag milti. Propriè aut emollientia dicuntur, q̄ medentur scirrhis tumoribus, ex pituita excicata, crassissq̄ humorib. ortis. Cōsueuerūt. n. h̄ possumū in musculari capitis bursæ gigni. At q̄ ab atrabilario succo dūræzæ, cāroia sunt oīa, & ab emollientibus medicinis exasperantur. Sed his quo pacto prospicere oportet, in cōmentariis methodi medendi docebimus.

Quæ verō à lento crassiq̄ humore concreto indurata sunt, calida in secundo aut tertio ordine, sicca autem in primo, medicamenta desiderant. Sed quom non exigua sit in corporibus indurata sed maioris minorisq̄ latitudo, necessum est medicamentorū illis medentū non parnam etiam lautudinem esse. In vniuersum autem, ex emollientibus medicamentis præstantiora sunt, quæ recentia existunt. Si quidem inuenerat, validius quā expedit exiccat. Porro radix altheæ & cucumeris agrestis, nonnulliq̄ alie plantæ, parim in oleo, partim in aqua decoctæ, emolliunt: sicut malux agrestis folia, tum cruda, tum cocta. Atq̄ hoc simplex medicamentum est, sicut porcinus adeps in veteratū, cui salis nihil indere oportet, sicut nec emollientiū vlli. Valde si quiddē sal exiccat. In summa verō, quæcūq̄ alia emollire possunt, calida sunt ex secundo, & interdum ex tertio ordine: leniter verō sicca. Sed & his etiā emplastica vis insit oportet, nō secus q̄ pus mouentibus: at quæ nō perinde meatus obstruat, quod magis, q̄ illa, evacuare sint nata.

CAPVT X.

At indurantia frigida sunt, & humida, vt semperuiū, portulacæ, psylli, lenticula palustris, solanum: quāq̄ hoc, in medio exiccannū & humectantiū consistit, duplicem in se habens substantiā, nepe terrenā, & aquæ. At verō si quiddē simul & exiccat & desiccet, sanē & ipsum indurabit omnino: impropiè tamen, quā concretere potius q̄ evacuatione induret corpus. Illa siquidē potius siccitas est, ac proinde non emolliōne, sed humectatione curatur: quæ admodum tensio relaxatione, & relaxatio tensione.

CAPVT XI.

Porro laxatio in articulis sit, humectatis immodicē quæ circa eos sunt iugamentis, pariter & tendonibus: tensio verō, non etiam simpliciter, sed aut plenum excalescat, aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut scirrhi. In cure aut non eandem ita, sed musculis quoq̄ subditis quoquo modo in tumorē subulis: quem admodū etiam in inflammationib. accidit. Quamobrē nō sim-

CAPVT XII.

Quom autē plurimā vrinā mouere est consilium, non admodum dictis vtendum est plurimā, sed quæ acriora sunt, et magis excalesciūt. Est enim omne acre calidū: cuius generis sunt, semen apii, pertosellini, feniculi, dauci, agrio seli-

placiter vna est species remediōrū laxantiū: vt pote quā alia humectando, alia calfaciēdo, alia emolliendo, quādam vacuando, nōnulla tumores præter naturam purgando, alia etiā per coniugationē, horū quippiā agendo, laxare assolēt. Est autē emollientiū medicamentū, quod terrena viscidū substantia, nimisq̄ mordaci prædictum, illarū meatibus corporis tenaciter hæret.

CAPVT XII.

Quod emplastico contrariū est, dici queat porro repurgis, & infarētū liberans: eūq̄ nec vici dum, nec mordacitatis experte, sed subtile & nitrosum. Nam in ratione tantum maioris ac minoris differūt, tum emplastica ab his quæ sordes nutriunt, tum repurgina ab extergentibus. Nam quæ poros obstruētos referant, subtiliora extergentibus sunt, emplasticisq̄ cōtraria. Sunt autē hæc, tum nitrosa, tum amara. Ceterum ad extergenda ea quæ in superficie sunt, requiritur vt cū extingū impolita medicamenta ipsa, solam extingū nitrosam qualitatē possideat. At intro in corpus assumpta, etiā si adiuncta sit quædā astrictio, possint tamen sic quocūq̄ magnos purgare abstergerēq̄ meatus, cuiusmodi in vasis cōsistunt. Nam foris meatū exiguitas prius ab astrictione occlusa, q̄ probē queat expurgari, nō etiā inde in alium abstergentē substantiā recipit, nec expurgat. At quæ circa ventrē viscerāq̄ sunt partes omnes, quā maximas in se habent meatus, maius accipiūt cōmodum ex vasorū corroboracione, q̄ propter osculorū exiguitatem lædant. Proinde intrus abstinētū repurgare potest, foris nō potest: quippe qd ex amara acerbāq̄ facultate est compositū. Quæcūq̄ igit repereris nitrofa & amara, ea ad purgandos meatus omnes, valere noueris. At cutis & vicerū sordes, non hæc tantū, sed & virib. minorā possunt auferre: qualia sunt dulcia quæ tenuiū sunt parnū. Porro scilla, iris, nitrū perse, aphronitri, spuma niri, seriphon, abrothionum, cum cibo poriq̄ assumpta, crassos viscidōsq̄ humores extenuandi vim obtinent. Quā obrēt lentis ac pituitosis thoracis pulmonisq̄ humoribus, aut parulentis & incidendis, & extenuandis, & educēdis, aptiora inueniē alia præ istis medicamentis nō possia. His ipsis & iednoris obstruētiōnes expurges, & modicas etiā lenis. Nam quæ maiores sunt, vehemētiora desiderāt: nempe capparis coriæ, radices tamarites, scolopendriū, & scilla, & asplenon. Sed ratem istis vtendum est, ad iecur quidem ipsi per sese duntaxat: ad hēnē verō, mistis aceto, aut ei incoctis: ad thoracē pulmonēq̄, melicrato, prius sanx, oxymelini, aut dulcium vinorū cuiuspiam.

CAPVT XIII.

Quom autē plurimā vrinā mouere est consilium, non admodum dictis vtendum est plurimā, sed quæ acriora sunt, et magis excalesciūt. Est enim omne acre calidū: cuius generis sunt, semen apii, pertosellini, feniculi, dauci, agrio seli-

CAPVT XII.

Quom autē plurimā vrinā mouere est consilium, non admodum dictis vtendum est plurimā, sed quæ acriora sunt, et magis excalesciūt. Est enim omne acre calidū: cuius generis sunt, semen apii, pertosellini, feniculi, dauci, agrio seli-

Laxationem
speciem hanc.

Emplastico
essentia qualis.

Emplastico
positum qualis.

Extergentia
sunt quidem,
debeat esse exacte
nitrosa: viscerum
autem, vel si
aliquid astrictio
non fortis, ad
huius conueniens.

Abstinētum
intrus repurgare
potest, foris
non potest.

Medicamenta
ad crassos viscidōsq̄
humores
expurgandos
conueniunt.

Obstruētiōnes
acriora et lenia,
quæ potius
lenia.

Acria omnia
esse calida.
Duntaxat me-
dicamenta qua-

Par materia
modicē excalescenti
humore.

Scirrhus quid,
ex vnde gignatur.
Scirrhi qui gignantur.

Emollientia
quæ.

Canceris scirrhi
ab ipso ex
medicamentis
gignatur.
Scirrhi à vitiis
da pituita
ortus, quales
medicamentis
conueniunt.

Emollientia.

Sal emollienti-
bus cuiusmodi
non est, quod
conueniat valde.

Emollientia de-
beant esse etiam
emplastica.

Indurantia sunt
frigida & hu-
mida.
Solam natura.

Laxatio vbi fit
& quomodo.
Tensionis causa.

rum excaſatoria exicatoriaſque ſunt, nec non ſecre-
retoria & coſatoria. At quæ expui debent, me-
dio crem caliditate deſiderat, ne videlicet impen-
ſe exſecentur: ac proinde medicamenta illis con-
gruentia, euſdem vtilitatis gratia cum ſorbinũ
culis porſionibusq; exhibentur. Quæ verò renes
expurgat, & ipſa incidendi vim poſſidentia, lar-
gæ humiditate non indigent. Porro quæ calloſas
coſiſtencias ſunt incidere idonea, admodũ qui-
dem incidunt, ſed minimum ſine caloris poſſi-
dent. Caliditas quippe callum perſone vigenit,
nō incidit, nec diuidit. Cæterũ quæ & incidunt
& medioſcriter calida ſunt, meliora exiſtunt: vt ra-
dices regionum a ſparagorum, & rubi, & betoni-
cæ, & polium, tum oſtra, & vitrum viſum, & ex
ſcilla conſectum aceturũ, & conſimilia.

CAPVT XIII.

Quæ cutis meatus referant, ea rarefaciẽtia di-
cimus: quæ verò vaſorũ oſcula, aperientiũ. Quin
& illis contrariorũ, quod poros coſtrahit, cõden-
ſans dicunt: quod autem oſculum claudit, occlu-
dens ſiue obſtruens nominant. Cæterũ rarefa-
cienũ quidem natura modice calida eſt, ac tum
minime ſiccã, tum tenuium partiũ: aperientiũ
verò, tum craſſarum partium, tum acris ac mor-
dax. His porro contrariorũ, condenſantium
quidem, frigida ſanè & aquæ: occludentium au-
tem, tum frigida, tum partũ craſſarũ. Rarefacit
igitur chamæmelũ, & althea, quodũq; ex ipſis co-
ſtititur oleum: nec minus quod ex agreſibus cu-
cumeribus. Quin & vetus, & cinũ, & raphani-
um, ex eadem ſunt nota. Aperientũ autẽ cyclami-
nus, allia, cepæ, ſel taurinũ, vnguentũq; iriniũ
& amaricũ, quæ & occæcatis hæmorrhoidas
aperiunt. Ac cõdenſantia ſunt, aqua frigida, ſem-
perviũ, portulaca, tribulus viridis, pſyllũ, auri-
cula muris, lenticula paluſtris, ac deniq; quæcũ-
que refrigerant, ſed nō aſtringunt. Proinde man-
dragora, cicuta, altercum, papauer, ſi eis quis
modice vtiat, cõdenſandi vim obinnet: ſin libera-
lius, nō modò cõdenſandi, ſed ſuſepaciendi, &
neq;andi. Occludunt porro meatus omnia quæ
valide aſtringunt, nec tamen acrimonĩã habent
adiunctam: quum nimirum eſſentia talium ſit
ſimul terrena & frigida. Medicamenta verò quæ
frigida quidem ſunt aut æquæ, aut amplius, ſed
ſubſtantia ſortiunt aquæ, ea in quã debilitet &
contrahunt & conſtringunt, videlicet propter
ipſam molliũ: quare cõdenſantia potius quàm
obſtruentia dicuntur. Quippe quicquid valen-
ter tum coſtipare, tum coſtringere debet, robur
quoddam remittens, & durũ, habere oportet.

CAPVT XIII.

Quæ itaq; citra moleſtiã excaſſant, ea ſola
omniũ ſunt rarefacientia. Si verò nō modò cali-
da fuerint, ſed etiã conſiſtẽtia craſſa, ſi quidẽ ve-
hementia ſint, & cauſtica, hoc eſt, vrennia, ignis
inſtar corpus colliquant, & ſæpe eſchareas ritu
cautẽri inducunt. At ſi debilius q̃ vt vrere poſ-
ſint, excaſſant, anaiſtomoniã, ſiue aperiẽdi vim
obinnet. Quod autẽ cauſticũ, nō tamẽ vehemẽter,
eſt, præterea eſſentia tenuioris, id proſus ab om-
ni mordacitate abſente: aut cõ exiguo, tũ dolo-
re, tũ morſu eliquabit partes carnoſas. Nam qd
nō cõſertim alterat, vt quæ vehemẽter ſunt cali-

da, quodq; nō ægrè penetrat, vt quæ craſſe ſunt
eſſentia, ea latentè aſtione obinnet. Porro altera-
tionũ ſubitè coſteretæq; mutationes, ſicvĩ & pene-
trationũq; violente ſunt, quales proſiciunt a
cauſticis & eſchareoticis, maxime ſenſibiles ſunt.
Cæterũ de quib; nunc agimus, minimè faciũt eſ-
chareas, vocaturũq; putrefaciẽtia, licet improprie,
atq; ob ſymptomatis tantũ ſimilitudinẽ: quũ ab
vtriũq; nullo doloris ſenſu corruptio fiat. Nam
quæ verè putrefaciẽtia ſunt, humectant ſimul &
caſſant. Multis autẽ modis corrupti quid poteſt.
Contrahunt ſiquidẽ plus nimio eſtingerata, aut
excaſſata, aut humectata, aut exſecata. Non in-
q̃quid corrupti coſputreſcit, ſed quib; id cũ ſuto-
re accidit. At medicamẽta de quibus nũc ſermo
eſt, putrefaciẽtia, qualia ſunt auripigmentum
(quod arſenici vocant) ſandaracha, chryſocol-
la, dryopteris, pityocampe, & aconitũ, oia colli-
quare ſunt nata, & potiſſimum carnẽ tenellam,
idq; abſq; dolore. Ex quib; quidẽ nonnulla imbe-
cilliora cæteris, vt vitæ petræ ſtos, extimam tam-
tum ſuperficiem, quam contingant, excedẽdo, vl-
terius excreſcentibus cicatricem inducũt: quan-
quam medicamenta quæ verè ad cicatricem per-
ducunt, nec detrabere, nec liquare carnẽ, fed du-
rare, & ſiccare ſunt nata: vt alumẽ, gallia, ompha-
citis, æs viſum, ac maxime lorũ, cũ eiũq; fructus
ſpinæ Aegyptiæ, ſiccag; mali granatũ putamina.

CAPVT XV.

Id igitur eſt in planis vicerib; ad cicatricẽ du-
cendis conſiliũ, vt caro alteretur, ſitq; cutis: id
quod perſicitur per ea quæ illam coſtrahere, con-
ſtringere, coſtipare, denſare, ſiccare, & in callum
cogere valeant: quum nimirum cutis, velũ in
callum durata caro ſit. Ea ergo medicamẽta quæ
ſic agere poſſunt, primariò proprièq; dicuntur
epulotica, ſiue ad cicatricẽ ducuntia: cætera verò
quæ exedũt carnẽ, ſecundariò, & per accidẽs:
ſicuti & ea quæ abſq; aſtriẽtione deſiccandi vim
habent morda citius expertẽ. Nam & hæc quo-
que ex accidenũ cicatricem inducunt: cuiuſmodi
vtriq; medicamentum eſt, myrrilla, lithargyrus,
oſtreum, & diaphryges combuſta: quandoquidẽ
& ipſa cicatricem ſæpe inducunt illa. At verò
medicamenta citra morſum mediocriterq; ab-
ſtergenda, cauities vicerum implent.

CAPVT XVI.

Porro attrahentes facultates ſunt, quæ ex al-
to vehemẽtus extrahũt: repercunt verò, quæ
in altũ occurrẽtes ſibi ſuccos repellunt. At eſſen-
tia illũ quidem calida eſt & tenuium partiũ: his
verò frigida, & craſſarũ. Attrahit enim perpetuũ
calidum: repellit verò frigidum. Verum quod ca-
lori iunctam partium tenuitatem forſutur, trahit
vehementius: quod autẽ craſſitudinem frigori,
violentiũ repellit. Atq; aſtringentium quidẽ no-
ta eſt eſſentia. Attrahentium autem, alia ſpõte eſt
nata, vt diſtanni, propoleos, thapſiæ, ſagapeni,
ſicq; Cyrenaci & Medici eſſentia: alia verò
a putredine exaſperate ſuam ducit originẽ, qualis
tum fermento, tum pſorico ineſt. Quod ſi ſimis
quog; ex putrefactione generatio conſtat, vtriq;
omnes attrahẽdi facultate pollebunt: ſed nō par-
ua illis differẽtia ineſt. Nam columbinus admo-
dum attrahit. Ex æquo autẽ vtriq; ab eo receſ-
ſunt,

Expulſionibus
que ſunt ſole-
na.

Callũ incidẽdi
deſiderandi
congruentia,
qualia eſſe de-
beant.

Rarefacientia.

Aperientiũ.

Condenſantia.
Occludentia.

Hæmorrhoidas
aperientiũ.

Colliquantia.

Rarefacientia.

Colliquantia.

Anaiſtomoniã.

Corruptio
modi diuerſi.
Putrefactionis
ſortes neceſſari-
o accedũt.
Putrefaciẽtia
que carnẽ abſq;
doloſe li-
quant.

Cicatricem in-
ducunt medi-
camenta quæ.

Epulotica quæ
ducunt primũ,
et quæ ſecun-
dariũ.

Attrahẽti cal-
idũ, repellit fri-
gidũ.

Attrahentium
eſſentia duplex

Viriũ omniũ
attrahit.

rūt, ad calidius quiddam anserinus, ad frigidius verō gallinaceus. Hoc etiam magis vincuntur humanus & suillus. At canum stercus simile est medicamentis extergētibz, maximē si vesicant q̄sibus. Crocodilorum autem stercus magis etiam id perficit. Est & aliud attrahentium medicamentorum genus, quod qualitate familiaritate attrahit: id quod aliud est nihil, quā totius essentię similitudine, ceu quę nutriūt, familiaria nutrimenta attrahunt. Talium enim medicamentorum sunt purgantia omnia, & amuletorum nonnulla. Ceterum calida vt sint id genus omnia est necesse.

Quinetiā inter ea quę essentia similia sunt, q̄d calidius fuerit, id potentius attrahet.

CAPVT XVII.

Iam verō facultatum alexipharmacarum natura est duplex. Quędam liquorem alterant, quędam evacuant venenū lędenti. aut deleteriu medicamentum. Alterant igitur vna qualitate, idq̄ ratione contrarietatis: aut darum cōiugatione: aut deniq̄ tota substantia. Evacuāt totius substantię similitudine, & caliditate subtilium partiu. Ceterum alexipharmaca medicamenta, sanē facultate sunt media inter corpora quę obliq̄ dunt, & medicamentū lędenti: vt videlicet eadem sit proportio corporis ad facultatem alexiteriā, quę illius ad deleteriū. Quamobrē omnia propemodū quę deleteris ad versant medicamentis, si largius sumpta fuerint, grauitur animis corpus offendunt. Quapropter ea exhibeantur moderate, vt nec copia nimia corpus oblectant, nec exiguitate sua ā deleteris vincant. Evacuatur autem omne deleterium venenū ā foris impositis medicamentis, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantię similitudine. Quā igitur omnia deleteria medicamentā ad verissima secundū temperiē sint corporis, quę ab ipsis lęduntur, certē si ā similibus temperie medicamentis vacuent, erunt vtiq̄ & hęc corporum naturis contraria: vt sunt baud dubie alia quę ex parte contraria, non tamen adeo vt intermiciant, sed in corporis perpetentis, & medicamentū lędenti medio liberentur.

CAPVT XVIII.

At facultas q̄ verē & est & dicitur anodyna, eorum est, q̄ primo ordine excalfaciunt, tenuēq̄ essentiam fortiunt. Quę verō improprie anodyna vocatur, is medicamentis inest, quę suo ingenti frigore partem stupefaciunt. Est autem stupefactio minus quā in sensibilibus, ac sensus priuatio. Ceterum quę affectum sanando dolorem sedāt, nec merito dici anodyna possunt: nā id est omnium curantium commune. Quę itaq̄ reuera sunt anodyna, parum sunt tenuium, & calidiora quā q̄ symmetra sunt, est necesse: vt scilicet evacuent, digerant, rarefaciant, extenuent, cōcoquant, & quābile reddant, quicquid partibus doloris est causa. Quare nihil prorsus attractionis habebit oportet, ne si pars quidem aut affectus exposcat. Ex quibus liquet, quod interdū affectuonem non iuuabit, sed tantūmodo mitigabit dolorē, quōdo videlicet verē anodyna dēctur. Interdum adiuuabit affectū, dicentūq̄ simul anodyna, & salubria. Igitur medicamentū anodynum quędam ex primo sensu calfacientium ordine, q̄ proprie anodyna dicunt, vt anodyna oleum: quędā similitur vt corpus nostrū, qualia sanē pus mouētia. Quę verō soporem e-pota inducūt, temperiem fortiuntur vel summe aduersam us quę reuera sunt anodyna. Refringant liquide p̄mnia corpus, & sensum eo vsq̄ stupefaciunt, vt si paulo liberalius bibantur, mortē afferant. Ceterum ad vnum propositum optima sunt quę desiccant. Quę verō exstant a frigida, humiditatis etiā copulā obtrinent, vt cicutā, ea potui nō sunt vtilia. Talis est midragora, excepto eius cortice sicq̄, & alterū, p̄ter semē. Sunt tamen & q̄ nobis tota essentia aduersent. Proinde si vel auxilium corū assumptū fuerit, omnino lędat: esse est cū dryopteris, ptyocampe, thapsia, solanum, mancum, hydragyros, & hūgorum nonnullū. p̄terea salua & iel animalū venenatorū. Nam talia omnia genere sunt deleteria, p̄ q̄ quantitate: ac p̄inde nihil corū in alexiteris aduēptos induitur, vt solet papaueris succus, myrria, hyrax, & crocus. Nam tamen q̄dam horū demētē largius bibita, quędā mortem inserāt, mensura tamen conuenienti permixta aliis adiungunt. Eorum porro quę mentem lędunt, pleriq̄ etiam caput degraunt, vaporibus ipsum impientia. Sunt quę id attingant, obliq̄dina ventriculū. Communiter verō cerebrum vniuersū duobus modis inficitur: aut totius substantię contrarietate, aut quum vna duabz ve qualitatibus illius temperaturam immutant.

CAPVT XIX.

Vocabulū hoc, purgans, vna quidem, rariq̄ cōmuni ratione, de iis omnibus dicitur, quę quouis modo animalis excrementa expurgāt: alia verō de iis tantum enuntiat per excellētiā, quę aut per vomitum, aut per alui defectionem, purgationem moliantur: ita vt ab his duobz generis sint q̄ quę tam per nases, tum per os ā capite humores eliciunt. Eiusdē cū istis sunt generis, quę vulgē admōra, vi quādam attrahit illius excrementa repurgant. Quęcumq̄ siquidē purgare animaduerimus, ea trahēdi vniū possidēt, alia vnam quempiam succum, alia duos, aut etiam plures: idq̄ illis inter sese commune existit. Nam quę crassos humores extenuando, aut vti nam ciere possunt, aut ex pectore pulmonēq̄ ei ciendi excretionibus auxiliari, aut menstruas purgationes ciere, purgant sanē & ea aliquo pacto, verū antedictis non similitur nūcupantur, sed alia dicuntur diuretica, alia bechica, alia menses mouentia, hac re ā superioribus diuerfa, quod nō habent vniū familiariū succorū attrahētię, vt illa. Bisarū autem dicitur bechica: partim quod tussim provocent, partim quod eandem lędent. Atq̄ contrarię horum sunt facultates. Alia enim extenuandi naturam habent, alia incrassandi. Atq̄ extenuandi quidē facultas, in calidā & tenuium partium substantiis sita est: incrassandi verō, frigida, & crassarum partium essentis inest.

CAPVT XX.

Lactis & seminis effectrices facultates sunt, partim in medicamentis tantum, partim in alimentis. In medicamentis quidem, quum fuscis pituitosos excalfaciētes in sanguinem veruimus: in alimentis autem secundum substantię totius similitudinē, vbi videlicet huius sunt succi, & huiusmodi.

Trahentia s. attrahentia id sunt.

Calidiora trahentia potentius.

Alexipharmacarū facultatū natura duplex.

Alexipharmacarū effectus media inter obliq̄ corpora, & lędenti medicamentis.

Anodyna facultatū natura.

Stupeo quid.

Anodynum opus.

Anodyna nitidē debere vassē āstrictiōis.

Anodynum debere vassē āstrictiōis.

Deleteria, tota substantia. Deleteria generis quę sunt.

Purgans medicamentū multos habet generis.

Purgantium quę duo trahit humores.

Bechica dicitur bisarum.

Hæmorum cor-
porum humani
temperata.
Lactis nigricans.

Lactis gignendi
ratio.

Lactis genera-
tioni quæ pro-
hibeant.

Sanguis est ma-
teriam mensium
et lactis.

Venas esse con-
munes vberibus
et matricibus.

Lactis mensibus
quæ gignantur,
eandem rationem
et medicam ra-
tionem distinge-
re.

Menses demitti
in venas, non
ab illis attrahi.

Menses et venas
quæ ab illis attrahi.

Menses ducti
in diuresi, non
modo differunt.

& tepide calida, ceu ipsum lac. Siquidem sanguis est caloris mediciorum participes: plus verò quàm medicinis, bilis: sicuti pituita frigidiora. In medio autem pituitæ & sanguinis lac ipsum consistit, proprius tamen sanguinem versus inclinat. Vbi igitur ob penuriam sanguinis parum lactis in mammis conficitur, humectantur simul & calfaciente vietus ratione est opus. Si verò quod biliosus fuerit, in primis purgatione ipse sanguis desiderat: mox victum quem nuper diximus. At si quòd pituitosus, medicamenta requirit exalfaciencia aut primo, aut secundo ordine, non tñ exiccantia. Verum inter ea posteriora sunt, quæ non tantum medicamta sunt, sed & nutritiva, veluti eruca, fœniculum, anethum. Intelligo enim ipsas herbas etiamnū viresces & humiditas: nam quæ sicce sunt, plus quàm par sit & exalfaciunt & deficcant. Huius generis est symyon, apium, fion, polion, eay prius quàm exiccantur. In summa verò, quæcunque calfacient plus quàm expe-
diat, quæque deficiat aut refrigerant, partem quabitatem ipsius sanguinis vitiantia, partim ipsum minore reddentia, lactis prohibet generatione.

CAPVT XXI.

Porro dictis & similibus facultatē obtinent, quæcunque, provocare aut sedare menses possunt. Vt ro-
runt enim cōmunis materia est, nempe sanguis in venis contentus. Quare vbi hic fluxilis fuerit, & qualitate temperatus, vtriq; abundanter copiam suppeditat. Cōmunes præterea vberibus, vterq; venæ sunt non exigue. Itaq; vbi ad alter-
vtram partē sanguis defert, altera siccescit. Proinde quibus menses medicoriter deferuntur, iis lac minime in mamillis colligitur. Quibus verò hoc large superest, iis planè menses cohibentur. Quocirca mirandum non est, si tum victus, tum medicamenta similia sint, nempe & ea quæ gignunt, & sedat menstruas vteri purgationes: & ea quæ lactis in vberibus generationē tum procurant, tum supprimunt: quanquam hæcenus differat, quodd & calidioribus, & magis incidentibus nonnunquam menstrua purgatio indigeat: quum nimirum ea in parte sitz venæ magis aperiri debeant, quàm quæ tendunt in mamillas, & sanguinem fluxilem magis requirūt, vtro ad delationem eius nihil conferente. Mittuntur enim in venas quæ comitantur illi, non attrahuntur menses. At sanguis in vbera non tantum mittitur, sed etiam trahitur: ac proinde leuiori subsidio medicaminum opus habet, quum non abunde in mamillas is confluat. Medicamta etiam quæ iuuant vt sanguis in mamillas feratur, imperfectas etiam purgatione ac promouent. Sin autem nimis oblecti sint, aut planè retereant, nullū eiusmodi eas sanare potest: verū sabina, meion, iris, calamintia, pulegiū, distannum, asarum, colus, casa, einnainomum, amomum, aristolochia, buuium, & eius generis reliqua, exactas vteri purgationū retinones persanāt: talique etiā vrinam promouēt. Sed ab iis quæ diuresin tantum dicuntur, hoc quidem differunt, quòd non vehementer deficcant. Etenim quæ non deficcant, & modice calfaciunt, lacti sunt generando valia: quæ verò plus exalfaciunt, non tamen valenter deficcant, mensibus eliciendis sunt cōgrua. Verum & vtraq; hæc vrinæ provocant, necnon

in primis ea quæ deficcantia, etiam calfaciūt. At præter alia & reddēdix ex pectore pulmonēq; excreationibus in cōmoda sunt deficcantia. Poscūt quippe & ipse in cōdis quidem, non tamen exicca-
ri, ceu & renum vesicæq; calculi.

CAPVT XXII.

Semē generant cibi qui probè nutriunt, & salutē suam, famulatiq; totis substantiis: medica-
menta verò stultentia etiā & calida. Extinguūt autem deficcantia & refrigerantia omnia, quæq; totis substantiis cōtraria sunt. Porro provocant quæcūq; calida sunt & stultentia absq; deficcantia: supprimūt verò contraria. Etenim quum feminis substantia ex bona superfluitate generatio-
nem sortiāt, sicut etiam stultentia: bene nutriūt & stultentia sint, necesse est, quæcūq; semen aut procreare, aut provocare possunt. Quare bulbi, cicer, fabæ, polypodes, cornus, edulia multi seminis & dicunt & sunt. At scincus & faryis medicamta ad id apta existūt. Porro simul cibi & medicamina multi seminis sunt, lini semen, & eruca. Ceterum quæ refrigerare sunt natura, tam edulia, quàm medicamta semen cogentia, intransantia, & stultibile reddēdix, vim habent ipsum supprimentem, non aut corrumptentem: vt lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones, cucumeres siue maturi, siue immaturi. Tam verò quæ deficcant, nec esse quiddē semen permittunt, etiam si uatura calida sint: vt rura. Quòd si etiā non calfaciant, multo minus: vt nymphaea. Eandē pporione tum esculentorū, tum medicamentorū est inveniente, circa lac & menstrua. Sub idem genus cadunt, si via alio modo, quæ respirantium instrumentorū reiciendis excreationibus auxiliatur, quæq; vrinæ cetera possunt. Hæc enim omnia extenuandi facultatem obtinent, vti contraria intransandi.

CAPVT XXIII.

Tametsi collyrio diarrhodon, & diapophlogos, & cygnio, & thure, vti posuimus ad aures, aut os, aut nates affectas, necnon ad pudendum & anum: quia tñ frequentius ad oculorū morbos iis vitium, ob id nimirum ocularia medicamenta vocant: sicuti alia hepatica, alia splenetica, stomachica, secundum differentia particulæ quibus solent auxiliari creberriem.

CAPVT XXIII.

Dum autē qui Methodici nominantur, metasyncriticas quasdam materias & facultates appellant, præter quàm quòd obscura & falsa loquuntur, etiam suæ ipsorum hæresi maxime repugnantis asserunt.

CAPVT XXV.

Ex operibus autem contrarias iudicare facultates oportet: dicentes quasdam esse facultates emplasticas, & iis cōtrarias, tum exergentes, tum sanctu liberates: præterea emollientes, indurantes, laxantes, & contedentes. Nam asstringētes, acres, amaras, acidas, atq; dulces, non facultates medicamentorū, sed gustus esse qualitates monstrauius. Quancūq; & harū etiam tum actiones, tum temperantur nobis veniunt investiganda. Etenim asstringens, terreste & frigidum: acidum, subtile & frigidū: amarū, terreste & subtile: insignis qualitatis expertus, frigidum simul & aquē: acre, igneum: salium, terreste & calidum,

Semina quæ gignant, nutriant, & stultent.

Semina provocant, supprimunt, & stultent.

Semina supprimunt, emollient, & refrigerantia.

Semina ne effugiant, quæ permittunt, quæ sedant.

Ocularia medicamenta.

Qualitas quæ sit.

Superiora temperantia.

dum, non dū tamen igneum: similiter dulce, calidū, sed non dū viret: quæ denique oleosa sunt, omnia aquosa sunt & aërea. Sequuntur sanè sunt reperiuntur eorū, & opera. Nam astringens, contrahere, costringere, densare, repellere, incassare, omnino refrigerare, exsiccareque est natum: acidū vero, incidere, extenuare, faciliū liberare, & purgare citra calfactionem, & cum aliquiscula repulsionis potest. At acre similiter vt acidum extenuat, & purgat, necnō pertrahit, attrahit, & resclaram inducit: ceterum calfaciens, & digerens. Sic amarū quoque meatus purgat, abstergit, extenuat, incidit humorū crassiniē ab ipso manifesta excalfactione. Quod qualitas est experta, inerscat, cogit, contrahit, exstringit, stupefacit. Porro salum costringit, contrahit, cōdendi seruat, delicat citra apertū aut frigiditatem, aut caliditatem. Dulce vero cōcoquit, laxat, rarefacit: oleosum denique humectat, emollit, & laxat. Ex quibus sanè facile inveniri licebit, quāvis sapores temperie, & qui sunt operibus contrarij.

CAPVT XXVI.

Symmetrum appellare medicamentum cōvenit, quod nec excalfacit, nec deficiat, nec refrigerat, nec humectat: nec calidū, frigidū, humidum, siccūque existit. Quod vero aut calidius, aut humidius, aut frigidius, aut siccius est, & vincit, seu excedit facultate cognominatur. Porro per vniuersum extetum quatuor posuisse ordines, quod ad vnum spectat, sufficit: calidum quidem, exempli gratia, nominites primi ordinis, quod nos excalfacit, non tamē euidet, sed ita vtopus sit rationali demonstratione. Quæ vero manifeste calfacere nos dicitur, ac secundi ordinis esse dicuntur. At quæ iam vehementer quidē, non tñ summē, tertij. Quæ autē adeo excalfacere possunt, vt echinā moliatur & vrant, quartij: similiterq; in aliis exasperantij existimandum. Nam quæ adeo vehementer refrigerat, vt extinguant, & ipsa quartij sunt ordinis. Ceterum nullū invenire est, quod quanto deficiat ordine, quod non enī vrant. At tertij ordinis exsiccantium quippiam esse possit, quod minimē vrant, seu omnia quæ vehementer astringunt: ex quibus est omphaciū, rhus, alumen, balauia, galla omphaciatis. In his autē ipsi quædā vicina sunt ad vrēbus, vt squama grise, & æa vītrū, quasi inter tertij quartamq; ordiē habeant. In medio tertij est æa vitum, si lotum sit in principio tertij hypocyli. Sic in secūdo & quarto differentias licet cōstituere triplices: quā non perinde vrant cauterium & napy, licet ambo quartij sint ordinis.

GALENI PERGAMENI

de simplicium medicamentorum facultatibus, liber VI.

Generalis igitur sermo de facultate medicamentorum simplicium, vniuersus iam super perioribus libris finem suū consequutus videtur. Tempus vero iam est ad sermoneis particulares, siue speciales tradere, hoc solummodo repetentes: primum quidem, in natura tēperatissimā: secūdo, in intēperata: postea deinceps in simplicibus morbis, faciendum esse periculum de facultate ipsorū medicamentorū. Ceterum quoniam

medicamēta pia, partim quidem sunt animalia partes, aut plantarū, aut fructū, aut liquorū res, aut succi: partim autē ex metallis sumunt: oportūm huiusvium est de plātis anīe oīa differere: et dein de metallicis tractare, ac vltimō ad animalia partes transire, idq; obferuato literarū gręcarum ordine. Cui abinus autē semper, vt (quod monuit primo oraculo Hippocrates, vtrū pronuncians breuem, & artem longam) festinantes quammaximo studio, viam incedamus compendiosissimam, per ea nempe quæ sunt in arte vtilissima. Inter oīs porro Dioscorides perfectissimē mihi videtur cōcessisse tractatum de medicamentorū materia. At qui aggreduntur figuras herbarum describere, quas ne per somnū quidem viderunt, certe vident præconib; similes, qui notas ab aliis acceptas fugiuū mancipij quib; nesciunt, quem ipsi nunquam viderunt, imō quē ne agnoscere quidē possunt, si propē assisteret. Illos etiam nō possum nō accusare, qui primi herbarum formas, scriptis docere conati sunt, quā melius existimē ab ipso præceptore oculis discere, ac non assimilari iis, qui ex libris prodeūr quib; nesciunt.

Abrotonum.

Abrotonū calidum & siccum est facultate, in tertio recessu, aut ordine, qui ad tēperatā naturam expenditur, situm. Valde siquidē est amarū: qui sapor, quā essentia terrena sit, & largo est calore exrenuatur. Porro si quibus per circuitus redeunt rigores, ante io vāsonem rigorum eos abrotono confices, minus vniq; concutitur, si bitorū sensum caloris percipiant. Quod abrotonum etiam lumbricos perimat, par quidem est, quā sit amarum. Ceteram & digerendi & incidendi quandā vim habet, ipsorū abstinthio maiorem: quandoquidē paucissimā acerbissimā particeps est abrotonū, haud autē exigue abstinthiū. Vnde iuuenicū sanè est ventriculo abrotonū, veluti etiam seriphium: gratū verō & amicū abstinthi. Per se quippe amarū omniū est infensum ventriculo: austerū verō, aut acerbū, aut in summa astringēs, amicū & familiare. Abrotoni duæ sunt species: quarum alteram sanē matrem, alterā feminam vocant. Similiter & abstinthi tres species, aut differentij assignantur. Quarum vnam eodem cum genere ipso nomine appellat abstinthium: cuiusmodi est Ponticum. Secundam autem Santonicū: ac tertiam deniq; Seriphium. Quibus omnibus abstinthium quidē minus est calidum, nempe plurimam astrictionem obtinens. Non tamen minus defecaciorum exultit. Ceterorum autem, Santonicū i Santonia regio ne, in qua nascitur, nomen sortitū, proximam habet facultatē, Seripho paulo imbecillio in extenuando, calfaciendo, deficcandoque. Porro ipsum Seriphium Abrotono minus est calidū, verum calidius abstinthio, stomacho impendit inimicum, nempe cum amaritudine, præ se etiam quandam ferens caliditatem. Sed nonnullam tamen, etiam minimā, astrictionem sortitur. Sic Abrotonum & Santonicum admodum sunt infesta vetriculo. Solū enim inter ea abstinthium, & maxime ponticum, gratū stomacho existit. Abrotonum vtrū, calidū siccūq; facultate est, magis etiā quā cucurbita sicca vītrū, & anethi radix. Illa

Yy ij

Cassidia 7. *fla* praeparat viceribus cignetur. Abscessus eius est aliquis alio calido, herbari tardius naſcentem elicit.

Agnes Viter.

Agnos. aut vitex, fruticosa illa planta, calidus
Vitis. quidem & ficcus est tertio ordine: verum multū
tenuis substantiæ, tum gustu scris simul & astrin-
gens: ipsas tamē vitices ad medicinam habet in-
vites. Cæterum folia, semēq; & flos, calida in-
diciō sunt facultate, necnō tenui substantiā: quare

Agrostis, Gramen.

Graminis radix modicè frigida est & sicca, mordacitate quondā exigua, & partium tenuitate obtinens. At herba ipsa primo quidem receptu refrigerat, in humiditate verò & siccitate existens quammoderata.

Gramen esculentum.

Eius radix est modice frigida & sicca: proindeque cruenta viscera glumina. Ipsa autem herba iustura non vehementer refrigerat, in medio constituta humiditate & siccitate. Radici porro mordacitas & tenuitas quaedam exiguis inest, quam mirum lapides frangit, si quis eam decoctam bibat. At fenum alterius quide[m] imbicillum est: cuius verò que in Parnaso nascitur: virum ciet, ac fluxum vêtis & Nomacli reficcat. Vis enim eius est exicatoria, tenuium porrium, & subacberba.

De quatuor Anchufis.

Onoclea quam vocant, radicem habet admodum refrigerantem, desiccantem, astrigentem. Et subamarā, corporibus condensandis et modice extenuandis idoneam tum abstergeſcis quodque et abluendis bilioſis et falſis ſuccis. Quare ſurgini et liemofis eſt utilis. Præterea cum polleat illa, iuvat eryſipelata, et abſtergimō modo eſt, ſed etiā ad morā extinguiſcē proinde accoſe, macerata vinigine et lepræ ſanāt. At folia iſtus herbi multo colliora radice ſunt, non tamē reſiccatione et aſtrictione aliena. Itaq; proſtuit ſancti cum vino pota. Lycopoſis nominat, refrigerat etiam et ſiccant, ſimiliter eryſipelas con-

gruit. Ceterum radicem quam onoclea magis
astringentis fortitur. Onocleo cognominatur
& calidior & medicamentosior iueni. Quare eo
qui a viperis morfi sunt, admodū iuuat, tum illa-
rum, tum fuscipia, tum efia. Reliquæ vero quæ quæ-
ra est, & parua, ceteris est calidior, amarior, &
medicator: ac promde ad laros lumbricos idonea,
oxybaphi mēfura cui uasurrio & lryfopo epota
Agaric radix.

Agarici radix.

Primo quidē gustu dulcis, sed paulō post sub-
amara apparet, acrimoniae & astringētionis leui-
culae quāndā specie tēporis spacio induci: effi-
cētissimē laxa. Quare composita hęc radix est
et subitāniā aēreā & terreā, à calore extenuata.
Minimum autē habet efficitē aequē. Hęc ratio-
ne & digerendi vni possidet, & crassitudinē in-
cidit, tum astringētis viscerum expurgandis. Idcirco
regio morbo laborātes est obstruētione in-
cinctos, necnō morbo cominali obnoxiosos, fa-
natum rigores per circuitus recurrētes, ex cra-
sis viscidisq; humoribus totos exterminat. Lu-
ar & morioi à bectus in gorea lēdribus, aut cū-
pūctis, tum foris in affecta parte imposui, tum
intēro in corpus assumptum, pōdere drachma
vniūe cum vino diluto. Est etiam & eurgatoriū.

Accanton.

Facultatē digerendi habet, & leuiter quadantenus phlegmone liberandi.

Adiantum, Polytichum, Callitrichum.

Vulgo capilli Venetiae.

In calore & frigore symmetrū est, sicut tamē,
& extenuat, & digerit. Caput ex alopecia gla-
brū, capillis vestit: struma & abscessus digerit:
eporū lapides frāgit: vicidorū crassiorūq; pe-
ctore pulmonēq; excreant onib; nō mediocri-
ter confert: ac deniq; ventris profluuiū sistit.

Autroch. Sempervirens.

Aizoon, sempervivum.
Aizoon vřvřg, tum minus, tum minus, delicat quidem leuiter, vřpore astringens modice: efframē ex tertio ordine refrigerantium, in eodē aquea essentia præpoller. Quare ad erysipelara, herpes, & phlegmonas à fluxione ortas accommodatur.
Aeonios. Avena.

Argilops, Aueua.

Digerēdi vim obnner, exiētē leuiter acris. Vnde phlegmonas induratas, & ægilopas sanat.

Acta. Lohum.

In principio tertii ordinis exsiccantiū, fecū
di verò extremo exsiccantiū consistit, sic vt acce-
dere magis quā iris, naturę acrimū videatur:
qua tamen essentia tenuitate relinquitur.

Asyrtus, sine populus alba.

Populi flores calidi sunt in primo recessu, paulum ad ficius declinant, subtiliorum potius quam crassiorum sunt partium. Floribus similia sunt folia, licet imbecilliora. Refina etiam floribus similem facultatem, sed calidiorem obtinet. At semen, tum refina, tum floribus subtiliora est partium, & exaccantius non tamen multo calidius.

Acacia.

Acacia: & planta ipſa acerba eſt, & fructus, & ſuccus: q̄ lotus acrimoniam deponit. Porro ſi par-
ti illiatur, proſitus eam ſicciorē atq; contra-
ctam reddit: eſtq; tertij ordinis exiccantiſſus, & ſe-
cundi refrigerantiſſimus, vbi quidem elotus fuerit
alioquiſi illoſus ſit, primi. Eſt autem confiſten-
tia terrea, habetq; in ſe partes quaſdā aqueas,
neque

Omachtigen.

Auctoresque quatuor
 et species an-
 nuntias, Latine li-
 bricas perueniat.

Agave americana
 com. aff. in
 Galerna.

Aquarici factores insignes

Apprentices:

Adiantum.
Polypodium.
Caulis Ym.

Algen.
Sumpffrücht.

Ахтара,
Ахтара.

Arta.
Lobum.

Argem.
Populus alb-a.

Acacia farnesiana

necon alias tenues & calidas.

Acalephe, Vrtica.

Acalephe.

*Vrtica vrticu-
lae venerea.*

*Vrtica subdu-
cit alium titu-
latione in egi-
quam purga-
tione.*

*Acanthus.
Spina.*

Huius herbe tum fructus, tum folia, admodū digerētis sunt facultatis, adeo vt phymata & pa-
roridas sanēt. Sed & quiddā diuorsum exhibēt,
dum coquantur, quo eximulant venērē, & ma-
ximē vbi semē cum multo bibitur. Quod nō cal-
faciat vehementer, sed nimis tenuium sit partū,
testimonio est crassior ex pectore educio: tum
pruritus quem in partibus excitat. Porro subdu-
cit venērē titulatione magis quam purgatione.
In vniuersum, quæ exsicari citra mordicationē
possunt, ea convenienter persanant.

Acanthus, Spina vulgaris.

Folia quidem mediocriter digerēt facultate
tem obtinēt: at radix exicatoria est, & leuiter in-
cisoria, & tenuium partium.

Acanthium.

Radix huius & folia facultatis sunt excalfa-
torie, vt & illi qui conuelluntur auxiliuntur.

Acanthos leuce, Spina alba.

*Acanthos leuce
Spina alba fa-
cultas.*

Radix eius deficatoria est, modicēq; astringēs:
quamobrē & coriacos & dysentericos iuuat, &
sanguinis reiectiones cohibet, ad marāq; illam
cōtrahit, ac dentes dolētes iuuat, si decocto eius
colluant. Semē tenuis essentia & calida facultatis
essentia potui dari illi qui cōuellunt cōvenit.

Spina Aegyptia.

*Spina Aegyptia
facultas.*

Validius q̄ spina alba, tum astringit, tū siccāt.
Quare pilulū muliebre radix eius supprimit.
Fructus verō & columellæ prodest, & illis qui in
sede inflata sunt: vicerāq; ad cicatricē perducit.

Acoron.

Huius radice vltimo, q̄ gustu modicē amaro
est, odorēq; non iniucundo. Itaq; facultatis cali-
dæ est, & consistentia tenuis. Quare & vrinā
ducat, & lienes induratos discunt, ceratoidisq;
crassitie detergit, extenuatq; Ad qd succus pre-
stantior existat: calcatur, n. & siccatur in tertio or-
dine.

Aconitum pardalianches.

Hoc putrefacientis & deleterij facultatis exis-
tit: quare in cibo potiq; fugiendum.

Aconitum lycoctonum.

Est & hoc similis alteri facultatis: sed peculia-
riter lupos interficit, vt illud pardos.

Aste, quā fabucum: Chamæaste, quā

Ebulum vocant.

Vtraq; potentiam habet & deficcandi, & con-
glutinandi, necnon digerendi modicum.

Alinum.

Semen simul & hac planta gignit, estq; gu-
stus acris & subastringens: ex quibus cōstat ip-
sam esse dissimilare. Maior tamen pars eius re-
perat est calida, cum humiditate incoëcta, & le-
uiter flatuosa.

Aloë.

Hęc herba, optima in India nascit, cuius liquor
est id qd ad nos importatur, cognominatū aloë,
medicamentū ad plurimas res, propter siccitatē
mordicationis expertē, vtile. Quod quidē astrin-
git modicē, sed fortiter amarū est: ac p̄inde sub-
ducit ventrem. Est autem tertij ordinis exican-
tium: calcascitū autem, aut primi intensi, aut
secundi remissū. Ad hęc verō, gratum est ventri-
culo medicamen, vt si quid aliud: & sinus gluti-
nat. Sanat vlcera quæ agrē ad cicatricem perdu-

*Aloë faculta-
tes.*

*Aloë est grata
ventriculo.*

ci possunt: & maximē quæ in ano sunt & puden-
do. Confert similiter si maceretur aqua, ad eorū
phlegmonas, necnon eas q̄ in ore, naribus, ocu-
lisq; obonuntur. In summa, repellere & digerere
simul potest, cum hoc vt paulum extergeat, quā-
tum videlicet vlceribus puris non sit molestum.

Alysson.

Nuncupata est hac herba Alysson, q̄ misce-
iuvat morios a cane rabido. Sed rabienti quop-
dara, sepe in torum sanauit, ob totius substantiæ
similitudinē. Siccatur autē digeritq; mediocriter,
ac præterea detergit nōnihil. Quæ ratione vini-
ginem, & ephelim purgat.

Alfine, Auricula muris.

Hęc quomodo essentia sit aqueæ, citra astringenti-
tum refrigerat, tū lumesat. Quare ad seruētis
phlegmonas & mediocra erysipelata confert.

Amaracon, Maiorana.

Calfacit quidē in tertio ordine: in secundo autē
siccatur.

Ambrosia.

Illata vim habet astringentem, ac repellentē.

Ami.

Eius semen est admodum vtile. Quoniam enim
sit subamarum & acre, cōstat ipsū & digerere,
& provocare vrinā. Calfacit autē, resiccatque in
tertio ordine intenso.

Amaranthum.

Facultatis est incidētis & extenuētis. Quare
coma eius cū vino pota, menses educit: omatq;
pota fluxiones deficcāt: stomacho infesta. Gru-
mos etiam sanguinis dissoluere creditur.

Amurca.

Ex secundo est ordine calfacientiū: at siccantiū
intenso quodāmodo magis, terrestris substantiæ
quom sit. Sic & vlcera corporum tēperatura sic-
corat, quæ verō in aliis omnibus sunt, exa-
sperat, perinde vt resina, pix siccā, & bitumen.

Ampeloprason, Porrum agreste.

Est enim herba hac porrū agreste, ob idq; a-
crius eo, atq; siccus, vt agrestia omnia hortensu-
bus. Proinde stomachio quā illud, nocentius.
At crassos & lētos humores potēnus incidit, va-
lentiusq; infarctis organis obstructione liberat.
Hac quop ratione sepe, pvocauit vrinā, vbi a
crassis & lentis renitebant humores. Adeo verē
est calidū, vt illitū caraplastis ritu, exulceret.

Ampelos agria, Vitis agrestis.

Racemi eius extergēdi vim possident: ac pin-
de cutis extima vlcera purgare possunt. Sed a-
stringentem quandam fortitū extremā germina-
na, quæ & sale conditi assolent.

Ampelos hermeros, Vitis sativa.

Vitis cultę assimilis facultas est agrestis, sed ad
omnia imbecillior.

Ampelos leuce, vitis alba, Bryonia.

Prima huius germina vere edi solēt, edulium
vtriculo propter astringentiā acceptū. Ceterum
subamarā, & modicē acré astringentem possi-
dent: quare & vrinā modicē cient. At radix &
abstergentem, & deficcantem vim habet, & mo-
deratē calidā. Quamobrē & lienes induratos li-
quat epota: cum siccibsq; foris impolita, p̄lorā
& lepram sanant. Porro fructus eius, racemi spe-
ciem præferens, iis qui coria depiant, est vtilis.

Ampelos melena, Vitis nigra.

Vocatur autem hac propriē Bryonia, prædi-

Y y in

*Aloë quibus af-
fectibus conferat.*

*Alysson maris
a cane rabido,
rabientiq; op-
pium sanat.*

*Alfine.
Auricula muris*

*Amaracon.
Maiorana.
Ambrosia.*

Ami.

Amaranthos.

Amurca vim.

*Ampeloprason.
Agrestia viti-
na est acriora
hortensibus.*

*Ampelos agria.
Vitis agrestis.*

*Ampelos.
Vitis.*

*Ampelos leuce.
Vitis alba.
Bryonia.*

Et ad omnia similis, nisi quod imbecillior.

Amygdala.

*Amygdalus
vera.*

Quæ quidem palam amara sunt, omnino extenuat vim possident. Siquidè ephelim purgat, & excretionib. ex pectore pulmonis crassiorum lentiorumque humorum mirè auxiliatur. Obstructio nes præterea icterorum à crassis & viscidis fucis ortas expeditur. Quin & lateris, & lienis, & coli, & renū dolores, ab huiusmodi causa natos p[er] se sit. Ipsius arboris etiā radices coctæ illitæq, ephelus purgat. Porro amygdala dulcia, q[ui] & ipsa nōnihil fortūnit amaritudinis, moderatè sunt ca lida.

Ammoniacum.

Ammoniacum.

Cuiusdā ferule est lachryma, intemam emollit vim possidens, adeo vt articulorum top[hi]s dis soluat, & lienes induratos sanet, & chæradas p[er] lialit[er] digerat. Amomum.

Amomum.

Acoro quilibet facultatè obtinet, nisi quodd aco rū ficius sit, minore aut concoquendi vi amomū.

Anagallis.

*Anagallis vi
ris, familiaris.*

Anagallis virag, & q[ui] caulesq, & quæ purpu reū fert florè, extergens est facultatis. Habet ve rō nōnihil etiā caloris, & quan dā trahendi vim, qua corpori infusa extrahunt. Succos earū ex na ribus purgat eadem de causa. In summa, deficiē di vim habent citra mordicanonē. Quamobrè vulnera glutinant, & putrida corrigit.

Anagyris.

*Anagyris facul
tas.*

Frutex est grauit[er] olēs, & digerētis, exalfaciē tisq[ue] facultatis. Cuius folia viridia tumores re primunt ressecant, incidētis sunt exiccat[is]q[ue] po tētis. Similè ferè vim habet eius radicis cortex. Semē aut subtiliorū est partiū, vomitū rē, vocat Androsimū, Officinis Mille pforata, Hispa nis Coracōillo, hoc est, corculum.

*Androsimen.
Millepforata.*

Planra est fruticosa, natura duplex. Vnum em dicit Ascyron, species hyperici: alterū à quibudā appellatur Dionysias. Est autem semē eorū pur gatoriu. foliorū verò facultas modicè extergens & deficcans, vt & ambusta curare credunt. Cæ terum in vino austero decocta, vinū ipsum vul nerum grandium glutinatorium efficiunt.

Androsaces.

Androsaces.

Amara & acris est herba. Potest aut ressecata ebitat[is] tum ipsa, tū fructus eius, magnopere provocare vrinā, & nimirū etiā digerere & defic care. Andrachne, Portulaca.

Andrachne.

Frigida & aquosa est p[er]terre, pauce particeps aust[er]itatis: p[er]inde fluxiones repellit, maximèq[ue] biliosas & calidas. Estq[ue] tertij ordinis refrigeran tiū: humectantiū aut secūdi. Quare maximè estu antes adgnat, tum v[er]is osculo imposta, tū hy pochōdriis: ac p[er]cipue in febrib. hecticis. Præ tera denū stuporè lenit. Quoniam aut restringit, viliter dyentericis edis, & muliebri, p[er]fluio, & sanguinis reiectionib. Sed ad hæc sanè multè est quā herba succus ipsius efficaci[us].

Anemone.

Anemone.

Radix cōmanfa p[er]ituis evocat: succus è narib. purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper fordidā vicerū anemone expurgant, & lepras de trahūt, mensisq[ue] ap[er]tione eliciunt, & lac trahūt. Anethum.

Anethum.

Adeo exalfacit anethū, vt habendū sit aut se cundi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccan tis verò ordinis est secūdi incipientis, aut primi

finientis. Itaq[ue] merito in oleo decoctum digerit, dolorem sedat, somnum cōciliat, crudos humo res concoquit. Vltum autem, tertij ordinis tum calfacientium, tum exiccantiū sit. Proinde vlcera sibus nimis humidis, p[er]est, potissimū is quæ in pudendis cōsistunt. At quæ in præputio sunt in vetera, ea, p[er]e cicatrice inducit. Ceterum viri de humidius & minus calidū est: itaq[ue] magis cō coquit, & somnum conciliat, sed minus dicitur.

Anthyllis.

Anthyllis virag modicè deficcac, vt & vlcera glutinet. At quæ chamæpityia similis est, subtiliorum est partium, magisq[ue] detergit, p[er]terea comitialibus competit.

*Anthyllis vera.
Pur.*

Authemis, Chamamelum.

Calfacit, & deficcac i[st]o primo ordine, estq[ue] tenuium partium, ac proinde digerendi, laxandi, & rarefaciendi vim obtrinet.

*Authemis,
Chamamelum.*

Anisi semen.

Calfacit & ficit in tertio ordine. Proinde vrinam mouet, ac digerit, sicutq[ue] ventris reprimi.

Anisi semen.

Anthrinum, Anazirum.

Anthrinum.

Semen habet in vrile, estq[ue] cū bubonio similis facultatis. Aparine, Philanthropos.

*Aparine,
Philanthropos.*

Modicè extergit & deficcac, habetq[ue] nōnihil subtiliū parnū. Apas, Pirus.

*Apas,
Pirus.*

Piri folia pariter & raciones, austera sunt. Ex fructu autem, pars vna terrea est, alia aqua. Cæ terum virag frigida, necnō alia semperpar. Pro inde est pira stomacho grata sunt, & sinu p[ro]hibent. Illia aut deficcant, modicèq[ue] refrigerit. Vnde etiam vulnera glutinant.

Achrades, Pira sylvestria.

Magis quā pira reliqua astringunt & deficcant: ob idq[ue] maiora vulnera glutinant, fluxuq[ue] reprimunt.

*Achrades,
Pira sylvestria.*

Apocynum, Cynocrambe, Cynomorum, Sylvestris mercurialis.

Canibus iuxta & hominibus est venenū, her ba grauit[er] oleus, ob idq[ue] vehemēt[er] calida: nō tamen proportionē deficcac. Itaq[ue] illata, admodum digerentis est facultatis.

*Apocynum,
Cynocrambe,
Cynomorum.*

Argemone.

Erhuius herbe facultas absterforia est, & digerens.

Argemone.

Mult minus est aro. Radicè habet oliue magnitudine, sed multo est ipsa acris.

Arifarsa.

Arifolochia.

Radix eius est amara & subacris. Sed ex illis omniū subtilissima est, quæ rotunda. Aliarū verò durarū, quæ clematis appellatur, fragrior est, infirmior tamen. Ar longa, tenestate quiddè rotunda vincitur, abstergendi tamen calfaciendiq[ue] & ipsa potentiam obinet: minus sanè quā rotunda abstergens & digerens, sed nō minus calfaciens, imo iorsā plus. Itaq[ue] in quibus vsus est modicè absterforis, cōmodior est longa: vtp[er]a in vlcibus carne implēdis. At in quibus crassum humorè validius extenuare oportet, illic vsum est rotundū. Proinde dolores à crasso spiritu inductos, rotunda exactius p[er]sanat, extrahit spli cula, putredines corrigit, vlcera fordidā purgat, dētēs & gingiuarū splēdidas facit: auxilio est a[ut] matia, ingulnentiibus, comitialibus, podagricisq[ue], si cum aqua bibatur. Tum rupis & conuulsis, vt si quid aliud, medicamen idoneum est.

*Arifolochia
triplex.*

*Arifolochia
triple adu[er]sa
da opera.*

Arceuthus,

Arceuthus, Juniperus.

Calida & sicca est terrij ordinis. At fructus, similiter calidus est: siccus tamē in primo ordine.

Artium.

Quod Thapio Verbasco est simile, radice tene ra, candida, dulci, caule oblōgo & molli, semine cymino simili, tenuiū est partium: ob idq; facultatis modicē exiccantis & extergētis. Quamobrem radix ac semē eius in vino cōcta, quadante nus dentū dolores mitigant. Porro ambusta & chymethla non horū modō decoctū, sed & cau les teneriores sanare possunt.

Arctium aliud, Lappa maior, Bardana.

Digerit simūl & desiccata: astringit tamē nō ni hil: vnde folia eius antiquis viceribus profunt.

Arnoglosson, Plantago.

Refrigerat pariter & siccat in secundo gradu: habetq; nonnihil austerum, ratione terrearū par tiū. Porro medicamenta, q̄ cum hoc quōd refri gerit, vnā enī astringūt, ea & ad vlcera rebellia omnia, & ad fluxiones & putredines cōueniunt, ac proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis pluuia sunt, & si quid aduērat, refrigerant. Tum sinus quoq; glutināt, & alia vlcera recētia simūl & vetera. Arque in omnibus ferē id genus medicamētis primas tenet, ac certē nulli secun dū est arnoglossum, ob tēperatū symmetriā & cōueniētiā. Nam siccitatem obtinet morbus ex pectē, & frigiditatē quē nondū stupefaciat. Fru ctus etiam & radix similis sunt facultatis, nisi q̄ rum siccioris, tum minus frigide. Quin & semē subtiliū est partū: radices verō crassiorū. At lie bae folia exaccata subtiliū partū existunt, & mi nus frigide facultatis. Radicibus vtunt ad den tum dolores tum mandentes, tum collationib. incoquētes: præterea ad iccinoris renūq; ob structiones noui has tantūm adhibent, sed folia quoq; & multo magis semina.

Arum.

Mediocrer extergēdi vim possidet, etq; pri mi ordinis calfacientium & exiccantiū. Radices eius comēst mediocriter humorū crassitiē inci dunt, ita vt sint excreantib. ex pectore idoneq;.

Artemisia.

Duplex est, vtraq; tamen calfacit secundo or dinate: intenso autem primo, aut secundo remisso desiccata: etq; renūū partū existunt, sed calculi re num, vterq; somērationibus laud mediocriter congruant.

Astrum.

Radices eius facultate similes radicibus a cori sunt: intensiores tamen.

Aklepias.

Hulus nondum nos periculum fecimus.

Alapalios.

Acris simul & astringens est. Quare partibus quidē suis acribus exalfacit, austeris verō refri gerat. Itaq; vtriusq; ratione desiccata: vnde ad pu tredines & fluxiones est vtilis.

Alparagus petreus.

Abstergendi vim habet citra manifestam cali ditatem aut frigiditatē. Hinc renes ac iecur infar ctū liberat, & maximē radices eius, & semē: quia & dentium dolores sanat.

Asplenium.

Tenuium quidem partium, nō tamen calida

est herba. Hac vtriq; ratione lapides frangit, & lie nes liquat.

Astragalos.

Radices astrictiores sunt: quare nō iustū e nuē siccata. Nā & vlcera glutinat, & alium fluen tem sistit, si quis in vino decoctam radacē hībat.

Aster arcticus, Dubonium.

Partim quidem digerere est, partim autem se frigerans: verum id non astringit.

Asiapius, Vicia passia.

Cultra quidem, cōcoquendi, astringendi, & le uiter digerendi, facultatē obtinet. At agreitis, ve hementer acris exiit, adeo vt ex capite purget, abstergetq; valenter. Itaq; ad pīoram accōmoda est. Sed & vrendi vim habet.

Aspiodelus.

Huius radix ex ter gentis est facultatis. Vtrū aut cinis, calidior, exiccantior, subtilior, ac digerere potentior existit: ac proinde alopecias sanat.

Attractilis, Cnicus agreitis.

Facultatem habet desiccandi, & modicē dige rendi: exq; spinarum est genere.

Atrophax, Atrepex.

Humida quidem est in secundo ordine, frigi da verō in primo: etq; aquea similiter malum. Quin & ventrē celeriter pmeat, vt iila, ob lubri citatē. Hortēses aut atplex & malua, q̄ agreites, nū humidiores sunt, tum frigidiores: punde pīle gmonis & pilygetilis incipiētib. hortēses: vi gentibus aut & declinātib. agreites magis cō ueniūt. Semen eius abstergendi vim habet, itaq; icteritq; ab obstructione iccinoris ortē auxiliat.

Aphace.

Astringit, edinūq; vt ipsa lentulica: rēgius ta men cōcoquitur. Carērum valentius desiccata, & moderati caloris est.

Abfinthium.

Astrictiorā, amaram, & acrem qualitatē sor titur, exalfaciē, extergens, eboras, & exicāq;. Prouide biliosos ventris humores deuict, ac per vrinā euacuat. Verum contentam in ventre pi tuitū nihil adiuuat sumptū. Sic nec si in thorace aut pulmone cōtineatur: nam astringēs in eo fa culas, quā amara, valētq;. Est autem calidum in excessu primo: sicciū verō in tertio. At suū eius longē quā herba est calidior.

Balanus Myrpicus, Glaus vnguentaria.

Succo eius, qui calidus est, vnguētariū vtrū. Reliquiū aut vnde expressus est succus, vincentē habet qualitatē amaram, cui admissa est quæ dam astrictio. Prouide extergentem, incidentē, contrahentem, & stipantem effectum possidet. Quod si quis carnē eius draclmæ pondere, cum melicrato bibat, medicamen expetitur vomito rium. Sepe etiam per infernū alium subducit lar giter. Sed lienes liquat, iecurq;, indurēcentia: ad quorū vīcerum expurgationem, ex oxyrato ipsam exhibere cōsueuimus. Ex acetō etiam le prās, pīoras, lētes, vitiliginē, ionthios, ephelsm, exanthemata, achoras, aliūq; id genus cūs af fectūs exterit. Abstergentē itaq; & incidentē cū astrictione obtinet facultatē. Cortex autem eius admodum astrictioris existit.

Balsamum.

Balsamū desiccata & exalfacit secūdo excessu: est aut & tenuium partium; adeo vt odoratū sit. Eius lachryma subtiliorum est partū quā ipsa

Yy iij

Carpobalsam.

plantarum non tamē adeo calida vt nonnulli existimant. Fructus eius perissimilis facultatis est, longē tamen in subillitare partium inferior.

Balaustium.

Balaustium.
Cytinum.

Flos est agrestis punice, sicuti domesticarū cytinus. Valēter gustum astringit. At vero si omne astringēs terrestris est & frigidū, merito quē dixē ritipsum valēter & exicare, & refrigerare. Quo nomine vlcera ad cicatricē perducit. Quin etiam ad sanguinis reiectiones, dysenterias, necnō vltis vteriq; profusio, nemo est qui non hoc medicamento utatur.

Batus, Rubus.

Batus, Rubus.

Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix, qualitate astringēte, neq; obscura, participat. Sed folia germinaq; recens nata plurimum in se habēt subillans aquez, parū verō astrictionis. Quare vulnera glutinēt. At fructus maturus, nō parum habet succi calidi tēperati, qui existit dulcis: ob idq; & ob modicum astrictionē, nō est insuavis gustui. At immaturus, acerbus est, & validē edecatorius. Ac sanē vterq; recondit, validus quā recens desiccans. Flos eandē vim fructui immaturo possidet. Vtraq; ad dysenterias, vtrius profusum, robur perditū, sanguinisq; expuitionem sunt idonea remedia. Radix pręter astrictionem, nō paucum habet substantiā in se tenuē, per quam & lapides renem comminuit.

Rubi radice citrini lapides

Batrachium, Ranunculus.

Batrachium,
Ranunculus.

Huius omnes quatuor species adeo acres existūt, vt cum dolore exulcerēt. Quare si cōuenient vtare, pforas & lepras excoñt, & vngues diuellunt. Tum leprosis stigmata digerūt, & verrucas detrahunt. Quin & alopecias iuuant, exiguo tempore admodum. Radix arefacta sternutationē provocat. Sed & dentes dolētes iuuat, sic vt eos frangat. Est itaq; valde calida & sicca, tum radix, tum vniuersa herba.

Bdelium.

Bdelium.

Quod Scythicum nominant, ēstq; acris & resinosus, emolliētis admodum & efficacia virtutis est. Arabicū autem, quod splendidius est, magis quā emolliēt exiccat: viderūq; in poru sumptū calculos rem frangere, tum vrinās ciedere, & crudorū flatuum discursus, pręterea laterum dolores, rupturāq; sanare.

Bechion, Tussilago, Vngula caballina.

Bechion.

Tussilago.
Vngula caballina.

Tusses & orthopneas iuuare creditur, si quis folia arida aut radicem in prunis vrens, ascendente inde fuliginē inspiratū attrahat. Est autē modicē acris: vt sine molestia, nō xāve, omnes thoracis affectus credatur rumpere. Folia virentia parē recentē phlegmone obfessam illius adiuvant.

Bitum.

Bitum.

Holus est esculentū, humidē frigidatq; temperaturę in secundo ordine.

Bulbus sativus.

Bulbus sativus

Frigidior quidē & crasior agrestis est, lentūq; succum creat. Nam & coctū difficilis est & flatuosus, & venērē provocans. Attamen illius ob amaritudinem simul & astrictionem abstergit simul & glutinat, & nimirum etiam exiccat.

Bulbus vomitorius.

Bulbus vomitorius.
After atticus.

Multō est calidioris temperaturę q̃ superior. Bubonibus, After atticus.

Creditur sanare bubonas & illiū, & alligatū

inguini. Digerit enim mediocriter, quia modicē est calidum. Ceterum non ita ficcat, vt tendat.

Buglosson.

Humidē calidatq; temperiei est: vniūq; iniectū hilaritatis causa esse credit. Sed gurgulis etiā lenit aspredinem, si mellisaro coctum sumatur.

Bunium.

Adeo excalfacit, vt & vrinās moueat, & menses provocet.

Bupthalthmon.

Flos eius floribus chamę meli est tum maior, tum acrior: vehementiūq; digerit, adeo vt & duritias sanet, cerato mistus.

Brathy, Sabina.

Quātū in acrimonia cupressum vincit, tantū ab eo superat in astrictione: quare illo & calidior est, & potentius digerit. Quin & similiter cupresso putredinibus accōmodari potest, maxime vbi rebelliores fuerint, & diuturniores. Carbūculos itē soluit: mensēq; vt si quid aliud, essentē tenuitate provocat, & sanguinē per vrinās mouet. Fortū etiā vluenē interficit, & mortuum educit. Est autē hoc medicamē tertij ordinis tum excalfaciētū, tum exiccantū, ex numero eorum quę vel maxime tenuiū sunt partium.

Bretanica.

Huius folia astringētia sunt, & vulnerū glutinatoria, similia agrestibus lapathis. At expressus ex illis succus perinde natus est astringēte, vt deturq; sanare iam potescētia.

Bromus.

Illius desiccatur, digeritq; mediocriter & sine morfu. Temperiem autem habet paulō frigidiorē. Nonnihil etiā astrictionis obtinet, vt vtrius profusio iuuat.

Bryon thalation, Alga.

Compositū est ex terrea & aquea essentia, vtraq; frigida. Siquidem & gustum astringit, et calida quibuscvis illitum, ac refrigerat, adiuvāt.

Bryon ut Spithanchon, Muscus.

Vim habet astringēte invalidā, ceterum mediocriter frigidā. Nam & digerendi, & emollienti facultatis est participes.

Gallium.

Inde nomen sumptū, q̃ lac coagulet. Facultatem autē obtinet exicatoriā, & subacrē. Flos eius cōpetere sanguinis profusio, videretur, & coibustis mederi. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

Gentiana.

Huius radix efficacissimē extenuat, purgat, abstergit, liberat obstrucone, vt pote impelle amara existētia.

Gigarta, a cinorum vix nuclei.

Ex secundo exiccantū sunt ordine: refrigerantium verō, primo. Omnibus aatem ventris cum profusio iunctis affectibus, impediō cōferunt, vt pote quum acerbis appareant.

Gingidium.

Gustu amarum & astringēs quum sit, temperie calidum frigidūq; videtur. Secundū vtriq; verō qualitatē desiccatorum est. Ceterā porro stomacho amicum existit.

Glaucium.

Astringit cum quodam fastidio: tum adeo insigniter refrigerat, vt solū saepe erysipelata, si valentia nō fuerint, curare possit. Constat enim ex aqua terręq; substantia, vtraq; frigida.

Glaux

Bupthalthmon
mellisaro
coctum part.

Bunium.

Bupthalthmon.

Brathy:
Sabina.

Bretanica.

Bromus.

Bryon thalation.
Alga.Bryon.
Spithanchon.
Muscus.

Gallium.

Gentiana.

Gigarta.
A cinorum vix
nuclei.

Gingidium.

Glaucium.

Glaux herba.

Glaux herba. Ex lactiginis quum sit, calida quodammodo humidatq̃ fuerit.

Glechon, Pulegium.

Glechon. Quandoquidem acris & iubamara est, valde
Pulegium. extenuat & calcitrat. Quare & illita rubicat, & exulcerat si diutius hærreat. Quin etiam humida, crassa, & læta, ex thorace & pulmone excreta talia facit, mensc̃q̃ mouet.

Glaux, strigmenta balnearum.

Modicè emolliendi vim obinet.

Glaux. Glycyrrhiza, Dulcis radix.

Strigmenta. Similiter radici ipse succus, dulcis leuiterq̃ astringens exiit. Proinde non modò asperæ arteriæ, sed vesicæ etiam scabritie lenire potest, idq̃ temperaturæ mediocritate. Quare fuerit sanè natura eius familiaris non stric temperaturæ. Ceterum tepidam quandam caliditatē sortitur. Porro quoniam temperie quoque est humidum, id quod modicè est dulce, iure sanè etiam si congruens medicamentum est, nimirum modicè humidū, humaniq̃ natura frigidius. Dioscorides ait, arefactæ radicis pollinem vnguibz oculorum mederi.

Glycyfida, Pæonia.

Glycyfida. Radicem habet leuiter astringentē, cum quada
Pæonia. m dulcedine: at si plussculū dentibus mandas, acrimoniam item quamplam subamarā subesse percipies. Proinde menses ciet ex melacra, amygdali pota quititate. Expurgat porro enī secur obstruētū, & renes: ventricūq̃ lūit fluxiones, si in aliquo austero vino cocta sumatur. Est præterea omnino reficacior: quare ex collo pueris suspensa, merito comitalē morbum persanat: idq̃ aut aliquem à se fluorem per infantuli inspirationē immitēs, aut aërem assidue mutās, atq̃ alterum reddens. Nam hoc pasto succus Cyrenæicus collemellam phlegmone affectam iuuat: & melancholicū frictū palam catarrhos & coryzas deficit, si quis id in calidum linteum rarum liget, assidueq̃ calorē ex eo per inspirationem in nares attrahat. Quinetiam si compluribus linis, & maxime marinz purpur, collo viperæ injectis, illis viperam prætoris, eaq̃ postea cuiuspiam collo obvinciam, misicet profueris, tum paristhmii, tum omnibus itz quæ in collo expullulant. Pæonia itaq̃ & exiccat, & tenuiū est partium: calcitrat autem medicorū.

Pæonia appensa. comitalem morbum persanat. *Cyrenæicus succus.* Melancholicum.

Viperula quibz. prætoriam viperam, effere moribus generat.

Gnaphalium.

Gnaphalium. Folia eius modicè astringūt: quare ex aliquo vino austero dysentericis profunt.

Gongilis, Rapum.

Gongilis. Gongilidis semen venter excitat, utpote spiritum flatuosum gignēs. Sic & radix coctū distichis est: insitūq̃ & semen generat.

Damasonium, Alisma.

Damasonium. Decoctum radicis eius calculos renū comminuit. Quare absterforia facultatis est particeps.

Daucus, Staphylinus.

Daucus. Domesticus esui aptior, sed imbecillior, ac re
Staphylinus. calidatq̃ facultatem sortitur: ac proinde etiam extenuat. Ac rediv sanè statuosum quid obtinet, ac venerē. Semen autem, domesticū quidem, & ipsum quandam ab Venerē ciendi potentia possidet: agrestis verò planè statu caret, ac proinde vrinam mensc̃q̃ ciet.

Dauci semen.

Dauci semen. Adeo vehementer excalcitrat, ut inter prima, tū vrinā, tum mēsa provocet. Multum etiam di gerere per halitū fors impositum valet. Ipsa verò herba, moderatè calida est, simulēq̃ eū vim obtinet, ceterum infirmiorum.

Daphne arbor, Laurus.

Daphne arbor. Huius folia calcassunt & fessant vehementer: et fructus adhuc vehementius. Radicis cortex minus quidem acris est & calidus, ceterū plus amarū: habetq̃ etiā astrictionis nōnihil. Quamobrem & calculos confringit, & icconi prodest. Bibitur ex vino fragrantum obolorū pondere.

Daphne herba. Daphne herba, quam Alexandrinā appellat.

Evidenter est calida, acris, & subamara, potaque tum vrinās, tum menses prolicit.

Clamædaphne.

Clamædaphne. Perfrigidis quidē est viribus daphnæ Alexandrinæ: sicut & quod daphnoides vocant.

Diastamnū.

Diastamnū. Tenuiori essentia constat quam pulegium, et tera illi simile. At pseudodiastamnū ad omnia imbecillius existit.

Diplosos.

Diplosos. Diplosi spinæ radix ex secundo ordine exicata toria est, habetq̃ nonnihil & absterforium.

Dorycnidion.

Dorycnidion. Aquea excelsit frigiditate. Quamobrem pauculum quidem soporem conoliat: plussculum verò sumptum, perimit.

Dracuncum, Dracunculus.

Dracuncum. Quiddā aro perfimile obinet, tum foliis, tum radice. Ceterū illo acrius est, & amarius: ac pinde calcicatorium magis, & tenuioribus partibz. Habet etiam & astrictionem leuiculū. Radix omnia viscera expurgat, optimūq̃ remediū est contumaciū viceram. Verum extergit etiam cetera omnia quæ exterioriōē desiderant. Folia præterea similem facultatē sortuntur, ob idq̃ si sint viridia, recentia vulnera glutināt. Fructus valentior est, non foliis tantum, sed radice. Itaq̃ & caneros, & polypodos credit eliquare. Succus eius quoq̃ vira oculorum expurgat.

Dryopteris, Filicula.

Dryopteris. Dulcis, acris, amara, & in radice etiam acerba existit. Habet aut facultatē putrefaciendi: proinde pilis glabram cutim efficit.

Drys, Quercus, Robur.

Drys. Exiccati astringendiq̃ possidet facultatem, cum mediocritate quādam tepidatq̃ caliditate. Ceterum plus ceteris eius partibus astringit, quæ in trunci cortice membrana subest: tum quæ ipsius fructus cōvestit carnē. Quamobrem ad profluuiū muliebri, sanguinis expulsiōnes, dysenterias, & diuturnos ventris fluxus esse credunt accōmodam. Valentius tamen astringunt fagus & ilex. Quarum plantarū folia renella illita non intrinseque deficiūt, nec non vulnera glutināt. Eandem foliis vim habet & fructus roboris: eōq̃ Medici nonnulli vrinatū ad incipientes atq̃ crescentes phlegmonas.

Ebulus, Althea, Agrestis malua.

Ebulus. Facultate digerendi, laxandi, phlegmone liberandi, mingendi, & concoquendi difficilis coctū affectus est prædita. Ceterum & radix & semen quā folia, & tenuiorum sunt partium, magisq̃

Althea. Malua, Gloriosa.

exicatoriam & extersoriam facultatē ostendūt, vt & vinligines detergant, & semē renuū calculos frangat. At radices decoctum, ad dysenteriam, diarrhœā, & sanguinis reiectionem est aptum, quum iuniorum etiam nonnullū astringat.

Ebenus.

Ebenus. Ex iis lignis est, quæ trita in aqua soluant. Vis inest excalescendi, extergendi, & tenuiū partium. Quamobrē, quæ pupillas offuscant, extergere creditur: misceturq; aliis ocularibus medicamentis.

Ebra, Olea.

Ebra. *Olea.* Olivæ rami quantum habent astrictionis, tantus sunt frigidi tatis participes. Fructus verò, si quē ad vāguē maturus, moderate calidus est: si immaturus, magis tum astringit, tum refrigerat.

Elæon, oleum.

Elæon. *Oleum.* Oleum quod ex olivis exprimit, humectatissimum esse, & moderate calidum, iam supra docui mus. Eiusmodi est, quod est dulcissimū. Sicq; potissimum ex olivis quæ druppas appellant. Cæterum quod omotribes & ompaciūm nuncupant, quale ab Hispania veluitur, id quantum se habet astrictionis, tantum etiam illi inest frigidi tatis. Porro oleū vetus quod quidē ex dulci inveterato efficitur, & calidius est, & potentior, ad evaporandū viribus: quod verò ex crudo, id, dum reliquū quippiam servauerit astrictionis, mixtæ permant facultatis: ubi verò illam prorsus abiecerit, reliquo evadit simile. Quinetiam quicunque in preparando ramos incidunt, non

30

Oleum lotum est murem medicant.

placino simile oleum efficitur. Porro quod oleum lotū minime omnium mordacitatem continet, supra etiam tractatum est. Sunt autem varia oleorum genera: quibus sanē cicinum & tenuius, & ad discutendum potentius est, quæsi millimū oleo ex olivā vetustū. Raphaninum autem, quætera hanc est simile, sed calidius tamen. At hoc etiam calidius sinapium: cui simile est qd ex melanthio conficitur. Pugnat cum istis myrtinum & sesamium, tum quod astringant, tum quod vassalū sint partium. Multæ facultatis est lentissimum, terebinthinū, & mastichinum. Non eum tantum emolliūt, sed & astringunt. Amygdalinum porro amaritudinē exasperantem possidet, quætenim cuiusdā astrictionis est participes: non tamen caryinum, sed id vel maxime simplicis est digerendi facultatis. Calidius eo est laurinum, & hoc etiam in agis, cedrinum. Proximum ei est qd ex nigra pice conficitur. Dadinum, minus quidem laurino calidū, verum valentius desiccans. Hyoscyaminū verò mixtæ facultatis est, emolliendi videlicet, ac refrigerandi. Oleum portū cicinum, ventrem subducit. Hoc verò magis, qd fit ex Gnidio grano. Quod ex agresti olivā exprimit, extergit, simulq; astringit. Squalidissimum est id est ex omni olei genere: & post, stricum quoq; deinceps illis Hispanum. Pinguissimum est Lybicum, & Cilicium: simul autem pingue & tenue, Sabinum. In medio comprehensorum omnium sunt, tum id quod per Cyclades insulas nascitur, tum quod per Græciam, Asiūq;.

Etenim oleum pingue æstimatur viscositate: tenue verò, si pellucet, si purū sit, si plurimū minimæ eius portione invngatur, si facile à cuti cōdibatur. Omne autem oleum, si cuiusq; iniectionū natura variari contingit.

Elatine.

Modicè tum refrigerat, tum astringit.

Elatine.

Elaphoboscos.

Excalescit, & tenuiū est partium: ob idq; exicat, maxime in secundo ordine.

Elenium, Enula campana.

Radix eius calida & siccā est cum recrementis humore. Quare elegantiā hī faciunt ad educendos crassos ex pectore succos, idoneē miscetur. Iuvant etiam ad rubrificationes partes vexatas frigidas diuturnisq; affectibus.

Elenium.

Enula campana.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

na.

Elclisphaeos, Salvia.

Evidenter excalescit, ac leviter subastringit.

Elclisphaeos.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Salvia.

Helleborus, Veratrum.

Helleborus.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Veratrum.

Tam albus quam niger helleborus extergentis calcificationisq; est potentia. Quamobrē ad alphos, lichenes, piores, leprās, accōmodi sunt.

Quineti niger si in fissulū callo indurati in fundat duobus tribusq; diebus, callū detrahīt. Dentibus prodest cum aceto colluentibus. Sunt aut in tertio ordine excalescentiū & desiccantium.

Porro niger gustu calidior est, calidus amarior.

Helixine, quam Parthenium vocant.

Helixine.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Parthenium.

Erice.

Bria. Digerendi per halitum facultatē obtinet: sed precipue flore eius ac foliis utendum.

Herypyllus, Serypyllum.

Supplicum. Viqueadeo calcificat, ut vrinas & menses moueat. Estiq; & gustu admodum acre.

Herypyllus.

Erysimum.

Erysimum.

Semen eius igneum est, & calfactorium. Vtile est cū eclegmatis ad promouendas crassiorū ex pectore expuitiones. Quin & parotidas induratas, & duritias antiquas vberum & testicularū, iuuat: & vt Dioscorides ait, etiā occultos cūctos.

Erythrodanum, Rubia pasciuia.

Erythrodanum.
Rubia pasciuia.

Est autē tinctorū rubia, radix acerba & amaraquare liene, & secur expurgat, & vrinas crassas, multas, & interdum sanguinolentas promouet. Quin & menses ciet, exergitq; mediocriter. Proinde virilgines albas cum aceto illa iuuat.

Eupatorium.

Eupatorium.

Tenuium est partū, incidendūq; & extergendi vim, citra manifestam caliditatem, obtinet: quo circa obstructions lecoris asperit. Inest ei quiddam etiam astrictio, per quam robur visceri addit.

Euphorbium.

Euphorbium.

Vrentem & tenuiū partium facultatē sortitur. Ephemeron, Iris agrestis.

Ephemeron.
Iris agrestis.

Astringit quidem, citq; suauis odoris. Quare & repellit, & per halitum digerit. Non ineffaciter autem radix elas in dentium dolore colluit. At folia cocta in vino, phlymarum augmento & statui congruant.

Echinus herba.

Echinus herba.

Fructus eius acerbus est, atq; idcirco repellens facultatis & exicatorij. Vtuntur eo ad oculorum turidūq; fluxiones.

Zeia, Spelta.

Zeia, Spelta.

Vniuersa sua facultate, quodammodo in medio est tritici & hordei.

Zingiberis radix.

Zingiberis radix.

Excalfacit, sed non primo statim occurru, veluti piper: vnde fani & minus esse subtilem partium, quam piper existimanda. Etiam illa bona tam quandam, & crassam retinere in se videtur humiditatem, quemadmodū piper longū. Quare diutius pericurat quæ proficiscitur à zingibere, aut pipere longo caliditas, quam quæ ab alio, aut nigro. Porro vbi totum corpus celerime calcacere cōsiliū est, ea tunc exhibēda sunt, quæ & celerime à caloris nostri contactu incallescant, & propiusimē vndequaq; ferantur. Verum vbi parit quævis refrigeratam recalcacere studemus, contra agendum: nimirum quæ tardē calefētia, plurimo tempore perdurēt, ea præbendo. Cæterum licet zingiber & piper longum hac ratione à nigro pipere differant, non magna tamen eis differentia. At nasturtium, gappi, thapsia, & agrestium columbarū stercus, maiori tempore perfecte acceduntur, & plurimo tempore perdurant.

Zythus.

Zythus.

Non parum est acrior hordeo, succiq; prauū, quum ex putredine oriatur. Est & stauosus, ac parum acris & calidus: parte verò plurima frigidos, aqueus, acidus.

Zyme, Fermentum.

Zyme.
Fermentum.

Tenuiū est partium, & mediocriter calidum;

proinde citra molestiam quæ in profundo sunt extrahit & digerit. Particeps autem est aciditatis cuiusdam frigida, & caliditatis ex putredine nate. Cui accedit ea quæ à sale est, & quæ etiā à farine natura.

Hedyosmos, Menthia.

Tam mentia, quam calamintha, gustu actis, & facultate calida est, ex tertio calfacientiū ordine. Infirrior tamē est mentia, & minus excalfacit: cæterū mediocriter ad Venerem excitat: id quod omnibus accidit, quæ humiditatem semel-coctam & stauosam continent. At calamintha, quæ valentius calcificat & exiccat, habet etiam quiddam amarum in se, atq; acerbum. Quare illo quidem lumbricos perimit: acerbitate verò, si cum oxycrato bibatur, recenes sanguinis reiectiones reprimi. Substantia est, vt si qua alia herba, tenuium partium.

Hedysarum.

Hulus semen amarū & subacribum apparere, ob idque potum stomacho gratum exiit, viscerūq; obstructions expurgat. Idem præstat totius fructus germina.

Hemerocallis.

Radice habet lilij radici similem, & figurā & viribus: prodēq; vt illa, igni ambustis, nimirum leuiter digerens, tum nihil astringens.

Hamionitis.

Astrictionem simul & amaritudinē possidet. Quamobrem cum aceto porta illeusio auxilio est.

Engeron.

Refrigerat & modice digerit.

Eryngion.

Calore quidem est temperatū, nō paruum tñ siccitatem sortitur, consistētē in tenui essentia.

Thalietrum.

Folia habet coriandro similia: caulē crassitudinē nate. Vis eis inest citra morsum exicatoria. Itaq; vlcera inueterata ad cicatricem perducit.

Thapsia.

Acetē habet ac valēter excalfacientē facultatē cū humiditate coniunctā. Quare ex alto violentè extrahit, & quod extraxit, digerit: celeriter tñ corrūpitur.

Thermus, Lupinus.

Præmaceratus aqua, amaritudinē exult, ediq; potest, sed nutrimentum fit crassi succi. Vbi verò natiui etiam amaritas pmanet, extergendi, digerendiq; vim obtinet. Interfici autem lumbricos, tum illitus, tum addito melle linctus, tñ ex poka eponus. Quin & decoctū eius lumbricos eicere potest: tum etiā foris identidē persufus, virilgines, adioras, exanthemata, ploras, gangrenas, malignaq; vlcera, iuuat. Expurgat lecor & liene cum nita & pipere suauitatis gratia sumptū. Ellicet mēses & tartum cum myrrha & melle impositum. Lupinorū porro farina, etiam mordicatione digerit: nec liuida tantū, sed & chæradas & phlymarum curat, si in aceto, aut oxymelite, aut posita coquantur.

Thermus agrios, Lupinus agrestis.

Amarior est, & ad omnia valētor domestico, eiusdem genere cum ipso facultatis.

Thlapsi.

Semen eius facultatē acetē sortitur, adeo vt internos abscessus potū disrumpat. Menses ciet, & forum enecat. Per sedem insulsum sanguinolētā

Hedysarum.
Menthia.

Calamintha.

Hemerocallis.

Hamionitis.

Eryngion.

Thalietrum.

Thapsia.

Thermus.
Lupinus.

Lupinus farina quā. melle coquantur.

Lupinus agrestis.

Thlapsi.

evacuata ischiadibus prodest: evacuataq; superna & inferna bilem oxybaphi mensura epotum, Thridax, lactuca.

Thridax. Humida & frigida est, secundum aquae fontanae frigiditatem. Proinde ad calidas phlegmonas, & ad parva & leuia erysipelata, est comoda: praeterea resinguit sinum. At si men ponam, geniturum profusum colubet. Sic & agrestis lactuca semen. Cuius holeris colligitur succus, argemas & caliginis purgans, invigila ad aduersiones cum lactate muliebri solutus.

Thymum. Incidit & calfacit vehementer, ob idq; urinam & menses provocat, sicutum evelit, ponum viscera expurgat, educit ex thorace & pulmone confert, ac deniq; excalfacit exiccatq; in tertio ordine. Idcirco radix.

Idcirco radix. Admodum gustu est acerba. Quare sanguinis effusiones, henterias & dysenterias, mensesq; fluxus suppressit, tum pota, tum etiam admodum extrinsecus.

Ios, Viscum. Ex plurima aërea & aqua, paucissima terrestria substantia constat. Quare ex alto humores extrahit, eosq; diffundit & digerit. Tempus autem ut caliat postulat.

Ios, Viola. Violae folia aquae & subfrigida substantia superant possident. Proinde tum per se, tum cum polenta illita, calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori ventriculi, stuant, & oculis.

Hippuris. Astringent cum amaritudine facultate possidet, ac pinde valenter exiccant, sed citra mortem. Itaq; vulnera etiam maxima glutinat, vel si perfectos esse nervos congerit. Praeterea vocat enterocelas glutinat: nec non sanguinis effusiones, fluxus menses, dysenterias, exteriusq; alui fluxus coarctet. Succus vero eius prodest sanguinis eruptioni per nares, & fluxui obnoxio in ventre passionibus, ex austeriori vinorum quopiam epotus: ac si febre teneantur, ex aqua.

Hippomarathrum. Vna cum feniculo & de ipso differemus.

Urtica. Domestica quidem quia videtur tinctorum, facultatis est valenter exiccantis, nondum tamen mordentis: est enim simul amara & astringens. Proinde magna vulnera corporum durorum glutinat: & sanguinis profusio laborantibus partibus utiliter illinitur: tumores laxos mirifice digerit, si solum ac reprimat, & adversus omnia maligna vlcera mirabiliter resistit. At isanis sylvestris manifeste iam acre quiddam, tum gustu, tum actione praefert. Proinde q; domestica magis deficiat, valentius etiam putredinibus obstitit: ad cetera iam comprehensa deterior.

Isoopyron, Phasiolon. Semen habet amarum & subacutum. Extergit itaq; & incidit humores crassos, cum hoc ut corpora contrahat, costringatq;. Quare exiccat: actionibus pectoris confert, & iecur expurgat, eodurq; iuvare haemopticos.

Irea, Salix. Salicis foliis ad cruenti vulneris glutinatione vti possis. Verum doctus eius maxime prope omnes videntur ad exiccatum emplastrum praeparatum.

nem. Est enim vis eorum ita deficatoria, ut morfu abstinent. Habet vero etiam quandam astringentiam. Porro succus expressus medicamen exiccatum existit, experitq; mordacitatem. Nec enim invenias aliquod medicamen ad plures res vtilius eo, quod citra mordacitatem exicat. Arboris cortex simile facultate obtinet, tum floribus, tum foliis, nisi quod temperaturae siccioris existat, velviti omnes cortices. Item cinere corticis macerata in aceto, nonnulli callos atq; myrmecias tollunt.

GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum facultatibus, lib. VII.

Calamintha, Nepeta.

Estentia quidem est tenuis, temperie autem calida & sicca, quod ammodo in tertio ordine. Est enim acris gustu, paululum amaritudinis obtinet. Extrinsecus adnota, primum qui dem valde excalfacit & mordacit, cutemq; exagit: postremo etiam vicus efficit. In corpus autem intro assumpta, tum ipsa per se sicca, tum etiam cum melisato, perspicuo calfacit, atq; sudores ciet, omnemq; corpus rui digerit, tum exicat. Idcirco ea contra rigores repetitis per circuitum nonnulli vident, sicuti & contra ischiadicis morbis trahit eum qui in profundo haerent ad superficiali, totumq; adeo articulum excalfacit, & cutem non obscure adurit, mensesq; tum epota, tum apposita, admodum efficaciter provocat, ac deniq; elephantiasis etiam probe auxiliatur. Praeterea cicatricibus atq; candorem restituit, & singulata digerit. Praestat autem in huiusmodi, ubi in vino decoxerintur, ipsam emplastrum ritu apponere, & vindem magis quam siquam. Ac sicca, ad venenatarum bestiarum morsum assumitur: vel vltis cauteria, & quaevis inodyamenta calida sunt & acris. Succus eius aut in bulbus, aut epotus, ascaridas, lumbricos, & acrii vermes necat. Sic & conceptum interitum, ruitq;. Ignitur incidendi quidem est vis adeo, ob calorem, tenuitatem, amaritudinem: abstergetur vero, propter solam amaritudinem. Quare asthmaticus atque ictericus convenit. Ad omnia tamen dicta, montana efficacior existit.

Calamus odoratus.

Leuculum quiddam astringentem, ac minimam acrimoniam possidet. Si quidem magna ex parte essentia quidem eius terrena est, & acris: temperies autem, calida & sicca, in secundo excessu, nisi q; valentius deficiat. Porro moderate monet urinam: ac facultatibus, quae iecori stomachoq; imponuntur, nec non iis fomentis quae in inflammatione vtero, aut mœnibus inestruis administrantur, commodissime potest misceri.

Calamus phragmites, Cannas.

Radix eius cum bulbis, aculeos stipitesq; infusos extrahere ex alto graditur. Etenim abstergetem, minimam acrem facultatem sortitur, quem admodum & ipsa folia. Cortex vero & cōbustus, admodum tenuum partium & digerentis facultatis est, cum nonnulla austerione, ut exiecit & calfacit tertio quodammodo ordine. Ceterum eius flos est vitidus. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter haerens affigitur, ut avelli non possit, auditumq; vitiat.

Canna-

Cannabis, Cactalia.

Cannabis.
Cactalia.

Radix cancani, crassam, empleticamq; & exsiccatē habet essentiam, sed mordacitatem experitem. Quare macerata vino, sicuti tragacantha, & lintha, aut cōmantha, artemis asperitatem sanat.

Cannabis.

Cannabis fo-
men.

Cannabis semē adeo status dūctū exsiccatq; vt si largius edatur, genituram absumat.

Capnios, Fumaria.

Capnios.
Fumaria.

Acris, amara, & acerbe qualitatis est particps. Quamobrē vinū biliosam, multamq; provocat: sanāq; tum obstructions, tum imbecillitates iecoris. Succus eius oculorū aciem acuit, nō parū trahens lacrymarū, veluti ipse fumus.

Capparis.

Capparis radi-
cis cortex intus
& feni adhibi-
tur, quæ melio-
rior.

Capparis radices cortex vincentē habet qualitatē amarā, proximā acrem, deinde acerbā. ob idq; pugnātib; facultatib; constat: quippe abitergere, purgare, incidere, potest amaritudine: exaltacere, incidere, digerere, acrimonia: contrahere, densare, astringere, acerbitate. Quare lienes induratos, si quid aliud, maximē potest iuuare, tum foris medicamentis quæ illuminantur admittit, tum intra corpus assumptus, siue decoctus in aceto oxymelitico, siue cōtus atq; illis permixtus: cū nimirū crassos lentosq; humores apertē hoc pacto sumptus evacuet: nec eos tantū per vinas, sed per ventrem etiam saepe sanguinolentos defert: vnde & lienes adhi sunt, & coxarū dolores. Quinetiam menses 10 promouet, ex capite purgat, auxiliat ruptis atq; cōvulsis, necnō malignis viceribus, caraplasmatismo modo impositus. Præterea dentium dolores adiuvat, interim cum aceto coctus, interim cum vino, saepe solus dēbus manūs. Ad hæc vitiliginē cum aceto detrahū, & churadas, & duros tumores digerit, denotēis ad eas medicamentis mixtus. Radicis corticis fructus proportionē respondet, nisi quod ad omnia fit imbecillior. Imō & folia, & caules similem enī vim obtinent. Admixturem tamen illis aliquid, quod eorum vehementiam obtundat. Nec mirum est, quod aurū vermes sua pecimant amaritudine.

Cardamomum, Nasturtium.

Cardamomum.
Nasturtium.

Nasturtii semē advenis facultatis est particps, veluti napy. Proinde omnia quæ rubificationem postulant, eo exaltantur. Mixetur quoque remediis quæ exhibentur asthmaticis, tanquam valenter crassos succos incidere valeat. Porro & herba arisa, & semini similem facultatem sortitur. Nam quæ humida est & viridis, multis numeris infertorem.

Cardamomum.

Cardamomum.

Quanto suavius magisq; fragrans nasturtio est, tanto & imbecillior ei calida facultas inest. Nec enim vicerare cōdponem. Habet autē adiunctū quiddam amaritudinis, quæ lumbricos interficit: & cum aceto valenter ploras detergit.

Cario.

Cario.

Cari semē calfacit & exsiccat tertio quodāmodo ordine, moderate acré possidens qualitē. Itaq; & status extinguit, & vinas ciet, tum semē, tum plantā.

Cafia.

Cafia.

Exsiccat & calfacit tertio quodāmodo ordine: sed & tenuiū admodum partium est, habetq;

acrimoniæ plurimum, ac leuiter nonnullū astrigens. Iacida itaque simul & digerit, roboreq; instrumentis addit. Quare menibus est mouendus idonea, vbi à copia limi & crassitudine illi suppressi fuerint.

Carya, Nucen.

Arbor tum in foliis, tum in germinibus astrigens, quandam posidens, ceterū evidentem multamq; in nucis putamine recenti pariter & sicco. Eius autem succo expresso, ac melle decocto, nos vice itomandi medicaminis vitmur. Oculum quod ex fructu elicitur in veterato, admodum per halitum digerit. Quare nonnulli eo gangrenas, carbunculos, & xyglopos sanant. Siur qui ad nervorum vulnera vrantur. Ceterū si recens sit, astringens nonnullū qualitatis obtinet. Nucleus arcifachus & vitus, tenuium partium & exiccatorū citra morbum est medicamē. At postica nux, quam *auspessary* & *avellani* appellant, plus habet essentiae terrestris ac frigide. Itaq; autem interior tum cortex, tum plania, tum fructus appareat.

Caucalis.

Exalfacit & desiccant. Præterea vrinam ciet, muring ad repositionem condit.

Carpesium.

Simile est valerian, tum gustu, tum facultate, sed plus habet tenuitatis. Proinde magis ea viscerum obstructions extergit, vrinam mouet, renēq; calculis degeneratos expurgat.

Cenchrum, Nilum.

Primo ordine refrigerat. Exsiccat verō tertio exoluto, aut certē secundo intenso. Paululum etiam tenuitatis sortitur. Quibus de causis inter omnia frumentaria edulia minimum nutritiū largitur. Ventrem tamen desiccant, forisq; admodum in facculis, de nouo fomentum est eis, quæ citra morbum exiccare postulant.

Cedrus.

Cedrus specie est duplex: altera fruticosa iunilpero asimilis: altera arbor non exigua. Vtraq; est calida siccatq; temperaturæ tertiq; quodāmodo ordinis secundū vtrūq; Ceterū cedrea (vo- cedrea. catur ita cedri oleum) quantum enam ordinem attigisse videtur, admodum calida & tenuiū partium. Quare mollem viuētiā carnem promptē citraq; dolorem putrefacit. Nam mortuorū corpora exiccat, similisq; à corruptione tuerit, vitpote humiditates eorū depascens, at solida haudquāq; astringens corpora. Nec mirum videri debet, si cum tanta vi polleat, lendes, pediculos, nēas, aurūq; vermes interficere valeat: tum factum viuētem quidem interimat, extinctū autem eicia: quæ admodū & ipsum semē, si cōiundi tempore, pendendo ea circumlinantur. Proinde parus aduersum est medicamen. Quod etiā dentium foraminibus ināstilla, eos & confringit, et à dolore liberat. Externuat quotq; oculorū cicatrices, & visus hebetudini ad humorū crassitudinem orre medetur. Vtunur autem ea plebei, cum ad vulnera quibus inter tendendum à forficē il lara, tum etiam contra ipsarū scabiem & rui- nos, quos *hispasus* vocant. Ar fructus moderatiores exiunt, adeo vt comedī possint. Quāq; si liberalius vtare, capiti dolorem inferant, ardorēq; ac moriū in ventre percipies.

Centaurium maius.

Centaurium
maius.

Radix eius gustu acris similisq; astringens ap-
paret, cum leuicula quadam dulcedine. Quod
verò ad actiones pertinet, mentes provocat, vi-
uum factū exstringit, extinguitq; propellit. Pre-
terea vlcera glumiat, sanguinemq; reicientibus
prodest. Exhibentur autem eius binæ drachmę,
febribus quidem cum aqua; febri verò libe-
ris, cum vino. Quinetiam ruptis, convulsis, dys-
pnoæ, inveteratę tussis est auxilio. Eadem quę
radix, & succus ipsius præstat.

Centaurium minus.

Centaurium
minus.

Huius radix planè in efficax est: at caulis & fo-
lia, & flores, vtiliora sunt. Vnde enim in eis qua-
litas amara, paululum habet & astringens: ob
idq; admodum excicatorum est medicamen, ex
pers mordacitatis. Vlcera itaq; magna herbe i-
psius recensentes illis glutinatur: & vetusta, quęq;
egre ad cicatricem perduciqueunt, cicatrice ob-
ducuntur. Arefacta verò glutinosioris & defic-
icatoris miscetur facultatibus. Miscetur etiã
quę rheumaticis medentur affectibus. In qui-
bus ea medicamina præstantissima sunt, quę ve-
hementer deficiantia cum quadam astringente
nullam habent mordacitatem. Decoctum herbe
quidam infundit ischiadici, seu biliosi & cras-
sa extrahunt: nam & calis purgat. Succus eius præ-
ter dicta, cum melle oculis illinitur, mentisq; &
factum evocat. Iecinoris quoq; obstructions o-
primè apert, bonumq; durato leni est remediũ,
& impositum foris, & bibitum.

Cerafia.

Cerafia.

Quę dulcia sunt, magis alui subducunt, sed
minus grata stomacho sunt. Austeria verò, con-
trario modo. At acida, pituitosis excremento-
sisq; stomachis sunt idonea. Siquidem austeris
magis excitant, & nonnulli eis incidunt. Ipsius
arboris gummi, arterias asperas lenit, calculiq; ve-
xatos adiuuat. Cerasia.

Cerasia.

Exciccantis astringentisq; facultatis est, tum
arbor ipsa, tum fructus. Qui quidem si fumatur
humidis, magis ventrem subducit: si autem sic-
cus, magis eundem sistit.

Celitrum, Betonica, Psychotrophon.

Celitrum.

Betonica.

Psychotro-

phon.

Vim habet incidendi, vt gustus indicat: est e-
nim subacris & amariculus. Quare calculos re-
num frangit: pulmonem, pectus, & iecur expur-
gat: mentes promouet: comitialibus prodest: ru-
pta convulsaq; curat, omnibsq; ventris mor-
bis illa auxiliatur. Postremo acidum ructan-
tibus & ischiadici, bibita prodest.

Cecis, Galla.

Cecis.

Galla.

Quę emplacitis dicitur, admodũ acerbum
est medicamen, plerag; sui parte essentis terrens
& frigida, per quã deficcatur, repercutitq; fluxio-
nes. Eto verò tertij in deficcando, secundi autem
in refrigerando ordinis. Altera autem galla, fla-
ua illa & magna, laxaq; & ipsa deficcatur quidem,
sed tantũ minus, quantum minus acerbę qualita-
tis est participes. Cocta itaq; ipsa per se in aqua,
aut si magis astringere vis, in vino aliquo austero,
ac dein trita, cataplasma est non infirmum
sed inflammatis, prociidentis. Gallę combustę,
extinctę in aceto aut vino, sanguinis reprimẽ
di facultatem acquirunt.

Cera.

Inter primas quatuor qualitates mediũ quo-
dammodo obtrinet. Habet verò quiddam crassie
essentie & emplasticum. Quamobrem aliorum
medicamentorum materia exiit. Ipsa autem
per se ex genere fuerit debilitat cõcoquentium.
Habet tamen quiddam digerentis, caliditę po-
tentię, quę plurima melle inerat.

Cica, Ricinus.

Vt fructus eius expurgat, detergit, & digerit,
sic etiã foliũ, sed vnde quaq; debilius. Oleum qd
ex semine conficitur, calidius atq; tenuius est, q̃
cõmune oleum, ac proinde potentius digerit.

Cinnamomum.

Summę tenuit̃ est partũ, atq; ex tercio ordine
calfaciendũ. Nihil autem ex quę deficcatur, eorũ
quę panter calfaciũt, propter tenuitatẽ essentis.
At Cinnamomi, veluti imbecillũ est cinnamo-
mum.

Circæa.

Dioscorides ait radicem eius ex vino dulci
potam, secũdas purgare. Est enim boni odoris,
& calfacitoria. Semen autẽ eius in forbitione ex-
hibitur, ad lactis generationem conducit.

Cistius.

Frutex astringens est. Folia eius & parua ge-
mina trita adeo deficcant astringuntq; vt vlcera
glumina valeant. Sed flores efficaciores sunt, a-
deo vt cum vino poti dyenterias, ventris imbe-
cillitates, fluxusq; & humiditates persanent. Cata-
plasmatis rursũ illis, vlcus purulentosia iunnt.

Deficcant enim secũdo excessu. Hypocistis mul-
to est magis astringentior quã folia, admodũ effi-
cax remedium ad omnes fluxionum affectus.
Quin si quam parrem roborare consistit sit, quę
videlicet plusculo liumore exoluta fuerit, robur
ac firmitudine illi haud segnitur addit. Quo no-
mine antidoro ex viperis inditur.

Cistiflos, Ladaneum.

Primo excessu medicamen est quodammodo
completẽ calidum, ita vt secundum atringat, la-
dens etiã astringentis non nihil. Est præterea sub-
stantia tenuis, & emollens, necnon moderatẽ di-
gerens, concoquensq;. Peculiariter igitur ad v-
teri vicia est aptum. Diffuientes tamen capillos
remittet. Ceterũ alopecias & ophthalmias sa-
nare nõ potest, quod hĩ affectus valentiora me-
dicamenta desiderant.

Cissos, Hedera.

Ex contrariis facultatibus cõstat. Habet enim
quiddã astringentis substantię, quę terra & fri-
gida existit. habetq; nonnihil acris, quam calida
esse vel gustus comprobatur: præterea vi viridis sit,
obtinere etiam quandam aqueam & tepidam. Vi-
rida igitur folia in vino decocta, grandia vlcera
glutinant, malignaq; ad sanitate reducant. Igne
factas et vlceraiones cicatrice obfirmant: cum
aceto decocta lienosis opitulantiur. Flores autẽ
quodammodo validiores sunt. Succus medica-
men est exhericon: vetustas aurium fluxiones sa-
nat, necnon vetera vlcera tum aurium, tum na-
riũ. Lachryma hedere perimit lentes, plisq; su-
dat. Aded quippe est calida, vt etiã obsecrat ad y-
rat.

Climopodium.

Calfacit similisq; ficit in tercio ordine, estq;
subulium partium.

Clematis

Clematis.
 Huius folia acrem & adurentē obtinent facultatem, adeo vt lepras excoriet. Fuerit itaq; in quarti ordinis exalfaciētis initio. Dicitur etiā Clematis illa herba, quam nonnulli polygonoidem appellant: quæ tantum abest vt exluceret, vt profuans & dysenteris cum vino pota auxilietur; manūq; dentium dolores minger, ac dentium doloribus vteri in pello admoti sit vsui.

Cnicos.
 Cnici femine duntaxat ad purgationes vsuuntur. Estq; tertij ordinis exalfaciētium, si quia sibi eo vti vult.

Coccos nidius, Granum gnidium.
 Eripiunt quodq; purgat, sed acris est, adurentisq; facultatis.

Coccos baphicus, Granum tinctorium.
 Astringens similib; amarū possidet qualitatem. Vtraq; sine morbo desiccatur. Proinde ad ingētia vulnera cōgruit, & ad nervos vulneratōnes.

Coccyneles, Prunus.
 Prunū fructus ventrem subducit, tecens quidem plus, aridus minus. Minus tamen subducti no sunt Damasena pruna iis quæ ex Iberia advehuntur. Quin & ipse arboris fructibus proportionē respondet. Porro quorum in germinibus astringitio quædā manifesta inesse apparet, iis decoctis phlegmonæ sit columella aut tonsillis cōsistens idonee colluuntur. Iam verō agrestium fructus, evidenter est astringitios, venterq; sistit.

Colla, Gluten.
 Gluten quod ad libros preparant ex similiagine & garo, emplastica, concoctoriaq; facultata existit.

Colocynthe, Cucurbita.
 Humida & frigida est in secundo ordine. Quare si succus elusor, facit mistus, aurū dolori cōtracto ex phlegmone, est vtilis. Præterea resinguit sitim.

Colocynthus.
 Gustu amara est, vehementerq; purgatoria facultate prædita. Ipsi virentis succus intratus, ischiadici prodest.

Comarus, Arbutus: cuius fructus Vnedo.
 Fructus vni cum arbore acerbus est. Est autem hic & infensus stomacho, & capiti dolore concilians. Commi, Gummi.

Lachryma est concreta in truncis arborum ipsam aduentis: estq; euacuatoria & emplastica facultatis, asperitatisq; medetur.

Conia, Lixiuum.
 Omnium maximè absterforū exicatoriūq; est, quod ex cinere ficus & rithymalorum efficitur: terq; putrefaciētis est facultatis.

Conyza.
 Conyza & maior & minor ad similes sunt tū temperaturæ, tum facultatis: gustu amara & acris. Luculenter autem exalfaciunt, siue quis folia cum teneris ramulis parti inficer, siue vbi oleum incoxit, eo vtiat. Si quidē rigores per circuitum redeant, sanare tale oleū videtur. Con similes quoq; flores sunt facultatis. Quos quidem nonnulli ex vino propinant, ad educendos menses, atq; petiendū factum. Est & tertium conyze genus in locis humidioribus nascēs, vtriusq; illis grauiolentius & imbecillius. At primæ memoratæ calfaciunt & siccant in tertio ordine.

Coriannon, Corion, Coriandrum.

Hanc herbam refrigeratōriam esse Dioscorides prodidit, quod mista pani aut polente, illitāq; erysipelas curet. Quanquam certè exactum aliquod erysipelas, quod vtriq; inflammariū est, & flauum, laud vtrūq; ita cataplasma persana bitur: sed illud tantum quod refrigeratum iam fuerit. Coriandrum itaq; ex contrariis facultatibus constat, plurimum habens essentia amara, quæ reuulsum partium est & terrena. Nec parum etiam aquæ humiditatis obtinet, quæ tepentia est facultatis. His adiunctum est quoq; astringitio nis paucissimum. Quod autem longe à refrigeratione absterforiarum, hinc constat, quod clię radas siue strumias, cum lomento discutiat: id quod nullum refrigeratū medicamentorum facere est aptum.

Coronopus.

Coronopidis radix cæliacis prodesse creditur manducata.

Costus.

Leuissimam plantā, plurimam autē acrem & calidam in se qualitatē simul & facultatē obtinet, adeo vt etiam exluceret. Quare in quibus exalfacere partem quāvis, aut ex alto in superficie extrahere quippiam est opus, ad costū confugit. Eadem de causa vrinæ mensesq; provocat: & ad rupta, convulsa, & laterum dolores congruit. Porro ob amaritudinem quæ illi inest, latos lumbricos execat, maculāsq; à sole contractas exterit, illius cū aqua aut melle. Inest item statiosa quedam illi temperiei humiditas, petquam & venter excitat cum vino mulso.

Cotyledon, Vmbilicus Veneris.

Humidam, subfrigidam, obiscuē astringentē, ac leuiter amaram obinet facultatem. Vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaque phlegmonas & epelatos, & erysipelas phlegmonode perstat: affusantq; vetriculo cōmodissimum cataplasma existit.

Crania, Cornus.

Fructus eius admodum acerbus est, esuiq; aptus: proinde valenter alium restringit, quem admodum & mespila. Folia quoque & germina peracribia sunt gustui, valentēq; desiccant. Itaq; maxima vulnera glutinare possunt, potissimūq; durorum corporum.

Crambe, Brassica esculenta.

Desiccandi vim habet, tum esā, tum foris imposita: non tamen admodum acrem. Præterea & vulnera glutinat, & maligna vlcera sanat, phlegmonasq; iam induratas, atque ægræ solubiles, necnō erysipelas id genus, epinyctidāq; & herpetes curat. Habet quiddam etiam in se absterforium, quo lepras elicit. Porro semen eius potū, amarum cum sit, lumbricos perimit. Eadem facultate ephelidas, lentes, & quæcūq; modicam absterfionem postulant, adiuvat. Cineres caulū brassicæ desiccant vsq; uideo, vt causticæ facultatis participes esse videant. Quibus sanē cū ad pēmissis, cōtra inveteratos laterū dolores vntur. Sic nāq; valenter digerēs pharmacū reddit.

Crambe agria, Brassica agrestis.

Calidior sicciorq; & amarior q̃ domestica est: præstata agriquamobrem nec citra noxam intra corpus suscipi.

mitur. Extergit autem & digerit quàm domesticam etiam valentius.

Crambe thalassia, Brassica marina.

Non solum alium densit, subasla & subamara est arena, sed etiam est ad externos corpora vius idonea.

Cratægonos.

Fructus eius & acris gustanti est, & videnti frigidus, similis milio.

Crethmon.

Gustantibus salum est, cum paucula amaritudine: quamobrem vis eius est exicatoria & absterforia.

Cnithæ, Hordeum.

Primi est ordinis in exciccando & refrigerando. Habet etiam absterforis paucillum. Præstat in cibo fabis, quod flatuosam naturam exuat. Quan tunc cumq; enim fabas coxeris, flatuosa semper illis natura remanet. Sunt quippe crassioris essentia quam hordeū, ob idq; eo plus etiam alunt. At polenta multo plus hordeo deficcatur.

Crimnon.

Plus nutrit quàm polenta, sed ægrius concoquitur. Sorbino quæ ex eo conficitur, si ex æra fiat, leuiter ventrem sistit.

Crinos Liliū.

Lilij flos temperaturā multā obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, partim ex aqua, etiam tēperata. Quare quod ex eo conficitur oleum, digerēdi, emolliendiq; citra morum facultatem fortissime vnde fit, ut vteri fit duritibus aptissimū. Porro radix foliaq; per se trita, deficcant, abstergunt, & digerunt moderatē. Proinde quoq; ambustis competūt. Radicem ergo rostram, ac dein rosaceo contritam, ambustis quoad obducatur cicatrix, imponunt: cum sit etiam vlcerum aliorum remedium. Emollit præterea vteros, mensesq; provocat. Cæterū cum aut vitiligines, aut psoriam, aut lepram, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, cōmīscemus illi aliquid aliorum medicaminum validius extergentium, cuiusmodi est mel. Imposuimus verō etiam quandoq; & soliorū succū cum melle & aceto coctum. Eratq; respectu vtriusq; portio ipsius succi quincupla. Atq; ita cōficiēbatur in signe medicamentū ad omnia vlcera, quæ excecari absq; morū postulant.

Crocodilum.

Crocodilij semen acre est, atq; odoratum, vrinam mensesq; ciens: itaq; facultatem habet calidam, digerentem, & exicantem. Succus tum caulis, tum seminis, ut quæ similia sint facultatis, nephriticis adiuuat. Radix pectoris excretionibus valenter conducit. Trahit verō etiam per nares sanguinem.

Crocus.

Secundi quidem est ordinis exalfacientium, primi verō exicantium. Proinde concoquendi quoq; vim obtinet, adiuuante etiam ad id, quādam exigua attritione.

Crommyon, Cæpa.

Cæpa ex quarto est ordine exalfacientium. Essentia eius potius crassarum est partium. Vnde etiam hæmorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit, tum alopecia attrita pilos halcyonio citius restituit. Succus eius iis qui suffusi sunt, aut acie ocu-

lorum obtusam præ crassitudine humorum habent, inunctus prodest. Ob huius temperaturā tota cæpa flatuosa est, manducata. Itaq; quæ temperie succore sunt, minus flatuum generant.

Cyamos, Faba.

Medio critere cūcat, refrigeratq;. At caro eius paulum quoq; abstergentis cultus continet: sicut putamen iuonihui, adstrugeria. Porro vti edulium, flatulenta est, & coctis difficilis, si quid aliud: excreationibus ex pectore & pulmone idonea. Vt medicamentum verò, foris imposita, deficcatur innoxia. In podagricis ea sæpenumero vsumus ex aqua decocta, & in adipi suillo admixta. Ad nervorum tum constitutiones, tum vulnera, farinam eius cum oxymelte imposuimus. Ad eos quos ex ictu iam occupauerat phlegmone, cum polenta. Sed & testum & vberū aptum est cataplasmata. Quo quidem & lac ipsum exungitur, & puerorum pubes farina fabacea illitur, ut plurimo tempore glabra permanet.

Cyclaminus, Rapum, Tuber terre.

Abstergit, incidit, ora venarum aperit, attrahit, & digerit. Succus eius hæmorrhoidas refert, violentiq; ad secessum provocat, in fluxibus appositus. Sic etiam facultatibus phlymarum, strumarum, aliarum durities digerentibus cōmiscetur ac suffusis, cum melle illius cōpuit. Ad hæc per nares expurgat. Adeo vehemens eius facultas est, ut abdomine illino, subducatur alui, & suri per rimat. Tota autem radix succo imbecilliores est, quamquam & ipsa vehemens satis. Nam & menses siue e porta, siue apposita, evocat & aurigini prodest. Modus eius bibendi est drachmarum trium siue cum melicrato, siue cum passo. Cuius detergit, ac tū alopecias, epichidas, omniaq; exanthemata curat: necnon aurilio est leni indurato. Fructus etiam alterius cyclamini, quæ nonnulli cysanthemum non nominant, cum vino pluribus diebus potus, sanat benem, vrinæ mouet, atq; aluium subducens. Locos quoq; euicit, atq; asthmaticis auxiliatur. Quæritas eius gustui acris est & subleuata.

Cyminum, Cuminiū.

Cymini semen calfacit intertio ordine: vrinam mouet, extinguitq; flatus.

Cynobatus, Sentis canis.

Huius fruticis fructus non segnetè attritiōrius est, folia verō mediocriter. Langus fructus, arteriam vitiat.

Cyparissus, Cupressus.

Cupressi folia, germina, pilulæ recetēs et molles, magna vlcera glutinā in duris corporibus. Quare reficcandi vim habent absq; insigni acrimonia aut calore. Tāta enim ei acrimonia inest, caliditasq;, quanta satis sit deducendæ in alium acerbant. Proinde in alio latet in flaccidis presentibusq; affectibus humiditates, innoxie depascit & populatur. Sic enterocelicos iuuat, exciccat, roburq; addens corporis partibus præ humiditate laxans. Quidam ea vtuntur ad carbunculos, herpetesq; polente miscentes. Sunt qui ad erysipelatā vtantur.

Cyperus, Iuncus quadratus.

Cyper radices exalfaciunt pariter & secant absq; mordacitate. Itaq; vlcetibus inueteratis mis-

culis

rifici profunt. Habent etiā quippiā stringens: quapropter viceribus item oris cōueniūt. Quin & incidunt vim quampiam illis inesse testificā- dum est, quā & calculos exterrunt, & vrinā men- scipi provocant.

Cypros.

Huius arboris folia summisq; germina habet in se quiddā digerē cum aqua substantia mo- dicē calida: habentq; & strictionem quandam ex terrena substantia frigida. Itaq; eorum deco- cto quidam ambusta fouent, necnō igneus phle- gmonas, carbunculosq; Nam absq; molestis sic- cant. Sed sponte oris in ore viceribus comman- sa folia commodissima sunt.

Cynsus.

Cynsi folia digerendi facultatem obtinent, a- quea & temperata mistum, vt malua.

Conion, Cicura.

Quod extremē sanē refrigeret, omnes norū.

Conos.

Coni fructus, quem cōcalum & strobilum ap- pellant, viridis totus, habet cum humiditate a- maru dinem quampiam & acrimoniam. Proin de purulentis, & iis quibus facili expuere est o- pus, accommodatur. Quod esculentū est, nutri- mentum est coctū difficile & validum. Vt medi- camen autem asperitū leniendū cōgruit, si prae- maceratus in aqua, omnē acrimoniam exuerit. Nam reliquū sic minus mordax efficit, in medio calidē & frigide qualitatē cōsistens, ex aqua & terrea mistū subtile, minimū participās aēre.

Lagopus.

Facultatis est desiccantis, adeo vt fluxus alui probē exiccet.

Lathyrus.

Et succo, & purgatoria vi rithymalum refert: nisi quod semen apparet dulce, licet maximē sit purgatorium.

Lampfane.

Esa quidem succos prauos procreat. At illita, abstergendi, digerendiq; nōnullam facultatem sortitur.

Lapathum.

Digerit moderatē. At oxylapsthem nonnihil etiā repercutit. Manifestē ipsorū semen stringit, ita vt dysenterias & dyarthrosas peraneat.

Limouium.

Eius fructū, vipote acerbū, ex vino exhibent celiaci, dysenterici, & hæmoptoici. Iam & profluuiū muliebri. Satis est oxybaphi mēsurā.

Lichen.

Lichens curat, extergentem, modicēq; refri- gerantem, ac siccaniem obtinens facultatē. Na- scitur enim in humidis rorēq; persulse saxis.

Leontopetalon.

Radix eius digerendi facultatē, & exiccandi, calis ciendiq; in tertio ordine possidet.

Lepidium.

Ex quarto est ordine exallicaentium, simile prorsus nasturtio, nisi quod minus desiccet.

Leucas.

Acrem possidet qualitatē exuperantē tem- peraturam verō calidam, siccamq; In tertio quo- dammodo ordine.

Leucanthion.

Huius radix amara est, ac proinde incidit, ex-

iccāq; in tertio ordine. Cassiā autē in primo.

Leucolion.

Extergit, ac tenuium est partium: plus tamen flores, ac præcipue qui sunt siccorei: hi quippe & oculorū crassas cicatrices exnuant. Præterea mensis eorum decoctum mouet: secundas, & partum emortuum elicit, bibulūq; facit abortum, maximē amarum cum sit. Quod si eius vi- res multa missione aq; frangi nūtur, erit contra phlegmonas, & difficilia vlcera, cōmodum medi- camen. Semen etiam eiusdem est facultatis, ra- dicēq; similiter, nisi quod hæc sunt crassiorū es- sentie, terretq; magis. Cum aceto tamen lienes induratos perfrangit.

Leuce, Populus siba.

Ex aqua, tepida, & terrens extenuata essen- tia consistat. Quomobrem & abstergentis facul- tatis est participes.

Libanotis, Thus.

Excalcact secūdo ordine, desiccet primo: ha- bet quoq; strictionē pusillam. Cortex eius euil- denter attingit, desiccāq; in secūdo ordine. Est autem crassiorū partium quā thus, & minimū acrimonie possidet. Quare in hæmoptoici, sto- machici, celiaci, & dysenterici eo vinunt. Ro- mus eius siccoris & calidioris est facultatis quā ipsum thus, adeo vt ad tertium vsque excessum perueniat. Habet verō etiam & absterforū quid- dam. Vnde expurgare & implere oculorū vice-

Libanotides.

Libanotides tres existunt: vns sterilis, dus fru- ctum ferentes. Omnes verō emollient, digerentis, incidentis, & abstergens sunt facultatis. Suc- cus tum radici, tum herbæ mistus mellis, obtu- sam oculorum sciētiā ab humorum crassitudine emendat. Decoctū eius, quam rorem marinum appellant, potum, regio morbo auxiliatur.

Lignys, Fuligo.

Fuligo omnis exiccatoria est, ob idq; terrens essentia, habens quidam etiam ignis est pusil- las reliquas: ratione quærum tenuium est par- tium. Cæterum quæ speciatim in ea differētiæ sunt, ex pro vīa matens eueniunt. Thuris fuli- gin e vinunt ocalibus medicamentis permista, iis videlicet quæ d oculos etiamq; humorem phlegmo- ne tentatos, & qui adhuc fluxione affiguntur, exulceratiue sunt, accōmodantur. Nam & illa ex purgat, & carne implet. Terebinthina etiā myr- rhæq; fuligo molestis caret, nō secus quā thus- rix. Sed styracis quodammodo valentior est. Ma- gis etiam picis liquidæ. Quæ adhuc magis cedet. Porro acrioribus vinunt ad vitis superciliorū vocat phle, & crosos angulos oculorum, & ci- tra phlegmonem humidum.

Libyiticum.

Libyitici radix & semē, ex genere excalcacien- tium sunt, adeo vt & mēsa ciant, & vrinas pro- vocent, stardiq; discutiant.

Linospermon, Lini semen.

Flatuosum est esum, etiam si frangatur. At cal- facit quidem quodammodo in primo ordine, hu- miditatis & siccitatis in medio existens.

Linozostis, Mercurialis.

Ea vinunt omnes s d sibi ductiones alui dun- taxat. Quāq; etiam admota, valenter digerit.

Lonchitis.

Lonchitis.

Radix eius, quæ semen gerit triangulare, vrinam ciet. Folia eius quæ scilopédæ similis est, viridia quidem, vulnera glutinant: sicca autem, & cum aceto epota, lienes induratos perficiant.

Lycium.

Lycium.

Arbor est spinosa, ex qua lycium fit, medicamen id liquidum, quo ad sugillata, sedis, orisq; phlegmonas, vlcera cancras, herpes, putredines, vlcera cõtumacia, aures pure fluentes, inter 10 trigines, & paronychias vituntur. Est enim facultatis exicatoris, compositum ex duobus generis substantiis, altera quidem tenuium partium, digerente atq; calida: altera terrestri & frigida, ex qua attritionem exigui obinet. Cæteru digerit & siccatur in secundo ordine: in calore aut medius est proximum. Est porro lycium Indicũ ad omnia valentius.

Lysimachios.

Lysimachios.

Superantem attritionem sortitur, per quam omnes sanguinis fluxus reprimuntur pota, tum cataplasmati modo admoda.

Lychnis.

Lychnis.

Semen eius calidum & siccũ est, secundo quo dammodo, aut etiam tertio ordine.

Lotos herba.

Lotos herba.
Tryfolium.

Lotos domestica, quam trifolium nominant, vt medioenter concoquendi, sic etiam exsuccidit vinũ possidet, in caliditate digestiariq; coniugio media quodammodo existens. Semen 20 gressis loti, secũdũ est ordinis calfacientium: habetq; nonnihil abstersorium. Porro Aegypti loti semen etiam in panes fingitur.

Lotos arbor.

Lotos arbor.

Non ita multæ attritionis qualitas est parti cept: sed & tenuium partium est, & exicatoria. Cuius licet ramenta profusio muliebri, dysenteris, capillorum effluvio, cæliacisq; affectibus accommodant, aut in vino, aut in aqua concocta.

Macer.

Macer.

Cortex est qui ex India advehitur, gustu multum acerbo, cum leuicula quadam acrimonia odorata. Constat aut ex mista essentia, pleraque terrena frigida, pauca verò calida & tenuium partiu. Itaq; valenter desiccatur, astringitq; ob idq; cæliacis & dysentericis medicamentis miscetur, in tertio exsuccantur cõsistens ordinis in caloris frigorisq; discrimine, neutru insigniter præstas.

Malabathrum.

Malabathrum.

Malabathi folium cum spica nardi simillimũ 30 obinet facultatem.

Malache, Malua.

Malache.

Malua.

Agrestis quidẽ, digerens paululũ & emollientis leuiter est facultatis: hortensis verò, quanto plus habet & quæ humiditatis, rãtò facultate imbecillior est. Fructus eius rãtò validior est, quanto & siccior, Cæteru Althea omniũ efficacissimẽ digerit.

Mandragora.

Mandragora.

Refrigerat tertio excessu. Nonnihil tñ pomis caloris atq; humiditatis inest. Vnde soporẽ conciliant. Radicis cortex nõ tantum refrigerat, sed etiam siccatur. Quo deo includit, imbecillimũ est.

Marathrum, Forniculum.

Marathrum.

Forniculum.

Calfacit in tertio, desiccatur in secundo ordine: prouidet lac gignit, auxiliatur suffusis, mensisq;

& vrinæ promouet. Radix & semen hippomarrathi, amplius quàm domestica siccatur: quare & ventrem videntur sustinere. Possunt etiam & callos frangere, curare ictericos, mensisq; & vrinæ mouere. minime tamen lac gignere.

Mastiche.

Candida quidẽ & Chia, astringit simul emolliatq; Proinde stomachi, ventris, intestinorum, se 40 conisq; inflammationis compent, vtputa secundo ordine exalfaciens & succans. Nigra verò, quæ Aegyptia dicit, magis desiccatur, miniusq; astringit, quàm obrem aprior est ad ea quæ validiorem digestiorem per halitum postulant. Porro oleum, quod præcipue ex Chia conficit, similis est cum mastiche facultatis.

Melanthium, Nigella.

Exalfacit & siccatur in tertio ordine, estq; amarum, atq; tenuium partium. Quare catari hos 50 statim luto admotum, atq; assidue olfactum: status porum extinguit: lumbricos enecat, non esum modò, sed etiam foris applicitum: lepras, claudos, atq; myrmecias extent: orthopneam iuuat, & menses provocat. In lumina verò, vbi sectione, extersione, desiccatione, exalfactione est opus, præstantissimum id remedium existit, Meliorum.

Quiddã habet astringens, digerit tamen, concoquitq; Copiosior enim in eo est substantia calida quàm frigida.

Mel.

Desiccatur exalfactiq; secũdo ordine: ac detegentem facultatem obinet. Porro cõstium, minus acre absterforiorisq; redditur. Itaq; ad sinuorum vlcera glutinationem eo vituntur. Cæterum quod mel est amarũ, mistæ facultatis existit. At Saccharo, quod ex India & Felici Arabia conuoluitur, cõstet in calamis, estq; mellis species, minus certè nostrate dulcius, sed similes ei vires obnens, quod ad abstergendũ, desiccandũ, & digerendũ pertinet. Quatenus verò nec inimicum ventriculo est, vt nostras, nec situm ad ferens, eatenus ab illo substratum distert.

Melisophyllon, Citrago.

Marrubio similis est facultate, sed plurimũ ab eo vincitur. Quàm obrem nec vitur eo quispiã, cum larga marrubij copia suppetat.

Mespilũ, Tricocon, q; tria grana gerat.

Fructus eius admodum est acerbus, vixq; edi possit, ventrem extreme cõccens. Quin & in germinibus & folijs acerba hæc qualitas nõ pauca reperitur.

Medion, Tnfolium odoratum.

Radix quidẽ eius austera est, omnẽq; fluxionẽs cohibet. At semẽ tantũ abest vt id moliarur, vt etiam menses cteat: nimirũ tenuium partium cum sit, & facultate incidendi præditum.

Mecon, Papauer.

Cum quatuor eius insignes species sint, facultas omnium existit refrigeratoria. Cæterum sat 60 in semẽ, medio critter somnũ conciliat, visu can didum: prouidet panis ipsum uispermunt, ac melis maceris tunc estant. At ex syluestribus, eius qd rheas dicitur, quia flos ipsius celeriter defluit, semen validius refrigerat: itaq; nequaquã eo quis innoxie solo vti possit. Illius verò quod calicem inciden-

Mastiche.

Melanthium.
Nigella.

Meliorum.

Mel.

Saccharum.

Melisophyllon.
Citrago.Mespilum.
Tricocon.Medion.
Tnfolium odoratum.Mecon.
Papauer.

Rheas.

incidentem sustinet, atrum exiit semen, medica mentosumq. atq. impensè refrigerat. Quod autem longiorem emittit calcem, medicatissimū primum est, admodūq. refrigerans, idq. omnibus partibus sua. Adco quippe refrigerat, ut stuporem ac mortem etiam inducat. Est enim ex quarto & vltimo refrigerantium ordine.

Mecon terranā, Papauer cornutum.

Vim habet incidendi extendendi. Itaq. radix eius in aqua ad demidium decocta, hepaticos affectus adiuuat. Folia & flores sordidis & contumacibus vlcibus profunt. Sed ea reticere oportet vlcibus iam repurgatis: alioqui sanam carnem excedent.

Mecoo Heracleia, Papauer Herculeum.

Semen habet pituitam expurgans.

Melea, Mālus.

Mālus non omnis eiusdem oaturæ est, sicuti nec eiusdem fructus. Succus siquidem, cortices, foliaq. arborū, enam inter se dissident. Itaq. si acidiota austeriorque sint, illis vulnera glutinare posuit, tum in phlegmonarū initio repercutere influxum, ac ventriculū exolutum & languidum roborare: at aquosioribus, mediocres phlegmonas incipientes & gliscētes remittere. Quod autem plurima pomis omnibus recrementina frigidāq. insit humiditas, hinc liquet, quod nullus eorū succus seruari possit: verū acetiant cor rumpantq. viuierit. Solus enim cydoniorū & struthiorū (quæ propter attritionem vehementem, ceteris minus sunt humida) succus coctus cum melle durare potest: per se autem minimè.

Melea Persice, Persica mālus.

In germinibus & foliis vincentem habet quā litarem amarā. Proinde folia eius trita, & super vmbilicum posita, lumbricos enecant: etq. digerens medicamen. Fructus humidior est, & temperie frigidior.

Melea Armenice, Mālus Armenica.

Fructus humidior frigidiorq. est, utruq. secundo quod ammodo excessu.

Melea Medice, Mālus Medica, Citrium.

Quod in fructu semen amplectitur, terri est ordinis resiccantium atq. refrigerantium. Cortex deficcatur quidem in excessu secundo, non tamen frigidus est, sed temperatus, aut paulo infus. Caro eius pariter crassū succū est, & pituitosa, frigidāq. Semen amarū est, digerereq. & exiccare potens, secundo quod ammodo ordine a temperatis recedens. Folia exiccandi & digerendi vim obinent.

Meum.

Radices eius sunt calidæ tertio excessu, in secundo sicca. Proinde vrinas mentesq. movent. Quod si liberalius iurant, capiti dolorē conciliant. Milax tracheia, Milax aspera.

Variis clauiculis suis arboribus circūvoluitur. Folia eius & actia gustū, & vtrū calida existūt. Milax leuiss.

Quodammodo iam dictæ similes vires obtinent. Morea, Morus.

Mori fructus maturus quidem aliu subducit: immaturus verò, ubi auerit, restringit admodum. Quare ad siccantes affectus est cōmodus. At maturorū succus, propter attritionē quam

habet, ad stomacica medicamēta est vtilis. In radicis cortice purgatoria vis cum quadā amaritudine exuperat, ita vt lutos vermes enecet.

Myagros.

Oleum quod ex semine ipsius funditur, emplastica facultatem obinet.

Mycetes, Fungus.

Frigida humidāq. admodū planta est, quare proximè ad enecantē facultatē accedit. Et sanè inter eos sunt qui interficiāt, maxime qui ex natura mistam habent qualitatē pumilaginosam.

Myle.

Radix eius contrahentis est facultatis: quam cum farina lolæ apertā vultū sanare ait Diosc.

Myofotis, Auricula muris.

Deficcatur secundo ordine, ceterū nullam evidentem caliditatem fortitur.

Myrice, Tamarix.

Abstergit & incidentis est facultatis: absq. per spicua delicatione. Habet verò etiam astringentem nonnullam. Igitur cum aceto decocta prodest lieni iudurato. Sapor etiam dentium dolores. Fructus & cortex non paucam possident astringentem. At cinis myricæ, admodum deficcatoris facultatis est, plurimam habens abstergentis vim, astringendi pauxillam.

Myriophyllon.

Adco exiccat, vt vulnera glutinet.

Myrtus.

Radix eius est odorata & dulcis, mēsciq. mouet, necnō thoracem atq. pulmones purgat. Cal facit itaq. secundo ordioe, cum partū tenuitate.

Myrtine, Myrtus.

In hac planta viuic terrene & frigidum. Habet tamen aliquid tenue & calidum. Quare valenter deficcatur. Porro quod ramis & truncis adnatis tuberosum, quanto siccus ceteris partibus est, tantò deficcatur & astringit velicētus. Folia item arida viridibus plus deficcant. Itaque omnes partes eius restringunt, tum fortis imposta, tum intro assumpta.

Moly, Ruta syluestris.

Radici habet oigram, & florem lacteum. Vis eius tenuium partium est, & calida tertio ordine: vnde crassos humores deficcatur, digeritq. & vtriam mouet.

GAL. DE SIMP. MED. FACULT. LIB. VIII

de simplicium medicamentorum facultatibus, liber VIII.

Nardu itachys, Spica nardi.

Alfac ex casso tertio, deficcatur secundo cōpleto. Constat ex astringenti, acri, & leuiter amara substantia. Quare radix iecori & ventriculo cōuenit, & pota, & admoda extrinsecus. Vrinam ciet: morius stomachi sanat: ventris, capitis, & thoracis fluxiones deficcatur. Valentior rament est Indica, quæ nigrior quā Syriaca existit. Nardus Celtica, hoc est, Gallica.

Ad omnia est in becculis dictis, præterquam ad provocandam vrinam. Nam calidior illis est, sed minus astringit.

Nardus oreca, hoc est, montana.

Plurima in Cilicia nascitur, sed prædictis infirior.

Narthex, Ferula.
Semen eius calfacit & tenuat. Medulla autem astringit & est pariceps. Unde hæmopticois & catarrhis conuenit.

Napy.
Calfacit desiccantq; ordine quarto.

Narcissus.
Eius radix desiccatur adeo, vt vel maxima tendonum vulnera glutinet. Habet verò quiddam absterforium & attractorium.

Nerua, Poterium.
Desiccatur citra morsum, aded vt incisus nervos glutinare credat, ac præcipue radices eius.

Nerium, Rhododaphne.
Foris quidem illius in fructu, digerendi vim obtinet. At si intra corpus sumatur, virulentus homini & pleriq; pecudibus est.

Nymphæa.
Tum radix eius, tum semen, desiccandi citra morsum vim habet. Itaq; ventris profluua, semineq; immodicè profluens sistit. At cui adest candida radix, ea & muliebri medetur profluuiio, ex vino nigro & austero epota. Vtraq; autem abstergendi quandam vim possidet. Quare maceratur quidem aqua, sanant albos: liquida verò pice, alopecias. Ad lux tamè aprior est ea, cuius radix est nigra.

Xanthion.
Semen eius digerendi vim obtinet.

Xyris.
Tenuium partium, attractorix, digerendi & desiccandi facultatis est, cum radix, tum multò magis fructus: qui quidem & vrinam ciet, & lene induratos sanare potest.

Xyphion, Gladiolus.
Xyphij radix, maximè altera quæ superior est, attrahit, digerit, desiccantq;.

Oë, Sorbus.
Astringentem vim obinet, at multò q̃ mespilus imbecilliorè. Proinde fructus eius gustui iucundus est, minuscq; ventrem q̃ mespilus cõtrahens.

Oenos, Vinum.
Ex secundo est ordine calfacientib;: sed quod admodum vetus est, ex tertio: sic vt mustum ex primo, Caliditate proportionè respõdet siccitas.

Olynthi, Grosul.
Acrem facultatem sortiuntur. Cõsti itaq; duos tumores discutiunt: crudi myrmecias & thy mos eliciunt.

Oslonium.
Desiccidi vim obtinet cū astringitione: idèq; propinatur ad rupta.

Olyra.
Mediam tritici & hordei naturam possidet, tam vt nutrimentum, quam vt medicamentum, Onagron.

Onagron.
Huius radix arefacta vinosum quiddam redolet, maximèq; ad vini facultatem accedit.

Onosma.
Acri & amara substantia constat. Cuius folia in vino posita, factum extinguerè expellerèq; creduntur.

Onobrychis.
Rarefaciendi vim obtinet vim obtinet. Proinde folia eius virentia illita, phymata digerunt: arefacta verò, & cū vino posita, itragurias iauant: sudorèq; eliciunt, cum oleo inuncta.

Ononis.

Radix eius calfacit quodammodo in tertio ordine, abstergitq; & nõnihil incidit. Itaq; nõn tantum vrinam provocat, sed & lapides frangit, & crustas detrahitis. Præterea ad dolores dentium, oxycrato in quo fuit cocta, colluuntur.

Oxos, Acerum.

Ex frigida calidèq; substantia cõstat: vtraq; tam tenuium partium. Verum calidam frigidam exuperat. Desiccatur porro in tertio gradu.

Oxyacanthos.

Vt specie, sic facultate hęc arbor piro syluestri est similis. Cæterum piri syluestris fructus, prorsus acerbissimus est: oxyacanthos verò, & tenuium est partium, & nõnihil incisorem sortitur: estq; rubescens & rarus. Qui quidè affectus omnes fluxionum colubet.

Opos, Succus.

Cyrenæicus quidem reliquos omnes caliditate & tenuitate exuperat: idèq; omnium maximè per halitum digerit. Quamquã sanè & ceteri admodum calidi sunt, & spirituos. Porro licet complures etiam sint alij succi, qui effluunt, incisa radice: ob excellentiam tamen sic dicitur Cyrenæicus, & Medicus, & Syriacus.

Origanus.

Heracleotica quidem efficacior est onitide: agressus tamè est valentior vtraq;. Omnes verò incidendi, extenuandi, calfaciendi, & exicciandi obinent facultatem, in tertio nimirum excessu. At Tragoriganus etiam quippiam astringit.

Orobis, Erbaum.

Desiccatur quidem excessu secundo intenso, calfacit verò primo. Porro quatenus amaritatis est particeps, cætenus incidit, extergit, argo obstructiones expedit. Cæterum si sumatur copiosè, sanguinem per vrynas evocat.

Orobanchæ, Eruangina.

Siccat frigidèq; temperaturæ est, in primo ordine. Oryza.

Habet astringentium quippiam, quare medicritur aluum sistit.

Orchis, Testiculus canis.

Radici eius bulbose & gemine, vis inest humida & calida, gustu nõnvisq; dulciscula. Cæterum maior radix multam habere videtur humiditatem excrementitiã, & sanientis: quapropter epota venerem excitat. Minor verò, cum ad calidius & siccus vergat, tantis adest vt ad coitum stimulet, vt etiã cohibeat, & reprimat. Eduntur bulborum more, totis.

Orchis Serapias.

Siccat vitra primum excessum. Quare nõn ita est ad venerem cõmodus. Oedemara illius discitur. Vlcera sordida expurgat. Herpetes sanat. Siccat multo amplius desiccatur. Nam putrefacta conuulsiõq; restituit vlcera, & subastringens cū sit, ventrem sistit ex vino posita.

Ofris.

Amara est, & aperienti vim obtinet. Quare iecur obstructum adiuvat.

Panacratium.

Radix huius, stillæ similem gustum refert, & vires, multò tamen imbecilliores. Ea itaque pro scilla, vbi hæc nõn adest, vtruntur.

Paliu-

Paliurus. Folia eius & radix ad se perispicue astringunt. ut fluxum ventris cohibeant, & adeoq; digerunt, ut mitiora phytmata eueant. At fructus, raptim incidendi vim possidet, vt calculus velut ea comminuat, & pectoris pulmonisq; excretionibus auxiliatur.

Papym. Oxycrato vinoq; macerata, recentia vlcera glutinat, maxime in circulo circumposita, vt materia sananna medicamina excipiens. At vbi vlla fuerit, medicamen exicatorium existit, vt charte combusta cinis. Hoc tamen cuius papryi est infemior. Panax Heraclum.

Panax Heraclum. Ex hoc conficitur opopanax, radicibus & caulibus eius incisio. Porro opopanax ipsum cum molli, tum digerit. At calcit quidem in tertio ordine, in secundo autem siccit. Cortex radiis ex calcit etiam & siccit, minus tamen q; succo. Ceterum abstergens nonnullam facultatem sortitur, Quare eo vtuntur & ad nuda osia, & ad vlcera contruaria. Sufficenter siquidem quae talia sunt, carum procreant. Fructus calidus est & ipse, ac mensibus mouendis accommodatus. Panaces Asclepium.

Panaces Asclepium. Minus est calidum supra dicto panace. Quare floribus eius & semine mella mista, ad vlcera, phymata, & phagedaenas vtuntur.

Panax Chironium. Praedicto similem facultatem obtinet.

Paronychia. Paronychias & fauos sanat, digerit ea quae discuti postulant. Calcit enim & calcit in tertio ordine, sitq; tenuium partium, & sine mordacitate. Pentaphyllum.

Pentaphyllum. Radix eius delicat vehementer, nimirum in tertio ordine, citra mordicationem tamen. Minus siquidem habet cum acrimonia, tum conspiciet caliditate.

Peplos. Succo habet similem tithymalia, cum in aliis, tum quia purgat cru illi.

Peplum. Eriam fructibus hic succo habet vt tithymalia, validumq; non tamen admodum vtile. Radix eius videtur supervacua. Semē vtile est, & sanulentum, pepi semini similiter purgans.

Pepi. Piperis radix vires cocto similem obtinet. Fructus nuper germinatus, longē exilit piper: quare maturo et humidius. At fructus qui veluti omphax est, piper album est, nigro quidē acris. Nam illud iam veluti superassatū videt. Verumq; tamen valenter & calcit, & calcit.

Persea. Persea folia modicē astringūt, ita vt nonnunq; sistere queant sanguinem erumpentem.

Peridymanos. Peridymanos, Volucrum maius. Fructus eius & folia adeo vehementer incidunt & calcit, vt si diutius bibantur, vinam sanguinolentam efficiant: principio tantum vrinam mouentia. Foris cum oleo illa etiam exalta ciunt. Lauant & lenosos, & difficulter spirantes.

Competens mensura est drachmā vnus cum vino. Desiccant etiam semen, & (vt quidam tradunt) si liberalius bibantur, sterilitatem inducit.

Peristereon. Vinū habet haerentius desiccantem, vt & vulne ra glutinet.

Petalites. Ex tertio est ordine delicatissimus: quamobrem ad cacoethē & phagedaena vlcera ea ahibent.

Petrofelinum. Eius semen est gustu acre, cum amaritudine. Sic & in operibus calidum, vni cum incidendi effectū. Hinc mēses & vinas astatim provocat, statimq; discit. Calcit itaq; & siccit in tertio ordine. Tota herba similem, sed ambuculorem possidet facultatem.

Peucedanum. Succus eius admodum exaltat & digerit, estq; tenuis & incoctus partium. Quare omnibus nervosis affectibus creditur opulari: tum morbis in pulmone & thorace ex transiudine humorū oris. Nec verō intra corpus sumptus duotaxat, sed olia etiam prodest. Ad huc saepe fortiorum denum dolores, caurau impossit, protinus mingunt. Quinetā induratos li nes iuat. Ad quae omnia, licet etiam vti radice, quae & squamas celerim ab osibus detrahit, & arida illa vlcibus contumacibus remediū est opimum: minus quidem quam succus exalt faciens, nempe in secundo ordine iam completo, delicatissimū verō in tertio incipiente.

Peganon, Ruta. Agrestis quidem in quarto ordine exaltat, domestica verō in tertio. Est autem non solum gustu acris, sed et amaro. Ex quo sanē digerere, in ciderēq; crassos & lentos humores potest, atq; mouere vrinā. Quin & tenuium est partium, statimq; extinguit. Quare ad inflationes competit, ac venens appetentiā inhibet: digeritq; atq; excoctat stremē.

Pissa, Pix. Siccā quidē siccit & calcit secundo ordine. At plus siccare valetq; calcare. Humida verō cōtra, plus calcit, & siccit: habetq; partium tenuitatem nonnullā, quā asthmaticos & purulentos adiuuat. Satis est autē cyathū linxisse mensuram mellis mixt. Abstergendi etiam cōcoquendi, digerendi quādam vim habent, veluti in gustu leuem amaritatem & acrimoniam. Sic leprosis vngues eximunt mixt cum cera, lichenisq; detergunt. Coquant item duos & crudos tumores, caraplastatis indit. Atq; ad ea omnia, humida valentior est: arida verō glutinosa & vulnibus aprior.

Pisselcon. Ex humida pice efficitur, genere quidem et si mīle, sed essentia tenuioris.

Pistacum. Fructus eius quodammodo tenuioris essentiae est, subinarum quid & odoratum retinens. Obstructiones itaq; omnium viscerum aperit, sed praeipue iecoris.

Ptyides, Picearum fructus. Astringit, similisq; acris est, cum amaritudine quadam. Vnde thoracis pulmonisq; expulsiōnibus confert.

Ptyis, Picea. Piceae cortex vntercentem facultatē astrictoriā foretur, sic vt intertinges finet, ventremq; potius sistat. Sed & ambusta cicatrice inducit. Tēg

Toda topex.

cortex illi adfinitus est, viribus tamen modera-
tioribus. Vtriusq; arboris folia glutinant vlcera.
In conifolis & cortice validior facultas est, a-
deo vt cū molestia mordicat. Fuligo q̄ ex dictis
colligit, ad pilos superciliorū est cōmoda, itēq;
ad angulos oculorū erosos, lippientes, & lachry-
manes. Pityusa.

Pityusa.

Viribus est similis thymalo, succāmq; forti-
ter similem, & similiter purgat.
Platanus.

Platanus.

Humidioris frigidiorisq; est essentia, non ita
multo quā symmetra. Proinde folia viridia tri-
ta & illata, non obfcurē nascentes phlegmonas
adiuuat. Cortex & puluī magis deficcantē vim
obtinēt: vt ille quidem in aceto coctus ad den-
tium adhibeat dolores: puluī vērō cum adipe,
ad vlcera ambusta. Virandus est puluis foliis ar-
boris infidens. Alioqui si attrahatur spiritu, ar-
teriam offendit, valenter siccat, exasperansq;
Necnon vocem lēdit, sicuti & auditū & visum, si
in oculos aut aures incidit.

Polygonon, Centinodia.

Polygonon.
Centinodia.

Vt attritionis est parriceps, ita in eo frigidū,
aqueum vincit: vt secūdo excessu refrigeret, aut
enim initio terit, itaq; xstuant ventriculo, cry-
spelan, atq; calidū phlegmonis, si illiatur frigi-
dum, auxiliatur. Suffit præterea vniuersas fluxio-
nes: qua ratione videtur exiccatoriū. Quare ad
herpetas, vlceraq; bonum remediū est. Quin-
etiam cruenta vulnera pluinat, acriūq; puri &
viceribus confert. Stitididū & stranguis affe-
ctus exhibitum, vrinā mouet, vt Dioscorides
ait. Fœminæ ad omnia mas præstat.

Polygalon.

Polygalon.

Eius folia modicē atringūt, videnturq; si bi-
bantur, lac generare. Itaq; superauerit in eo cali-
dum humidūq;.

Polygonatum.

Polygonatum.

Attritionis parriter & acrimonia habet quip-
piam, cum fastidiosa quadā amaritudine. Quare
nō vique adeo est viciū. Sunt qui radicē eius illi-
nant vulnerib; Alij eo nauos in facie detegunt.

Polemonium.

Polemonium.

Tenuius paruum est, & deficcandi vim obti-
net. Vnde quiddā radicē eius cum vino ad ischia-
das, dysenteriam, hememq; in duratū propinant.
Poliū.

Poliū.

Amarū est ac modicē acre. Obstructionē itaq;
omnis viscera liberat, vrināq; & menses pro-
mouet. Ar viridē magna etiā vulnera pluinat,
& maximē species eius fruticosa. Aridum sanat
rebellia vlcera, præcipue quod minus est.

Poliū minus.

Poliū minus.

Acrius & amariū est hoc quā maius, adeo
vt ex tercio sit ordine deficcantiū: ex secūdo
autem completo calfacientiū.

Polycnemom.

Polycnemom.

Deficcat & calfacit secūdo excessu: itaq; &
ipsū vulnera pluinat.

Poramogeton.

Poramogeton.

Astringit & refrigerat similiter polygono, sed
essentia eius crasior quā polygōni est.

Polypodium.

Polypodium.

Dulcē simul & austerū vincentē obtrinet quali-
tatem, vt facultatis sit citra morisū admodum
excantia.

Prasum, Marrubium.

Prasum amarum cū sit, leuē ac licet em libe-
rar obstructionē, thoracem & pulmōem expa-
gat, ac menses promouet. Sed illius etiā deter-
git & digerit. Calfacit itaq; secūdo excessu com-
pleto: siccāt autē tercio inuente; aut completo.
Succo eius ad aciei oculorū claritatem vnu-
tur cum melle: per narēq; aurigiem purgat,
ipsūq; ad inueteratos auris dolores adhibent.

Propolis.

Modicē quidē extergit, ceterū validē trahit.
Est enim essentia tenuis. Excalfacit porro ordinē
secundo completo, aut tercio incipientē tercio.

Parnice.

Flores eius tendē sternutatoris vim obli-
nent: Sugillata & ceteras ecchymoses digerit. Vi-
ridis porro calfacit secūdo ordinē, tercio autē
siccat.

Prelas, Vimus.

Vini foliis quādoq; recentū vulnū congluti-
uimus, confidētē atringentem simul & ab-
stergentem ineffe eis facultatem. Ceterū in cor-
tex magis amarus est, attritionisq; magis: itaq;
dum aceto & lepras sanat. Quōd si viridis circū-
ligetur vulneribus, ea glutinare potest. Radices
etiā eandem vim obtinent. Quarum decoctio
sunt qui perfundant fracturas, quæ callo obdu-
ci desiderant.

Pteris, Filix.

Radix eius latius lumbricū perimit, si in me-
licrato pondere drachmarum quatuor bibatur.
Quare ipsam partem viuam necare, mortuum
autem expellere, non est mirum. Stiquidē ama-
ra existit, paulatim attritionis obtinet. Vnde val-
de vlcera deficcāt, citra morisū tamen. Similem
ei vim habet Thelypteris.

Pycnocomum.

Radix, fructus, & folia eius, digerendi attra-
hendiq; obtrinet facultatē: acia nimirū cū sint.
Folia eius phymata furunculōsq; discutunt. Fru-
ctus valentior est: nam & palos, & tela infixa, ad
extimam cutem elicit. Radix ad supradicta est in-
firmior, ceterū suauem bilem expurgat.

Pyrethrum.

Radix eius causticā possidet facultatē, qua-
dentes refrigeratos mingit. Porro ad rigores
ante periodum cum oleo conficit: stupidosq;
& resolutos adiuuat.

Pyros, Trincum.

Foris impositum, primi est ordinis calfacien-
tium: ceterum nec siccare, nec humectare ma-
nifesto potest. Habet vērō etiā quiddam lento-
ris, obtrahentisq; naturæ. Quod ex eo amyllum
conficitur, ipso est tum frigidus, tum siccus.
Quod ex pane fit cataplasma, magis digerit, q̄
quod ex tritico, salis & fermenti ratione. Fer-
mentum quipē vim attrahendi habet, digerendi
q; in alto residet.

Rhamnus.

Deficcat & digerit excessu secūdo. Refrigerat
in primo cōplero, aut secūdo incipiente. Proinde
herpetes sanat, & erysipela nō magnopere ca-
lida.

Rhaphanis, Radicula.

Excalfacit excessu tercio, deficcāt vērō secūdo.
Agrestis in vtroq; efficiatior est. Semen etiā effi-
caciū est plāta. Ei enim ineffe digerēdi facultas.

Rheum.

Rheum, Rha.

Quiddam habet terrestris frigidum, seu iudicio est astrictio: adiuncta est illi tamen quedam caliditas. Siquidem si mandatur pulcillum, sub-acre conspicitur. Est enim aere et cuiusdam substantie subtilis particula: quod indicat laxitas, leuitasque. Quare cōvulsis, ruptis, orthopneæque prodest. Sic quoque luentia & lichenia cum acetosillitum perianat. Astrictiois ratione, sanguinem expuentibus, ceriacis, & dysentericis confert.

Rhetina, Resina.

Rhetina,
Resina,
Mastiche.

Resinæ omnes desiccant & exsiccant. Lenticinæ tamen (quam vocant maitichen) primæ de bentur partes. Nam præter quod paucula ei melle est astrictio, qua stomachi, ventrisque & iecoris imbecillitatibus, phlegmouibus etiam accommodatur, delicat insuper citra mordacitatem. Minimū enim acris est, & maxime tenuium partium. Inter ceteras persertur terebuthina, manifestam quidem, non tamen similiter atque mastiche, astrictio- nem possidens. Verū adiuncta habet quandam amaritudinem, per quam magis quam mastiche digerit. Pereandem etiam vique adeo abstergit, ut poras sanat. Quin etiam in profundo residet, magis ceteris extrahit, ob maiorem tenuitatem partium. Attamen pinea, & hac etiam magis strobilina, aciores ea sunt, sed non magis tamen digerunt, attrahuntve. Media inter has sunt picea & abietina. Habet porro & emolliens quiddam re- rebuthina. Secundum locum habet in emolliendo lenissima, sicuti cyparissia in ipsa acrimonia.

Rhodos, Rosa.

Rhodos,
Rosa.

Ex aqua substantia calida, duabus aliis qualitanibus mista, astringenti videlicet & amara, composita est. Flos tamen magis, quam ipsa rosa, est astringens: ac proinde etiam exicatorius est.

Rhodia rhiza, Radix rhodia.

Radix Rhodia

Tenuium partium & digerens est facultatis. In calidando vero secundi ordinis est censenda, aut certe tertij incipiens.

Rhododaphne.

Rhododaphne

Tota sua essentia venenū est & hominī & ple- risque pecoribus. Porro calicis excessu tertio: pri- mo autem desecat.

Rheza, Mālum granatum, siue panicum.

Rheza.

Mālum grana-
tū panicum 70

Omne mālum granatū astringentē qualitate sortitur: non tamen in omnibus ea exuperat. Nam inter ea quædam sunt acida, quædam plus dulcia quam austera. Pro ratione quarum qualitatū vincendum, suos usus præstat. Porro acini astringen- tiores, & exicantiores sunt succo. Sicuti & his putamina, quæ siccā dicuntur. Ad similem il- lis vim habent flores qui cyrini dicuntur.

Rhus, Sumach.

Rhus.

Sumach.

Ad desiccandum & astringendū coriarū hæc planta fructuosa vruntur. Medicis in visu sunt fru- ctus eius & succus, austere admodū qualitate. Exaceat magis tertio ordine, refrigerat vero in secundo.

Rhypos, Sordes.

Rhypos.

Sordes.

* Sordes quæ a gymnasiarū statuis æreis abra- ditur, digerendi emolliendique vinū obriunt: quæ autem ab eis qui in palestra exerceantur, quantū accipit pulueris, tantū ab ea est diuersa: atque lisc sordem vocat Greci nominant. Prior igitur, quæ ob contractam ruginem, acrior etiam existit,

cruda phymata digerit. Secunda autem, optimā est phlegmones miliarium remedium. Constat enim ex puluere repercutiente, oleo emolliente, ac denique sudore & sordibus digerentibus.

Sagapenum.

Liquor est calidus & tenuis partium, sicuti & alij liquores. Sed ab ætheris quādam obtinet, qua oculorum cicatrices expurgat, extenuatque. Suffusionibus etiam & hebetudinibus oculorū, quæ a crasse humorum proveniunt, non ma- lum est medicamen. At planta ex qua provenit, ferula aserilis, imbecilla est & inutilis.

Sampfyction, Maiorana.

Tenuium partium & digerentis est facultatis: desecat enim & calfacit ordine tertio.

Sampfyctum,
Maiorana.

Saprotes phus, Cares lignorum.

* Cares eorum præcipue lignorum quæ par- ticipia sunt astrictiois & abstercionis, ut vi- mus, expurgat, impletque vlcera humida.

Cares ligo-
rum.

Sarcocolla.

Mista vim habet emplastica quādā sub- stantia, & paucula amara. Itaque citra morium de- siccatur, ac proinde glutinæ vlcera valet.

Sarcocolla.

Saryion, Triphylon.

Humidū calidumque est temperie, ob idque dul- ce. Recrementitiam tamen & statuofam humi- ditatem possidet. Quo circa ad vlcera incitat.

Saryion.

Triphylon.

Selinon, Apium.

Aded calidū est, ut & vrinam & menses cieat. Flatus quoque digerit, & magis semen quā her- ba. Oreoselinū & hipposelinū similis vis existit. Verū Hipposelinum imbecillius est, oreoseli- num valentius.

Selinon.

Apium.

Seris, Cichorion.

Holus est subamarum, & magis quod agreste est. Id namque est frigida & sicca temperaturæ, se- cundo excessu. Ceterū domitica magis quā agrestis refrigerat. Porro utraq; astringens qua- litas est particpe, ut chondrilla, quæ est etiam seceos species.

Seris.

Cichorion.

Seriphium.

Abinthio est rum specie, tū gustu simile. Ex- teram non aquæ astringit: sed calfacit valentius, necnon amaritudinem quādam salsuginosam refert, ventriculūque est infestum: magisque abstin- tiis lumbricos enecat. Calfacit itaque secundo or- dine intensio, siccat autem in tertio.

Seriphium.

Seseli.

Aded exsiccant tū radix, tū fructus, ut moueat vrinam. Est etiam tenuium partium, ut & comitialibus morbis, & orthopneis competat.

Seseli.

Sesamum.

Viscosum & pingue cū sit, emplasticū etiam existit, emollientique, ac modice calidum. Oleum quod ex eo conficitur, & ipsius lixuræ decoctū, eiusdem sunt facultatis.

Sesamum.

Sesamoides magnū.

Semen eius ut helleborus purgat, similiterque abstergit, calfacit, & desecat.

Sesamoides ma-
gnū.

Sesamoides albiū.

Huius semen nonnullam acrimoniam forti- tur, vehemensque est amarum. Exsiccant itaque, rumpit, extergitque.

Sesamoides al-
biū.

Sideritis.

Nonnihil abstergit, sed plurima pars eius est sideris.

Sideritis.

humida & mediocriter frigida, cum exigua astringitione, qua phlegmonē sedat & glutinat. Sideritis autem Achilles, distam superans astringitione, sanguinis eruptioni, dysenteriz, & muliebri profluuiō est aptissima.

Sicyos, Cucumis.

Maturus, tenuioris essentiz est: immaturus, crassioris. Sed incidendi & abstergendi facultas eis incit. Quare & urini mouet, & corpus splendidum reddit. Sunt enim humidi frigidiq; quasi in secundo ordine. At arefacta tum radix tum semen, siccant primo, aut secundo incipiente, ordine: magisq; abstergunt, q̄ ipsius molonū caro.

Sicyos agrios, Cucumis agrestis.

Tum ipse, tum eius succus, quem elateriū vocant, aut ex foliis & radicibus pressus, peruenit ad medicaciones exilit. Elaterium itaq; menses cit, faciūq; perimit applicatū, seu alia omnia amara & tenuium parium. Summē siquidē est amarum: calfacitq; in secundo ordine, ac proinde etiam digerit. Sic enim eo angustia laborantes in vngūt quidam cum melle aut oleo veteri. Bonum item est regio morbo affectis insulsum cum lacte in nares similiter dolores capitis sanat. Radicis atq; foliorū succus similem, sed imbecilliorē facultatem sortitur. Radix etiam abstergit, digerit, emollitq; Cortex potentius deficcit.

Silphium, Lasiopodium.

Silphij liquor calidissimus est. Necnon folia, caulia, & radix, strenuē etiam sunt calida: omnia tamen statulente magis essentiz sunt, ac proinde difficilia concoctū. Foris autem impolita corpori, efficaciora, liquor præcipue, admodum trahentē facultatem possident. Attamen & excrecentias extirpat, & quandam liquandi vim possidet.

Silfon.

Calidus & subamarus exilit. Vnde urini mouet, concoquit, menses pro vocat, omnēq; viscum obstructions referat.

Sion.

Quantum gustu aromatiū est, tantū etiam excalfaciens facultatis est particeps. Quare & digerit, & urinum mouet, & calculos renū frangit, & menses euocat.

Sisaron.

Sisari radix cocta stomacho grata est, & urinam mouet: secundo ordine excalfaciens, cum amantudine & astringitione leuicula.

Sisybrium.

Tenuium est parium, facultatisq; digerentis, calfacientis, & exiccantis in tertio ordine. Quidam semen cum vino exhibent singultuentibus, tormināq; parientibus.

Sisybrium, quod Cardaminem vocant.

Si siccum sit, tertij est ordinis calfacientium & exiccantium: si humidum, viridēq; secundi.

Scandia.

Agrestis est olus, subacre & amarum. Calfacit itaq; & siccit secundo ordine intenso: valenter 60 mouet urinā: viscerāq; liberat obstructionsibus.

Scilla.

Admodum quidem incit: calfacit autem secundo ordine. Porro præstat etiam astringam fumere, quod sic eius vehementia exoluat,

Scolymos.

Radix eius, si quis illam in vino cocta bibat, graueolentem urinam abvndantē elicit, factoriq; alarum medetur. Succus enim eius est purgatorius. Calfacit porro secundo & completo ordine, aut tertio incipiente: siccit verò secundo.

Scordion.

Nonnihil amarum obrinet, & scerbum, & acre: ipsiusq; acrimonia, alij acrimoniæ est permixta. Expurgat igitur, excalfacitq; viscera: menses urinaq; pro vocat. Conuulsa, rupta, doloresq; laterum ab obstructione & frigore obortos, epotum sanant: illud viride, magna vulnera glunna: purgat fordida: in isperumq; aridū, contumacia ad cicatricem perducit.

Scorodon, Allium.

Deficcit & excalfacit excessū quarto. Porro opusoscorodon, aliū agreste est, domestico valentius.

Scorodoprasion.

Virgultu & odore, sic viribus inter allium & porrum medium naturam sortitur.

Scorpiodes.

Excalfacit ordine tertio: deficcit secundo.

Smilax, Cactus arbor.

Facultatis est venenose.

Smyrta, Myrrha.

Secundi est ordinis calfacientū & exiccantiū. Vnde capitis vulnera glunna. Inest illi amaritas non exigua, qua siccum & lumbrosus enecat, enititq;: habet etiam & abstergendi vim moderatam. Quare ocularibus miscetur medicamentis, & his que ad veterem tūsam, atq; antrationem administrantur.

Smyrta Boice, Myrrha Borotia.

Vim habet calfaciendi, fundendi, emolliendi.

Smyrnum.

Ex eodem genere cum apio est & petroselinio: fueritq; apio quidem validius, imbecillius verò petroselino. Itaq; & urinas & menses prorat: calidum siccūq; tertio ordine.

Sonchus.

Dum viridis est, aqua terreæ essentia constat, vtraq; leuiter frigida: nam & astringitōnis eius iudam est particeps, & manifestē refrigerat, tū illitus, tum estus. At arefactus, terrefactū redditur, modicam asciscens caliditatem.

Sparganium.

Deficcantis est facultatis.

Sparrum, Genista.

Sparti quo & vires alligatū tum fructus, tum succus virgari, valentē trahendi vim possidet.

Staphilinus, Pastinaca.

Satiua imbecillior, agrestis ad omnia potiorior est. Urinas mensēq; pro vocat, abstergitq; nonnihil, cum herba quidē tota, tum vel maxime semē & radix.

Strachys.

Gustū est acri & amaro, tertijq; calfacientium ordinis. Vnde menses rationabiliter pro vocat. Facit tamen abortum, atq; secundas elicit.

Strabe.

Fructus eius & folia astringunt citra mordacitatem, deficiantq; in tertio ferē incipere ordine. Quare decoctum eorū iniicitur dysentericis, aut ribisq; pure fluenribus: quod etiam magna vulnera glunna, præcipue cū vino atro & austero. Valenter

Sicyos.
Cucumis.

Cucumis agrios.
Lasiopodium.

Silphium.
Lasiopodium.

Silfon.

Sion.

Sisaron.

Sisybrium.

Cardamine.

Scandia.

Scilla.

Scolymos.

Scordion.

Scorodon.
Allium.

Scorodoprasion.

Scorpiodes.

Smilax.

Smyrta.
Myrrha.

Smyrta Boice.
Myrrha Borotia.

Smyrnum.

Sonchus.

Sparganium.

Sparrum.

Genista.

Staphilinus.

Pastinaca.

Strachys.

Strabe.

Valenter enim deficiat omnes præter naturā humi-
ditates. Folia viridia illa erumpentē sangui-
nem supprimūt, suffusio nibus oculorū ex ista
medentur. *Stechas.*

Stechas. Amara est & mediocriter subastringens, cum
nimis ex terrena essentia frigida exigua, & ex-
ternata altera terrena copiosa, consistit. Quare ob-
structione liberat, extenuat, exergit, roboratq,
& viscera & vniuersum corpus.

Stranotes.

Stranotes. Aquaticus quidem humida & frigida faculta-
te est terrestris verò, non nihil habet astringentis.
Proinde & vlcera glutinat.

Struthion.

Struthion. Radix eius est acris, calida, siccaque tempera-
mentum, ex quarto propter modum ordine exalsa-
cientium. Sed & abstergit, & irritat: proinde &
sternutationem provocat.

Syrax.

Syrax. Excalcificat, emollit, concoquit. Quamobrem
rursi, cararrho, pituitæ distillationibus, caucedu-
mibus auxiliatur. Tum mensis, seu potum, seu
admotum prolicat. Combusti eius fuligo, thuris
fuligini est similis.

Syca, Ficus.

Syca, Ficus. Arida excalcificat ordine primo aut secundo
incipiente, habentis partium ténuitatem quan-
dam: quare rubercula dura concoquant, digne-
runtq, tum ipsæ, tum ipsarū decoctum. Verum
vbi magis concoquere consilium est, miscenda
est farina triticea: vbi verò plus digerere, hordea-
cea. Panis horum in medio. Porro quæ sunt pin-
gulores, magis possunt concoquere: quæ acro-
res, magis tunc extergere, tum digerere. Ficus vi-
rides, imbecilliores sunt. Vtræq, tamen & sicca
& humidæ aluum subducunt.

Sycc, Ficus arbor.

Sycc, Ficus arbor. Calidæ, tenuisq, partium temperaturæ est,
sevi indicant tum liquor eius, tum foliorū suc-
cus. Valenter enim calcificat uterq. Itaq, non mor-
dica rantū, aut vehementer absterget, sed & vl-
cerat, & ora vasorum reterat, & verrucas extir-
pat. Quin & vim purgatoriam habet. Porro la-
chryma & succus agrestis fucus, quam capsicā
vocant, ad omnia, q̄ sanus, valentior est. Ceterū
ipsarū furculatæ ad calidi sunt, atq, tenuius par-
tum, vt carnes bubulas duras, si coquendis adhi-
cantur, friabiles ac teneras reddant.

Symphytum petreum.

Symphytum petreum. Habet quandam vim incidens, quæ collectū
in thorace pulmoneq, puræ expurgare potest: ac
simul contrahendi facultatis est particeps, quæ
est cūonibus sanguinis auxiliatur: estq, humi-
dum, ac non immodicè calidum: vnde & dulce
apparet, atq, odoratu rucundum. At hæc, man-
sum sitim exinguit, & arteriæ sanat asperitates.
Laquet igitur ipsum etiam & digerere, & cōstin-
gere posse. Vnde & enterocæcus bibitur, & ad
conuulsæ & ruptæ cum oxymelæ bibitur.

Symphytum onagrum.

Symphytum onagrum. Simile dicto vim habet. Ceterū non vide-
tur dulce, neq, odoratū. Est verò secundū visco-
sitate mōdicioremq, tollit simile.

Spondylon.

Spondylon. Fructus eius acris & incidens est. Itaq, ad astring-

ma & conuulsalem morbi aptum est medicamē.
Prodest & aurigini. Atraxid vltra iam dicta, si-
stularū callos tollit, si sit circumfusa. Floris suc-
cus, ad diuturniora auris vlcera cōueniēs repo-
nitur.

Schinus, Lentiscus.

Schinus, Lentiscus. Ex aqua essentia leuiter calida, & terrena fri-
gida non pauca, consistit. Deficiat itaq, secundo or-
dine cōpleto, aut tertio incipiente, in caloris fri-
gorisq, medio cōsistens quodammodo. Astringit
autem ex æquo, moderatèq, omnibus parti-
bus suis. Succus bibitur & per se, & cum aliis me-
dicamentis, quæ dysenterias & alui affectus san-
nant. Quin & ad sanguinis expunctiones, flores
muliebres, necnon sedis vulvæq, prociendias
idoneus est, vt pote ad hypocoistida non nihil ac-
cedens propè.

Schinus anthos, Schini flos.

Schinus anthos, Schini flos. Modicè calcificat, modicèq, etiam astringit, nec
planè à tenuitatis natura est alienus. Quare vni-
nam & mensis mouet, siue ponit, siue fomētū
adhibuit. Prodest enī iecoris, stomachi, & ven-
tris inflammationibus. Ceterū magis astringit
radix, quāq, flos etiam astringat omnibus
partibus suis. Proinde medicamentis quæ hæmo-
ptoleis exhibentur, miscetur.

Schizoneleja, luncus leuis.

Schizoneleja, luncus leuis. Quidā oxyfchenos, alius oligofchenos elici-
tur: graciliores duriorq, oxyfchenos, crassiores la-
tiorq, oligofchenos. Fructus huius somnū con-
clat. Oxyfcheni autē dux sunt species: altera
sterilis, cuius nullus vsus in medicina: altera quæ
fert semē somni cōclatū, sed minus q̄ oligo-
fcheni. Vtrūq, si cum vino bibatur, ventris su-
cus defecit, & muliebri profluuiū rubrū sistit.
Est itaq, eorum temperes composita ex terrena
essentia leuiter frigida, & aqua leuiter calida.

Terminthos, Terebinthus.

Terminthos, Terebinthus. Coetæ, folia, & fructus eius astringunt, & se-
cundo ordine excalcificat: vnde enī quod siccū,
liquet. Porro fructus aridus propinquus est ter-
tio ordini defecantiū, calcitici valentior. Qua-
re & vniuersam provocat, & lenibus auxiliatur.

Tenion, Beta.

Tenion, Beta. Nitrosæ facultatis est particeps, quæ tum digne-
rit, tum extergit, & per nares expurgat. Ceterū
colta nitrositate exuit, evaditq, leuiter digerens.
Ad detergendū tamen digerendūq, validior est
Beta alba.

Tenurium.

Tenurium. Incidit & tenuit est partū: quare lienes san-
nat. Ad exiccat quidem in tertio, calcitici autem
secundo ordine.

Tephra, Cinis.

Tephra, Cinis. Ex partibus cum terrenis, tum enī fuliginis
sunt, quæ & remouet sunt, & cum aqua in qua macer-
ant prius fuerint cineres, excolant consistit. Pro
matōre tamen cōbuste differentia, cinis etiam
peries variat. Quare haud scio qua ratione Dio-
scorides astringere cineres omnes proderit, quæ
cum ficulneus cinis eiusmodi omnis qualitatē
sit expertus, nimirū ipsa arbore nulla parte sui acer-
bani qualitatē reddente. At ex acerbis lignis
cōfectus cinis, non parū quidem astringit: memi-
ni me eo aliquando sanguinis suppressis eru-
pisse. Verū nullus vnq, ad rale vn fuligine au-
deat. Siquidē hic acrimoniæ plurimū, vtriusq, fa-

Calx. cultatis obrinet, mixta absterfioni. Est & calx cineris quæ dâ species, ceterâ tenuioris essentia, quæ ex lignis fit. Porro elota, medicamen est contra morbum desiccans, magis si bis terve lauet. Ceterâ si marina aqua abluta sit, admodum digerit.

Telephium.

Telephium. Exiccandi & detergendi facultate est, non tamen ingruere calida, sed iorian secundi ordinis. Desiccatur etiam secundo infuso tamen, aut tertij principio. Proinde ad putrida ulcera cognat, & cum aceto vitæ vtilitatem sanatur.

Telus, Farnumgracum.

Telus. Calfacit secundo ordine, desiccatur primo. Proinde de seruitus phlegmonas irritat, quæ verò minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo planat.

Tithymali.

Tithymali. Tithymali omnes vincentem habent acrem, calidamque potentiam, cum amaritudine quadam. Validissimus eorum est liquor: deinde fructus & folia postremo radix. Hæc aceto in cocta, sanat erosorum denique dolores: liquor in ipsa foramina inditur. Ceterâ si aliam partem cõtingat, cõtinuò ad vitæ viceratq; illam, ex quarto exiit calfacientium ordine, quod ad exvrentia pertinet. Sic pilos quoque, & verrucas, & myrmecias, & pterygia, & thymos, cum oleo invectus succus evellit: detergit lichenas & pforas, propter amaritudinem: necnon ulcerum plagedenica, anthracode, & gangræode, quia valenter calfacit & desiccatur, aliquando iuvare poterit. Ad hæc fistularum callos eximit. Prædicta omnia folia & fructus prætare possunt, sed imbecillius. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos, vtili assolent. Celerime enim ab illis in veriginem acta, ac semimortuos reddunt, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum septem sint tithymalorum genera, valentissimus est quæ characiæ marisq; nominant: & forma nuncupata myrfinites: & qui in petris nascitur arborefens. Deinceps qui phlomo assemilis est, & cyparissus. Deinde marinus: ac deniq; helioscopius. Pro portione autem facultatis ipsorum, & cinis & luxuriam existet.

Tragacantha.

Tragacantha. Emplasticas facultatem similem gummi obtinet, necnon obfusorem acridinem. Ac sanè similiter illi desiccatur.

Tragion.

Tragion. Tragii folia, fructus, lachrymæq; trahentis digenerisq; sunt facultatis. Est verò & tenuis partium, & facultate in principio tertij ordinis calida. Stipites, & infixæ corporibus extrahit, lapides frangit, menses movet, diachmæ pondere potum. Porro in Creta sola nascitur, lentisco simile. Alterum minus, cuius folia scolopendrio similia sunt, visitur quidam in locia, sed non parum habet facultatis astringentis, ut & ad fluxionum affectus conveniat.

Tragoriganon.

Tragoriganon. De hoc in sermone de origano diximus.

Tribolus.

Tribolus. Ex humida essentia modicè frigida, & sicca non medio critere, ceterâ similiter frigida cõstat. Unde contra phlegmonarum generationes, & cõtra oculos influxus cõgruit. Porro terebrius ipsius fructus, cum tenuis sit partium, potus renu calculos cõteret.

Tripolion.

Radix huius est acris, & facultate calida in tertio excessu.

Triphyllum.

Calfacit & siccatur in tertio ordine, ut bitumen, cui odore est simile. Proinde potum lateris dolores ab obstructione naros sanat: & urinâ mensis quæ vocatur. Trehomanes.

Eadem præstat quæ adiantum.

Trychnon, Solanum, Strychnon.

Excellenti quidem astringit, refrigeratq; in secundo ordine. At eorum quæ efusi non sunt, vnum quidem dicitur Halicacabum, fructu habens rubrum, acino vix persimilem. Alteru verò est fruticosum, à cõciliando somno Hypnotici appellatum. At tertiu, quod ad insaniam adigar, omnes Manicini nominant. Halicacabû igitur, fructu fertiendi vineæ idoneu, compluribusq; facultatibus quæ ad iecur, vesicam, & renes accommodantur, miscetur. Solani verò hypnotici cortex radicia, si cum vino bibatur, somnu accersit, drachmæ pondere sumptus, exulens succo papaveris similis, nisi quod imbecillior, vix potest tertij refrigerantiu ordinis, cum ille sit quartus. Huius solani semen urinâ cendi vim habet. Si plus tamen duo decim corymbis hauseris, detinentiam accersit. Quod reliquu est ex solanis, positu est ad medicaciones intra corpus invile. Nam si quatuor eius drachmæ offerantur, mori inferent: si pauciores, insaniam. Vna certe innoxie fumit: aliud tamen vtile præstat. At foris corpori illitu, vlcera maligna persanat. Verum ad talia, radicia cortex præterit, desiccans secundo ordine iam cõpleto, aut tertio incipiente, secundo autem incipiente refrigerans.

Hyacinthus.

Radix eius bulbofa est, desiccans primo ordine: secundo autem, aut immo tertij refrigerans. Fructus leuiter extergit astringitq; vnde & regio morbo laborantibus exulberat in vino, ordine quidem tertio desiccans, at in medio caloris frigorisq; consistens.

Hydnon, Tuber terre.

Substantiam habet vincenti terrestrem quidem, sed cum paucula tenuitate permixtam.

Hydropeper.

Non vsquendo calidum est, ut pipere. Viridis ipsa herba cataplasmati malar impostata, sugillata & tumores induratos digerit.

Hyoscyamus, Altercam.

Cui semen atrox est, insaniam ac soporem inducit: cuius verò medio critere fluxum, propinquu ei obtinet facultate. Vtrig; tamen fugienda sunt, ut deleteru & inviles. At cui semen & flos est candidus, sanitan idoneus existit, ex tertio quodammodo refrigerantium ordine.

Hypericum.

Calfacit & siccatur, essentia tenni, adeo ut mentes vniusc; provocet. Illu vixide, ad cicatricem omnia perducit vlcera. Siccum cõfusumq; si inspergas, mollis, humida, & purulagiosa sanabis. Sunt qui & ichthidicis bibendum propinæ.

Hypercon.

Refrigerat tertio ordine, parumq; à papanere distat.

Hypoglosson.

Radix eius & succus emolliendi vim possidet.

Hyssopus.

- Hysopum.** Desiccatur & exsiccatur ordine tertio, sed tenuius est partium.
- Phaci, Lentis.** Valenter astringunt, mediūque tenent inter calorem & frigiditatem. Desiccatur tamen in secundo ordine. Ipsum itaque earū corpus, siccatur & fistitalium. Ceterū decoctū prouocat. Proinde prior aqua abicitur, ubi retentionis causa exhibetur.
- Lenticula palustris.** Pacos, Lenticula palustris.
- Phaleria.** Humida frigidaque temperatur existit, utrinque ex secundo ordine.
- Phaleria.** Succus, semen, & folia eius, commode potari creduntur contra vesicæ dolores, cum in se habeat tenue quiddam & calidum.
- Phalangium.** Phalangium. Sic dicitur, quod moris à phalangis auxilio fit. Est autem facultatis tenuius partium, & excantis, quare tormina lenit.
- Phlomis.** Phlomis, Verbascum.
- Phlomis, Verbascum.** Huius herbe duæ sunt species. Quædam enim foliis est candida, quædam verò nigra. Rursus, albæ quidem mas est, cuius folia ambustiora sunt, minora, cuius maiora visunt. Est & alia phlomis agrestis, flores habens aureos & luteos: necnon alia quam phlomis appellat. Priorum duarū radix acerbâ gustu est, & fluxionum affectibus prodest, atque adeo dentium doloribus: quanquā folia digerendi vim habent. Similiter & aliarum folia. Omnium quippe folia desiccandi & detergendi vim possident.
- Phoenix, Palma.** Astringitior facultatis est particeps omnibus partibus suis. Igitur ramorū succus austerus est, ex aqua substantia tepida, & terrea frigida consistit. Similis facultatis est eius cerebrū, cuius aptū. At fructus, & maxime dulcis, non paruum obtinet caliditatem. Qui quidem cum edendo fit, magno est vsui, non tantum foris impositus, ubi roborare, desiccare, contrahere, sparareque est consilium, sed tanquam cibis sumptus, & simul cum aliis, & perse. Porro teneris palmæ germen, eandem cum eius cerebro facultatē sortitur. At cortex astringit quidem, ac plus quam dicta omnia desiccatur: * vrpote minūm habens humiditatis. Quare ad vlcera putrescentia, laxatos articulos, hepatis & vetriculi imbecillitates, eo intus & foris administrato vtuntur. Radix citra morisum desiccatur, cum nonnulla astringitione.
- Phormion.** Phormion. Phormion semine cum melle ad leucomara vtuntur. Sed spicula etiā extrahere creduntur, veluti & ipsa herba. Quare tenuium partium, & attrahendi digerendi potenter obtinet.
- Phu.** Olorat quodammodo eius est radix, nardo viribus similis: ad plerique tamen infirmior. Mouet autem vrinam, vt nardus gallica.
- Phycos, Alga.** Phycos, Alga. Ex mari exemptus & vires, siccatur refrigeratque in secundo ordine: habet enim quiddam modice acerbum.
- Phyllitis.** Phyllitis. Acerba cum sit, meritis & diarrhasas & dysenterias epota iuuat.
- Phyllon malabaricum, Folium malabaricum.** Phyllon malabaricum, Folium malabaricum. Nardo similem posidet facultatem.
- Chaibanum.** Chaibanum. Succus est plantæ ferulaceæ, molliēdi & digerendi vi: calfacit enim ordine tertio incipiente, aut completo secundo: siccatur verò secundo incipiente.
- Chamaedrys.** Chamaedrys. Vincentem habet qualitatē amarā. Est & quodammodo acris: quare merito lienes colligat, vrinam & menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, viscerumque obstructions re-purgat. Calfacit itaque & desiccatur tertio ordine: plus tamen calfacit quam siccatur.
- Chamaecissos.** Chamaecissos. Flos eius admodū amarus cum sit, iecur obstructū aperit: daturque & coxendice laborantibus.
- Chamaelea.** Chamaelea. Vincentem habet qualitatē amarā: quare admodum sordida vlcera, & que maximis indurata sunt crustis, purgare cum melle est potens.
- Chamaeleuce.** Chamaeleuce. Calfacit quodammodo tertio ordine, siccatur primo.
- Chamaelon.** Chamaelon. Nigri quidem radix, letale quiddam obtinet. Quare foris vsus eius ad ea quæ absterisionē postulant, administratur. Præterea digerentibus & emollientibus pharmacis commiscetur. Etenim siccatur tertio ordine, calfacit autem secundo abs-luro. At ubi radix quod uō sit perine acris, potui datur cum vino austero, mensura oxybaphi, laborantibus aqua inter cutem.
- Chamaepitys.** Chamaepitys. Magis amara est quam acris: quare abstergit, purgatque viscera, magis quam calfacit. Proinde aurigiosis, & quibus facili iecur obstruitur, bonum remedium est. Quin & vrinam, & menses ducit rum pora, tum illita cum melle. Viridis vlnera magna glæinat: vlcera putrescentia sanat: durities vberū discutit. Est enim in siccando tertio ordine in calfaciendo, secundi.
- Chamaesyce.** Chamaesyce. Abstergeti simul & acrem vim possidet. Itaque acrochordonas & myrmecias, caules eius teneriores intriti, quique ex eis profluit liquor, aufferunt. Cum melle crassas oculos cicatrices deter-gunt: hebetudinem visus à crassitie orram, adiuuant: sicuti & suffusionem principia.
- Chelidonium.** Chelidonium. Admodum extergit & calfacit. Succus eius ad acutū visum est commodus. Quiddam radice eius ad auriginē ab obstruktionē iecoris orram, in vino albo cum aniso propinant. Mansa etiam confert dentium doloribus. Chelidonium minus, cum maiori sit acris, celeriter cutem exulcerat, vnguentis scabros euicit. Succus eius per na-res purgat. Hæc itaque siccatur & calfacit in quarto incipiente ordine: at chelidoniū maius in tertio.
- Chondrilla.** Chondrilla. Eiusdem ferē est facultatis cum feri: nisi quod amariūcula est, ac proinde siccantior.
- Chondrus.** Chondrus. Nutrimētū quidem est optimū, sicut triticū. Vt medicamen autem, emplastrū est facultatis, tēperie tritico similis, nisi quod viscosior existit: quare ratione plus illo nutrit. Est porro hoc semē

veluti materia quædā idonea excipienda medica-
mentis siccantib. Ipsum verò ex numero conco-
quentiū existit, vt triticū, quæ minimè profectò
deficiant. *Chrysocoma.*

Radix viuaces habet aeternā & astringentem
qualitates: quare non admodum multi vius est.
Quantū coctis in vitricato, peripneumonis &
morbis hepatici a auxiliat. Sed & menstruis pur-
gandis est utilis.

Pseudodictamnū.

Vim dictamni, sed imbecillam sortitur.

Ptyllium.

Semen habet admodum vile ex secundo re-
frigerantiū ordine. In deficcando verò & hume-
ctando, quodammodo est symmetrum.

Ocimum.

Ex secundo est ordine calfacientiū. Habet au-
tem recrementitiam humiditatem: proinde nec
cōmodum est, vt in corpus fumatur. At foris il-
litum, concoqui digerit.

Ocimoides.

Semen tenuius est partium, & citra morsum,
facultatis deficatoris.

GALENI PERGAMENTI de simplicium medicamentorum facul- tatibus, lib. I. X.

QUORQUE plantarū sunt partes, fructus,
succa, & liquores, supra dicta sunt omnia.
Nunc autē de reliquis medicamentis, quæ
ex metallorum sunt genere, quæque species ipsius
terræ existunt, disserere propositū est. Post quæ
deinceps nonnulli tractabuntur de partibus ani-
malium, quibus ceu medicamentis ad curatio-
nes vitium. Meminisse autē in vniuersum oportet,
astringentibus medicamentis facultatem in-
esse cum acrisbus pungentissimam. Astringentia
siquidem contrahunt, conspiciunt, & conden-
sant substantiā nostram: ac proinde in quamvis
corporis nostri partē extrinsecus imposita, conti-
nuo illam & rugosam, & contractam efficiunt:
contrā quādam acra, quæ ad mota cuti, perspicuo
eam excalfaciūt, atq; in molem attollunt, ruben-
te colore: ac si diutius immorentur, exsiccant.
Hæc itaq; euidenter apparet iudicare, excalface-
re, à vicinisq; partibus ad sese sanguinē trahere.
At astringentia, refrigerando, cōtrahendo, con-
stringendōq; in illis etiam contentū repellere.
Porro combustorum nōnulla calidiora q̃ antea
reddidit, & ad gustum, & ad tactum, & ad eam
que in visu cernitur, facultatē. Quædam contrā,
ab vitione minus apparēt calida, id quod tactu
& visu manifestè dūcernit. Igitur acra multū ca-
loris amittunt viti: quæ verò nō sunt eiusmodi,
assumunt. Ceterū combustorū nullum planè est
frigidū: relinquunt enim in illis veluti acrimo-
nia ignis, quæ per ablationes extergitur: ita vt
aqua in qua medicamentum ablutum fuerit, ca-
lidam facultatē comparet, eamq; tenuius par-
tium: quod reliquū verò est, sit terreum simul &
frigidum, ac deficcare citra molestiam possit.

De differentiis terræ.

Terra cōmuniter ac secundū agricolas, dici-
tur illa quæ agriculturne est apertissima, quæq; hu-
more macerata, lutū efficitur. Atq; in ea sanè plu-

res differentias constitunt: aliam (exempli gra-
tia) pingue esse dicentes, ex qua lutum fit visco-
sum & lentū: aliam cōtrario modo dispositam,
hoc est, quæ lutū efficit friabile. Atq; hoc vnum
vocabulū terræ est omnibus vitarū. Alterum est
solis Philosophis vsurpatū, cum aiunt, elementa
corporū esse terram, aquā, ærem, & ignem. Cor-
pus namq; extremè siccū & frigidum, terrā nūc-
cupant. Secundū quos nullum compositorū cor-
porum terrā censetur elemētaria. Aiunt tamen,
quantò corpore fuerint duriorē, tantò magis ea
esse terram: contrā quādam agricolis, qui eam exa-
ctissimam esse terram cōtendunt, quæ ipsosif-
simè à laxi consistentia recessit. Pro hoc itaq; se-
cundo significato, quod à Philosophis celebra-
tur, tribus claudunt generibus differentijs ipsius
terræ: quorum vnum genus est lapis, alterū cor-
pus metallicum, tertium terra quæ colitur.

De differentiis nominatæ passim terræ.

**Terra itaq; vel Latinis etiā dicitur vītate, quæ
iniecta aqua soluitur, & sit lutū. Quæ sanè quādam
differentias sortitur: secundum propriam
quidem rationē, vt videlicet pinguis sit & vis-
cosa, quæ vtiq; omnino & citra colore est: aut
contrā friabilis, & pinguitudinis experta, quā
argillam appellant, quæ quodammodo candi-
diore existit: aut si inter has maximè cōtrarias ha-
beat. Secundū mixturam autē alienorū cor-
porum, vt dum dicimus lapidosam aut arenosam
hanc esse terram. Porro talis substantia admixta,
segregatur largā aquæ affusione, macerationēq;
donec vniuersum perfusat. Sic enim quod lapi-
dosum & arenosum est, subdit, & terra exacta
supernatat in quæ modum præparat etiā & ter-
ra Lemnia, quā alij sphragida Lemniā (ob im-
pressum illi sigillum Dianæ sacri) cognomināt.
Quæ quidem à Lemnia rubrica differt, quod cō-
tactu nō cōtaminet, perinde vt illa: quodq; secū-
dum collem in Lemno, qui totus colore est ful-
uus, & in quo nec arbor, nec fixū, nec planta na-
scitur, tantū huiusmodi terra vilitur. Ceterū eius
tres differentiæ assignant. Vna quā Lemniā
sphragidem diximus: quāq; alij nemini, præ-
terq; vni sacerdotisq; cōtingere fas est: altera ve-
rò eius, quæ milto est, siue rubrica: ac denique
tertia, quæ deterendi vim habet. Vtuntur autē
priorē illa ad vulnera vetera & cōrumacia, ad om-
nēsq; ferarum morsus, sicuti aduersus medica-
menta letalia. Distinguerē itaq; ab ea terra quæ
colitur, medicamentosam oportet, quæ ad cura-
tiones vitium. Tamen si eius quoq; quæ colitur,
si quæ pinguis est, utilis ad curationes existit ear-
um omnium partium, quæ deficcari possunt.
Deficcant namque vim terra quæ vis possidet.
Cum enim eius corpus natura sit siccum, omni-
nōq; igneque substantiæ experta, citra mordacitatē
exiccat. Ad quod quidem etiam ablutio iuuat.**

De terra lotione.

Ac lauatur sanè terra omnis, vt Lemnia. Pri-
mo siquidem maceratur aqua, quæ nulli habet
medicamentose qualitatis suspiciōē. Dein ef-
fundetur quod innatat, colligiturq; id quod est
à lapidosis & arenosis secretū. Gustus autem do-
cet, quānam terra lotione indigeat, aut quæ mi-
nimè. At Lēnia, cum sit à sacerdote abluta, rursus
elui non exigit.

De

Chrysocoma.

Pseudodictamnū.

Ptyllium.

Ocimum.

Ocimoides.

*Astringentium
facultas.*

*Acrium facul-
tas.*

*Vitiorum diffi-
rentia.*

*Combustorum
autē est frigi-
dum.*

*Terra differē-
tia.*

*Elementa corpo-
rum.*

*Terra pergamē-
di ratio.*

*Lemnia spha-
rica.*

*Lemnia rubri-
ca.*

*Lemnia tres
differentias.*

*Terra quæ vis
deficcandi vim
possidet.*

*Terra abloti-
di ratio.*

De terra Samia.

Samia terra,
Samius aster.

At Samiam ne lauari quidē est opus. Vimur autē altera eius specie magis, quā Samiū astra cognominant, ad sanguinis expunctiones, mulie bñiq; profusiva, velvī & Lemniō filigillo, necnō adversus vlcera dyfenterica, priusq; putrescentia evadant. Quāq; etiā & putrescentibus, quae depascencia vocant, interdum Lemnia ipsa profuit, iniecta quidem per armoglossi succi, bibira verō ex oxycrato aquoso: prius tamē ablutis vlcēribus. Idq; primō quidem, melicrato: dein autem muria. Ceterū Lemnia terra q̄ Samia nō parum efficacioribus esse videt viribus. Quare ab ea, quae phlegmone tentant corporis partes, exasperantur, cum tamen à Samia iuuentur. Ex qua & oleo rosaceo minisimū conficitur pharmacū, etiā cōtra alias feruentes phlegmonas, incipientēsq; bubonas & fluxiones podagricas, & ad ea breuiter, quae refrigerare cum mingione est animus. Vnde constat Samiā refrigerare. Quin & magis aërea eius essentia existit, collata à Lemniū, cuius argumentū est leuitas. Aestimabis porro omnē terram medicaminosam, tam leuitate, tum grauitate: praeterea circa gustū asperitate & lenitate: ad haec tenacitate & abstergendi potentia. Tenax enim & viscosus est Samius aster, cum & Lemnia sphaeragis eiusmodi paululū quiddam habeat. Absterforiā quoq; facultatē moderatā obinent & Selinusia terra, & Chia: quā morbiē mulieres quēdā lis ad faciē vtuntur. Porro quicquid abstergit leuiter, producendū vlcēri carni est idoneū. Quod si etiā siccat, cicatrici inducendū est habile. At omnīū aptissima sunt & ad vice ra quae in summa cute consistunt, & ad ambusta, illa quae citra morsum excisae, nec in anisestō exalfaciūt, nec refrigerant. Quocirca terra Selinusia & Chia, pulcherrima sunt ad ambusta vlcērum remedia. Tam verō Cimolia terra cum multū sit facultatis, partim sanē refrigerat, partim leuiter digerit, operatinq; pro natura illorū quibus miscet. Verū vnicē ambustis cōuenit, velvī & aliz omnes, illitae ex aceto, aut oxycrato: nimirū bullas existere prohibentes. Advertendū tamen est, corpora mollia valentem medicaminū vim haud posse perferre: dura verō posse. Terra itaq; missionis experts, vim habet citra morsum siccandi. Cū aut nullū reperire sit corpus à missione alienum, inspicuendum est, qualem nam miscellam ipsa terra fortat. Si qua ergo in ea restrictio sentiarur, tantū frigiditatis assumpsit, quantū habet restrictionis. Sin acrimonia, tantum scito illi inesse caliditatis, quantum & acrimoniae. Similiter, quantū leuior terra ipsa fuerit, tantū acrior existit. Quāto grauior, tantū etiam syncerior ter ra. At propriū terra est, quod igni ad mortā nō soluitur, aut liquefit: id quod accidit plumbo, stanno, auro, & argento. Cū igitur audis nominare terram argenteam, aut auream, minimē intelligas ipsum argenti, aut aurum, per totū terrę corpus misceri: sed particulas quasdam exiguas tum auri, tum argenti, illi coniunctas, atq; coniunctas existere: calig ab igne in fornacibus fusas colore inuicē. Eundem in modum quae vitriū continet terra, arenosa est. Sed & auri quoq; glebulae exiguae frequenter nō paruo numero in quibul-

Selinusia terra
Chia terra.
Abstergetia leuiter, producit ad esse carniē idoneā.

Cimolia terra.

Ambustis quae conferant.

Corpus nullum dari à missione alienum.

Terra igni ad mortā non soluitur.

Vitram continet auri terra. Aurum reperiri in arenis.

dam reperiuntur arenis. Terrarū autē id genus omnīū quae in metallis sunt, vbi ab eis separatur id metallū aut aeris quod continent, reliquae videntur lapideae: nec macerari, rigariq; aut humectari per totam substantiā possunt: vt medica minosa illa, quae cum aqua in lutum degenerat: quāq; vini circūlita nascentes in ea vermes interimit, vnde Ampelites vocatur. Cadmia etenim est illarū lapidearū est genere, neq; rigari potest. Terra Crenica admodum imbecilla est, multū habens substantiae aëreae. Inest tamen ei quiddā citra morsum vis extergendi. Eremensis, q̄ Lemnia, valentiorē possidet restrictionē, haec tamen vix nōdum mordet. Expedit verō hāc terram bis terq; lauare, vt Cimoliam, quō modera tior reddatur. Eam etiam vruat, vt subtiliorem, acriorem, & magis digerentē efficiant. Quod si postea q̄ combusta fuerit, abluatur, replendis & cicatrice inducendis vlcēribus multo magis opitularur. Ceterū quae colore cineritio est, illi quae alba existit, praefert. Est & alia terra dicta Pignitica, tota quidē faculitate terrae Cimoliz assimilis, ceterū atra colore, quemadmodū Ampelites. At terra, siue lapis, siue bolus Armenus, colore est pallido, promptissimēq; soluit in liquorē omnino æqualem, vt calx, validamq; desiccandi vim possidet. Siquidem ad dyfenterias, ventris profusiva, sanguinis expunctiones, carathos, & putrescentia oris vlcera, in primis cōpetit. Quin & illos magnificē iuuat, quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit. Quare & iis quibus ex tali occasione anhelus difficiilis est, valde auxiliat. Sed & eos qui tūbe laborat, adiunxit: vlcus enim ipsorū dēficat. Maximē etiā cōfert Armenus bolus contra pestilentes affectus. Si siquidem vsu eius non perstantur, quae prius immedicabiles sunt. Ceterū bibitur ex vino alio, cōsistentia tenui, modicē diluto, si is qui morbo est correptus aut planē febrī careat, aut leuiter ea teneat. Sin grauius febrat, admodum aëreo. Non sunt tamen calore vehementes febres pestilenciales.

De lapidibus.

Ex corporibus spontē natis sunt lapides, hoc diuersi à vulgo nuncupata terra, quod rigari nō sustinent. Vires habent partim secundum rotas substantiae proprietatē, partim secundā qualitates effectrices. Nunc autē sermo nobis erit de illis viribus, quae secundū effectrices agunt quallitates in quibus sanē est & vten di ratio & methodus. Nam facultates quae proprietatis rotas substantiae ratione insunt, à methodo sunt atq; ratione alienae, & per solam experientiam noscuntur. Nam cur hic lapis ratio vulnere vnde sanguis prorumpit, cursum eius recipere, haud nouimus. At cur huiusmodi lapis in oculares facultates indatur, nouimus: quod sit rationis inuentum. Nam si in coteo culari cum aqua cum terras, donec accipiat crassitudinē mellis, astringentem facultatem percipies. At didicisti, quod gli scentes etiamnum phlegmonas restringentibus medicamentis repercutere oporteat: vbi autem iam sanguis nō fluit, astringentibus medicamentis digerentia adiungere, & sensim ad ipsa sola transire. Itaq; de iis lapidibus prius disseret, qui mortarij aut cotis attritu, in liquorem soluant.

Ampelites terra.
Cadmia.
Crenica.
Eremensis terra.

Phlegmonas.

Bolus Armenus dyfenterias.

Amelites.

Amelites.

Febres pestilenciales non esse vomitibus calidat.

Facultates quae proprietatis ratione insunt, est si à methodo alienae.

Huiusmodi lapis in oculares facultates indatur.

Phlegmonas restringentibus medicamentis repercutere oporteat.

Ciferis, Pumex.

Smiris. Pumex quidem abstergit. Sed Smiris acrimonia quiddam obinet. Proinde caustica & deficcantibus facultatibus additur, eisq; quæ curant gingivas laxes. Pumex autē si cōbūatur, haud erit inferior Smire, eisdem ad vīas.

Lapides qui in spongii reperiuntur.

Spongiorum Lapides. Frangendi vim obnunt, non tamen ita vālidam, vt lapides in vesica cōminuant. Rumpunt eos tamen qui coguntur in renibus: velyti qui adyehuntur ex Cappa dōcia.

Onracites.

Ofracites. Hunc lapidem aiūt deficcandi valenter facultatem habere, temperatē ex attritione, acrimoniaq; vt Geodem expurgare pupillas, vberūq; & testū sanare phlegmonas, inuēciū ex aqua. At cōis Naxi ramentum virginibus mammae prohibet tumescere: sicvti & testes puerorū tanquam facultatis refrigeratoriē sit particeps.

Ophites.

Ophites. Extergēdi cōstringēdīq; vim possidet, ceu etiā vitrū. Admodū enim ipsum ex vino albo ac tenui eporū lapides vesicę conterit, atq; cōstringit. Iaspis viridis.

Iaspis viridis. Ventriculū adhæsi, ipsiusq; os adiunat. Porro Ophitem lapidē fūspensum, iuuare moros & vi perā tradit. Sed cuiusmodi facultates nō cōstant merhodo. Veluti etiā cum Hieracites & Indicus profluētē ex hæmorrhoidib; sanguinē sūstunt.

Sapphirus.

Sapphirus. Idēos & scorpionē iuuare creditur. Aphroscelinus.

Aphroscelinus. Liberat cominali morbo vezarōs: id qd nondum sumus experti.

Diosconidis Thyites.

Thyites. Subviridis est vt Iaspis, soluiturq; in succū colore quidem lacteum, gustu verō acrem: ac proinde nemo illum oculorum misceat medicamentis, nec fluxiones repercutientibus, nec vlcera sanantibus. Sed eo tantum vitrū ad purgandum & abstergendum, quæ pupillam absq; phlegmone offuscant: quales sunt cicatrices recentes, & pterygia non nimis dura.

Indaicus.

Indaicus lapis. Colore est candido, specie cōcinna, lineas habens ceu torno ductas. Vtuntur ad vesicę lapides in cote soluentes, & ex aqua calidē tribus cyathis potui præbentes. Præcipue verō ad eos qui in renibus hærent, est effi cax.

Pyrites.

Pyrites. Validam possidet facultatē, eōq; vitmur digerenti emplastro admisso. Adicitur etiā & feliōs. Ab hoc medicamine & pus sepe numero, & consistentia grumosa in spaciis intermediis musculorum nata, per halitum sunt digesta. Nisi autem dum in vsum veniunt, pollinis instar cōminuantur hi omnes lapides, vt profundū corporum quibus applicantur subeant, asimiles manent isti marinis fluuiatilibusq; arenis: quæ & ipse cōmunem omnū lapidum vim possident. Siquidem exiçant tum entem ab aqua inter cutem carnē, si in ipsis excaletis decumbat æger. Non tamen ad aliud quippiam eis vitmur.

Phrygius.

Phrygius. Hoc semper vitor combusto quidem ad vlcera

putrida, idē Igso aut per se, aut ex aceto, aut ænomelite, aut oxytrato. Ad oculos verō ex eo permisso aliis, medicamē ficiū efficio. Valide em deficcant, habēs quiddā attritionis simul & mordicationis.

Ageratus.

Astringit simul et digerit. Atq; attritione qui dem euidētē iuuat phlegmone columellas gra uatas.

Asius.

Asius. Colore & consistentia est topho similis, friabilis, laxusq;. Innascitur ei quiddam instar farinę tenuissimæ, qualis in molarū parietibus adhærescit. Appellat hoc medicamē petræ Asm florem. Est verō & tenuiū partium, vt sine morfu nimis fluidas carnes eliquet. At petræ ipsa in qua nascitur, actionis vehementia est inferior. Habet enim & falfedinē quandam ipse Asius petræ flos, ita vt inde videatur ducere originem: quod res ex mari in petram refidens, & sole posita exiccetur.

Gagates.

Gagates. Colore est atro, qui vbi igni fuerit admotus, per similem bitumini odore exhibet. Consert autem ad discutiendos statulentos tumores consistentes in genu, diuturnosq; & ægrē curabiles: ac præterea cruciā vulnera glutinat. Est & lapis Thracius, cuius in hūc modū Nicetor meminit: Si lapis vteret tandem Thracius igne, & post modū aqua, flagrabat totus idem. Men sers affuso potius refrigerat. &c.

Nullus tamen eius in medicina vsus, nisi quod suffitu abigit feras.

Magnitis, Heraclia, Magnes.

Asimilem hamarini vim obtinet.

Arabius.

Lapis est elephantho similis, deficcatis abster gensq; potentia.

Alabastrites.

Combustus in medicinx vsum ingredit. Quidam cum bibendum dant stomachicis.

Smiris.

Vehementer quidem abstergit: quare ipso ad annulos exulpandos vtuntur, & ad dentes punificandos.

Hæmatites, Galactites, & Melinites.

Hæmatites & Galactites lapides, & colorū similitudine, quos representant, sic nominantur. Ille siquidem sanguini, hic in succum solutus, lãsti videtur similis. At Melinites, nō & colore, sed & sapore mellis talem nomenclaturam foecitur.

Cū igitur succus omnis dulcis & temperato calore profificatur, astringens verō & frigore, habebit sanē hæmatites lapis tantum frigiditatis, quantā & attritionis. Melinites verō temperatā caliditatem: at mediā vtriusq; temperiem Galactites. Merito itaq; oculūbus medicamentis lapis hæmatites miscetur. Ac solo eo vn̄ possis superciliis exasperatis: si quidem cum phlegmone sint aspera reddita, ex ouo ipsūm diluens: ac si magis, etiam per decoctū fœnigræci. Sin verō citra phlegmonem, ex aqua. Hic idem lapis similiter in cote contritus, sanguinis exputioni conducit, vlceribusq; vniuersis. Porro siccus, redactūq; in tenuissimū pollinē, reprimē excrecentia: ipsiq; oculorū vlcera solus p se cicatrice includit atritus, ceterū aut affusus, aut inuēctus.

Schistos.

Artemis quædam dicitur ramentū ab aqua inter cutem carere.
Phrygius lapis.

Schistos.

Hematiti perissimam vim obtinet, sed infirmiorē Schistos: ac post eum Galactites. At Melites nonnihil caliditatis asculit. Vt igitur vnuquisq; leuiter ac sensim ab leguminiū facultate recedit, ita in vsu oculorum accommodatus: est tamē mior. Etenim miora remedia partibus etiamnum pliegmone afflictiis semper gratoria sunt. Quare quidem, liberis iam a pliegmone partibus, infirmiora sunt, q̄ vt persanare valeat. Porro cum lapidibus omnibus commune sit vt desiccet, quotquot ex eis in succū soluti, aut redacti in pollinē, nullam cōtinuū qualitātē in gustu obtinent, hos putandum est esse tum infirmisimos, tum minisimos, tum minime mordaces. At qui manifestā qualitātē exprimūt, hī pro qualitate ratione potentiū possident. Ac si quidem astringant, ad cōprimendū, cōstringendū, spissandū, & cōrahendū: si verō mordicent, ad excalfaciendū, digerendū, & colliquandū. Mediorum sunt, qui abstergent citra mordicationem. Igitur Hematites, Schistos, Galactites, & Melites, in succū vertuntur. Quāq; sunt & alij in succū solubiles, vt Moroxus qui in Aegypto nascitur, omnium dictōrum minime qualitatis particeps. Quare tantū desiccandū vim possidet.

Metallica medicamenta.

Metallica medicamēta appellare medicis mos est, quorū generatio in metallis cōsistit, siue spontanea, siue per fornacē facta. Vt igitur lapidibus vniueris, & terris medicaminū osse cōmune est vt siccat, ita metallicis quoq; medicamentis omnibus. Est enim essentia eorū terra, secundum elementaria terrę significatū. Porro caliditate diutina, mistam ex terra & aqua, nōnunq; enī aēre, substantiā vniēte, temperantē, ac postea desiccante, metallicorū medicamentorū cōsistentiē proveniūt. Quemadmodum igitur in differētiis terrę, plurima essentia terrę elementaria habet, paulū verō aēris, ita in metallicis multū igneę substantiē est immistū. In medio autē eorū sunt lapides. Proinde alia metallicorū semel aut bis, alia frequentius lota, idonea sunt, vt citra morosum excicent. At locorū, in quibus hæc proveniant, natura, pro vt plus minūq; est frigida, alia plus, alia minus, cogit, congelatq;.

Hales, Sales.

Sal partim ex mari siue in salinis, partim ē terra effoditur. Ceterū vtriq; vis est asensibilis, impensē videlicet excicatrix. Porro aphonitri sapor amarus est, & absterget: salis verō, tantū in abstergendo inferior, quantū in astringēdo superior. In vtriusq; medio sapor nitri cōsistit.

Armeniacum.

Vim habet extergētē cum leuicula tum acrimonia, tum astringēte. Vnde meritis miscet ocularibus facultatibus. Præterea ipso per se redactō in pollinē, atq; sicco, vtuntur ad pilorum in superciliis incrementum: vbi præ humorum acrimonia partim excidunt, partim nec crescūt, nec nutrantur.

Arrheolicum, Autripigmentum.

Facularis est caustice, tam combustū, q̄ vltio nis expers. Ceterū per vitionem tenuiorū partium efficitur. Vtuntur porro ipso ad denudandam

dam pilis quamvis particulam. Verū si diutius hæreat, ne cuti quidem parcat.

Aphonitrum.

Aphonitri ab aphonitro differt. Nitri enim spuma medicamentū excicatoriū existit, a spētu triticeę faringē similis. Etenim alba est, nō vt Asie petrę sios cinerica. Aphonitri verō farinę speciem non habet, neq; solutum est, sed cōcretum & congelatum. Quod quidem aded extergit, vt non modō sordes expurget, sed etiam pruritum sanat. At spuma nitri, eiusdem cum nitro est tum naturę, tum facultatis: licet essentię tenuiora. Dictum autem est paulō antē, in medio aphonitri & salis, facultatem nitri cōsistere. Aphonitro enim sola inest vis detergendi: salī verō enī astringendi, sed multo magis quān detergendi.

Gypsum.

Gypsum quidem tum desiccāt, tum vites habet emplasticas. Quare siccis medicamētis quæ ad sanguinis eruptiones accommodantur, vtiliter cōmiscet. Nam ipsum per sese lapidosum sit, coactū & congelatum. Ac proinde diluendum est oui tenui & cōdida albugine, quę & ad ophtalmias est utilis, admisto illi tenuissimo farinæ triticeę pollinē, qui residet in molarū parietibus. Excipere quod sic macerātū est, remelius leporis pilis, aut qui perinde sint molles, expedit.

Gypsum vsum.

Nō habet quæ emplasticā vim, ceterū tenuiorum est partū, & valentius desiccāt. Quin & repersuioni est, maxime si maceretur oxycrato.

Diphryges.

Mistam habet tum qualitātē, tum facultatem. Habet enim in sese quiddā & mediocriter astringens, & mediocriter acre vnde vicerū rebellium optimū medicamentū. At eo siquidē ad putrefcentia oris vlcera, siue per se, siue cū melle, cū detracta erat spuma, tum ad anginā, vbi iam per astringentia medicamēta cōstiti qd infuscat, ac breuiter ad columellam præcisam, pudentiq; & ani vlcera cicatrice obducenda, sum āflictiū vltis. Porro quo pacto adulerentur dictorū medicamentorum singula, non videtur precū opere scribere, cū talia posse dicere homines sceleratissimi in lucro ponant.

Theson, Sulfur.

Sulfur omne trahendi vim possidet, estq; temperamenti calidi, atq; essentię tenuis, aded vt ad multa venenatorū animalium resistat, si ficum ictū inaspergat, aut cum salina, aut vrinā, aut oleo veteri, aut melle, aut resina terebinthina illinatur. Quin & pforas, & lichenas, & lepras, nō raro hoc medicamento cum resina terebinthina sanant. Extergit enim omnes id genus affeetus, absq; hoc vt in profundum repellat.

Ios, Aerugo.

Gustantibus acrem exhibet qualitatem, digerens, detrahens, & liquans vno teneram modō, sed & duram præcisam. Hallucinant igitur qui talia medicamēta, epulotica appellāt, hoc est, quæ cicatricem in ducūt: cū nimirū epulotica pharmaca contrahant, conspiciant, & in calli morem ipsam carnem indurent. Quin & gustum mordicat ærugo, non tantum vlcera. Quod si particulam eius cerato nō pauco admiscas, id quod

AA iij

Asphitru,
Galactites,
Melites,

Lapides omnes
cōmune sit
siccant.

Moroxus.

Metallica quæ
dicantur.

Metallica omnia
siccare.

Metallicis plurimū
igneę substantiæ
essentia est immistam.

Hales.
Sales.

Armeniacum.

Arrheolicum,
Autripigmentum.

Aphonitrum.

Aphonitrum.

Nitrum.

Gypsum.

Asiæ cui ad
ophtalmias
vtilis.

Gypsum vsum.

Diphryges.

Asteria medicamentorum
cor dicenda
non sunt.

Theson.
Sulfur.

Ios.
Aerugo.

Epulotica
opera.

Cyris.
Pumex.
Smar.

Ciferis, Pumex. Sed Smiris acrimoniae quiddam obtinet. Proinde causticis & defecantibus facultatibus additur, eisq; quae curant gingivae laxae. Pumex autē si cōbatur, haud erit inferior Smire, eosdem ad vñs.

Lapides qui in spongiis reperiuntur.

Spongiarum
Lapides.

Frangendi vim obtinent, non tamen ita validam, ut lapides in vesica cōminuant. Rumpunt eos tamen qui coguntur in renibus: veluti qui adyehuntur ex Cappadocia.

Oñacites.

Oñacites.
Gaud.

Hunc lapidem aiunt deficcandi valenter facultatem habere, temperatū ex astrictione, acrimoniaq; ut Geodem expurgare pupillas, vberumq; & testū sanare phlegmonas, invectū ex aqua. At coris Naxū; ramentum virginibus mammae prohibet tumescere: sicut & testes puerorū; tanquam facultatis refrigeratrix sit particeps.

Ophites.

Ophites.

Extergēdi cōstringēdiq; vim possidet, ceu et vitrū. Admodū enim ipsum ex vino albo ac renui eportū lapides vesicę conterit, atq; cōstringit. Lapis viridis.

Lapis viridis.

Ventriculū adhaesi, ipsūq; os adiuvat. Porro Ophitem lapidē suspensum, iuuare morfos à vi pera tradit. Sed eiusmodi facultates nō cōstant methodo. Veluti etiā cūm Hieracites & Indicus profluente ex haemorrhoidib; sanguinē siliunt.

Sapphirus.

Sapphirus.

Ictos à scorpionē iuuare creditur.

Aphrodisium.

Aphrodisium.

Liberat cominali morbo vexatos: id qđ nondum sumus experti.

Dioscoridis Thyites.

Thyites.

Subviridis est vt lāpis, soluiturq; in succū colore quidem lacteum, gustu verō acrem: ac proinde nemo illum oculorum miscet medicamentis, nec fluxiones repercutientibus, nec vlcera sanantibus. Sed eo tantū vitur ad purgandum & abstergendum, quae pupillam absq; phlegmo ne ossifaciat: quales sunt cicatrices recentes, & pterygia non nimis dura.

Ludaeus.

Ludaeus lapis.

Colore est candido, specie cōcinna, lineas habens ceu torno ductas. Vtuntur ad vesicę lapides in core soluentes, & ex aquae calidae tribus cyathis porui praebentes. Praecipue verō ad eos qui in renibus haerent, est efficax.

Pyrites.

Pyrites.

Validam possidet facultatē, eaq; vtitur digerenti emplastro admisso. Adicitur etiā ei & schistos. Ab hoc medicamine & pus sepienū, & consistentia grumosa in spaciis intermediis musculorum nara, per halitum sunt digesta. Nisi autem dum in vñm veniunt, pollinis instar cōminuantur hi omnes lapides, vt profundū corporum quibus applicantur subeant, asimiles manent istis marinis fluuiatilibusq; arenis: quae & ipse cōmunem omnī lapidum vim possident. Siquidem exsiccat tumentem ab aqua inter cutem carnē, si in ipsis exalfectis decumbat æger. Non tamen ad aliud quippiam eis vitur.

Phrygius.

Phrygius lapis.

Hoc semper vitur combusto quidem ad vlcera

putrida, idq; ipso aut per se, aut ex aceto, aut conomelite, aut oxyurato. Ad oculos verō ex eo permixto alius, medicamē siccū efficio. Validē em deficac, habēs quiddā astrictionis simul & mordicationis.

Agerranus.

Astringit simul et digerit. Atq; astrictione quidem evidēter iuuat phlegmone columellas grauatās.

Alsius.

Colore & consistentia est ropho similis, friabilis, laxaq; Innaescit ei quiddam instar farinae tenuissimae, qualis in molarū parietibus adherescit. Appellant hoc medicamē petrę Alsi Petra Alsi flou.

Agerranus.

Alsius lapis.

Petra Alsi flou.

20

Gagates.

Colore est atro, qui vbi igni fuerit ad mortus, persimilem bitumini odorē exhibet. Confert autem ad discutiendos barulentos tumores consistentes in genu, diuturnosq; & ægrē curabiles: ac praeterea crucia vulnera glutinat. Est & lapis Thracius, cuius in hūc modū Nicetides meminit:

Si lapis utitur condenti Thracius ignis, et

Post medicat aqua, flegmabit tetter: ut idem

Max elea affuso prius refrigerat. Cy.

30

Nullus tamen eius in medicina vñs, nisi quoddam suffitu abigit feras.

Magnitis, Heraclia, Magnes.

Asimilem hermatini vim obtinet.

Arabius.

Lapis est elephantio similis, deficcatis abstergentisq; potentia.

Alabastrites.

Combustus in medicina vñm ingredit. Quiddam cum bibendum dant stomachici.

Smiris.

40

Vehementer quidem abstergit: quare ipso ad annulos exculpandos vtuntur, & ad dentes punificandos.

Hermarites, Galaetites, & Melitites.

Hermarites & Galaetites lapides, à colorū similitudine, quos representant, sic nominantur. Ille siquidem sanguini, hic in succum solutus, lacti videtur similis. At Melitites, nō à colore, sed à sapore mellis talem nomenclaturam sortitur.

50

Cōm igitur succus omnis dulcis à temperato calore proficiatur, astringens verō à frigore, habebit sanē hermarites lapis tantum frigiditatis, quantum & astrictionis. Melitites verō temperatilitatem: at mediū vñusq; temperem Galaetites. Merito itaq; ocularibus medicamentis lapis hermarites miscetur. Ac solo eo vñi possis superciliis exasperatis: si quidem cum phlegmo ne sint aspera reddita, ex ovo ipsum ducens: ac si magis, etiam per decoctū fornigred. Sin verō circa phlegmonem, ex aqua. Hic idem lapis similiter in core contritus, sanguinis expunctioni con dicit, vlcētib;q; vñueris. Porro succus, redactūq; in tenuissimū pollinē, reprimat excrecentia: ipsiq; oculorū vlcera solus p se cicatrice includit attritus, ceterū aut affusus, aut inunctus.

Schistos.

Gagates.

Thracius lapis.

Magnitis.

Magnes.

Arabius lapis.

Alabastrites.

Smiris.

Hermarites.

Galaetites.

Melitites.

Dolus foccus

omnis à tempo

rato calore pro

ficiatur, vt ad

stringens à fri

gore.

Schistos.

Hæmatitis per similem vim obtinet, sed infirmiorē Schistos: ac post eum Galactites. At Melitres nonnihil calidioris assuit. Virgatur vniuersusque leuiter ac sentit ab hæmatitis facultate recedit, ita in vsum oculorum accommodatur: est tamen mitior. Etenim mitiora remedia partibus etiamnum phlegmone et assuetis semper graviora sunt. Quæ quidem, liberis iam à phlegmone partibus, infirmiora sunt, quæ ut persanare valeat. Porro cum lapidibus omnibus commune sit ut deficiant, quotquot ex iis in succu soluti, aut redacti in pollinem, aut conuerti qualitate in gustu obtineat, hos putandum est esse tum infirmos, tum mitissimos, tum minime mordaces. At qui manifestè qualitate exprimitur, si pro qualitate ratione potenter possident. Ac si quidem astringant, ad comprimendū, constringendū, spissandum, & cōrahendū: si vero mordicent, ad exsiccandum, digerendū, & colligandū. Mediorum sunt, qui abstergent circa mordicatio nem. Igitur Hæmatites, Schistos, Galactites, & Melitres, in succu veniunt. Quamq̃ sunt & alij in succu solubiles, ut Moroxus qui in Aegypto nascitur, omnium dīctorū minime qualitatis particeps. Quare tantū deficiendū vim possidet.

Metallica medicamenta.

Metallica medicamēta appellare medicis mos est, quorū generatio in metallis consistit, siue spontanea, siue per fornacē facta. Virgatur lapidibus vniuersis, & terre medicaminosæ cōmune est ut siccat, ita metallicis quoque medicamentis omnibus. Est enim essentia eorū terrea, secundum elementaria terre significatiū. Porro caliditate duritia, mistam ex terra & aqua, non unq̃ etia aere, substantiā veniente, temperantēq̃, ac postea deficiente, metallicorū medicamentorū consistētiæ proveniūt. Quæmadmodum igitur in differētiis terre, plurima essentia terre elementaria habet, paulum verò aëria, ita in metallicis multū igneæ substantiæ est immixtū. In medio autē eorū sunt lapides. Proinde alia metallicorū semel aut bis, alia frequentius lora, idonea sunt, ut circa morsum exsiccant. At locorū, in quibus hæc proveniunt, natura, pro ut plus minusq̃ est frigida, alia plus, alia minus, cogit, congelatq̃.

Hales, Sales.

Sal partim ex mari fit in salinis, partim ē terra effoditur. Cæterū utriq̃ vis est assimilis, impendit videlicet exsiccatrix. Porro aphronitri sapor amarus est, & abstergeas salis vero, tantū in abstergendo inferior, quāto in astringēdo superior. In utriusq̃ medio sapor nitri consistit.

Armeniacum.

Vim habet extergentē cum leuicula tum acrimonia, tum astringēte. Vnde merito miscet ocularibus facultatibus. Præterea ipso per sedactio in pollinem, atq̃ sicco, vniuntur ad pilorum in superciliis incrementum: vbi præ humorum acrimonia partim excidunt, partim nec crescit, nec nutritur.

Arbhenicum, Asprigmentum.

Facultas est caustice, tam combustū, q̃ vitio nix expers. Cæterum per visionem tenuiorū partium efficitur. Vniuntur porro ipso ad denudan-

dam pilis quævis particulam. Verū si diutius hæreat, ne cuti quidem parcit.

Aphronitrum.

Aphronitri ab aphronitro differt. Nitri enim spuma medicamentū exsiccatorū existit, aspectu triticæ faring similes. Etenim alba est, nō ut Aficæ petreæ flos cinerice. Aphronitri verò farinæ speciem non habet, neq̃ solum est, sed cōcretum & congelatum. Quod quidem aded extergit, ut non modò sordes expurget, sed etiam pruritum sanat. At spuma nitri, eiusdem cum nitro est tum naturæ, tum facultatis: licet essentia tenuior. Dīctum autem est paulo antè, in medio aphronitri & salis, facultatem nitri consistere. Aphronitri enim sola inest vis detergendi: sal vero enī astringendi, sed multo magis quādam detergendi.

Gypsum.

Gypsum quidem tum deficiat, tum vires habet emplasticas. Quare sicca medicamēta quæ ad sanguinis eruptionem accommodantur, vtiliter cōmisceat. Nam ipsum per se lapidōsum fit, coactum & congelatum. Ac proinde diluendum est oui tenni & cādida albugine, quæ & ad ophthalmias est vtilis, admittit illi tenuissimo farinæ triticæ polline, qui residit in molarū parietibus. Excipere verò quod sic maceratum est, tenellis leporis pilis, aut qui perinde et molles, expedit.

Gypsum vsum.

Nō habet quæ emplastrictæ vim, cæterū tenuio-
10 rum est partū, & valentius deficiat. Quin & re-
percussorū est, maxime si maceretur oxycrato.

Diphryges.

Mistam habet tum qualitatem, tum facultatem. Habet enim in sese quiddā & mediocriter astringens, & mediocriter acre: vnde vlcerū rebellium optimū medicamen est. Eo liquidè ad putrefactionem oris vlcera, siue per se, siue cū melle, cum detracta erat spuma, tum ad anginā, vbi iam per astringentia medicamēta cōstitit qd̃ insubebat, ac breuiter ad columellam præcisam, pudendiq̃ & alia vlcera cicatrice obducenda, tum assuetissimè vltus. Porro quo pacto ad ulcērentur dīctorū medicamentorum singula, non videntur præciū opere scribere, cum talia posse dicere homines sceleratissimi in lucro ponant.

Theion, Sulfur.

Sulfur omne trahendi vim possidet, estq̃ temperamenti calidi, atq̃ essentia tenuis, aded ut ad multa venenatorū animalium resistat, si siccum igitur inspergatur, aut cum salina, aut vltina, aut oleo veteri, aut melle, aut resina terebinthina illinatur. Quin & pforas, & lichenas, & lepras, tū raro hoc medicamento cum resina terebinthina sanant. Extergit enim omnes id genus affectus, absq̃ hoc ut in profundum repellat.

Ios, Aerugo.

Gustantibus aciem exhibet qualitatem, digere-
10 rens, detrahens, & liqnans non teneram modò, sed & duram carnē. Hallucitantur igitur qui talia medicamēta, epulotica appellat, hoc est, quæ cicatricem inducūt: cum nimirū epulotica pharmaca contrahant, confitent, & in cali morem ipsam carnem indurent. Quin & gustum mordicæ ærugo, non tantum vlcera. Quod si paululum eius cerato nō pauco admiscere, id quod

AA uij

Schistos.
Galactites.
Melitres.Lapidibus omnibus
commune sit
cane.

Moroxus.

Metallica quæ
dicuntur.Metallica omnia
siccare.

Metallicis plurimū igneæ substantiæ esse immixtum.

Hales.
Sales.

Armeniacum.

Arbhenicum.
Asprigmentum.

Aphronitrum.

Aphronitrum.

Nitrum.

Oplum.

Albugine cui ad
ophthalmias
vtilis.

Gypsum vsum.

Diphryges.

Adulteria impudiciorum
cor docenda
non sunt.Theion.
Sulfur.Ios.
Aerugo.Epulotica
opera.

ex ambobus mistum est, citra morsum extergit. Cadmia.

Cadmia.

Cadmia fit, ubi in fornacibus res paratur: nēpe tota terra, aut lapide ex quo res gignit, in sublimem partē fornacis egerente, vel in fuliginem aut fauillam quidam. In argenteis etiam metallis simul secretionē efficitur. Quin & ex pyrite lapide in fornacibus viro fit cadmia. Ceterum absq; fornace in Cypro cadmia invenitur, quam iure quispiam lapidem vocet. At eius quæ combusta est, aliam botryitin, aliam placitn Medici nuncupant. Botryitin quidem, quæ in edioribus ipsius fornacis muris colligitur. Placitn vero, quæ in humilibus. Ac liquet sanē botryitin partem esse tenuiorē, crassiorum verō placitn: vtrāq; autem vi deficcandi, ac mediocriter digerendi præditam. Quæ autem colligitur in fornacibus, igneæ qualitatē necessariō etiam aliquid habet. Merito itaq; eam abluentes, medicamen efficiunt mediocriter tum deficcans, tum

Cadmia diffusa.

Cadmia vitri.

extergens absq; mordicatione: vnde ad caua vlcera præhumida, & putrescentia, quæ in oculis & in toto corpore habentur. Igitur respicientes ad temperatā & mediam inter omnes excessus naturā, leuiter deficcatoriā absterforiāq; cadmitz inesse facultatē dicimus. In caliditate autē & frigiditate differētia, cadmia quodammodo temperata existit.

Cinnabari.

Cinnabari.

Modicē acrem facultatē obtinet. Habet verō & astrictionis quippiam.

Ciferis, Pumet.

Ciferis, Pumet.

In scarifica medicamenta induitur, & ea quæ dentes extergunt, partim viationem non expertus, partim etiā exvitus: quando quidē aliis omnibus combustis similiter, substantiæ tenuioris efficitur. Ceterū viatione quiddam acquirat acrimoniæ, quam rursus lotionē exurit. Videri autē poterit, & conciliare splendorem, non tantū facultate, sed etiā asperitatem: veluti si smirin, aut testam tritam admoueas. Eundem in modum cornua devisa dentes reddunt splendidos.

Cornua devisa reddunt splendidos.

Conia, Lixiuum ex cinere.

Conia.

Abluo cinere fit. Cinerem autem, vitrorū corporum reliquias Latini nuncupant. Fit ergo lixiuū pro eius quod eluitur natura. Cineris siquidem qui acrimoniā igneam habet acerrimā, ipsum quoq; acerrimū est: eius quod tale nō est, etiā moderatius. Quare & putrescentibus medicamentis miscet, vitpote causticē facultatē possidens: sed propter substantiā suę tenuitatem, citra dolorem advenit.

Cyanos.

Ceruleus lapis.

Cyanos, Ceruleus.

Acrem possidet facultatem, ac tum detrahen di, tum digerendi, q̄ cinnabari, potentioe. Inest quoq; ei nonnulla astrictio.

Lepia, Squama æris, & ferri.

Lepia.

Squama, alia est gris, medicamē multo vtilissimum: alia ferri, & stomomatis: alia deniq; quam nonnulli vocant helatin. Atq; omnes sanē vehementer siccant. Ceterum helatin principē in deficcando locum obnerenam subtilissimę omnium substantiæ est, nimirum quæ æruginis nonnulli asumpserit. Maiorem obtinet astrictionē squama ferri, & hac etiam maiore stomomatis. Quæ

Helatin.

obre ad contumacia vlcera meliores sunt quam squama æris. Detrahit & liquat carnem potentius squama æris, & hac etiam valentius helatin. Omnes autem squamæ nō instruunt mordaces sunt. Quare essentia ipsarum nō est admodū tenuis. Siquidem inter ea quæ parum vim possident, minus est mordax quod est tenuius.

Lithargyros.

Mordacia minus est quæ sunt tenuiora, si parum facultatis obtineant.

Deficcet quidē, sed omnium moderatissime.

Lithargyros.

& secundū alias tum qualitates, tum facultates, quodāmodo in medio consistit. Modica tamen astringēdi, abstergendiq; facultas ei inest. Ceterū ad intertrigines scemori vtilis medela est. In re itaq; medij ordinis in metallicis habebit. Proinde frequenter vinum lithargyro ceu aliorum materia: sicut in liquefcentibus ad plerāq; medicamenta adhibemus ceram, tanquam materiā medæ eorū quæ valentem possident facultatē.

Cera.

Nitrum.

Inter aphonitru & salē vires medias sortit. Ceterū vitum propriū ad aphonitru accedit, vitpote ex viatione tenuius redditū. Deficcet itaq; & digerit: q̄ si iusta corpus sumat, secat & extenuat crassos & lentos succos, multo potentius q̄ sal. Aphonitru verō, nisi grauis virget necessitas, devorandum nō est, nimirū inimicū stomacho: quando quidē plus etiā nitro incidit. Porro, ad suffocantes fungos, nitro viro simul & nō viro, & multo etiā magis eius spuma, vti cōsueimus.

Nitrum.

Aphonitrum inimicum stomacho.

Melauteria.

Valde quidem astringit, astringentiāq; omnis propemodum tenuitate superat.

Melauteria.

Melan graphici, Atramētū scriptorium.

Admodum & ipsum deficcet aqua solutū. Vlcera autē igni ambusta prorsus illum iuuat: & si acetum quoq; habeat, multo magis.

Atramētum scriptorium.

Misy.

In metallis ipsa, super chalcitū nascitur misy, vt ærugo super æs. Ac suspicor etiam fori longo tempore mutationem in chalcitū posse accipere. Quare mirum non est, tria hæc medicamina eiusdē genere facultatis esse, fori dico, & chalcitū, & misy, tenuitate & crassitudine inter se diuersa. Crassissimū enim est inter ipsa fori, tenuissimū misy: mediam vtriusq; facultatem habet chalcitis. Advrsū vniuersa hæc tria, & schiacæ efficiunt. Atramētū nonnulli etiam astringūt. Ceterū misy ad morū corporibus duris, minus chalcitide mordicat, tamen ea nō minus fit calidum: id quod beneficio tenuitatis fortitur. Porro cum vtrāq; hæc in decoctionibus fundantur, & magis chalcitina q̄ misy, fori tamē nō liquefcit: nimirū quod lapidosius fit, & vehemensius cōstitutum: sicut rursus misy, quia d congenito calore elaboratius est, ac proinde & siccus chalcitide, idcirco merito quoq; liquefcit ægrius.

Misy. Arrugo. Fori. Chalcitis.

Molybdæna, Plumbago.

Similē lithargyro vim possidet, tantū d mediā tēperie & frigidus paulū quid recedat. Sed neq; abstergentis facultatis est particeps. Vtrūq; autē medicamētū liquari potest, celerimēq; ubi cō nō nihil aceti est additū. Liqueant tamē etiā admissa aqua, sed cōctione lōgissima. Vidi quidē molybdænā proiectā plurimū cū multis aliis lapidibus, in ea via q̄ ad ergasteria ducit ad Pergamo.

Molybdæna. Plumbago.

Molybdos,

Molybdos, Plumbum.

Facultatis est refrigeratrix. Siquidem non modo multa habet substantiam humidam à frigore congelatam, sed & aëream: paucam autē terream. Igitur quod plurimum habeat essentiae humidae coactae à frigore, iudicium tibi esto, quod vbi admotum est igni, celeriter funditur suisque. Quod verò & aëre sit particeps, hoc habeto signum.

Omnium quae nouimus, vnicū plumbū tum mole ipsa, tum pondere augeatur, si condatur in vasis

subterraneis, aërem habentibus turbidum, ita vt quaecumq; illic ponatur, celeriter sitū contrahant. Iam verò si in mortario plumbeo liquorem quemlibet plumbeo pistillo contriueris, ita vt ex pistillo ipso, atq; etiam mortario exprimas etiam aliquis succus, id quod ex vitro consiliabitur, multū erit frigidius, q̄ liquor infusus fuerat.

Ceterū si vis magis refrigeratoriū medicamen efficere, oleum omphacinū, aut rosaceū, aut melinum, aut myrrinum, sit liquoris, quem infundes: eritq; remedium optimū ad sedis phlegmonas cum vlcerē aut rugis, & ad eas quae in pudentis, testibus, vberibusq; consistunt: similiter aduersus ceteras omnes fluxiones, quae articulis accidunt. Sed & viceribus rebellibus etiā vtile est. Nam ad caneros eo vtiens, virtutem medicamenti miraberis. Quod si celeriter multū succi plūbei velis colligere, conare in sole terere, aut quocumq; certē modo aëre excalcācto. Multo autem vtilissimum habebis medicamentum, si assu-

sio refrigerantium succorū aliquo teras, vt semperuius, coryledonis, iunibi, lactucae, conditiles, psyllis, omphacis, portulacae. In laminam etiā ductum plumbū, lumbisq; admotū, pollutionē per insomnia coërcet, nimirū haud obscurē refrigerans. Sed & bractea tenuis probe ganglio illigata, ipsum dissipat. Illigabit autem probe quisquis ab Hippocrate didicerit, in ipsam noxā potius firmandū, q̄ hinc vel inde. Porro plumbum vitum, ac dein ablutum, refrigerat, confertq; ad implenda vlcera, eadēque cicatrice obducenda.

Conuenit & chironiis dictis, & omnibus canerosis viceribus. Ante lotionē autem, viceribus pertinacibus enī auxilio est.

Ostracon, Testa.

Defaecandi abstergendiq; vim possidet, maxime quae ex fornicibus est. Ex qua quidem preparata emplastrum, optimē cicatricem inducit.

Pompholyx, Spodium.

Pompholyx fit & in aris fornace, veluti & cadmia: sitq; dum in fornacib. cadmia vitur, nimirum ab ipsa cadmia in tectum fornacis quadam fauilla ascendente, quae dum colligitur est pompholyx. Nam quod reflectens in paucum tempus recidit, nominatur spodium. Cui videtur similem habere facultatem, quod antipodium appellat. At ego illo visum sum nunq̄, cum largē mihi semper pompholyx suppetere. Nec enim quicquam vbi haec adsit, spodio vni veli, nedum antipodio. Est autem pompholyx medicamentū propē omnium quae circa moriū deficiant, si ciura fuerit, praestantissimū. Quamobrem ad vlcera cancrois ignea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; indistincte colligis quae ad oculorū imponunt fluxiones, colligis bullas in eis natus cu-

rant. Praeterea ad pudendorū & sedis vlcera optimum est remedium.

Sandarache.

Vrentis est facultatis, vt arsenici. Merito itaq; digerentibus facultatibus & extergentibus commiscetur.

Sandyx.

Qua sit facultate praedicta, in sermone de psimmythio explicabitur.

Scoria.

Scoria omnis reficaciorū est medicamen, potissimū autem ferri. Siquidem ad lauiorem redigens ipsam in aceto faciemus, postea decoquens, ad aures iam pridem fluxēs pure, ea vtor pro medicamento maxime exiccatorio.

Stimmi.

Cum facultate deficatoria habeat astrictionē stimmi adiunctam. Quamobrem & ocularibus medicamentis miscetur.

Stryteria schiste, & strongyle, & hygra. Alumen fissile, rotundum & humidum.

Alumen vehementissimē astringit. Ceterum cōm sit crassum partium, tenuius quodammodo est quod vocatur fissile. Proximum est rotundum, & astragalorum. Admodum crassum est tum liquidum, tum placent & plinthites dictum.

Tiranos, Calx.

Vina quidē vehementer vrit, adeo vt crustas efficiat: exuncta verò protinus enī crustam molitur & ipsa: at post diem vnum & alterū minus vrit, minūsq; inducere crustam potest. At verò temporis progressu prorsum nec crusta quidem gignere valet, ramentū etiamnum calciaat, carnemq; liquet. Porro si lauatur in aqua, suū mordacitatem exurit, efficitq; nuncupatum lixiuium. At ipsa absq; officio defecet.

Hydrargyros, Argentum vlium.

Non est ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex iis quae parantur: veluti psimmythiū, ærugo, pisorum, lithargyros. Ceterum Interimne deuorati aut admotum extrinsecus, nōdum feci periculum.

Phycos.

Facultatem eius, vbi de psimmythio agetur, Phycos exponam.

Chalcanthos, Attramentum sutorum.

Chalcanthos, qui in Cypro ex viridi quadā aqua concreuit, extrema sui parte in chalcitum temporis processu degenerat. Habet autem cum astrictione maxima, caliditatem non vulgarem coniunctam. Vnde omnium maxime condire feruareq; carnes humidas potest: nimirum caliditate humiditatem absumens, astrictioneq; substantiam contrahens, atque consipans. Constringit itaque, ficit, & contrahit in sese totius substantiam carnis.

Chalcitis.

Mistas habet astringentem acremq; facultatem. Ceterū vincit acris, vt pote adro vehemens, vt carnem vrit, necnō inducat elcharam. Vltimum hoc medicamen minus mordicat, nō tamen minus defecit. Verū non parum astrictionis remittit. Itaq; melior est vndequeq; chalcitis rursus aduersa, tum lota, cuius evadat sic minus mordax,

Molybdos.
Climbuz.

Plumbum vici-
ei mole & pon-
dere augeatur.

Plumbū mer-
curium effuso
ad conficiendū
medicamentū re-
figerantia.

Plumbū lami-
ne ad motū in-
bu nō tūm si
pollutionē coër-
cet.

Plumbū vitum
quibus cicatrē
afficit.

Ostracon.
Testa.

Pompholyx.

Spodium.
Antipodium.

Pompholyx qui
bus vitiis.

Sandarache.

Sandyx.

Scoria.

Stryteria.
Alumen fissile
rotundum.

Tiranos,
Calx.

Hydrargyros.
Argentū vlium.

Chalcanthos.
Attramentū sū-
torum.

Chalcitis.

Chalcos cecaumenos, Aes vltum.

Habet & acrimoniam quandam, sed & attritionis est participes. Proinde si laeuerit, pulcherrimum est medicamen cicatrici inducendae.

Chalco anthos, Flos xris.

Tenuioris essentiae est q̄ aut res vltū, aut squama. Quare ex eo factis collyriis extingunt, auseruntq̄ superciliorum magnas asperitates.

Chryso colla.

Carnem liquat, nō tamen valenter mordicat: 10 quāquam sit facultate admodum digerente, exiccantēq̄. Preparare autem hanc chryso collā debet tempore aestiuo, aut aere prorsus calido: vltimam pueri, mortario & pistillo, vtroq̄ ex rubro xre, contundens. Hoc medicamentum aprisimū est vlcibus conrumacibus, tum per se, tum alia mistū. Nam quāto plus q̄ chryso colla medicinali desiccet circa mortuum, tantō etiam ipsam excellit tenuitate.

Pīmmythium, Cerussa.

Si ex acri aceto soluat, gustu tamen neq̄ acere erit, neq̄ mordax, sed emplasticum, & refrigeratorium. Cerussa adyta, in sandya transit, medicamentum seipso tenuius, non tamen exallescens. Phycos autem seruata cerussae frigiditate, tenuitate assumpti.

Porcium.

Cōfiscitur dupla chalcite admista lithargyro: 20 antē tamē vtriusq̄ acerrimo aceto solute, sicut in ollam nouam coniecta, quam sūto x̄state media diebus quadraginta obrutam sepius. Hoc medicamē magis deficatoriū est, minūsq̄ chalcite mordax, cum partibus sit tenuioribus.

GALENI PERGAMENI de simplicium medicamentorum facultatibus, liber X.

Exposuimus igitur quinque commētariis prioribus, qualitates quas secundas appellant, in medicamentis quae effectibus 30 qualitatibus agunt, pro earundem effectuum specificarūq̄ qualitātū mīsurā nasci. Oñsensum prēterea est, quo pacto vniuersalis facultas vnicuique experientia inueniat: neq̄ ex vulgari, sed quae certis adhibeat limitationib. Porro in sexto, septimo, & octauo libro, materiis quae ad plantas pertinent, explicauimus: in nono autē, eam quae circa terrena & lapidosa versatur. Reliquū verō nunc est, vt eam quae ab animalibus sumitur, in hoc decimo persequamur materiā. Nam ad finē 40 vnde cui agemus de iis, quae proveniunt in aqua, nec plangi, nec terra, nec lapide, nec animalia sunt.

Hæma, Sanguis.

Pro natura animalū variat. Huic liquidū animalē est liquidior, siccor illi, calidior alteri. Nullus autem sanguis est frigidus.

Sanguis suillus.

Humidus & minus calidus est, temperie humano persimilis. Siquidem & carnes suum similes humanis existunt. Vnde quidam ad hospitibus prauis appositas, auidissimae humanas carnes ederūt. Etenim ex ipso sanguine, tum generano prima, tum postea nutritio ipsi carnis consistit. Itaque quicquid humanum sanguinem morbo alicui vtilem esse ait, in suillo primum id

comprobet. Nam et si aliquatenus inferior is sit humano, saltem a similitudine quippiam efficit: quo cognito, ab humano pleniorē fore vtilitatem sperabimus. Porro similia efficere posse similia, experti sumus. Nam colūba sanguinē, quī capitis ossa cōfracta perforat, in crastinum cerebrū ito lucrū effundere assolent. Quidam autē, cum nō esset columba ad manum, palumbi sanguine est vltus, feliciterq̄ successit. Alius turturē eidem ad vltum applicans, nihil hominē lēsat. Similibus siquidem ad eosdem affectus vtimur, vbi quae antea experti sumus non adfuit.

Hæma peristeris, Sanguis columbae.

Eo ad hypophagmatia in oculis confidentia quidā vtunt, venis ad alarū exortū in cūcise, quae sanguis calidus est, vt sic ad multo vltus idē perderet animal. Alij pullos teneros extraxerunt pennas, quae humore redvndant, in ipsū oculum exprimūt. Quāq̄ sunt nobis collyria varia 30 hypophagmatia oculorū aprissima, cuiusmodi est quod plurimū recipit myrrha, & quod multum thuris admittit: necnon quae ex croco constant. Quin & fœnigræci succus sanguini columbino in hoc vtriq̄ prae stat. Præterea sexcentos no-

ui eorum quibus Romae perforata fuisse capitis ossa, nec quicq̄ ab vltu rosae, circa sanguinē columbinū, offensus. Quare id calidū sit æque atq̄ colūbae sanguis, necesse est. Cæterū præter moderationē caloris (cuius forte cōtractū luat) leuiter enī astringit. Itaq̄ melius inueniēti nihil possis in capite plorato, q̄ vt probō rosaceo vltis.

Hæma nycteridis, Sanguis vesperilionis.

Si vbi hoc sanguine axillas illeueris, postea chalcanti non aut cicuta semen interspas, Xenocrates quidem ait, aut sub illis prorsum pilos vbi prodituros, aut certe lanuginosos. Alij verō & puerorū pudēs sanguinem vesperilionis illinunt, vt glabras illas partes cōseruent. Ergo ex refrigeratione parvis vehementer, eiusmodi quipiam posse cōtingere, nō est à ratione alienum. Nō tamen ad ed frigidā facultatē est sanguis vesperilionis, cum in totū nullus sanguis sit frigidus. Porro hordinū sanguinē seruacētū cum pa- 40 ri acen portione, hæmoptois iuuare prodidit enī Xenocrates. Quod remediū tūc experiri poteris, vbi nullum aliorū ad manum suppetet.

Sanguis viridum ranarum.

Cūm assereret quidam, illū hunc prohibitorum quo minus evulsi semel palpebrarū renascerentur pilī, falsum esse id experimento didici.

Gala, Lac.

Perfectissimū lac, nempe quod ab omni aliena qualitate est immunē (hoc est, odoris expert, aut exigui boni odorem referens, præterea gustu suae, pauculam habens dulcedinē: sicut & saluberrimus sanguis, ex quo & lacti generatio constat) ad acres & mordaces fluxiones est com- 60 modissimū, non abluens modō eas ratione feri ab afflictiis particulis, sed etiā ob pinguitudinē corpora illuens, vt nō in nuda cadat, quod desinit. Porro cū lac omniū alteretur facillimē, præsertim si ambiens fuerit calidus, multū à dicta facultate amittit, nisi protinus quibz ab vberibus effuso ipso calido vlt. Maxime igitur mulieris bene habet & bonā vltus rationē seruatis, lacte

Chalcos cecaumenos.
Aes vltum.

Chalco anthos.
Flos xris.

Chryso colla.

Pīmmythium.

Cerussa.
Sandya.
Phycos.

Phycos.

Hæma.
Sanguis nullus
est frigidus.

Sanguis suill.
temperie est hu-
mano persimilis.

Columbae na-
sum per cran-
q̄ fracturam.

Sanguis colum-
bae hypophag-
matia oculorū.

Hypophagmatia
oculorū quae cū reman-
ant.

Rosaceum cum
modo subdito
per cranq̄ fracturam
offensū nō minus calidus
sanguis colum-
bae.

Sanguis vesper-
ilionis.

Sanguis nullus
est frigidus.

Sanguis viri-
dum ranarū.

Gala.
Lac in optimo
nata.

Lactis vltus.

Lac alteratur
omnino facillimē.
Lac mulieris
est hominis fa-
miliarissimū.

lacte vtendum: nam id humano corpori est longē familiarissimū. Deinde aliorū animalū, quæ quidē ab humana natura nō longissimē abstant: id qđ scies ex carniū odore. Nam fastidiosus est eorum quæ multō diuersam habent temperiem, vt canis, lupi, leones, pardalis, vulpes, lyones, vt si, & similia. Non inuicundus est eorum quæ nō porrō abstant, vt fuis, capræ, equæ, bouis, ouis, & asinæ. Quocirca etiam homines docti experientia, caprino, ouillo, bubulo, asininūq; lacte vtuntur, & caseos ex eis conficiunt, excepto asinino. Nam id planē tenue est, & plenū humoris serosi, velvū bubulū crassum: ceterū consistētia mediū caprillū est. At fuis crudū aqueūq; lac obtinet. Iam vero lac omne ex tribus constat essentia, caseosa, serosa, & pingui. Hæc plurimam habere conspicitur bubulū, ex quo buryrū conficitur, facultatis cōcoquens & relaxans. Quare maxime illo vtuntur ad parotidas & bubonas.

Serum lacūs.

At serum extergendi potentia possidet, adhibeturq; subducendi ventris gratia, ac per clysteres inicitur, extergens & abluens sine mordacitate ac commotione interiorū. Præterea si quis vī cera quæ sanie infestā acri, vice aque sero colluat, optimē sanē fecerit. Quæcumq; etiam medicamenta digerere solent echymomata, & atra, ea præstat sero quā aqua diluere. At quod lacū calcosum inest, illud adhibet magis: ob idq; acrimoniam retūdit. Atq; vbi aliam quampiam dissicantem facultatem habuerit adiunctam, optimū est dysenteris remedium, & omnū ventris acrim fluxionū. Eam autē accipit a lapidibus, aut etiam ferreis cylindris, qui præ decoctio lacū iniiciunt igniti. Ferrum siquidem altissimē facultatibus etiam est parces. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium colliviorū quopiam, est vtile: præterea ad lypopia & hypophlagma. Quinetiam palpebris extrinsecus, vbi quæ ophthalmia laborat, somno sese dabunt, impositū simul cum rosaceo & ouo, phlegmonas eorum cōcoquet. Sed hoc est lac mulieris recens ex mammillis expressum. Infundimus ipsū & vtero exvicerato. Sic eo & ad sedis & pudendorū vlcera vtimur, & ad omnia breuiter, quæ leniri postulant. Ea propter & cancriosis applicat vlceribus, medicamentis anodynis commissum, qualia sunt quæ consistant ex pompholyge. Collutū etiam, omni phlegmonas mitigat: nec non fontillas, columellam, anuadas phlegmone affectas, ac proinde etiam anginam lenit. Est itaq; medicamen leniēs, totam quidem substantiam habens mordacitatis expertem, sed multo magis vbi concoctione moderata, potissima pars feri consumpta fuerit. Sic mihi videtur tunc medici ad venena quæ erosione intermunt, lac propinare: velvū sunt lepus marinus, & candelarii. Sunt etiam qui & merito id exhibent, nisi quæ aconitum & thapsiam deuorauerunt.

Caseus.

Vbi pinguitudo cum toto lacte concreuit, seroso duntaxat humore per coagulationē secreto, pinguis caseus efficitur. Qui quidē quālisq; sit, temporis spatio acutum acquirat, quam deprehendes gustu & olfactu. Ceterum impen-

sē acris in veteratūq; iam redditus, miseratūq; decocto sillarum carnum, rrophos arthritico-rum discunt. At recens caseus & mollis, mirē vulnera glutinat: nam repercutiendū vim possidet, leuiter nimirum refrigerat. Ceterum oxygala etius, præter lactē, digerendi etiam quandā vim lenem obtinet.

Buryrum.

Facultatis est cōcoquens, paulū etiam habens digerentis potentia, in mediis nimirū corporibus secundū duritiem atq; molliem. Nam corporum planē durorum tumores præter naturam, hoc nequit medicamen digerere. At quæ in molliibus sunt phlegmonæ, eas & cōcoquit & digerit facili. Nam parotidas, & bubonas, & oris inflamationes, prorsus illo solo curamus: nimis puerilibus corporibus, mulieribūq; eas perpetuentibus. Sed & gingiuis puerorū dentitionum assidue illitū, nililo imbecillus melle, extenuat exitū dentibus: ceterūq; omnes oris phlegmonosos affectus, posteaq; fluxio resisterit, digerit pariter, concoquitq; proinde cataplasmati inditur, quæ extrinsecus imponuntur parodontibus, hypochondriis, bubonibūq;. De vocatū etiam, distributūq;, magnificē confert expuitionibus ex pulmone, idq; in pleuritidis peripneumonicisq; affectibus: cum hoc quod eos etiam concoquat. Quid si solum lingatur, magis quidē concoquit, verū educit minus: sin cum melle & amaris amygdalis, plus educit, sed minus cōcoquit.

Pyria, Coagulum.

Coagulū omne acris & digerentis potentia est, atq; etiam excitatoris: nam necessariū id superiora comitatur. Ac leporis quidem coagulū comitialē morbum, si cum aceto bibatur, præterea profusum muliebre sanatur & proditum est: nec non coactū in ventre lac dissoluit. id quod nos sumus haudbreuē experiri, non solum in leporino, sed in aliorum etiam omnū animalium coagulo. Sed & sanguinem in ventre cōcretum simili modo eorum coagulum leporinū dissoluit, ac efficacius quidem ceteris: verū non in iolum, cum hoc omni sit commune coagulo.

Coagulum phocæ.

Hic nonnulli vires castori tribuunt.

Chole, Fel.

Hic succus omnium qui in quocūq; sunt animalū calidissimus est. Ceterū pro vana animalū temperie, calor eius variatur. Sunt autem in vniuersum quatuor in singulis animalū sanguine & preditorum humores: sanguis videlicet, pituita, & bilis tum flaua, tum atra. Verū dum absolute dicimus bilem, semper intelligimus flauam, quæ in icoris vesica colligitur. At ipsam flauam bilem interdum medicis pallidam nominant. Sciendū tamen est, flauā tantū esse pallidā calidiorē, quantū & crassiorē. Nam serosiocremento flauæ bili permisto, pallida constituit cōtingit: si vbi & flauam plusculum exaltatā, consistētia reddi crassiā, colore autē flauam. Quin & in animalibus apparet flaua quidem, his quæ magis sunt calida: quæ verō minus, pallida. Et vbi animalia calida, aut lame, aut sit torquentur, ad atram colorem vergit, interius illū habens eruginosum, exterius cinereum, interm accuratē fuscū. Porro vbi

Lac asinum
est plenum
humoris
serosi.
Lac bubulum.
Lac caprinum.
Lactis substantia
triplex.

Serū lacū quæ
per aqua.

Caseosa lactis
substantia vī.

Ferri facultas.
Lactis visus.

Lac callosum
anginam lenit.

Lac auxiliari
ad quæ venena
creduntur vera
runt.

Caseus.

Caseus in vtero
acutus est acutus.

Buryrū facili-
ter.

Buryrum exte-
nuat infensū
exitū denti-
bus.

Buryrum op-
eratur pleuri-
tidis expulsi-
onē efficit.

Pyria.
Coagulum.
Coaguli lepori-
nis facultatis
infensum.

Coagulum
omne dissoluit
lactē, & sangui-
nem in ventre
cōcretum.

Chole, Fel.

Humeri flauus
genua proditor
non amarus
conuulsi, quæ-
tor fuit.

Flaua bilis pal-
lida, & dyspep-
sia.

ocularia medicamenta præparant, callionymi, scorpij marini, hyænx, galli, perdicis, & aliorum quorundam animalium bilem admiscere. Quare color eius est explorandus. Iam verò taurorum bilis calidior & siccior est, quæ boum castratorum: nam castratū animal semper simile redditur formæ, & iis quæ sunt ætatis minoris. Itaq; ut hęc humore superat adulecta & perfecta, vincunturq; ab isdem caliditate: ad eundem modum bos castratus à tauris. Virgiter vrina à modica portione modicè pallere: & sitim famicq;, & multum laborem perpensis, flaua esse cõspicitur: impletis verò atque inebriatis, albicans: ita bilis colores mutat. At verò quod hic humor fit acris, hinc discas licet, quod reserat hæmorrhoidas, quodq; illis ipsis qui vruntur, mordicare percipitur. Ac proinde cauemus, ne ad alium morbū, aut symptomata, bilē vsurpemus solum, atq; per se. Quippe dum oculus ipsam accommodamus, miscemus illi tum mel, tum fœtuli succum, tum opobalsamū. Domesticarum suum bile (quæ imbecillima omnium, ac maximè aquea existit) vruntur quidam ad aurium vlcera: medicamento certè non reprobò. Cæterum vbi vlcus diuturnū fuerit, ac multam sanie & pus continet, etiā sicciorē bilem perferet, pnta ouum, quæ paulo est acrior: nulla: ita etiā magis caprarum, cui ad similia quodmodo est vrsorum & boum. At taurorū his valentior est: inferior tamen bile hyænarum: & hæc quoq; inferior bile callionymi, & scorpij

Castratorum animalis bilis sicuti sitim leuissima.

Bilis quoque passio accommodatur oculis.

Aurium parte sanant, quæ sitim leuissima.

Bilis differens pro animalis diversitate.

Hydros. Sudor.

Sal. salin.

Sudor eff. sal. fugiunt.

Sal. salin.

Sudor eff. sal. fugiunt.

Sal. salin.

Sudor eff. sal. fugiunt.

Sal. salin.

Sudor eff. sal. fugiunt.

Sal. salin.

Sudor eff. sal. fugiunt.

Sal. salin.

Sudor eff. sal. fugiunt.

Sal. salin.

Sudor eff. sal. fugiunt.

Sal. salin.

Sudor eff. sal. fugiunt.

Sal. salin.

Sudor eff. sal. fugiunt.

num miscuisse sufficit. Hoc medicamentū est admodum vtile, ad resurgendum & discutiendū lac à partu in mammis concreta.

Vrina.

Quanta est in animalibus bilis diuersitas, tanta item est in vrinis. Atq; omnes quidem facultates sunt calidæ, sed plus tamen animalium calidiorum, minus autem frigidiorum.

Vrina humana.

Hæc aliarū omnium est imbecillima, excepta illa quam reddunt porci domestici, quibus excēti sunt testes: quorum ut temperes, ita vrina similis humanæ existit. At montanorū aprorum valida est, ut vel ex odore acerrimo cõstat. Sed & in animalibus cæteris ex odore vim eius conicere licet. Nam degustare ipsorū vrinas, planè fuerit abominandū: cūm ne pueri quidem vrinam vir quidam honestus vita pariter & moribus, ebibere sustinuerit, etiā si pestiferè ægoraret in Syria, vbi multi ab humanæ vrinæ potione sese libera-
ros proficēbatur. Etenim vrina hominum, ut si quid aliud, exurgendi vim obinet: id quod facit fustiones indicit, qui sordida vestium expurgant vsu illius, atq; extergit. Quod cõspicati non ulla medici, ac piosæ & lepras deterguunt, profundūq; vlcera præhumida & sordida, multoq; magis cõputrescētia. Sed & puendis vbi sic afficiuntur, vrinā infundunt, & auribus pure fluentibus. Quin & achoras & furfures ea curant, caput idem idem perfundentes. At nos hæc facere odimus, cūm ad manū sint alia, quæ illis conducant, medicamenta. Quamq; vlcera digitorū pedis, maximè quæ ex illi fione infecta essent, sæpe numero, vbi careret phlegmone, & ipse vrina curauit: idq; in senis, & hominibus rusticis. Cæterum medicamentū quod ex vrina pueri constituitur, quod quidem Chrysocollam appellant, quia eo ad auri glutinationē vruntur, ad vlcera difficilia sanata omnino esse assero. Fir autē id, vbi in mortario artis rubei, pistillo etiā ex rubeo ære cõfecto, puerilis vrina tandem sub calido te-
lo tunditur, donec ob eliquanone attrituemque pistilli & mortarii, mellis crassitudine cõtra-
hat.

Sielon. Salua.

Ut vrina & bilis, sic etiam salua, sumpto quidem cibo, imbecilla est: valida & acris eorū qui in genti aut siti, aut inedia premuntur: in medio viri usq; est, eorum qui probè coucoxerunt quidem, nondū tam en cibum potumve hauserunt. Hæc ergo salua nurrices pueri lichenas curat, parū videlicet digrum rigantes, ac deinde eam affectum cõfricantes. Sed & triticum mandentes rusticiorum pauci furunculi imponunt: nam celeriter eos digerit, concoquitque: cūm si maceraret aqua, non atq; prodesset. Ex quo liquet, salutem suauē robur adferre. Atq; corāporibus mollibus, aut pnciorum, panem, ad triticum, imponant ore comminatum. Porro romanis omnia digerant & fugillata, & cætera etiam chymomata omnia, maximè vbi panis simul cum pauco radicle fuerit cõmanus. Iam verò vniuersa substantia sua vel maximè aduersa est salua bethis hominem interficiētibis.

Stercus caninum.

Stercus omne vim maximè digerentem obtinet.

Vrina omnis facultate est calida.

Vrina humana potione multis suis liberat & pestiferis morbo proficit fuit.

Vrina humana facit.

Vrina humana potione multis suis liberat & pestiferis morbo proficit fuit.

Vrina humana facit.

Chrysocolla facit ad ratum.

Sielon.

Salua leuissima ventriculo ad qua cõferat.

Triticum man si furunculi quæ celeriter concoquit.

Salua humana aduersatur bethis hominem interficiētibis.

net. Ceterū canis, qui solus ossib. fuerit integrū
biduum nutritus, durum, candidū minimēq. fer-
retur stercus est: quod quidem excarnat, red-
dūmque in pollinem, ad anginam, dysenteria, &
summe in veterata vlcera optimē accommodatur:
Ad anginam quidē, is mittitur, quē alioqui huic
affectui conveniunt: ad dysenteriam autem, inie-
ctum tacti decocto, & quod filices candētes, aut
cylindros ferreos extrinxerit.

Stercus humanum.

Stercus pueri siccū, & cū melle Arico ad leu-
renā tritū, illitūmque, sanat gutturia phlegmonas.

Stercus lupinum.

Quidā lupinum stercus candidum, quale vbi
ossa ederint, lupi solent excrevere, quidēq. nō de-
didisset in terram (lupi enim vt canes suspensio al-
tero posteriorum citurum, & melius & caciē, in-
dūmque quopiam ex terra loco) aut vino albo,
aut aqua dilūtemperatum, colicis potandum da-
batūque tantum in ipsi paroxysmis, sed etiam io
intervallis, si quidem vacaret phlegmonē felici-
simēq. cedebat illi negotiū. Verū illud etiā in
eo mirabar, quod vel appensum illis vinculo co-
fecto ex lana ovis ā lupo lanatæ, aut ex ceruina
pelle, evidenter aliquoties luisset.

Stercus caprillum.

Omnis crederimē vimur caprillo stercore,
digerentis & acris facultatis: adeo vt induratis
scirrhorū in modū tumorib. congruas, nō tenus
modō, sed etiam aliārū partib. Mittere in illi so-
lemus farinā fabaceā, necnō oxycratum. Quis
& ad aquam inter cutem, & ad spleneticos, variē
caprillo stercore vimur. Sed & vitum tenuioris
quidē essentia, verū haud manifestō redditur
acris. Quamobrem sanē ad alopecias congruit,
& omnia vicia, quæ extergens medicamentā po-
stulat, vt pŕora, lepras, lichenas, & hoc genus
alia. Miscetur & digerētib. cataplasmatis, quæ-
lia sunt quæ accommodantur ad paronidas, & diu-
tiores bubones. Est enim vis eius tum viti,
tum non viti, absterforia & digerēs: nec eam par-
um habet digerendi potestatem. Nam eo etiam
ex aceto quidā medicus utebatur in agris ad vī-
perarum morsus, ac multo magis aliarū bestia-
rum: ac profectō ex illis complures seruavit. Idem
etiam ad viruliginē spyrrathos ipsas propinquit
ex vino: & ad profluuiū muliebre cum thure ap-
posuit. Acris tamē est medicamē, quim vt mu-
lires vrbanaa, aut pueros, aut omnino qui tene-
ra sunt carne, sanare possit. Iam verō animalū
temperatura siccioris, excarnatis stercus assic-
catū & calidiorum, magis ex calidioribus. Verūm

nullū omnino stercus refrigerat, sicuti neq. viliū
humectat. Pro natura etiam eorū quæ eduntur,
nulla reperitur diuersitas. Proinde in hominib.
trialior est, quā in ceteris animalib.: quando-
quidem hoc animal diuersisimē maximeq. vari-
us vitur cibis.

Stercus bubulum.

Facultatē habet elicicatoriā, atq. attractoriā
etiam, vt sanē ostendit, dum apī, vesperūq. mor-
sibus auxiliatur. Quidam autem medicus aqua
inter cutem laboratē bubulo stercore oblinēs,
in solem exponēbat. Idem parib. vāsticorum
phlegmonē obfusa, humidum illud vere colle-
ctum, dum herbam bouē pascunt, admo-uit

Est em id moderatius alio, quod ā paleis come-
stis excernatur: ac prouide accommodatius ad
phlegmonas. Stercus onilium.

Ille idem medicus, cuiū utebatur stercore ad
sacrochordonas, & myrmecias, & rhymos, & su-
rūculos durōs, aceto videlicet diluens. Quin &
vicerum ambula, ad cicatricem illi ducebat, id
cerato rosāco commiscens.

Stercus columbinum.

Stercore columbarū nomadū siccō, trito & cri-
brato, vni cū nasturū semine, vice napyos vtor
ad ea quæ rubrificari postulat: nēpe ad omnes in
veteratis affectus, cuiusmodi sunt coxendix, he-
matica, scotomara, vertigines, cephalæ, & in
lateribus, scapulis, ceruice, ac lumbis, antriqui do-
lores: necnō nephritides, affectus collicis, & po-
dagricæ arthritides, quando in articulis nondā
concreti sunt topi. Est autem hoc stercus minia-
mē faciendum, præcipue si sit ascraftum:

Gallinaceum stercus.

Tritum, propinatū cum tribus quatuorve
oxycrat aut oxymelitis cyathis, coacteliter in-
nat, qui ā comestis fungis anguntur: nimirū
per vomitum crassissimos humores eliciēs. Est autē
hoc stercus minus calidū columbino. Porro vt
animalia quæ excruciantur, oīsiū sicciora sunt.
& quæ cibā videntur calidioribus sicciorib.que,
is quæ frigidā atq. humidā: sic etiam eorum &
excremēta, & partes. Quare columbarum dome-
sticarū stercus multo imbecillius est eo, quod ā
montanis excernitur. Gallinarum præterea quæ
conclusæ feruntur, & forsuribus aluntur, longē
etiam infirmius stercus est, quā earum quæ in
agris poscuntur.

Stercus anserinum, & elconiarum.

Anserinū stercus præ nimia acrimonia in vtile
est. Colligo etiā ita esse & accipitur, & aquilariū.
Sunt qui elconiarū stercus morbo comitali me-
dici scriptit. Quo epoto credulus quidā nihil
aduersus est. Stercus murium.

Sic em & murū stercus alopecias curare pro-
ditum est.

Stercus crocodilorum terrestrium.
Crocodilōū terrestrium stercus, & sturnorū,
quom solam oryzam ederint, vtriusq. ulstergen-
di, desiccandū moderatam facultatem fortitur:
ac multo moderatiorem sturnorū stercus. Por-
ro crocodilorum stercus, quod mulierum luxus
preciosum reddidit, vt ā facie ephelū tollit, ita
ad viruliginē, & lichenas.

Rhypos, Sordes hominum.

Quidā auris sordes paronychis sit vnus, pro-
ditum est. Quæ verō in torā cute provenit, illius
sordis quam paron vocant, nonnihil actionem
adiuvat: vt pote desiccandā vim habens, cum nō
nulla caliditate. Porro ea sordes quæ lanis oīsiū
inhiæcet, ex qua ascypon constat, similē butyro
concoquendi vim possidet: paulum etiam dige-
rentis facultatis fortior.

GAL. DE SIMP. MED. FACULTATIB. LIB. X.
de simplicium medicamentorum facultatibus, liber X.

Præter partes sunt animalib. vniuersis co-
munes: nulla tamē est aquæ cōmonis vt ca-
ro: hanc enim habet omne animal. Ceterū

*Caro proprii
qua dicitur
Terentia.*

eam quæ reperit in multis, solam Medici carnis appellationem dignantur. Nam carnem viscum nonnulli parenchyma vocandam censent, propterea quod venis ciliis sanguis, circum vascula omnia (ut ipsi arbitrantur) concrevit. Sed nos nominum contentione neglecta, persequamur proprietates particularum.

Caro viperæ.

Non omnes animalium carnes hominem nutriunt, sed quorundam etiam letales sunt. Tum inter eas quæ hominē nutriunt, quædam tantum sunt nutrimentum, quædam etiam medicamentum. Nam viperarum carnes palam videre est exsiccantes & exulcerantes, ubi coniunguntur, seu anguilla, oleo, sale, anetho, porro, & aqua: horum omnium seruat modo. Quod autem totum corpus per cutim vacuent, vel hinc tibi discere licet, quod elephantici quidam prorsus sint restituti, ac potu vini, in quo viperæ quædam fuerat extincta. Præterea nos elephanticum quendam, misso prius sanguine, atragylle medicamentis purgata, viperis quas capiebat uti iussimus, præparatis in olla, anguillarum more. Atque ita sanatus est, evaporato per cutem affectu. Porro viperarum caro adeo valentem obtinet desiccandi vim, ut quidam quæ eam edunt, vehementissimè fuerint siti cruciati. Quæ obrem eas dipteras nominant. Sunt tamen quidam demones à viperis satari potu non posse, sed disrupti potius à liberari sint. Cavendum autem est, ne in locis maris, proximus, sanguinolentis, venemus viperas, seu ad eum, seu ad Theriacis antidoti præparationem: quum venisimile sit, earum quæ in id genus locis capiunt, carnes falsas existere. Siquidem cum cibis etiam animalium mutantur carnes. Porro quoniam ex more dum artifice Theriacis paramus, non tantum caput, sed carum etiam caudam absumimus, subit mihi frequenter rationabile fortassis esse, caput quod totum abili, ob venenum quod ore continet: verum à ratione alienum esse, adimere & caudam, Theriacos aut ipsos artifices sic præparamus. Purgatas illas in aqua cum anetho elixamur tandiu, donec à carne separari facile possint spina. Mox pani purissimo, probe cocto in cubano, salisq; & fermenti quod sit satis haberi, ac breviter resiccato, & ad leuorem trito, necnon macerato cum ipso viperarum decocto, carne prius in mortario tuam micemus. Postea vero paruos artifice singentes, atque in edibus calidis & siccis siccantes, in talibus eos tandem reponimus. Hos ergo ineunte ætate coëscimus, sicut & salis ex devitis viperis, quo consensum tempore optima ipsarum est caro. Vitum eis postea cibus denuo & cibus, rursum ad leuorem redactis, adiciunt nonnulli & falsis, ad suavitatem compositi, cuius etiam ali quid ipsi theriacis iniicimus. Itaque caro viperæ siccat, valentiusq; digerit: exsiccatur verò mediocriter. Propter enim vis eius ad cutem, per eam videlicet, quæ in corpore sunt recrementa exigens. Quibus igitur copia mali succi in corpore abundat, in pediculorum numerosa multitudo exortitur. & à cute cæ quædam squama abscedit, deciditq; cuticula exirent, ad quam vitæ solent si sit crassus terrosus humor: à quibus sanæ spora, lepro, & elephantis nascuntur. Quod autem ad animalia cætera pertinet, proportionem quæ in tem-

peratura excedunt, & carnes quoque eorum differunt atque exuperant. Proinde talium animalium carnes perperam exulbere oportet, quale volumus corpus humanum reddere. Nec parva exiit carnium differentia, dum quædam sale coëscimus. Nam interdum animalis temperie humidissimi caro saluta, longè exsiccantior evadit ea, quæ sicca natura existit. Verum inter eas quæ salute non sunt, siccior est asina, quam quæ in aqua est elixata. At verò caro mustelæ arefacta, valenter digerit, deficatur: proinde morbo comitali afflicto iuvare epota. Salitum etiam asinæ carnem ad leuorem contritam, palos & spicula educere auit, impositam: sicut & mulorum carnem viceribus à mordente cane infectis congruere. At cochleari caro, prius in mortario coctus, ac postea ad leuorem redacta, omnium valentissimè deficit partes superfluo humore grauatas, aded ut conveniat hereticis. Ipse autem humor solus, thuri, aur aloë, aut myrrhæ permixtus, quoad ceratū accipiat crassitie, medice amè sit tenax, defecaturque purulenti aurii humoris. Sed & frons impostum hæret, oculorum fluxiones exsiccans. Quidam etiam ad palos eximendos vultum totum vernæ testis, ad liquoris tritis: alii ad sistendos menses. Carnes etiam solæ cum farinæ polline tritis, contusorum vulnera glutinant. Ipsa cochlearum humiditas pilos superciliorum præter naturam habentes glutinat.

Pinguedo & adeps.

Differt à pinguedine adeps, quod crassior sit ac propterea animantibus totam naturam terrosiorè habentibus, ut bobus & capris, adeps provenit: humidioribus autem, ut suis bene habitis, ipsa pinguedo. Proinde pinguedo celeriter in igne soluta colliquefacit: nec facile ubi semel liquata fuerit rursum concrevit, aut coagitur. At adeps nec facile fundit liquefitque, & rursus celeritè coëscit. Porro adeps suillus, aliorum ornatum est humidissimus, ob idque actione sua vicinam oleo vim possidet: quam quod oleo magis rum emolliat, rursus coquat: quam ob rem cataplasmatibus que ad phlegmonas accommodari solent, miscet. Qui verò mordicationes præcipiunt aut in recto intestino, aut in collo, his porus caprillum adipem quam suillum iniicimus: non quod plus acrimonia obrudat, sed quod coëscat citius, suillus autem instat olei defluat. Quare caprillus potius dysentericis & tinea morosis iniicitur, quod morium eorum mingere est consilium. Quamvis quoque tenuitè essent: nonnulla magis acrimonia retundunt, ubi in alto mordicatione corporis, quod mole sit est, hæserit. Hæc ratione adeps asinerum magis obtundit quæ in alto corpore mordicit: præterea suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinaceorum & gallinarum adeps. Porro calidior semper & siccior est masculorum animalium adeps: & horum ipsorum ex ceteris minus rum calidus, tum siccus: quippe mas castratus eiusdem semper generis faciemur assimilatur. Omnis igitur pinguedinis facultas est humefactoria & exsiccatoria humanorum corporum. Ceterum pinguedo sua, ut ad nos quædam, largius humefactore potest, sed non quæ exsiccare, sicut neque oleum: talem quippe caliditate obnnet, qualis spectat in nobis. Taurorum adeps suillo multo calidior & siccior

*Carnes esse
sicciores sunt
ob id
humefactores
carum &
pinguedinem
adulterant.*

*Cochleari car
ne, & succo,*

*Pinguedo
adeps.*

*Dysenteria
ad
vulnere capri
lumi adeps.*

*Adipem
differt
suillum.*

*Castreum ma
sculorum simile
novo siming
assimilatur.*

*Carnis viperæ
facilis & con
sumenda me
dus.*

*Elephantico
curatio.*

*Viperarum e
ssentiam anas
mam capere.
Viperæ car ap
plicatur dysen
terici.*

*Carnes anima
lium cum cibis
mutantur.*

*Viperæ caput
ut candens ab
utroque sporte
ad confectum
artificis thera
ciæ.*

*Artificis thera
ciæ confusio
viperæ.*

*Carnis viperæ
virtus.*

*Elephantico
symptomata.*

*Elephantico
symptomata.*

ficcior est. Sic & adeps vitulinus taurino minus
tum calidus est, tum ficcus: & hordorū quā ca-
prarum. At caprarū minus quā hircorū. Rur-
sus taurorū minus q̄ leonum. Nam horū adeps
omnium propemodum adipe potētiū digerit:
quippe & caliditate exsuperat, & partiū tenuita-
te. Quare nimis vlcera & phlegmonas irritat. In
veteratis tū tumoribus, atq; scirrhi in morē du-
ratis, tū neruorū curuaturis aptissimus est: in q̄-
bus sanē suillus videt minimē efficax. Taurinus
autē quāto calidior ficiōrēq; suillo est, tantō suspe-
ratur ā leonino. Itaq; tanquam in medio consti-
tens, merito vtriq; medicamentorū miscetur ge-
neri, & ei scilicet qd scirrhis medet, & ei quod
phlegmonas ad suppurationem perducit: cuius-
modi est tetrapharmacū, ex cera, resina, pice, &
adipe cōstans. Verū omnibus quib. caro est mol-
lior, adeps suillus conuenit magis. Duram autē
& ficcam habentibus, taurinus. At verō adeps
dum inueterat, seipso & calidior, & acrior, &
tenuior efficitur: ac proinde valentius ficcas &
digerens, id quod omnibus in vetera scenn. ac-
cidit, nisi interim computrescant. Porro vrsorū
adipem alopecias curare verē est produrum: quā-
rā tam ad eum affectum probatiora remedia ha-
beamus.

Myelos, Medulla.

Vim habet corpora indurata & scirrhusa emol-
liendi. Optimam semper sum expertus ceruinā:
dein vitulinā. At hircorū & tanrorū, tum
acrior est, tū ficiōrior: itaq; durities scirrhisas mol-
li nequit. Est vitulina igitur & ceruina pessi cō-
ponuntur ad emolliēdos vteros. Et extrinsecus
vteris medicamenta imponunt, quę ex medulla
parantur, vim emolliēdi habētia. Accipitur autē
non solum medulla ex ossibus, quę sanē reuera
est medulla: sed ex spina etiam, quę tū durior, tū
ficiōrior est altera. Vtraq; autem hyeme collectā,
in ficca editaq; domo cum solis lauri siccis repo-
no, ne videlicet cōputrescat. At si quādo ambien-
te existēte calido, austrinōq; medullas aurā dispē-
velis reponere, vteris ad id cubiculo quammaxi-
mē fieri poterit temperato, quodq; ad aquilonē
obuersum, apertas habeat paruas fenestras, vt
perpetuū flatus inspirantes excipiat.

Caput mœnidum.

* Mœnidū sale inueteratū capitibus vtrius, ad
sedis fissuras vtebatur quidā: & ad columellam
dū indurata. Videtur ergo vtrius illarum esse de-
ficcatiora, non admodum acris. * Nam vt acrimo-
nia ad vtrarum nonnullis inest, sic omnibus
vtrius exuccandi.

Caput leporinum.

Alius capite leporis vtro vtebat ad alopecias
cum adipe vrsino.

Caput saurum.

Sauri caput contritū quidā palos & spicula
extrahere prodiderit memoris: tū myrrecias,
acrochordonas, & clauos eximere.

Cerebrum leporis.

Id attritū & esum, vtile dicimus esse pueris den-
tiemibus. Quiddā etiā ad versus tremores vtiliter
edi cerebrum hoc prodidere.

Cornua ceruina & caprina, vitæ.

Dentes candidos reddūt, fluidiq; gingiuas cō-
trahunt. Quod si ceruinum ab vtriuscūq; laetura,
dynteriam, & sanguinis excretionē, præterea

cerliacos affectus sanat. Aurigini etiā dicitur id
esse vtile. Ex quo quiddā duo exuberi cochlearia
ad oia ista præcipiunt. Quiddā etiā ipsum miscue-
runt collyriis deficiētibz oculorum fluxiones.

Pulmo agninus & porcinus.

Intertrigines ā calcemēns curare credat. At
vulpinus si bibatur ficcatus, asthma coniuuat.

Lecur canis rabidi.

Si assum edat, remediū existere iis q ab ipso ra-
biente cane fuerint emorſi, quibuscūq; peditū est.

Lecur caprinum.

Quidam ipsum affantes, sanicēq; excipientes
fluentem, ea vtruntur ad nictalopas. Vaporē autē
eius, dum elizatur, oculis apertis excipiendum
præcipiunt. Quin & assum si edatur, & ad cōsidē
affectus ā commodari aut, & eos qui comina-
li morbo sunt obnoxii, coarguere. Idem potest
hircinum hepar.

Lecur lacertæ.

Erosiō impoſitum dēmbz, eos dolore libera-
re nonnulli scriptis mandantur.

Venter mergi.

Qd de hoc & de interna tunica vētriculi gal-
linarum produrum est, id vanam esse promissio-
nem, comperimus.

Castorium.

Testiculos castoris, vocāt castoriū medicamē-
& celebre & multi vſus. Evidenter siquidem cal-
facit. Quum autē calfaciētia omnia, quę cōstent
tia sunt ficca, vbi cōtractæ substantiæ quippiū dige-
runt, continuū etiam illa deficcant: manifestum
vtriq; est, castoriū etiam deficcare haud obſcurē:
id quod illi cum multis est medicamentis cōmu-
ne. Quia verō impēſt ſub ſilium est partium, ob
id plus valet quā alia, quę ſimiliter vt ipſum
tum calfaciunt, tum ficcant. Nam quę tenuum
sunt partium medicamēta, iis quę sunt crassiōra,
efficaciora sunt, etiam ſi parem ſortita ſint ſcalu-
tatem: nimirū quia magis penetrāt. In cōuulſio-
ne igit ā plenitudine, quę in neruis est, orta, & bi-
bendum castoriū exhibe, & cuti foris etiam im-
pone. Vbi verō ex ficcitate nimia cōuulſio obve-
nerit, ſcito hoc medicamē illuc eſſe ad verſuſimū.
Ad eundem modum iis qui præ plenitudine aut
tremūt, aut ſingulorum patiuntur, est vſuſiſimū:
ad verſuſimū verō iis, quibus id ab inanitione,
aut acrim humo rū morſu accidit. Vbi itaq; ex-
calfaciōne, aut reſiccatione, aut vtriq; ſimul a-
ctione eſt opus, maximū in vſu caſtorij expre-
re commoditatem: nec vſam parti alicui noxiā
aſſeret, poſſiſimū ſi homo nō febricit, aut febrim
non admodū calidam perpenatur, ſed tepidam,
qualis maximē in cataphoris & lethargis acci-
dit. Ac multis ſanē caſtorij vnā cū pipere albo,
vtrūq; meſura cochlearij, ex melicrato propina-
uimus: nec quiſquā vſam percepit noxam. Sed
& retentis menſibus, vbi per venam quę in talo
eſt, modicē euacuatiſſimū ſanguinē, obſolato caſto-
rio vnā cum pulegio, aut calamintha, ſemp me-
dicamē hoc ſum expertus purgationē ciere, citra
vſā aſſumentis leſionē. Præterea locos morſites
euiat: erig oſa ex melicrato potū efficit. At quib.
ab occaſione frigida ita venter ſtatu diſtenditur
vt ægrē curationē admittat, eos ex oxycrato po-
tum caſtorij a diuauat. Quę porro inuāt in cor-
pus intro ſumptū, iis prodeſt quoq; cuti impo-
BB 11

Myelos,
Medulla.

Medullas repo-
nendo rati.

Caput mœnidū

Caput leporis.

Caput ſauri

Cerebrū leporis

Cornua cerui-
na & caprina
vitæ.

Pulmo agninus,
porcinus, vulpi-
nus.

Lecur canis ra-
bidi.

Lecur caprinū.

Lecur lacertæ.

Venter mergi.

Castoriū.

Lethargicorum
fibris eſſe ſepa-
ratū.

Menſes educen-
do rati.

strum, cum Sicyonio, aut veteri oleo. Quæ verò ampliori calore indigēt, is etiam per se inficari debet. Iuauat etiam, si quis fustis eius prunis impositis, inspiratione lauiat: illos præcipue affectus, qui in pulmone consistunt, aut capite Atta mē letiargicos & cataphoricos affectus, q̄ quidem habent adiunctā febrem, præstat non dicto rum oleorum aliquo macerantes curare, sed potius ex rosacro capin colligē imponere.

Lumbi scincorum.

Scincorum lumbi. Quæ circa renes scincorum sunt, bibunt, tanquam pudenda intendere valeant. Contrarium aut moliri videtur semē laetucę porum ex aqua.

Vngues caprarum & asinorum.

Vngues capribus, asinorum. Quidam vngues caprarum devitos, mōxq̄ aceto perfusos, alopecuris illinunt. Itaq̄ fuerit & talis cinis facultatis excicatorius. Sunt qui combustos asinorum vngues cominales morbum curare dicant, si solcat assiduo bibant. Si verò macera oleo applicentur, digerere cheradas. Sed & ipsum cinerem, si sicus inspersus fuerit, sanare perniōnes.

Offa combusta.

Offa combusta. Admodū digerentem, exiccantemq̄ vim obtineat, maxumque (vt quidam ferunt) humana. Noui siquidem nostratis quosdam * combusta ossa humana potius exhibuisse, ac multoties sic epilepsiam & arthritum curasse.

Senecta serpenis.

Senecta serpenis. Hanc scripsere quidam in aceto bullitam, den 30 nium mederi doloribus.

Pellis ouina recens detracta.

Pellis ouina. Circūposita verberatis, eos die ac nocte vna perfrangat. Concoquit enī & discutit sub cute con cretum sanguinem.

Equeorum lichenes.

Equeorum lichenes. Eas aceto tritas cominales curare scriptū qui busdam est. Alij verò & ad cuiusvis ferę morium adhiberi consulant.

Tela aranæ.

Tela aranæ. Hanc scribūt nonnulli ad phlegmone tueri sum maz cutis vlcera.

Coria vetera vsta.

Coria vetera vsta. Eorū cinis excicatorius existit. Quare vlcera ex attritione, & ambusta, & intertrigines quæ in feminibus sunt, perfrangat.

Ostreia.

Ostreia. Ostreia quidā nuncupant testacea omnia: ostreum aut, vnam tantum testaceorum speciem.

Buccina & purpura.

Buccina, purpura. Buccinarum & purpurarū testa vsta, redacta que in tenuissimū pollinem (quod si tibi cōmune præceptum in testaceis & lapidosis omnibus) desiccandi vim obtinet, ac, pinde vlceribus malignis opitulatur: id quod etiam cōmune est omnium quę citra insignē morium vehementer desiccant: quippe quum alioqui fluxionum causa existant. Hoc etiam est omnium id genus commune, quod ex aceto, aut oxycrato, aut crōme lite, aut oxymelite, idonea sunt vlceribus putrescentibus.

Ostreia.

Ostreia. Ostreorum testa vsta similis est facultatis buccinarum testis, tametsi minus crassæ. Etenim oia id genus cogēdi quandā in se facultatē obnēt, per quam cōdensata eorum essentia, dura terro-

siq̄ sunt reddita. Quæ vbi perversionē possint, digerentē facultatem acciunt. * Quod si ea, vbi vsta fuerint, laueris, quicquid habebit igneum, in aqua ponit. Quare aqua sanē ipsa excalcificat cum tenuitate reddit, adeo vt putrefaciat interdum: reliquū verò terrosum, morfus experts efficiunt: maxumq̄ implēdis & cicatrice claudēdis humidis vlceribus auxiliatur. Caterum vlceribus, causis & fistulosis, fluxioniq̄ obnoxius vlceribus,

10 ex suo adipe in veterato toris circūpono ipsū: in sinū aut aliquid eorū quę talia carne implent, impono, quale existit diaphanes vsum. Quin & dentes splendiores testarū cinis efficit, nō tantum extergēdi potentia, sed & asperitate substantia: veluti & pumex, & testa dubiana. Verū in vstu eiusmodi, non est necesse quę sic vsta sunt admodum laugare, sicut dum inspergant vlceribus. Porro ex crescentiam medioerum extertunt, cōprimuntq̄. Ad hæc, vsta omnia id genus cum sale, dennum smegma efficacius reddunt, vt nō modō laxitatem molliemq̄ gingivarum deficiet, verum etiam vlcera putrescentia adiuuet.

Sepiæ testa.

Sepiæ testa. Sepiarū testa admodū laxa est, non vt ostreorum lapidosa. Itaq̄ adhæsiō illi cō aliis testis cōmuni est, vel vt & desiccatio: ceterum parium tenuitas eximia illi præ ceteris inest. Quocirca vsta ea vimur ad virgines, ephelim, lētes, & psoras. Quin & fossili salī mista, in oculis existentes vngues, & fycoses vocatas eliquat. At anteq̄ vrtur, dentib. splendorē cōciliat, & vlcera desiccant.

Opercula purpurarum.

Purpurarū opercula. Ea quidam prodidertunt memoriæ: turgidos lienes sanare: suffrit eas q̄ vteri flococanone periclitant, iuuare: præterea retentios euicere locos.

Lana succida.

Lana succida vsta. Idonee excipit irrigationes quę adhibentur contritis, aut quovis modo percussis, vt vultatem ex illis proficiscentem promoneat: idq̄

40 propter asypon. Lota verò, apta est humoribus qui irrigantur, excipiendis. Porro vsta vim habet acrem, pariter & calidam, vni cum partium tenuitate. Itaq̄ molles præhumiditq̄ vlcetum carnes celerimē eliquat. Inditur & in medicamentis desiccatoriū. Vrito eam tanquam alia plurima, ollā implens nouam, quam tegat operculū multitis foraminibus pertusum.

Pila vsti.

Pila vsti. Similiter vstæ lane excalcificandi exiccandiq̄ 50 possident facultatem.

Quorum facultates.

Oua partes animalium non sunt, sed proportionē respondent iis quę adnascunt. Sunt aut facta ad propagandē generis, perpetuatēq̄: ac sunt virilia, seu nūmentia. Porro ouorum album & tenue illud, quo item ad opthalmias vtitur, ex numero est medicamentorum minimē mordicanū. At vnam prauitatē solum panitur oua, quæ scilicet affert vetustas: eamq̄ facillimē effugias, si vtrius recētibis. Vtendū autem ouū symmetro temperie frigidius. Vtendū autem est ouū albumine, nō tantum ad oculos, sed ad alia omnia, quę medicamenta requirit suauissima: vt sunt vniuerū sedis & pudendorū vlcera cōstuma cia. Miscetur quoq̄ idonee medicamentis profluuiū sanguinis ex cerebri inuolucris reprimē-

Tela aranæ

Sepiæ testa

Purpurarū opercula

Lana succida vsta

Ostrea vsta

Lana vsta

Pila vsti

Quorum facultates

Oui temperies

Albumen ouū quibus assellum conficitur

Vitellus vul.

tibus, quæ nimirum citra morsum illinuntur, astringuntur. Ceterum & ipse vitellus a similibus est nature, ac proinde miscetur ceratis morbus expertibus. Verum quanto plus deficiant quæ sunt assa oua, tanto minor mitigandi vim obtinent. Miscetur & cataplasmatia phlegmonem extinguentibus. Item verò crudo roto ouo vitmur admisto rosaceo, ad palpebrarum, aurium, mammarum, aliarumque omium partium phlegmonas. Ad hæc, in aceto coctum ouum si edat, ventris fluxiones deficiat.

Oua vero ad que vitantur.

Ouum in aceto percoctum officinae dyfenteriae amittitur.

Ambullus vul. opuntiacus impostum.

Anacollema d.

Ouum forbile quod dicitur veniat.

Erinaceus. Erinaceus.

Cochleæ. Limacis.

Dysenteria e. primum modum.

Carcini.

Carcini vul.

Carcini.

Carcini vul.

Carcini.

Carcini vul.

Carcini.

Carcini vul.

Carcini.

Carcini vul.

Quod si etiam eorum quippiam, quæ ad dysenteriam aut colicum affectum conveniunt, adiunxeris, atque in igne modico, fumigis experte frixeris, edendumque ipsi præbeas, non minime sanè ita laborantes adiuveris. Ad ambullum etiam ouum est, protinus impositum, vitile siue quis seorsum albumen duntaxat ipsum molli lana excipiat: siue etiam cum vitello confundens, comiscipiat, applicet. Medio criter enim refrigerat, & citra morsum deficiat. Tale quum sit, & ad anacollema vocatur, quæ fronti imponunt, eo vitmur, & pilos palpebrarum agglutnamus: nimirum admisto idoneo rum quippiam, cuiusmodi est thus, potissimum pingue, ac non in veteratum & ficcum. Ouum igitur medicamentis quæ humilitates deficiant, aut elixi, aut assum, aut frictum, tanquam materia miscetur: iis verò quæ lentorem humorum in pectore pulmonis incidit, forbile id quod in aqua eaqvisq elixari debet, donec in calefaciat. Simili modo sumprum, gutturis, stomachi, ventris, intestinorum, atque vesicæ medetur asperitibus.

Echinus, hoc est, erinaceus, combustus. Erinacei utriusque tum marini tum terrestris corpus vitum, cinerem efficit facultatis tum extergentis, tum digerentis, tum extrahentis.

Cochleæ, siue limacis. Cochleæ si forte cum testis vrant, admixta galia omphacitide, similis pipere albo, mire, sunt dysentericis, in quibus vlcera coëputescere non ceperunt. Cōvenit autem ut pipere sit pars una, galli verò due, quarum cochlearum. Hæc ubi ad vinum leuigaueris, cibis inspergito, bibendumque aut ex aqua, aut ex vino albo & austero, præbebo. Ceterum absque galli mitione et cinis cochleas admodum reficantis est facultatis, obtinens item non nihil ex vitio ne calidum. Porro cochleæ quæ vitionem non sunt expertæ, si vasa cum testis trite imponantur, & toti ventri aqua inter cutem laborantium, & in articularum tumoribus, egerit quidem divelli poterant, ceterum impensè deficiant, vel si viscidus crassusque humor in alio cōtineat. Et sanè in hærere sinere oportet, donec spontè decidant. Idem faciendum in tumoribus ex icteru natis, difficili solubilibus.

Carcini, hoc est, canceri viti. Fluvialium cancrorum cinis, quam similiter prædictis exicatorius est: si bibatur, tamen pro prietate mirabilis est eius in iis qui à rabie canis sunt morbi, effectus: isque tum solus, tum cū gentiana & thure, multo præstior. At thuris partem esse vni oportet, quinque gentianæ, cancrorum decem. Ex quo quidam medicamine Aristionem Empiricum, cōcinitis atque præceptor meus, iis qui à rabido cane emorui fuerat, quod tidie dieb. quadraginta mensuram cochlearis magni cum aqua bibendam dabat. At si non protinus ab initio, verum

aliquot post dies, curâ cepisset demorui, tunc quid die duo cochlearia aque inspergebat. Ad ipsum verò vulnus applicabat emplastrum, quod ex pice brutia, opopanax, acerogis cōficiunt: habens picis libram unam, aceti acerrimi sextarium unum Italicum, opopanax verò uncias tres. Hæc itaque monita volui de canceris, quum nullus eorum qui vti illo medicamento fuerunt, exunctus sit.

Chelidonæ, siue hiruindines vitæ. Sed & hiruindinum cinete permixto meli permixti vntur, contra omnes affectus gutturis. Vntur & ad acuendum visum nonnulli hoc cinere. At aliquas arefactas drachmæ pondere bibendas exhibent.

Terreæ, hoc est, cicadæ. Cicadæ etiam nonnulli vntur ad colicos affectus, cum paribus numero paperis granis. Alij affas edendas offerunt, quibus affecta vesicae. Corydori, Galerita.

Galerita, avis illa pusilla, quæ in capite velviti galeri ex pilis habet constatur, in iure eluxa colicos adiuuat, velviti & ipsa herba corydalis appellata. Verum assidue eam simul cum iure esse necesse est.

Alectorides, Gallinæ. Gallinarum ius simplex retinendi vim possidet, vni gallorum subducendi. Concoquendi autem sunt cum sale diutissime.

Gale, hoc est, muscila. Eius cinerem cum aceto illium podagricos iuvare est proditum: ipsam verò arefactam posse comitialibus morbis.

Ranæ vitæ. Ranarum inspersum cinere sanguinis eruptioni mederi referunt: cum liquida autem pice sanare alopecias. Hippocampus.

Huius etiam cinerem alopecis prodesse est proditum, facultatisque exiccantis & extenuantis existere. Telline falsæ.

Salsæ tellinas vitas, adeo videntur efficere cinere autem, ut si cedria evulsos radices ex palpebris pulvis, instillatur in locum eorum renasci prohibeat. Intestina terre, seu lumbrici.

Cōtrita, nescitis quibus imponitur, mirum in modum ea prodesse est proditum. Præterea cum vino pota, medicamen esse monens vringi idoneum.

Cimices. Eas cum aceto bibulam, excite hiruindines autem: quas nos semper hiruindinum vitas.

Cancerum vitæ. Cui idoneis emplastris impositis, adeo scabros vngues educit, ut rotii cadit. Præceptorum meorum quidam, eorum nonnulli solet dyureticis medicamentis iniungere. At nonnulli solas alas & pedes intincit: alij cōtra. Ceterum nos toras indimus.

Porro aptiores sunt ex catharides, quæ invicem in frumto, iure transversum in alio cingula obrinet Buprestis.

Animal est catharidis tum specie, tum viribus simile. Pityocampe, Eruca picearum.

Eiusdem sunt facultatis. Salamandra. Salamandra cinerem quidam septicis, lepricis, psoricisque miscunt facultatibus.

Narce, Torpedo marina. Si applicet viua cui caput dolet, fieri potest ut dolore liberet similiter aliis quæ sensum obtemperat.

B B in

Morbi à rabido cane curandis.

Chelidonæ. Hiruindines vitæ.

Terreæ. Cicadæ.

Corydori. Galerita. Corydalis.

Alectorides. Gallinæ. Gallorum ius.

Gale. Muscila.

Ranæ vitæ.

Hippocampus.

Telline falsæ.

Intestina terre. Lumbrici.

Cimices.

Cancerum vitæ.

Catharides. Buprestis.

Pityocampe.

Eruca picearum.

Salamandra.

Narce. Torpedo marina.

Draco mari-
nus.
Trigla.

Mar.
Saur.
Mygale.
Scorpius.

Afalabota.

Afircum.
Cybus.

Pityocampe.
Vrta marina
Lepus marinus
Siphi.
Onyfi.

Volpe.
Hyana.

Oleum vulpis
summi canalis
in morbo arti-
cularibus.

Adarcion.

Aleyonioru fac-
calitate & fer-
mentis.

Draco marinus, & Trigla, & alia id genus.

Vivus etiamnum hasce animantes apertas, & protinus partibus affectus appositas, posse traditum est. Nempe draconem marinum in suum ipsius ictum impositum: similiter & Trigla in draconis: mures domesticos in ictum scorpi, veluti & sauram: mygalē in suum ipsius: & saurā Chalcidicam, quam ex vino bibendam prębent, tanq̃ suum ipsius morsum sanat. Porro ictus corporum suū ipsius morsum curare, si tritus imponat, necnon si assus edatur. Congruere autem aiunt & iis qui a vipera sunt emorisi: a falabota verō iis qui a scorpio. Referunt etiam & in Aegypti regionibus ascraftum afircum exhiberi iis qui a scorpio percussus sunt: & vocatum cibū, vnliter vulneri a cane infecto adhiberi. Ceterum in oleo frictus totis animalibus, ipso oleo vtebantur non stratiū medicos quidam: sed & superiorum nōnulli ad pilorum effluuium: nempe pityocēpis, vrtae marinis, lepore marino, & scolopendro marino: ad aurum verō dolore, silphus in oleo coctus, & iis quos Graeci oniscos, Latini multiplēdes vocant.

Vulpes, & hyana.

Oleum in quo eluxa vulpes est, nō est potērioris in digerendo facultatis, quim in quo hyana: quae si similiter in oleo eluxetur, oleum ipsum longē potēssimae facultatis in digerendo reddit. Talia autem medicamēta vim habent, ea quae in alio corpore delatiscunt, ad extimam cutem trahendi, atq; eo nomine quidocq; dolores sedādi. Quare qui vniunt vulpibus, & ipsi oleum digestorū efficiūt, atq; inde impletis eo alucolis, totos articularios in eos demittit, multro tempore inibi immorari iubentes. Ex quo fit, vt nō tantū qui circa articulos sunt tumores vacuentur, sed etiam vniuersum corpus. Vnde certē magnū cōsequi commodū, quum nihil praeerea amplius in affectas partes sit defluxurum, nimirum evacuato iam corpore.

Adarcion.

Essentia quidem sua veluti spuma est aquae salis coēcta, idq; circa arundines & farragines. Est autem acerrimū, simūq; calidissimū pharmacum: proinde & per se invale. Verū cōmisceri solet iis q̃ vim eius retundunt: sicut fit multro vtilissimū in iis affectibus, qui exalferi postulant, foris impositum. Nam id intra corpus sumi impossibile est.

Aleyonia.

Aleyonia omnia detergunt ac digerunt, qualitate habentia acrem & calidam. Est autē eorū vñū densum & graue, odoris prauū. Olet cū pisces putridos, spongia in specie simile. Alterū vero figura sōguscula, leue, & rarum, odorem habens similem phycis. Aliud tertiu vermī simile specie existit, colore purpureo, cōsistentia molli: vocant id Milecium. Post quē quartum, secundū quidem iam posito similiter & lene & rarum, verū lanis succidū simile. Deniq; quintū, extima superficie lgu, ceterum interna subtrāna asperum, nullius odoris, gustu tamē apparens acre. Quod sanē omnium aleyoniorū est calidissimū, adeo vt pilos devertere possit. Itaq; quū duo prima lichenas, alphon, pīscas, leprāsque adiuvant, praeerea autem splendidiore efficiant, idē pręsta

re non potest hoc vltimo loco positi. Nec enim perinde vt illa cutem duntaxat summā extergit, sed etiam exorat, ita vt vicera inducat. Porro quod tertio ordine recensimus, omnū tenuissimū est. Quare vitum alopecias curat illū cum vino, colore quidem fuluo, tenuitāmē essentia. Quartū autē euulsum cum hoc specie vires obtinet, verūm haud parum imbecilliores.

Sal.

Sal eiusdē genere facultatis est, sine fossilis sit, siue marinus: verūm hoc differit, q̃ salis ē terra effossi substatia magis compacta sit, ac proinde in eo maior partū crassities, & astringēdi potentia. Marinū itaq; assūsa aqua liquescit protinus: id quod uon accidit fossili. Similem species cum marino est qui in stagnis quibuscūq; salugnosia nascitur, sitate videlicet aquis ex iis ritu absumptis: cuiusmodi est Tragabius, nō procul a Sminthio. Igitur quum qualitas salis digerat simul, & contrahat contactum ab ipsa substantiā, aphronitum in hoc differt, quod in ipso vnum saporē exasperantem sit videre, quem vocat amarū, vim habentem digerendi, hand itē cōtrahendi, vtī sal. Nam luc, quicquid in corporibus humidum est, id totum absumit: & quod reliquum est substantiae solidae, astringētiōe contrahit: ac proinde etiam cōditura sua carnes seruat, & putredinēq; tuetur. Quippe quae putrescunt, excrementū humorem cōtinent, substantiāq; rum diuolutam, tum minimē cōpactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum inest superflua humiditas, ceu mellis optimi, & substantia solida & compacta est, vt lapidibus, ea vt putrescit est impossibile. Quare in iis salis non probatur vīus: sed in illis tantūm, in quibus suspecta est putredo.

Salis facultas.

Salis qualitas in facultate. Aphronitum.

Salis facultas.

Potredinam substantia. Putredine quae nuda modo posita.

Sal vitus.

Digerit quidem potēssimū, quā vīonis expers, quantō scilicet subnilius ipsius corpus accepta ab igne facultate, redditur.

Sal vitus.

Litrum, Natrum.

Ostensum est hoc medicamen in medio salis & aphroniti vires habere.

Litrum. Natrum.

Halos anthos, Flos salis.

Liquidum est medicamen, tenuissimū quā sal vīus: praeerea qualitatē acris, facultatēq; admodum digerentis.

Halos anthos. Salis flos.

Halos achue, Spuma salis.

Spuma salis est salis efflorescētia, multro tenuioris naturae, quā ipse sal. Quare & extenuare, & digerere q̃ ille multro plus potest. Verūm quod substantiae est reliquū, contrahere vt sal nequit.

Halos achue. Spuma salis.

Apholton, Bitumen.

Vnum & ipsum est ex iis quae in aqua marina proveniunt, & in alia quāpiam quae non est marinis dissimilis, vt in Apollonia Epiri, vbi reperitur hoc medicamen in aquis sponte nascētibz, veluti spuma quaedam inaequans. Quo sanē tempore est molle postea vero resiccatur, pice sicca durius efficitur.

Apholton. Bitumen.

Bitumen proveniens in mari mortuo.

Optimū verō bitumē in mari quod mortuū vocant, provenit. Cuius medicaminis vī est tū resicatoria, tum exsiccatoria in secundo excessu. Mentio itaq; vniuntur eo ad cruentorum vulnerum glutinationē, & ad alia omnia quae exuacari debent, ceu modica exsiccatione.

Bitumen quod in mari mortuo nascitur.

Spongos,

Spongia vlla.

Spongos, Spongia.
Spongia vlla, acris est & digerentis potentiss.
Vtebatur ea præceptorum meorum quidam ad san-
guinis eruptiones, quæ manuali opera indigent.
Porro admovebat eam partibus sanguine pro-
fluentibus etiam non ardentibus, ut & cruenta pars in-
ducere, & ipsum spongiæ corpus, seu operculum
adhereret. At vero spongia noua, non sicut lana
in linamentis, materia duntaxat est quæ humo-
res irrigandos excipiat, sed etiam manifestè defic-
cat. Quare vulnera glutinat, si aqua, aut oxycra-
ro, aut vino admoveatur imbuta: aqua sanè, quæ
antiqua est, longo spacio relinquatur.

Garus.

Garn.

Facilem habet admodum calidam atque siccam.
Proinde eo quidam ad vlcera vti sunt putre-
facta: tum dysenterici ichthia disijci iniciunt.

Halme, Salsugo.

Halme,

Salsugo.

Similiter garo ad putredines accommodatur &
ad ichthias & dysenterias inicitur. Etenim acrimo-
nia sua humores coxi infestiores attrahit: ob
idque per intestina evacuat: putrefacta verò vices-
ra in dysenteria colluit, & siccatur. Maxime tamen
salugine Galiorum silurorum & maxidum ad tra-
hia Medici vtuntur.

GAL. DE SVBSTITVTIS LIB.

substitutis.



Vbi sunt medicamenta dicunt, quæ
in alterius locum substitui possunt:
quorum sanè cognitio, plurimum ad
medendi vsum cõfert. Merumque si qui-
dam designati Medici vsus quæ ad morbum
exterminandum maxime expedire arbitrantur, ne
que expedites ea quæ similè ferè vim obtine-
nt, vice illorum assumi possunt, ægrius opitulati
nesciunt. Quod ne tibi aliquando contingat, en
subdime omnia pharmaca substituta, ordine li-
terarum disposita.

PRO

SVSTITVTIS

A Brotono
Abinthio. *nos.*
Acacia
Acoro
Aerugine
Amianto
Agallocho
Agarico
Aiga
Aloe Indica
Alumine
Amqui
Ammoniac thym.
Ammoniac Gale.
Amomo
Amylo
Amygdalis amaris
Anchusa
Aniso
Arace
Aristolochia ros.
Argemone
Armenio lapide

Origanum.
Abrpronum.
Succum lentisci.
Radice m. asari.
Atramentum satonum.
Aphronitrum.
Calamum odoratum.
Euphorbium, aut epithy-
mum.
Anchusam.
Aloes viridis folia, folium,
vel glaucium, vel finitum
vel Lycii, vel ceras-
sæ.
Salem fossilem.
Anisum.
Propolim.
Capitadocum saltem.
Acorum.
Gyrin siccam.
Abisinthium.
Hysanthum.
Daucum.
Sesamum.
Anisoplochiam longam.
Silybrium.
Atramentum Indicum.

PRO

SVSTITVTIS

Asbesto
Alpalatho
Alphodolo
Alaro
Alio lapide
Anupigmento
Balaustio
Bdelio
Bitumine
Bruna pice
Buccina
Buprestis
Buryro
CAdmia
Calamo odorato
Cancuri
Cantharidibus
Capparis radice
Cardamomo
Casia
Castorio
Cedria
Ceraunio
Cerauna adipem
Cera
Cervi cornu
Cerussa
Chalbano
Chamædry
Cicuta
Cinerule Cypria
Cinnabari
Cinnamomo
Climopedio
Cnico
Colocynthide
Colophonis pice
Corallio
Costo
Cotyledone
Crinanthemo
Croco
Crocomagmar
Crocodili adipem
Cumino
Cynobato
Cyperi
Cyphi
DAmasiao
Dauci semine
Dictamno
Diphyrg
Dorycnio
Dracontio
E Beno
Ebific radice
Elateris succo
Elleboro nigro
Eneaphyllo
Adarcem.
Ericis semèn, aut viridis.
Succum betæ.
Zingiber.
Gargem, aut salem amme-
niacum totum,
Bandaracham.
Malicorium.
Sphagnum odoratum.
Picem Brutiam humidam.
Picem in aceto seruata.
Oñreum.
Laser, aut liuridinem.
Lac babbalum coactum.
Lencographin Aegyptii.
Sphagnum.
Baccas lauri.
Pialangia.
Ericæ radicem aut myricæ,
Fructum myrti.
Cinnamomi semidum.
Sulphium.
Ladanum.
Lencographin.
Anfersis adipem.
Fabam hirsutam cum propo-
li coctam & tritam.
Caprinum.
Scoriam plumbi.
Sagapenumi
Lapathi radicem.
Semen coriandri.
Cinere foliorum oliuæ
Rosaceps patillos.
Cassie duplum.
Heliotropium.
Vitis semen.
Ricini semen.
Apothyma.
Moly, aut symphyrum.
Cedri fructum.
Anagallin.
Aphrodisiam.
Crocomagma.
Agallochum Indicum.
Canis marini adipem.
Brassicæ semen.
Solani vesicaria semen.
Juniperum vigram.
Caricam vigram.
Eryngium.
Sesemem.
Salsuam.
Pluridium lapideum.
Alicri semen.
Aron.
Lori arboris lignum.
Folli mori.
Eiusdem herbe succum.
Papiri radicem.
Potamogitonem.

PRO	SUBSTITUTES
Sesamoide	Amaranthi cremorem.
Sinapi	Nasturtium.
Sifone	Anisum.
Silymbrio	Ocimum.
Solano vesicaria	Semen solani hortensis.
Splagno	Iuncum odoratum.
Spondylis	Folia oliue.
Stercore vulturis	Columbinum stercus.
Stercore rurturis	Stercus columbi.
Stercore felis	Ichneumonis stercus.
Snbio	Aeris squamam.
Struthij radice	Ellebori nigri radicem.
Succo calpaii	Succum myrti.
Succo peucedani	Glycyrrhizæ succum.
Succorhododaphnes	Viscum quernum.
Succo cyrenaico	Synacum succum.
Succo papaueris	Mandragoræ succum.
Succo salicis	Hederæ uigræ succum.
Succo gallæ	Succum mori.
Succo panacis	Lactysaminum.
Succo polygoni	Succum plantaginis.
Sulfure viuo	Sandarachiam.
Symphphyto	Centaurium.
Seri	Lithiargyrum.

Terra Samia	Leucographen terram.
Terra cretria	Calcem Thebaicam.
Terra alana	Plumbaginem.
Terra aseri	Cimoliam.
Terebinthina	Mastichen.
Thaphæ succo	Chamaeleonis nigri succu.
Thymo	Saturiam.
Tirhymalo	Chamaeleon.
Thure	Ampelitin terram.

Verbenaca	Chamaeleucen.
Viola	Florem radiculæ.
Vino Rhodio	Austerum vinum.
Vino Falerno	Vinum Mendesium.
Visco quercino	Chamaeleonis albi viscum.
Vulpis adipem	Vrsinum adipem.
Vulturis stercore	Columbinum stercus.
Vua domestica	Pulpan palmulari Syriacaram.

XYlobalfamo	Radice violarum albarum.
-------------	--------------------------

Zingibere	Pyrethrum.
-----------	------------

GALENI PERGAMENTI de compositione medicamentorum secundum genera, lib. I.



Vandoquidē ex cōmētario quem Palarē bibliothecæ maximo conflagratur incendio: quidē amicorū precibus victus, cogor nuncillos eosdē recudere: idq; ab eodē initio au spicatus, à quo in illis exortus fuerat. Siquid statim in auspiciis primi cōmentarii monebā, esse exterminandos sophistas, qui traditionem medi-

caminum compositorū ē medio tollunt: nonnul liq; simplicia peculiares quasdā facultates ines se inficiunt: eos etiā excipiētes scōmate, qui de illis aliquid prodiderunt. Qui quidem adeo vires medicamentorū ignorant, vt nesciant prorsus, à marino lepore pulmonē solum exvicerat: vesticā solam à castidiaridibus. At verō Empirici cognoscunt quidem ex friguge cerato simplici admixta, confici optimum scaroticum medicamētum: tametiū neutrum eorū per se, carnē gignere possit: qua autem ratione id contin̄gar, ignorant.

Sunt igitur vires medicamentorū simplicium, non generatim tantum, sed particulatim etiā investigandę. Siquidem non fat est nosse hoc pluar macum calfacere, nisi etiā quo gradu id efficiat, noris. Calfacitur quippe resine omnes: attamen maioris minorisq; ratione plurimum inter se earum calores differūt. Atqui in curatione particularē resfringere, medicamēt admodū bibimus

admodum calfaciens: illi verō quę paululum ab habitu naturali recessit, calore modico præditā. Merito itaq; nos quatuor ex calfacientium ordinē statumus, separātes à modicē calidis ea quę evidēter eiusmodi qualitate præcellunt: tum quę magna, tum q; vebemēna adeo, vt vrere iam videatur: atq; in singulis hisce ordinibus latitudinem momētaneam constituentes: similes in excessibus reliquarum qualitatium, ratione. Porro medicamētorum materię, quędam sanē à plantis, quędā à metallis, nōnullę ab animalib; proficiuntur. Iam verō, præter simplicia omnium medicaminum facultates, omnium etiā præter naturā affectuum differētiās ad vnguem nouisse expedit.* Quippe primus curationis scopus à morbosicis dispositionib; nascitur: cum quibus simul indicat curationē natura particulū affectū. Sed aeris etiā nos ambiētem temperiem, constitutionēq; præterea ætatem, tempus, regi-

onem, vitę studia, & mores, multi præstantissimi Medici vnā cum illis inspicunt. Ergo si simplicibus tantum medicamentis, vniuersos præter naturam affectus curare liceret nobis, nunquā egeremus compositis. Quum autem expēnēro aliquatenus calfacere corpus volentes, simplex nullum, quod præstare id possit habeamus, ex variis vnū cōficimus medicamēt, quod eodem, quo affectus, gradu à mediocritate recedens, id quod ex viū est, moliatur. Taceo nonnulla simplicia, citra alterius medicamētū miscellam, non posse adhiberi in emplastrum: alia, nisi retundant, aut mīngentur, administrari nō posse. In morbis etiā qui contrarias simul facultates desiderant, vt, repellendū & digerendū, detergendū ac læuigandū, vel attenuandū simul & incrassandū humores, maximus compositiois medicamentorum est vīus: nec secus vbi vnicū medicamen habere cupimus, quod multis venenum eiulantibus sens, ac pharmaciis extrialibus aduersetur.

Quum autē oleum vetus & adeps, vim digerendi sortiantur: chalcis autem & palmæ succus, repellēdi, asfringēdiq; ex his ipse pharmacum phlegmaticum dictum composui, glutinandis viceribus, exatrite obducendis, & phlegmonis curandis accommodum: quo iam complures vtuntur. Etenim ratio compositionem inve-

Scaroticum op-
primus confici
ex argenteo
cerato
simplici
admixta.

Resina omnes
calfaciunt.

Calfacientium
ordinē quatuor
ex quibus vnū
repere est in ca-
teri qualitate
bus.

Medicamenta a-
liis materia v-
de proficiuntur.

Scopus curatio-
nis primus à mor-
bosicis disposi-
tionibus nascitur.

Compositio me-
dicamentorum con-
stat.

Phlegmici
pharmacis dip-
siti & vni.

Pacis delubrum
conflagrasset: o-
lum & vinum re-
b-bibliothecae pa-
latii, et nonnul-
los cōmentarios
Galenis,
Zosimi et aliorum
manuscriptos effe-

nit: experientia, de inventorum virtute decernit. Cum prædictis autem debet coqui lithargyrus, donec consentiant consequatur emplasticam. Adeps porro ipse fit in infusus, ut vetus, quæ admodum etiam oleum: quæ sanè quod vetustiora fuerint, eo digerit prædictus, phlegmoocit duriorum atque consummatorum erunt magis accommodata. Verum ad incipientes atque augescentes phlegmonas, ut quas asstringere atque refrigerare oportet, præstat emplastrum ipsum ex vino, vel a-
cero, vel aqua, vel oleo immaturo, vel astringente, liquare. Communis autem compositionis modus est talis. Vetusti adipis lib. 1. olei veteris lib. 3. Lithargyri tantundem. Chalcitidos vnc. quatuor. Liqueo adipe reliqua elegantiter atque artificiosè misceant, ferveciantque simul, ac rudicula palmæ viridi & succulenta moneantur, donec sibi emplastri consistentiam contraxerint. Quo quidem medicamine, ad vlcera quæ non facile cicatrice obducuntur, & ad cruenta est ventum. Auxiliatur etiam inflammationibus, articulorum morbis, bubonibus, phymans, ambustis, perniciosis, fracturis, contusionibus, rheumaticisq; vniuersis constitutionibus, cuiusmodi plures solent Romæ invadere. Cæterum in phlegmona rum principis vim repulsoriam esse validiorem oportet in incrementis verò, hæc imminuenda: quæ digerit virtus, augenda est. Viget in phlegmone, pares in vicem esse cõvenit facultates, nisi vehementis dolor pharmacum lentius requirat. At
tunc inclinante phlegmone, vim digerendi augebis. Quæ ex methodo licebit tibi secundum varias indicationes ut prædicto emplastro, variis oleis atque succis liquato. Ego verò ad phlegmonas erysipelatoses soluto ipso ex rosaceo vtor. Cui etiam si æstas fuerit, vix æcerbè simul & portulacæ, vel sempervivus succo immisceo. Quippe vix æcerbè liquor per se, plus quæ oportet asstringit: tantum autem asstringit quod erysipela, ut quæ calor ipsorum, cutis densando, includat. Igitur in exactis erysipelatis, ea quæ adventitia sua frigidity auxiliant, vim cooperant inalecere, sunt munda. Postea verò quàm incendium conquieverit, aut si nec perfectum planè ab initio erysipelas fuerit, * haud amplius ascitiam frigiditatem desiderabimus: verum us succis diluimus phanicinū emplastrū, qui moderatè refrigeret. Ab his iam & lini seminis, & chamæmeli succo miscebimus: ipsosq; solos, sed fuso postea vtemur emplastro, nihil aliud illi miscentes. Quod si quando humidū, ob refrigerantum usum, erysipelas ipsum evaserit, solū phanicinum emplastrum, veteri oleo liquatū, id discutere potest: quo tẽpore partes luidæ, aqua foveat calida, atque etiam scannant. Sunt qui calcis vix omnium ipsi pharmaco immisceant.

Romæ invadere
epiphora de
strophomestron
maticæ.
Phlegmonarū
curatio.

Omphacis fa-
cultas.

Erysipelatis co-
rurio.

Liniensis erys-
ipelatis curatio.

Emplastri pha-
nicini facultas.

Rheumatis cas-
se.

et reliquum est, contumax atque scirrhusum reddiderit. Sed neq; id genus dispositiones ferunt nisi asstringentia medicamenta, ut à quibus dolore & tensione assigantur. Anqui omnis dolor inflammata exacuit, irritat, & fluxionibus occasionem præbet, vel si rheumatica intèrpe æger non afficiatur.

Dolor inflama-
ta exacerbat,
fluxionibusq;
occasionem præ-
bet.

Sunt autem complura medicamenta, quæ pharmacum cum miscentur, vim nullam aut parvissimam exhibent: cõmoditatem verò materię præstāt, ut vel emplastri, vel cerati specie referat. Atque ex eorum sanè genere exiit argenti spuma, nullam insignem poiens facultatē, præter siccandi modici. Quia ratione attrita femora ex itinere adiuuat. Est autem ex his pharmacis quæ liquefieri possunt, etiam argenti spuma, quam Græci lithargyron vocant: ut chalcitis quoque, & misy. Cæterum chalcitis quidem omnium celerrimè funditur: tardissime argenti spuma: at in horum medio crugo & misy cõstunt. Porro candidū medicamē, quod ad parva vlcera vtor, ex oleo, aqua & argenti spuma conficit, ita ut libris duabus atque, tres quàm purissimè splēdisimiq; olei, totidemq; spumę argenti iniiciat. Debeat autem simul coqui ad ignem minime fumidū, idq; in loco sub dio atq; soli exposto. Siquid ut aer nubilus pharmacum ipsum denigrat, sic fœnerus ad candorē eius plurimū cõfert. Hoc autem fiet glutinantis in medicamen, quod plus liquoris indideris. Aqua etenim subiecta propria semper humectat, refrigeratq;. At oleum si recens sit, pharmacum minimè eluciat. Permanet itaq; humidum, ac modicè frigidum, quali maxime tenera corpora & cacochyma indigent. Ergo huiuscemodi emplastrum, pruritus, desquamata, & vix vno verbo expeditam, vlcera exigua perfricat: ut pote exaceratis partibus ne quid influat, impediens: & quod iam influxit, de novo ad partes circumstantes retrudens. Adverte autem, nullum humectans nec propriæ ratione, nec ex accidenti esse vlcerebus vile.

Lithargyri fa-
cultas.

Chalcitis om-
nium celerrimè
funditur.
Candidum me-
dicamē Gale-
ni.

Aerem nubilū
denigrare phar-
maca, fœnerū
conferre ad vo-
rum candorē.
Aqua propria
facultat.

Candidū empla-
strum Gale-
ni.

Vlcerebus nullū
humectans esse
vile.

Conficiuntur etiam lithargyrosq; similiter medicamen paratur. Equidem per æstas sub sole ardent, ex vino Falerno, aut alio tenui partium, lithargyrum conterere soleo, idq; cõtinuis quindecim diebus. Quib; exactis, medicamē ipsum excicant, repono: quo postea ex oleo soluto, in rheumaticis affectibus vtor, necnon ad vulnera glutinanda. Cruda itaq; ac per se, argenti spuma, attritione corrigit. Ex aceto autem aut vino trita, siccataq;, vlcera quæ ob humiditatē ægrè cicatriem recipiunt, remediū sūt. Quod si ipsa cupis rofionis experte, elota vtor. Ac minimū quidem rofionis exhibere, si vino vel aceto ablui. Cõvenit tñ cunose toto die contrahi, cū liquore p no-
etiam

Lithargyri præ-
parandi ratio.

Lithargyri fa-
cultas.

Lithargyrum
redditur expers
rofionis, si ex vi-
no vel aceto ab-
luatur.

tem relinquere quem postero die manē effundē
mā, alii denuō infillētes, ac postea rursus run-
dentes: id quod singulis diebus facere sub fer-
nē si sole (hoc enim fit cōmune præceptum in lapi-
dosia omniū) minimē desistemus, donec vnā
cum humore ceru quidam sterculus ipsius argen-
ti spuma cernatur.

Quæ ex lithargyro cōponuntur, fieri possunt
etiam ex molybdæna. Ceterum molybdæna sub-
stittit crassiora ac frigidiora quā lithargyru;
est: ac medicamenta quæ ex ipsa parantur, cine-
rina redduntur. Quam igitur discutere quid vo-
lueris, lithargyro potius q̃ molybdæna vitior.

At crustam vel coloria causa ad emplastra cō-
dida consilienda medici lithargyro immiscēt:
velut quando astrigendū refrigerandūq̃ vim
medicamento conciliēt. Sed resina etiam insi-
cere assolent, quod sequax ac sibi continuum fiat
pharmacum. Verū quā misissimā omnium resine
sint rum terebinthina ipsa, tum illa quæ laxū
dicitur, has miscere præstitit, dum consicere ra-
te medicamē est animus. Multo etiam leniora ta-
ctu omnia sunt, rum quæ resina constans, si cerę
quid adiciatur: tum quæ ex cera, si modici resine
recipiāt. At candido emplastro alba cera desi-
derat: quā, si spōte sit nata, prius abluerē oportet
nimirum liquetā ipsam, cō mox in aqua fontis
mergentes, cōmouentes, & tepurgantes: qua
ratione etis piz, resina & phlyema, abluēda sunt.

Vbi igitur cerussæ, spumę argenti, adeo præ-
coctis vt minimē insiciāt manū, cera simul cum
resina fuerit admixta, candidum emplastrum ha-
debit, cui aquil aut oleum miscere poteris. Ex o-
leis autē omphacium, Hispanicumq̃ pharmaceu-
o vim astrictiorā adiucit. Isticū verō cum
exigua astrictione quādam amaritudine refert.
Arg principio viceris, sinig, potiora sunt astrin-
gentia: dulcia autem in media. Pondus ergo lu-
lusce emplastri sit tale: Cerussæ, lithargyri, singu-
lorū lib. j. olei lib. 4. cerę lib. 5. Terebinthū vnc. j.
Quibus omnibus licebit tantum thuria, quan-
tum & terebinthinę, aut etiā dimidiā portione
addere. Qua industria medicamē maxime ano-
dynum reddetur, sed ac cicatrice inducendū ine-
prius: quandoquidē ex ipsius vfu caro viceri ex-
creset, quā thui sit facultate sarcocticum. Tacto
laxitia medicamenta corporibus plena & eaco-
chymis admota, fluxū ad affectus partes citare.
Satius itaq̃ fuerit, tum ac cicatricē inducēdam,
tū digerendū ex actus, aluminis scissilis, can-
didip, vnciam vnam, piperis semunciam miscere.

Candidi ex pipere medicamēti, quod ad sēdū
vlcera, & eorū qui mollem fortissimē cuticulam
perforandā est efficax, quoddā refertur ad Anaxila-
regem hostrium, qui olim Pergamēnsibus impera-
bat, compositio haberi in hunc modum: Argē-
ti spumę, cerussæ, sing. lib. j. olei lib. 4. cerę lib. 5.
terebinthinę vnc. i. thuris vel tantundē, vel me-
dia pars, aluminis drach. 6. piperis drach. 3. Verū
apud Romanos librari quidem dicuntur solida,
vt mēsuram humidā. Metallica in primis sub so-
le coquuntur, donec duriculusam consistentiā
adipiscantur: quibus reliqua postea misceri des-
bent arusticiorē. Hoc pharmacū viceribus humi-
dioribus, argi abrasis medetur.

Alba quę oleo recētū & aqua citra piperis atq̃

thuris mixtura confici docuimus, vehementer
cōmorfas partes offendunt. At minus illa Ara-
licam lardere solet, eō quod terebinthina, oleū
verus, thuris, & piper, adiecta sint. Ad comorfas
nanq̃ minimē alumē conducit: quom opus hic
sit non astrigentiūbus, sed abvnadē extrahētib;
ea, quæ in alto nervos punctos asistunt, & ve-
neratam animalium saluam. Distinguenda au-
tem sunt cacoethē vlcera, ab iis quæ nō faciliē ad
cicatricem perveniunt: quom non omnia cacoethē
vlcera grē cicatricē admittit. Porro si blan-
dū medicamentum, ad sedandūq̃ dolorem
cōmodū, cōficere vis, aliquid adipis asserui:
vel gallinacii, vel porcini immiscebis. Sic nanq̃
magis anodynum effecit: minus tē adonem
cicatrici inducendę. In vniuersum autem, nemo
probt vti possit medicamēto cōposito, quō sim-
plicium vires prius non accuratē dixerit.

Aliud albū Andromachi. Lithargyri, cerussæ,
sing. minam Atticā. j. cerę partem quartā, re-
sine terebinthinę tantundē, olei hemina 3. a-
quę heminas duas. Cōficito. Nōnulli porro vn-
cias 30. minam continere tradunt: nōnulli sex-
decim. At qui mirer ut ipsi, quomodo Romę
degenē, pro libris nominant heminas: cui vbi
sunt familiaria vocabula, libra, sextarius, & vn-
cia. Ex multis aut medicamentis iam pridem cō-
scriptis, priusquam potentia Romanorū vique-
adeo creuisset, sum cōiectura assequutus, quā il-
lij vocarent heminam, fuisse æqualem nouē vn-
cię vniū libe Romanę.

Aliud album Andromachi.

Argentī spumę drach. 160. cerussæ drach. 200.
cerę drach. 30. terebinthinę drach. 34. olei hēmi-
nam 5. aquę cyathos 6. Cōficito.

Aliud candidū ab Hera descriptum. Cerę al-
bæ Pont. lib. 4. lithargyri chrysidis lib. j. cerussæ
tantundē: myrrha, medullæ ceruicis, singul.
vnc. 4. thuria insecti vnc. j. olei veteris sextarium
vnum. Lithargyru oleo in coquit vbi verō for-
dum crassitudinem acquiritur, cera, mox teru-
sa, aspergitur, mouetiq̃. Vbi vnita fuerit, nec
iam polluit, ab igne extractis medulla iniicitur.
Postquam refrigerit medicamentum, myrrha &
thus aliis miscēt. Deinde emollit, sub æthimę
manibus, ad vsum seruat. Etenim rabidorum
moribus auxiliatur, tum vulnē impositū, tum
mole a vellente nucia, catapora mīta exhibita,
quadraginta diebus. Ad hæc abrasa, fuggillata,
& vlcera quę difficulter admittunt cicatricem,
perferant: ad alligę pleręq̃ et vnle. Eo namq̃
propinare pharmacum hoc contra canis rabidi
morfus, nunquam fui ausus: quom haberem a-
liud, nempe ex cancri confectum medicamen-
tum, ad sanandos illos maxime efficax. Ita enim
remedia ipse vti semper, conatus sum, quæ licet
non nunquam præsidē quod allatura essent, du-
bitam spem promitterent, ne utiquam tam en-
obesse possent. Porro Heras cum heminam scribit,
sextarij Romani dimidiū indicare videtur, con-
tinentia vncia viginti, quas cornibus maiori ex
parte metiunt, incisā extrinsecus lineis quibus-
dam orbicularibus. In vniuersum ade, nisi me-
tallica medicamēta plenius coquant, emplastrū
ex eis constans adeo friabile edetur, vt adligere
cuti absq̃ deligaturā nō possit. At coquantur

Lepidosa om-
nia quæ ablu-
untur, sub arden-
ti sole sunt ex
humore aliquo
lauganda.
Molybdæna fa-
ciunt

Cerussa vfu,

Terebinthina.
Larix.

Cera abluda
ratio.

Vlcibus inci-
poribus potio-
ra esse astrin-
gentia.
Anaxila phar-
macum.

Thui carum
cognit.
Laxantia ple-
na & eaco-
chymis admo-
ta ad affectus
partes citant.

Anaxila Rex
Pergamē, pa-
tri Galienus.
Candidi ex pi-
pere aliquid.

Librari solida
da.
Mēsuram hū-
midā.

Cerussa qua
creuēdi ma-
dicamentis.

Cicatrice vici-
ra ad omnia et
si dysgalactia.

Cōpositio re-
fritur vti po-
tiora quā simpli-
cium vni prius
non dicitur.

Candidi ha-
derat.

Heminæ fuisse
æquale nouem
vnciæ libe Ro-
manę.

Candidi ali-
ud Androm-
achi.

Candidi Hera

da & Anaxila

Morbi rabidi
canis auxiliari
medicamēta ex
cancri confectis.

Sextarij Ro-
manū continere
vncias 30.

Metallica ple-
nitus coquenda
esse, vt adligere
possit.

largitas, diu maiorum liquidorum mensurā in
mensura continent. Quod verō ad adipis diferen-
tias pertinet, in omni anum genere iue-
nitia perfectius humidiorum, minusq; calidum a-
dipem possident.

*Candidum
Mojan.*

Album quod ad Minasum refertur, ad diutur-
na & difficilia cōferens. Lithargyri, cerussę, sin-
gulari drachmā, cerussęq; drach. 50. zerebinthinę,
thuris, sing. drach. 15. aluminis fissilis drach. 15.
olei heminis 5. Nec verō differre putetis, si dra-
chmas centi alicubi scriptas loco vnius librę in-
veniaris: Libra siquidem drachmas sex habet ad
nonaginta. Schibra, octo & quadraginta. Sic &
huius rursus dimidium, viginti quatuor.

*Librum quatuor
re drach. 96.*

*Dyspnotica
vix a qua drach.
cantur.*

*Quod
est
aqua
drach.
cantur.*

*Vlcus dicitur
palatum quod
malignum, quia
medicamentis
la cōueniunt.*

*Quod
est
aqua
drach.
cantur.*

*Cera Tyrrhe-
nica.*

*Metallica ab-
lenda modis
duobus.*

*Vnciā consistere
est drachmā.*

singulorum drachmę quinę ponentur. Si vltimā
chalcitidem singulorum drachmę quaterne: sic,
vt ex omnibus in vnum cōiungantur, tres tātum
vncię consentiant.

Candidum emplastri Damocratis, ad abra-
sa, ambusta, & vlcera summa in cute suborta.

Cerussę lib. 5. lithargyri, tryphery, sing. vnc. 15. *Candidum Da-
mocratis.*
Cera Pōnice vnc. 5. ter ebulliant purissima vnc.
j. thuris vnc. 5. olei candidi lib.
j. aquę sextarius. Cōficiat vt decet. Porro in his
qui molles sunt carne, in senibilibus, aut iis q; malo-
sunt p̄dicti corporis habitu, aluminis licet ut
etiam quatuor vncias miscere.

GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorū secun- dum genera, lib. 11.

VT igitur si quidō perdidimus librū, cui
in scriptis intant medicamentum consuetorū
compositio, similia reficere am-
plius valeamus, necessariū in primis est, nos vniuer-
salem quādam vix formulam didicisse, quā pro-
positum in veniamus deinde vt secundum hanc
in multis particularibus exerceri, scientes ab ig-
nanti exercitio nullū posse recte opus absolui. Pro-
ponatur itaq; nobis casus vlcus curandum. E-
tenim docti ab ipsa ratione, casuorum vlcis cu-
rationē subministrari se cōfitecentē alia carne lo-
co perdidit, ex ea videlicet quę subiecta est: co-
gruam fieri hoc non posse, si in vlcere fordes,
aut copiosa humiditas subsit. Verū fordes me-
dicamina detergere auferūt: humore, exsiccata
discutiūt. Quocirca necessū est inusum de phar-
macorum materiis cognoscere, idēq; non simpli-
citer secundum genus eorum facultates cōside-
rantes, sed inuenientes etiam quō ordine, quōve
gradu, aut excessu, singula suas vires fortitantur.
Fingamus ergo nobis ad manū tamen addeisse
cerā, frugineiq; quibus casū vlcus repleamus.

Quum enim comperit habeamus, ceram qui-
dem solam, vlcis fordes minime prohibeturū
esse, vt quę nec detergere, nec exicare possit: fr-
uginem autē per se adhibitam, excitatam tum
rationem, tum phlegmonē: vtiq; horum vtriusq;
vitabimus, mediū autē ex ambobus cōstituemus,
vt imbecillus frugine, sic cera valētius. Quia ve-
rō paulo hęc intervallo relinquitur, ab eo quod
cōmodē admisceri possit, xругo autē magno
id ipsum excedit, ob id sanē multo cerę modicā
xругinē admiscebimus. At quantū quāte misce-
re oporteat, certē ante experientiā exactē quidē
nemo inuenire poterit: conicere autem poterit,
ludicareq; & ita cōficere pharmacum, vt primō
nullum infelicē successum sit habiturū: quemad-
modum aliquando ego in quodam vico cōfeci,
cum cerę luscę ex oleo rhodino libra vnica, v-
nciā vnam xругinē temperans. Ceterum valē-
diora corpora validiora medicamenta sustinent: q;
verō imbecilliora existunt, hoc est, humidū &
molle habere p̄dicta, adeo ut talia p̄ferūt. Du-
ra itaq; corpora ex copiosiori frugine cerato ad-
mista, recipiunt carnē molliorē ex pauciori. Quare
ipsa experientiā docet, quatenus vel augere, vel
remittere, vel tueri pharmaci facultatē expediāt.
Sunt namq; omnia medicamenta ei optima, qui
afic-

*Candidum Da-
mocratis.*

*Casi vlcis go-
nerali curatio*

*Ceram per se
in cōtra vlc-
ceribus subdita
Arrugo per se
adhibita, resis-
tem ex phleg-
monē excitat.*

*Corpora vali-
da. validiora
medicamenta
perferre possit.
Medicamentū
humidū et effi-
cacia, quā a se-
dit quā ex-
hibetur, vni-
uer-*

*Viride medicamen-
tum Galli.*
affectus quibus singula offeruntur, cognoscit.

*Terebinthina
proxima.*
Viride medicamen-
tum Galli, ad glurinanda maio-
ra vulnera potentissimum, ab Andromacho scri-
ptum. Resina strobilina drach. ccc. ceræ drach.
c. xruuginis rase drach. l. thuris drach. xxv. Ace-
ti quod sit satis. Hæc Andromachus. Ceterum
quum strobilina resina aliarum omnium longe
calidissima sit: ambabus autē qualitatibus mo-
deratissima, quæ terebinthina vocat: certè mul-
to satius videt hanc omnibus medicamentis, quæ
rectè curabunt vlcera, permiscere: quandoquidē
primus, præcipuūq; in eis scopus est, vti id quod
offertur, non mordicat. Cōmendanda est autē i-
pssius thuris cōmissio, q̃ emplastris cōsistentiam
adiunget, dolorēq; lenis & cōcoquens. Qua-
re si in ea cōpositione æquā ipsius portio conuen-
iat xruugini esset, tenacius & mitius ipsum reddē-
ret medicamentum: xruuginis tamen exicca-
tem facultatē exoluere, quæ vlcibus ægrē ad-
mittentibus curationē desiderat. Meminisse autē
oportet, fortium medicamentorum ex aceto die-
bus pluribus contritorū, morsum & acrimoniā
obscūdi, vires augeri. Eadē ratio est in metallicis
medicamentis cōbustis. Hæc tamen ex ignis cō-
mercio nōnihil mordax siue eto dens perferat:
quod eloto deponunt, ac lenia prorsus reddunt.

*Fortium medi-
camentum ex
aceto tritorum,
morsum quādi
obscūdi, vires
autem augeri.
Elota acrimi-
niā amittere*
Proposito itaq; emplastro, si ex rosaceo li-
quescito vtaris, ad erit sordidus, humidusq; vlcē
ribus. Pura verō erodit: ac pinde miscēdū ei est
ceratum liquidum ex cera & resina confectum,
vel ex rosaceo, vel oleo liquatum. Est autem olei
nomē vnum, qualitas & facultas diuersa. Quip-
pe omphacinum frigidius est: ex maturis oleis
pressum, calidius. Temporis autē progressu, cal-
cendi vim auget. Si etiā quod salē habet;
quantum ex illo sumpserit, tantū calidius est: ma-
gisq; ficit, quā quod ipsius est expers. Idē qd
fuculos oleæ cōbnet, vlcensū attingit. Indica-
bit autē quod vitilus est, & vlcis forma, & cō-
pōris ægrī natura. Vlcus quidem cōtrariis reme-
diis curabit: corpus vlceraum, similibus. Ros-
aceum verō præstantissimū esse nobis, quod solis
rosis pluribus, oleo citra salē preparato, plenius
maceratis confectum est. Quæ omnia si quis me-
moriter teneat, nec oblitus sit viriū medicamen-
torum simplicium, & is varia emplastrā vīdia
componet, & compositorū singulis q̃rectissimē
vret. Porro durioribus corporib; magis exicca-
tia medicamentā excludēda sunt: minus autē, mol-
lioribus. Ad hæc intendemus exiccatis medica-
menti vim, vbi opus esse videatur, admisso mel-
le: temeremus autē & mitigabimus, ex oleo, & cē-
rato, vel oleoso quopiam. Igitur causū vlcus in
sano corpore, viridi emplastro, qd ex xruagine,
cera & resina conficitur, liquato ex rosaceo, cura-
bitur. In cuius medicamentū cōpositione, equi-
dem ceræ & resine soleo portiones pares misce-
re: xruuginis autē duodecimā, vel decimā, vel octa-
uam, nimirū pro vlceraum corporūq; diuersita-
te. Atq; erit sanē duodecima, si ceræ pōdo, & re-
sinæ tantūdem, xruuginis vncias duas temper-
mus, decimāq; & octauā ad portionem.

*Viride Hecarōndrachimon dictum, quod cen-
drachmas medicamentorū recipiat, ad ma-
gna vulnera glutinida, & purgāda sordida, ma-
ximē vtile. Ammoniaci drach. viij. squamę drac.*

*Viride Hecarōndrachimon dictum, quod cen-
drachmas medicamentorū recipiat, ad ma-
gna vulnera glutinida, & purgāda sordida, ma-
ximē vtile. Ammoniaci drach. viij. squamę drac.*

*Viride Hecarōndrachimon dictum, quod cen-
drachmas medicamentorū recipiat, ad ma-
gna vulnera glutinida, & purgāda sordida, ma-
ximē vtile. Ammoniaci drach. viij. squamę drac.*

*Viride Hecarōndrachimon dictum, quod cen-
drachmas medicamentorū recipiat, ad ma-
gna vulnera glutinida, & purgāda sordida, ma-
ximē vtile. Ammoniaci drach. viij. squamę drac.*

*Viride Hecarōndrachimon dictum, quod cen-
drachmas medicamentorū recipiat, ad ma-
gna vulnera glutinida, & purgāda sordida, ma-
ximē vtile. Ammoniaci drach. viij. squamę drac.*

*Viride Hecarōndrachimon dictum, quod cen-
drachmas medicamentorū recipiat, ad ma-
gna vulnera glutinida, & purgāda sordida, ma-
ximē vtile. Ammoniaci drach. viij. squamę drac.*

*Viride Hecarōndrachimon dictum, quod cen-
drachmas medicamentorū recipiat, ad ma-
gna vulnera glutinida, & purgāda sordida, ma-
ximē vtile. Ammoniaci drach. viij. squamę drac.*

*Viride Hecarōndrachimon dictum, quod cen-
drachmas medicamentorū recipiat, ad ma-
gna vulnera glutinida, & purgāda sordida, ma-
ximē vtile. Ammoniaci drach. viij. squamę drac.*

xij. manę drach. viij. resine stæ drach. xij. xru-
uginis drach. viij. seu i vitulini drach. xiiij. resine te-
rebinthine drach. viij. cerę drach. lxxx. olei quar-
tam cyathū partem, aceti quantū satie esse videat-
ur. Conficito.

Viride Epigoni, ad carnē gignendā efficax.
Acris squamę, xruuginis, gurę ammoniaci, ari-
stolochiæ, thuris, sing. vnc. j. Aloës, myrrhę, dial-
bani, sing. vnc. s. Aluminis rotundi drach. vi. resi-
næ colophoniz drach. cc. cerę drach. c. olei hemi-
næ dimidium. Misceto.

*Viride Passonis ad extrahendū & digerē-
dum vtile.*

Resine colophoniz drach. ccc. cerę drach. cl. xru-
uginis drach. viij. aluminis rotundi drach. xij. xru-
uginis drach. xij. thuris drach. xij. aris cōbu-
sti drach. viij. Sais Ammoniaci tantūdem. Olei
dimidium cyathi: aceti quod satis esse videatur.
Conficito.

Viride Lite appellatum. Resinæ lib. xij. cerę
lib. viij. xruuginis rase lib. ij. seu vitulini lib. ij.
aceti lib. so. Ego autem mannæ libram iniicio.
Liquet igitur acetum cum duabus xruuginis li-
bris, & vna ipsius mannæ, lraugandum esse, ac
dein liquida ipsi miscēda. Hoc medicamentum
emollit, concoquitq; adipis atq; mannæ ra-
tione.

Porro ad efficiēda viridia medicamenta, xru-
ginem non modicam immittere oportet, vt ce-
tera in suum colorem permutat. Quare quæ per-
tinaciter propriū colorem reuertur, ea simplici-
cia ad hac miscēda ligenda sunt. Sed neque in-
ter coquendum est iniiciendā ipsa frugo: verum
vbi in mortario vnitas facta est, tunc miscēda.

Consilia igitur curandorū vlceraum sunt, sordid-
is adhibere abstergentia medicamenta: pro-
fluentibus exiccantia: atq; quod in fluxu est,
repellētia. At si copiosum & contumax sit quod
fluit, fluxoris causā prius est amputanda. Constat
autem, inflammationem vlcis prius esse sanan-
dam phlegmonis: carnem intemperatam, redu-
cendam esse ad temperiem: cui sanē quatuor mo-
dis simplicibus, totidēmq; cōpositis, p̃ter contrarias
qualitates succurrit.

Porro vbi sinum implere proponimus, medi-
camentum istū vocatum, aut Macharionis em-
plastrum liquariū ex copiosiori oleo, per foratū
cornu infundendum est: ad quod etiā pyulcia
vimur. Ad autem ipso medicamento tunc mera-
diori vtendum, quum sinus oppletus est sordibus:
vt soluto ex oleo largiori, dū magis purus
existit. Ceterum si parua adhibe phlegmonis si-
num insectantis suspicio adsit, medicamentū ex
rosaceo liquabitur. Pari modo & medicamen-
tum siccū, quod ex charta cōbusta constat, ro-
saceo copiosiori deluētis, ipsi sinui infundimus.
Quemadmodum verō sinus liquidioribus phar-
macis indiget: ita quæ superficiem corporis ca-
ua vlcera insectant, crassius medicamentum po-
tulant. Merito igitur in id genus vitilis, ceratum
validē abstergentibus admisceamus: in finibus o-
leum, vel rosaci plurimum. At verō medicamē-
ta quæ ex salibus constant, vbi animus est carnē
gignere, offerēda non sunt. Sal quippe magis a-
stringit quā purget: ficit verō nullo minus
quā nitrū ac aphronitrū.

Viride Epigoni

Viride Passoni

*Viride Lite di-
ctum.*

*Viridia efficiē-
do ratio.*

*Vlcera curan-
dorum vincti-
satis consilia.*

*Vlcis inflam-
māti curatio.*

*Sinus implē-
do ratio.*

*Sinus liquidi-
ora pharma-
ceia sunt.*

Salis ficitas.

Melina emplastrum.

Melinarum et
que viridia du-
scimus.

Quemadmodum viridum emplastrorum plu-
rima, propter xeruginem prepolleat ita sunt,
ita quoque melinorum nonnulla. Sed viridia xeru-
ginem in coctam habent: melina vero coctis, sed
mediocriter.

Melinum An-
dromachi.

Andromachus igitur copulavit melina scriptis,
ad glundanda vlcera, caenem gignendam, indu-
cendamque cicatricem idonea quale est quod sub-
dam. Lithargyri drach. ciii. olei heminam qua-
dem xitate, hyeme aut tres cyathos: cere drach.
xlviij. colophoniz tantundem: ammoniaci thy-
miamatis drach. xxiii. xeruginis raris, chalbani,
myrrha, sing. drach. viij. Conficito. Aliud sim-
plex. Lithargyri drach. c. xeruginis drach. lxxx.
olei veteris tantundem. Misce. Covenit cum car-
ne molli præditis, digerit. Aliud Heraclidis,
interiores abscessus sine dolore discutens. Li-
thargyri, cerussæ, sing. drach. c. cere drach. lxxx.
resinæ aridæ drach. lx. ammoniaci thymiamatis
drach. l. chalbani drach. xvj. olei veteris heminas
ñ.

Melinum Hera-
clidis.

Melinum Meneti.

Melinum Meneti. Lithargyri lb. iij. olei lb. iij. terebinthi lb. ñ.
ceræ lb. j. gruginis, thuris, chalbani, sing. vi. iij.
ammoniaci thymiamatis vnc. vj. Conficito.
Melinum Serapionis, ad vulnera, & ad
resolueudum.

Melinum Sera-
pionis.

Cocitionem nō
sufficit myr-
rha nec thus,
nec aloë.

Hygicus empla-
strum minus vni-
us.

Lithargyri pro-
parandi ratio.

Emplastrum ex
Thelamonio.

Lithargyri drach. c. ammoniaci thymiamatis
drach. xxviij. ceræ di. ac. lvi. gruginis Cypræ drach.
ix. myrrha drach. j. colophoniæ drach. lvi. chal-
bani drach. viij. olei hemina 2. Quod si xitas sit,
quartam partem hemina. Adverte autem, myr-
rham non sufficere cocitionem; quam uct thus,
nec aloë feruit.

Hygieni emplastrum ad multa: 3 ad vlcera vix
cicatricem ducentia nullum melius exstat. Li-
thargyri chrysidis minam: cere tantundem: cha-
malæontis nigri radicis drach. xxxvj. xeruginis
raris drach. xviij. chrysolæ drach. xl. olei vete-
ris heminas iij. Conficito. Preparatur optimè ar-
genti spuma, si intrita vino Falerno sub æstu Ca-
niculæ, dein asceitur.

Emplastrum ex diamæleonte, quod cicatricem
vcleribus difficillimum, callosis, & in veteratis in-
ducit. Lithargyri minam j. cere minas vj. xeru-
ginis minas iij. chamæleontis minas viij. olei mi-
nam vnam. Conficito vt decet.

De ruffis emplastris.

Ruffa empla-
stra fieri per li-
gam cocitionem
xeruginis.

Ruffum empla-
strum Galeni.

Quemadmodum propter crudam quidem xeru-
ginem fuit viridia emplastrum: propter medio-
criter aut coctam, melina: sic ruffa evadunt, vbi
liberalius ea coquuntur. Manifestum igitur est, me-
lina ruffam oleum copiosius, quam viridia, reci-
pere. Ruffum porro, quo semper mea industria
parato vtor, in hunc modum coquuntur. Argenti
spumæ cum oleo prius coctæ, metallica ex aceto lg-
nigata immittit, & sic coquo, donec amplius ma-
nus non polluat. Impono itaq; olei venterioris
libras quatuor, argenteæ spumæ lb. iij. aceti 3
acerimi lb. ij. Horum trium metallicorum, squa-
mæ æris nigri, xeruginis, chalcitidis, sing. vnc. ñ.
Ceteram hyeme plus olei quam per xitatem mi-
scendum est. Ac sane hoc medicamē cruenta vulne-
ra glutinat, magis in duris corporibus: curatū-
que difficillima vlcera concoquit. In summa ve-
rò, solū hoc sinus glutinat, autragni fistulas, exic-

cat, & prorsus claudit. Ipsum tñ iuvat spongia re-
cene veteri vino reserpiat. Deligatura in iambus
ab imo fiat, versus vlcis osiculum.

De usque cicatricem obducunt.

Quāto autem glutinātia sarcoticis magis di-
cuntur ficcare, tantō glutinantibus epulotica, si-
ue cicatrice facienda. Ea tamen ex aliquo astrin-
genti oleo (cuiusmodi rosaceum, aut myrtæ est)
solent administrari. Porro inter ea quæ apud om-
nes magnifice cōmendantur, inducendæ cicatri-
ci præstantissimū est quod ex cadmia, quodq; ex
ladano consistit.

Emplastrum ex cadmia.

Cadmia vitæ, & ex vino preparatæ, chalciti-
dis tostæ, sing. drach. lxxx. picis colophoniz
vnc. viij. vini Phaleri quod satis est. Confici-
to vt decet.

Aliud etiam ex cadmia.

Cadmig tostæ, chalcitidis tostæ, diphyrgis, sing.
drach. xvj. ceræ, resins frictæ, olei myrtæ, sing. scil-
bram. vini Italici quod sit satis.

Aliud ex cadmia.

Argenti spumæ, cerussæ, cadmig, diphyrgis, re-
sins, singul. drach. viij. chalcitidis drach. ñ. ceræ,
drach. viij. myrtæ olei, & vini Amici quod satis
esse videatur.

Emplastrum ex ladano.

Chalcitidis, argenti spumæ, ladani, singulorū
drach. xxvj. bituminis drach. viij. cere vnc. ix.
myrræ heminam, vini tantundem.

Emplastrum Pyricauton dictum.

Olei hemina, aluminis fusi, manna, thuris, ar-
genti spumæ, chalbani, singulorum drach. i. cere
drach. xxvj. anchusæ drach. viij. medullæ cer-
uine, adipis suillæ, xeruginis, cerussæ, sing. drach.
ij. ouorum trium lutea. Conficiatur vt decet.

Medicamē Magne dictum, ac verè magnū cō-
tra vlcera quæ difficulter cicatricem admittunt:
quod ex rosaceo dilutū, enam sedis affectus san-
nat. Argenti spumæ drach. c. ceræ drach. l. Ce-
russæ drach. c. terebinthi drach. xxvj. thuris tan-
tundem: aluminis fusi drach. xvj. olei heminas du-
as. Conficito.

Aliud Thelamonis, accommodatum carbu-
culis, singulis exiccatis. Ptyng, ceræ, calcis viij.
lithargyri, sing. di. a. h. a. c. c. u. f. drach. xxvj. olei
tres cyathos.

Aliud Mosi, hionis vnice cōferens ad amouē-
dum vlcis callum, sanandosq; sedis affectus.
Argenti spumæ, cerussæ, calcis viij, sing. drach. viij.
medullæ ceruicæ, ceræ, vtriq; drach. xvj. olei myr-
tæ quantum sit satis.

Epulotikum medicamen Andromachi.

Cadmia lb. j. chalcitidis vitæ, ceræ, sing. tan-
tundem: resinæ aridæ lb. iij. myrtæ tantundem,
Vinum ficis immiscetur.

Aliud eiusdem candidum epulotikum.

Argenti spumæ minam j. cerussæ tantundem:
ceræ, resins, sing. minas iij. olei heminas iij. aque
hemina.

Candidum Telephanis.

Argenti spumæ drach. lxxx. cerussæ drach. cxx.
myrræ drach. iij. obo. ñ. Sagapeni drach. v. thu-
ris drach. vi. obo. iij. olei heminas ij. s. Omnia
simul coquiro.

Aliud ad herpetas, carbunculos, cōdylomata
&

Deligatura
qualis sit ad
benda sinibus.

Cicatricem ob-
ducuntia.

Epulotikum ex
cadmia.

Emplastrum ex
Ladano.

Emplastrum py-
ricauton.

Medicamē Ma-
gne dictum.

Emplastrum The-
lamonis.

Emplastrum
Mosi.

Emplastrum
Andromachi.

Candidum Te-
lephanis.

& rhagadas maxime valēs: quod etiā phlegmonas arceat. Adipis suilli drach. lxxxvij. cera candidæ drach. xlvij. cerussæ drach. xij. argenti spumæ tantundem. Conficito.

*Cephalica
pharmaca
vnde dicitur
quod
facilest
præ
be.*

At verò nonnulla emplastrā cephalica, & catagmatica nominant, potissimū à caluariæ fracturis, quibus locis opitulari. Sunt autem talia, ab stergeri, digerendi, & siccandi potestate prædita. Pleriq; tñ paululum ex astringentibus pharmacis eis admiscēt: vt id quod affectus partibus insinuat, repellatur, & abstergentium facultas in altum vsq; descendat. Cæterum nisi astringentia contentantur in tenuissimū pollinem, magis obfunt, quàm prosunt, eis quæ trahē vim obtinēt.

Catagmaticū optimum ab Asclepiade traditum, ad confirmanda fracta ossa.

*Catagmaticū
Asclepiade.*

Argenti spumæ, bituminis, sing. drach. cc. picis aridæ, ceræ, sing. drach. c. terebinthinæ drach. l. aluminis scissilis, propolis, sing. drach. xxx. ammoniaci thymiamatis drach. xliij. xurginis drach. x. olei sextarios quatuor.

*Catagmaticū
Mysibianu.*

Moschionis catagmaticum ad fracturas, contusiones, atque recentia vulnera, aliofque affectus complures celebre. Argenti spumæ minam j. picis tantundem: seu vitulini tantundem. Terebinthinæ drach. octoginta: mannæ thuris tantundem: ceræ drach. xl. xurginis, opopanax, chalbanī, sing. drach. viij. olei cicuij, aceti, liquoris fycaminī, sing. heminam: picis liquidæ heminam dimidium. Conficiatur vt decet. Pro mina impre-

*Mina continet
vires xx.
Vires continet
viij. denarios.*

sentiarum intelligi vncias viginti: quarum singulæ pendunt octo denarios. Sic itaq; continebitur mina, centum sexaginta denarios. Propriè autem dicuntur emplastrā cephalica, ea quibus Medici in eis capitris fracturis, quæ ad diploën penetrarūt, vtuntur, ad extrahenda ex alto, superficiem versus, nō ossa modò, sed lesa multo magis humores crassos & viscidos, in sinus delitescentes. Quare acrimoniam quandam forantur oportet. Itaq; catagmaticis cephalica generosiora existunt: quæ quidem mista cerato, carnem possunt producere. Quocirca sarconcis quodammodo sunt similia.

Cephalicū optimum ad capitis fracturas ab Ilera descriptum.

*Cephalicum
Ilera.*

Squamæ æris drach. xxv. aluminis, aristolochiæ longæ, sing. drach. xx. ammoniaci thymiamatis, thuris, sing. drach. xxv. myrris drach. iij. seu taurini, terebinthinæ, pitynis, sing. lib. iij. olei heminam: aceti quantum sit satis. Conficito.

Aliud eiusdē, arcis phlegmonē, maximèq; ad fracturas, & puncturas neruorum conducens.

Argenti spumæ drach. xxv. bituminis aridi drach. c. picis aridæ drach. l. ceræ drach. l. resinæ pitynis drach. xxv. ammoniaci thymiamatis, xurginis, aluminis scissilis, propolis, sing. drach. xv. olei veteris lib. iij. Conficito.

Andromachi catagmaticum.

*Catagmaticū
Andromachi.*

Argenti spumæ, picis, ceræ, seu taurini, thuris, sing. minam: picis liquidæ, heminiæ dimidium: li quoris fycaminī heminā: terebinthinæ minam: opopanax, chalbanī, xurginis, sing. drach. viij. vinci heminam. Ammoniaci thymiamatis drach. xxv. Ex vino austero diluitur.

De emplastris glutinantibus.

Quidam hæc *phlegmonæ & epiphlegmonæ* nominant:

etq; opus eorū cōiungere, & diuisas partes con-

glutinare, reducerēq; ad pristinam integritatē.

Sunt autem sarcotici ipsi glutinatoria hęciora.

Ad hæc, sarcotica, quidē detergendi vim, sed absque rosione possident. Glutinanna autem, tantum desiccantia esse debent. Cæterum cicatricē

inducentia medicamenta, præterquā quod a-

stringunt, hęciora etiā sunt glutinantibus. Ercū

glutinantiū est finis, nullū inter cortura subnasci

humiditatē pmittere: cicatricē verò inducentiū,

nō modò hanc prolubere, sed consistentē etiā in

his q̄ cicatricē sunt receptura, cōsumere: præterea

callo obducere, & astringēdo obdurare. At sarco-

tica sanguinē ad refectionē idoneum tam quan-

titate, quā qualitate tuētur. Iam quod nullus

sit mordicationis participes medicamen, purā vi-

cus conseruat, si quidem tale illud acceperit. Por-

ro molliora humidioraq; corpora, imbecilliorib;

medicamentis indigēt: vt vehementioribus,

quæ prorsus contraria existunt.

Glutinatoriū ab Andromacho scriptum,

nomine Barbarum.

Picis, resinæ, bituminis, sing. drach. cc. thuris

drach. xliij. olei heminam. Conficito.

Aliud eiusdē.

Picis lib. ij. bituminis, ceræ, sing. lib. j. Ammo-

niaci thymiamatis, mannæ, sing. vnc. vj. cerussæ

vnc. iij. olei heminæ dimidiū: aceti heminas iij.

Aliud enenon Iuliani.

Argenti spumæ, bituminis, ceræ, picis brutiæ,

singul. drach. l. resinæ frictæ drach. xv. æris squa-

mæ drach. xij. thuris drach. xij. chalbanī drach. h.

viij. chalcitidis drach. iij. aloës drach. vj. gallæ

drach. iij. myrris tantundē: aristolochiæ longæ

drach. iij. aristolochiæ rot. drach. iij. olei veteris

heminas iij.

Nigrum enenon ab Hera conscriptum.

Ceræ, picis, bituminis, pitynis, sing. lib. j. man-

næ vnc. vj. cerussæ vnc. iij. chalcantili tantundē:

opopanax vnc. ij. olei seminam: aceti heminas

duras. Conficito vt decet. Valet ad diuisio-

nes uoratu dignas, maximè capitis: ad fistulas, fi-

nus, fracturāq; Colubæ fimsicæ sanguinem e-

rum pentem. Canum hominūq; moribus au-

xiliatur: ac prorsus phlegmonem arceat.

sanæ, tenuius pharmacum inveniendū est, cuius virtus intenacens particulas permeando non dissoluatur, sed in altum penetret. Hoc autem facere poterit pharmacum vehementer exiccans. Quod quidem etiam si non sit in calore & frigore symmetrum, offendere nervum læsum nō poterit: quum facultas calfaciendi aut refrigerandi (quæ illi inest) admodum imbecillior reddatur, dum particulas nervoso corpori præpositas permeat. Porro inter omnia quæ refrigerandi vim ha-

Arteri facultas.

Sacrorū calfacientium differentia.

Terræstris partium tenuitate prædita.

bent, tenuiorum partium acetum est quam acerrimū: quod etiā caloris modici est particeps. Inter calfacientes autē liquores, qui partium tenuitate sint præditi, primæ tribuuntur partes Cyrenæo succo. Cæterum si eius facultas non detur, vtemur Medico, vel sagapeno vocato, vel euphorbio. Panacis etiā, & nithymalorū liquores, & opobalsamū, tenui di facultate sortuntur. Ex terrestribus etiam nithi spuma, aphronitrum, beronica nithi, petra asia, euſſy flos, partium tenuitate insigniunt. Ex metallicis auripigmentū, & sulfure, nū subtilia, nū calida sunt. Quibus succedit misy, etis squama, & dialcitis, parū simul astrigentia. Citra calorem verō manifestū tenuis essentia metallica sunt, spodiū, pompholyx, & pſoricum. Subtilis ab vnde est & chrysocolia. Ex succis, laurinus valenter calfacit, ac præterea tenui di vim possidet. Nihil autem minus eo cedrinus calfacit: calore tamen qui sensibus subicitur, propter substantiæ tenuitatem, illi cedit. Eiusdē generis cum cedrino est luxiula, quam ita ten vocat. «Quæ quidē si ex tenuiorū partium materia vſta fiat, cedrinū oleū virtute superat. Iam ex cereali- bus, subtilissimus est eruus, sine insigni calfaciē- di vi: lolium verō, cum insigni. Hordeum nequaquam calfacit. Mediū inter ea materiā obtineat, qualitatibus amara: vt quæ multum tenuibus substantiā cedit, & crassi nihil possidet. Igitur medicamentorū materiæ non semel aut bis, sed fre- quenter sunt explorandæ: quandoquidem sensi-

Sensibilium rerū cognatio, inspectione sedula confirmatur.

Medicamenta reponendi ratio.

Galenū ut omni rebus cura- bus sibi adferri omniſſima medicamenta.

biliū rerū cognatio, inspectione sedula confirma- tur. Cuius rei indicium evidentissimū est, quod gemelli per oſta similes esse nobis visi, differētes apparent iis, q non p transiēnt, atq obiter, sed accurate inspicere eos cōsueverunt. Itaq herbarum, fructū, arborūq materiæ, prius quā ē terra eximant, contemplari pulcherrimum est, dum fructus videlicet futuri sunt, dum eduntur, dum augetū, dum vigent. Ex hac naug speculatione assequētur, quādo excerpēdi sint, in sic- ciscq domunculis reponendi. Etenim commodē reponantur in locis nec subterranis, nec sub tegulis cōstituti: sed mediis, atq oſtia ad meridi cōversa habentibus: prope quæ tñ reponi medicamēta nō debēt. Amicos aut omnes adhortor, si artis opera pulchrē obire voluerint, vt me imitentur, qui ex omni natione quotannis præstan- tissima medicamēta vt mihi adferantur curo, eō quod perditū illi omnigenarū rerum cōempto- res, illa indies adulterio cōtamināt. Cōvenit pr- terēta medicum, nō modō affectionibus, quam sin- gula medicamēta inducunt, qualitatem, sed etiā ipsius (vt ita dixerim) quantitate cōiecturare. Quippe quod humore copioso est auctum, non simpliciter humectari postulat, sed opus est vt siccitatis quantitas, copis humiditatis respōdeat,

Porro nervosarū partū doloribus a frigore ob- ortis, vnicē opitulatur emplastrum ex euphor- bio, oleo, & liquata cera cōfectū: ad computre- scentes autem circa arculos partes, cōfert cata- plasma ex hordei farina & stillantio luxuio para- tum. Perfundendæ autē liberaliter partes circūa- centes sunt oleo caltē: postea verō, vbi lana sic- ca, totus mador fuerit exhaustus, humidio cera- to, & cui euphorbiū admittū sit, illinendē. Porro secūda die, p hordeacea sania, miscere eruinam cōsuevit: atq vbi iam totū quod cōputruit exem- prum sit, paulatim primō quidem ad carnem gi- gnētiā, dein ad obducētiā cicatricē trāsire. Quā- do autē mihi nervus aliquis vulneratus occurrit, interim p liquida pharmaca curationē molior, interim per emplastra: lanā extrinsecus quāmol- lissimā, imbutamq oleo caltē, applicis. Quod si medicamentum ex aceto viſperem, aceti modicum oleo admiscēs, bis tēre quotidie soluo, & oleo calente soueo. Si nō cito longæ fuerint, etiā in his solvere cōsuevit: idq magis, dum vlcus a medicamentis eroditur. Oleum autē quo foue- bimus, satis caltē esto: verūm ita, ne vultu eratam partē offēdat. Nam vt frigidū huiusmodi af- fectibus a diversissimum est, sic tepens nō omni- no vñle. Nam quem admodum aqua ipsa, quate- nus calet, aut friget, maximē contraria facere u- ta est, ita quoq oleū. Frigidum siquidem corpo- ri admotum, perspiratum ipsius obstruit, & pro- hibet: calidū verū digerit, extenuat. Porro ab aquæ vſu in tora curanone ita tēpero, vt ne artin- gas quidē vlcus. Proinde, quū sanguis initio ita- tum a vulnerate parte abstergetus est, ex oleo id facere expedit. Iam verō acetum, si quando ipſo ad affectos nervos vtamur, in se nihil vinofum contineat. Quod autem omni affectione vacet, sitq omni ex parte tenuissimum: quale Sabinū existit. Memini autē me, quum alia remedia des- sent, nervorū vulnera propoli rectē curasse, in- terdum etiam antiquiori fermento: quæ ambo aliquando commiscui.

Vetus etiam euphorbiū oleo lætigis, instillatq cataplasmanis adhibens, aliās tendinem punctū sanauit: id quod, euphorbio rectē adhibito, neu- tiquam successisset, quum calorē magnum, mor- dicationēq, atq dolorē exciter. Eorum tamen euphorbium est, quæ calorem caducum, atq sta- tim evanescētē sortuntur. «Cæterum aliis mul- tis pharmacis accidit, vt pauculis annis eorum vis resoluatur: id quod, post thapsiam, nullo mi- nus euphorbio cōtingit. Quippe thapsia bimū- la expirat penitus, quū euphorbiū vires ad sextū vſq annū seruari possint. Porro vbi pharmacū consentientia simile acopis ductis vnctionibus ha- bere volueris, oleum sit quadruplū ceræ. Vbi ve- rō emplastrū speciem referet, parem ceræ portio- nem oleo expedit tēperare, maximē si sicca & ve- rusta fuerit: ac tum sanē ipsi ceræ sit tēperatē, po- teris sextam partem euphorbiū recentia adicere: ita vt illius sex draclmæ, ceræ sex, atq itē olci sex miscēantur. Licebit etī refinē aut picis aliquid emplastro ipsi adicere, vt glutinosius evadat: tunc tamē minus infundendum est olei. Ac resi- narum quidem omnīū siccissimā est, quam aliq phryctam, aliq colophonī appellat. Huic suc- cedat quæ ex figulinis impura sumitur: quam si

Nervosarū par- tium doloribus quid medetur? Purgissimum circa articulos partium curatio.

Nervi vulnera et curatio.

Tepidum oleū caltē nervo nō congruū.

Aqua sſum val- neratū esse ner- vi minimū ſu- mum.

Euphorbiū ad punctos tendi- nes facere.

Euphorbiū vin- oſo transſicere.

Thapsiā bimū- lam expirare præſent.

Colophonū deſ- ſinatū.

purgat,

porget, in pluryſtem mutabit. His ambabus ſicior eſt, quæ dial ptyrinon phyſema. Ego tamen ad rem propoſitam pluryſte vror, & liquidis. Ha rum ruriſ nonnullæ diuiniſ liquidæ permancet, quemadmodum terebinthina: alæ citò inareſcunt, vt ſtrobilina: media vtriuſque eſt abietina. Quin eodẽ facultate calidior eſt quidẽ ſtrobilus, mox verò abietina, deinde terebinthina. Poteris autẽ medicamen quod euphorbii receperit, experiri io tuo cure, vel brachio: atq; ita eſt affectu quẽ in-

Propolu viret.

Fermentu facit
lat.

Nervu vulnera
tu cifferet, quæ
humores ex alto
ducent, ac
digeret poſſent.

Empirici cur ſi
milia tantum
medicamenta
conſueverant.

Aquã nervi ſe
ſu effuſumel.

Tendones atq;
neruorum affe-
ctus aquẽ per-
cuſus eſſe, con-
ſuevit medicu
rumuſ deſide-
rare.
Femoris vulne-
ra glutinandi
valia.

Tendones non
aliq; periculo
conſus,
Ligamentorum
affectus cur pe-
riculo vacat.

Medicina par-
tes motuſ opẽ
deſiderant.
Punctuſ non
neruam anguſta
non iſſidem me-
dicamentuſ vtri-
uſ, quibus ner-
uũ quati.

neruo nudo eſt ex viſu. Quippe multo calidius eſt magiſq; mordet, quam vt nudus neruus ipſu perferre poſſit. Præcipue autem danda opera eſt, vt orẽ anguſtiorum punctum aperire ſint, quod calidum medicamen ad morum extrinſecum, per eas vapores eliciat, attrahẽs humiditatem circa affectum locum intus deliteſcentẽ. Quamobrẽ orificium duabus in cure ſectionibus ad rectos angulos diuidere oportet.

Punctuſ anguſta vna quomodo diſecti de

Conſectiones medicamentorum ad ner-
uorum vulnera.

Ex metallicis aſtringẽtia vitanda ſunt, præſer-
tim vbi nerui ſunt puncti. Detergentia autẽ con-
ferunt: quæ tamẽ ſub ſituo ſole, ex acerrimo, ve-
tuſtiſſimo, ſubſtantiaſ tenuiſſimo aceto leuigra-
re oportet, quod ſeliciuſ craſſiſſum partium, quæ
omnia metellica prædita ſunt, auferat. Quantò
aurem longiori tempore attrita fuerint, hoc te-
nuiorem cõſequenter ſubſtantia� eruntq; apno-
ta anguſtiſ vulneribus: quemadmodum in ner-
uũ carne nudatis, admodum tenuia, exedentiſ
cauẽda ſunt: quib; ſanc paſſillũ Andronis, Poly-
dæ, & Paſionis congruunt, ex ſapa, quam Sireuſ
vocat, applicio. Ad punctos autẽ neruos equi-
dem cõpoſitiſ medicamentis omnib; illud præ-
ſtituſ ſemper eſt viſu ipſo cõperiri, cui copioſi-
aeris ſquama inſectet: deo chalcitis combuſta, po-
ſtea miſy. Porro vbi neruus q nudus erat, ab im-
poſito medicamẽto iam tectus fuerit linamẽtis
extrinſecum, vnũ alioquin ex iſi quæ ad anguſtia
conueniunt vulnera, ſuperponendũ eſt aliudq;
eiuſdem materiẽ toti affectũ particulẽ circundan-
dum, ita vt fanas quoque partes, præſertim ſu-
perpoſitas, plurimuſ comprehendat. Quum au-
tem permaſſa differentia humanorum corporu
ſit, ob idq; vnicum medicamentum omnibus cõ-
venire non poſſit, duẽ ſemper in promptu habe-
re: alterum nempe valentiſ, ſed ex ſimilibus ge-
nere cõſectum: alterum mitius & blandius: quæ
in vicem temperas, dum poſtulat viſus, pro va-
rietate miſture, permulta alia media inter ipſa cõ-
ſtitues. Eſto igitur valentiſſimuſ metallicuſ ta-
le: Chalcitidis crudę partẽ j. miſyos crudi partes
ij. priſ ſquamp; partes tres. Miſiſimuſ hæc recipi-
ar. Miſyos, chalcitidis, vtriuſq; cõbuſti partem j.
ſquamp; partes quatuor. Mediũ ſit tale: Miſyos,
chalcitidos, gruginis, cuiuſq; vtri partẽ vnũ: æris
ſquamp; partes tres. Præterea cerg in valentiſſimo
duplũ: in mitiſſimo duplũ, atq; ipſius dupli di-
midium miſcetur: at in medio, duplum, ac ipſius
dupli quartũ partem miſcere oportet. Quum igitur
vtri valentiſſimuſ ex ſex partibus cõſtet, duode-
cim illi cerg partes miſcebis. Imbecillimuſ au-
tem, quomodoquidẽ ex ſenis erit conſtabat, octo-
decim quod duplũ, ac dupli dimidium eſt) reci-
piet. Mediocri verò dimidiũ harũ partium orni-
nũ indet. Atqui octodecim & duodecim, trigina
partes conſtituũt: cuius numeri dimidiũ con-
tinet quindẽcim partes. Tot igitur mediocri me-
dicamento adiciuntur cerg portiones (id quod
erat duplum, & dupli pars quarta) ſive ex dra-
chmẽ ſint, ſive vncie, ſive etiam libra. Porro me-
ſura quæ Romani memuntur oleum, eſt cornu,
diſcretuſq; circularib; lineis, totam ipſam diuidẽ-
tibus in duodecim partes. Atq; integra quidẽm
meſura ab eis appellatur libra: vt eius duodeci-

Nervuſ vulnera
tate quatuor
medicamentis
congruat.

Medicamenta
duo aſſiſi quidẽ
dum generat, ſed
faciliuſ deſi-
ſſimis ad vul-
nerate: nervuſ
cur in promptu
habere ſemper
oporteat.

Meſura cornu
vna olim apud
Romanos cor-
nea.

ma portio, vncia. Iam verò prædictis pharmacis omnibus, iuxta ceræ portione, addatur oleū effentia tenuioris, minimeq; affingens, quod quidem cerā ipsam dimidio superet: ita ut octo illius vnciæ, duo decim olei misceantur. Quin etiam vbi metallica plurib; dielut in mortario trita ex acetato fuerint, commode illis rursus candidissimū atq; pingue miscetur. Cuius quantitas medicaminum portioni sit par: q; licebit nob; augere aut minuerē, prout volueris efficere medicamentū mitius, aut acius. Cere etiam oleo liquat; potest aliquā resins ex prædictis inicere: scilicet acius futurū pharmacū, & robilina iniecia: mitius, cere binthina: mediū vniūsq; abietina. Ex harum genere quoq; est larix, ceterū prædictis humidior, liquidē piceæ substantia similis. Miscebis igitur cere, sextam vniū dictarum resinarum partem, si vis ut medicamentum emplastrū formam retineat. Chalbani verò æquale thuri pōdus inde, vbi minimū reddere statuis: duo valentius, vbi dimidū: quando ipsorū mediū, id quod inter æquale & dimidiū est. Inest porro chalbano, vt emollitibus omnibus, etiā putrificū qd; quare nudatis nervis non vsque adeo cōuenit. At si nudus nervus nō sit, haud mediocriter pmissio ipsius ad dolorē leniendū confert. Omnia quippe metallica exasperat, dolorēq; excitant: vt ex humidis etiā, acetum. Quare dolori ab his excitato, plurimum auxiliat foras ex oleo & chalbano mistis administrari. Nihil autē minus chalbano dolorē lenit adeps tenuitate subtilit; prædictis: qualis a feris, & agrestibus animalibus sumitur. Nam animalium quæ cōclusa in vrbibus degunt, adeps est & humidior, & crassior. Ex his igitur quæ leniant dolorē, habere aliquod me dicamen expedit, quod ex metallicis composito possit interdum miscere.

De medicamento ex euphorbio confectis. Vetus euphorbiæ recetiori lōgē est inferius. Si igit anniculus sit, etiā Cyrenop succo, quē nūc habemus, & cuius irrigatione stirpes augēt, & fuculentas reddūt, magis exalfacit. Porro colore quidē vetus recetū fluidius pallidiusq; apparet: subtilia, durius & siccus. Conficit aut ex recetū euphorbio calfacis medicamentū in hunc modū. Euphorbiū vn. j. cere vn. iij. olei vn. xij. q; sine gmate intrepidē vti ad pūcturas poteris, dū veris ne oscula ipsū cōmiescit. Quod si imbecillius fuerit euphorbiū ipsū, augenda eius mensura est, pro imbecillitatis ratione. Ceterū cōfectura ceram euphorbiū triplicatam continens, aliarum est valentissima, quam illud recens miscet: quincuplam autem recipiens, invalidissima. At quadruplā capiēs, medio inter vtrasq; gradu cōstitit. Quod si vnguentū proponas facere, qualia ætera nuncupantur, oleum cere quadruplū immiscebis: si verò, vt in fracturis, liquidum ceratū parare, duplū. At emplastron medicamen euphū conficere, oleum pari mensura cere immisceatur, si quidem ambis fuerit calore temperatus. Sin autem ille frigidus sit, cera autem vetus & arida, paulo amphiori misceri debet. Vt autē tenacius hæreat, terebinthinā, aut colophoniam, oleo emplastro adijcere. Pix etiā, cerati consistētiā tuetur. Multo autem præstent medicamentum, si resins, picisq; loco, propolium cere

parē adiunxeris. Quæ si pinguidine careat, cupimūq; vt adhæreat pharmacū, terebinthinam, vel laticem, vel sycomitē pinē, vel resinas sua sponte fluentes, miscebis.

Medicamen cōfectum ex liquabilibus.

Ex aceto citra ignē liquefit ammoniacū thymama, sagapenum, & opopanax. Igni verò solvantur, propolis, cera, resina, & consimilia, quæ in duplici vase liquare est melius: nempe quā in cacabo aquam calidam continente, incumbēteq; prunis, alterū vas consistit, præter liquabilē etiam chalbani continens. Valentissimū igit ad vulneratos nervos medicamentum sit huiusmodi. Opopanax ex aceto dissolutum diuini cōterito. Postea liquefacta illa super igne, propolium, chalbana, & resinam terebinthinam misceto. Singulorū itaq; aliorum pars vna est, pro poleos recetū pinguisq; sex. Quæ si careas, eius loco picē pingue inde, qualis est brutia. Quod si hæc non adit, vteris terebinthina. Ego nōnum quam vel solum medicamentum ex pingui pice cōfectū imposui, quo etiam ad canum morsus vtiuit. Id autem recipit, picis lib. j. opopanaxi vn. iij. aceti, in quo illa coquūtur, sextarium Romanum. Etenim puncturæ oras cōnere non sinit. Sic tū composito, in duris tantū vtemur corporibus. Nā in mollioribus, ex aliquo molliori, sed digerētē, vnguento vel oleo liquidum est. Quod si loco opopanaxi, sagapeno prius in pila trito ex aceto, liquefactā resins, propolium, & adipe quādam acriorē adicias, eiusdē generis medicamē habebis. Mollius tū est qd; ex resins, poli, seu, ac cera colligat; absq; aceto, conficitur. Ceterum qd; in dētur seum, sit acce: quale est qd; ad agrestibus animalib; sumit, quodque vetustū exsistit. Porro ex medullis, æterna, vniūsq; aut cellum.

De pharmaco ex columbaræ stercore confecto. Columbarū turricolarū stercore acce est: quo interm ruri sum vti in adoleſcente, nervi vulne re affecto. Cuius sanē tū cōpositio, tum vti, idē est, q medicamini ex euphorbio inest: aliis quidem eodem modo se habentibus, sed euphorbiū loco, stercore in dītro.

De medicamento ex herbis confecto.

Ex herbis etiam tenuiū partium, amaritudinem absq; attritione, aut acore modicum, referentibus gustu, haud inodorem ad vulneratos nervos cōfici medicamē potest. Tales enim sunt dictamni, amarum, aristolochia, polium, argemone, chamæpitys, centaureum, atq; id genus alie: quemadmodū etiam radices omnium aristolochiarū, dracūculi, cucumeris agrestis, bryonig, althei, tri dia, acori, mei, asari, phu, gentianis, & panacis: q; omnes, perinde vt collyria arida, leuigari in tenuissimum pollinem debent. Nam quod crassa est substantia, nervis vulneratis conducit nihil. Leuigarum autem medicamen, alio qd; cerati modū habeat, est excipiendum: idq; ea tēperatura, quæ in euphorbio prius indicata est. De sumptuosiss pliarum cōpositionibus, vulneratis nervis congruentibus.

Iis autem qui odoratis & preciosis oblectant medicamentis, in hunc modum illa soleo consistere. Cinnamomi, dictamni, mari, singulorum drach.

Refinarum diffinitio.

Emollitibus omnibus iniecia putrificū quæ Chalbano pōdus vniū ceræ. Metallica omnia dolorem excitant. Adeps tenuior partem, leuissimū dolorem.

Euphorbiū vetus recetiori est inferius.

Medicamen ex euphorbio ad nervorum partem cōmiescit.

Medicaminum varietas cōstitutio parū ratiōe.

Liquandi medicamenta in duobus vaseis.

Medicamen ex pice, vti ad canum rabidum morsus.

Medicamen ex columbaræ stercore.

Medicamen ex herbis confectis.

Medicamina sumptuosissima valneratis nervis congruentia, drach.

drach.xl.amaraci paulillum. Hec redacta in tenuissimū pollinem, cum cerato ex opobalsamo optimo, & cera Tyrrhenica factō, cōfundo. Debent autem ceræ partes octo, opobalsami decē, in id ceratū coire. Adcoq̃ etiam partem vñi terebinthi odoratæ, vt medicamē non sit friabile, sed sibi mutuo cohæreat. Sed ex eodē cerato, & li quore Cyrenaco, similiter aliud medicamen cō pono, mixtura ꝑ portione euphorbio facta: tertiumq̃ aliud ex vtriusq̃ temperatis constat: quar tum deinde, quod in se myrrha stactē recipit. In quibus autem neruus est nudus, ibi ceratū ex ce ra q̃ vocatur myrrepece, & vnguentis apud Ro manos foliatis & spicatis dictis, composuo, duo decimam partem pompholygis etiam misceō. Li cer autem ex Tyrrhenica cera id conficere: q̃ so lam nihil etiā prohibet ex nardo optima lique ficere, idēq̃ in duplici vase: quod in omnibus vn guentis sit cōmune præceptū. At raso cerato, spi ex nardi, amomi, folij malabathri, & elone pom pholygis, pares singulorū portiones miscebis. Etenim in puncturis, acriora pharmaca ex vsu sunt, quæ vulnera apertū consequentur. Denudatis autem, mediocri astrictione, cum digerendi vir tute absq̃ morfu, prædita offerre conuenit. At amomi, astrictionis cuiusdam est particeps. Ma gis autem ipso nardi spica, & malabathri foliū.

Quæ alij scripserunt ad sananda ner uorum vulnera.

Quidā nostræ ætatis Medicus vtebatur me dicamento, similiter uicis cōfecto, ex metallicis. Recipiebat enī ceræ vnc. vj. olei vnc. ix. misyos drach. vj. chalcidius dra ch. j. squamæ æris vn. ij. æthis vn. j. s. chalbani vnc. j. Cera & chalbani liquata, metallicis aceto interitis superfunditur. Porro si neruorum vulnera non comiterur ple gmonē, molliora humidioriq̃ statim à principio sunt potiora medicamētis durioribus, ac ficio ribus: præstatū liquata ipsa in digerente quopiā, vel mingatorio medicamine administrare. Vo co digerētia quidem, vetus oleū, & ricinum, & ficyonium: mingatoria autē, rosa ceum, chama melinū, & quod ex althea conficit. His fortiora, eoq̃ durioribus corporibus magis idonea sunt, quod ex cucumeris a gressis radice oleo decocta exprimit: & quod ex iride, bryonia, & aro para. His valentius est, ex dra cunculo, aristolochia, & panacea factū. Nos frequenter vli oleo sumus ex abietis semine, populei flore confecto.

Claudij Philoxeni Aegyptia, neruorum vi tiis, aliisq̃ congruentis affectibus.

Argenti spuma, ceræ, sing. drach. ix. ammonia ci thymiamati drach. lxxx. propoleos drach. xl. resina sicce, terebinthinæ, squamæ æris, thuris, sing. drach. xvij. lanæ succidæ exvñæ, squamæ stomomatis, sing. drach. viij. opoponacis drach. liij. ricini heminas tres. Conficito artificioso.

Fuscum Andromachi, contra puncturas.

Ammoniaci, ceræ, terebinthinæ, gris combusti, sing. drach. viij. picis aridæ drach. xl. lithargyri drach. iij. aloē Indiciæ, aristolochiæ, chalbani, sing. dra. ij. æruginis dra ch. j. thuris drach. ij. olei hyeme quartā heminx partem, æstate octauam:

aceti tres cyathos, quibus ammoni acum dissoluatur. Con ficio.

GALENI PERGAMENTI de compositione medicamentorū seculi dum genera, lib. IIII.

Q Vandoquidē ex dysepuloticis quedā, fa nieri humorūq̃ vlceratoris partibus in fluentū vitio, ægrē ex acricē admittunt: quedā ipsa affecta sede influentē succum quam librum corpulentum, secunda ratione vlcera dysepulotica & cacoethe propriē nomināt: in quibus interim totam partem affectam excin dere, vel ad virere nōnulli coguntur, aut medica mentis crustam inducentibus, aut igne vtentes. Quum autem ampla vtriusq̃ latitudo sit, ito eo quod alterum altero magis dysepuloticum ma lignūq̃ est, tot sanē desiderant auxiliaria phar macā, quod fuerint ipsorum vicerum differētia. Quare duo vt minimū, quæ idem polliceantur, eandēq̃ facultatem offendant, differant tamē maximi minimiq̃ ratione, in promptu adesse il li cōuenit, qui omnia id genus vlcera constitue rit curare. Ceterū vbi nullus vniuosus succus vlc eratas partes infestat, tale requirit pharmacū, quod influentē quidem humorē repellat, infixū aut parti, discutiat. Atq̃ licet sanē vires contrarij præstant. Si quidem influxū reprimūt astrigen tia: impacta digerūt, quæ trahēdi potestate sunt prædita. Porro quæ astringūt, maiori ex parte ex asperat, atq̃ hac occasione molesta sunt. Trahē tia verō ac digerētia ex alto humores, non citra acrimoniā id faciūt. Ac acrimoniā dolor aliquis necessariō sequitur, mordens vlceratam particu lam: vnde influētis humores irritari cōtingit, ac proinde in vlcere phlegmonem excitari. Ex quibus liquet, medicamēta dysepulotica malignā quæ vicerib. cōgrua, esse diffidillima inuenta. Inueniendā tamē aliqua eorum materia est, qua vlcus citra dolorem siccefat: quod accuratē fie ri nulla ratione licet, ignoratē medico, quem ef fectum ad morum medicamen offendent. Quip pe ex erodente simul & astrigente, validū consti citur pharmacum. Ceterum sordes humorū vlc eri incumbens, pharmaci rationem exoluunt. Itaq̃ perpendendū est, quantū primus vsus hu miditatis ac sordium in vlcere deficcauerit: atq̃ ita secundū, tertiumq̃ vn illo debemus, donec siccum & purū vlcus ipsum apparat. Vbi verō id tale conspexeris, ad aliud medicamentū te cō feres, eiusdē quidem speciei, sed priore imbecil lius. Scire autem oportet, medicamenta ipsa nō alia ratione mēdi vlcerebus, quā q̃. in exul cerata particula eam siccitatem inducant, quam fortiebat quū se haberet secundum naturam: id quod factū intelligimus, vbi neq̃ tenuis am plus sanies influit, nec pus ꝑducitur. Revocan da igitur ad memoriā sunt ea quæ citra morūm excicit, cuiusmodi complura metalla existunt. Meminisse etiam oportet, combusta, & lora, acri moniā, quam prius habebāt, amittere: ac proin de ipsis vtendum esse, in iis qui molli carne sunt præditi, admodūq̃ ad sentidū prompti, nec non cacochymi. Nam in aliis corporib. allata etiam vsurpari licebit. Siccāt igitur modicē. Lem nia sphragis, cadmiāq̃, præsertim quæ sponte na scitur: quam sub æstiuo sole pluribus diebus ex aceto, aut vino gilio pelluadōq̃ interfe, excicit.

Dysepuloticis
differētia.

Vlcibus ist
desiderat
pharmacia,
quæ ipsorum
sunt differētia.

Vlceratorum
parium, quæ
non infestat vi
tiosum succum, cu
ratio.

Dysepuloticis
cyrenaco ma
dicamento, cu
sunt diffidillima
inuenta.

Vlcibus quæ
ratione medi
camentis mō
deantur.

Vlla et lota me
dicamēta, acri
monia quam
pus habet
amittere, & ob
id ipsis vtendū
esse in molliorib.
& cacochy
m corporebus.

Vmuerata om
nia in eodē es
senti in dupl
sua

Puncti arri
quon nudi, a
diora phar
ca possunt.

Digerētia quæ
Mingatoria.

Ammonia Cleu
dy Tholomæ.

Ammonia Cleu
dy Tholomæ.

Chalcitis cro-
ciat exsiccata.

tiorem reddo. Chalcitis cōbusta, quam cadmia,
valentius siccatur. Per se autē, nec combusta, si ad-
ministratur, crustas excitat. Lotam vocatur ipsam,
deinde siccata habere est satius. Minus enim lota
quam combusta deficcatur, tum lōge mitior est,
minusq; mordax. Per similem medicamentum
est etiam arugo combusta. Nam quæ ignem nō
est experta, fortissimū medicamentum est, sicut
chalcitis. Verū hęc nōnihil etiā astringit, & ea
multo magis chalcitium, quod inter metallica
maximē ficitur. Misq; sūt & fori diuolida sunt co-
gnata: tenuius tamē misq; apparet, minusq; mor-
dax & vrens: crassius fori, & vtrūq; ficitur imbe-
cillius: quædam modū & finim maiorem astrin-
gendi, siccandi q; vim, ac fori, possidet. Porro di-
phryges vicerib; ægræ humoris vitio ad cicatri-
cem veniēbus, aptissimū medicamētū existit: va-
lida namq; ficitur, etsi fit mordax modicē. Ad hęc,
præter acritē tam qualitatē, tum potentia, vim
astringentiā possidet. Iam omnes differentie alu-
minis, vlcera sanis exsiccant, generosē astringētes:

Chalcitium.

Diphryges.

Alumina sile-
cia nō sūt ad vi-
cera vrendum.

Siccantia citra
resolventem qua-
litē.

Siccantia citra
resolventem qua-
litē.

Vlcibus cito-
maticis aduer-
sari tū oleo-
sa, tū acida.

Vlcera quomo-
do sine tractamē-
to.

quæ nemo solis is ad vlcera vtratur. Igitur quæ
plethiora, vinosiorq; succo laborat corpora, quæq;
tenera carne prædita, & ad sentiendum maximē
præpta sunt, faciliē ex moris, & osoneq; phlegma-
nem cōtrahunt: quare minora medicamēta de-
siderant: cuiusmodi sunt, vitæcolla, iclithyocol-
la, chrysolacca, plumbi vitæm, fori, stimulæ: si-
militer etiam combusta. Insuper plumbi scoria,
probe siccata: quædam modum ferri squama, quæ
enī abstergit, purgatq;: vnde pura vlcera reddit,
quod reliquæ quam non possunt. Quare si hæc
omnia medicamēta arida vlcenib; malignis con-
tumacibusq; insperseris, mirificū videbis citra ro-
tionem ea deficiant: si ceteri vbi buc minorū testas
cōcrematas, purpurarum, ostreorum, aliorūq;
qd genus similiter adhibueris. Lapis etiam dia-
phaneus, siue specularius dictus, leniter ac sine
morsu exaccat. Eiusdem facultatis est vitæ vstrū.
Quinetiam Aegypti spissior fractus, galla immat-
ura, rheon, malcorum, siccanda & astrigendi
facultatem sortiuntur. Aristolochia etiam, iris,
acori, artemisia, panacis radix, argemone, cha-
mæleonis nigri radix, cyperus, dracunculus, &
gladiolus, assatim siccant. His evidentius adhuc
centaurii & posium: quibus paulō imbecillior
est terra eretmas dicta: vbi valentior, vocata am-
pellitis. Porro arugo ignem non experta, calx vi-
ua & illota, & molle aphronitrum (quod revera
aphronitrum est) sola per se non admoventur vl-
ceribus. Nihil autem nobis in prædictis vlcenib;
tam evitandum est, q̃ tum oleosa & mollia medi-
camenta, cuiusmodi sunt omnes adipēs, & quæ
siccarios emolliūt: tum actia, vrpiper, zingiber,
sinapi, & alia id genus.

Medicamenta prædictis quomodo
sūt vrendum.

Vbi igitur siccum aliquod pharmacum vlceri
imponere est animus, sordes prius sunt exprimē-
dæ, molli, puro, atq; sicco linteolo. Medicamen-
to iam indito, platyima ex emplastro labris at-
tenuandis cōmodq; extrinsecus superandū est.
Huic rursus linamentū vndiq; æquale foris in-
ciendum: cui spongiā ex aqua aut vino tinctā
applicabimus: quæ vtrifrigida maneat perpetuo,
per assiduū frigidū foris curabimus. Porro

deligatur ipsa in vlcere inchoanda est, atque il-
licitē ducenda versus partes supernas: quā tertio
quoq; die, nō singulis, solvere expedit. Tunc au-
tem si ambientes vlcus partes aliquid phlegma-
tes referant, meo Phlegmicio emplastro liquato
ex oleo, cui plurimum vini astringentis permi-
stū sit, externas platysmatas partes quilibet im-
buere expedit. Verū nōn ex obvio quovis o-
leo phlegmicū liquare oportet. Sed si rubor qui
dem, atq; omnino caliditas dominet in adiacen-
tibus vlcenī partibus, ex aliquo astringenti atq;
refrigerantiū id soluen: cumulo sunt myrtus,
melinum, & omphacini. Sin durities aliqua cō-
spiciatur, oleo veteri, vel vicino liquandum est.
Tutius autē fuerit, vel si nihil in ambiente vlcus
loco vitiosi appareat, superpositæ regioni ipsū
medicamentū apponere, vrpellet si qd prius vel
prauum, vel plus q̃ parat, insinuat: maximē quū
in crure vlcus obortū, superpositam habet vari-
cem. Quæ dum sanguine melancholico turget,
excidenda venit: q̃vis iuxta excisionē ipsius, vl-
cus malignū & contumax interdū oriri solet. Igit
in id genus vitius præstat, vitibus ægri consultis,
a seclione veng auspiciari: dein pharmaco purga-
re melancholicum succum, si nūq; etiam puru-
tosum vacuare: quoniam is quoq; interdū vna cū
melancholico inhiit, dum vices gignunt. Pos-
tea venā vlcenī suprapositam in longum scarifi-
care cōmodum est. Vbi abvnde vacuatis, et ipsi
venæ seclæ prius medendum. Postq̃ exactē iam
cicatricē videtur recipere, tunc aggredere mali-
gui vlcus curatio nem. Iam verō si en nonnūq;
malē effectus, vitiosū talis humoris est autem: si-
cuti & iecur: quibus vbi in primis cōsultū fuerit,
sic tandē accedere ad curandū vlcus oportet.

Pari modo si vniuersū corpus plethoricū, cacochymūve exstiterit, id prius vacuare, expurgare
que expedit, q̃ vlcenī medicamentū admoventur.
Cui quidē tum medetis, si valentioribus abster-
foris pharmacis ad minora, lenioriq; digrede-
re, si vlcus adamsim esse purū videat: quomodo
modū in sordidis ad magis abstergentia transi-
re cōvenit, nisi ex ratione medicamēti sint facta
sordida. Sæpe siquidē ad acri medicamento col-
liquata & soluta caro, in vitiosam sanie degenerat.
Ceterum causas vlcenū maiori, orisq; ruben-
tiores, & calidiores effectū cernuntur, quum ob
medicamenti acrimoniā ipse sordes accrescunt.

Compositio emplastrorum.

Quādoquidem malignorū & difficulter ad-
mittentium curationē vlcerum, summus scopus
est, vrmedicamentū citra morsum exacer, aqua
verō & oleum maximē omnium humectant, ab
eis abstergere oportet. At cara deligida est recens
& pinguis: qua in sole emollita, aut apud ignem
subacta, & in calidā aquam immersa, arida medi-
camenta prædicta excipimus. Medioere autē
medicamentum fiet, si quætra pars metallicorū
ipsi ceræ adiciatur: valentius autem si tertia. Ete-
nim quū laud exiguo discrimine invicē corpo-
ra differēt, vnum omnibus medicamentū rectē
præparari non potest. Enit ergo temperati phar-
maci cōpositio huiusmodi. Vtriusq; eruginis, x-
ris combusti, sing. drachi. j. aluminis scisci drach.
x. ceræ drach. x. Conficito. Minus autem morde-
bit, si loco aluminis integrā diaphrygis drachmā
adicias,

Deligatur vl-
ceri, quāto sit
adhibenda. Et
quādo solven-
da.

Resolventia esse
applicanda re-
gioni suprapo-
sitæ vlcenī.

Varices quāto
excidenda sint.

Vlcenī cui va-
res insidit, ut-
ratur.

Sordes ab acri
medicamēto ex-
citata, quomodo
delicere debet
ab eis quæ vi-
ces proprias ra-
tione præstat

Vlcenib; cito-
maticis, ut
oleum & aqua
adstruantur.

Vlcenib; cito-
maticis phar-
macum temper-
atius deferendi
sunt.

adicias. Quod si expurgare sordes cōsiliū sit, sic conficiemus. Aeris, æruginis vitæ, diphyrgiæ, sing. drach. j. acris squamæ drach. s. ceræ pinguis drach. x. Mucos. Cæterum si cera ipsa sit siccor, emollitæ est alioquo astringente oleo, vel larice, vel terebinthina.

Ad chironia & difficilia vlcera medicamē ab Asclepiade proditum.

Aeris squamæ vnc. j. æruginis rase tantundē: ceræ seibram: resinæ laricis vnc. s. Quæ liquari possunt, aridis affundunt: quibus excepta, ac cunose emollitis, vntor. Cæterū plarysima exigui soli assectx parti, vt vlcus tantum cōprehendat, imposito. Ambietes autem particulas pharmaco quod phlegmonē arceat, circūdare oportet. Inter curandum tertio quoq; die soluere, dein somentis mingare, ipsūq; emplastrum quod plarysima vocatur a latitudine, abluēdo emollire, ac rursus imponere, donec cicatricem inducere incipiat. Ego certē Attico nonnūq; cæsylo cerā tē

perauī. Meminisse autē oportet, qualitates omnium vicinorum corporum, muruō in se agere, etiam si alterū ipsorum multo validius sit. Vnde processu temporis quodāmodo evadūt similes. At vbi qualitas medicamēti curādo corpori spece similis fuerit, maior vitilis sequit. Porro diphyrges, si vel solum inspergatur vlcibus quæ difficulter cicatricem admittunt, apbē illis medetur: item & xā cōbustum. Aerugo autem exedit atq; mordet insigniter. Indē calx ignē nō expecta, quā insigniter mordet, exigua pornone alia medicamētis a nōnullis miscet. Extincta medocce est pharmacia. Elosa profus lene, & mordacitatis experta.

Pharmacū ad mitiora vlcera cicatrice inducenda, ab Andromacho scriptum.

Cadmig toisæ lib. j. chalcididis vñs tantundē: ceris lib. iij. resinæ aridæ lib. iij. myrti lib. iij. Vinum miscetur aridis. Quam autē ad maligniora vlcera valētoribus vtendū remediū sit, vt imbecilliorib. ad media: alind medicamētū subdam, quo vtor ad dyspeulotica. Aeruginis, & squamæ, sing. vnc. j. ceræ vnc. viij. miscantur. Si igitur casu sit vlcus, indito medicamēto repletur. Post hoc rursus aliud plarysima super accommodabitur, quod & labra cōprehendat. Huc deinde linteus frigidus madē tantus vndiq; oblitus, vt medicamētū occultet. Postremō sponsia mollis, fascia ex linteis excepta, vel femel, vel bis, assectx partē orbicularem ambiat, tantę magnitudinis, quō totū vlcus cum labris, ac superpositorū ipsis aliquid, subiectorūq; cōplectat.

Deligatio autē ipsa a duobus initiis fiat. Vocant sic quonies tota pars media vnculi assecto loco incumbit: vt rursus autem vncus in oppositam regionē deducitur. Vbi hæc primo die peregeris, altero aquam frigidā per spongiam fringat. Si ambies aē calidus & hūcus fuerit, bis hoc tēve in dies singulos est faciendum, ac deligatura tertio quoq; die soluēda: per hēmē, quarto. Affectus autem ipse indicabit, num fortius, vel mollus, vel simile sit imponendum pharmaciū. Emollies ipsum paululo myrtini, aut rosacēi, aut melini, aut lentissimi, aut masticini, aut cyprini insillato. Validius reddes, aliqd squamæ, aut aruginis addens,

Aliud ad obducenda dyspeulotica apsisimum.

Chryfocolly, squamæ, sing. drach. ij. ceris drach. vj. diphyrgis drach. ij. lithiagry drach. viij. Confundito. Adverrendū autem est, minā pharmacia mihi dici farco collam, chalcitidem vitæ, æruginēq; cōbustum, atq; chalcanthon: quæ ignem nō experta, acris omnis sunt: combusta, moderata: lora post combustionem, lenia, rosso nilq; experta.

Aliud mitissimum.

Elori plumbi drach. ij. spodij, cadmig, diphyrgis, sing. drach. iij. terebinthine quæ excipiuntur drach. vj. Zeno addit chalban dracs. s. Etenim satisfius est modica portione miseri pharmacia id genus, quā nimirum confectum sibi faxeam duritiē cōtrahant. Porro in liscie omnibus, illa q; liquari possunt, liquefacta & refrigerata, abralig, sicis diligētē redactus in pollinē, admisceto. Nam si liquida ipsis affundas, in grumos concresecēt, maxumē vbi invaluerit frigus. In sole autē feruenti si matura fuit, licet ea superfundere, mouendo rudicula primū, dein cōchleario: præstat tamē ad omnia hæc ramulculus palmæ.

Aliud ad desperata vlcera ex collectanecis Primionia.

Soreos drach. xxiij. aluminis scellæ, malicōriæ, calcis viæ, sing. drach. xv. lithuris drach. xxxij. gallæ omphacitidis tantundem: ceris drach. cxx. seu vitulini (aut eius lico, adipis porcini & veauti) drach. lx. olei vetetis hemin. Conficito. Porro fori, alumen, malicōriæ, galla, nō digerendi facultate, sed astringendi eximia, sunt prædita. Etenim sub astringentiū genere cōtinenti austera & acerbata: sed illa quidē astringit mediocriter, hæc autē, hoc est, acerbata, vehemētē. Oia igitur astringentia cōtrahunt, ac dēstant meatus, vincitūq; cōtinent partū sibi coherentiū substantiā: quo fit vt altius ipsorū virtus penetrare nō possit, nisi ab aliis acerbis, atq; subniliū partū ducantur: id qd ipsi calx in præscripto medicamēto præstat. At vero in duratis vlcib. labris multo vilius medulla ceruina adhibet: quæ si non addit, vitulina. Porro in veteratū oleū ad adipē suillo (quē oleo cōmuni liquatam mīstiores pro oleo vendunt) ex odore & cōsistentia discernes. Vtrūq; tamen inveteratū, rosionē quam dē acquirat: quo nomine ad vlcera præter modū maligna conveniunt. Talia em̄ appello, in quibus aut pars assecta tam vitiofo habitu est prædita, vt vel optimū sanguinē, qui nutritionis gratia confluit, corrumpat: aut id quod influit, a dēo peruersum existit, vt etiam pars rectē se habeat, ab ipso rñ sōlo erodatur. Igitur vt citra rationalem methodū medicamenta cōponere, ita vim illorū certū & accuratē cognoscere lenē experientia nemo potest.

Epuloricū dñd radari a Critone cōscriptum, quod prætumidis, durisq; & causis vlcibus cōvenit. Picis aridæ drach. s. æruginis rase drach. xxiij. gris combusti drachmas xv. squamæ rubræ drach. xxiij. ladanū vn. ix. argenti spumæ lib. iij. olei sextarium j. s. Etenim arida pix evidētē siccat. Calcat autem modicē: ob idq; pus mouenribus medicamentis miscetur. At quoniam aliquand calidum, frigidum, humidum, aut siccum dicimus, cū optimo corporis temperamēto id con-

Vlcibus difficilibus, pharyngis Asclepiada.

Vicinorum corporum qualitates in se agere mutant.

Aeruginis facultates. Calcei vñs.

Vlcera maligniora, valentioribus vtendū remediū qd re mediet: imbecillioribus autē, mitiora.

Deligatio vñs ceratū partibus quæ qualis molliora sūt.

Necesse medicamenta quæ sunt.

Astringentiū qd quoniam cōtinent austera & acerbata, abstrahunt facultates.

Vlcera maligniora vñs quantū vñs vñs quæ sunt.

Epuloricū Critone vñs ladanū.

Picis aridæ facultates.

Vlcus ceru & puru, à quibus sanatur medicamentis.

Metallica ducuntur ex oleo, magis siccat, et minus resoluunt.

Medicamentum Crisostomi ex oleo leuissimum oleum facit.

Subtiliora sunt quae leniuntur aceto: quae ex vino magis cicatricem obducunt.

Archigenia ad vlcera ducuntur, et remedia.

ferimus. Igitur cauum & purum vlcus, à medio-
criter siccantibus medicamentis curatur: sordidum
verò & malignum, & oris duris & prætumi-
dis quidē, sed carne iuxta cutem fluida, validissimē
siccatia requirit. Verum quē metallica, vt siccant
sine vilo morfu, praeparas, coquere diutius
oportet. Sic siquidē magis siccant, ac minus ero-
dunt. Porro ladanū ipsum solū ex vino tritu, vl-
ceribus ægrē ad cicatricē ventientibus auxiliat.

Medicamentum ex chamæleonte à Critone descri-
ptum, inducēs cicatricem periculosiss & callosiss
viceribus. Lithargyri drach. c. ceræ drach. x. xru-
ginis drach. xxij. chamæleontis drach. xj. olei
minam. Conficito. Ego tamen huiusmodi em-
plastris ad cicatricem lentissimum consueui, & emol-
liat nō nihil, digerat, & astringat. quæ omnia, dis-
soluta vlcera cum labris induratis, desiderant.

Aliud Heraclidis Tarentini aduersus
vlcera vetera.

Squamæ drach. j. xru-
ginis rase drach. iij. ex-
cipiantur dracumis octo myrte cerati. Misce. E-
tenim metallicorum facultas à quibus cerato resoluunt.

Aliud. Squamæ tritæ acetum affundito, eamq;
sub Canaliculo exortu leuigato vsq; ad crassitudi-
nem mellis: vel etiā incoquito. Postea exiccatæ,
redactæq; in puluerem, cerati partes octo misce-
ro. Valet aduersus recentia vulnera, & vlcera in-
veterata. Licetbit enim ad ignem exicare ipsam
squamam, si alio tempore medicamentum id confici-
amus. Porro subtiliora sunt quæ ex aceto lqui-
gantur: atq; ob id melius purgant, attenuant, &
siccat. Verum ad cicatricem inducendam sunt ex
vino trita meliora.

Aliud Andromachi cicatricem ducens.
Oleum vitulorum drach. ij. melle drach. j. cad-
mæ obolos. iij. tritis vitulorum.

Aliud eiusdem, quo malignis cica-
trix inducitur.

Piceæ corticis drac. vj. cornu ceruini vti drac.
iij. cadmæ drach. xviij. melle drach. iij. xru-
ginis rase drach. ij. siccat vitulorum.

Aliud ad excrecentia vlcera cicatricem
absq; morfu ducens.

Sandarachæ, chrysolæ, asclepiadis, singulorū
partibus æquis confusis, aridissq; vitulorum.

Ad vlcera quibus callus obducit non po-
test. Ex Archigene.

Cōmuni quodam oleo expurgatis, verustissi-
mum cū linamētis imponit. Aerugo rase cerato
rosaceo, qd paulū resine habeat, excepta, impo-
nitur. Item squamæ æris rubri quam plurimū ce-
rato myrteo exceptum vsurpatur.

Eiusdem ad putrida & noma.

Sori crassissimū tritum, inasperissimū, condu-
cit. Vel aristolochiā rotundam, & gallam, equali
pondere ex oleo inungit. Vel cucumeris agre-
ssis radicē cum solis illicatā, calido cinere reco-
dit: quum aut emolliet, contritam imponit.

Eiusdem ad canceros.

Canceri fluuiatilis viti, & cadmæ, pares portio-
nes tritas inpergit. Vel canerem cancerorū cum
cerato imponit.

Eiusdem ad callosa.

Nitrū torrefactum & calcem vsum cum lo-
tio pueri impulsū liguata circumlinio. Conser-
uit etiam caustica medicamenta.

Andræ emplastrū ab Asclepiade scriptū, om-
nem excrecentiam reprimena, atq; arcens iustā
mationem. Argenti spumæ lib. ij. squamæ æris,
chalcidinis, xru-
ginis rase, sing. vnc. vj. acetū hēmi-
nam: olei veteris lib. viij. Misce.

Asteris medicamen ad idem.

Lithargyri lib. j. olei veteris lib. ij. xru-
ginis, chalcidinis, squamæ rubræ, sing. vnc. j. acetū hēmi-
nam. Conficito.

Iis emplastrum rufum, ad fluida, diu-
turna & maligna vlcera.

Argenti spumæ drach. c. minij sinopici drach.
viij. diaphrygis, ceræ, chalcidinis combustæ, sing.
vnc. j. chalcidinis crudæ drach. ij. olei hēminas ij.
Conficito vt decet.

Aliud Scribonij Largi, ad eadē accommodatū.
Cere drach. c. lithargyri drach. x. olei myrti
hēminam j. misyos cōbusti, chalcidinis vti, alu-
minis scissis vti, cerussæ, resine terebinthine, sing.
drach. xj. Conficito.

Aliud ex chamæleonte, ab Asclepiade scriptū
ad fluentia & ægre curabilia vlcera. Lithargyri
lib. j. olei veteris lib. ij. chamæleontis radicis trien-
tem: aristolochiæ tantundem: chalcidinis vnc. ij. gal-
læ vti. q. thuris tantundem. Conficito.

Aliud ab Asclepiade scriptum ad vlcera quæ
vix curationem recipiunt.

Squamæ xru-
ginis rase, sing. vnc. j. ceræ seli-
bram, resine laticis vnc. s. Conficito.

Decleōtis cephaliceon ab Asclepiade scriptū, id
quo educunt ossa corrupta. Aeris squamæ, man-
næ thuris, resine siccat, sing. drach. c. acetū hēmi-
nas xj. Terito squamā ex aceto, & quā lauis fa-
cta fuerit, thus in pollinē redactum adicito, resi-
næq; atq; paulū singiro: quorū assicicatorū
in vmbra miscens partē vnā cū cerati ex rosaceo
cōfecti parti portione, ipsa vitulorum. Aliud Hygie-
ni scriptum ab Hera, vtile viceribus ægrē ad cica-
tricem venientibus, necnon paronychiis. Lithar-
gyri chrysidinis, ceræ, sing. minam j. chamæleontis
nigri radicis drach. xxxvj. xru-
ginis rase drach. xviij. chrysolæ drach. xl. olei hēminas ij. Cōfi-
cito vt decet. Aliud egegiū. Cere, picis, bitu-
minis, sing. lib. j. melle, xru-
ginis, gallæ, ipisæ
Aegyptiæ, tridis illyricæ, aristolochiæ rotundæ,
chalcidinis, singulorū vnc. iij. aristolochiæ lōgæ,
gris cōbusti, vti vsq; vnc. ij. Conficito. Aliud. Bitu-
minis, aluminis liquidi, sing. lib. j. picis, resine
pityniæ, ceræ, sing. lib. ij. melli terræ rotundæ, gallæ,
spisæ Aegyptiæ, sing. vnc. viij. malicorij, gris vti,
melle, melli terræ lōgæ, sing. vnc. iij. olei ricini,
aut veteris, lib. ij. Conficito. ad dignitate. Aliud q
vitor in molli carne predit. Cere lib. j. rosacei rā-
tundē, cerussæ vnc. viij. salis ammoniaci vnc. iij.
squamæ Cypricæ vnc. ij. thuris, calcis vitæ, alumi-
nis, xru-
ginis, malicorij, sing. vnc. j. Conficito di-
ligenter.

GALENI PERGAMENI
de compositione medicamentorū secun-
dum genera, lib. V.

Polycresta medicamēta, siue ad multos v-
sus vtilia (de quibus agere in præsenti com-
mētario est animus) ex contrariis pharmaca-
cis cōstant, etiā iuxta qualitates scōdas, nō ran-
tium primas. Etenim primas appello, caliditatem,
frigi-

*Andræ empla-
strum facit ad
excrecentia vlcera.*

*Aliud medicamē-
tum.*

Iis emplastrum.

*Cephaliceon
ossa corrupta
educunt.*

*Polycresta
pharmaca ex
contrariis con-
stant. Qualitates
primæ ex secunda
qua dicuntur.*

frigiditatem, humiditatem, & siccitatem: tum ex harum coniugatione compositas: secundas autem, quæ hæc ipsas primas sequuntur.

Panacea Hera.

Hæc est emplastrum descriptum ab Hera, boni coloris, epulonicum, glutinans, implens, valensq; ad Chironia vlcera: cuius temperies est talis. Cereb. lib. ij. pluryctæ lib. ij. æruginis rase vnc. vj. manna vnc. ij. olei heminas v. aceti sextarium. Conficito.

Panacea Herae, ad omnem malignitatem vlcero mirè cōducens. Rumpit atq; dissoluit quicquid corruptū est: omnem sanguinis eruptionē suppressit: hæmorrhoidas ipsas consumit & tabefact: omnivici vlceri imposita, quāvis agrestis, minus ipsum statim reddit. Chamæpityos, diamæleonis, symphyti, marrubij, singulorū drachmas iij. polij, centaury tenuis, singulorū drachmas ij. helenæ, aristolochæ, singulorū drach. iij. thuris drach. xij. s. myrrhæ drach. iij. aloës drach. vj. chalbani drach. vj. obolum vnum: olei drac. clxxx. melis drach. xxx. propolis drach. xij. s. aluminis scissi, terebinthinæ, chalcitidis, sing. drac. vj. obo. s. bituminis, terre ampelididis, lithargyri, drach. l. gallæ & pulueris iridis sing. drach. ij.

Conficito diligenter. Porro maribus vel solo vti etiam quas in iis qui carnē abundè humidā & sordidam circa vlcus habent. Helenion verò laud item convenit solum inasperum: sicuti nec aliud quodvis acre. Nostri siquidem acris irritare, mordere, calcificare, & fluorem concitare ad as

fectas particulas: amara verò exicare citra mortem atq; calorē: eodē exviceratim conducere. Jam verò thus cōcoquit, & pus mouet intemperatis naturis: nam in corporibus humidioribus carnem producit. Nullum autem eorum quæ cōcoquant, ac pus mouent, valenter digerens est: sicuti neq; acre. Siquidē eiusmodi mediocriter ex-

calfaciunt: emolliuntq; magis, q̄ exiccat. Oleum lenit, ac valida pharmaca obundit. Terra ampelididis tum ficit, tum digerit. Chalbani emollit, concoquit, lenit, atq; dolorem sedat: quas vires thus, licet imbecillior, fortit. Terebinthina dertigit, discutit, & quodammodo cōcoquit. Bitumen cū calore non admodū vehementi, etiā ficit. Propolis attrahit. Mel ficit, & digerit, putrescentiūq; est maxime congruens, ex us exiens quæ minimè putrescere: quare cōposita huiusmodi à putredine seruat, præterquam

extremè ad putrescendum præpta, quæ humida sunt & calida. Myrrha & aloë citra rationem ficiant. Ceterū aloë astringit: myrrha tenuiorum est partium, magisq; ficit.

Illi Epigoni ab Hera traditum, valens contra oia vlcera, puncturas neruorum, hominumq; atq; canū morsus. Venenā à bestis illapsum extrahit: curat fracturas artū cum vulnere, fistulæq; & omnes abscessus sanat: atq; omnē fluxionem sistit. Cere drach. c. terebinthinæ drach. cc. squamæ rubri grs. fruginis rase, aristolochij rotundæ, thuris, salis ammoniaci, guttæ ammoniacæ, sing. drac. vj. aluminis viti drac. vj. æris viti drach. viij. myrrhæ drach. xij. chalbani tantundem: olei veteris heminā: aceti acris heminas ij. Cōficito. Et est hoc medicamen Epigonus com-

chusus in carcere, curauit quendam ex valde posentibus, vnde confectum damisus est. Ego verò

predicū etiam radicem dracunculij adicio, quæ vel per se, in orbiculos secta, asuscitæq; & redacta in pollinem, si inspergatur, malignis vlcerebus auxiliatur.

Emplastrū ex Dictamno ad eadem faciens.

Olei veteris heminas ij. lithargyri drac. c. æruginis rase drac. viij. squamæ drach. vj. colophonis liquide drac. l. manna drach. xij. ammoniaci thymiamatis drac. xxvj. æris cōbusti drach. viij. diphrygis drac. vj. gentianæ tantundē: aloës drac. viij. chalbani drach. xij. propolis drac. viij. cere drach. xxv. aristolochiæ drach. x. dictamni Crenci tantundem. Conficito accuratissimè.

Emplastrum ex vtrag aristolochiæ, cephalicū enemum, callosis vlcerebus congruens, atq; articulos solutos confirmans. Picis, cere, bituminis, terebinthinæ, sing. lib. j. mīnq; æruginis rase, ceruffæ, sing. felibræ: chalcitidis, aristolochij longæ, iridis lilyricæ, sing. vñ. iij. malcorij, galli maturæ, grs. combusti, sing. vnc. ij. spīg vnc. iij. aristolochiæ rot. drac. iij. aceti heminam. Ricini nī, vel olei cōmunis tantundem. Cōficito. Porro

manna exigua astringendi vim possidet. Vocat enim sic quod à thure excutitur, nonnihil etiā illius corticis obtinens.

Emplastrum Asanitæ, malignis vlcerebus, necnon ambustis conueniens.

Picis aris vncit: cere, adipis suilli, seu taurini, ægypti, sing. vñ. iij. resinæ picæ vnc. v. Conficito.

Emplastrū Haliei ex sinopide, nihil minus quā priora vtile.

Cere, lithargyri, vtriusq; minam: manna, terebinthinæ, chalbani, sinopidis, sing. drac. viij. olei veteris heminas duas. Conficito.

Emplastrū Machæronis à Critone descriptū, phlegmonē arcens, mirèq; cōducens vlcerebus. Aristolochiæ rot. chalbani, opopanis, æruginis, iridis lilyricæ, ammoniaci thymiamatis, myrrhæ, sing. vñ. j. terebinthinæ vñ. vj. s. cere vñ. lx. s. olei omphacini vnc. viij. s. Conficito.

Emplastrum ex salicibus à Critone la multos vius descriptum.

Misyos, chalcitidos, fruginis, ceruffæ, galli, aluminis scissi & rotundi, cere satonis, sing. vñ. vj. cere, resinæ ptyiæ, picis, bituminis, salicis foliorū, sing. vñ. ij. olei heminas ij. vñ. iij. chalcitū vñ. vj. malcorij tantundē: aceti sextarios sex. Cōficito.

Emplastrū venatorū, ad quadrupedum ictus, morsūq; & ad reliqua venenata. Argenti spumæ min: olei veteris, squamæ æris rubræ, cere, resinæ phycæ, sing. lib. ammoniaci thymiamatis trientē: chalbani, minij sinopici, sing. vñ. ij. Cōficito.

Viride Alcinonis, cōueniens fistulis, educens ossa, & strumas discutiens.

Chalbani drac. xvj. æris viti drach. viij. squamæ drac. xxiij. cere drach. l. seu capilli, vel vitulini, drac. xxx. thuris, resinæ ficæ, ammoniaci thymiamatis, terebinthinæ, nitrī, aristolochiæ, sing. drac. xxv. bryoniæ drach. xij. orchideos drac. xij. iridis aridæ drach. iij. aloës Indici drach. xij. fœculis drac. viij. felis taurini tantundem: aceti, olei, vtriusq; heminam. Conficito.

Viride ad herpetas, & ad Chironia vlcera ab Andromacho scriptum.

Hordel combusti drac. x. fruginis drac. xx. cere drac. lxxx. cyprini heminā. Ceterū hoc medi-

Emplastrū ex dictamno ad multa vtile.

Manna quid sit.

Emplastrum Asanitæ.

Emplastrū Machæronis.

Viride Alcinonis.

Acris facultas. Amara cur ex vlcera cōducant. Thuris facultas.

Pus mouitium facultas.

Olei facultas.

Chalbani virtus.

Terebinthina.

Bitumen.

Propolis.

Mel non putrescit.

Putrescentiūq; est maxime congruens.

Putredini quæ sine apertura.

Isti Epigoni.

Multa vtile me docemur.

dicamen aeruginem multam cōtinet. Porro com-
bustum liordeum, vel si per se infpergatur, chiro-
nia vlcera iuuat.

*Pastilli Aristar-
chi.*

Pastilli Aristarchi *αριστάρχου*, hoc est, ad mul-
tos vsus. Nā prater alia vides sunt in principio
phthisicis, lienosis, coeliacis, & dysentericiis, trib.
obolis in potu datis. Myrrhæ drach. vj. croci,
crocomagmatis, sing. drach. ij. citinorum, chal-
canthi, aluminis scissilis, aloës, sing. drach. vj. exci-
pantur vino Falerio, singulorūq; orbiculi, & as so-
ficcati in vmbra feruentur.

Polyidæ Sphragis.

Malicorij drach. vj. myrrhæ drach. viij. aluminis
scissilis drach. v. thuris drach. iij. chalcithi drach.
ij. sellis taurini drach. vj. Vino dulci excipiuntur.

Pastillus Thirepti ad aures pure fluētes, carnis
excrecentias, & narium vlcera.
Malicorij drach. x. gallæ omphacitidis drach.
viij. aristolochiæ tantundē, aloës drach. iij. myr-
rhæ drach. viij. fisis drach. ij. thuris drach. iij. pas-
so excipiuntur.

Pastillus *διὰ τὸ χυαίν* ad nomas &
scabiosos affectus.

*Pastilli do-
ctylæ.*

Licij Indici, aloës Indici, myrrhæ, xris, alumi-
nis scissilis, citinorum, thuris, sing. drach. iij. succi
myri hemine dimidium. Conficito.

Pastillus niger, quo vitor.

Malicorij drach. x. aristolochiæ, gallæ, singul.
drach. viij. aluminis fisis, aloës, sing. drach. iij. myr-
rhæ, chalcithi, sing. drach. ij. thuris drach. iij. Vino
excipiuntur, & quæ res exigit, vino dulci diluuntur.

Ad erysipelata.

Acaciæ drach. viij. mysos drach. iij. opij. drach.
ij. thuris drach. iij. cū aceto excipiuntur. Faciant
etiam ad herpes.

Ad herpes, Tiberij Cæsaris.

Diphrygis, meconij, aluminis fisis, acaciæ, sing.
vnc. ij. aceto vel aqua diluens vitior.

Aridum putrefaciens absq; morbo, ex
descriptiōne Andromachi.

*Putrefaciens absq;
quo morbo.*

Sandarachæ, arsenici, sing. drach. ij. calcis viij.
drach. iij. tritis vitior.

Pastillus sanguinem comprimens.

Chalcitidis, mysos, mannæ, sing. drach. iij. tri-
tis vitior. Ad ani vitia, alumine liquido nucis
magnitudine cum mellis cyathis duobus co-
cto vitior.

Aridum cephalicum ab Asclepiade scriptum,
quod tollit squamas, ossa corrupta educit, & ca-
ua implet. Iridis Ilyncæ, panacis, sing. drach. iij. 50
Aristolochiæ drach. ij. mannæ tantundem: cōtra
fis cribratissq; vitior.

Aridum Asclepiadis, cicatricem
inducens.

Calcis viux drach. vj. mannæ thuris, squamæ,
sing. drach. iij. redactus in pollinem vitior.

Cruetas inducens, Asclepiadis.

Chalcitidis crudæ, cadmij, sing. drach. iij. ieli-
nus ex salina excipito.

Medicamen Diatesaron.

Chalcitidis tostæ, mysos tostæ, diphrygis, chal-
canthi, sing. drach. iij.

Ad nomas Asclepiadis pharmacum.

Sulfuris viui, auripigmētis, squamæ, sing. drach.
ij. xris combusti quantū color exigit. Arido & ex
melle vitior. Etenim putrida vlcera, quā ambijē

tes partes depascunt, nomas propriè appellant.
Qui affectus vehementissimis medicamentis in-
digent, vii sepe in eis etiam causticis vtamur.

Apellis medicamentū *ἀπὸ πέλλης*, quod nomas
nō solūm sistit, sed incipientes prohibet. Chartæ
combustæ, plumbi viij, xris viij & loti, arsenici,
squamæ stomomaris, singulorum æquas portio-
nes, sulfuris viui dimidium: tritis vitior, vel cum
melle, vel ex rhodino.

Ad carbunculos.

Nitri rubri, arsenici, sandarachæ, chalcitidis,
aramētis sutorij, diphrygis, singulorū parem mē-
suram aceto laeuigis, excicatisq; postea eis tritis
vitior. Etenim carbunculus vlcus est crustum ei-
tō cum valida phlegmone circumstantiū parti-
cularum excitans: adeo vt febres vehemētes, &
extrema pericula inferat. Quare ipsi crustæ vali-
dum medicamentū imponere expedit, & ex his
quæ ad nomas conducunt.

*Nomas qualis
vlcera sunt, &
qualis medica-
menta pastilli.*

*Medicamen ex
charta combus-
ta, nomas cum
pessent.*

*Carbunculus
quid, & qualis
vltis exort medi-
camentis.*

GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorū secun- dum genera, lib. VI.

IN præsentī cōmentariō ad *εὐαγγέλιον*, hoc
est multū vsus medicamentū, me cōvertere est
animus, quæ tum ad alia multa singularem fa-
ciunt, tum ad putrescentes particulas aliter qui-
dem affectas quā illa vlcera, quæ difficulte cu-
rabilia appellantur. In putrescentibus siquidem
ipsa putredo vagat, ob idq; tales dispositiones
cōpures Medicorū *κατὰ*, hoc est, depautiones ap-
pellant. In illis aut, affectus secundū vnum locū
est circūscriptus, absq; vlla putredine: ita vt pha-
gedæq; vocat, exedant quidem partes vicinas,
non tamen putrefaciāt ipsas, nec febres inferat,
quæ cōsequi ad depascentes affectus cum putri-
lagine, consueverunt. Hæc igitur quæ nunc scri-
bentur omnia, mordacia sunt, si quis ipsis solis
40 nō cerato tēperatis vtatur. At quæ cerato misce-
tur, purgare quidē vlcus fordidum, & carne re-
plere possunt, atq; etiam duritiē quandā & ten-
sionē discutere: nō tamē difficilia curare. Quo-
circa tum plurimū cerati miscemus medicamen-
tis acribus, quū vlcus purum & sicci est: corpus
autem curandū, & molle, & ad ficiendū prom-
ptum: paucissimum verō, si vlcus quidē ipsum
sordibus, humiditatēq; redundet plurima, ægei
autem corpus sit durum, & parum sensile.

Anicetos Crionis, quāsi dicas in insupe-
rabile pharmacum.

Extrahit, rumpit, purgat, glutinat, pus educit,
duntias discunt, lasitudines lenit, tractatis cū
vulneribus auxiliatur, calat hominū atq; ferarū
morbus ad innumerat alia cōducit. Squamæ x-
ris drach. lviij. pyrethri, staphisagiæ, cocci gni-
dij, sinapi seminis, eachrysos, columbini sterco-
ris, aristolochiæ tenuis, æruginis, cyperi, erucæ
seminis, cumini, singulorū drach. xviij. nitri, falsi
60 ammoniaci, singul. drach. xxxij. baccarū lauri,
mannæ, iridis, singul. drach. cxx. aceti acris sexti
nos sedecim, de octi carcarū cyathos iij. & se-
mis. Tusa cribratig omnia simul cū aceto sub
pessu caniculæ laeuigantur. Vbi sicci & viride aqua
serit, sicū decoctio adiciunt, & simul emollita
tolluntur, & in olla xris rubri asservantur. Vltis
autem

*Cerati pluri-
mum quando
acribus medi-
camentis mi-
scetur, quæ
de cerato, pau-
cissimum.*

*Anicetos Cris-
pi.*

*Medicamē do-
ctylæ.*

autē vna ipsius medicamēti parte aceto diluta, vsq; ad consistentiā sordidam, permista sex resing portionibus, cui nōnihil cerę sit temperatū. Scribitur etiā imperigini agrestis cōgruere. Sic enim vocant, quę a medicamentis imbecilliter siccantibus nihil iuuatur: irritatur autē a validia. Porro tētararū decoctum lenissimū est, & maximē concoquit, similib; digerit. Acetū verō efficacillimiorum medicaminū iuuat. In quo quidem quę macerantur sub sole xstiuo, tenuē subtilitatem acquirunt, eodē altius virtus ipsorum penetrat.

Emplastrū Serapionis, cōtra omnia vulnera, punctus & parotidas maximē valens. Educi cōtra pus, glutinat, fenilidq; & chironia persanāt. Olei veteris leminas iij. argēti spumę drach. cē. ammoniaci rhyimiatis drach. clxviij. resinę colophonę, pitynę, singul. drach. lxviij. cerę drach. clxviij. chalbari drac. xx. xuginis tantū dem, myrrhę drach. viij. Conficito.

Humidum Andromachi ad nomas.

Cerę, resing terebinthinę, vtriusq; drach. viij. adipis taurini curati, drach. iij. chalcidis drac. ij. squamę aris drach. iij. mannę thuris drach. ij. gallę immaturę drach. iij. olei myrtē heminas v. Arida aceto & melle excipiunt, dein liquida se perfunduntur. Porro quod a auxiliōrū quędam a ratione sola inueniuntur, quędā ex experientia, quę ad id ratione nō indiget, nōnulla vtriusq; opem desiderant, persepe iam vobis est demonstratū: sicuti & quod ratione & experientia comperita, coniecturali viā ad eorum quę inquirunt inuentionē perueniunt: quę verō per rationem sperata sunt, confirmantur experientia. Cū igitur omnia artium opera frequēti exercitio absoluantur, non satis profectō est generalia duntaxat ipsorū addiscere, sed etiam in particularibus subinde exerceri oportet. Nam actionū vsus exercitatiōq; ad perfectiōis possessiōē est viā.

Aegyptia Andromachi.

Argēti spumę drac. xliij. ricini heminas vj. cerę drachl. cxliij. ammoniaci rhyimiatis drac. lxxij. terebinthinę drachl. xxxvj. lanę vsq; drach. xviij. squamę stomomatē, squamę aris, aristolochię, thuris, singul. drach. viij. myrrhę drach. iij. opopanax drach. ij. marinę aquę, ad conspēgendam ceram, drach. l. Conficito. Etenim argēti spuma, quum medię temperamenti sit, quod pertinet ad calorem & frigus, paululum ad siccitatem inclinat. At cera, materię locum obtinet, non virtutis efficaciam adiuvat: tamen si vis quędam ei per exigua emolliendi insit. Iam terebinthina, q̄ cera, magis mollit, calcificat, & digerit. Porro ammoniaci inter emollientia principatū obtinet: in digerētib; mediū est. Quare compositum ex oleo ricinino & gutta ammoniaci medicamētum, ab vndē potest digerere, emollire, & nihil enī fēcisse. Iam lana cōbusta, aristolochiad plurimū digerūt, excidentq; thūs autē digerit cōcoquitq; Myrrha etiam nō ignauiter calcificat & exicat. sed vtrunque opopanax præstat multo absolutius. Ceterū squama aris, stomomatę, p̄ter q̄ quod valde siccant, vim etiam astringendi fortuantur. Consensaneū autē est, Andromachum pro hemina vncias nouem mensurales accipere, ita vt sex heminę vncias

quinguaingenta quatuor mensurales absoluant: quod idem est ac si dicas, mensurę Romanę lib. iij. s. Ego verō olei Romani libram, quam per dissecta cornua metunt, ponderavi quandoq; discere cupiens quantū grauior sit pondus cōtineret, inuenisq; duo decim mensurales, decem viciis ponderi æquales exsistere. Prescriptum igitur medicamēt, cruentis vulneribus, viceribusq; aliis nō paucis bonum medicamētum redditur: sicuti & ad abscessus, & omnia quę discuti possunt. Nec ignoratis, medicamenta quę simul cum digerētib; etiam astringentia recipiunt, longē tutiora esse: quę verō absq; adstringētib; digerūt, efficaciora quidem, non tū perinde tuta. Sæpe siquidē fluxiones attrahunt, dum corpus quod curatur, plethoricū est, aut prauis fœcis replendat. Adeo itaq; digerit generosē prædictum pharmacum, vt etī pus, si non admodum copiosum sit collectum, discutatur, absq; incisione cutis: emollitq; callosū, & quomodo docile in duratiora possit. Cōgruit etiam nudatis neruis, & si in parte quapiam abscessus fuerint. Etenim prædicti nerui, tamen si periculo qd cōforti lege obortiri solet, garant, tamen eas partes, in quas incurrunt, sensu destituūt: taleq; medicamen desiderant: nam quę humescit, facile eos putrefacit.

Medicamen fuscū Andromachi, Athene dictum, ad difficilia vlcera congruens.

Argēti spumę drachl. c. terebinthinę drach. xxxvj. cerę drac. xxv. minę sinopici drac. xxviij. ammoniaci rhyimiatis drach. xxxvj. chalbari drach. xij. aloës drach. viij. diaphrygis tantundem, aris combusti, mastichę, sing. drach. vj. aristolochię drach. v. propolis tantundem, mannę drach. vj. squamę aris tantundem. Lapidia asij drach. iij. trifolij seminis drach. ij. symphyti radis drach. j. & obolos iij. olei leminas iij. Conficito.

Hellepontia Andromachi, propulsiōis phlegmonem, strumas, panos, & parotidas curans: necnon pus maturans, abscessusq; rumpens & glutinans. Argēti spumę drach. c. picis drach. l. ladanī drac. xxv. xuginis ratizē dracmas viij. aris combusti tantundem, squamę drach. ij. olei veteris drach. cc. Conficito.

Tyria Damocratis, vlcēbus ac moribus quadrupē dū congruens.

Lithargyri lib. v. cerę lib. ij. pitynę pinguis lib. iij. xuginis, chalbari, aris combusti, squamę, singulorum vnc. iij. pinguis olei lib. xvj. curiorē conficito.

De emplastris digerētib; & attrahētib;. Attrahētia medicamēta nōnihil etiam discutiunt: & quę discutiunt, pariter etiam attrahunt. Verim in digerētib; medicamentis, discissoria virtus: in attrahētib; attrahētia præpollēt.

Salsum Andromachi, digerens, exirahens, ad multāq; vrile.

Salis cōmunis lib. iij. squamę aris vnc. iij. marini lib. xvj. gimbis acetum affunditur.

Aliud Cresiphontis, parim duciens, parim evocans, atq; detergens.

Aphonitri lib. mānē thuris tantundē, lixiņę straciz lib. Sunt qui addant etiam libram acetū,

Est etiam melle
ratum olei, con
tinere vnc. s.
pidiatum, Gal.
experientia q̄.

Diferentia qui
bus adstringen
tia sunt melle,
esse longe melle
ra, sed minus ef
ficacia sicut quę
tantū digerunt

Humellantia,
præcisus nervus
facile putrefac
unt.
Athene Andro
machi.

Hellepontia
Andromachi.

Tyria Damo
cratis.

Attrahentia
digerentia di
scutiunt.

Salsum Andro
machi.

Imperigini agre
sta.

Caricorum deco
ctum.
Acetū facultas

Serapionis em
plastrum.

Humidum me
dicamē Andro
machi.

Artium opera
frequēti exerci
tio absoluan
tur.

Aegyptia And
romachi.

Ammoniacum
inter emollien
tia principatū
obinet.

Heminę

Medicamen-
ta bacca lauri.

Refine, nitri rufi, cere recentis, baccharum lau-
ri, colophonis, seu vitulini, ammoniaci thymia-
mans, fing. drach. lxx. Cyprini decumam sextā he-
minam partem. Conficito.

Digerunt Ale-
xandri.

Aliud attrahat & digerēt, ad multa vtile.
Argenti spumæ, ceruffæ, chalbani, fing. librā:
falſis foſſilis, ruginis rafæ, fing. ſeibram: olei ſe-
xtarios tres, atramenti ſutorij vnc. ij. Conficito.

Aliud digerens melicerides, Alexandri.
Salis Hiſpani, argenti ſpumæ, ceruffæ, ſing. li-
bram, Cere, terebinthine, vtriuſq. vnc. ij. chalba-
ni, vel opopanacis vñ. ij. ſinapios vñ. vj. olei ve-
teris lib. iij. aceti ſextarium. Confundito.

Aliud epiſpasticū, diſcutiens ſtrumas, paroti-
das, atq. omnes abſceſſus, conferensq. ad articu-
lorum vitia. Salis foſſilis lib. ſingenti puriſſi-
mi lib. iij. Chalbani drach. l. Conficito.

Aliud, quo viſus eſt ad eadē Andromachus.

Ceruffæ, falſis foſſilis, ſing. drach. lxxx. chalcan-
thi drac. xij. olei veteris heminas iij. aceti hemi-
nas iij. Aliud Aſclepiadis ad eadem, quod va-
lenter etiam mammarum abſceſſus digerit. Cere,
terebinthine, nitri, olei veteris, ſingulorum
libram, aque heminam. Nitrum in aqua ſolutū
igni admoueto, vaſeq. cooperto, coquito, mo-
uens ex intervallis. Cum autē ſtrepere adeo de-
ſierit, liquida inſundito, mouens alia die, donec
non inſequantur. Poſtea in mortarium tranſfu-
ſa, ruſus tundito: inde exapiens, vñtor.

Aliud ad eadem.

Cere, terebinthine, ſingul. drach. c. nitri ſpu-
mæ, olei veteris, mannæ thuris, ſing. libram: la-
pidis aſij ſloris ſeibram: chalbani, propolis, am-
moniaci thymiamans, ſing. drach. xij. aque lixi-
næ quod ſit ſatis. Conficito.

GALENI PERGAMENTI de compoſitione medicamentorum ſecun- dum genera, lib. VII.

Malagmata
quæ dicantur.

Malagmata ſive emollientia vocant Me-
dici, quæ partes præter naturam indura-
tas emolliunt, calido omnia tēperamen-
to prædita: non tamen exiccantia, quemadmo-
dum nec manifeſtū humectantia. Nam cum exa-
ctē emollientia mediū quendā ordinem inter
humectantia ſiccantiaq. ſortiantur, indureſcenti-
um ſubſtantia veluti ſuſione quandā molliun-
tur. Vbi vero ſuſa durities fuerit, digerentiū
medicamentorum viſus ſuccedit. Porro leoniſus a-
deps valentiſſimē tum calcaſcit, tum digerit. Pro-
ximum locum habet pardi adeps, vt qui modicē
emolliat. Vim minorem in calcaſcendo ac dige-
rendo habet anferinus: habet tamen aliquate-
nus maiorē in molliendo. Pari ſpacio ab hoc re-
cedit gallinaceus. Suillus adeps, molliſſimus, hu-
miduſſimus, atq. aliorū imbecilliuſſus eſt: quare
tēneris corporibus conuenit. Capræ & boum
adeps quæſto ſuſillo eſt validior, tantō magis cor-
poribus & natura durioribus, & inter duriora
ſcirrhoſioribus congruit. Taurinus hirciniſque
adeps validioribus tum corporibus, tum aſſectū
bus auxiliatur. Eſt autem commune tum phle-
gmone, tum ſcirrho particulis laborantibus, reni
u prementibus digitis: diſtinguunt tamen aſſe-

ctus q. ſenſu doloris & indolentia. Igitur magna
phlegmone cataplaſmatis & humidis quibūdā
medicamentis ſanatur: paræ, cui ſcirrhoſa du-
rines permiſta fuerit, tum cataplaſmatis, tū me-
dicamentis cerati modo cōſectis: liquiduſq. em-
plāſtris atq. emollientibus.

Medicamen Parrygon Heræ, quod medetur
particulis exigua phlegmone aſſectis, non mul-
to poſt cōſectiōnem tempore. Si verō duritiem
abſq. dolore pars aſſectā contraxerit, aut ſi phle-
gmone aſſectū ſit libera, paulō etiam recenti
uſuſque vtile fuerit. Eius itaque compoſitio eſt
talis: Adipis ſuſilli recentis curati vñ. xliij. cere
vñ. xxiij. ceruffæ vñ. vj. argenti ſpumæ tan-
tundem. Conſicito. Ad duritiem in ſcirrhoſum ab-
euntem, valentior præſidia perſequent: cuiuſmodi
ſunt, tum medullarum genus, tum bellium
vtriuſq. Arabicum nempe, & Scyllium: necnō
ſtyracis, ex quibus eligendus eſt pallidus: nam
niger deterior eſt. Iam ammoniacū thymiama,
iuncta ea quæ emolliunt duntaxat annumeratur,
 præcipue quod pingue eſt & recens. Medullarū
oppoſita eſt vitulina. Ex reſinis aſpiſſima eſt,
Chia vocata, & larix. Poſt has pinea. Inde abien-
na. Strobilina verō vehemētē eſt acris. Piryina, ſerena.

quæ propriē phlegma vocant, pinguitudinis ex-
tera, excaſt admodum. Haſ igitur fugere, Chia
verō & abienna vñ oportet, non ipſis per ſe, ſed
cum cera, & aliquo aliorum, q. cōducere aſſectū
videbitur. Brutia pix & ipſa eidem obſtinet vim,
nōnihil pinguis & tenax. Pix alia nō eſt miſcēda,
ſicvti nec bitumē, vtpote iuſto ſicciora. Exiccantia
quippe, mollientibus ſunt cōtraria. Quoniā
verō & picea, & phlycten reſinā, & colophonii
appellare cōſueuerit, ſcendū eſt & aliā colopho-
niam quandam haberi, Chia maſtiche ſimilem,
quæ nonnihil molliens ſortitur, quemadmodū
ipſa maſtiche & thus. Ad hęc Aegyptia maſtiche
nōnihil emollit. Tiſus etiam quandam mollien-
tis vim obſtinet: verim hoc quidem coctum ex
viſu eſt, velvñ & ſernigraci gemino: hoc etenim
probē coctum emollit, ac magis adhuc, ſi adſip-
temperetur. Quæ citra coctiōnē liquari, diſuiq.
ob conſiſtentia ſiccitate, nō poſſunt, oleoſo alia-
quo indigent, cuiuſmodi ſunt, tum oleū ipſum,
cui nihil aſtringēſ ineſt: tum balnearū ſtingen-
ta, & quod vocatur Suſinū, & hoc multo magis
Comagenū. Huius generis eſt butyrū, althæxij
& ſernigraci decoctū. Porro inter ea quæ ſic e-
molliūt, & ea quæ validiſſimē (cuiuſmodi exiſtūt
ſtyrax, & bellii) ammoniacū thymiama idem
poſſe quod propolis. Cæterum Scyllū bellii
Arabico eſt multo ad emolliendū præſtan-
tius. Chalbani & opopanax, præterq. quod di-
gerūt, etiā aliquid molliens ſortuntur. Opopa-
nax tamen digerendo, chalbani molliendo, co-
quendoq. præcelit. Ex his igitur quæ produxi-
mus, valida validis, imbecilla imbecillis ſunt ad
hibenda aſſectibus. Ar vbi poſt primā pharmaci
impoſitiōnē, denū ipſum applicas, oleo pingui
parte aſſectam fouere conuenit. Ex his autē quæ
ixiſſima (quod tenacius licetare) vocantur, nul-
lum auferēdum eſt prius, q. ſua ſponte abſcedit:
ſed vt adhæreant ſemper ſinenda ſunt, etiam ſi
urgrotans laeuetur. Vitanda autem gemino ſunt
medi-

Phlegmone qui
ſua medicamē-
ta indigent.

Parrygon Heræ

ſtyracis diſſi-
muta.

Medullarū ſpi-
na q. vitulina

a. ſcinarum diſ-
ſerena.

Colophonii da-
pice.

Maſtiche.
Thui.

Sernigraci ſi-
mon.

Bellium.
Ammoniacum
thymiama.

Chalbani.
Opopanax.

Tenacius medi-
camentu nō eſt
ſi amouenda
prius, quā ſua
ſponte abſcedat.

Digerentiū
quædo vñtorū.
Aliquid diſſeruo
tia.

medicamento farā aquarum lauacra: præsertim quæ chalcanthum, alumen, & sulphur referunt. Cum igitur malactica sunt varij gradus, & differētæ, certè malactica primi ordinis ad exiguas durities, atq; in mollibus vtemur corporibus: vt secundi, ad fortiores tum affectus, tum corporum leuitatis: ac similiter tum tertij, tum quarti, nimirum pro illorum ratione.

Malactica primi ordinis.

Butyrum, vel resina colophonia, & cera candida non vetusta, singula pondere æqualia, in vicem liquata, primi ordinis malactica sunt. Liquida similiter medicamen, quod Parygron vocant, primi ordinis est. Emollitum imbecillimū est cera cum butyro soluta, aut ex sulino, aut comageno. Arthris imbecillius cereleon dictum. Jam ex ouis cerata facta, exiguum quandam relaxandi vim possidet. Valentiora his, verum imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex ægypto, resina, & cera pari pondere iuncta.

Malactica secundæ ordinis.

Emplastri quod ad Mnafrū refertur, restitui me secundo malactico ordinis ascripseris: nimirum confans ex oleo veteri, argenti spuma, & sulfo adipe. Cæterum illa si omnia illa fuerint recentia, imbecillimū pharmacum fiet. Validius autem, oleo quidem existente veteri: adipe autem recente. At validius adhuc, ex vetustis amobus confiteris. Quocirca secundum vetustatem quidem olei & adipis, pondus autē singulorū quæ induntur, varias differētias ipsum medicamentum suscipiet. Copiosa siquidem argenti spuma insecta, medicamen potestate mollius evadet: paucior, validius: ac magis emollet, si plus adipis immittam: digeret fortis, si augeamus oleū.

Amythaeon malagma ab Asclepiade scriptum.

Ammoniaci thymiamatis vnc. xxxvj. ceræ tūndem: terebinthinae vnc. viij. drach. tantumdem: chalbani, thuris, myrrhæ, sing. vnc. iij. Cyprini heminas iij. Conficito. Discutit omnē duritiem. Valet contra præcordiorū tensiones, impeditorūq; articulorum motus.

Malagma Dioscoridis, ad eadem.

Ceræ minā vnam: resinæ phrycæ, chalbani, iridis illyricæ, sing. minæ dimidiū: irini faculq; quod satis est. Vini quantū volueris. Conficito.

Malagma Lucij omnē duritiem digerens, articulorūq; impedios relaxans.

Bdelli, seu vitulini, ammoniaci thymiamatis, iridis illyricæ, sing. drach. xvj. opopanax, chalbani, caicheos, ityracis, thuris, sing. drach. viij. piperis grana clx. irinæ faculæ quod sit satis: ceræ, resinæ terebinthinae, sing. selibram. Vini quod satis esse videatur. Conficito. Est enim extremi emollitum ordinis, vt quo nullum durescentia magis emollire comperias.

Malagma Neapolitæ ab Asclepiade scriptū, cū tra omnes durities: qd etiā pleuritidis auxiliat. Vini pisset sextarios sex: ceræ lib. vj. ammoniaci thymiamatis, phrycæ, vtriusq; vnc. ij. terebinthinae, thuris, myrrhæ, aloës, aphronitri, lapidis Asij floris, gentianæ radices fuscæ, sing. vnc. vj. fagapeni, sulfuris viui, propolis, sing. vi. iij. panacis rad. d. simplicij, piperis albi, sing. vnc. iij. Conficito, & vitior.

Malagma Andromachi.

Picis lib. iij. ceræ lib. ij. resinæ libram: chalbani vnc. ij. ammoniaci thymiamatis tantundem: nianæ vnc. iij. acetis sextarios iij.

Malagma Andromachi.

Malagma Andromachi ex melilot.

Nardi Gallucæ drach. x. cyperi, cardamomi, lreos illyricæ, myrrhæ, sing. drach. viij. croci drach. iij. meliloti drach. xxv. ammoniaci thymiamatis drach. viij. terebinthinae drach. l. ceræ recentis drach. c. cyprini hemina dimidiū: acetis quod sit satis. Conficito.

Emplastum ex melilot.

Malagma ex baccis lauri, Andromachi.

Ceræ, picis brutæ, baccarū lauri, nitri, resinæ phrycæ, sing. drach. lxxv. chalbani, ammoniaci thymiamatis, caicheos, ameos, sing. drach. xij. piperis albi drach. xvj. cyprini hem. vj. Conficito.

Malagma ex baccis lauri.

Ad scindicos generofum.

Rutæ agrestis feminis, silphij, baccarū lauri, aphronitri, abrotani, colocynthidis, cardamomi, ameos, sing. drach. iij. Rutæ viridis, picis, terebinthinae, ammoniaci thym. ceræ, seu, sing. minā partem octauā: chalbani drach. vj. opopanax drach. iij. sulfuris viui tantundem. Conficito.

Ichthyocollaplasm.

Ad lienosos.

Ceræ minam: ammoniaci thymiamatis minæ dimidiū: aluminis liquidi drach. l. frigiditatis heminam. Capparid. rad. calamitæ rad. myrobalani facis, quod magna vocat, sing. drach. l. acetis aridis, oleo adiecto liquidis, vitior.

Ulenis optimi cataplasma.

Malagma ad hepaticos.

Ammoniaci thymiamatis, bdelli, sing. drach. cxiij. croci, myrrhæ, sing. drach. xij. ceræ drach. cxiij. acetis quartam partē hemina: cyprini heminam. Conficito.

Hepaticis conueniens malagma.

Malagma ad rheumatismum stomachi & intestinorum.

Oenanthe vnciam: omphacæ vnc. iij. phœnici cobalini carnis vnc. ij. acæ, rosearū, aloës, singul. vnciam: gallæ, aluminis, picis, sing. vnc. iij. ceræ vnc. iij. Vinum aridis adstantur.

Rheumatismo vitæ et intestinorum, malagma.

Ad hydropicos & flatuosos.

Picis liquide, ceræ, vtriusq; librā: nitri, sulfuris viui, aluminis fissi, sing. vnc. vj. Permelicero.

Hydropicis conueniens malagma.

Malagma Antipatri ad colicos.

Silphij drach. ij. elestipaci, casæ, melanthij, staplides agricæ, chalbani, strudij, sulfuris viui, sing. drach. iij. panacis, propolis, pyrethri, ammoniaci thymiamatis, nitri, sing. drach. vj. Asij florid. lxxv. ceræ drach. cl. resinæ tantundem: olei heminam. Conficito.

Colicis malagma Antipatri.

Adodynnon N. offratu ad podagram.

Ceræ libram: ammoniaci thymiamatis vnc. iij. opopanax vnc. iij. amconi vnc. iij. cyprini tantundem: confusioem eorum adhibetur.

Adodynnon ad podagram.

Aureum malagma ad arthriticos.

Resinæ strobilinae lib. ij. chalbani drach. xij. xanthæ porcine tantundem: ceræ drach. xxiij. baccarum lauri drach. xij. incoquito vt decet.

Arthriticis conueniens malagma.

Aliud ad laterum dolores.

Cyperij, cardamomi, manne, ammoniaci thymiamatis, terebinthinae, ceræ, irini, sing. libram. Misce. Porro phlegmones, scirrhiq; eadē quodammodo generant & curantur est. Nascitur enim ex confluxu humorum vterq; affectus: curatur iisdem vacuatis: quāquā etiam istis modis.

Phlegmonis conueniens malagma.

Inflammationes curatio.

Scirrhi curatio.

Scirrhi in cutem, bulbi, ab eis qui possunt curari, nec in scapula, quomodo discernantur.

Phlegmona quando in scirrhus degenerat.

Pori quomodo generentur.
Callosi et ingenuantur in rebus.

Refrigerantia quomodo scirrhus producant.

Inflammationes bonae et mediocriter curantur.

Acopa medicamina quomodo esse debeant.

Resinatum differentia.

Adipis differentia.

Dura corpora valentius medicamina possunt, quomodo molli carum praedicantur.

1188
dus utrobique idem non est. Quippe inflammatis quidē particulis tum repulsoria medicamentorum qualitas, morbi initio, tum discussoria, semper ex usu est. Scirrhus autē sola discussoria, sine repellente. Itaque summē indurata scirrhus, protus insanabilia sunt. Dignosces autem ipsa hinc, quod nullus sensus partibus affectus superfit. At in quibus sensus quidē est, sed obfcurus, hae curantur pharmacis digerentibus iussuatum humore: non tamen validē, ac vniuersim hoc agens 10 nibus: quod epistastica solent. Quocirca minime sanē oportet mirari, si partes inflammatae scirrhum inter dum contrahant, dum videlicet humor quidē influens est simul crassus & viscidus: curatio autē medicamentis valde exsiccantibus administratur. Nam quomadamodum in externis rebus, permulta corpora quae ignē contingunt, ab ipso torrentur, atque rursus ab aqua emolluntur: ita in particulis inflammatis, ex humore ipso, & calfacientibus & exsiccantibus acerrimē dedicato, relinquitur quippiā crassum & viscidum, nimium omni tenui discussio. Atque hac sanē ratione in morbis articularibus pori gignuntur: nec secus per nephritidas calculi. At si fluxio, quae phlegmonē gignit, tenui substantia sit, cura nonius eius per siccantia & calfacientia pharmaca administratur, nihil scirrhi osum relinquitur: imō refrigerantia vehementer, asringentiaque, scirrhus procreare tunc solent. Vnde multis per erysipela vehementer refrigeratis, occalescere solent humores. Igitur optimus usus in dolentibus inflammationibus est, quae medicamentis ab vnde humidis simul & modicē calfacientibus administratur. Alter paulo crassioribus & siccantioribus constat. Tertiis relaxantibus nominatis, quae nonnulli inter malagmata collocant. Sunt autem inter ea, maximē emollientia quidem, quae cōsistentiam cerati referūt, cum ex butyro, cera, adipibus, oleisque relaxante consistant. Temperatur ipsis aegypti, resinæ, & picis, modicū: sic vti & thus & chalbani, & nonnulli ires illyricæ.

De acopis, siue labores lenientibus.

Acopa medicamenta omnia, liquidæ cōsistentiaē necessariō esse debent. Inter quae sanē oleum per se, eos labores qui summam cutem infestat, persanat: altius autem ingruentes, vehementioresque, alicui relaxantia, & medicoriter calfacientia cōmixta: ut chalbano, resinæ terebinthinæ, colophonitæque phryciæ appellatæ. Quibus calidiores sunt abietina, & strobilina. Terebinthinā verō la 50 rix nonnulli calore superat. Ceterū id genus omnia relaxantibus oleis miscetur, quale est Sabinum, iniecta interdum & cera. Iam verō *sumptus* vnguentum est, ubi dolor altius infestat, medicamē ex semine abietis, chamæmeli, anethi, & florae populi: præterea sulsimum, gleucinum, & comagenum, & quæ tum ex medulla, tum adipe componuntur: suis quidem, moderatissimē relaxatæ: gallinaceo autē, his vehementius: & hoc adhuc magis asferunt. Ad adeps leoninus, & pardi, validior est, ut iam vehementer calfaciat, eoque discutiat insigniter. In medio horū, bubullus & capril 60 li, consistit vulpiū atque litynæ adeps. Meminit autē oportet, dura corpora aquirere valentiora pharmaca: mollia verō & humida, minimē ta

lia medicamenta perferre posse. Nec ignoratur quæ dicuntur myræopa medicamenta, ex acoporum eum vnguentis temperatura fieri, nihilō ceteris præstantiora, nisi odoris fragrantia.

Acopon Themisonis ab Asclepiade scripti.

Sampfuchi, rosimarini foliorum, saxinæque, sing. sextarii vni: cardamomi, brathyos, sing. sextarii dimidium: vini dulcis sextarios tres: olei venetiani trepodo: ceræ lib. ij. Cōfictio ut decet.

Acopon ex melle.

Mellis, irini, rosacci, cyprini, gleucini, ceræ, terebinthinæ, sing. vnc. iij. Cōfictio.

Acopon Aphrodite *describitur*, hoc est, secundum appellatur.

Ceræ, terebinthinæ, sing. drach. viij. chalbani drach. vi. olei veteris heminas duas: medullæ ceruinæ drach. viij. Cōfictio.

Aliud ad omnem nervorum dolorem.

Resinæ terebinthinæ drach. lvi. ceræ drach. xxviij. ammoniaci thymiamatis drac. xxxij. chalbani tantundem: medullæ ceruinæ drach. xxij. olei veteris heminas duas. Cōfictio.

Aliud *describitur*, hoc est, ex casuario: quod solutis, & omni diuturno malo auxiliat.

Ocypsi vnc. iij. medullæ ceruinæ vncias iij. terebinthinæ vncias iij. ammoniaci thymiamatis, chalbani, castorei, piperis albi, euphorbiæ, adarces, nitri spumæ, opopanax, sing. vnc. ij. olei styriaci vnc. ij. olei irini vnc. ij. olei veteris heminæ 30 vnam: ceræ scilicet libram. Cōfictio.

Vnguentū dolores articularū discutit.

Thuris, piperis albi, sing. drach. x. aphronitri drach. viij. myrrinæ drach. iij. ammoniaci thymiamatis drach. vi. acetū quod fit saria: olii Cypri heminam vnam.

Medicamen ex populo.

Populi nigre surculorum minam: cucumeris agrestis rad. lib. iij. castrū fistulæ lib. ij. vnguenti crocini lib. ij. croci vnc. iij. vini odorati sextarios xij. olei Sabinii sextarios x. sampfuchi, ceræ, sing. lib. iij. Surculos populi diligenter cōtusos in vase duplici vnguentario cōtineto: quibus sampfuchium, cucumerisque radices eōcis adiecto. His vinum superfunditur. Omnia diebus nouem macerari finito. Sequenti die oleum adiciatur, & rursus accuratē tuncta, igne non acri incoquit. Postea liquori expresso ceram subactam, & medullam leuem factam indito. Igni imposta coquit. Vbi liquata fuerint, ab igne tollens, crocinum adiungit, mouetque continet. Crocinum verō laue factum, terrestris testudinis sanguine excipit, ut olei veteris crassitudinē habeat. Li 40 quata croco inflecta rursus tūdito, atque excepta vitrot. Arthritide & ichthide liberat.

Aliud Flauti Clementis, cuius vsum nouimus homines toto disortos corpore, conuulsiue a podagra, chira-grag. Olei Sabinii lib. xij. cucumeris agrestis rad. lib. xij. ceræ, terebinthinæ, medullæ ceruinæ, chalbani, sing. lib. j. Olei diuidimus, & seorsum in eo ranas, seorsum item radices incoquimus. Dein liquore percolato, ad pharmacā cōfectionem vniur.

Acopon viride Haliei.

Ceræ, terebinthinæ, olei veteris, sing. scilicet: a phronitri vnc. iij. chalbani, fruginis rase, sing. vnc.

Acopon Themisonis.

Acopon ex melle.

Acopon Aphrodite.

Acopon ad omnem nervorum dolorem.

Acopon ad casarium.

Acopon ad articulares dolores.

Medicamen ex populo ad articulares dolores.

Podagra non dicuntur Flauti.

Acopon Haliei.

vnc.ij. opopanacia vnc. vj. ammoniaci thymiamati, manna, sing. vnc.ij. acetum, melini, cyprini, irini, sing. vnc. ij. capilli viciam. Confectio.

Cauti Acopon, ad diuturnos affectus & convulsiones.

Acopon Cypri.

Pytheli, Syriaci vnguenti, vtriufque sextarium: ireos illyricæ parem modum: terebinthinæ lib. æxungæ tantundē. R. furæ nautalis viciam. In eo quæro, rura viridi mouens.

Gleucini confectio Andromachi.

Gleucini confectio.

Myrrhæ, nardi Indicæ, cuiufque lib. ij. costi lib. ij. styracis libram: bdelli, fampijuchi, xylobalfami, iunci odorati, cardamomi, spathiæ, ireos illyricæ, myfios, afari, sing. lib. ij. meliloti, nardi Gallicæ, sing. libram: aspalathi, calami, sing. felibræ: aristolochiæ longæ tantundem: rofimarini feminis sextarios duos: thuris, calix, sing. lib. ij. feniçgreci sextarios duos: fphagni, amomi, sing. lib. q. corticis thuris libram: rofarum ficcarum lib. q. carpobalfami tantundem: croci vnc. ij. baccarum lauri libram: piperti albi tantundem: opobalfami vafcula tria: malabathi foliorum lib. ij. nucleos pineos virides duos: rutæ viridis vnc. q. fa lia ammoniaci, netri, cuiufque vnc. iij. vini veteris sextarios duos: multi boni vafcula duo. a. olei veteris lib. v. præparato diebus quinquaginta. Ad dolorem laftrudumque tollendum, medicamē est longè accomodatiffimum.

Acopon Hære.

Acopon Hære, ad diuturnos dolores coxendicis, articulos impeditos, & paralyfis, admodum efficax. Olei veteris, irini, laurini, pyracini, ceræ, sing. lib. vj. terebinthinæ, piperti, euphorbiæ, sing. vncias ij. ammoniaci thymiamati vnc. iij. calforij, opopanacis, clialbani, medullæ ceruinæ, sing. vnc. q. Liqubilia liquara ficcis affundito, & vntis vntor.

GALENI PERGAMENI

de compositione medicamentorum fecundum loca, lib. I.



Curatio quæ indicat.

Vod non modo affectus ipsi, sed etiam ægri temperies, naturæque partis affectus, ipsam curationem commouent, ubi a nobis est demonstratum. In hæc autem commentariis, de compositione pharmacorum ad singulas corporis partes cõgruente, differere est animus: ad quod iam negotium accingimur, à vitiis capillorum exoriri. Porro generatio pilorum, eadem est quæ plantarum. Nam quemadmodum ex istis quedam arte & arbitrio agricolæ, quedam iuxta naturales causas proveniunt: eodem modo & in animalium corporibus, aruo quoddam alicui triticum, aut hordeū, aut aliud quoddam cerealium seminū in se inferta habent, caput æsimilatarialis verò herbis quæ in aridioribus crescūt ærgonibus, reliqui totius corporis pilum similem generationem sortiuntur. Si quidem uol fecundum primam rationem, sed per accidens quoddam natura ipsos consuevit gignere. Igitur affectus pilorum suat, tum de perditio omnimoda: tum coloris mutatio, qualis in vitelligine alba, quæ leucem vocat, fieri cõsuevit. In id genus autem affectibus, sicuti in aliis omnibus, summe curandum est, vt quæ prædicia adhibebimus, aut in-

Pilorum generatio eadem quæ plantarum.

Pilorum affectus.

q. 111

uent, aut certè non noceant. At qui vius pharmacorum amethodos, non modò uon prodest, sed etiam obest frequenter.

De alopecia, caluitie, & ophiassi.

Quemadmodum ex plantis ipsis, nonnulli quidem ob humorum inopiam reficacæ extrahunt: nonnullæ autem, quod lue moribus à sua natura alienis imbutantur: eodem etiā modo capilli, aut propter penuriam humorum à quibus consueuerunt nutrir, aut propter prauitatem, corrumpi assolent. Ac propter inopiam quidem, caluities accidit: propter vitium autem succorū, alopecia, & ophiassus. Etenim læsa capitis pars, serpenti similis in ophiassu apparet. Alopecias autem, ob id ita appellari ferūt, quod vulpibus frequenter accidant. Iam verò quales tandem sint ipsi corrupti humores, ex colore cuius in capite facile lucebit tibi discernere. Alius namq albidior apparet, alius nigror, atq pallidior alius. Quare in istis primū totius corporis purgationem molieris, aut pharmacò pituita ducente exhibito, aut quod bilem pallidiam, aut nigram eliciat coniectura redvndatis humoris, ex colore cuius inita. Ego verò hiera exhibita semper ipsos purgavi: aliquando nigro veratō adiecto, ubi melancholicum succum vacuare erat animus: aliquando scāmmonio, si amara bilis purganda esset. Vbi verò pituitiosiores exvperare humores conieci, nihil adfiscui. Tales siquidem, præteritum ex capite, hiera ex calocynthide purgare humores consuevit similibus cum iis aliis quosdā, etiā scāmmonio, aut veratō nigrum, aut epithymū, non addatur. Catapota etiam ex aloē, quæ tum scāmmonio, tum colocynthidem admixtam habent, cõmodius ita affectos purgare solent. Post totius autem corporis purgationē, apophlegmatismis pituitam ē capite detrahère præstat, ac dein localibus vti auxiliis. Cæterum incipites ophiassus & alopecias, per astringentia & refrigerantia prædicia cohibere cõvenit: adultæ autē, digerentibus discutienda sunt. Ego verò quendā adolefcentē in principio affectionis curavi sola purgatione ex hiera diacolocynthidos. Prius tamē catapota ex aloē vndecim ē exhibueram, cicerū magnitudine. Habent autē catapota hæc, colocynthidis partem vnam: aloē & scāmmonij, vtriufque partes duas: quibus partem vnam succi abūnthij addo. Antea verò etiam mastichem Chiam, & bdellū immiscebā. Porro pharmacū extrinsecus adhibendū, si præter hoc quod vitia tos humores discutiat, etiam idoneū sit ad probum sanguinem attrahendū, veluti est thapsia, ensendum sanè est optimū medicamen. At verò cum thapsia longè calidior sit, quæ affectus postuler, merito rursus per se vsum vitamus. Exvcerationes quippe excitare consuevit, ac omnino quosdam inflammatos tumores. Quamobrem quædā quæ illius vchemētis mingent, necessariò adfiscimus: id quod ceratrum ex oleo aliquo tenuium parium (cuiusmodi Sabinum est) præstare cõmodè poterit. Vt quicquid sum etiam sola thapsia, fed vehemētis illius fuscitate, larga aquæ affusione exoluta. Porro ex pharmacis prædicto affectui congruentibus, vchementer quædam calfacit euphorbiū: sufficiēter aut laurini,

Medicamenta sunt semper talia, vt si non præstint, non lædant.

Capilli à quibus causis corrumpi solent.

Caluities. Alopecia. Ophiassus.

Color cuius quod latet humorum subest patet: cuiusmodi indicat. Pilorum corruptionis cõtrario.

Hiera ex calocynthide.

Catapota ex aloē vndecim.

Thapsia fasciata.

Euphorbia. Laurinum.

DD iij

siue oleum, siue vnguen. Licet igitur ipsi per se vti, euphorbium quidem, oleo introito, ac laeuigato: laurino vero solo, citra alterius admixtionem illito. Si tamen nimis fluidum appareat, parum cere ipsi addatur. Cum vero multo calidius sit recēs euphorbium, si quidem bimo, aut trimo ipso vtaris, ad libram vnam Romanā olei, euphorbii vnciam vnam iniicies: recēn autem euphorbii, si vti & thapsiæ, & omnibus foribus pharmacia, parcius vtendum est. Peccatū siquidem infra modum, nullum detrimentum addit: supra verō, aliquando exasperat, exviceratq; cutem, atq; inflammationē excitat. Similiter etiā fugienda sunt omnia valde vetusta phar-
 maca: quandoquidem vel merallica ipsa, vbi nimis antiqua sunt, suas faculitates amittūt. Vniū cuiusq; autem medicamenū vigorem, iis qui sepe ea conspexerunt, licet cognoscere, tum ex odore, tum ex gustu, atque adeo interdū ex colore consistētiāq;. Est itaq; inter ea quæ alopecias conferunt, calidissimū medicamen euphorbium: eo autem minus calidū est thapsiæ: post hanc, sinapi nasciturūq;. Iuxta alium autē modum liminis (quæ adariū & adarcē vocatur) nulli horum secundū est. Post hæc succedunt sulfur, & nistri spuma, ipsūq; nistrum molle, vstum, & quod Eereiciariū vocatur: quemadmodum & aphroditron albiū, i. uē, atq; laxū. Deinde veratrum vtrumq;, & erucæ semen, & labrinū vnguentum, aut oleum: ad hæc alcyoniū vtrumq; vstum, & nod vltim: calamiq; ram radices, tum cortex, ambo vitæ. Quin & pix liquida, & cedrinum, quod cedriam vocant, & muriū stercus, vtrūq; adeps. Hyænx eam, leonis, pardalis, anserisq; adipes congruunt: & quicunq; tenuium partū subitantiā fortuitur. Amygdalæ etiam amare torce vitz, cōmodū sunt: & thus aceto acerrimū maceratum. His itaq; omnibus pharmacia licet vtaris, foribus quidem, ceratū liquidū temperans: debilibus verō, laurinum oleum immiscens. Rursus inveteratas quidem, ac difficulter curabiles, cum fortibus persanare conaberis: incipientes autem & paruas, cum imbecillis.

Ad Alopecias composita.

Euphorbii, thapsiæ, laurini, sing. drach. ij. sulfuris viui, veratri, vtriusq; drach. j. ceræ drach. vj. Misco, vtrūq; hoc, ceu fortissimū pharmaco, ad inveteratas, ægræq; curabiles alopecias. Si thapsiæ non adsit, pro spā licet tantundem addicere seminis nasciturū, aut erucæ, aut ipsiusmet nasciturū. At loco laurini, picē liquidam pones. Admiscui etiam aliquando mel, nec deterius evasit pharmacum. Porro quæ ex adipibus, ac modica item thapsiā constant, similiter prosint, præsertim si euphorbium & adariū addatur. Sit autem adipis leonini, pardalis, & hyænx, cuiusque pars vna, quibus miscere anserinum atq; vrsinum poteris: ita vt ad duodecim adipum vncias, thapsiæ aut euphorbii vnciam vnam iniicias: quanquam ambo etiam potes adicere, si efficere fortius pharmacum velis. Auspiciari autem semper à leuioribus cōvenit, & respectu effectus, quem pharmaca primò admodum produxerit, sic facultatem eius aut lenire, aut augere.

re. In alopecia igitur, primū quidem capillos novacula tollere expedit: dein affectam cutem per lintreolum nec asperum, nec molle nimis, conficere: ac videre ad quantum ruborem perhuiusmodi mononem pervenit. Magis namq; spem succelluræ curantis tibi inuicet, si per modicas defriciones rubescat: quæ moderate affectionis significatio exibat. Si verò per multas frictiones tandem succedat rubor, grauiorem tum affectionem, tum curationem indicat: præsertim si quadam cunicula, etiam si multum conficet, non rubescant. Præ omnibus autem cauendum est, ne in sortum pharmacorum admodone, cutis vitra quā par sit, concalcet: id quod tum ex colore ipsius, tum tactu deprehendes. Colore namque lauior apparebit, & digitorum contractu satis calidam agnosces. Quare tunc ad molliora transeundū: aut eodem vtendum quidem, sed cerati, aut adipis, aut liquoris cuiuspiū oleo, vi ipsius exoluta. Vtendum est & olei calidi dulcis irrigatione, & cataplasmate ex pane, fomentisq; & icaributionibus: necnon cucurbitis, & ceræ in vncionibus. Ceterum perseverante affectione, vtendum est assidua rasura, & rubificatione ex sinapi, præscriptisq; frictionibus: sequentibus autem diebus, illita pice, aut oleo cedrino, & post frictionem, scarificari. Quidam verò acicularū acervo affectam cutim cum pungunt. Post hæc omnia, pharmacia quæ ex alto evocare, & meatus transmutare possint, vtendum. Curandum autē perperuū est, vt in aëre calido, insolatōq; (si id fieri possit) omne pharmacum applicetur. Hyænis verò tempore, præstiterit in balneo his pharmacia vti. Porro alcyoniū vltimū, illitūq; ex lucernarum oleo, mediocres dicitur alopecias, pharmacum mediocre edm sit. Est autem lucernarum oleum communi magis tenuium partium.

Aliud Heræ, ad molli carne præditos.

Sem. erucæ, & nasciturū, nistri, sing. partē vñ: contritis affundito picem liquidam, vtrūq;.

Aliud à Critone descriptum.

Eninaceorum cinere permixto vrsino adipi, vtrior. Aliud. Calami radices vitas, adipisq; vrsino exceptas, impone.

Aliud ad inveteratas.

1. Muscerdæ, thursi, cuiusque drach. ij. aceto acerrimo dissoluit vntor. Aliud. Cineram ranarum minimarum in ollula vstarum, muscerdæ, veratri albi, radices calami vitæ, piperis albi, singulorum æquis portionibus aceto excepta, fricato.

Aliud ex libris Cleopatæ.

Sandaracis tritam, largōq; visco querno exceptam, loco per nistrū prius preparato, imponi. Aliud. Scillæ, veratri albi, vtriusq; drach. j. ex aceto trita, prærasis & nistro confictis, impo-
 nato. Aliud. Muscarum capita contrita affrica.

Aliud præcellens. Murium domesticiū vñ: rum, panniculi ampelini vitæ, dentium equinorū vntorum, adipis vrsini, medullæ cetruæ, corticis calami, singulorum æquis portionibus simul exceptis melle, vntor.

Aliud Archigenis. ad alopecias in alvum progressas. Cum aceto, aut si gleba, aut si foliis,

*Alopecia faciei
catoble argu-
mentum.*

*Alopecia rubi-
la curatio.*

Alopecia.

*Lucernarum o-
lei est tenuius
cinnamum.*

*Alopecia invet-
rata optatū
medicamen.*

*Leuiores me-
dicamenta esse
in prima vici-
di, quæ alo-
peciam meliorat*

aut ali-

liis,

*Alapocia alius
propositus reme
dio Archigeni.*

litis, vique ad dilanationem defricæ deinde de-
terio sanguine, beatam ex vino coctam impone.
Aut carcas vitæ, cum vino, aut lenis farina ex
vinò, pro cataplasmate adhibe. Aut castanidis
vitis, pice liquida exceptas, ad ceratiqui liquidi
formam redactas, impone. Aut testudinis ma-
riæ sanguinem iline. Aut thapiz succum ce-
raro exceptum iline.

Aliud Asclepiadis Bithyni.

Spumę nitrę partes duas: salis ammoniaci par-
tem unā: quibus tum vitis, tum tritis, acerrimę
aceto dulcis, præcalptę leuiter alapocia illunio.

Aliud Sorani.

Stercoris felis aut crocodili drach. viij. Sna-
pis drach. iij. ex acri aceto læuigatas imponito.
Alid. Fici folia ex aceto, don ec lanugo prodie-
rit, asfrica: dein stæbes succū iline. Aliud. Locū
pumicę proritato, & suluris, spumę nitrę, amo-
niaci, sing. æquas partes mixtas cū aceto illunio.

Ad calucentes præter ætem, & ad men-
ti pilos nō nascentes, remedium.

*Calucentibus
in eorum parte
dilat.*

Adipis taurini insolan lib. j. adares vnc. j. suc-
ci thapiz vnc. j. s. myrrhæ vnc. j. polytrichi, al-
lurichi, sing. lib. j. membri asini, splenis asini,
ladani, sing. lib. j. Ladanum in modico vino
couterito: ad quem adque vaporem liquefaci-
to: dein asinum membrum asiatum, donec in-
sumatur, raddeo: splenem verò cum polytricho
& callurcho in noua olla torrefacto: omnia de
nię contrusa gleucino, aut fabino excipito, & an-

*Ladani effe-
des ab huius
barbis desum-
ptæ.*

te balneum in vitror. Sciendum autem est, lada-
num sordes esse ab hircorū barbis desumptas,
quas illi ubi ex cistibi madore contrahunt.

De capillorum defluuiis.

*Capillorum de-
fluuii causa.*

Est & alia pilorum affectio, quæ ad raritatem
cutis, inopiāque substantiæ pilos gignentis, con-
sequitur, maxime superveniens à morbo conva-
lescentibus. Quapropter curatio etiam hoc mo-
do lesio: non eum dem scopum, quem alopeciz,
habet. In alopecis liquide, vt vitæ vitæ humor
consumatur, primariū scopum habemus: in his
verò, vt capitis habitum roboremus, & alimen-
tum boni succi attrahamus, cutis densitatem &
raritatem modo deratę restituiamus. Quamobrem
ad pharmaca humectantia aliquid moderatę a-
stringens admiscere oportet, quale est ladanum,
quod vitæque in se moderatę complectitur, quæ
ad hoc symptoma conveniunt: caliditatem nem-
pe mediorum, & astringendę vim moderatam.

*Capillorum de-
fluuii curatio.*

rem. j. a.

rem. j. a.

*Astringentia
vehementer re-
frigera. Aliam
si quæ inflatur re-
primunt.*

Quare si capiti prius raso, perfricandū, aliquo
mediocriter astringenti oleo (cuiusmodi Hyspa-
nū, & lenicium est) admittitur, maxime ex vi
est. Nam quæ vehementer astringunt, omnia
etiam refrigerant, & alimenti influxu reprimunt:
propter cuius inopiam capilli defluunt. Atqui in-
stitutio nostra etiam quæ in affluente non mo-
do non præpedire, sed etiam proleclare: cogere
lentius sensim, & astringere rarefactam cutem.

*Defluuii capi-
tis oporiet
ducere non al-
iquid ex lada-
no ex lenicio-
no oleo amulat.*

Quare ad defluuios capillos omniū præstantis-
simum medicamentum est, quod ex ladano, & leni-
cino oleo conficitur. Quod si largē desuam ca-
pillis, maiore videatur esse raritas cutis, pro leni-
cino, myrridē addendum. Licet ab aliquando vi-
genter adhibere nardinum, in ætate frigida,
& hyemali tempore: si vero in ætate calidioribus solariis,

& spicari. Debet autem ladanū liquari in du-
plici vase, ac reliqua postea illi misceri. Atque hæc
sanē medicamenta mihi fuissecerunt, vñ cum re-
fectiora, salubrius vicius ratione, quæ in plerisque
etiam sola sufficit.

Archigenis remedium contra de-
fluuios capillos.

Ladani & abinthę æquales partes, & iunipe-
ri baccas x. tritas, in linteoli diligat, & in oleo
per dies quinq; macerato, ex eoq; caput illinito,
& neq; capilli decident, neq; gignentur furfures.

Aliud Cleopatrz, capillos augens citro,
dentisq; & denigrans.

Ladanum ex oleo, vinodq; dulci læuigatā in-
crassatinq; præfictū illinito.

Comptoria ab exornatoria medicinz par-
te, quomodo differat.

Comptoria quidem scopus est, inducere pul-
chritudinē. Exornatoria medicinz partis, quic-
quid secundum naturam est, id omne in corpo-
re custodire: ad quo etiam naturalis pulchritu-
do cōdiquitur. In decoro enim aspectu est caput
alopecie vitatarum: sicut etiam oculi ciliis & su-
percilis nudati. Non folium verò ad pulchritudi-
nem, sed multo prius ad ipsam partium sanita-
tem, pili conduntur. Ad faciei colorem per phar-
mace mīldorem, aut rubicundiorem reddere,
aut pilos capitis crispos, aut fuluos, aut nigros,
aut auctos. hæc inquam comptoria præutaris,
non medicæ artis sunt opera.

De infestis capillorum.

Quandoquidem tamen iam consuetudo hæc
invaluit, vt vetula quidem posum capillos de-
nigrent, tanquam turpe sit canos habere: mari-
ti autem id probent, spectaculum permolestum
emittentes, vxorem aniculam cano capite habe-
re sanē quecunq; præ delictis seipsum ornam, ea-
rum nulli rale quippiam s me petenti, exhibui:
quæcunq; verò honestiores, tum vt nocte culpam
effugerent, tum vt molestias maritorū vitarent,
capillos suos nigros reddere optant, iis certē,
ne ex astrictiora vi nigrorem inferrent obla-
de rener, consilui, vt cedri liquore vitarentur, ita
vt tribus aut quatuor horis ante balneum iline-
rent, & postea defergerent: idq; per quatuor aut
quinq; dies facere pergerent. Cedris liquorem
nōn modō nihil lædit, sed etiam cōmoda est eis
quæ facili offenduntur frigore, abvnde videlicet
calfacient. Ad hæc, defluentes capillos corrigi-
t, & non defluentes, auctiores reddit. Contrā
verò, quæ ex austertis & acerbis composita sunt,
magnoptere lædunt. Ceterum materia ex qua
constant hæc, etiam quippiam tenuium parti-
um habeat oportet, quod non in superficie tan-
tū, sed in profundo etiam cutem permeant,
progreduendo vsq; ad capillorum radices. Non
solum autem in periculo versatas sepe scio so-
lminas, sed & mortuas, ex perfrigeratione cap-
itis ab huiusmodi medicamentis inducta. Offen-
duntur tamen citius, quæ frigidius capitis tem-
peramentum fortiantur. Frigide namq; parti-
culæ frigidæ affectionibus, calide calidis cor-
ruptantur facilius. Verū minime periculum
subeunt, vpotē eōm à minore causa ledantur,
quæ frigidius habent temperamentū. At calidæ,

*Comptoria ex
exornatoria ar-
tis parti quomo-
do differant.*

*Pili ad quid ef-
ferant.*

*Aniculi & ca-
no capite vxo-
rem habere se
flamini lapsu-
dando videri.*

*Capillos desu-
gran cedri liq-
uorem.*

modicis viciis

*Similibus affe-
ctionibus faci-
lius frigida cor-
rupta, minus ta-
men periculi ar-*

propterea quod ægræ & vix tandem lædi à frigidi causis possunt, si quando à magnis fuerint exuperat causis, maiorem lesionem incurrunt. In morbis siquidem minus periclitant illi, quorum natura, ætas, habitus, ac tempori, ipsa ægritudo congruit.

Tingentia capillos, ab Archigene prodita.

Periclitari in morbis ætate, quib. cōgruit.

Capillos tingentia, ab Archigene prodita.

Radicem caprarum cum muliebri lacte vel asinino ad tertiam cōcoquito, & ad noctem per capitulatum imponito. Aut vrinā canis in capitulato aut sex dies asseruata lauro. Aut corticia salicis succum ex oleo affricato. Summe nanque denigrat. Denigrant barbam suber aridum & plumbum vsum, cum betæ crudæ succo mellis spirititudine illita. Fulsos autem reddunt capillos lupini crudi cum aqua & nitro illiti.

Crispos reddes capillos, si spuma salis cum myrrha confricaueris.

De pharmacis corruptentibus pilos.

Pilos corruptentia pharmacis.

Ex pharmacis corruptentibus pilos, quædam proprie pilothra nominantur: quædam capillorum attenuatoria: quædam penitus extirpantia. Atque hæc sanè vltimò nominata, periculosi sunt vsus. Ex liquidis igitur est luxuriam tabi vi præditum. Ex aridis autè & metallicis, arsenicis, & sandaracha, & calx non extincta. Manifestum itaque est, vehemētem ipsorum vim, per admissionem imbecilliorum pharmacorum frangi: quorum congruentem miscellæ modum cōduciet primò, quæ ipsorum vires cognoscit. Dein verò per experimentum defectum corriget, aut etiam addet.

Pilothra Crionis.

Pilothra Crionis.

Calcia viarum partes duas: auripigmentum partem unam. Hæc in mortarii plumbeo coniecta, aqua aut pitæ succo affuso terito: atque ubi nigra tēdetur, calfacta illini, maxime in balneo, iubero.

Aliud. Amyli, calcia viarum, auripigmenti, sing. vnc. j. contritis vitore ex aqua diluta.

Quæ pilos disperdunt.

Pilos disperdunt.

Disperdentia pilos componunt ex lepore marino, hepate thynni putrefacto, cedria, ranarum cruore, maris testudinis sanguine, lachryma vitæ albæ, lachryma luedæ, similiterq; bryonice, atque oleo insulso. Ex marinis item scolopendris, viticisq; marina, & stellis marinis, nitro, & amurca, ad hæc admittis. Quin & fortiora his ex erinaceis & salamandra cōponunt, in oleo coctis. Admittent autè ipsa alcyonia, & sandarachen.

Quæ pilos attenuant.

Pilos attenuant.

Attenuantia pilos, deteriores sunt facultatis. Igitur hordei, fabarum, atque erui farina, spuma nitri, atque ipsum nitrum, familiaria pharmaca sunt, omnibus ad tollendas fordes vsuata. Assiduis autem eorum vsus etiam pilos attenuat. Quocumq; verò fortius deterget, in iis qui valde duros & magnos pilos habent, adhibere oportet. Ac talia sanè sunt, nitrum vsum, nitri spuma, & aphroditrum spumofum, pumex, testæ vitæ, os sepis, vitæque veratrum, sirathium, hyponice & dracunculi radix, aristolochia vitæque, canchry, radix pauca, atque id genus alia. Quod si hæc ipsa odorata facere vis, cyperum, melislorum, rosas siccas, iunci odorati florem, iridem Myricæ, melissophyllum, & cydoniam herbam eis admix-

scias. Si verò pro diuinibus pharmacum prapares, spicam nardi indicam, Celtricam, & montanam iniices: necnō Eretriada terram, folium malabathri, amomum, myrrham, crocum, costum, & hedychlorum.

De furfuribus.

Quibusdam se scalpentes, furfuribus similia ex capitis cute decidunt: ob idq; medici hoc symptomata furfures vocant, à vniuersis usdemq; ferocis succis proveniens: quos absumere proposuisti, iis qui huic malo mederi vult. Manifestum igitur est, discussoria & extensoria pharmaca adhibenda esse, præparato prius vniuerso corpore, si vniuersis succis redvnt. Admiscuerit quidam huiusmodi pharmacis etiam astringentia novualla, quibus partem læsam ita corroborarent, ut non facile influentes humores susceperet.

Remedium Archigenis contra furfures.

Nitri spuma, & atramentum sutorium æquis partibus, cum vino tundito, vti oportet aut quater in mense. Aut vini Rhodii faciem, & pumicis, & nitri, pares portiones, cum lupinis affrica.

De phthiriasi, hoc est, morbo pediculari. Pediculi nonnulli in capite acervatim gignuntur, ex multis humoribus calidis quidem, sed non ad tantam caliditatem progressis, ad quantam perveniunt acres atque feroci humores. Quare manifestum est, in profundo cutis, pedicularis morbi affectionem fieri, ubi etiam aismacula huiusmodi gigni possibile est: non in superficie, in qua ipsi consistunt furfures. Pharmaca itaque ipsorum necessariò exiccantia sunt, & quæ ex alto trahere & evacuare possunt, magis utique quam ea, quæ conveniunt furfuribus.

Remedia Archigenis contra morbum pedicularum.

Straphidis sylvestris partes ij. sandarachæ & nitri, vtriusq; partem j. cum aceto & oleo capiti illine. Aut oxyblasti radicem cum oleo.

Aut veratrum album, & straphidem sylvestrem, & nitrum, pari pondere cum oleo in balneo adhibe.

De achoribus, hoc est, viceribus capitis manantibus.

Inter affectus invadentes capitis cutem, achor annumeratur, ex genere tumorum præter naturam existens: quo affectu insectata particula, foraminibus quibusdam tenuibus eroditur, remanens humore modicèq; viscido redvndantibus. Ad similitudinem verò eius proximè accedit alia cutis affectio, quæ Cerion Græcis, Latinis fauus vocatur, habet maiora foramina, in quibus humor hymetrio mellis similis continet. Generatio ipsius ex humore mixto est, qui partim tenuem, ferocemq; mordacem, partim crassum succum in se habet. Tenuis itaque humor, vitæpote mordax, primū quidem ad scalpēdum ipsos impellit: progressu verò temporis, ad scalpturn etiam tumor augescit, tum foramina circa ipsos erumpunt. Manifestum igitur est, humores qui affectionem agunt, debere vacuari. Qui si etiam suavitius amplius prohibendus in primis est ipsorum influxus per capitis atque vniuersi corporis evacuationem. At verò si effectio ipsa sit parva, sola remedia localia sufficiunt, vel si minimè totū corpus vacuet. Ea igitur pharmaca idonea erunt, quæ crassum humorem

Furfures capiti à ferocis succis eroduntur.

Furfures capiti curantur.

Pediculi in capite à quibusdam viscerantur.

Pedicularis morbi remedia.

Achor.

Cerion.

Achorum, fauus, etiam, curatur.

Acetis facilius.

humorem incidant, quare facultate sua necessarid discutiant repellant. Atqui acetum ex incidentium ordine existens, ultra lior quod discutit, enā reprimur, depellitque id quod insit: ac cum nimirū secundum substantiam suam habeat exiguum quid salidi: plurimū autem frigidi, sed tenuium partium. Et sic autem debet acetum exquiri acutum, in quo nulla penitus vini qualitas persistant. At tali profectō pharmaca metalli ca imbues, achoribūque ex ipsis medebis. Incipere autē ab imbecillioribus præstat, præsertim si simul dolor insitet. Apra igitur ad hanc rem sunt, Cimolia, Cretica, Lemnia, Samiāque terra: præterea pompholyx, spodiū, lithargyros, & radomia tenella. Quod si his remediis malum non cedat, pharmacū ex charta siccā, areto dilutū illi nito. Prius tamen capillos abrades. Quod si quādo in vlcus manans inflammatur simul & afflictum dolore incidat, lentes primū dolore ipsū per humectum concoctorūque & emolliens pharmacū, & quod acrimoniam accere possit: cuiusmodi sunt tum vocatū Parygon, tum quæ sedis viceribus, & cancri opitulatur.

Remedia Archigenis ad achoras.

Cadmiū cum oleo veteri illinito. Aut cinnabari similiter intū imponito. Aut chalcitidem cū myrteo oleo, vel sullo felle liquido invigito.

Remedia Apolloniæ ad achoras.

Caput succo betæ illinito, aut laurino oleo, aut crocino vnguento, aut taurina, aut camelina vrina. Vel fursurū charnucem dimidium in aquæ heminis duabus maderacito, posteaque terito, cremoremque extolato, cūque dimidia acetī hemina ad lini spissitudinē roquito, & ex eo caput fricato. Vel cucumeris agrestis radicē coctarum succū panē læxam illinito. Vel argenti spumę drach. viij. foliorū rutæ tenerorū drac. v. olei drach. viij. acetī quartam partem heminx, simul trita capiti illinito.

Quæ Crito ad achoras prodidit.

Ficulnæ furculos, aut sola tenera trita cum aqua imponito. Aut recrementis ferri, & rosarū par pondus rum vino tuedito, imponitorūque. Vel lithargyri drach. l. foliorū rutæ tenerorū drach. xxv. areto diluto: & rosaceo, aut myrteo excepta, cum pecunia illinito. Vel, si affectio fuerit inveterata, ladani, cerussę, sing. drach. viij. sulfuris viui drachmas uij. vino & myrteo oleo subactis vitro.

Ex libris Cleopatræ ad achoras.

Fenogrecō tenui cocto, & in betæ nigry succo macerato, caput eluatur. Post ablutionē vero myrto cum vino & oleo trita, illinat: superneque betæ folia imponant. Vel cerussę, thuris, sing. drach. ij. sulfuris drach. j. trita ex oleo illinito.

Remedia Sorani contra achoras.

Plumbaginē, sulfuris viui æquales partes terito, & assuio rosaceo, aut myrteo, aut lentiscino, illinito. Vel sulfuris viui, lithargyri, cerussę sing. æquas porciones, croci dimidiā, trita cum passo Cretico illinito.

Ad psydracia & achoras, pustulasque vlcerosas, & erupciones in rapire.

Ad affectiones præscriptas, convenienti vii oportet visus ratione: corpusque atque caput pur-

gare, catapotia ex aloë, rolocynthide, & scamnio, succo brasice rosæque. Dein localia remedia adhibenda sunt: cuiusmodi existit adiantum ex rosaceo illitum: aut ferruginei decoctum affictum: aut malua cum farina lordeacea pro carta plasmate imposita: aut melliorū cum farina festugracæ, cicerūque decocto impositū: aut ipsum met cicer decoctum, impositumque: aut amarynaces cōmansæ & illitæ. Discutit autē maxime & li li j radix afficta: & thus cum vino & aqua, & lupinorum amarorū decoctū, & bulbi cum nitro afficti: thus præterea ex aceto illitum, puramentū mali punici cum laurino illitum, & anchusæ radix vīta, tritāque cum oleo, & per pinnā invincta.

GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorū secundum loca, lib. II.

Quia citra distinctionem scripserūt auxilia doloris capitis, maius detrimentum ejus emolumentū attulerūt eis, quæ si adhibuerunt. Nec enim omnes ob vñs affectionē caput dolent: sed tum ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singularim propria existit. Vna etenim affectio est iuxta intemperiem simplicē citra humorem affluxum: alia iuxta humorū qualitatem versatur: tertia secundum eorum solam multitudinem acridit: quibus accedit quarta, cum transitus liquorum atque vaporum ipsi humores obturrit: ac præterea quinta, dum in quibusdam capitibus paribus, propter imbecillitatē spiritus stultosius innascitur. Est cōm ob causam aliquam procaractica (cuiusmodi sunt ardor extrinsecus, aut refrigeratio, aut ebrietas, aut ictus) dolor capitis accidit. Vehementissimi igitur capitis dolores sunt iuxta caliditatē & frigiditatem, maxime cum inæquales fuerint: moderati autē iuxta siccitatē: ad humiditatē verō nullus consequitur dolor. Eodem modo cum ob redundantē humores capitis dolor oritur, vehemētiorem quidem ob calidos & frigidos accidit: moderati autē, ob exirrantē citra calorem aut frigus. Humectantes verō, penitus nullū dolorē inferūt, quantum ad qualitatem quidem ipsorū attinet: nam ob multitudinē sanē, instrumentaliū partū morbos efficiūt, non tñ similiarium particularū vllum aliquē: rñm nimirū earū morbi in pura intemperie consistant. Ad hanc affectionem ob ropiā humorū oritur, citra quidē obturationē caput grauit: cum obturatione verō, si quidē ea moderata fuerit, moderatē doloris fient: si fortes, vehemēter affligunt. Quod si etiā mordacem qualitatem multitudinē humorū fortiauerit, etiam iuxta hanc dolorē augebit. Quod verō ad naturam affectarū particularū pertinet, interdū quidem extra valuarum affectio fit, aliquando intra: & interdum quidem omnes externas, aut internas partes infestat: interdū autem non omnes, sed vnam tantū speciem corporis, arteriam nempe, aut venam, aut neruum, aut membranā, aut cutem, aut ipsum deniq. cerebrū. In vniuersum igit, singulari affectionē curanonis scopū ratio nos docet: materię verō facultates experientia cōmonstrat. Porro aliquādo sola intemperie

Capitis doloris
distinguitur, &
generatio
trita.Dolor capitis
nulli ad humores
daturus causa
quorū.

Galenus.

Similiter partium
autem morbi
in pura intemperie
consistunt.Capitis doloris
distinguitur, in
eandem differentiam
autem
florum, partium,
calorem.Pustulæ capitis
in medicatio.

calida ex infolatu laborat caput: aliquando cum ipsa intemperie accedit etiam humorū affluxus, præcipuè cum vniuersum corpus laborat plethorā, quæ sit ipsius quatuor humoribus ex æquo aut sitis: aut etiā sanguine solo. Nam cum alius quispī humor redvndat in corpore, nō plethorā, nec simpliciter plenitudinem, sed pituitæ, aut bilis fluxus, aut atræ, tunc plenitudinem dicimus. Igitur eius q̄ ex ardore caput dolent, cutis tactū andor ad primū contactū apparet: oculorūq̄

Pleniorā fieri, quatuor ex æquo humoribus affluis, aut etiā sanguine solo. Dolore caput ab ardore constituto indicia, et curatio.

Occiput nec salis cerei, nec atræ nec refrigerari præcipuum spinalis medulla cū sit. Spinalis medullam in fræ gunt, nervos distrahunt. Sinæputa repia nem esse apūm mām ad trans mittenda vni applicadorem medicamentorum

Rosaceum cerei sū commodū, quatuor subf- ci debent. Chamæmelis elix in quibus sit vitendo cor- poribus.

Refrigerandi medicamenta raris.

Porquam Gal- lani parva

Staphisagria, et quæ vbi vni refrigerandi, vit- tula in capite dolentem esse. Refrigerandi solum, quod ra- tio vti in cap- ito dolentē pos- sumus.

gis enim refrigerat. Equidem aliquando eucurbitæ cremorem permiscuit omphacis. Potent etiam quis similiter sendis succo vti, nec non tum hortensis, tum syleutis lactuca. Quin & moro rum non admodū maturorū succus est aptus ad refrigerandum. Si igitur calvus sit æger, aut bre- ues habeat capillos, vbi easmē refrigerari pote- rit, tum per iam dicta, tum per omnia illa quæ erysipellati auxiliant. Qui ex frigore caput do- lent, his facies decolor, mīpimēq̄ arefacta cōspi- ciuntur: & frigidis neq̄ gaudent, neq̄ item iuvant. Si igitur frigiditas ipsa sit recens, solum rutaceū oleum, si calidum affundatur sin capiti, perfectē hominē liberalat. Si verō vehementiori calore sit opus, euphorbiū oleo indat, & pharmaca quæ- cunq̄ constant ex pipere. In vnguentis autē est faci- es, ac tum aures, tum nāres, præcipuè irino, a- maricino, & iardino vnguentis: necnō solatis spicatisq̄ vocatis. At opobalsamū sapie experti sumus ad nullā affectuōnē calore indigenē, evi- dentem opulurū. Sampuciū autem, laurini, & serpyllinū cōmendo. Propanandum præterea ius est vinum tenuium partiū: & motus corporis præcipiendus, lauciaciq̄ calida: & quandoq̄ ara phano vomitus. In capitis autem inveteratis affectibus necessariū pilos radimus, aut præci- camus ad cutem vsq̄: ac rasiū quidem admo- uemus pharmaca emplastica: liquida verō iis, qui brevissimē habēt capillos præfectos. Ac sanē me- dicamenta refrigerantia, ex iis quæ erysipellata cu- rant, sunt transferenda: calidissima verō, ex phar- macis calfacientibus conficienda: quos simpli- cissimū est ex euphorbio composuī. Sufficit autem vnciam euphorbiū vnam, ad tres ceræ lique factæ in olei laurina cōiectæ, atq̄ vitendū qui- dem abstringenti oleo, ad affectuones quæ indige- rent calore, non est: sed aliquo tenuiū partiū, cu- iusmodi Sabinū exiūt. Quibus autem ob po- sitionem calidorū vinorum, caput repletum va- poribus aut humoribus calidis (solent enim his vel absq̄ vini potu, si apte natura ad caput attol- li) dolore affligitur, iubendi hī sunt, si crudū ad- huc in eis vini permaneat, vt lauta aqua tepi- da vomant. Quod si etiam post concoctionē ca- put doleant, refrigerantibus ac repellentibus est vitendum: quale est rosaceum per se, & cum ace- to, aut hedera & brassicæ cremore. Quin & ipsa brassicæ folia calida macenta, capitisq̄ circūpo- sita, ac obligata, naturaliter ebrietati resistunt. Ceterū somni quietisq̄ cura in primis habenda est: vbi vero per totū diem quierint, ad vespere- ram loti, cibis boni succi nutriti sunt, non ta- men calfacientibus. Sūt autē tales, pistanae cucu- & sorbitio ex alica, & panis ex aqua, & oua sorbita absq̄ garo. Admiscatur autē eis ex mel- le, vel ex sale condimentis aromatū preparato, quantum sit satis ad suauitatē saporis. Ex olei- bus congruit illis lactuca, vt pote boni succi atq̄ refrigeratoria: nec non brassica, vt quæ vapores resiccet: sic & ex leguminibus lens. Potu verō om- nino aqua vitendū est. At quia nōnullis ventri- culus a frigide potu subvertitur, mālum punicū ipsū superaddendū est, aut solū per se, aut cum ali- ca flaccida calida, probēq̄ cocta. Quin & mālā Celsiana appellata in vrbe Roma, citra cocturā

Dolore caput ab ardore indicia, et curatio.

Opobalsamum ad affectionem indigenam calore non magis- pere opulurum.

Dolorem capi- tis in veterato- rum curatio.

Dolorem capi- tis ab ebrietate curatio.

Celsiana mālā

quidem

quidem sunt austera: post cocturā verō, stomacho evadunt commoda. Coquenda aut sunt ad vaporē aquae suspensa. Abstinentum verō à pal-
mulis est, ut quae ex proprietate dolorē capitis
excitant. Quod si moderate tam habeant, & a-
quam bibere nequebas, permittendus est eis po-
tus alicuius vini diluti & aquosi, quale est in Ita-
lia Sabinum, in Asia Titacazenum. Quin & mo-
derate habentibus, galiorū testiculū & alar, & sa-
xatiles pisces, mollisq., exhibendi sunt: nec non
columbarū pulli. Haec verō omnia, citra garum
& vinum, in albis simplicibus coquantur iuri-
bus, quae ex aqua, oleo, anetho, ac modico porri
conitant. ad cocturā suā, salis paulillo adiecto.
Ceterum ante cibū quidem pluribus deambu-
lationibus est vrendum: post acceptū verō cibū,
breuibz acientis. Oportet tamen nec multa e-
disse, nec statim post cibū sumptū inambulare,
sed post duas, aut tres, aut plures horas. Quod
si quando à vaporibus aut humoribus in caput
sublati, reliquis quidā superflint, in poris ipsis,
meatibusq. angustis impactae, & ob id etiā per-
seueret capitis dolor, non rosaceo, sed vrendum
primū chamæmeleo est, moderate calido: po-
stea verō inno. In balneo verō caput calidaper-
fundatur, non modō ut aliquid eorum quae circa
ipsum consistunt, discutiatur, sed homini etiam
conciliandi gratia. Quapropter secundū etiam,
aut tertium, ad vesperam, balneum apparidum
est: post quod exhibende lactuce aceto, cui
pauillulum, aut omnino nihil gari additum sit:
verū aqua assusa multa, ita ut acetū exaquet:
nisi acetum sit planē aquosum, quale vniq. illi
desiderant: quandoquidem quod acerrimū est,
aliquem calorem sortitur. Post haec verō postea
die, quae magis caput calcifiant, administran-
da sunt: ita ut ad irinum, aliquid amarinum
vnguentum, aliquando uardinum addamus.

At capitis dolor ob plagam conspicuam or-
tus, nihil est aliud quā inflammatio, quae non
ex plaga solum aut casu, sed absq. manifesta etiā
causa, iuxta omnes partes fieri ob affluxum hu-
morū consequitur. Si igitur plaga vulneris
aut contusionis exstiterit causa, plures scopi erunt
ad inveniendā praesidia. Vnus qui circa vulnus
versatur, quod, posteaquā fuerit constitutum
fibulis, glutinātia & arcenata phlegmonem me-
dicamenta postulat. Secundū consusio est in-
tentus. Tertius totus in doloribus est: qui interdum
quidem in ipsis solis percussis partibus si-
unt, plurimum autem ad vicinas etiam partes
se extendunt. Etenim pericranium, & eius cutis
exterior, propriam continuūque substantiam
habent, per totum caput extensam: ob idque sa-
ne contingit vniuersum caput dolore affici, prae-
sertim si ad peritiosā membranam, quae crania-
no est adhaerens, plaga ipsa penetret: cui me-
debimur diuidentes pericranium membranā,
subdurāq. illi os radentes, viq. illic rursus con-
crescat caro, curantes. Quod si ob commercii
illud quod per futuras peritiosā habet cum du-
ro cerebri involucro, etiam intra calvariam dis-
tribuitur phlegmonem, non absq. periculo ra-
lis dolor conngit. Conngit autem non raro,
vbi quis ex sublimi cecidit, ut aliquid circa cere-

brum, aut membranas eius, rumpat: quod vbi
cōngit, adhuc amplius inualeat ipse capitis do-
lor, affectioq. tota aegre curabilis redditur, & pe-
niculum maius, magisq. praecipit imminet. Opi-
um itaq. fuerit in his, nisi aetas prohibeat, vita
liue facultas appareat debilis, curationem à ve-
naz sectione autipari: & cōuenientibus capita
irrigationibus subinde vti, oleo dulci imbuctes
lanam, capitiq. illam circumponentes. Quod si
aut per aetatem, aut vires, non liceat sanguinem
ipsum detrudere, deicienda alius per clysmum
est, tum ut eius excrementa vacentur, tum mul-
to magis ut reuelentur humores n., qui consue-
uerunt ferri ad affectus particulas. Postea verō
auxiliis utemur ad inflammationes congruenti-
bus. Si igitur membrana cerebri vulnerata fue-
rit, egregie ipsam conglutnat (ut ait Archige-
nes) calaminthae succus infusus, & farina mi-
liarida inspersa: deinde butyrum & rosaceum,
ac adeps suillus infusus, vterq., omnia in vniū
cōmixta, tepescētiq., & infusa. Hoc modo affec-
tor, à vino & cibis crassioribus abstinere opor-
tet, maxime si correpit sint febri. Etenim affec-
tū ipsa nobis auxilia indicat. quantitatem autem
singulorū, particularemq. materierū differe-
rentiam, tum affecta particula, tum aegri tempe-
ramentum cōmonstrat: nec non vitalis facultas,
deinde aetas, ambientisque nos aeris temperies,
iuxta regiones, anniq. tempora, & praedominan-
tem anni constitutionē evariis. Porro ad phre-
niticos, quando quidem omnia, quae extra cal-
variam circa cutem atq. ipsum pericranii consi-
stunt, immunia ab affectu sunt, rectē, mea quide-
m sententia, aliis pharmacis acetum miscue-
runt veteres. Siquidem ad affectiones in pro-
fundo delitescētes, pharmaca diuersa ab his, quae
affectibus in superficie haerentibus congruunt,
debent administrari. Exoluitur namq. omnium
ipsa vis in transitu per profundum: & ob id ad
propria affectionū auxilia, aliquando contrarie,
& nocentis facultatis pharmaca temperamus.
Quippe acetum ex se, cum nec mitigandi, nec la-
xandi vim habeat, praeter rationē miscetur auxi-
liis his, quae ad dolentem inflammationē admini-
strantur. Quia verō per sinciput pharmaca pe-
netrare volumus, ob id sanē aliquid eorū, quae
in profundum deducunt, miscemus: interdum
quidem frigida facultate, sed tenuium partium,
praedictā, cuiusmodi acetum existit: interdum ve-
rō calida, quale est euphorbia. Quocirca, dum
crasse membranae cerebri nudae inbillamus ro-
saceum (quod fieri solet, vbi osiculus aliquod
est exemptum) solum ipsum leuiter tepescētum
infundimus. Cum verō circa deducionem, in-
tegra existente caluaria, rosaceum cupimus ut
per sinciput ad membranā cerebri penetret, ace-
tum illi, ut ipsum perducatur eo, temperamus: cuius
vehemens facultas, tum per viarum transi-
tum, tum per rosacei miscellam, exoluitur. Iam
verō inflammationes quae in capitis cute, aut e-
tiam in pericranio consistunt, si quidem citra ve-
hementem dolorem accidunt, per modici acetū
ad rosaceum missionem iuuari possunt: laxen-
tur autem, si & magne fuerint, & dolorē vehe-
mentē induxerint. Ad haec, rosaceū cum aceto,

*Palmas ex
proprietate ex-
citare dolorem
capitis.*

*Albi iuri con-
posito.*

*Balneum crasi-
liae fontanis.*

*Capitis dolor
ob plagā ortus,
quasi modico
scopis largia-
tur.*

*Dolor capitis
ex ulla obor-
ta, cui sepe ex-
stilitur per totū
caput.*

*Capitis dolor
ex plaga, quan-
do rursus peri-
cranium.*

*Meningem cere-
bri vulneratā
conglutinantia.*

*Affectiones sine
in profundo, si
necesse pharmaca
ab his quae
haerent in superfi-
cie, desistat.*

*Acetum cum mi-
scetur rosaceo
ad phrenitidē.*

*Malleo crasso,
quomodo rosaceū
laxa rosaceū te-
pescētum in crassā
mischungem.*

*Acetum quātū
de sit rosaceo
miscendo est ad
soluendū caput.*

*Acetū rosaceo
missionem, quā
per se, quā
obst. inflammationē
leniant.*

incipientibus in vigore verò consentientibus, roscum solū administramus: quemadmodū etiā in induratis, absinthium ei atq; pulegium misceamus: nam quæ absq; duriciam decreverunt inflammationes, pharmacā laxantia desiderant. Porro ad dolores capitis, in quibus exaccare est animus, commodissimū cataplasma ex lolij farina & adipe asserino conficitur. Sciendum autem est, myrrhæ odorem plurimis etiā sanis dolorem capitis conciliare: vnde eos ipsos qui iam caput dolet, non parum offendit. Opio autem eo tantū tempore uti cogimur, dum præ dolens velentia æger de vita periclitatur. Extinguit liquidum senius, maximèq; solidas partes offendit, adeo ut postea correctione siropus. Cum autem difficile sit, ut qui homo est nō in multis hallucinetur, quædam videlicet penitus ignorando, quædam malè iudicando, quædam negligentius scriptis tradendo: mirū cuiquam esse non debet, si aliquando deliquisse cōperiar. Arculgenius, in his quæ de auratione capitis doloris conscripserit.

De capitis dolore à ventriculo exorti.

Nonnulli autē vel si modicus humor in eorū ventriculo colligatur, & præsertim circa os eius, statim caput dolent: atq; ob id, si diuinus à cibo abstineant, offenduntur. Augetur quippe esurientibus eiusmodi humorum malitia. Cum igitur cuiusmodi affectus capiti proprii non sint, sed ab humorum noxiis vaporibus à ventriculo volitantibus exoriantur: quemadmodum etiam ob id genus succos, aliis suffusorum symptomata veniunt: capiti adhibenda remedia nō sunt, sed quelcerrimè qui in ventre cōstitant succi, vacuandi. Vacuantur autem in iis qui ad vomitum sunt proclives, facile ab aquæ potu: æger verò vomennus, difficilis. His igitur conabimur quiprimū cibum boni succi, ac ventriculo commodum exhibere, si res ita ferat, à balneo: si non, ante balneum tantum cibi offeremus, ut non ledantur inde postea lavantes. A cena autem modicum abstinē in potu dabimus: posttridie verò, in posterūmq; similem vitæ rationem illis instituemus, donec exactissimè concoquant. Quo tempore iam licebit illis modicum panis præbere circa tertiam aut quartam horam, aut citius, aut tardius: si tamen, ut sane amplum spacium ad consuetam balnei horam inter sit. Quod si qui panem absque obsequio edere nequeant, his olivas, aut palmulas, aut uvas, aut tale quippiam addemus, iuxta naturæ cuiusq; proprietatem. Ceterum ad præuorum in ventre colligendam succorum copiam, plurimū conducit tum imbecillitas cœcoticia potentior, tum oris ventriculi infirmitas: quemadmodū etiam ad capitis hinc dolores giennados, tum facilis sensus, tum caput ad cuiusmodi humorum vapores suscipientes promptum: sicuti etiam & in nonnullis oculi. Qui igitur propter acres humores caput dolent, mordacem dolorem, non tantum, percipiunt: at fames in sensibus commodā est: contraria autem iis, qui mordaces humores collegerunt in ore ventriculi. Quum itaque hic mordax humor fuerit amarus, pallida & flaua bilis vocatur: quæ

ob leuitatē in sitam fursum fertur, ad os ventriculi: cum verò pituitosius, aut acidus, aut salis fuerit, magis in tonus ventris spacio cōnnetur: ac fuerit sanè optimū, si in fundo ventris in cōtineatur. Omnium autem est pessima constitutio, dum viscosi humores, ventris tunicis includibiler sunt defixi, & imbuti: quibus educēdis opem minū remediū est hiera picra, cuius talis fit cōpositio: Aloës drachi. c. cinnamomi, spicæ nardi, xyloballami, cluæ mastiches, asari, & croci, sing. drach. vi. Præstatissimum autem est pharmacū, vbi minus de aloë additur, mindiq; etiā ex croco: quandoquidem nonnulli ex visu ipsius oblectantur capite, id quod d'ispe ex solo eius odore perpetuatur. Quare optima erit ea cōpositio, quæ aloës drach. x. croci quinque receperit: quæ sanè ipse vtor. Præstat etiam pro asaro carpesili concicere. Pro pinatur ad summū ex pharmaco drachima vna cum aquæ calidæ cyathis tribus: minimū verò, dimidiū eius præbetur. Cōfert autem hoc pharmacum eis qui suffusorij afflicti sunt symptomatis, & mulieribus quæ nō pro dignitate purgātur. Quemadmodū autem in ventris & intestinorij regionibus ex caloris quidē inopiam, interdum ex cibo ac potu vapor statulentus producitur: propter imbecillitatē verò facultatis comprehendere, adeo instantur atq; replentur ea organa, vtriusq; quidem repletionis ratione tendantur: ob tensionem autē impensè dolent: sic etiam in partibus quæ ad caput pertinent, possunt hinc eadem cōtingere. Etenim ob dissolutionē continuitatis partium dissimilariū dolor oritur. Dissoluantur autem ipsam, erodentia, discicanna, distendentia, vehementer calfacientia, atq; refrigerantia. Si igitur erosiōnis, aut punctiōnis sensum percipiant ægri, a credo vel humorū, vel flatus, causa putanda est. Si verò citra morsum tendantur, tensio ipsa vel ab spiritibus flarulentis, vel ab humoris colluuiē, oboritur: quo in genere phlegmone erysipelatq; consistit phlegmone quidem, vbi plurimū sanguinis affectam particulam occupat: erysipelas verò, vbi biliosus fuerit is humor. Quod si ab vtriusque redundantibus aliqua pars repleatur, aut instillatio erysipelatola, aut erysipelas instillatū talis affectio erit. Maximè itaq; artis curandi cōiectura in affectiōis cognitione consistit: quæ vbi inuenta fuerint, curationē nō cōiecturaliter, sed sciēntificè indicant: cum hoc quod etiam cognoscere datur, q̄ æger aliquæ affectiones melius cedant in quibus ut vtriusq; semper remediis ab indicatione profectis, ratione est consonum, tamen si nihil enim in principio videatur. Aliquando autem adeo vehementer in angustia meatūs flatus vaporosus, atq; eo adhuc magis viscidus crassiusve humor impingitur, ut multo tempore ad curationē sit opus. Ac sanè quæ sic infarctā sunt, attenuate oportet, dilatarēque meatus per quos excurrent, habita simul providentia, ne quid aliud amplius influat: vtrūque affectū corroboret, ne ipsa etiam flarulentum generetur. Qui igitur primi ad eiusmodi affectiones pharmaca cōposuerūt, merito habuerūt opus materia varia: si quidem in flurent substantiam, siue humor, siue vapor ea sit, repellere necessarium

Myrrhæ odorē
conciliare dolo-
rem capitis.

Opio quando
ad caput dolo-
rem uti debet-
mus.

Hemionem in
multis hallucina-
tioni.

Capitis doloris
ob ventriculi
conferentia abor-
tis & indicia,
& curatio.

Utrūque

Vitæ ratio facit
in ventriculo
colligendā, quæ
conferant.

Favorem ad ver-
sam in quæ mor-
daces humores
colligunt in ore
ventriculi.

Hiera picra
optimè melle
mixta ad esop-
gōlis humores
tunicis ventri-
culi infixis de-
scribitur.
Croci odorē
ferre caput.

Hiera picra
quibus humoribus
affectibus.

Dolor vnde ex-
oritur.
Erysipelat
quæ solent.

Phlegmone seu à
sanguine.

Erysipelat oritur
à flava bile.

Tumores cōspici-
ti.

Cōiectura ar-
tu modica, in
affectibus cōiunctis
conficitur.

Præstat opti-
ma car. sap. in
principiis acri-
tatis videret-
ur.

Impacta esse co
quenda, attenua
da, deficiente

cessantū existit: impactū verō cōcoquere & atte
nuare, eandēq; ipā discutiēre: ac nihilominus,
imō longē magis, affectū parti robur indicere,
ne videlicet qd̄ inhiit, inscipiat: vix attenuatum
enecaret, impactūq; eo cōcoquat, atque subri
lius reddat. Ergo in proposito dispositione, si
doloribū calor vni cum spiritu flauilēto prae
polleat, in principio quidem repulsoria curatio
ne est vitandū, quae ex facultate refrigerante con
stat. Quod vbi factum moderatē est, ex mitiga
toris & cōcoctōris quippiam ad repulsiōis mi
scere oportet: dein disculsoria addenda, ita vt
paullatim repulsiōis detrahāmus, donec phar
macum ipsum plurimum quidem digerēs atte
quatorumq; reddatur, minus autem concoctō
rium & mitigatoria, minus verō repulsi
orium. Portulaca igitur refrigerans & aquose
substantie est: minus ea polygonū: in solano tan
tum crasse & terreē est admissum, quantū astrif
sionis. Accetum repulsiōis simul & arrenuato
ris, imō & disculsoria facultatē forniat: vt po
tē quod secundū temperiem, frigiditate qua
dam tenuiū partū praepondeat, nō secus q̄ ex
quisitē serenus boreas. Rosa cum porro, repul
soria, cōcoctricis, mitigatrice, ac deniq; discul
soria facultatus est particeps. Vt ergo sermonem
lumen habuit reperam: nec in biliosis causis inini
genda est inedia: nec vitandū venae sectione, si
puer aut senex sit egger, aut virū imbecillitas ad
sit. Licebit autem vni validis clystis, quod maxi
mē hi possint reuellerē capite, vacuareq; non
modō quae circa ventrem & mesenterium consi
stunt, sed etiā quae in sinu hepatis haerent. Com
mendat autem Archigenes irrigationes ex ruta,
oleo, & aceto mixta, ad dolores capitis: sicut &
succum baccharum lauri cum aceto & ruta. Scien
dam verō est, aridam rutam esse multo & aciorē,
& calidiore viridi. Qui caput ob humorem
biliosum dolent, eis signa similia sunt eis quae ab
ardore proficiuntur. Accedit his maior mor
sus, & faciei pallor, & nonnunquā oris amaritu
do. Aetati autem vigoria, & temperatior calidi
oribus, & vine foliatis, & us qui flauum bilem
accumulant, haec affectio praecipue contingere
soler. Itaq; balnea temperata, & vntiones, & po
tas dilutas, eis excludendae sunt, omnīq; victus
ratio rum* humidior, rum boni succi, cōstien
da. Evacuandus item biliosus humor per abstin
tiam cremorem est, aut per aloē, & per ipsam pla
nam aridiorum, per le datam, aut modico scam
moni adiecto: vel per caraporia ex aloē confu
cta. Illinenda frons paulillo croceo, aut appila
to Trigonō, aut aliquo alio his simili. Si cum vo
luntario corpore caput consorsit lege afficiatur,
prospiciendū illi est. Igitur si plenitudo humo
rum, ac maximē circa venas consisterit, runde
mus venam. Si verō magis qualitas inualerit,
vitemur purgantē pharmaco. Si caput vni tantū
parti condoleat, vt hepati, ventri, aut ipsum ori
illis in primis optinebimur: nempe calida in li
pis praecipiente temperie, panem ex diluto vi
no exhibentes, sorbitionesq; ex alica: ac foris ex
tiam vntes irrigationibus, quae rum refriger
rent, rum firmitudinē addant. At si ob viscidō
& crassos in vnticulo pōtētos humores caput

quis doleat, etiā hos exturbabimus, acetū mul
tum in potu praebendo. Ex hyssopo enām origā
nōq; potuonibus, & quae huc adhuc valentiores
sunt, magisq; incidendi vi praedixi, vtremur: nec
non & radculus vomiti, lrisq; anibūsq; & car
plasmatis calidioribus. In doloribus autē ca
pitis qui ab initio invaserūt cō febribus, vena se
canda est, post primā aut secundam remissionē,
nisi quid impediāt: & praeterea in corporibus
bonae habitudinis, & multo sanguine redivdan
tibus. Quod si serius post septimā diē dolor ipse
prehenderit, alio prius abvnde per clysterem ex
soluta, cucurbitulae ad occiput, aut ceruicem, sunt
affigendae: capitisq; irrigationibus ex oleo fouen
dam: rosaceo quidem, & cum modico aceto, in
calidioribus, & tempore aetatis: chamamelino
verō, in frigidioribus habitudinibus, ac hyeme;
quinta parte acetū illi adiecta. Illinenda frons in
frigidioribus quidem est, ex cyphi: ex crocama
gnate autē, in calidioribus. Porro vitandū sim
in omnibus capitis affectionib. ea quae subdū
tur: nepe vinctis semē, abinthij succus, lac in po
tu, glandes quercing in cibo, oliuae nigrae, arbuti
fructus, eruum, quod etiā exoluit articulos: sm
plius autem offendunt myrrha, succus, hederē ca
cumina. Menis etiā perturbant lentisci fructus,
crocus, peucedanū, cicadaminū sicca cum vino
epota. Styrae modicus quidē potatus, tristitiam
vultus discunt: multus verō, somnos turbulen
tos conciliat.

De Cephalaea.

Cephalaea, inveterata & aegre cedens capitis
dolor vocatū, qui ex levi occasione maximas ex
acerbationes habet, adeo vt neq; strepitū, neq; vo
ces vehementiores, neq; lumen splendens, neq;
vini potum, neq; odoramenta caput replentia,
aegri perferre possint, neq; itē mori: sed in quie
te & tenebris decumbere ob doloris magnitudi
nem velint. Etenim tanquā a malleo percuti bib
videntur. Sunt qui velvni contendi ac disendi
sibi ea quae circa caput sunt, sentiant: non pauci
verō vix ad oculorum radices ipse dolor potē
greditur. Habet autē haec affectio aliquod quid
dem continuos dolores, aliquando verō ex ac
erbationes, & intervalla. Manifestū igitur est, hanc
affectionē cōsumit aptitudinē capitis, vt obla
datur facile, habereq; quēdam modō in cephalal
gia. Verū ad maiorem imbecillitatē deveniūt
in hac affectu partū capitis. Ac sanē quidē ex
sic affectis, cerebri in volucria doliant: quidē pe
riculanti duntaxat. Dolores igitur cum grauita
te, multitudine humorū significant: cum mor
dacitate verō, aut humorū, aut vaporū a credinē
vt cum pulsi, oborti inflammationē: ac cum res
sione, si quidē citra grauitatē & pulsum accedat,
spiritus tenuis ac flauilēti multitudine indicant:
cum pulsi verō, membranosi corporis inflama
tionem enarant cum grauitate distensio accidas,
humorū multitudinē intra membranas coaren
tam arguit. Rursus, dolores quidē in superfi
cie haerentes, pericranij affectionem significant: qui
verō in profundo sunt, cerebri involucri. Qui
buscumq; autē affectio intra caluariā est, ita vix
ad oculorū radices dolor extenditur, propter
quod oculorū tunicae ex cerebri involucri suam

Capitis dolor
cū febri ab ma
no affliguntur
enām.

Cucurbitula
quidē affigē
da occipiti.

Capitis in
vni dolore qua
sint vitanda.

Crocus perur
bat mentem.

Styram fuisse
tam.

Cephalaea de
doleat facie

Cephalaea ma
gnitudine facie
latis, quā co
phalaea.

Cephalaea vni
symptomata
re & causis di
uina proditio

Cephalaea ma
gnitudine facie
latis, quā co
phalaea.

Cephalaea vni
symptomata
re & causis di
uina proditio

Cephalaea ma
gnitudine facie
latis, quā co
phalaea.

Cephalaea vni
symptomata
re & causis di
uina proditio

Cephalaea ma
gnitudine facie
latis, quā co
phalaea.

Cephalaea vni
symptomata
re & causis di
uina proditio

Cephalaea ma
gnitudine facie
latis, quā co
phalaea.

Cephalaea vni
symptomata
re & causis di
uina proditio

Cephalaea ma
gnitudine facie
latis, quā co
phalaea.

Cephalaea vni
symptomata
re & causis di
uina proditio

Cephalaea ma
gnitudine facie
latis, quā co
phalaea.

Cephalaea vni
symptomata
re & causis di
uina proditio

Cephalaea ma
gnitudine facie
latis, quā co
phalaea.

Cephalaea vni
symptomata
re & causis di
uina proditio

Cephalaea ma
gnitudine facie
latis, quā co
phalaea.

Cephalaea vni
symptomata
re & causis di
uina proditio

Acetis facultas.

Boreas frigida
tem offe tenet
pariam.

Rosam fuisse
tam.

Lacina non est
vitanda in cau
si biliosis.

Vena in quib.
nō sit secanda.

Clystis fuisse
vnde reuel
re & capite.

Capitis dilatio
remedia.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

Capitis dolor
a bile ortu
cia Crumato.

ducunt originē. Si verò putrefactus humor calidior fiat, cum febris capitis dolor invadat. Febricitant aut omnino, & qui dolent propter inflammationem. Si igitur totius corporis plenitudo sit in causa doloris, sanabis ipsum, corpore uniuerso vacuato. Si verò imbecillū existens caput, sublatos ad se humores ac vapores susceperit, materiam reuelleret oportet in totū corpus, atq; ita mederi particula. Reuelleremus itaq; & clystis, & vinculis extremis, & pluribus infernarū partium frictionibus, interdum etiam sanguinis ex cubito detractioe. Quod si amplius redvndare sanguinis videatur, etiam referata in naribus vena, & sanguine, quantum par sit, vacuato. Dein hieram dabimus exacratam: posteaq; apophlegmanū is elicientibus pituitam, & medicamentis quæ naribus inferunt, utemur: qualia sunt quæ ex elaeorio, & cyclamino, cum lacte & porro apparant. Caput aut curabis, quando quidem reuulsoris vi oportet, per repulsorias irrigationes. Ceterū post totius corporis evacuationē, vtrius caput vacuabis: dein illi qui firmitudinē addant. Repellat igitur immaturum oleum, rosā cēdēq; per se, & cum aceto, & ex papaueris capitulis, & oleis teneris germinibus, & hederæ cacumibus, & mentha virida preparauit. Applicentur autem remedia tepida quidem, ubi frigidos & crudos multum humorū exterius frigida verò, ubi calidos, biliosiores. Digerat ut oleū dulcissimū calidum, & magis in ueteratū, itēq; scyoniū. Si verò crassior sit copia humorū, ipondylium, aut ferruginem, aut pulegiū comam, aut calaminthē, aut mentham, oleo incoquens, multitudinē euacuabis. Eadem licet parti etiam firmitudinē addunt: quæ propter visū ad perfectam curationem ipsi venduntur. Omniū porro longē maxime discutit, ac perfecte corroborat, verbenacæ recta oleo incocta. Cōiicienda etiā ad eā crocodiliadā, præsertim iuxta aquas nascentes, radix. Maxime etiā conferunt sub hydris aëliū nascentes, si oleo incoquant. Ad verte autē, capitum papaueris vlium, tempestiuum esse incipiente affectione: nocere autē, si iis in dolore in ueterato vrantur. Iuant verò non inflatū fomenta tum ex semine lini & rosaceo, tum etiam confecta ex milio: nam quæ ex sale sunt, ob gravitatē capiti negotium facessunt. Archigenes inter cataplasmata varia, viticis semen, per se viridis folia, & myrrhā & quæ portionibus mista, exceptisq; Aegyptio vnguento, fronti admodum præcipit. Ceteram in sola Alexan dria ipse perisam arborē vidit, cuius fructus in Persis quidem letalem esse, in Aegypto autē innocuū, sunt qui cōtendant. Porro sanguinis à locis affectus detractioes conueniunt in affectibus in ueteratis, non Archigenes modō, sed omnes ferē medici consentiant. Verū cucurbitæ occupat affixæ, ex reuulsoris auxilii sunt, cum lumbos ad oculos, ad aut anteriorē capitis partem ferri cōsuevit, a vertere properamus. Iubet autem Archigenes vi sternutatoris quantum caput, fasciolas circumposita collo, spiritū colubinaū moliamur. Iam verò ad affectiones frigidas in ueteratas, equidē medicamentis ex thapsia & sinapi soleo adhibere. minime autem ad calidas. At chamæmeli (quā anthemidem

vocat) florem quidem, olfactu auxiliari dolenti capiti, aut Archigenes: folia autem nocere.

Sternutatorū ab Asclepiade scriptum.

Veraci albi, rad. cucumeris syluestris, struthii, sing. partes ii. castorii, acori, neri rubei, euphorbiæ, cumini Aethiopici, sing. partē i. tria iussuta. Medicamen ab eodem traditū, quod mansum caput purgat.

Piperis albi, organi, staphidis syluestris, castig. sing. drach. ij. excipiani passularum exacratarū, aut caricarū carne, & mandenda exhibeant. Ceteram nō statim à principio efficacissima adhibere cōvenit, sed à debilioribus auspicari. Porro fortia pharmaca, quibus ad mouenda sternutamenta vitmur, mitigatiorū admisione lenita, moderata sunt. Ob id quædā ipsorū muliebris sit rectē & aqua diluō: post hoc oleo dulci: dein betæ succo, & anagallidis quæ florē cœruleū habet, inde succo: atq; ita sensim in viū eorū progredior, donec postremū etiā per opobalsamū talia dissoluō. Ego autē melanthiū soleo incedere naribus: aliquid quidē aceto acini premaceratū, aliquādo oleo veteri intritū. Interim verò dum exger ethrinas vitat, habeas et aqua plenum. De hemicrania.

Hemicrania verò affectio dolorifica est, dimidiā tantū capitis partē infestans, interdū quidem dextram, interdum autē sinistram: quæ futura extensa secundum illius longitudinē, terminatur. Vel proximū autē per circuitus exacerbata, influxu vaporū, aut humorū, causam doloris fugerent. Quiddā igitur ipsorū circa temporū musculos vehemēter dolent: quidam dolorē longē vltierius progredientē habent. Sunt qui ad eō vehementer cruciant, ut ne manus quidē contactū faceret: in quibus palam est, pericranii affectum esse, neq; eius cutē omnino immunē ab affectione existere. Rationi igitur cōsentaneū est, vaporū aut humorū, aut vtroque influxū, aut à cerebro & illius involucri, aut ab vniuerso corpore illuc trāsmitti. Quapropter ubi quis hemicraniem curare aggredior, prius quibī purgatione, aut venæ sectione exger indiget, consideret: atq; ita deinde ad capitis auxilia progredietur, tum per digitos suæ manus, tum per lintēdū, humidā frontis partē, & cum maxime quæ circa temporis musculū est, confricandū exalfaciati id quod ante exacerbationis tempus faciendum est. Post exacerbationē verò, pharmacis hemicranicis ductis vtendum: si quidem multa caliditas in doloribus percipiat, iis quæ refrigerant quippiam habent: circa verò hanc, eis quæ sufficere exalfaciūt. Vtrūq; tamen aliquid ex iis quæ robur & firmitudinē addunt, misceat, quod astrigentem videlicet facultatē fortiat. Porro ex meis præceptoribus quidam ad hemicranias in ueteratas vtrab; piperis albi, & crocomagmatis, singulorum drachmā duabus, mistis cum euphorbiæ drachmā dimidia. Cū autē citō facultas euphorbiæ exoluatur, in lnuisicemodi sanē medicamentis nō est vtendū veteri. Est autē candidius, quod rectē est: nam qd in ueteratū existit, statim rem aut pallidiorē sibi colorē cōtrahit. Similiter etiā & columbarū nurrucolarū, sibiq; viciū quereantium, ætcoris, & atramenti scriptorū, licebit addere

Sternutatorū ab Asclepiade scriptum.

Erbis quib; lenius debet li querebus.

De aqua nupitidum esse, dum quæ arthritas vitat, Hemicrania de Jussuta.

Hemicrania causa.

Hemicrania curatio.

Hemicranis in ueteratis remedium.

Euphorbiæ rancis quidē esse calidum pallidius autem in ueteratū.

Reuelliendi à capite modi duobus.

Venam referatam in naribus, conferre ad delendum caput.

Erbis.

Caput esse vacuandum post totius corporis evacuationem. Repellat.

Digressio.

Verbenacæ recta facilius.

A. 16. Papaueris capitibus quidē sit uelut vtendum.

Sal est ad caput fumenta siccipiam.

Am. 16. 17.

Perisam fructum in Persis letalis esse, in Aegypto autē innocuū.

Cucurbitula in affectibus capitis quidē vtendum.

Calchitis scriptum.

addere vtriusq; dimidiam drachmam, ex ipsisq; omnibus aceto acerrimo diluisti, coſciere medicamen hemicranie ſanſſe idoneū. Ad hanc aut rem, Pergameni noſtrum atramentum multo eſt praſtantius. Aliud pharmacū, ad hemicrania; & omne inveteraſſe capitis aſſectionē ſummē vtile. Croci drach. xv. chalcanti drach. x. aluminis ſiſiliis drach. xij. myrrhæ, opii, omphacis, ſing. drach. iij. gummi drach. xv. omnibus tritis vinum Falernum adice, & rurfus tanquam collyrium tere, deindeq; in paſtillos redige. Poſtea verò ex poſca diluſti vtere. Sæpe ſimpliciter euphorbij illatione miſti cum oleo & cera, ſum vſus. Sufficit autem ad libram olei cuiuſpiam te nuiſ, cere quadrante inſicere, & euphorbij vnciam vnam: quo quidem medicamine vtendum in ea tantum hemicrania eſt, quæ à frigidiſſe cauſis oriſcit. Iſuar etiam hos, ſi oleum tepidum inſtilletur in aurem, euphorbij vncia, cum libra olei prius temperata.

GALENI PERGAMENI

de compoſitione medicamentorum ſecundum loca, lib. III.

De aſſectionibus aurium.

Aurium dolores nonnulli quidem ſunt ex frigidityte: uñnulli ob inflammationem, vel cutis meatu auris ambictis, vel etiam nervi auditorij. Quia verò ratione inflammationis ipſa partes inflammataſ diſtendens, dolorē exciſtat, eadem ſtatulentiu ſpiritus, tranſiſſu non habens, dolorē cruciat. Conſimilis etiam fit dolor à ſeroſis humoribus: in toto corpore genitiſ, ei qui ex mordaciū humorū forinſecus advenientium illapſu cōtingit. Dolores igitur à ſola ortos frigidityte, calſcienſia quamcelerimē curant. In quem vſum ſolent nonnulli ruſtici exen teratas capras oleo replere, & in ſeruenti cinere modicē calſcificare, atque ita auribus ipſam inſundere. Alij nō capras modō, ſed alium etiam oleo frigentes poſtea inſunt illiſſi auribus. Ego verò euphorbio omnino modico, ad multū verus oleum admiſto vtor, veluti etiam pipere exquisiſſimē trito. Prodeſt etiā amaracini oleum lappi inſundi, & optimū nardū. Quod ſi aliquod oleum tenuiſ partiū, in quo ruſi præcoxeris, aut inſundas, magnopere iuueris. Magnificē autē eos miſgatorui candidiſ: quo etiā ad lippitudines vtitur: itēq; lac muliebre. Plurimū iuuant item ex adipe aſſerino, vulpinoq; inſundi tamē omnia debent medicocriter calida. At ſi inflammationē adſit, nardū vnguentū, cum pharmaco appellato Baſilico, cōmodiſſimē inſundiſ. Porro medicamen Baſilicon, alio nomine dicitur terapharmacū. Eſt etiā & Comagenum perruile, & ex adipibus pharmacū. Cogēte verò dolore, necceſſum eſt etiā iſis quæ ſenſum ſuſceptiſſi, vti. Miſcet autē opii multiebori lactū, & oui candido: quæ ipſa per ſe, ſæpe aurium inflammationibus conſulerunt. Miſcetur etiam & caſtorio opium: verum multo ante vſum tempore, præparatū id eſe oportet: & miſcetur quidē, in vehemētiſſimis doloribus, pari in minoribus autem, duplo. Liquor quo hæc diſtillatur, ſit ſapa ex muſto: multo nāq; magiſ hęc, q̄ dulcia vina, dolorē ſedat. Verū

ego nullum pharmacū dolore vexatiſ inſundo, neq; etiā per ianā inſtillo: nimirum experiētia edoctuſ, quod præſtet neq; omnino conſingere doloris tempore auditoriu meum. At remiſſio dolore, per auriculare ſpecillum, obvolūtū lanā molliſſimā, partē dolentē foueo, pharmacūq; inſicio modicē reſectum in auriflorio ſpecillo: poſtea verò fornicuſ me orificio auditorij meatuſ, tum vniuēſe aurī, mollem lanā impono. Iam quæ ex fomentis craſſa & ſpiſſa fuerint, cuiuſmodi ſunt ſpicata & foliata vnguēta, diſſoluēda ſunt vnguēto nardino: vel ſi zeſta ſit, & calōriſ ſenſuſ ægrum in aure inſtāmata inſeriet) roſaceo, vel amygdalino. Conſicitur bonū roſaceū ex oleo immaturo, ſibiſq; experite, in quo pluriſ roſæ ſint macerate. Si verò ſtatulentiu ſpirituſ, aut humorē craſſum & viſcidū, qui tranſiſſu non habet, inſclum eſſe conſicieris, etiam ex pharmacis liberantiſ ab obſtructione, quiſpiam admiſce. Porro frigidityte antegreſſa, ſpirituſ ſtatulentiu colligitur: grauiate verò capitiſ, cibiq; pituitoſiſ & mali ſucci, frigidi & craſſi humores: quibus ſi accedat frigiditytas, dolores conſtingunt. In hiſ igitur ſpuma nitrī, & nitrū ipſum molle, cuiuſmodiq; aphroſitruſ, & oleum amygdalinū, rationabiliter in pharmaca auriculāria miſcentur. Ex hoc genere eſt vtrunq; veratrum, & ſtruthium, & amygdalæ amariæ, & ex tribus ariſtolochiis, quæcunq; fuerint ad manū, & inſiſ Illyrica. Inſiciet autem & cinnamomū ſi habueris: aut, ſi id non habeatur, caſiam, tum eam quæ Ziegir, tum quæ Motos vocatur: ac præterea Carpeſium. Aurium etiam meatu� ab obſtructione liberant, quæ lapides in renib; atterunt: atq; omnia breuiter, quæ tenuium partiū ſubſtantiā abſq; mordacitate ſortiuntur. Ex quorū numero eſt etiam cucumeriſ ſylueſtriſ radix, itēq; me bryoniæ, & ari, & dracunculi, & centaureæ, & polij, & omnino amarorū omniū. Rurfus, modicæ æ aurium inflammationeſ, & nō pulſanteſ, roſaceo & aceto ſimul temperante, tepēſſiſſiſſiſ, atque inſuſiſ curantur. Glauciū etiam ex aceto in cote medica tritū, dolorib; à modica inflammatione ortiſ opitulariſ. Præſtat autē paſtillum ex glaucio, multæ ſanē vtilitatiſ pharmacum, priuſ præparatū habere: qui ſit ex glaucio probe cum aqua pluuiali trito, deſing in paſtillū coactō, exiccatōq;. Licebit verò decimāquintū gummi ad glauciū portionē addere, vt meiuſ compingi in paſtillū poſſit. Quin & collyria ex glaucio eodē modo cum aceto trita, eiſ proſunt, aurib; inſtillata: atq; hiſ nihil minus collyria ex croco. Vltera aurū recentia, tum glauciū ſolum cum aceto tritum curat, tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco & ex roſiſ coſecta: quæ modicō etiā quod Nilū dicitur. Curat itē ea Damocratiſ collyriū ex myrrhā. Quæ verò pure manſiſ circa dolorē, atq; id moderate panuntur, iſidē medicamentis curant. At q̄ fortiter aſſiſiuntur, per cuiſmodi qualiſ eſt paſtilluſ Androniſ, & q̄ ad Muſum referit, ſapa, modicōq; aceto diluta. Quod ſi hæc ab ipſo morbo vincerit, ſcoria ferri ad plurimos dieſ in ſole ex acerrimo aceto cōtrita, lævigatāq; eſt intrepide vtendū. Huuſcemodi etiā vicia paſtillū meo ex charta combuſta, ipſe ali-

Perzamus pama Galeni.

Hemicraniaſiſ gida quæ opitulentur.

Dolores aurū quæ cauſa eſt tere poſſunt.

Dolores aurū à frigidityte ortiſ remedia.

Aurium inflammationem curatio. Baſilicon pharmacum. Terapharmacum.

Opium quibus miſceri debeat ad auris inflammationem.

Sapa ex muſto dolorem ſedat.

Roſaceo optimiſ compoſitiſ.

Dolores aurū à ſtatulentiu ſpirituſ in, aut à craſſiſ humorib; excitatiſ, curatiſ.

Ariſtolochia triplex.

Caſſia duplex.

Aurū meatu� obſtruſſuſ quæ reſeruat.

Aurium modicæ inflammationeſ curatio. Glauciū ex aceto inſuſiſ curatio. Paſtillū ex glaucio ad inflammationem auris.

Aurium viciaſ curatio.

Aurū parietuſ tere curatio.

Paſtillū ex charta combuſta.

Papaveris succum autem doloris materiam affectionem autem non sanat, nisi ex accidenti si quidem.

quando curauit. Porro per papaueris succum mitigatur aurium dolores: haud item affectiones iuuantur: nisi forte ex accidenti quis eas iuuari dixerit, quod nimirum sedato dolore, atque iude somno sequuto, natura ipsa affectus dolore gignentes concoquat. Per aurium autem inflammationes, gallinaceus atque asinerius adeps, si quidem euacuatum corpus inuenerint, & humoris, qui inflammationem excitat, non amplius influentem, dolorem leniunt, affectionemq; auxiliantur. Si vero humore adhuc fluente adhibeantur, affectioni quidem nihil opitulantur, leniunt tamen doloris symptoma: ut si ob humoris accedentem aliquis morbus contingat. At pharmaca ex papaueris succo omnia, sensum stupefaciunt: & ob id sanè tunc solum illi cogimus uti, ubi nullum aliud mitigatum doloris contulit. Miscetur autem castoreum papaueris succo, ut vehementem eius frigiditatem retundat: quo nomine etiam meconium ipsum, & quidem rectè, nonnulli torret: quoniam satius multi videtur uti illo minimè torrefacto, in veterato tamen, & cum castoreo permixto. Porro galbanum fusino vnguento dilutum, mellis & rosaceo cōmixtum, discutit citra molestiam aurium inflammationes, in quas nihil fuit iam amplius, doloribusq; a frigore opitulatur.

Ad vehementes aurium dolores medicamentum ab Andromacho scriptum. Castorei drach. j. succi papaueris drach. iij. opoponacis drach. ij. spumæ lycij drach. j. passio excipito, & tepescit vitior.

Aliud eiusdem ad purulentas aurium & veteres affectiones.

Fabæ Aegyptiæ internæ amara, aluminis scissi, piperis albi, spumæ nitri, croci, opoponacis, malicorij, myrrhæ, thuris, nardi, sing. drach. ij. castorei drach. iij. aceti & mellis quod sit sanis. Cōmixto.

Aliud eiusdem, ad dolores statulentos, & aurium sonitum congruens.

Nitri, myrrhæ, sing. drach. ij. rosacei cyathū j. 40 aceti tantundem: simul trini vitior.

Aliud ad aurium sonitus.

Veratri albi drach. j. castorei obolum j. spumæ nitri sesquibolū: trini cum aceto optimo vitore.

Aliud ad purulentas aures.

Alumen scissum vitum, & myrrham cum melle terito, & praelotæ auriculæ pharmacum lana exceptum imposito.

Auricularis compositio probata, ex Apollonii libris.

Myrrhæ, thuris, sing. drach. ij. nucum amarum drach. j. spumæ nitri drach. ij. aluminis scissalis, malicorij, sing. drach. j. spicæ nardi drach. ij. aloës drach. ij. vili multi veteris cyathos iij. Arida trita vino multo admisceto, & cocta in stanneo vase reponito, ac tepido vitior.

Ad carnem excrecentem in auditorio meatu, quo visus est Heracles Tarentinus.

Aeruginis rase drac. viij. squamæ æris drach. iij. mellis heminx dimidiū. Arida trita, ac melle 60 excēpta, donec rubescit, cogito, & ablatis vitior.

Aliud ad sanguinis ex auribus eruptiones, Heraclidæ Tarentini.

Marrubij succum exprimito, & aceto dilutum infundito. Aut mali punici in aceto cocti

fuccū exprimito, infunditōq;. Aut polygoni succum cum modico aceto, Ad vermes innatos auribus, verum album cum melle immittit, aut andum infusit: aut rubi succum infunde.

De sonitu aurium.

Ex sonitibus aurium, alij quidem, spiritus flammæ sunt soboles: alij verò ob exquisitū sensus audiendi subtilitatem fieri: quemadmodū etiam in oculis oriri solent visusorū imagines, ob vapores exhalantes ab ore ventriculi. Ceterū neutrius affectionis exacta cognitio haberi in principio potest. Porro si in febribus sonitus fiat, minime interturbati sunt: ut plurimū namq; statim sedantur. Si verò ob statulentū spiritum, cui non pateat exitus, sonitus fieri suspicatus quis fuerit, & ob hanc rem discicantibus, attenuantur, ac discussoris ad motus pharmacia, nihil cōtulerit: similij apoplegmatis viciū sit, & vniuerso prospectant capiti: huic merito in hāc suspiciō nem inclinatus animus erit, videlicet sensus audiendi exquisitam facilitatē, causam eius morboris existere, præsertim si acuto aduēdi sensu præditus esse æger appareat. In talibus igitur, ex sensum stupefactis: quibus quippiam soleo admiscere: cuiusmo di est mēdragorū, & papaueris succus.

Ad sonitum remedia ab Archigene prodita.

In sonitibus repentinis aceti cum rosaceo instilla. Aut cuminum, & oleum, crassei rudine mellis. Aut radices sylvestris cucumeris succū. Si verò protrahat, omnibus amaris, acerbis, attenuantur & discussoris, quibus utimur ad dolorem ex crassis humoribus ortum, vitris, singulis in aceto coctis, admiscitōq; melle. Aut reclinato nigro, & nitro trito in aurem insperito, acce aceti infunde tepidum, ac postquam seruerit desierit, exterge lana, & nucū amararū succū infunde, lanāq; obtura. Ceterū quibus ob maximū ad audiendum facilitatē id genus sonitus sunt, castoreum & cicuræ semen cum aceto trita instilla.

Ad auditus grauiteratem.

In surditatibus, qui exiguas quidem voces omnino non audiunt, magnas autē vix percipiunt, hoc ipsum symptoma valde suspectū habere oportet: paulatim namq; temporis progressu augescens, perfectā surditatē inducit. Quapropter per hieram purgandi sunt, & per catapotia ex colocythide: pituitaq; eis per apoplegmatis morbus detrahenda, & caput resiccandum est, eiūq; ut robur addatur, omni studio curandum. Vitendum etiā attenuatoria victus ratione. At in ipsam aurem pharmaca iniicienda sunt, quæ crassos visci dōq; humores cōmuniunt, & disscent. Cuiusmodi existunt hæc, quæ Apollonius prodidit: Caprarū succo & resina oleo diluta, vitior. Aut oleo nucum & resina mistis pariter vitior. Vel adipem asineriū, & sel bubulum, ac lanrinū, ex æquo mista instillato. Porro surditati cōterariis præsidiū habent opus, illi qui aurium doloribus insistantur. Quippe in doloribus affectæ partes exquisitam quietem desiderant: surditati verò, vehemētē motū postulat, transmutationēq; in contrariam ei, quæ iam adeit, dispositionem.

Fomenta ad aurium dolorem ab

Apollonio scripta.

Fomentis porro vitendū est per spōgias aqua calida

Aurū verum eurytomidae.

Sonitum in aurib. causa.

Sonitum aurū per febrem, cum q̄si cōspicienda.

Sonitū auris ob exquisitam sensitivitate facili latens oritur, curatio per stupefacientia.

Sonitū auris remedia varia ab Archigene prodita.

Auditus grauiteratem curatio.

Aurium dolori fomenta.

Stupefacientibus quando cogimur uti medicamentis.

Aurium excrecentia videri medium.

Aurū sanguinem effunditum remedia.

calida imbutas, ac sufficienter expressas: itēq; per cucurbitas affixas. Amplius verò & per vaporem ex arundinis perforatis allatū. Oportet autem alteram arundinis oram, auriculæ cavitati adaptari: alteram verò in ollam perforatam habentem operculum, & vndiq; obruratū, incumbere. Sit autē in olla abstinium in aqua servefactum, quod vapor inde sublatu perferat ad auditorii meatum. Confert etenim hoc fomentum etiam auditui graui.

Archigenis ad surditatem remedia.

Chalbanū cum aceto & melle servefactum in stilla. Aut collyrio ex nitro, sicu, & sitapi immisso, per triduum id non extrahimus. Postea verò assiduis acutisq; vocibus, & vicissim grauib; indamamus: & per tubam sonitu incusso, conamur malum depellere. Post hæc & asphodeli radices oleo veteri incoctas, commodè infundimus, caprināq; asinudē elauimus vitra.

Eiusdē de corpufculis quæ auribus illabunt.

Quod si aqua illabatur aurē, auxiliatur aceti, & cum altero pede, qui responderet affectu auri, exulire, alioqualiter se ipsum inclinando: hoc enim modo facit excernitur. Quin & exvitis simplex per os, aut etiā per stipulā, egregiè aquam extrahit. Si verò calculus, aut faba, aut cōsimile quid in auditorii meatum illapsum fuerit, eluito: aut lana circa auricularii specillum obvolvatur, & resina tinctā, extrahito. Idem & per glutinosum aliquod pharvacum fieri potest. Quod si neque sic sequatur, sternutatorio in nares injecto, os ac nares obruat. Facta namque spiritus infulsi extensione, id quod est illapsum, efflabitur: idq; assidue, donec excidat, facito. Nam si intus manferit, aure iussimata convulsionem inducet. Optime etiam confert ad eorum quæ illapsa sunt eiectionem, cōcusio. Si itaq; puer fuerit, pede comprehensum, & in caput sublatum, concutiens ipsum, vibrabit. Si verò perfectæ ætatis quispiam ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundum affectum aurem reclinatū, caput ad tabulam firmat iubeto: dein lenata tabulæ iuxta caput parte, deferri sinito, idq; sæpius facito. Monebit enim sic quod incidit, & ad expeditores meatus partes progredietur. Arque ita angusta & concaua specilli parte immissa, scitè extrahito. Si verò faba, aut cōsimile quippiam in aurem illapsum, in ea hæreat, madefactūq; & tumefactum dolores inferat, impossibile quidem est integrum ipsum eximere. Quare per specilli concavum diuidere id industriè expedit, argi ita particulatim extrahere: deinde sapam, aut vinum dulce calidum infundere, ac lenire meatum ex laciniatione oblatum. At verò si animal aliquod sit illapsum, scammoni aceto dilutum, aut abstinij, aut peucedani succum, nitrūq; ac sulphur, cum radicali succo instillato.

De parotidibus.

Parotides ē genere quidem inflammationum existunt. Fiunt autem, glandulis secundum aures affectis. Cæteri prima parte curationis parium inflammatarū in eis minimè vitmur. In illis siquidē plurimum curatione reprimente, repulsoriāq; uti veniat, præcipuè cū nec malignum sit, nec multum quod insit: nec vniuer-

sūm corpus plethoricum. Sic namq; spongia sola ex posca imposita, incipientes inflammationes repressit. Verū in parotidibus contrariam curationē molimur, nepe pharmaca attractoria adhibētes: & si hæc nihil memorabile efficiant, etiā cucurbitulas affigentes, aut fomenta assidua adhibentes, conantesq; vi infestans humor ad cutim ipsam trahatur, præsertim si affectio in capite hæreat. Similiter cum natura per acutas febres, redvndantes humores ex vasīs ad regionē inter cutem & subiecta corpora pellit, quandoquidem illis enām glandulæ imbuuntur, multo satius videtur tunc opitulari naturæ, febres per se abscessus curant. Verū si vehemētī impetu insuant humores, nihil nos curiosius agētes, omnia permittemus naturæ. Nam siue cucurbitulæ, siue aliud pharmacū humores ex alto eliciēs, ad-mouerimus, vehemēs dolor isominiē apprehēdit, vnde & vigilie & febres oriuntur, atq; exol-uuntur vires. Mitigare itaq; tunc, & non influ-xum provehere, oportet, per cataplasmatū maxi-mē lenientiū vsum: cuiusmodi est quod ex fru-menti, aut hordei, aut seminis lini farina, cum mulsā, aut fœnigræci, aut altheæ, aut chamæme-lorum decocto conficitur: & quæcumq; nō mo-dò humectam habent caliditatē, per quam mī-gare dolores valent, sed etiā influentes succos possunt cōcoquere, suppurrarēq;. Quod si etiā sanguis redvndare videatur, per venæ ipsū sec-tionē vacuabimus, præsertim si liccat per vires.

Ergo si humor non discutatur, suppurrantibus pharmacis est vrendū: cuiusmodi est frumenti fa-rina cum oleo & caricarū decocto item quod ex polline & fermento constat pharmacum. At si suppurrata fuerint parotides, tunc aut per sectio-nem pus elicere oportet, aut per pharmacū ab-scessum rumpere, quale est Smilii vocatū, & qd ex alliiis constat: aut tentare, vt ipsum per attra-ctoria & tenuitū medicamentū discutiāmus, bis in die iisdē ablatis, & fomentis admoris, donec dolores remiserint. Vbi verò iam plurimū puris discussum fuerit, tunc iam primū semel solue-re ea medicamentis, & fomenta adhibere oportet: dein verò neque ex re est id facere, sed ipsa pharmacis permittere, vt si quid reliquū in pro-fundo hæreat, ipsum discutiant. Quod si duri-ties adsit, ea ipsa quoq; mollienda est, emollien-tibus medicamentis ad attractoria admistis.

Archigenis ad parotidas.

Rumicis radices in vino tenuiū partium coctas, applicabis parotidibus circa vehementem dolorem ortis. Aut buccina marina, aut purpura vitas, melle aut axungia exceptas imposito. Aut sicū aqua marina muria ve incoctā, ad-moue: aut lanū etiā butyro imbutū. Cōmendat etiā vsum plētiginis, tamen ex multis facultatibus, disculforia nempe & repulsoria constat. Ego ve-rò nunquam pharmaca ad parotidas definitatis repulsoria admisceri opere precium existimo, ni-si forte aliquando pauxillū repulsorij multo dis-cussio addatur: idq; vbi circa vehementē do-lore ipsæ irruunt parotides.

Aliud Archigenis ad discutendās parotidas.

Lupinorū amarorū farinam cum melle coctā, modica calce viua addita, pro carapinimate im-

Parotidū medi-catio.

Natura impetu quando mi-nime sit inuac-da.

Cataplasma dolori leniens.

Suppuratio quid sit quib; modis curari solent.

Parotidū vna remedia ab Archigeni pro-ducta.

Namq; constat ex facultatibus disculforia si-mul et repulsoria.

Repulsoria quando vti en-da medicamen-ta parotidum.

Surditas re-mediā ab Archigeni scripta.

In auri illapsa corpora quo modo ab eis extrahenda.

Parotidis est glandulari inflammatione.

Inflammatio nem incipit in cutis.

ponito. Aliud. Picis brutæ, manne thuris, vtriusq; drach. ij. terebinthine, palmularū Syriacum non vetustas, pinguium, carnis puræ, vtriusq; drach. ij. omnibus simul vnus vitior.

Aliud. Caricari, chabani, nitri, sing. drach. ij. sulfuris teritiam vnus drachme partē: terebinthine, opopanaxij, vtriusq; paululum: simul vnus vitior. Quod si medicamentis parotis nō cedat, Archigenes consilium esse coniugendū ad cucurbitulam, adhibita scarificatione. Porro simplices parotidas curant, emplastrū Maaseæ, & quod ex succia cōstat, & quod ex pitfana. Hæc molliora adhuc sunt, ceræ forma, tum ex butyro, tum ex æscopo consistata, ostreis, aut buccinis, aut purpuri vitis additis, adipēq; porcino salis experte, lingulis quadrantis pondere. Sic ipsum etiam licet conficere: Butyri vnc. j. ceræ vnc. ij. s. ostreorū vitiorū, redactiorūq; in pollinē, vnc. ij. Cōficio & vitior: efficacissimū namq; est ad parotidas. De affectibus narium.

Polypodes. Ex genere tumorū præter naturā polypodes in nariibus generantur, vt osænis ex genere vicerum. Secundū genus aut excretionum præter naturam, sanguinis effusiones contingunt in morbis acutis. Primū itaq; de osænis sermonem faciam, quæ ex luminum acrimia, putrilaginosiorūq; influxu gignuntur: nam si q̄ duntaxat sint acres, egre curabilia vlcera inducūt, graueolentia vero non item. Ceterū cura cōmunis tum his ambobus, tum etiam polypo est, primū ca put siccare, corroborareq; cum palām sit obredundantiam vnosiorū humorum, fieri ab eo in ipsas nares defluxum. Capite roborato, nariibus adhibenda curatio est, scopo in osænis propoli, vt affecta pars per mixta facultatis pharmaca tum repellentia, tum discutientia, excitet. Repellent itaq; tum austera, tum acerbā, quæ cōmūnem astringētum appellatōne fortiantur. Discutiant calidam & siccam vim obtingentia.

Archigenis remedia ad osænas.

Obline eoa chalcide, vel atramento sutorio, vel psorico, ex melle tritis. Vel iridem & sandaracham cum melle illinito.

De polypo narium.

Polypus tumor est qui præter naturā in nariibus generatur, polypodis carni assimilis. Quæ affectio ex crasis & viscidis humoribus gignitur, ob idq; multa medicamentorū materia indiget, quæ partim astringat, partim secet & teneat, partim etiam discutiat, condensetq;.

Asclepiadia ad osænas remedium.

Aluminis scilicet drach. ij. myrrhe, sandarachæ sing. drach. iij. gallæ drach. j. æris vñ tanrundē. Tritis vtere, nariibus prius vino odorato elotis, & pharmaco per specilli extremum admoto.

Lamponis ad osænas, ægilopas, polypos, & quæcūq; velis citra sectionem, vñtionē ve extirpare, remedium. Scobis æris rubri vnc. j. salis ammoniaci sextantē: ammoniaci thymiamatis tanrundē: aluminis rotūdi quadrantē: aceri acer rimi heminas sex. Arida terito, & assulo aceto, omoia in vas æris rubri cōficio, in edq; ad solem sub ardore Canicæ cum rubri æris radio agitato, donec exarefat pharmacum: quod postea in mortariū translatur, diligēter terito, in si cūlig

recidito. Vñ verō exigente, aquam sorbendam dato, quæ vt ore continet, præcapito: dein phatmacum per fistulam infundato, vel etiam melle exceptum immisero. Ceterum post huiusmodi pharmacorū adhibitionem, etiam stemmatosis vñmur, quō videlicet testatoria vlcera obduela excutiamus, quæ tribus aut quatuor diebus ferē excidere consueuerūt. Vbi verō exciderint, adipe asferino, ac butyro cum cerato curantur.

Porro ipse in osænis polypis pyramentalissimū pharmacū reperi succū ex malis punicis tum dulcibus, tum austreis, acidisq; & maturis & integris, pariq; magnitudine & numero maceratis, expressum. Ceterū si humectior esse polypus videtur, plus ex austreis melle est cōtundendum. At ex aridis pharmacis, diphyre cetera mordacitatem aliquando per multū tempus consumptū polypum noui. Probatum etiam prædictū ex mēlorum succis colligium, si vbi exaruerit, redigatur in pollinem, indēq; ex vñfiter, aut etiam per specilli nucleum indatur. Omnia autē hæc assidue facere oportet, vt nunq; ab austera parte absit pharmacū, cum facili ab hominē ditare eluatur.

Iam verō rose sicce cōtruf, inditūq; in vas quī molli carne sunt præditi, citra noxam curare aliquando solent polypos. Nam pleraq; eorū quæ polypodas exterunt, eos exacerbant, si quando ab scopo aberrant. Ceterū vlcera in nariū meandubus semper per passillos curant. Androniū videlicet, & Pasonia, & Polyde, & Bithynum, & per eum quem ipse composui. In diuite verō quopiam, qui odoratum pharmacum exigebat, hedychoi vñ vñm excogitauit, ipsūq; Falerno veteri dilui, & mīrum quā breui affectio ipsa est curata.

Heracleidæ ad sanguinis ē nariibus erupciones remedia.

Vbi grumos sanguinis eduxeris, lanam specillo edvoluito, eāq; in lycio aqua diluto imbuta, & sanguine manantē locum illinito. Aut linamētrū ex elychinio contortū, madidatūq; aqua, & chalcididis polline inspersū inferito. Aut menthū tritam indito. Luvat etiam frontē spongiæ refrigerare, extremāq; vinculo excipere, quæ parte magia cōtracta videntur: obturaretq; aures, & os plantalis aqua & frigidis opplere.

Asclepiadis remedia ad sanguinis effusionem ē nariibus.

Spongiæ cruda pice imbutā, & linamento exoptē indito. Aliud. Puraminis oui, & galli omphacitidis, vtriusq; partē vnam. Trita linamētro intorto, aqua aut aceto madefacta, excipito, inditōq;.

Andromachi ischiron.

Chalcididis drac. c. chalcithi drac. c. misyos affati drac. xlv. æris vñ drach. xij. & s. tritis vtere.

GALENI PERGAMENTI
de compositione medicamentorū secundum loca, lib. IIII.

DE oculorū affectibus, oculariisq; medicamentis, agere in presenti cōmentario est cōfiliū. Pompholyx igit lora nulli pharmacorū mordacitatis expertū inferior est: atq; ob id ea vñmur ad tenues & acres oculorum fluxiones, sed vacuato prius capite & vniuerso corpore,

Escharæ ingenuit maribus, excutidas per antistoria esse.

Panicorum succum ad osænas polypis, maaseæ emplastrum ad cucurbitulam.

Referū polypum in quibus cura per polypos faciat.

Narū vlcera quibus medicamenta curant.

Sanguinis ē nariibus erupcionem remedia.

Pompholyx ex prima q̄ medicamentis oculorum fluxionibus.

Ozæna ē quibus gignantur humores.

Ozæna atq; polypo cōmūnis curatio.

Repellētia quæ.

Discutientia quæ. Ozænarum remedia.

Polypi dūctio, prius, causa, remedia.

Ozænarum remedia varia.

port. At vacuum quidem corpus veng sectione, purgationeque caput autem per apoplegma tismo a viudicamus a pituita. Potest tamen pompholyx lora, quemadmodum etiam spodium, atq amyllum, simul & moderate resiccare humores similis ne per tuniculas evacuetur ea que in magnis oculorum venis superflua humiditas continet, prohibere. Quare si quis prius q caput ab humoribus ad oculos defluentibus purget, vitatur obturamentibus pharmacis, vehementes dolores ob tunicas distenta inducet, & ob multitudinem influentiu humoru, aliquando ipsaru rupturam aut erosionem pariet. Eiusdem generis cum predictis pharmacis subtenus ouorum liquor existit, abunde valens humiditates oculoru abluere, & exasperata lenire: obturandi autem tenuis meatus non parè illis facultati fortis, siue nec simile vim resicandi. At sanguinei succus, qd ad viscositate attinet, similis est ouoru albugini: diffusioriam tamen possidet facultatem, & moderate calfacioriam: ob idq multos dolores mitigare cõuenit. Maxime predictis cõtrarij secundum genus existunt liquores acres, vt Cyrenaicus, Medicus, ac tum sagapenum, tum euphorbium, omnemq breuiter, qui circa exasperatione calfaciunt vehementer. Forti autè facultate sunt prædita extergentia medicamentà, cuiusmodi est æris squama, chalcitis vitæ, ær vitis, flos æris, misy, flos, atq stibium. Hæc adhuc aliud genus adiacet, erodeum videlicet, siue putrefaciens nam: quale est auripigmentum, & sandaracha, & Asia petre flos: cuius facultatis misy etiam paululum particeps est. Hæc aliud genus pharmacorum, quod in oculares cõpositiones iniicitur, eorum videlicet que natura astringunt. Quæ igitur medicorum hanc vim habent, influxus repellunt: quæ verò vehementer, ampliore dolore insilunt, tunicas exasperando, q iuuent inflexionu impetu repellendo. Porro quæ mediocriter astringunt, lippitudinibus cõmodissima existunt: conserunt autem & reliquis ferè omnibus affectionibus vicerum, pustulari atq fluxionum. Sunt verò huiusmodi, folia rosarum, & flores, & succus: erice fructu, spica nardi, malabathri foliis, crocus, lycium, & hypocistis. Vehementiorè his astringendi vim acacia & omphacium habent, quæ & ipsa in succorum genere numerantur. Ba laustiu etiam, & cynui, & gallicæ omphacindes, ex genere eorum sunt quæ multum astringunt, lippemationes & alias affectiones concoquunt, myrrha, crocus, castorium, thus, & cremor fennigræ decocti: quæ etiam diffusoria facultate sunt prædita, & presertim ex ipsa myrrha. Hæc itaq sylvæ ocularium medicamentoru existunt. Porro quæ medicamenta substantia terrestri sunt, circa manifestè calorem aut frigura, ea emplastica nominantur, vim habentia contrariam ipsi, quæ ab obstructione liberant: quali facultate insilunt famis ather, pompholyx lora, eidemq cinia elorus, atq etiam cadmia tum vitæ, tum lora, cui deterfori etiã uñhil inest. Pompholygi verò & spodio parè quid inest astringens, quem admodum etiam plumbio post exvionè. Nam & hoc pharmacum omnia mordacitatis est expers, parum tamen quid astrictiois sortitur.

Amylum etiam exactè lorum, q mitissimè est, & medium, vt nec astrictio nem nec acedinem habet: hoc est, nec calorem, nec frigus. Quin & ex ruffa lora proxime accedit ad facultate plumbi vitæ atq siori: manifestè tamè astringit: amyllum autem & similia atq, quatenus ex gustu & odore licet colligere, sunt penitus qualitatis expertes. Igitur vniuersum huiusmodi pharmacorum genus, siue modicè in gustu aut odore qualitatis exhibeat, siue penitus nullis ostendat, veluti atque purissimè, experta qualitatis vocatè moderatèq solè terrestrè substantiis secundum propriam naturam siccat. Ac siue sola hæc medicamentà cõueniant in erosionibus cornæ tunicæ, ipsiusq ita goldia prolapsibus, ob influxu tenuis atq mordacium humorum orta: cum nimis astringentia colubænt effluere humores, atq ob id dolorem ex mordacitate ipsorum ortum intendat: acia verò affectionem simul adaugent. In vniuersum tamen ipsi particule affectu, quod facilius curationem recipiat, prospiciamus, tum vniuersi corporis purgationibus, tum reuulsionibus: primum quidem ad infernam corporis partem: dein etiam ad occiput, & ad capitis cutem. Vnum eni sectionibus arteriarum, interdum quidem incidentes eas quæ retro caput iuxta aures sunt exporrectæ: interdum autè earum partem, quæ temporebus inest: idque vt mediam dispositioni, quæ tunicis oculorum est genitoræ, ob quæ eni oprimus sanguis ad tunicas ipsas delatus corrumpitur. Ad hæc igitur solas dispositiones conuenire videtur predictorum medicamentorum genera, circa mordacitatem exicantes in affectu parte cacochymia, à qua id quod insiluit corrumpitur. Vocant autè collyria quæ ex eiusmodi medicamentis cõstant, tum Libiani, tum Cygninæ: nempe ob candorem, qualem cygni possident. Prævalet quippe in ipsis amyllum, & terra samia, & crussa Rhodia, quæ præstantior est & candidior. Sunt qui collyria id genus in conbus terant, lacte boni succi ex nuncia vberibus infusillato: vt astrictoriam vim quæ ouillo inest, effugiant. Etenim cum in lacte serosa quedam exteriorisq facultas insit, eius visis congruens est ad propositam curatione: quippe vlcera explenda, extergentibus circa acrimonia habent opus medicamentis. Quod si huiusmodi haberi lac nequeat, per fennigræ decocti terere collyria præstiterit, vtpote quod exteriori quandã vim habet, quæ oua omnino sunt destituta.

De aspritudinibus palpebrarum.

Cum ægrè curabiles prædictæ dispositiones existant, adhuc earum difficultatem adaugent palpebrarum asperitates: à quibus etiam in lippitudinibus, tunicæ oculoru commorfa, assignatur dolore. In illis tamen ademus ad pharmaca in lippemationi cõgruentia, nonnihil ex detergentibus immiscere: veluti est collythi ex vino, aspritudinibus accommodatissimè, quod primum ex quæ ad palpebras succreuerit, deprimatur. Nam vbi oculi minus instantur inflammatione, ea quæ aspredines expurgare possunt, administramus. Ad dum cornea exvicerata est cum mordaci inflexione, impossibile est tali aliquo vti pharmaco. Cornea siquidem ipsa amplius exasperabi-

Oculorū flauis
nibus cur non
sint aduocan-
da obstruentia
pharmacis ex
se capitis re-
siccationem.
Albunum aut,

Famigra deo
est fuitio.

Exurgit me-
dicamenta que
sint.

Putrefaciens
medicamen-
ta.

Lippitudinis
remou, quæ a-
stringit medi-
cine.

Astringentia
rebuant que
sint.

Ocularia me-
dicamenta.

Emplastica me-
dicamenta que
sint, a dictis
sunt,

Amylum.

Aqua purissi-
ma sunt quali-
tatem experta.

Cornæ tunicæ
morsa, quæ medi-
camentis expo-
nuntur.

Arteria fere
aut, et tempo-
rè, quando in
oculo sunt.

Collyria Libi-
ani & Cygni.

Collyria lauo-
gandis modum.

Lactis mulie-
bris vñu cõmo-
ditum vlceri-
bus corneæ exi-
sit.

Fennigræ deco-
ctum.

Collyrium ex
vino.

Aspritudinis palpebrarum morbus.
 tur: Vicia verò impensius procider, hominemque
 vehementer dolor corripit, augebiturque ipsius inflammationis malignitas. In huiusmodi itaque adfectione miscella, solum medicum, prae ipsius consilio, palpebras ipsas revertere, atque absque medicamentis purgare, idemque specilli conatui, tum molli spongia. Quidam ex præceptoribus meis, ex punice laugato, cum tragacantha aut gummi, collyrium faciebant, eoque ab externis atque reversis palpebris, aspritudines deradebant. Vbi verò tempore progressu per prædicta collyria fluxu fuerit sedata, audemus tunc iam ea quae palpebras extergunt, paulatim adhibere medicamenta: quæ admodum ubi fluxus omnino fuerit iam resecata, & palpebra moderate habuerint, caua vicia sunt collyrio ex thure complenda.

De lippitudine, siue ophtalmia.

Lippitudo. Ophtalmia est inflammatio periclyti membranae, quam etiam agnatam vocant, quod aliis, quæ oculum ipsum constituunt, tunicis forinsecus agnoscatur, ligamentum existens toti oculo, ad circumscripta ossa. Ob id enim omnia quæ circa oculos sita sunt, usque ad malas quandoque simul per vehementem lippitudinem intumescunt. Igitur pharmacorum omnia huiusmodi affectionem curantia, ex genere eorum sunt quæ medentur inflammationibus: assumunt tamen necessaria nonnulli, pro ipsius partis natura, quæ ex cellentem mollium, atque eximiam quandam superat omnem totius corporis cutem, ad patiendum facilitatem est nata, ob sensum subtilitatem, ac raritatem substantiæ. Adhibenda itaque sunt pharmacorum repellentia, minimè tamen exasperantia, hoc est, non vehementem asprictionem sortita: sed quæ tum propria sua substantia moderatiora sint, tum lenitui liquoris admixtione adhuc magis talia reddantur. Voco autem leniores liquores, oui candidum, & senigræ decoctum, magisque adhuc ipsum lac. Vt plurimum verò albumen oui cum accommodatis pharmacis lippitudines curare sufficit, per collyria videlicet vocata monohemera, hoc est, diaria. Saepè siquidem magnas inflammationes, hæc adeo mitigauerunt, ut in vespere quidem homo balneo vteretur: in sequenti verò die, nardino collyrio ad instauracionem & corroboracionem iningeretur. Admiscere autem ei circa primam inuentionem minimum quiddam acrum & sistendum medicamento oportet: ut circa secundam paulò amplius quiddam priore. Sufficiunt namque hæc pharmacorum adhibiciones, & desubariuncula aliqua non multa ante balneum. Foveri tamen oculi per spongiam debent ex melilone & senigræ decocto, semel quidè aut bis in die, si medicamentis sit dolor: saepius autem, si vehementior.

De viceribus oculorum.

Oculorum vicia, quæ a medicamento possunt.
 Oculorum vicia eandem secundum genus rationem requirunt, quæ reliqua omnia: ob ipsius tamen partis naturam, ælimissima eis adhibenda sunt, quale est, quod ex lora pompholyge consistat. Admiscetur ipsis etiam succi quidam non solum mordacitatis expertes, sed qui etiam vehementissimos mingere dolores possint, vellem mandragoræ succus. Quidam etiam polygoni succum miscuerunt, ut alij ipsorum onorum

candidum. Quæ omnia, dum tempus vren di instat, miscenda sunt, propterea quod facile accensum quo tempore etiam rosarium additur succus. Eorum autem omnium esse debet scopus, ut vicia mundum seruentur: utpote partium natura ipsum replente, atque ad cicatricem ducente. Si itaque inflammatio adhuc oculis virget, aut quispian etiam dolor, collyria ex thure, & metallicis lora, & succis mordacitatis expertibus, adhibenda sunt. Vbi verò fordida reddita ob eos vsum vlcera fuerint, ex repurgantibus quappiam miscendum est: quale existit Paccianum crocum, ex vino: quod etiam aspritudines exterit, pterygia attenuat. At verò vlcera quæ per erosionem tunice corneæ sunt, ita vt aliquid ex ipsa rhagoide procidat, repellentibus & astringentibus pharmacis opus habent. Discussoria autem possulant tum pustule, tum pus intra rhagoide contentum. Recentia igitur & adhuc iniuncta, pharmacis ex myrrha, thure, & croco sedantur. Vetusiora autem, nonnulli ex discussoriis desiderant, quemadmodum etiam indurata tunicarum inflammationes.

De oculiarum pharmacorum viribus.

Oculari vici causa vicia.
 Igitur omnimodæ acrimonie sunt expertes hi tres liquores, senigræ decoctum, lac, & candidum oui: ex quorum genere existimare oportet tum gummi, tum tragacanthiam. Quippe nisi prædicta illa tria, tum copia, tum vsum, prompta & expedita essent, possemus vix parum gummi, aut tragacanthiam in multa aqua maceratum, in eundem vsum velvni illa assumere: & per ipsa etiam in medica cote collyria terre: & per sola infusa, serofos in affectis oculis generatos humores eluere. Oculari itaque pharmacorum vnum genus in illis tribus liquoribus, atque etiam in tragacanthia, gummi, metallicisque eloris consistit. Alterum verò genus eorum sit, quæ medicam mordacitatem sortiuntur, propterea quod quædam eis sunt admixta, quæ parum astringunt detergiunt: qualia sunt, rosæ, & thus: ille quidem, pauculam asprictionem: thus verò modicam extergendi vim possidentes. Habet tamen ob moderatum calorem thus etiam & concoctiorum quid, ac doloris mitigatorium. Ex eodem genere cum ipso, quantum ad concoctionem & discussionem attinet, censendus est crocus & myrrha: quæ inter se in eo differunt, quod crocus quidem moderate astringat: myrrha verò circa asprictionem non insistentem discussat, & reficet humiditates. Suntque hæc viribus præstantiora thure, & ob id etiam maiorem discutendi vim habent: cum autem careant vi detergendi, ad vlcium curationem thure inferiora existunt. Huius generis medicamentorum, concoctiorum inquam & discussorum, lycium quoque est, & castorium. Sarco colla etiam concoctiorum & discussorum medicamentum existit: ac magis quàm ipsa, chalbanum. Melilone verò decoctum ad concoctiorum facultatem assumptum etiam quid asprictorium, eiusdem ferè generis cum croco existens. Inuenitur etiam in oculares compositiones lapis hamarites vocatus, humores reficandi vim habens, velvni & cadmia. Mitius tamen pharmacum lapis ipse quàm cadmia existit, utpote ex humida substantia,

Oculari vici causa vicia.

Concomitantia.

Oculari vici causa vicia.

Thus doloris causam, concomitantia.

Crocus modeste asprictorium, Myrrha circa asprictionem discutit, possidet.

Lycium, Castorium, Sarco colla, Chalbanum, Melilone decoctum.

Lapis hamarites.

Cadmia, stantia,

stantia, non terrestri, veluti cadmia, generatione indeptus. Huius similis est lapis Schistus dictus, sed fortiorum obtinet facultate. Quod vero stilum vocatur, illius quidem, fortem astringendi facultatem ostentat: lotum autem, exsoluitur, ut propè ad vim mordacitatis expertum accedat. At res vitum vehementem extergedi possidet facultatem, itemq; squama eius, & flos. Nec minus efficax, sed minus mordacitatis experta, chalcitis vita est. Quod si lauentur talia pharmaca, exteriora quidem adline manent: tanto tamen imbecilliora, quantum amiserunt mordacitatis. Huius generis sunt etiam misy, & ærugo, fortissima pharmaca, iis quæ scylosi & callis conveniunt, admista. Sunt qui etiam gallas admisceant, vehementer astringens pharmacum: sunt qui etiam chalcanthum, quod vni cum acredine vehementissimè astringit. Moderatus tamè redditur vitum, & lotum. Ad hanc sylvam pertinet & stomomans squama. At thuris cortex, astringit quidem & ipse admodum, prædictis tamen est longè inferior. Porro mâna thuris à thure ipso differt, quod exiguum quid astrictionis sortitur, ratione corticis thuris, cuius non nihil contrahit. Quæcunque igitur ex astringentibus multam terram compagem habent, asperitudines, & scylos, & callos consumunt. Cæterum quæ ex succorum genere sunt, veluti omphaciū, & hypocitis, eluunt faciliè in sublimationibus, disfluencia simul cum lachrymis. Ex hoc genere est glaucium, & acacia. Citra mordacitatem verò ex terget ceruicorni vitum, veluti etiam caprinū: non tamen dolorem sedant, nec concoctoria facultate sunt prædita, vt thus, frigidi nimirum & siccæ temperamenti existētia. Mixtæ facultatis est aloë, quemadmodum rosā. Habet enim quod extergere est narum, aliquid in æ amarum: sicvri & astringentium quippiam, vt & cômittat, & ad cicatricem perducit.

Quæ ad scabras affectiones conveniant.

Ex iis quæ ad scabras palpebrarum affectiones cōveniunt, sunt sales ammoniaci, & lapis Asius, tum ipse, tum eius flos: & quod pforicū appellatur, nō simplex, neq; sponte natum, sed præ paranonis modum indeptum. Admisceatur is & misy vitum, & sandaracha, & arsenicum. Ex medicamentis verò aromaticis, cāsa, malabathi folium, & ammonium, cinnamomūmq;.

Quæ in duratis auxiliantur.

Compositiones quæ ad induratos oculos tunicas congruunt, ex succis constant, & ammoniaci thymamate. Misceantur autē eis myrrha, thus, thibianum, & consimilia.

Quæ suffusis medeantur.

Ad suffusos habetur compositū medicamentū, ex succo fœniculi, hyænz felle, ac melle Amico constants: cui nonnulli capillum fel addiderunt. Nunc autē in præcio habetur pharmacum ex felle scærorū compositū: sicvri & quod ex myrrha facte consistitur: quorum omnium promissa magna, effectus autem interdum nullus.

Pharmacum aridum ad tuendam oculorum valetudinem à me compositum.

Lapidus phrygiæ ter viti, tonicis extincti: sed prima quidem extinctione, butyro: secunda, vi-

no odorato: tertia Amico melle, ad ipsum extingendum, insecto lib. j. æris viti, pipæris albi, folij malabathi, sing. vnc. j. stibij drach. xij. Postquam vero omnia fuerint læuigata, & reponeret medicamentum velis, adice opobalsamū Syriaci vnc. j. s. Porro vitis ipsius ad solas palpebras compeit cum specillo inducti, citra tunicarum ipsius oculi contractum.

Andum ad circumferos oculorū angulos ab Asclepiade scriptum.

Spodij Cyprij drach. iij. omphacii aridi drachmas ij. nardi obolo. tres: pipæris fricti grana xv. trinis vtere.

Pharmacū callibepharon, exortandis palpebris accōmodatū. Facit & ad lippitudines inveteratas. Stibij viti ac vino extincti drach. xij. plumbi viti & loti drac. viij. fuliginis thuris, spicæ nardi, myrris torrefactæ, croci, squamæ æris, sing. drach. j. omnibus trinis ac repositis vitior.

Andum Philoxeni ad prunginosos & circumferos angulos. Facit & ad obtusum vitum. Cadmiz drach. iij. sales ammoniaci drach. ij. pipæris albi drach. j. tritis & læuigatis vitior.

Liquide oculares compositiones ad omnē extaberantiam carnis tollendam, & ad incipientem lippitudinem.

Cōpositio qua vitus Philippus est in Cæsaria. Misyos assan drach. viij. myrriz drach. iij. cadmiz drach. viij. croci drach. ij. sales ammoniaci tantum dem: nardi indicæ, pipæris albi, vtriusque drach. j. mellis Amici cytharum vnam. Misce.

Panchreos Erasistrati ad lippitudines omnes, & ad purulentes aures.

Æris viti, myrriz, sing. drach. j. pipæris obolos ij. misyos totidi drach. j. croci obolos ij. vini Chij heminam j. palci cretici heminæ dimidia. Coquantur ad lentum ignem, vt decet.

Philoxeni liquida exacuens vitum, ac cicatrices & callos extergens.

Ammoniaci thym. drach. iij. æruginis drac. ij. vino dulci, & contrita, melle Amico excipito: Compositio Largi exacuens vitum.

Succi radicis fœniculi partē vni: mellis tantū dem. Misce. Alia. Succi radicis fœniculi, succi chelidoniz, mellis Arici, sing. drach. j. Misce.

Ad tingendas albiginas.

Gallam tritam per specilli nucleū calfactū imposito: dein chalcanthū aqua dulci admovent. Ad glaucos oculos, quod pupillæ turgē reddantur.

Mallcorij dulcis succum infundito: dein post temporis intervallū hyoscyami sorem cum vitio tritum instillato.

Ad paruos instar hordei oblongos circa pilos palpebrarum abscissos. Chlaba partem vnam cum modico nitro mixtam imposito.

Cataplasma Heraclidis Tarentini ad vehementes oculorum dolores.

Rosarum viridium, aut siccatū drach. iij. croci drach. j. opij rantum dem: excipito melio ti decocto, aut passo, vitiorū. Aliud. Rosarū, violarum albarum, melilon, capitū papaveris, sing. drach. ij. croci, opij, myrriz, sing. drach. j. onit asati vitellum. Tritis & passo subactis vitior.

Ocularia mellis camita varia, à medicis vtriusq; conscripta.

Oculorū vtriusq; morbos dolores, sicut etiam cataplasma.

Schistus lapis. Scabrum.

Ans vitum. Aera squama. Stibij. Chalcitis vita. Lota vtriusq; imbecilliora.

Misy. Aærga. Gale.

Chalcanthum.

Stomomans squama. Thuri cortex. Et mâna.

Omphaciū. Hypocitis.

Glaucium. Acacia. Ceruicorni vitum.

Aloë facilius.

Scabris palpebris qua asperit medicamentis.

Induratis tunicis oculorū que conferant.

Suffusorum remedia.

Oculorū robora pharmaca.

Oculorum fluxionibus repellendis agglutinatum teritur pharmacum.

Agglutinatorium ad repellendas fluxiones ab oculis.

Pollinis, myrrhæ, mannæ thuris, singulorum drach. j. candido oui excipito, temporibusque & fronti admoeto.

Collyrium Moschionis, ad epiphoram, dolores, atque fluxiones congruens.

Glaucij drach. vj. sarcocollæ drach. viij. croci drach. iij. gummi drach. ij. tragacanthæ, succi mandragoræ, singul. drach. ij. opij drach. j. Aqua pluuiæ excipito, vitæroq.

Paccij sphragis.

Cadmiz vitæ, & lacte caprillo, siue muliebri, extingitæ ac lotæ, assiccantur in umbra, drach. x. et ris vitæ ac loti, ac acie, vtriufque drachmæ x. opij drach. vj. croci tantundem: gummi drach. xv. aqua pluuiæ excipiantur.

Collyriū ad acerbissimos oculorū dolores.

Cadmiz vitæ & lotæ, ac acie, sibiij vitæ & loti, aloës Indicæ, sing. drach. viij. croci, myrrhæ, opij, sing. drach. iij. gummi drach. viij. aqua excipe, vitæroq. ex ovo. Ego etiam pompholygis & thuris, vtriufque drach. iij. adieci.

Malabathrinum nostrum ad vexationes dolorum.

Cadmiz drach. xvj. acacie drach. xl. xris vitæ & loti drach. xij. opij, lycij Indici, malabathri, nardi Indicæ, castorei, croci, aloës, sing. drach. ij. myrrhæ drach. iij. cerussæ drach. viij. sibiij loti tantundem: gummi drach. xl. aqua excipito, & vitæro ex ovo in principio affectionis, & etiā in dedinatione, ubi panchrestum ab ipsa parte remoueris.

Collyriū albū tryphera dictum, ad modū lenē, ad epiphoras maximè congruens.

Cadmiz lotæ drach. xvj. cerussæ drach. viij. amyli, gummi, tragacanthæ, sing. drach. iij. opij drach. ij. aqua excipito, & cum ovo vitæro.

Cygnus inscriptus Reginz, ad maximos oculorum dolores.

Cadmiz drach. xvj. cerussæ lotæ drach. viij. amyli, tragaclithæ, ac acie, opij, sing. drach. ij. gummi drach. xij. excipe aqua pluuiæ, & dum vti voles, adieci candida ouorum quatuor recentium.

Aerianū pharmacū ad veteres ac recentē affectiones accommodatum.

Cerussæ drach. xxij. cadmiz vitæ & lotæ, sibiij vitæ & loti, thuris, singul. drach. x. squamæ xris drach. v. opij drach. iij. myrrhæ tantundem: gummi drach. xij. aqua pluuiæ exceptis, vt ere ex ovo.

Collyriū ex cornu ceruino, ad vlcera & pustulas, quod cicatrices extir.

Cornu ceruini vitæ & loti, thuris, plumbi vitæ, sing. drach. iij. squamæ xris lotæ drach. ij. opij drach. j. gummi drach. iij. excipe ex aqua pluuiæ.

Collyriū diarthodon, ad fluxiones atque dolores oculorum congruens.

Rosarū drach. c. croci drach. ij. opij, myrrhæ, sing. drach. viij. gummi drach. l. vino odorato excipito, vitæroq. ex ovo. Ego verò pro follis rosarum, tantundem earundem florum iniici, sellæroq. succedit.

Lyncus, ad affectiones callosas, ex aciem visum.

Cadmiz, xris vitæ & loti, ammoniaci thymiamatis, sing. drach. xij. myrrhæ drach. xvj. lapidis

hematitæ drach. vj. opij tantundem: aloës, fellis taurini, chalbani, sing. drach. iij. fruginis drach. j. opoponacis drach. iij. salis ammoniaci drach. ij. gummi drach. vj. Aqua omnia pluuiæ excipito.

Melinū Lucij præceptoris, ad scabros & corrosos angulos, intercos prurios, oculos humectos, omnemque hebetudinē visus, cicatrices etiā & callos externos. Cerussæ, croci, sing. drach. xxij. ammoniaci thymiamatis, salis ammoniaci, nardi Indicæ, opij, myrrhæ, omphacis, sing. drach. vj. gummi drach. xxij. Excipiuntur aqua pluuiæ.

Quæ Archigenes ad oculos affectos scripserit.

In fluxionibus oculorum primo cōuenit cibi atque potionis parcitas, aquæ potus, ac maximè rei venereæ abstinencia. Subducatur alius, & facies assidue primū multa frigida, dein oxycardā abluatur. Fugiant odores acres, & pulueres, fumusque, & tum solis, tum incernæ splendorem. Si augeat fluxio, dolōroq. accedat, cōfert etiam phlebotomia. Circa frontem porro & tempora conuenient medicamēta astringentia. At super oculos lana pura oui candido madafacta imponatur: aut oui alii luteum, aut mellotum in passo coctum. Omnia enim ex astringentium genere in principijs conferunt. Ad plagas illatas oculis facit columbinus sanguis instillatus, & præsertim is qui ex teneris penis exprimitur. Candidum etiam oui eodem modo in oculum instillatur, ac præterea lana exceptum, & superne impositū. Prodest etiam melolotum coctum cum vino, impositumque. Ad tumores ex plaga in oculis ortos valde cōuenit fomentum per mollem spongiā a ceto diluto madentem.

Ad palpebrarum deflusiū, xeruginis tritæ partem vnam, ammoniaci thymiamatis tantundem, trita imposito. Ad inuiles atque pungentes palpebrarū pilos. Vbi xruici fuerint, illino san guinem cimicum, & non renascit: aut chamæ leonem albam & tritam, cui viridum ranarum sanguis sit mistus, inungito. Olfuscationē omnem, incipientēque suffusionē, sanat sel omne, cum marrubij succo ac melle Attico. Ad pre rygia, Chalcantui, & salis ammoniaci æquales partes: gummi dimidium. cum a ceto in collyria formato, illinitorq.

GALENI PERGAMENTI

de compositione medicamentorū secundum loca, lib. V.

De suggillatione, quam Græci hypopion nominant.

Hypopion ex genere effusionum existit, estque affectio cutis ipsi oculo subditi; vbi cōtusis venis quæ in ea sunt, sanguis per fissuras effunditur: qui quidem nisi discutiatur citò, interdum progressu temporis liuescit & denigratur. Quare merito ad eius curationem statim venantur medici. Cæterum quoniam tunacula venarum, ex quibus sanguis exilit, rumpuntur, parum quiddam ex astringentibus ad discutiendā adfiscit. Vbi verò ad propriam naturam redierint venæ, tunc discutiendi solus vti admodum opportunū videtur: ex quibus tamē imbe-

Oculorum afflicto remedio ab Archigene scripta.

Oculorum plagis que opusculi in.

Hypopion, suggestio quod sit.

Suggillationis curatio.

Malabathrinum medicamentum ad vexationes dolorum.

Collyrium tryphera nomen habet.

Aerianū pharmacū afflicto oculorum accommodatum.

imbecilliora quidem in primis sunt adhibenda, fortiora vero inveterata & denigratis conveniunt. Ego igitur Nili collyrio dariodon, in oculariorum coticula ex aqua trito, partē fuggillatū ilano, ferule campanæ ac ſenigræci decocto prius pro fomento vſus: quo ipſo decocto, poſtea etiā collyriū diſſoluo: ac dein etiā ex ſolius ſenigræci decocto. Quod ſi quæpiā affectionis reliquis reſiſtēt, in ſenigræci decocto collyria ex myrrina diſſoluo, illinoq. Vbi vero aſſectus his remediis nō edit, collyriū ex ſandyce etiā cōmodo. Archigenis pharmaca ad ſuggillata.

Summē facit ad recētia & limida ſuggillata, ſpōgia munda immoſta, & aſiduē impoſita, ſubſtaq: poſtquam, fomentū ex aqua calida prodēt. Cataplaſmate autē vtere faba freſca cōtrita, abſinthio, hyſſopo, origano, raphani cortice, vna paſſa exacina, vnoquoq: per ſe cum melle, aut aceto, aut aqua. Minimē tamē rectē nihil videtur præcipere, vi indiſcriter vno aut alio vtanatur. Aqua quippe acrimoniæ omnis expertiſſima eſt. Mel autē vlcibus mordax, cutē laudatūq: offēdit: acetum verō vtriuſq: mordax eſt. Aliud. Aut fabam freſcam cōmanſam, cum melle impoſito. Etenim fabæ lomentū, etiam cetera manducationē cum melle ſubactū, liquida diſcutit. Ex manducatione autē, ſummē diſcuſſorium efficit, nimirū viribus à ſalua aſſumptis.

Aut ceuſe & lithargyri partes æquas cum melle terito, atq: admixta fabæ lomentū, etiam cetera manducationē, vtiſſimū. At hordeaceæ farinam cum aceto multo coctā impoſito. Aut tuiſ & thapſiæ æquis portionibus cum roſaceo cerato. Hæc Archigenes. Diſtū autē à nobis eſt, quod ex diſcuſſoris medicamētis in principio præſtiora ſunt, quæ modicē attritūq: vim poiſidēt: qualia ſunt roſæ, meliorū & croci. Apollonius autē ad inveterata ſuggillata, ari radicē ſaſam, mellēq: ſubſtā impoſitūq: cōmendat. At Crito bryoniæ radicē vitam cum melle, aut roſaceo cerato exceptā, inter remedia ſuggillatorū recēſcit.

Medicamēt Heræ cōſcriptū ad ſuggillata.

Succi cicutæ obolo ſ. croci drach. ſ. myrrhæ, acaciæ, ſing. drach. j. opij drach. ſ. ſucci thapſiæ, gummi tragacithæ, ſing. drac. j. cū aqua cogito. Tribus enim horis (vt inquit Heras) ſuggillata diſpungit. Ego verō nucē per artem iam oleaginofam effictam expertus ſum aliquando ad crauentatos facientem.

De xgilope.

Inter naſos & magnū oculi angulū, paruum noſſedam exiguo abſectū perſimile ruberculū naſcitur: quod iane ſepe in ipſum angulū cūmpitur, ægēq: curationē admittit, ni mature illi occurratur. Igitur mæcenſi oportet medicamentis quæ abſq: mordacitate diſcutiūt. Quippe cōficiuntur ab acnibus oculus, ac ſic inflammatio particule augetur.

Heræ ad xgilopas.

Malus folia cum ſale & melle trita impoſito. Alia etiā in aceto cocta, incipſi xgilopi opita iacur. Archigenis redia ad xgilopas.

Ægilopas eruo cum melle integimus, aut cinere viciis cum aceto ſubactū. Probē facit & thui cum recenti columbino ſtercore impoſitū,

In nouum foratū, ſaphidem ſylueſtrem, & ammoniacū thymiam cū melle veluti ſplenū, impoſito: aut alumē ſciſale cum terebinthina.

Si morbus his remediis nō cedat, diuſo angulo, oſſeq: nudato, cauteriū admove: ſic ſiquidem decedunt ſquamulæ, atq: ipſum malum curatur.

De variis.

Tumor parvus & durus in faciei cute oboriſ, varus Laninis, Græcis ionthos dictus, à craſſo cōcretus ſucco, oſtendēſq: merito ſuiſſimus curationē futurā per emollientia & diſcuſſoria pharmaca.

De ſciſis tumoribus.

Vna quædā hæc aſſectio eſt ex eo quæ in mento enaſcunt, diſſerens à variis in cō, quod nō ſolum craſſus ſit quæ tumores exarāt humor, ſed ſeroſa etiā tenuitate particiſe, ob quā exulcerantur citō, ſi nō, vt decet, curent: & ob id magis exiccantibus pharmaciis q̄ vari opus habet.

De liuenoſis in mento tumoribus.

Ethæc aſſectio ex mixto quoſpiā generatū humore, ſeroſis nimirū tenuiſſiq: acribus ſuccis cum craſſis mixtis: quapropter facile etiā in pſoram ac lepram tranſit: indiget quæ etiam ipſa pharmaciis fortiter exiccantib. Vbi verō in pſorā aut lepram tranſierit, vltra hoc quod reſiccantibus indiget, etiā repurgantiā & euerſoria deſiderat.

De menti eruptionibus.

Hoc eruptionum, ſue exanthematū nomen, quidam in cōmuni vſurpant ad aſſectionibus vlceroſis & aſperis in mento ſua ſponte oborientibus. Indiget verō & hæc ipſa aſſectio reſiccantibus medicamentis.

De furunculis.

Furunculi, Dothienes Græci vocati, ex ſimilibus humoribus, veluti vari, gignuntur, per vniuerſum corpus duplices exiſtentes: nonnulli quidem vtroſq: duri, & ægēq: concoctiles: aliqui verō inflammati in quibus aliquando febris cōſiſtunt, & tumor excreſcit in magnitudinē, & in pus tranſmutatur. Vnde curatio ipſorum vtrūſq: eadem quæ in inflammatione exiſtit.

Critonis ad vares remedia.

Mellis Attici, & acerrimi aceti, ſing. cyathum vnum miſceto, ipſiſq: vares illino, cum digito perſcificando. Vel ſmaras amygdalas aceto intrita, faciei illine. Aut alumem ſciſile probe læugatum terebinthina excipito, impoſitoq.

Ad vares caſioſos.

Saponis gallici drach. iij. ammoniaci thymiamans drach. j. thuris drach. j. aqua diſſoluo, & cerati ſpſiſſitudinem facito, eōq: illino, & poſt horæ interſtinum calida ablue imbeto.

Ad aſſectiones eminentiores, ac principium elephaniaſis.

Gummi albi, ſpumæ nitrī, thuris, ſulſuris vini, ſing. xquales partes aceto dilutas ac probe tritas, in paſtillos tedige, eōſq: in vmbra exicca: vſu verō expetere, aceto diluto illine: atq: vbi reſiccati fuerint, ſubſcripta compoſitione deterge. Saponis gallici li. j. ammoniaci thym. tantū dē thuris, maſſiſſicæ, ſpumæ nitrī, ſing. vnc. iij. Saponem & ammoniacū in ſiſtile vas coſecta, & aq: ſextantis duobus aſuſu, coquito: atq: vbi diſſoluta fuerint, arida conuſa atq: cribraia adſictio: deinde in mortariū trituſa, & pbe conquaſſata

Suggillati
pharmaca ab
Archigene
proſtita.

Lomentum fa-
becinæ.

Vari deſcriptio
& curatio.

Variſus tumor
à vno quomo-
do deſcribitur,
& qualis medica-
mentis poſſit curari.

Lichen à quo
liu gignatur,
hinc morbus,
qualis medica-
mentis deſideret.

Exanthematū
reſiccantibus me-
dicamentis vti
debet.

Furunculorū
ſpecies.

Suggillati me-
dicamēt ab He-
ra ſcriptum.

Vari remedia
ſcripta à Crito-
ne.

Ægilopi deſcri-
ptio et curatio.

Elephantiaſis
incipiūt me-
dicamentis
dignetur.

in vase vitreo reponito. Vſu verò poſtulanſe, faci-
ciem ex eo ſinegmate inquinato, et poſt modicū
reporu larga aqua molliſter perfricido abluito.

Eiſdē ad ſiſcoſas menti papularū eruptiones.

*Papulae in men-
te eruptionibus
medicanda eſt
guaiaca.*

Spumę argenti, miſyos crudi, æquas partes

tritās inſperge. Aliud. Atramenti ſutorij, ſul-

furis viui, ſing. drach. ij. æruginis drach. j. niri ru-

bri drach. ij. trita inſperge.

Andronis pharmacū ad idem accōmodarū.

Chalcithi, myrrhę, ſing. drach. ij. thuris, alumi-

nis ſciſi, ſin. drach. iij. malicorij, gallarū, anitho-

chig, ſing. drach. viij. vino auſtero exceptis vitior.

Citronis remedia ad lichenas.

Tritici grana multa imponito in incudem: de

inde laminā æris candentē tritico ſuperponito:

& reſolutū ab eo liquorē, calidū adhuc, auferro,

illinitōg. Auportulacę ſuccum aſidue illini

to. Quod ſi inueterat ſint lichenēs, capparīs fo-

līa trita cū aceto imponito. Aut corticē radicis

hortenſis rumicis, ſimiliter ex aceto tritam.

Paſtilli lichenici.

Glutinis fabrilis, chameleonis, ſing. drach.

iiij. ſulſuris viui, thuris, ſing. drach. ij. aceti hemi-

næ dimidium. Glutinum aceto diſſoluitur, de iis

aridis aſſunditur. Vſus reſore, quantū ſatis eſt,

aceto diluo, calidūq; impono.

Humida ad impetiginofos affectus.

Myſyos peregrini, thuris, myrrhę, aluminis

ſciſi, ſing. drach. viij. alois, ſulſuris viui, vtriuſq;

drach. iij. Paſſo excipito, ad ſpiſſitudinem ſtri-

gimenti, & bis aut ter in die perfricito illine.

Emplaſtrum lichenicum.

Cerę, picis coctę, terebinthinę, ſulſuris viui,

ſing. librę dimidium: liquida cōmituto aridis.

Excoriatorium lichenum.

Squamę æris drach. viij. auripigmenti, ſanda-

racę, vtriuſq; drach. iij. æris viij. veratri albi,

ſing. ſeſquidrachmī: ventrum cantharidū tan-

tundem. Singula per ſe terito: dein ſimul miſta,

cedra excipito, & ad ſtrigimenti ſpiſſitudinē re-

ducta, pyxide æris cyprij reponito. Carterū an-

tequū excorioria imponitur, circumſiſtas &

vicinas licheni partes pharmacō aliquo inſtam-

mationem arcente in ſplenio excepto, integere

ac tueri oportet. Poſt excorioriorū vſum em-

plaſtra viridia & alba ſunt impotenda.

Emplaſtrū viride Pamphilī ad lichenas.

Cerę librę: æruginis ſaſę quadrantē: reſinę

phrycę lib. ij. olei cyathos iij. aceti acerrimi qđ

ſit ſatis. Conſicito vt decet.

Viride Hero philli.

Acrugius drach. ij. marnę drach. iij. adipla

vitulini drach. xij. chalbani drach. iij. cerę drac.

lxxx. reſinę drach. xx. aceti quod ſit ſatis.

Emplaſtrū album, quo Magnus circulator

eſt vſus ad excoriatos lichenas.

Lithargyri, cerę Tyrrhenicę, ſing. lib. j. olei ſe-

xarij j. ceruſſę lib. j. aquę ſextarij j. Conſicito.

Aliud. Lithargyri, ceruſſę, plumbaginis lōre,

ſing. drach. xxx. cerę, terebinthinę, ſing. drach.

xvi. olei hem. j. aquę tantundem. Conſicito.

Compoſitio Menecratis ſquamę decidere

faciens, & corpora atenuans.

Picis brunę pellucidę, ſiccę, & electę, drach.

ij. a. reſinę pinus pellucidę lib. j. & quadrantē: ce-

re ponticę tantundem: chalbani quadratę: ac-

ti heminam vnam. Conſicito diligenter.

Heraclidę Tarenni ad capitis & men-

ti ſiſcoſos tumores.

Elaterij ſaliſq; pares porciones cōfundito vt

torq;. De dentium affectibus.

Equidem in meipſo manifeſte aliſquido per-

cepi, nō dolentē modō, ſed etiā pulſantē dentē:

quemadmodū carnoſę partes inſtillatione ve-

xatę conſueuerūt. Quare mirabar ſanē, quōd in

dente oriri inſtillatio poſſet. Atqui cūm etiam

alio tempore dentem dolerem, perſpicuē ſenſi,

nō ipſius dentis, ſed gingiuarū inſtillationarum,

eum dolorem exiſtere: Ita vt etiam circa coarcta-

tionem dolerent, ob vicinitatē tamen durorum

denum illis inaugetet dolor. Vtriuſq; itaq; do-

loris ſenſum expertus, alū quidem in gingiue,

aliū in ipſius dentis ſubſtantia eſſe, clare ſcio.

At verō, & quōd neruus quidem ad radicem

30 ſo dentis ſubſtratus, aliquando etiam doleat: im-

ponar autē nobis, vt credamus ipſum dentē do-

lere, conſentaneū rationi eſt. Etenim quōd den-

te exempto remaneat adhuc exigua quedā po-

tio doloris, id ob nerui inſtillatione cōtrin-

gine: cūm tumurū dolor nerui leuior tantū

reddatur, ed quōd nō amplius ab oſſe, cui cohe-

rebat, tendatur: & quōd iam liberus perſpiret,

fructuſq; medicamentis quę illi adhibent. Neg-

enim per contractū, neq; per diſtributionē poſſi-

bile fuerit inſtillatio neruo mederi, vtriusq; idē

nerui locellis coarctato, & ab anteriori parte ab

ipſo dente. Etiam verō cūm luidi ſorta ſubſtantia

ſua interdū reddant uerū, tūhī mirū ſit, ſi phleg-

monē ſimile quid patiatur. Cui rei hinc maior

accedet fides, quōd tum nutrant, tum augeant

per torū ſere ipſius vine curricula: id qđ eviden-

ter ſepemurō in iis dentibus liquet, qđ ſunt

exemptis oppoſiti, vt pote qui ſemper augeſcit.

Siquidē quantū augeatur dētes, tantū in ciboſi-

40 tatione aſteritur. Cūm igitur illis abſq; nu-

trimento augeri nō liceat, vtriusq; duabus affectio-

nibus, & his contrariis, obnoxij erūt, inopie ſci-

licei & redvndantię alimēti, qđ ipſis ſuppedita-

tur. Inopia ergo, aridiores & tabidiores, atq; ob

id tenuiores eos efficit: redvndantia verō, conſi-

miſe in eis excitare affectiōē poteſt, qualis eſt

circa carnoſas partes phlegmonę: ac proinde co-

trandū eſt, vt redvndantia evacuet, partim diſcu-

tiū, partim eam repellēdo. At tenuitatis den-

30 tium ob alimentū inopiā, nullū remediū eſt, cūm

tunc neceſſario laxenī moueantur: nempe cō-

pagę ipſorū laxiori redditā, ob tenuitatē nō mo-

dd dentū, ſed locellorū enī eo amplectentiū;

Hęc itaq; affectio ſenibus accidit citius aut ſe-

rius, veluti etiam magis aut minus. Quę verō

phlegmonē refert, magis innenes corripit. Audi-

uari tamē etiā oportet ſenibus, auxilio gingiua-

adhibito. Eas autē aſtringentib. medicamentis ro-

buſtiores, & magis circa dentem aſtriſtas facere

cōuenit: tanqđ ipſę ad ſtabilitatem & firmitu-

40 nem dentū, aliquid etiam conducat. Porro fo-

rantur dentes ab humorū acrimia & erodētium

influxu: quemadmodum etiam cutis circa exter-

nam cauſam ſolet exulcerari. Verū cutis exulce-

ratur aſidue & multis oſſa aūrarius, quōd ob

duritiem

*Dentes dolent
ex pulſione.*

*Dentes inter ſe
nonnulli ſimile
inflammationē
perſeipi.*

*Dentes augeſci
et nutrire, quod
liquet ex eo quod
ſunt exſcripti op
poſiti.*

*Dentes duobus
ſunt obnoxij
affectibus.*

*Dentium tenui-
tati ob alimen-
ti inopiam eſſe
incurabiles.*

*Dentes a quib.
ſeruantur humo-
ribus.*

*Papulae in men-
te eruptionibus
medicanda eſt
guaiaca.*

*Lichenum re-
media ſcripta a
Crispino.*

*Impetiginis cau-
ſas remedia
ſcripta.*

*Lichenus excor-
iator.*

*Lichenus excor-
iator ſanctus
medicamentis.*

*Lichenus excor-
iator ſanctus
medicamentis.*

*Dentium fœ-
derum curatio.*

duritiem ægrius quam cutis ipsa pariantur. Igitur corporum erosorum medela, erit ressecatio vitiantis influentis humoris: qui si paucus fuerit, per localia exiccantiaq̃ auxilia absumetur. Si verò multus, vniuersi capitis providentia est habēda: quod quidem si ob valuerum corpus affectum sit, huic etiam est prospectum. Etenim erosos ob molitudinem dentes, duriores impatibilibusq̃ per austerā & ærbera medicamenta reddendi sunt. Arsiuidos redditos, per siccantia curare oportet, vt qui ex viscosorum humorum influxu id pariantur: vnde similem cum foratis curationem desiderant.

De gingivarum medela.

Gingivæ ex inflammatione do lentibus, optimū pharmacum est oleum lentiscinum recens, calfactumq̃ in duplici vase, atq̃ ore retentū. Repellit enim citra molestiā, discutiitq̃ absq̃ mordacitate, cuius rei inflammationis præcipuus est usus.

Quæ Archigenes ad dentium dolores conscripsit.

Dolētes dentes colluant acri aceto calido cū galla. Aut pinguibus tedis in aceto seruefactis. Aut myrti ramulis cum pice in aceto tepefactis. Aut hyoscyami cum aceto. Aut agrestis cucumeris radice, vel marrubio, singulis cū aceto, pipere, & nitro. Aut pulegij decocto. Mirificè laedit dens caninus vitus & tritus, deinde cum aceto coctus, & ore retentus. Aut scallam, aut radicem hyoscyami in aceto coctā colluito. Aut pyrethrum cum hyssopo, & colocythidis medulla similiter coquito, liquoremq̃ ex eis longo temporis spacio in ore teneto. Hæc Archigenes. Porro solanū stupesciendi sensum duntaxat, auxiliatur dentium doloribus.

Ad foratos atq̃ dolentes dentes remedia ex Archigene.

Sory Aegyptium resina terebinthina exceptū obline, indeq̃ intra dentis cauernulā. Aut seneciam anguis dentib. apprimito, & exident. Aut vermes terrenos tostos cauernulæ præmundatè inspergito. Aut piper, vel rorismarini semen opio exceptum, in cauernulam inde. Aut in aurem denti vicinam oleum sesaminū, in quo vermes terrestres concocti fuerint, instilla. Ipso autem dolente dente hyoscyamum cōterant. Erosus etiam atq̃ dolentibus dentibus, candens admouetur cauterium. Præstat ad eliciendam pituitam, staphidē agrestem per se, & cum pulegio mandere.

Fomenta ad dentium dolores extrinsecus fiunt ex sale & melle, simul & torrefactis, & coniectis in facculos. Dolenti autē denti affricetur origani ramulus, oleo seruido intinctus. Aut opopanaxem & peucedani succū vnita, linteolo illigato, & intra oleum seruefacta, denti dolenti apprimito. Aut bene coniecto, & hiarē iusso, hyoscyami semina in suffimentum adhibere.

Ad eximendos absq̃ dolore dentes.

Pyrethrū acerrimo aceto ad dies quadraginta condito, terito, & reponito. Vsa verò exigēte, reliquis cera obruratis, dolenti ipso pharmaco integro. Deinde hora interposita, digitus extraheo, aut scalpello exigo. Dentes educunt fortiter tithymali succus, & fori, cum chalbano imposita. Apollonius autem radices betæ succum per

se iubet instillari in nares, ad soluendum dentium dolorem.

Eiusdem, ne erosi dentes vacillent, neve foratorem edant, remedium.

Veratrum nigrū erui magnitudine, melle coctū exceptum, cauernis indc.

Eiusdem ad dentes denigratos optimū dentificium.

Alabastrite vñ drach. viij. pumicis vñ drach. iij. salis torrefacti drach. iij. tritis vñtor. Ab horum vñ collatione vtendū est, ex vino odorato, in quo ad multū tempus iris sicca fuit macerata.

Asclepiadis remedium ad dentes motos.

Cornu cerui vñ drach. viij. Rhodis rubri drach. iij. omphacij drach. ij. balastij drach. iij. corticis pinus, myrrhæ, sing. drach. j. tritis vñtor.

Collatio eiusdem ad molarium dolores.

Radices smyrnæ cum aceto mulso coquito, & excolatum liquorem ore tenendum dato.

Ad erosos dentes præseruatium.

Zingiber cum aceto mulso coquito, ac pbē terito, indeq̃ in cauernā indito, forisq̃ dentem ex eo integro. Aut hederæ lachrymam chalbano miscito: aut tithymali, vel ficus syluestris succo dissoluto, ac vñtor.

De mobilibus & prominentibus dentibus.

Vbi dentes absq̃ ictu præcedente mouent, vel simile est neruos radicibus eorū adnatos, præ nimia humiditate laxatos esse: ob idq̃ siccantib. medicamentis eis esse opus. Quum autem emori dentes prominentiores sint reliquis, præcipue vbi ex plaga mouentur: sane semper optimū iudicauit fore, si sic affecti, in tantum attererentur lima, quantum super reliquos prominent: idq̃ ne oppositos sibi offenderet, in loquendo, mandendo: quod consilium semper mihi satis feliciter celsit. Oportet autem gingiuis linteolum molle vsq̃ ad radices dentium circumdare: dein digitis sinistræ manus leniter amplecti, simulq̃ turē, & citra compressionem, ne cōcutiatur, cui limulam adhibemus, chirurgij ipsam aggredi: eāq̃ nō vna vice absoluerē, sed pluribus. Imperādum etiam est ægro, vt nec loquatur, nec durum aliquem cibum accipiat: vtatur autem alimēto succo ptisanæ, & sorbitione ex alica, & pane madido, atq̃ alius id genus mollioris.

Ad firmandos dentes, ex Archigene.

Myrrhæ, pompholygis, aluminis scissi, amyli, quales singulorum partes tritas admoue. Pothea asinum lac colluant calidum, aut acetum, aut vinum, in quo malcorium & galla sint cocta. Ad dentium autem stuporem portulacā manducant.

De dentitione puellorum, eiusdem.

Dentienti infantulo, si doluerit, canino laste gingiuas obline. Aut si leporino cerebello gingiuas eius illeueris, citò dentes proveniunt. Mulier gingiuas dolētes acetū cui hyoscyami radix incocta fuerit. Quod si enascēte dente ægre erumpat, & cōpungat gingiuam, cyperum ex butyro & vnguento fusino iuxta exortum illinito.

Præseruatua dentium ab Archigene prodita.

Alumine scisso & modica myrrhā confricato, nec erodent vñq̃. Aut in dem illiyne manduto.

De diti-

Dentium lindi-

Gingiuæ infla-

Dentium dolo-

Foratorū abs-

Dentibus ex-

Dentium fœ-

Dentificium

Dentes conf-

et diti-

et

Dentes prom-

et diti-

Dentium stu-

Dentitioni pu-

Dentes præ-

Compositio Andromachi eadem hora dentium dolore sedans.

Piperis, pyrethri, succi thymali, chalbani, singul. drac. j. chalbano excepta in cauernâ indito. A. i. Seminis hyoficyami, opii, niri, myrrhæ, pyrethri, piperis, sing. drac. j. chalbani drac. ij. tritis ex vino vitior.

Collutio ad motos dentes, Critonis.

Lenificum, myrrum, galli, in vino cocta coluenda præbeto. Eiusdem ad corrosos dentes. Capparis radicis cum acri acetio ad dimidias coquo, & colloito tepidum.

Dentificiû ad gingiuas madore laxatas, putrescentes, & cruentatas, concussos dentes, osænas, parulidas, dolores, & omnia oris vlcera.

Dentificiû ad omnia gingiuarum & ora vlcera leniens.

Perdicij rectis drach. x. mellis, aluminis scissii, iridis Illyricæ, sing. drac. iij. piperis albi drac. viij. nigri drach. iij. pumicis, pyrethri, hyssopi, pullegi, seminis apii, sing. drach. ij. myrrhæ, menthe siccæ, herbæ sideritidis, singul. drach. iij. salis fossilis drach. iij. Perdicium, si deritidem, mel, & salelem, mista vitio: alume verò per se vitu vino extinguit: dein omnibus simul confusus vitior.

Dentificiû infusum.

Smegma dentes reddens candidos, eosq; ad erosionem defendens, orig bonum odorem cõsilians.

Nitri, testis sepi, myrrhæ, sing. vnc. j. tritis vitior. Aliud ad idem. Aluminis scissi sciscuncæ: mastiches vac. j. comæ rosarum quadrantem: iridis trientem. Tritis vitre, indicoq; aquâ tepidam coluendam præbe.

GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorû secundum locos, lib. VI.

Quamvis plurimû interest, ex viuâne aliquis voce, an ex libris discat, non tñ parum cõmodû studiosis ex cõmentariis accedit: ob idq; ad hoc cõscribendos me accinxî, quam rationalis auxiliiorum inventio præstet illi, quæ soli experientia innitit. Igitur in stomacis pharmacis, de quibus agere in presenti cõmentario est animus, primus medendi scopus est communis omnium partium inflammatarum: secundus autem, proprius illius cui medemur.

Porrò inflammationes, ex influxu calidi sanguinis sunt: qui repellendus est, nisi vereamur ipsum ad partem aliquam principem recursum, atque illic grauiores aliquem morbum excitaturum. Vnum igit venæ sectione, & purgatione, & clysteribus, etiam inedia, vbi totû corpus plethoricum, aut cacochoyimum extiterit. Si verò neutrum sit horum, statim properamus ad curationem per localia remedia. Impossibile autem est, pharmacis ritè vti cum, qui vim ipsius nō cognorit, secundum quam auxiliatur. Porrò medicaminum repellentium genus, quibus vitium in principis inflammationum, in materia refrigerantium consistit: quorum sanè ea quæ astringendi natura prædita sunt, efficacior vim habent, ad oculos repellendum influxum. Inest quippe ipsis ita in eis facultas cogendi & densandi superficiem corporis cui admoventur.

Communis itaque scopus in oris inflammationibus est, prohibendi eos dum incipiunt. Se-

cundus autem ab ipsa particula sumitur, quem sciamus longè rariorem atq; molliorem esse oris tunicam, cute qua vniuersum integitur corpus. Taceo tunicam oris, medicamentorû insua uitarem percipere possiq; medicamentâ ori indita desinere in ventriculum & pulmones: quorû neutrum cui reliquæ adest. Quare fortibus medicamentis, cuiusmodi drachanthos existit, quib; venenosam facultatem sortiuntur, vti ad oris affectiones nō licet, nisi magna virgeat necessitas:

Ergo succus mororum solus, recensq; & fructu ipso expressus, ad incipientes oris inflamationes est melior illo, qui, vt assertari diutius possit, ex melle coquitur: quanquam ad sequentia inflammationis tēpora, visior est quæ ex melle est coctus. Nam quemadmodum in principio vitia sunt pharma repellentia id quod insult: sic post principii vsq; ad finem, pharmaco opas est ex vitisq; misto, repellente videlicet facultate, & discutiente prædito: ac primo quidem tempore, astringens præcellere oportet: ad finem verò discutiens: atque interposito tempore æquales vitiorumq; partes esse conuenit. Quando verò veluti indurata quippiam ex ipsa inflammatione relinquitur, penius non conuenit astringens ad discutitorium miscere, & si prius vniuersum corpus fuerit vacuatum. Similiter neque in principio bonum est discutioria miscere astringentib; Merito autem qui pharmacum diamoron composuit, parum ex croco & myrria ei cõmiscuit, quod communem habeant facultatem concutoriam inflammationum: priuatim verò crocus quidem astringat. Myrria autem calfaciat in tartum, vt sufficienter discutiat, tenuium partium enam substantias possidens, quæ facile in alnum subire possit, virisq; aliorum medicamentorum deducere. Soleo autem ipse in principio ad pharmacum diamoron miscere thois succû, aut omphacium, aut florem rosarum, aut ipsas rosas sigcas, necnō balaunium, cytimos, malicorium aridum, gallam omphaciden, pini, thursiq; cornicel, hypocistidem, lentisil succum, ac breuiter alia in gentia omnia, præter ea quæ corruptentem possident facultatem, quæ & deleteria dicuntur, & letalia species quædâ existit: quippe cum non omne letale, necessariò etiam deleterium, hoc est, venenosum existat. At vbi inflammatio iam constitit, sufficit ad mororum succum addidisse thmum crocum & myrrham, vt ipsa inflammatio coquatur. Quæ vbi concocta sunt, addere aliquid ex discutioris licet, cuiusmodi sunt nitri spuma, nitrum Berenicarum, sulfur viuum, sapa, origanum interdum incocto, aut hyssopo, aut pulgigo, aut thymbra, aut ilymo, aut calamintha hortensil & agrestil. At verò Erasistratus, quum mororû succus illi ad manum non esset, rubi cremore visus, sispium curauit. Ego autem pharmacum ex succo nucum viridum confeci, facultate ad oris inflammationes ceteris omnibus stomacis plurimum antecellens. Cuius compositio est huiusmodi. Saccum externi nucum viridum corticis cõ mellis iusta portione coquo, donec ex vitroque mellis crassitudo consistat. Hinc autem liquet, qualis sit eorum cornicel succus, quantiq; astringendi vis, quod ne per fortissima quantaq; exterioria, nigredo elui possit ab eorû manibus qui

Oris affectibus cur exhibenda non sit per habet: nam si medicamentum.

Oris inflammationis modum quæ opulentior medicamentum.

Digerendum, si la vlcera est, vbi durior aliqua ex ore inflammationis res quæ curat: etiam præter per vniuersum rationem.

Crocus facultas. Myrris facultas.

Diamoron medicamentum.

Letalia omnia non esse deleteria. Oris inflammatio vitis concocta quæ cõuenit.

Rubi cremor.

Stomatitis ex sacro nucum vitiis, ad ore inflammationem cõuenientissimû cõponitur. Nucum succum viridum adaleq; ad illius partem trahi.

Inuentio rationalis auxiliiorum præstet illi, quæ soli experientia innitit.

Inflammationis causa, & curatio.

Astringentium facultas.

qui virides nuces decorticant. Atqui nisi in profundum manū illa facultas descenderet, non certe ægre eluibilia esset. Quum autē descendat, indicat planē substantiam succi, tenuium partium esse. Attrationi est consonum, attingendā vim esse maximē ex visū, ubi in eiusmodi cōtineat substantia inaptam autem existere, quæ crassā partium substantiā est cōiuncta. Optimum itaq; ac simul suauem esse nucum succū tenui periuadēs, eum in quatuor partes diuido: & ad primam ita

aliquid ex attingentibus misceo: ad secundam, ex croco & myrrha: ad tertiā, sulphurā & natri nonnullū. Quartam verō solam sinceram seruo, ob dulcorē futuram vtilem pueris, mulieribusq; & viris est cōminata. Est autē quod ex succo rubi cōstat, fortius eo quod ex moris conficitur: quæmodmodū hoc eo, quod ex multo paratur: omnib; tamen præstat quod ex succo fit nucum. Porro in pharmacia quæ deglutitur, maximē conieciare oportet naturam eorum quæ ipsa sument. Nam qd cum molestia aut fastidio

accipitur, ea ventriculi evertit. In stomacis autem medicamentis, eiusmodi sinceritatem interdum contemneret licet. Si quia igitur medium aliquod medicamen cōficere omnibus aptū velit, vt (exempli gratia) quod constat ex succo mororum, ad quinq; libras succi, vnam mellis adiciat. croci autem & myrris, vtriūque drach. j. s.

Vini item austeri hemina vnam: omphaci, drach. j. Quod si non addit, pro ipso rhois succum iniicies: & si voluerit per pōdū vtriūq; imponere, nihil peccauerit. At Hera drachmam vnam scissili aluminis addit. Quod vero ad coquēdū modum spectat, eo sanē censeo succum ipsum solum esse per se præcoquēdum vique ad crassitudinem frigiditatem: deā verō adiciendū meli: atque vbi iam cacabam ab igne velis auferre, reliqua imponenda esse. Etenim vt spuma argēti, & plumbago, aliq; multa metallica, per cocturam meliora evadunt, sic vis cōplurium aromaticorum exoluitur. Ceterum ad induratas inflamationes, quum iam præterierit vigore, nec amplius insuat quicquam, prædicto pharmaco diffusoria miscere oportet: cuiusmodi sunt, spuma nitri, nitri, petræ aliæ sēs, sulphur vniuū. Ac si scit sanē nitri vnciā semia, sulphuris vnciā duas, si addideris. Quod si nihil horum sit præstitū, in sapā aut mulsa origanum seruefacito, ipsūq; stomacico pharmaco adicito, & gargarizare iubeto. Nihil autem refert, etiam si hyssopum coniciat pro origano, aut pulegium, aut thymū, aut thymbram, aut calaminthem, aut ledyosimū. In vigore autem inflamationis collutionibus & gargarismi concoquere inflamationē oportet, pinguum caricarum decoctō, lēscinoy oleo repecto in duplo vase. Quin & ipsum stomacicum pharmacum in vigoribus gargarizare venit mulse dilutioni permittum, aut calide sapæ, aut etiā aque calenti. At meum ex succo nucum medicamentū, aliorum omnium est validissimū, vtilissimūq;.

Quum aut tres sint Punicorum malorum species, austeros: nempe, dulciū, & acidore, quas singulorū partes, vnciā corticis soleo ipse enī cōtundere, ex pressūq; succū cum melle coquere, ac sic cōficere medicamē nō solum stomacicū, sed ad multa alia vtile. Con

tunditur etiā cum illia & rubi fructu: cuius succus similiter preparatur succo mororum, melius illo pharmacum redditur, sed minus validum eo, quod ex nucum succo paratur. Quin & malorum cotoneorū, & pitorum syluestrium, ac mespilorum succu, similiter preparatur, stomacicum pharmacū redditur, aptiusq; enī vt deuoletur: quum hoc qd ex nucibus cōstat, deuorare nō liceat. Verū quod ex punicia constat pharmacum, aptū est exsoluto & cibos fastidiēti ventriculo: deficit tamen ab eo qd ex malis cōstat. Innocuus est enī rubi mororū succus voratus, veluti & ipso mororū: sed succu rubi mororū habet quid quod stomachū roborat: quod ipsum, mororum cremor non habet. Iam vero succu nucum plurimo melle opus habet: & post eū, rubi mororum: modico autem, malorum & puniceorum, & pitorum syluestrium. Medius inter hōa est mespilorū succus. Ex cornia enām, brachylig & prunis, stomacica preparantur. Ceteri si crassius esse videantur succus, statim mel admiscere oportet: sin liquidior, præcoquantur. Sufficit autem pitorum atq; malorum succus parem mensuram mellis. Succus verō corū quæ nimis acerbæ sunt, veluti est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplum mellis desiderat. Porro si atramentum sutorium admixtum sit, non admodum deglutire oportet confectum pharmacum, præterquam si iuxta stomachum aut alium vicerolam affectionē fieri vteamur. Quin & si in ipso ore maligna vlcera sunt, præstant ex atramento sutorio medicamenta. Sufficit aut drach.

ad prædictam compositionē admittā, in qua vna mellis librā conici debeamus. Iam vero quum rhua sit duplex (alter enim obsonia inaspergitur, stomacho commodus: altero conorū tinctura stomachi) vterq; sanē multo incoctus, stomachi efficitur medicamen. Multum etiam solum, citra mellis mixturam in mellis coquegem redactū,

bonum sit pharmacum in principiis, augmentia, atq; vigoribus. Ad declinationem autem præstitū, si in ipso diem integrum tedeā pingues præmacrauerit. Quod si præcisiō efficitur pharmacum via, iniicies etiam casie corticem, aut nardū Indicam, aut malabatrum solum, singulorū nempe vnam drachmam. Ad induratas autem inflamationes cōiiciuntur quæ generosius discutere possint, rusa videlicet, & cribrata: idque vbi olla ab igne est expleta. Ac italia sanē sunt, costus, amomū, macer, Cyrenaiacus succus, Medicifq; Pau-

peribus tamen pro sumptuosia discussione pharmacia, aut distamā, aut acoron, aut meon, aut pyrethrum, aut cardamomū, aut sinapi inuicendū censeo, pari pondere: ita vt ad triū drachmarum pondus, eorum mistorum moles perveniat ad prædictā symmetriā, in qua mellis libra liabebatur. Verū pro cōstitutionia affectuū proportionē augeri ac minui pharmacorum vellemennam oportet. Ergo pharmaci cōficientes ex multo, ad decē mli heminas, tres iniiciemus heminas rhoia corianorū, aut eius q obsonia inaspergitur. Si verō vtrunq; iniiciamus, vtriūq; vna & dimidia iniiciēda est. Iuxta proportionē etiam, ex diffusionis, quodcūq; tandē in promptu habeamus. Quod si vnum tantū suppetat nobis attingēdā vim habē, quod in principio ini-

Adstrictionē tenui substantia uolūt, esse inuicem ex vso ad repellendā inflammationē, stomacico ex succo nucū quæ duplex compo sita.

Stomacico ex succo mororum, croci, myrris, natri præstat.

Stomacico diu morum compo sita apta omni bus.

Aromaticorum compulsum viret, per colatū exoleat. Ora indurata inflamationibus qualia sunt apta medicamenta.

Ora vigrata inflamationibus qualia sunt apta medicamenta.

Punicorum malorum species tres, austeros, dulciū, & acidore. Stomacico ex punicorū succo.

Stomacico ex succo mororum, croci, myrris, natri præstat.

Rubi mororum succus, est vtilis ad roboratū, id quod succu mororum non habet. Sutorio quidā pluit, qui nisi meli requiratur melis.

Calceantibus quando stomacico miscere ex prestat medicamenta. Alui duplex.

Melle quando et qualiter praeparato vti debet in ore inflamationibus.

Diffusionis pharmacia quæ nam sunt.

Stomacico ex multo compo sita.

mus: aut vnicū discusforium, quod iuxta finem: ex illo totum pondus explebimus, qd ex omni-
bus alioqui fuisse cōstandum. In vniuersum au-
tem, austeriora quidē, in principis, & vehemen-
tibus infusionibus congruunt: moderatiora in
vigoribus: vt magis discusforia in dedinationi-
bus. Porro ex astringentibus facilia parata sunt,
rosā, bacē myrti, myrtus, lēiscus, rubus, canis-
rus, galla omphacitis, fructus Aegyptiacae spin-
osae, oia aluminis genera, vnus & alter rhus, glauciū,
omphaciū, cynni, & balausta. Ex discurrentibus
moderatē, facile parātur cascarum furfurūq;
decoctum: aut mulsā, in qua origanum, aut hy-
sopū, aut thymus, aut calamintū, aut pulegiū,
aut hedyōsimū cōcocta sint: quae si diutius co-
quantur, formora redduntur: amplius autem &
nitri spuma, aut ipsum nitrum vitum. Fortius ve-
ro his est sulsur vitum. Rectē autem Androma-
chus medicamini ex succo mororū confecto ad-
didit glycyrrhizā, vt exasperata leniret, asperi-
tatemq; astringentium minorem redderet.

Stromaticum Andromachi ex mulo,
quo vitor.

Gallas xxx. Rhous coriarij sex. ij. mulli sex. vj.
Gallas confractas per diem & noctem in multo
macerato: dein coqto, donec ex toto quarta su-
perfit portio: quam per linteolū colatam, expres-
simq; in olla ad mellis crassitudinē spissato: de-
in trita addito, aluminis scisai, croci, myrrhæ, sin-
gul. drac. j. permixta reponito, tandemq; eis vi-
tor. Iam verō, quod ex dulci cōfectum est mu-
sto, magis mingtorum & moderatum erit, sed
minus efficacius: id autem quod ex acerbis fit vis-
us, velicentius quidem astringit, leniendū vim ta-
men non habet: ex medio vino paratum, mediā
facultatem foritur.

Stromaticum ex befā, anginis congruēs,
ab Andromacho scriptum.

Sem. anisi, apij, ammij, floris lunci odorati rot.
aluminis scisai, in dis Illirij, befā (hoc est, semi-
nis rutae syluestris) cinnamomi, myrrhæ, Troglody-
tyce, aristolochiæ longae, casae, rosarū siccarū,
crocomagmatīs, sing. vnc. j. croci, cineris hirun-
dinū tenellarū, vtriusq; quadrante: croci sesqui-
vnciam: nardi Indici, amomi, vtriusq; vnc. s. gal-
las viij. tritis cum melle vitor.

Stromaticum Asclepiadis.

Hirundinū syluestriū vitarū cineris drac. iij.
croci, nardi Indici, vtriusq; dra. j. melle excipito.
Aliud Andromachi, ad collumellam laxatā.
Aluminis liquidi lib. j. sorum rosarum lib. s.
succū hypocistidos quadrante. Alumen in mel-
le coquito, dein sicca inspergito, vitorq;.

Aliud eiusdem ad omnia vitia oris.

Crocomagmatij drach. ij. in dis drach. iij. fan-
dara chae drach. s. terebinthinae drach. ij. lycin-
Indici drach. j. vnae passae drach. viij. aloē, ompha-
ciū, singul. drach. j. succum pinearum rosarum
drac. viij. succū glycyrrhizae, aluminis scisai, bala-
ustij, singul. drach. j. floris rosarum drach. ij. mel-
lis hem. q. s. Conficito.

Stromaticum Asclepiadis.

Succi hypocistidos drach. ij. balanij, lycij, aca-
ciē, sing. drach. j. excipito oliuē immaturū succo,
& postea melle subactū vitor.

Si verō pger stomatica diu genis fastidiat, in mo-

deratis quidem inflammationibus sufficere suc-
ci soli fructuum iam dictorum, vt rubi, & moro-
rum, puniceorumq; mīlo, & cotoneorū. Quia
& succus nucum vbi cum solo melle paratur, gu-
stus suauis existit: itēq; multū ex vus acerbior-
ibus pressum, si rhus in eis cōiciatur, optimum
pharmacum redditur. Ad eas verō inflamma-
tiones quae multa astrictione indigent, austerorū
punico, aut cotoneorū, aut vitrorūq; succus,
melli admixtus, saepe mihi fuit satis. Singulis autē
hoc succo, licet omphaciū adicere. Vehemen-
tissimū medicamen reddet, si punica integra tun-
das vnā cum corticibus, indeq; succū exprimas:
atq; hoc magis si acerbā fuerint. Acerbissimum
enim fiet, si ad punicorum austerorum ita tulo-
rum succū, omphacium superaddatur cum mo-
derato melle. Praestantius adhuc reddens pharma-
cum, si tota cōfusa punica malla, passio cocta ex-
colaueris. Ne verō valde exasperet, glycyrrhizae
succum admiscens, conficies optimū pharmaciū.
Si quid verō indurātū appareat, iis succis & me-
diis facultates foruntur, inuicēs aliquid, dum
coquantur, ex pulegio, aut thymo, aut origano,
hysopo, mētha, aut calamintū: dein colabis, &
habebis opusū medicamē. Quod si calidius ef-
ficere velis, piper addes. Omnia, tamen si glycy-
rrhizae succus addatur, melius pharmaciū efficiet.

De crustis.

In calidis & humidis corporis partibus, qualis
est os, ex quacūq; tandem causa fuerit exulcera-
tum, citō putredo oboritur. Ad cuius vlcera for-
tissimis saepe vti cogimur medicamentis. Arque
fortissima sunt, quae ciccharam in flar cauterij ex-
citant. In externis igitur corporis partibus, vbi
parti curandae crusta fuerit inducta, si fortis. su-
perfedemus pharmacia, transgredientes ad deter-
soria, quae ciccharas tollunt. In iis verō quae in ore
excitantur sunt escharas, rarius mihi videt esse ad-
miscere ad exteriora pharmaca, alia quaedā for-
tiora, & quae per se ad mota, crustas enā inuertit.
Melli itaq; maxima extergēdi vi praedito, crustissi-
ca medicamēta immiscemus: quemadmodū ad
sordida quae in corporis cuticula oriunt, misce-
re illi leuiter extergēna solemus, vt rhus, erum
iridem, aristolochiā, & alia id genus. Porro An-
dromachus, ad oris crustas, ex nucib. pineis, &
amylo, alumine scisso, flore rosae, croco, & mel-
le, composuit optimum stomacum.

Crispitas ad oris crustas medicamentum.

Misyos torrefacti drach. iij. mellis optimi cy-
athos sex: miscero & vitor. Idem enī praestat
chalcitis afflata cum melle.

Archigenis ad crustas oris remedia.

Commodissimū est stercur canum, aliorum
onibus, ex melle illitum: quod enī in angina au-
xiliat. Aut rhus Syriacus ex melle, Aut hirundi-
num vitarū & stercoreis humani par modus cum
melle illitus. Aut heparis lupinidi co chleiarū
duo trita bibenda dato. Ego verō medicamē
rhorū damno, quod astringēt sit facultatis, quae
minimē crustas cōuenit. At hepar lupinū eupato-
rio mistum, ad hepanicas enī bibit affectiones.

Soranī stomacum ad crustas, fortentēq; gin-
giuas & humore pregnantēs.

Misyos vti drachmas viij. iridis Illirice dra-
chmas iij. croci drach. j. Trita in pyxide lignea
reponi-

Inflammationi
sacrosita, anse-
rura: vnguenti,
moderata: ma-
gis digerenda
conueniunt.
Astringentia pa-
rata facilia.
Digerentia me-
diocriter.

Digerentia va-
lenter.

Stromaticū An-
dromachi ex
mulo.

Stromaticum ex
befā Andro-
machi.

Colomella la-
cata remediū.

Stromaticū ad
omnia vitia o-
ris.

Stromaticum
Asclepiadis.

Acerbissima pe-
nosa, cistis
de radio.

Indurata in flar
mariorū apud
stomatica.

Glycyrrhizae
stomacum addi-
ta, ipsa melle
reddet.
Putredo oboritur
citō in calidi-
ssimis corporis
partibus.

Oris postea ex
sterpido melle
ad exteriora
est vlcem
fina pharmacia
est qua per se
ad mota, crustas
enā inuertit.

Oris crustis do-
lendo remediū
varia.

Crispitas ut con-
uenire astringē-
tia.
Hepar lupinū
eupatorio hepani-
cas.

Stromaticum
Soranī.

reponito, & tum per se, tum ex melle vitior.

Aliud nomine Antlhera.

Antlhera.

Iridis Illyricæ, sandarachæ, cyperi, sing. drach. iij. aluminis scissi, croci, crocomagmatis, sing. drach. n. trinis & mistis vitior.

Stomatium Heraclidis Tarentini ad vehementes putredines oris atq; reliqui corporis.

Chalcindis partem j. calcis vias tantundem: auripigmenti partem dimidiam: tritis & mixtis vitior. Aliud. Florum rosarum drach. iij. aluminis scissi, gallicæ, sing. drach. n. myrrhæ drach. j. trita melli misceto, vtiorq;. Quidam sale mace rato in aceto, resiccatq;, vnt. Si hæc remedia putredo ipsa respuat, vtendū cautior est: postea verò colluendū vlcus prædictis, imponēdūq; antlhera, donec cruisse abscidant.

De columella.

Caruncula illa quæ ad extremum oris dependens cernitur, à veteribus quidem gargareō, & cion, hoc est, gurgulio & colūna: à neotericis autem cionis, hoc est, columella, vocat: cuius sanæ affectionem quandam, staphylen, hoc est, vus, dicimus. Rarò tamen affectio hæc circa columellam contingit, licet ea sæpe inflammetur. Et sanè quemadmodum in aliis omnibus, in quib. ex humorum influxu contingit morbus, sic etiam hic prima auxilia debet fluxionem ipsam repellere: quare astringētes sint facultatis oportet: verum si quidē influxus sit moderatus, moderatè astringenti, quam priuatim austerā vocat: si verò vehementior, acerbæ. Ambe q̃ppe facultates astringunt, sed debilius austerā, vehementius acerbā. Porro moderatæ collutiones fiunt ex palmularum, rosarum, pampinorum vitis, rubi, canirubi, aspalathi, cyperi, cytinorum, siliquarum, radicē mori, lypocistidis, malorum austerorum, pirorum, acerbiorū, ac sorborū decoctio. His fortiora sunt myrri & baccarum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, & virgultorum teneriorū siccis, arbuti, simlacis, fagi, & ipsarum glandium: mespilorum item, & cornorum, & fructus memecili. Genserolisimū autem est decoctum gallarū, & rhois culinarū, & coriariū, fructūq; myricæ, & Aegyptiacæ. Ex his singula tū per se, tum etiā nuxtiū cocta ex aqua, gargarizare oportet. Mirū. n. quā mixturæ ipsorum vtiliores ipse sunt ipso simplici visu. Quin & arida etiam columellæ insperguuntur. Iam verò moderatè astringūt etiā lapis Ageratus, aloë, cyperus, & rosæ iūci odorati, &

Cautio vtendum in putredine gingivæ seu vlcibus, vbi reliqua incausa admostrantur, Columella. Gargareo. Cion. Columella.

Staphyle.

Columella inflammata cura fit.

Acerba & austeri facultates vt differant. Collutiones moderate ex quibus fiant.

Collutiones moderate astringentes.

Miscellæ medicamentis aliquod esse vitiorum simplicium vsu.

Alumina omnia genera esse vt astringunt. Chalcindis facultas.

Medicamenta omnia respectu ad aliquod in vlcibus rem opus dicit.

rectè dixeris: nihil enim sunt, nisi nacla fuerint vtentē rectè. Si verò cōtra, pharmaca deorū esse manus fitearis, similiter rectè dices. Iuuant quippe maximè, si is quæ vnt, in rationali methodo fuerit exercitatus, atq; natura prudēs. Porro mixtura pharmacorū euulsē generis, mediocri plurima corū visus sit gratia: ob idq; semper duo contraria medicamēta in vnoquoq; affectu vos habere oportet precium duco: quæ quidē permiscendo, multis pharmacis abvndabit. Quā autem rarò quis affectionē inueniat, quæ (exempli gratia) solis discussorius, aut repulsiōis indigeat, cogimur etiam sæpe diuersi generis medicamēta miscere: quemadmodum vbi cum repellentibus aut anodynis discussoria cōfundimus. vt si gurgulione inflāmato, ad alumē itidem miscamus Illyricam, aut farinam eruñā, aut tiliā, aut myrrham. Etenim quā discussoria sunt multa, et semper à minoribus auspicandum: quandoquidem inflammata exasperantur ab acerbis.

Quæ Archigenes scripsit ad gurgulione inflāmato.

Vualaxarā, succum Cyrenaicū dissolutū illine: aut gallam tritā cum sale: aut ipsam sal dissolutum: aut lycij radicē tritam: aut omphaciū cū melle. Si fortius medicamētum vis, atramentū futurū, quæque aris, aluminis scissi, misyos, myrrhæ, gallicæ, quas partes tritas, ac vino acceptas illine in principio tamen sale non est priuatim vtendū, siue nec Cyrenaica lachryma: sed vbi columellæ inflāmatio indurata iā fuerit. De gurgulione aut inflāmatione sic Hippocrates differit: Gurguliones cum periculo excidunt, vrant, ac resiccant, quādiū rubri fuerint & magni: q̃ tempore aliis artib. graciles sunt reddendi. Quā verò torū id quod appellant vus, abcesserit, extremum autē gurgulionis maius, liuidūq; redditum fuerit, superior verò pars tenuior, tunc sanè intrepide curationi admoledū vt manus.

Quæ scripsit Archigenes ad vigentē inflāmationem gurgulionis & tonsillarū.

Si verò in vigore affectio peruenit, subducatur alius, aut calidam lorionem sursum gargarizet, aut psianæ succum, aut psium tepidū, aut radicis dulcis decoctum cum passo & hyssopo: aut ficus vino incoctas: aut succum psianæ, in quo vus sint passū lico est. Magnopere iuuatur, si amygdalinum oleum in aures intundens, forniculo ipsogis expressis leniter foueas. Quin & omelys ex cruda hordeacea farina imponenda: aut ex farina seminis lini aut fennicæ. Quod si iam ppe ad inspirationē accedere non sinit videant, coadiuuare assidue per ficū decoctū oportet, apmodū incessanter id gargarisma exalbere, similitēq; aquā multā calidā. At si nihil tale apparuerit, augeat autē malum ita, vt ægri vix transglutire possint, ac suffocationis principii sit nobis suspectum, alius fortī clystere, aut glande subducenda est, & secunda cubiti vena, cucurbituræ cū scarificatione collo ac mento assignenda. Fomentis etiā & cataplasmas robustioribus est frequentius vtendum, gargarismis assiduus. Quod si ne his qdē remediis multat morbus, sed augeatur indies, venæ sub lingua secent, aut iuxta angulos oculorū, atq; illa q̃ in fronte consistit. Illatur autē assidue sel tau-

Pharmaca vbi sunt sola. Pharmaca esse dicitur manus.

Discussoria mixta: ut cor sit in principio vlcis, vbi discussoria est opus.

Gurgulione inflāmato remedia secundu Archigenem.

Gurgulione afflicto curatio secundum Hippocratem.

Gurgulione inflāmato cura iuxta secundum Archigenem.

Tonsillarum inflāmatio iuxta secundum Archigenem.

Vena sub lingua, vel iuxta angulos oculorū, inflāmatio sensu quā disciendū.

ri, & elaterium cum melle: aut fal cum oleo veteri, mellisq; & aceto: aut centaurea cum melle: aut absinthium cum nitro & melle.

Hæc medicamentum ad columellam laxatam.

Gallæ omphacitidis, aluminis scissi, falsæ ammoniaci, sing. pares porciones contrito, inspergitur. Vel ageratum lapidem deraum in polinem similiter columellæ imponito. Porro Heracleides Tarentinus rectè sanè post usum medicaminis exacerbatum, iubet colluvium fauces lentum decocto, ad tollendam vehementem illam astringentium aspredinem.

Ab aulepiade prodita.

Rosarum siccarum sextarium j. nardi Celsiq; vna cū radicibus, & adhirente terra, fasciculum j. nidi hirundinis sylvestriū andi drach. iij. myrsiq; drach. viij. gallas omphacitidas numero xv. cōfusa & trita digitis apprime. Est enim hoc mixturæ potentissimæ. Alud. Piperis albi, myrsiq; sing. drach. l. aluminis scissi drach. ij. gallæ omphacitidis tantundem: tria admoue. Hoc tamen utendum non est in gurgulione vehementer rubente. Aliud eiusdē facultatis, quo & nos sumus vsi. Lapidis agerati, Alisæ petræ, terræ famisæ, singul. drach. iij. aluminis scissi, croci torrefacti, gallarū omphacitidū, sing. drach. ij. tritis vitior.

Critonis medicamentum digerens.

Osium palmularum, nucū tenerarum immaturarum, ficcarū, vitrarumq; drach. vj. Viro, atque in pulvulum terito, vitiorū arido admoto.

Aliud Sorani, maxime mitigatoriū, ac promode convenientissimum ad vigentes inflammationes. Glycyrrhizam contundito, & mel & aquam pari mensura affundito: dein coquito, & liquorem ipsum gargazandum præbeto.

De pharmacia ad vlcera oris aphthas appellatas.

Vlcerações in superficie oris obortas, aphthas appellant, habentæ quippiam igneæ caliditatis. Hunc aut plurimū pueris lactentibus, quum aut vicosum fuerit lac nutritis, aut nō probe ipsum coxerit infans. Curant facili, vtpote quæ vel moderate astringentibus compescantur. Quandoque tamē durtum sūt, ægrèq; solubiles, & progressu tēporis nonnihil putrilaginosum acquirūt: atq; hæc sanè fortiora medicamēta postulat.

Andromachi medicamē ad aphthas malignas. Aluminis scissi, viti, drac. ij. fructus erice drac. l. oleo excipito, & per digitum locis apprimito.

Eiusdem ad aphthas leuiore.

Lycium Indicū vino tritum, circumlitū, & ericæ fructus tritus, aut rose ficæ cum melle, auxiliantur. At Crito, adipem suillum, & mel, simul liquefacta, commēdat: vt collutionem etiam ex aluino lacte mēdicacionemq; portulacæ intrinset melle: quæ omnia & simplicissima sunt, & pueris maxime idonea.

Quæ scripserit Apollonius ad aphthas.

Ad aphthas albas, chalcididē oleo triti penna illinito. Postquā verō puræ factæ fuerint, myricæ fructū tritum, aut aqua mulla, aut vino dilutum, illinito, maxime infantibus. Ad nigras aphthas, uam passim exaceratam, & animum, tria cum melle illinito. Vel aramentum fortior tria cum melle vitior. Vel æruginis vermiculatae obolos tres in vini quarta hemina parte gar-

garizandos præbe. Vel muriam oliuarum & acetum pari mēsurā mista, colluenda dato. Mandendæ sunt etiam oliuæ mēria conditæ. Hæc Apollonius. Etenim oliuæ sic affertur, discutit, atq; vehementer astringunt.

Quæ Archigenes ad aphthas scripserit.

Ad aphthas faciunt collutiones ex decocto foliorum oleæ, aut myrti albis. Facit & amurca, & marrubij succus, aut lentis decoctū. Aut fixi vini dulcis cum melle illita. Sūmē facit ad depascētes, forniculi radicis vitæ cinis. Porro ex colore ipso facile licebit colligere, qui nam humores ipsas aphthas produxerunt. Rubicundiores siquidem, sanguinem præcellere indicant: flauiores, amarū bilem: albescētes, pituitosum humorem: quemadmodum nigrescētes, melancholicū succum. Qui autem hæc citè discernerit, noueritq; facultates singulorū medicamentorū simpliciū, is vnicuiq; aphthæ speciei, propriū sciet administrare remediū. Expēdet aut simul ipsas naturas corporū. Fortioribus quippe corporibus fortiora medicamenta adhibēda sunt: debilibus imbecilliora. Ego porro infantibus qui adhuc a nutrimentis aluntur, lentem cum modico pane, & medulla cerui, aut vituli exhibeo. Ad nūscō etiam cibis nonnihil ex astringentibus fructibus. Quandoq; etiam de lactuca, fende, solano, & portulacæ condicio aliquid, si aphthæ sit inflammata. Quod si cibum assumere nequeant, nutriticem eiusmodi victu alo, vtiq; cōcoquat rectè, prospicio. Verum tamen etiam infantes illino, si quid subrubras videro aphthas: in principio quidē, iis quæ moderatissime astringunt, & frigefaciūt: dein verō, eis quæ citra mordacitatē discutunt. Si verō subflaua videro, iisdē vitior, sed magis refrigerantibus. At si pituitosiores, astringentib. vt si nigrescētes, discussoris generosiorib. Ceterū in maioribus pueris, eiusdē generis facultatibus pharmacodōtū etiam in perfectis & duris corporibus, singulis relictis facultatibus fortissimis vitior. Sufficit autem mihi in his per omnia misyos vsus cū vino astringēte, quod tum intendit, tum remittit vim suam, prout magis aut minus vinū fuerit astringens: & prout crassus aut liquidus effici pharmacum ex misyos ac vini mixtura. Quod si sordida appareat aphthæ, misy cum vino mulso tero.

His verō qui fortiora quā misy, medicamenta postulat, ærugio similiter dissoluta, est vitilis. Cōmodum est etiam pharmacū ad hanc rem, chalcitis oleo trita. Atq; hæc quidem efficiatiora. Moderata verō, & maxime ad incipientes affectus, omphacium cum vino & enomeliet: similiter etiam rhus. In pueris sufficit rosarū flos, & ipse etiam rose ficæ. In summa verō, moderate aphthæ, maxime in corporib. teneris, moderatis pharmacia opus habet: fortes verō & maxime in duris corporibus, curantur a validioribus. Fortia pharmaca intelligo, tum quæ astringunt vehementer, tum quæ etiam mordicat: sicut moderata, quæ prorsus sunt mordacitatis expertia, nonnihilq; astringūt. Porro oleū per se, infensissimū est aphthæ affectui: vel vti etiam chalcitis: quandoquidem alterum quidem lumentat, & sordes gignit: mordet autem vehementer dialcitis. Verum moderata mixtura ipsorū, optimū pharmacum

Oliuæ mēria condita discutiant & vehementer astringunt.

Aphtharū cum suis ex colore de gnosco naturā.

Fortiora corpora validioribus remediis medicantur, vt imbecilliora mitioribus. Aphtharū quæ infensissimæ infans, curandas.

Columellæ nata melle: aut melle illita.

Pancibus inflammatis remedia ab aulepiade descripta.

Aphthæ aut oris vlcera, propriè sananda sunt infantibus.

Aphtharū curatio per moderate astringentia.

Aphthæ variæ remedia à variis descripta.

Aphthæ moderatè medicantur medicamentis descriptis: vt melancholicæ, fortiora.

Aphthæ si opus sit medicantur ex chalcide et oleo moderatè commixta.

macum

Sarcotium
pimum si ex
cerato & cro-
pae.

macum efficit. Nam quemadmodum ex cerato & argumine incarnans ethici pharmaci solet, tamet si ambo per se sunt contraria carni gignenda: ea dem ratione ex oleo & chalcidide apium urdis-
camentum conicitur.

GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorum secundum partes, lib. VII.

De affectionibus contingentibus circa
respirationis organa.

Arteria phar-
maca quae de-
canatur.
Apera arteria
ex quibus con-
fit particula-

Vox quando
intercipitur.
Rauco quae
de gignatur.
Vox organa
quae.

Aperae arteriae pharmaca, mos est appella-
re arteria ca. Vocat enim arteria asperam,
via illam quae ducit a larynge ad pulmones,
ex cartilaginosis corpusculis, brachiis ductis, co-
lilatam: vnde eam tota arteria, interdum dicitur
bronchios. Vestit autem ipsam utrinsecus quaedam
crassa membrana, quae ob crassitudinem nonnulli
tunica nominant. Scripserunt porro veteres multa
& diuersa medicamenta ad affectus organorum
respirationis: ad vocemque tum intercepit, tum rau-
ca. Etenim ubi instrumenta vocis ab humiditate
vehementius atque tenacius unipacta tuerint imbu-
ta, vox intercipitur: quod vero moderatus lumen
dilatant, oboritur rauco. Organa vocis quod
dam, intelligit arteria, et larynx, & pharyngem,
siue epiglottida. Qui igitur ex vehementi clamore
vocis amplius oblectam habet, siue fundus quaedam
affectus contingit in illa tunica asperae arteriae in-
terna, ei quae manibus, cruribusque, & musculis, via
plurimum laborat. Ceterum curacionis genus
evariat. Si quidem crura & manus confricare per
oleum licet, quod per cutem in adhaerentes musculos
penetrare ipsius possit facultas. Iuxta asperam ve-
ro arteriam cartilagineas possit cutis fuisse, prolubent
in subiecta pellucida trasitum facultans vngue-
torum mollientium. Itaque auxiliorum materia co-
gruentium respirationis organis, quod ab aliis pre-
dicta est, tum etiam a balneis dulcium aquarum, cibisque
& leuibus, & laxantibus. Si qua vero asperam sen-
tiantur, cibis ventrem est ei qui diutius haret par-
tibusque cum loco affecto commercium habet:
Est enim vna, eademque sibi continua & cohaerens
tunica, quae pharyngem, laryngem, gulam, & in-
terna ipsius asperae arteriae vestit, obducitque. Qua
re cibi congruentes tunc erunt, qui ex lacte, amylo,
alica, ouis, & libis dulciter coctantur. Si vero per
haec non curetur affectus ipsa, inuenta sunt a medi-
cis pharmaca sub lingua tenenda, ob idque hypo-
glottides appellata: quae eadem facultate cum arteria
eis vocatis praedita, ex vino Theriaco, gummi, tra-
gacanthia, & glycyrrhiza coquantur: quae laeuigata
quidem reprimuntque omnes asperitates, quicquid ve-
ro reliquum est ex inflammatione, decoquant, & cito
persuant. Qui autem pharmaca lingue suble-
det, patienti sit laboris oportet, ut ipsum paulum
liquescentem, in larynge excipiat, retentum in te-
rim tulsit, si qua excitari videatur. Impossibile est
enim, ut hi clari vocem edant, citra visum phar-
macorum absque cinnomonia extergentium: qualia sit
faba fresa alba, plicina, ac semine bini torrefactum.
His magis detergantur resina terebinthina, thius-
que, ac desumptum mel, & amygdalae amarae:
quemadmodum his rursus fortiora sunt farina
erui, semine homini, radix indus, panactis. Certe

Respirationis
organum male
affectum rursus
diu vnde potest
da.

Tunica eadem
vestit gulam,
pharyngem, laryn-
gem, interna asperae
arteriae.

Hypoglottides
ex quibus con-
sistunt.

Hypoglottides,
quomodo sunt
tenendum.
Extergentia ad
vocalis puritatem
facientia, quae
sunt.

ram his omnibus viua mollia, & passum creticum,
& Theriacum, & Scybelites, & fapa, & decoctum ca-
ricarum, conueniunt. Est autem ab affectionis prin-
cipio, visum ad finem eiusdem paulatim progredi-
dum a leuissimis tunc cibis, tum medicamentis, ad
ea quae defuturum detergantur vehementius. Igitur
primi ordinis sunt tragacantha, gummi, samius
alter, amyli, sorbitio ex alica & trago, la c, panes
dulcissimi, oua sorbitia, fefama, & nuces pinex,
quas strobilos vocant. Ab his autem deinceps est bu-
tyrum, & glycyrrhizae decoctum: id quod praestiterit
ad saporem ex melle, vel ad Creticum passum misce-
re, rursusque coquere. Haec citra in affectionibus in-
flammatiis circa arteriam atque laryngem oris como-
da in principio sunt, donec moderata inflammatio
habet: ac per omnia. A viis post hoc tempore
abstinendum est. Quum vero moderator laeta
inflammatio fuerit, vinum dulce Theriacum, aut
Scybelites bibere licet: quo tempore enim butyrum
est aptum, & sorbitio ex amygdalis, necnon ex la-
cte & melle diutius coctum, amyli inieci, aut
siligine. Qua sane victus ratione inflammatio qui-
dem ipsa sedatur: relinquunt tamen humiditas mul-
ta, ob quam impossibile est clari vocem profecti.
Quare transire tunc conuenit ab his edulis, ad
omnia ex melle cocta, & ad fabam fresam elixam,
& plicinam, & brassicam, & porrum probe coctum. Si
militet etiam pharmacorum visum idoneus est, quo
tempore inflammationis aut asperam praecellunt, eorum
quae denudentur sub lingua: post hoc magis
detergentia & resiccantia exhibemus: idque gra-
datim facimus, donec ad ea quae credimus non-
nihil fortissimi perveniamus. Deinceps igitur
arteriacas quae a veteribus prodita sunt eligens
praestantiora, huius methodo adiciat: quae quidem
nec discernere, necis probe vi poterit, qui in
commentariis simplicium medicamentorum ac-
curate non fuerit exercitatus.

De arteriacis ab Andromacho scriptis.

Thuris, myrrhae, croci, sing. drac. j. scilicet drac.
j. passu Cretici sextar. iij. Scilla in passu coquid,
donec insipierit passum: deinde scilla abieciat, in
sparguntur reliqua: sing. creticis, hoc est, delongi-
bile pharmaca.

Alia arteriaca confectio.

Alotis sextidem: croci vnc. j. mastiches tantum-
dem. Confectio. Soluit enim aluim, decoquuntur
(croci ratione) ea, quorum gratia exhibentur.

Alia leniens exasperato, concoquuntur
& extergens.

Thuris, succi glycyrrhizae, sing. vnc. j. tragacanthae
drac. vi. nardi drachm. j. myrrhae, amomi, croci,
sing. drac. iij. mellis Arctici quod sit sans.
Confectio.

Alia arteriaca, optima ad tabidos, & ossis in-
teratos pulmones & thoracis affectus. Cinnamomi,
thuris, vniusc. vnc. j. succi glycyrrhizae,
myrrhae, tragacanthae, nardi Indici, amomi, sing.
drach. iij. croci drach. j. Melle Arctico excipito.

Alia ad arteriam affectum, vlcera pulmonis, puris
& sanguinis refectionem, fluxionemque in thorace,
& ad ea quae egre educi possunt vehementer ef-
ficax. Resina terebinthina, croci, Ciliac, thuris,
myrrhae Troglodyticae, cinnamomi, amomi, nucis
pinex, glycyrrhizae, abique medulla, aseris
famei, chalbanis, costi, singul. drach. iij. nardi Sy-

Vari autem im-
pedita, aut rau-
ca, ob inflam-
mationem afflic-
ta circa laryn-
gem, aut aspe-
ram arteriam
obicitur, qualem
visum ex medi-
cina ratio con-
ueniat.

Arteriaca, hoc
est, ad affectum
organorum vo-
cis & respirationis
tunc tunc gignit
tunc, pharmaca
Andromachi.

Tabidos arte-
riacis optima.

Phlegmatis
arteriaca rem-
filla.

riacæ drach. i. s. calix nigre drach. i. tragacanthæ, palmularum Syriacarum carnis, sing. drach. iij. Mellis Attici heminas iij. Conficito.

Hypoglossides, hoc est, orbiculi sub lingua te nedi, ad alpredines gutturis, interceptâ vocem, & sanguinem reiectantes. Tragacanthæ drach. vj. gummi drach. v. thuris drach. j. obol. j. myrrhæ drach. j. obol. i. croci tantumdem: succi glycyrrhizæ drach. j. obol. iij. aut rad. drach. q. s. piperis albi grana xxv. palmularum pinguium carnis drach. iij. Tragacantham passo maceratam & tri tam reliquis tritis cōmittito, singitōy catapota magnitudine fabæ.

Arteriacæ delingibilis, ad tabescētes, punulen ros, atq; hydropas incipientes, & tussis in vetera tæ congruens. Datur per diem & noctē cochlearij mētura. Succī scilicet sext. iij. passī Cretici sext. iij. vini Falerni sext. viij. mellis Attici sext. iij. myrrhæ trientē. croci, thuris, vtriusq; sextantē: aristolochiæ oblongæ minam j. s. glycyrrhizæ minam vnam: radicis eryngij sextantē: calix, nardi Celtici, singul. vnc. j. xylobalsami bessem. Lignosa ista contrusa in vino macerato per tridui, deū ad lentū ignem ad terras coquito, atq; ita ex primi ro, & tertientis abiectis, passum, mel, & scilicet fuccum cōiuncto, & ad mellis crassitudinem coquo. Crocum verō, thuris, cum vino terio, atq; vbi opimē habuerit pharmacū, addi ro: postq; verō fuerint modicē fusi, ab igne tollito, & reponito ad vsum.

Alia arteriaca media, mediis congruens arteriæ affectibus.

Croci, vix passæ exacinate, vtriusq; drach. j. amygd. dulcium drach. viij. myrrhæ obolos iij. tragacanthæ drach. iij. piperis albi obolos iij. melle cocto excipiantur.

Cronis Arteriaca, ad vocem interceptam.

Ficum & eryngium probe coquito, & ad decoctum ipsorū gummi addito, vt melle durior confectio fiat: exhibetōy ad noctem.

Alia eusdē, faciens ad affectus arteriæ, & vlcera tum aurium, tum etiam pudendi. Thuris obolos iij. myrrhæ drach. i. passī cyathos iij. Passum ad mellis spissitudinem coquito, dein myrrham & thus cū passio semicocto ablato, misceat. Facit etiam ad dysentericōs & coliacos. Rectissimē autem fecerit, qui arteriacas concoquētes atq; lenientes, in duplici vase coxerit: nempe vasculum quod coquendum pharmacum cōtinet, in aliud plenum aque feruentis imponens.

Confectio Cronis ex capitibus papaueris, diacodyon dicta, ad affectus organorum respiratoris conduens. Capita papaueris agrestis ostingēta: quæ sextarios lxxx. Coquito ad tertias, hoc est, donec fæccida appareat: atq; expres sū addito mellis lib. x. Si verō variā efficere vis, adde croci, fucci hypocistidis, singul. drach. xij. thuris drach. vj. a cæci drach. xij. Opima tamen est simplicissima.

De vfu confectiois ex papaueris capitibus.

Vius eius est in us qui somno opus habet: quibus etiam ex opio confecta sepe exhibere consue mur. Opus habent maxime huiusmodi, quibus tenuis nā destituta.

tē rufum. In talib. ego etiā ex sapa, hoc est, hepse mate, siue multo cocto, quod etiā siron vocat, phar maci cōposicionem parare solco. Quin & per passum aut Theriū Cretici melius est q; per mel coctū fieri, vbi fluxus valde tenuis extiterit. Mel siquidem fugiendum nunc est, quum tenuis fluxionis augeat, facultate tenendi præditum. Admiserit etiam huiusmodi phar maco glycyrrhizæ, ita vt simul cū ipso coquantur. Si verō in pulmone consistat copia humoris delapsi à capite, cōfectio ex melle est præstantior. Datur cōmoderata mensura duorum cochleariorū satis magnorum copis. Auges autē & minus hanc copiam, respiciens ad magnitudinē corporis cui exhibiturus es, necnon ætatem, anni tem pus, atq; regionē. In omnibus enim his, frigidioribus minimū dabis, calidioribus amplius.

Arteriacæ ab Alcibiade scriptæ.

Brasice fuccum melle coctum lingendū ex hibe. Alia. Cremoris eryngij in aqua cocti, heminas iij. Cremoris caricarū similiter coctarum, tantundē. His adde gummi subtilissimē dissoluti drac. viij. coquito diligenter ad arteriacæ spissitudinem, & inde cubitum iuris ad cyathi mēsuram lingendum dato. Alia. Chalibini drach. vj. piperis drach. j. nutritundem, mellis Attici cyathos vj. Chalbanum & mel coquito, densatq; adicuo ceteris, vtiōy. Alia insignis. Croci, myrrhæ, fucci glycyrrhizæ, thuris, calix, sing. drach. j. piperis grana xxij. passī Cretici sext. iij. mellis Attici cyathos vj. vtere.

Hypoglossis Dioscoridi.

Croci, myrrhæ, tragacanthæ, fucci glycyrrhizæ, sing. drach. j. nuces pineas repurgatas, contrasissq; numero. lx. amygdalas mundas totidem. Excipiantur melle decocto. Datur nuda ponitæ magnitudine sub lingua tenenda.

Alia Mithridatis.

Myrrhæ, croci, vtriusq; drach. iij. nardi Indici, terebinthinæ, vtriusq; drach. i. thuris, calix, cin namomi, sing. drach. j. passī Cretici heminas iij. Passum & terebinthiū ad perfectā compagem coquito, & cum siccis cōmittito: indeq; ad nucis ponitæ magnitudinē sub lingua tenendū dato.

Alia mirisic faciens ad affectiones thoracis.

Farinæ fabacæ tostie hem j. indis Illyricæ quæ drantē, nucum pinearū tostiarum sextantē, pulegij aridi cōfusi sesquidrachmam: seminis vrtice drac. j. piperis vnc. s. Mellis boni sext. iij. Farinā cum melle ad densitatem coquito. Seminis lini etiā tusti, tosti & cribrati heminam vñ in prom pta habeto, cum ceterisq; adicito.

Alia ad rufum & spiritus prolationem, valde probē expurgans.

Hysopi, pulegij, vtriusq; sextantē: iridis, sem. sinapis, nasturij, anisi, piperis, sing. vnc. j. tusa & cribrata, melle cocto excipito. Datur cochlearis boni mensura.

Confectio ex marrubio Platonis.

Myrrhæ, syriacis, opij, fucci marrubij, chalban, æquales partes Vtere melle cocto exceptis. Pharmacum Harmonia dictū, ad destillatio nis superabilemq; defluxum conduens. Sey sis, castorij, piperis, cardamomi, singulorum drach. iij. opij, myrrhæ, seminis hyoscyami albi, sing. drach. iij. passio excepto in cataporia reduci cito,

Hydropis recen to optatum me dicamentum.

Mellis vñm jo quodam est, vbi trano fit vñ à capite ad asperam erro riam destilac recipiendum autem dum crassum. Diacodyon me dicamine vñm di modum.

Arteriaca medi camenta ob Alciade re lecta.

Hypoglossis, hoc est, media men sub lingua tenendum, Dios coridi.

Hypoglossis Mithridatis.

Vaci interceptæ arteriæ Cronis.

Vlceribus aurium, pudendi, medicamentum.

Coquenda offe arteriaca lenientia in duplici vase, quo modo. Confectio Cronis noua.

Hypoglossides noua, atq; vñm.

Diacodyon, hoc est, ex capi tibus papaueris confectum med icamentum, quibus tenuis nā destituta.

Marrubio ca lida medicamentum. Harmonia di lioni medicamen tum destillari ad pelus con ferunt.

cito, datq; ciceris magnitudine ad somnum.

Medicamen Andromachi, Ambrosia dictū, ad plithificos & febres repententes per circuitus, Nardi, croci, myrrhæ, costi, calicæ, cinnamomi, iuncti rotundi odorati, piperis nigri & albi, castorei, claubani, terebinthine, styracis, succi papaueris, seminis hyoscyami, sing. drach. j. tragacanthæ drach. vj. anisi, sem. lini, ling. drach. j. mellis qd sit (satis: vini Falerni heminam. Tragacantham vino sufficienti macerato, & reliqua simul cum melle cōmittito. Datur febrientibus sequeunda clima ex aqua mulsæ: febrentibus vicia diutius cum melle & aceti cochleario vno, & semini Falerni cyathis duobus.

Aliud ad omnem tussim.

Anisi drach. ij. costi obolos iij. myrrhæ, castorei, chabiani, piperis alibi, sem. hyoscyami, opij, succi glycyrrhizæ, sing. drach. j. passo excipito, redigitoq; in catapota, ciceris magnitudine.

Aliud ad omnem tussim, & fluxionem, & abscessus internos.

Sagapeni, gētanæ, myrrhæ, opoponacis, piperis albi, sing. drach. ij. bacchari lauri mund. drach. iij. trita, & aqua excepta, exhubeto ad græcæ magnitudinem fabæ: ischiadici tamen paulo plus, ex vini diluti cyathis tribus.

Derectione sanguinis.

In resectione sanguinis primū periculū est, ne immoderate eius vacuum fiat. Vbi verū sup pressus est, curatio eius quidē, quæ ex referendē osculi alicuius vasis configit, p obturationē sit oscula dilata: eius verō quæ ex vasis ruptura, p cōglutinationem eiusdem: quemadmodū eius quæ ex erosione, p erosorū renutitionem. Obaturatur igitur osculum referatum, per astringentia: conglutinatur autem ruptum, per eadem, & quæcumq; ipsis in compositione miscentur, citra mordacitatem resicantia, & glutinosum quiddam habentia, velut est Lemnia terra, & Samius asper. Renutitur corrosa per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignētia. Igitur iuxta primam rationem, ex talibus pharmaca cōponuntur congruentia ad curandā sanguinis resectionem: iuxta secundā verd, in iis qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut larynge reiectat sanguinem, miscentur prædictis cōgruenti mēsurā calida & tenuiū partiu medicamenta, quæ infestissima sunt tribus illis affectionibus dictis: miscentur iniquā grātia distributionis, vt videlicet astringentibus medicamentis præparēt, ac veluti sternit viam. At quum ex locis circa stomachū, aut aliu, aut aliquod intestinū, sanguis educit, huiusmodi pharmacorū mixtura nō est opus. In festissimū tamē his est id genus pharmacorum, quod in tantū refrigerat, vt affectū stupefaciat: quamvis & hæc miscēatur medicamentis ad sanguinis resectiones cōgruentibus: quū aliorū somnum conciliant, & cōmodissima sint ut qui tussi lancinantur, sistentia nimirū sanguinē qui ad vas affectum defertur: atq; hoc per se sui frigiditate. Atq; hi sanē sunt compositionis scopi.

Quæ Andromacho ad sanguinis resectionem scripta sunt.

Acaciæ drach. iij. rosarum siccarum, balastii, sing. drach. viij. gummi drach. ij. tragacanthæ drach. j. cum aqua pastillos facio, quorū singul

pendeant drachmā vnam. Dato ex aqua pluuiæ: habet enim vim astringendi. Aliud siccus sanguinē. Croci Ciliici, myrrhæ, iris, nardi Indicæ, thuris, acaciæ, sing. vnc. j. succi papaueris, costi, piperis, sing. vnc. s. rosarū siccarū trientē. Mel le excipito. Datur sub Aegypnæ magnitudo.

Aliud. Succu hypocistidos, balastii, acaciæ, gallæ, cynorū, sing. drach. xij. succi papaueris drach. vj. croci tantundem. Redigito in triobola res pastillos. Aliud egregium. Balastii, acaciæ, opij, myrrhæ, sing. drach. ij. tragacanthæ, succi hypocistidos, florum rosarum, seminis hyoscyami, singul. drach. iij. thuris drach. iij. excipito succo polygoni.

Aliud ad hæmorrhoides & dysentericos.

Floris rosarū, opij, acaciæ, gummi, balastii, hypocistidos, sing. quadrantē: gallæ vnc. j. seminis plantaginis, eiusdemq; succi, vtriusq; sextantē: lycij Indici, succi rosarum, vtriusq; vnc. j. redigito in pastillos drachmā alē.

Quæ Asclepiades ad sanguinis resectiones scripsit.

Radici polygoni maniculæ: rad. symphyti tantundem: rhois rubri acatubulum: aq; sexta rios iij. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathū vnum dāro, cum gummi tenuissimē triti & dissolui drachma vna. Aliud. Mororū reborum nōdum maturorū lib. xvj. aq; plume sextarios xvj. coquito ad tertias, & expressum huiusmodi quorem reponito. Idē licebit facere etiā de vni fructu. Aliud. Balastii, terræ Samiæ, corioli thuris, gummi, singulorū æquale pondus. Trita & cribrata exhibe cochleari mēsurā in aq; sili gidæ cyatho vno. Aliud. Succu hypocistidos, succi acaciæ, succi rhois Syriaci, balastii, vna, gummi sing. drach. iij. Vini myrris quod iuuat est. Gonflicto, & vitto.

Pastilli ex succino, hæmorrhoides, diarrhoeæ, & recentis tussis, plithificis, sanguinis resectionibus, purulentis, cæciacis, dysenterici, & multos cōferens. Psylli mundi drach. xij. indici thuris, mastiches, ramentorū siccarū, opij, sing. drach. xxx. opij drach. xv. Psyllum in aqua calidā cōiectum macerari sinit. Vbi vero hoc glutine & mucilage ipsam aquam aliorum, p pastillos cōprimto, & cum eo pharmacum in pastillos cōprimto: ex quibus obolus vter ad sternū dāro. Sing autem aq; sextarios xvj.

Pastilli ex corallia.

Corallia, mte Samæ, vnaq; drach. vi. Balastii, thuris, sing. drach. xij. Linnæi, drach. iij. in mēsurā huiusmodi. Vbi vero hoc glutine & mucilage ipsam aquam aliorum, p pastillos cōprimto, & cum eo pharmacum in pastillos cōprimto: ex quibus obolus vter ad sternū dāro. Sing autem aq; sextarios xvj.

Quæ Andromacho ad sanguinis resectionem scripta sunt.

Acaciæ drach. iij. rosarum siccarum, balastii, sing. drach. viij. gummi drach. ij. tragacanthæ drach. j. cum aqua pastillos facio, quorū singul

Dysenteria remedium.

Hæmorrhoides remedium.

Pastilli ex corallia.

Pastilli ex corallia.

Pastilli ex corallia.

Pastilli ex corallia.

Pastilli ex corallia.

Pastilli ex corallia.

Pastilli ex corallia.

Alia iucunda appellata.

Iridis Illyricæ, succini, croci, mastiches Chie, sing. drac. xxx. psyllis drach. xlv. fucci papaueris drach. xv. cum aqua pluuiâ passillis, quorû singuli pendeant drach. j. s. conficito, & exhibeto. Psyllium tamen per diem ac nocte aqua pluuiâ macerato: dein coqueto, & exprimito, cremoremq; cum aliis misceto.

Alia dolorem sedans ad oēs internos affectus & sanguinis reiectiones, vnde cūq; crumpit. Facit & ad nepliriticos & hepanicos. Hâc ne prius dederis, quam mercede accipias. Cinnamomi, casie, vtriusq; drach. ij. myrrhæ, piperis vtriusq; chalbanî, sing. drach. j. opij drach. ij. Trita cū melle pauco, in catapotia redigito, partim magnitudine fabæ, partim quâtrate arci. Dato iuxta cuiusq; vires cum aqua, aut pro iudicio tuo.

Alia ad eadem, Mysterium dicta.

Croci, costi, castorij, asiri, sem. hyoscyami, opij, styracis, sing. drach. j. Excipito melle, vitiorq;.

Anodyna ad easdem affectiones ab

Asclepiade scripta.

Seminis cucumeris hortensis decorticati drac. viij. amyli drach. iij. sem. lini, sem. papaueris albi, vtriusq; drach. ij. Tusa & cribrata excipe tragacanthæ cremore, & in dracmalis passillis redige. Dantur oboli iij. ad febrientibus quidem, ex vino febrientibus verò, ex succo rhos. Faciunt ad fluxiones thoracis.

Côfectio Panchrestus dicta, hoc est, multi versus, ad tussim antiquam, purulentes, orthopnoicos, tabescentes, ad omnesq; inflationes. Pellit secundas & menses, medeturq; vesicæ affectibus. Te rebintit drach. viij. styracis drach. vj. myrrhæ, drac. v. croci, iridis, chalbanî, sing. drach. iij. Seminis hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti, opopapanis, sing. drach. ij. piperis, spumæ nitri, vtriusq; drach. j. passio excipito.

Annodorus Anisacelu admiranda, cōfessio ad affectiones prædictas, renensq; venenis, externamq; febrem repetetes p̄ circuitus, vna hora ante exacerbatione exhibita. Cinnamomi, costi, chalbanî, castorij, fucci papaueris, piperis nigri & longi, styracis, sing. vnc. j. mellis sextarii vni. Anida teruntur & cribrantur. Chalbanû coquitur cū melle: excolatis verò reliqua addunt, reponuntq; in vitreâ pyxidem, argenteâ in ve. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudine, cum aquæ mulsæ cyathis duobus, instillata digito guttis aceti nouē.

De orthopnoia.

Qui citra febrem dense respirant, ob symptomata id dicuntur asthmatici, hoc est, anhelosi. Eodem etiâ ob symptomata aliud orthopnoicos appellant, quod thorace recto spiritum cogitur, metu suffocationis. Minus est autem quod hi inspirant, quàm pro vîu respirationis, etiam si thorax ipsi plurimû dilataci. Ex quo manifestû fit, inter-nâ capacitatē coarctatâ ipsi esse præter naturâ: id quod ægri etiâ laud ob scuro sensu perceptit. Fit etenim & purulentes locorû coarctatio, ob collectû inter thoracē & pulmones humore. Fit et peripneumonici, ob pulmonis inflammationē. Restant autem adhuc affectiones duæ, quæ angustiam locorû faciunt in viis per quas aer inspiratur: quâ aut humore crassorum & viscidorû multitudine pulmonis brôchia fuerit impacta, aut tu

mor abscessus similis in ipso cõstitit. Cæterum curatio ambarû affectionû aliquid cõmune habet, aliquid priuatû, & alteri tantû propriû. Cõmune quidem vtriq; est, vt absumat redvndantia humoris affectiones gignētis: propriû, affectioni quidem viscidorû humorum, vt per attenuantia & extergentia pharmaca dissipentur: verò quæ propter tumorem accidit, vt per attenuantia & excruciantia eadem consumptio fiat: quæ curatio rursus omnibus in profundo abscessibus cõmunis existit. Vini itaq; potus ambabus competens. Omnis autē potus modicus fit in iis qui alibi abscessum habet: multus cõtra, in illis quibus viscidis & crasis succis sunt obturata bronchia. Quippe pharmaca eiusmodi repurgantia humores, tules necessarii excitant: uo verò facili per ipsum reicitur, quod expurgatum est, nimium ob crassitudinē: quapropter humectatione multa opus habet, quò eficeratur facili.

Quæ scripserit Asclepiades ad dyspnoicos.

Scilicet cruda succi exprimito, eiq; parem Attici mellis mensurâ addito, & ad prunas admodum cocto. Dato inde & ante & post cilii myrri mensurâ. Aliud. Origani drach. viij. comæ thymati, illis Illyricæ, calamithæ siccæ, piperis albi, anisi torrefacti, sing. tantum em. Cribrata melle cocto excipito. Dato nucis ponticæ magnitudine. Aliud. Vux passæ Rhodiz, exacinate, acetalibû: farnigraci loti tantundem: aquæ pluvie sextarium j. Coquiro donec dissoluantur, & liquorem excolatum reponito. Ex hoc præbeto assidue, & iuxta singulas irritationes, cyathi mēsuram calascit. Aliud. Anisi, sulfuris vivi, vtriusq; quadrantem: ammoniaci thymiamatis, castoris, melanthij, singul. drach. iij. aqua diluta in catapotia cogito, vniq; in aceti mulli cyathi tribus, ppinaro. Hæc omnia sunt ab Asclepiade scripta illis, quibus pulmonis bronchia crasis & viscidis humorib; sunt repleta. At verò abscessus qui attenuantibus & resiccantibus opus habet, maxime gaudent aromatatum facultatibus, quæ & tenuium partium sunt, & resiccatoriz, præter hoc quod calascit. Porro iis qui propriè orthopnoici & asthmatici nominantur, pharmaca conveniunt secantia citra calascitionem: ob idq; iuuantur maxime ab scillâ co aceto, necnō ab scillâ, & ab aceto mullō, eodēq; scillâco. Quemadmodum autem in hac affectione vehementer cauendum est, ne calfaciamus, propterea quod viscidis & crasi succi non modo nō iuuantur, sed offenduntur etiam vîu calascientiū: eodē modo quæ valde refrigerant sunt omnino vitanda.

Quæ pharmaca scripserit ad eiusmodi affectiones Andromachus.

Ad dyspnœa. Sulfuris vivi drach. j. Sem. rutæ sylvestris tantundem: aristolochij, ab sinthij, ammoniaci thymiamatis, abrotorij, sing. drach. iij. trita cum aceto in catapotia fabarum instat redigito. Dato mane tria, & vespere totidem. Aliud. Ammoniaci thymiamatis, abrotorij, sing. drach. ij. sulfuris vivi drach. j. formato cum aqua passillos, & cum aquæ mullæ cyathi tribus præbeto.

Aliud. Scillæ, sulfuris vivi, bituminis, sing. partem vnam. Dantur oboli iij. in aceto mullō.

Potum esse de huiusmodi in quibus organa respiratoria ab aliquo tumore augescunt: citra multum illis, quibus bronchia à crasis et viscidis succis obstruuntur.

Dyspnœa remota ab Asclepiade scripta.

Scillâco aceto tantum orthopnoicos & asthmaticos maxime opuntur.

Dyspnœa remota ab Andromachos.

Anodyna ad internos affectus ab Asclepiade scripta.

Panchrestus Asclepiade multis versus ad varios internorum affectus.

Anisodorus Anisacelu admiranda.

Asthmatici cur sic dicuntur. Orthopnoici cur sic dicuntur.

Orthopnoia causa.

Purulenti.

Peripneumonici.

Respiratorium organorum angustia quæ efficitur perijunt.

GALENI PERGAMENTI de compositione medicamentorum secundum partes, lib. VIII.

De pharmacia congruentibus oris
ventriculi.

Porro difficillimum est, ad veritatem eos revocare, quod se fecisse seculi feruliter addiderunt. At qui prudentes sunt, veritatem arguti de fiderio tenentur, si (vt spero) custodient ea que in natura nobis vel in indicandi instrumenta concessa sunt, ad actionum viam cognitionem, Exple-
vientiā nempe & Rationem: quorum semper alterum, ad perfectam disciplinam, altero indiget. Etenim falsæ opinionibus animos hominum præoccupantes, non solum furiosos, sed ad eam cycos efficiunt, vt videre nequeant, quæ ab aliis obsequi-
cne cernuntur. Proinde fit, vt complures Empirici, nec pauci etiam ex iis qui sese Methodicos iactant, per pharmacia relaxantia curantes inflam-
mationes oris ventriculi & hepatis (quæ miscellæ astringentium desiderant) ægros omnes ad vnum occidant, atque in exitum adigant. Quippe nisi facultatē quæ firmitudine addat, in illarum partium affectibus ad relaxantia permisceas, vita in discrimine vocatur. Igitur astringentia omnia quæ ad illarum partium affectus, partim empla-
stris atque ceratis mista adhibentur extrinsecus, partim intus vorantur, imprecanturque ea ipse indicamus, æquiparant ab illis quæ conveniunt in inflammationibus: quod maxime in ipsi ægri per-
riclitentur. CERATVM ergo quod assidue vtor, ex aloë, mastiche, cera pontica, & vnguento nardino consistat. Ceterum ad vincti vnam mensuram olei, hyeme quidem octo, æstate iuxta septem ceræ partes induntur. Liquidius igitur in duplici vase, refrigeratissq; & derasis, adde-
re aloës & mastiches, reduktorum in pollinē, vtriusq; dracm. j. & quandoq; plus, sic tamen vt ad seque drachmā vnam omphacitid quod
primo iniici debet in cerati præparatione. Similitel-
cebebit abstinēti succum misceat, quandoq; etiam ambo: sicuti & ternā hypocistidis, & quartam enanthedis. Quin & rhois succum non raro admiscui. Cerati tamen augenda est copia, iuxta proportionem numeri aliorum pharmacorum. At inveterata atq; induratis inflammationibus, magis varia conveniunt pharmacia, & quæ ex aromatis quippiam habeant, nonnulli illos etiam cum mollentium atq; detergentium sortiantur: cuius
modi est quod ex melilotto conficitur, cōgruens omnibus iuxta præcordia inflammationis. Porro os
ventriculi, nonnulli hodie cōmuniter stomachi nominant: quoniam partem olim frequentius car-
diam, hoc est, cor, appellabant: unde vox cardial-
gia est deducta, q̄ minime quidē cordis, sed oris
ventriculi dolore & mordicatione significat. Funt
quippe in ipso rō morbus, tum in explebilia
fames, vt interdū etiam nauseosæ dispositiones:
in quib. omnibus cōmunis quidam & distincti-
gentium pharmacorum usus in ventris est: admi-
ta autem sunt pleriq; ipsorum caliditatis simul
& resiccantia. Verum affectus in profundo sitos

vt cognoscamus, maximis vtamur coniecturis
est opus: ob idq; vtilissima Medici artis pars est:
quæ cognitionē ipsorum indicat. Quæ igitur
octo sunt in singulis partibus intemperatæ cor-
poris: atq; hæc omnes aut secundum solas mudas
qualitates gignuntur, aut accedente alicuius hu-
moris complexu: certè earum singule per con-
trarias qualitates sunt reducendæ ad mediocri-
tatem. Quia vero plurimæ intemperatæ homi-
nibus ex reducta danna humorū, magis quàm ex
inopia fiunt, pharmacia resiccantia plerisque magis
iuvant. Quum autem resicētia ipsa partim quid-
dam astringant, cogendo astringendosq; substan-
tiam eorum quæ coningunt: partim vero discu-
niant, & in hoc substantiam eorum dissolunt: ob
hoc ipsum sanè plures sunt qui astringētibz in-
digent. Verum si alicuius intemperies cōeat cum
frigidityte, leduntur qui per sola astringētia cu-
rantur, quæ frigidity facularis existit. Quare me-
rito plurima pharmacia per experientiam inventa,
ex miscellanea materia constituuntur, astringen-
te videlicet atq; calfaciente: quorum omnium dif-
ferentiam cognosces, si simplicium pharmacorū
facultates memoria teneas.

Confectiones stomachicæ Andromachi.

Hiera ad stomachicos: Floris iunci odorati, xylobalsami, mastiches, croci, nardi Indici, asaf-
ri, cinnamomi, singulorum drachmæ vj. aloës
lotz drac. centū. Simul trita repone, præbeo iei-
nis cochlearia iij. Sunt tamē qui ad aloës drach-
mā centū, singulorū aliorū octo drachmas adii-
ciant. Non desunt qui absq; flore iunci odorati
conficiant. Porro ad ventris subductionem illa
ta aloë est aptior: elota autem multum de medi-
camentosa vi amittit: quam etiam febricitantē
dare aliquis possit, si febris sit valde mitis. Infes-
tissima autē est aloë, vellota, ita quæ citra vitio-
sos succos intemperie assiguntur calida & sicca.
Proximam ab his cladem percipiunt, qui siccam
intemperiem habent, vel frigiditytatem etiam impli-
citant: & in vniuersum, qui ex sola qualitate par-
ticulā aliquam affectam ac lesam possident. E-
tenim intemperatæ in humoribus consistentes,
pharmacis ipsas evacuantibus egent: quæ vero
absq; his insectant, penitus cōmigrant in tabem,
ob pharmaci huius ex aloë constantia exhibitio-
nem. At vbi vitiosa humiditas perierit ventri-
culi tunicas, hiera ex aloë est utilis. Omnino au-
tē sic affectus plus aut minus adsunt nausæ quæ-
dam symptomata. Iam verò purgatio quod aloë
mollitur, imbecillior est, quàm vt vniuersum cor-
pus purgare queat. Addi illi mastiche, vt vires
eius refringat, ventriculo existens etiam grata,
& odora. Cinnamomū verò, quum ob easdem
causas, tum etiam vt partium suarum tenuitate
aperire vtrius meatus possit, fuerit geretq; atq;
atenuare, si quid viscosum aut crassum in humo-
ribz insit. Crassos quippe succos ob purgatorisq;
facultatem imbecillitatē aloë trahere non possit.
Quapropter biliosarum ventris dispositionū o-
ptimum pharmacum est. Ad hæc cinnamomum
vim obniti alteratricē vitiosorum humorum,
in id quod rateret modo responderet. Scire itaq; li-
cet, eas dispositiones q̄ a prauis succis circa ven-
trem stomachicum oboriuntur, maxime per me-
dicamenta ex aloë iuuari: mirum autem in mo-

Affectus intus
vt cognoscatur,
opus est coniectu-
ris.
Intemperantia
partium larum
fieri solent, quæ
per contrarias
qualitates reduc-
unt ad mediocri-
tatem oportet.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Stomachica cō-
fectiones Andro-
machi.

Inflammati-
dus nobis fuisse
data à natu-
ra, nascitur
ad quā astring-
entia perueniūt
utpote & vici-
ni, quorū sem-
per ad perfectā
disciplinam al-
terum indiget
altero.

Inflammationes
oris ventriculi
et hepatis, cum
gelatinam, mas-
ticellam affren-
gentium phar-
macorū deside-
rent.

Ceratum quod
ad inflama-
tionem ore vici-
culi & hepatis
maxime aptum
est.

Os ventriculi,
quod olim cor
nominabant,
nonnulli hodie
stomachum vo-
cant.

dum ladi, ab edaliis, potionibus, & pharmacia astringentibus. Cōtra verò, vbi humores nō qualitate, sed copia os ventriculi affixerint, vilius, mus astringentiū est vsus, nimis languida tunc existente ipsa particula affecta, instar laxarum ar. nictorum, quorum etiam per astringentia affectu corrigi. Porro polychresta, siue multi vsus medicamenta appellantur, quā vnum habere viginti affectionibus congruum malumus, quam tot numero alia: quum tñ ad singulas affectiones vnum aliquod destinatum, eo quod ad plures paratum est, melius existat.

Ad stomachicos hiera Antipatri.

Aloës elect. drach. iij. mastiches drach. ij. asari drach. iij. rosarum siccarum, iunci odorati, mei, phs, casia, sing. semunciam. Tritis vniort.

Stomachica Galli, affectionibus que calidiori & siccati postulant, vtilis.

Stomachica

Galli.

Corticis radices feniculi lib. s. acetii acris sextarium vnum s. sloēs quadrantem. Mellis Attici lib. j. Radices lotas ad triduum aceto macerato, deinde coquito: atq; vbi cocti fuerint expressis prociato, & affuso ad acetum melle, simul coquito. Dein aloem inpergiro, & cochlearia tria cum aqua dato. Etenim vbi per profundum ventriculi, hoc est, alius, copia, sed non praua, fuerit defixa humiditas crassa fimal & viscidā, opus est mistura pharmaci attenuatori, petrosiluique, quale est rti acetū, tū oxymeli. Si verò nec talis sit humiditas, nec talis imbibita, sola ad curationem astringentia suffecerunt. Est aut sufficiens si gnum frigide affectionis ventriculi, si æger se nō sitire percipiat.

Asclepiades stomachica, ad roborandū vētriculū, exprimendisque illius aduentitias humiditates cōgruenta.

Ad stomachi subversiones. Nucleorum feli punici tusorū succi sextarios iij. succi menthe sextar. j. mellis Attici tantundē. Cognino in fictili vase, assidue agitandū: & vbi densata fuerint, ab igne ablata reponito: porrigitōq; mystm vnum, aut duo, ante cibum.

Cōfectio ex fructibus, ad stomachi subversionem, calidioris, & dyentericis faciens.

Mila coronea numero x. forba numero l. me spila rotidem. Rhois rubri sextariū vnum. Aque conglōs vij. fructus tusos & in aquā coniectos, diligēter coquito: & vbi dissoluti fuerint, liquorem exprimito, ac rursus coquito. Quā verò retia pars liquoris superflua, addito mellis Attici lib. iij. & ad prunas assidue agitandū coquito, ac spissata reponito.

Carapotia ad subversionē ventriculi.

Rosarum recentium defectus vnguibus, drac. viij. sem. papaneris albi drach. iij. sem. hyocyami drach. ij. aloës obolos iij. asari tantundem. Cū aqua diluta in pilulas redigito, præbetōq; cicris magnitudine.

Ad ardorem stomachi carapotium refrigerans sitim.

Seminis sariui cucumeris drac. viij. sem. portulacæ tantundē: itragacanthē drach. iij. Itragacantham ouorum crudā: recentium candido dissolutam, phē trinis reliquis addito, & ex eis mistis singito carapotia, quorū assiccatorū in vmbra, sub lingua vnum teijedum dato, hęc Asclepiades.

des. In vniuersum aut fugienda ex pharmacia sunt in ventriculi affectionibus, quæ chalcantion, mandragorā, vve, an alia id genus recipiunt.

Ad voluolosos stomachi subversiones pastillas Amazonum ab Asclepiade scriptas. Seminis apn, & anili, vtriusq; drach. vij. abanthij drac. iij. pipere, myrtij, opn, castorei, sing. drac. ij. cinnamomi drac. vij. cū aqua pastillos singito, & sumum drachmā vnā dato, stomachicis cum protropi diluti cyathis iij. cholericis & vomentibus cibum, cum frigida: colicis & dyentericis cum baccarū myrti decocto: splenetici, cum hydro-melitis cyathis tribus. Ego verò, quod myrtha aliquid medicamētum cōtinuat, sine illa maior securitatis grana hoc pharmacum preparare cōsueo, pipere quantitatē rem augens. Porro per eiusmodi voluolosos dispositiones, aliquando iterum per vomitū reddit: vbi videlicet particulari affectū, & serosis medicamentis humoribus affliguntur magnopere. Quod si etiā imbecilliores sint, generalis alium. Exit itaq; in his curationis scopis, vt ad affectas partes odorata admo-uamur, cuiusmodi sunt, anisum, apn, daucus, cuminum, & fesceli. Nam quemadmodum graue oleum omnia stomachi subvertere solēt, sic odorata corrobore. Ab abanthij miscet in prescripto pharmaco, quod habear vim extergendi, repurgandi, & subducendi vniuersos stomachi humores: quodq; cōstringat, & deiet, ro bārg affe-ctū particulē addat. Cinnamomū autem fortidū omnibus, putrilaginosisq; humoribus aduersatur. Ceterum si cinnamomū non adsit, licebit cū siam pro illo aliumere.

Alia stomachica Asclepiadia compositio, vtilis ardorē sentiētibz, & ad intenos singultus, & stomachi voluolosos dispositiones. Costa, spica nardi, chryfobalanon, rosarum viridiū, mastiches, sing. drac. iij. aloës, asari, vtriusq; drach. ij. opn drac. ij. succo psylli excipito, atq; ad pastillorum formā reduco, obolosq; tres exhibito.

Ditum mihi tamē iam est, impossibile esse vt inueniamus pharmacum, ad affectiones multas optimum: multoq; præstantius esse, quod singulas eā destinatur. Porro Hippocrates siet conuulsionē prodidit ex repletionē simul & evacuatione: quemadmodum eam singulm. Quanquam hic aliquid excitari citra plenitudinem aut inanitionē solet, vbi ventriculus ab acibus, serosis, medicamentosisq; humoribus mordetur: quos vbi quis vomitu eiecerit, singultu subitō liberatur. Multi etiā deuorato pharmaco diatrium pepereon, si vinū insuper bibant, omnino singultum. Similiter ex cibo in mordacē qualitatem corrupto, nonnulli singultu, confectimq; a vomitu liberantur: vt alij ex rigore osis ventriculi corripunt singultu. Verum pueros maxime singultire contingit, tum ob alimenti corruptionem in ventre, tum ob partis frigiditatē. In vniuersum autem, vomitus est sufficiens medela

eorum, qui ob copiam, aut mordicationē singultunt: vt caliditas, eorum qui ob frigiditatē. Ex medicamentis quæ pharmacum illud cōstituant, opium, rofæ, & psylli succus, refrigerant. Spica nardi & chryfobalanon, digerit & corroboret. Asarum per vrinas deducit vniuersos succos Aloē grauos humores purgat. Crocus concoquat, & partes

Ventriculo affe-ctū fugienda ex se ea pharmacia, quæ chalcantion, mandragorā, vve recipiunt.

Pastilla Amazonum, ad voluolosos stomachi subversiones.

Myrtha vnum non est admodum catum.

Voluolosus vtri-que diffinitione est per oleum rata cordis.

Grammētia sub ventriculi madram.

Abanthij facit sat.

Cinnamomū fa-ctum.

Costa licet vi- pro cinnamomū.

Pharmacū v- num multū ef- fectū. opium, reponit nō pos- se.

Cōuulsio fit ab repletionē simul & inanitionem.

Singultus a qui- bus fit causi.

Singultus a qui- bus fit causi.

Singultus a qui- bus fit causi.

Singultus a qui- bus fit causi.

Singultus a qui- bus fit causi.

Singultus a qui- bus fit causi.

Singultus a qui- bus fit causi.

Singultus a qui- bus fit causi.

Singultus a qui- bus fit causi.

Singultus a qui- bus fit causi.

Polychresta, hoc est, multi vsus medicamenta, reliqua ab in- que ad singulas affectiones parantur.

Hiera Antipatri facit ad stomachicos.

Stomachica

Galli.

Ventriculi tunc- ca humores crassi alius im- bibiti, quales medicamenta de- siderant.

Ventriculi frigi- dam affectionem significat, pro- pter vbi sitire.

Stomachica ab Asclepiade scri- pta.

Cōfectio ex fru- ctibus, ad subver- sionem ventriculi, calidior & dy- entericis faciens.

Carapotia ad subversionem ventriculi.

Carapotia ad ardorem ventriculi, si sub lingua ti- neantur.

partes corroborat. Cofus calcaſti abvnde, aſtringitq; mediocriter. Srupefacientib. miſetur calcaſtenta, vt eorum malignitatem corrigant, eiſq; ſint inſtar vehiculi. Quippe viuentiu corpora mortificationi ſimile quod perpetitur ab eoru medicaminum uſu, quæ ex opio, hyoſcyamo, & mandragora conſtant, ita vt inſeſtantes cauſas nõ ſentiant. Quare multi qui talibus aſſidue vtuntur, particulas ad immedicabilem frigidiſſimam perducunt.

Deſcribit etiam Aſclepiades Hieme compoſitionem, in hoc ab Andromacho diſſidens, quod ille quidem alios drach. c. ac reliquoru ſinguliſq; indident drach. vj. hic autẽ octo drachmas ſcripſit, ſtorẽq; iupci odorant omiſſit, quod aliis miſcuit Andromachus: quodq; non xylobaſamõ (vt Andromachus) ſed pro illo ſit carpopaſamõ vius. Conſert autem huiuscemodi pharmacu iſs qui ob viſioſos humores, & præcipue biliſos, tardẽ concoquunt. Siquidẽ quibus bilis alius tunicas ventriculi inſeſtat, ij præſtantius pharmacum non inueniet. Cuius moderata exhibitio ad quatuor viſq; drachmas exten ditur. Similiter auxiliatur viſceru iam cõcoctis inſtillationibus. Rectẽ aut hoc pharmacu tardẽ concoquentibus, aut bilem vomitibus propinatur ex aqua cyathis quaternis: vt ex aqua muſſa, ad viſcerum inclinantem inſtillationem: ac deniq; ex vino muſſo, dum aut vrinæ clere, aut promouere menſes eſt animus. Adverte autem nos appellare drachmã, quod Romani vocant denarium.

Stomachicum dictum Aſter inexpugnabile, ab Aſclepiade proditum, ſedans dolorem, inducens ſomnũ, ac varios affectus ſanans. Myrrh; ſtyracis, nardi Indici, calici ſitula; terre Lemniæ, corticis mandragoræ, piperis, ſingulorum drach. iij. Croci, ſucci papaueris, ſingul. drach. vj. ſeminis duci Cereci, aniſi, ſeſeli, ſeminis apij, ſing. drachmas octo. Myrrha, ſtyrax, & opium, vino diſſoluantur odorato, & teruntur: acida verò cribrata miſceant, ſubigunturq; aig in paſtillos coguntur, quorum ſinguli drachmũ dimidium pendunt.

Quæ ſcripſit Archigenes ad affectus ventriculi.

Vbi ructus acidus edatur, coriandrum cõchlearij meſura edendum ante reliquũ cibum dato: inſuperq; merum bibendum. Ad exoluũ vetriculiũ abique febi, menthe ramulu contritum bibendum dato. Aut ananthen ſimiliter tritam cum uardo Indica bibendam dato. Aut marubij ſuccu cum melle: & vbi paulu quietierint, vinum cum polenta exhibeto. Aut Chig maſtiche cochlearij ex aqua frigida dato. Aut glaciẽ iſtanti quon die porrigito. Dolores oris ventriculi ſent, ac maxime iſs quibus trinitia aut deſperatio accedunt, lat aſſiniũ, aut melibree, aut babulum, ſilicibus incoctis, portum. Si vnũ cum humectatione ventriculi etiã inſtillationibus adde, anithen cum meliloto, aut roſam ſiccã cum cerato roſaceo, parum reſing vitæ habentẽ imponno. Quibus autem ob atram bilem, quam gignunt, ſtomachus inſtillatio ne tentatur, ſpongias aceto acerrimo calido imbutas ad ſtomachum ipſum imponito. Quod ſi

tenſio adhuc perſeueret, alumen liquidum cum atramento ſuono into, melle exceptum imponas. Aut hiec & aloẽ pari portione miſta, & myrteo cerato excepta. Aut armentarij bouis ſtercus atamũ vino incoctum. Aut polũtaſculum coquito, & bibendum dato. Aut calamintha decoctu per noctem ſub dio expoſitu, & melle & piperis drachma admiſta, porrigito. Soluit autẽ dolores cuminum apiumq; roſita, ſi modica portione cum aqua bibantur.

Aut aloẽ obolos duos. cũ vino muſſo, aut vino, aut aqua, bibendos dato. Aut abrotoni & thymũ, vtriuſq; obolos duos, ex vino præbe bibendos. Ligaturus inſuper extrem orũ forſitet adhibe, & circa ipſum ſtomachu cucurbitulis & ſomẽtis variis vtere. Quod ſi vehemens ſit diſtentionem, venie ſectio eſt: ac auxilium, & alui ſolano per glaciẽ poſſipinniam. Porro eos qui ex ingenti tamen linquantur animo, reuocabimus odoramentis aceti aut pulegiũ, aut malis, aut pins. Excitantur etiã ad carnẽ ſuillam aſſitam, & ad omnia quæ multum aluni præſertim ea quæ inodoroſum odorem exhibent. Inſtaura bis autem ipſos iſs quæ cõſertim vires reſicere poſſunt: cuiusmodi ſunt oua ſorbilia, bulbi, cochleæ.

At ſingultientibus rutam cum vino dato, aut nitrum in aqua muſſa, aut opium, ac coſtorũ, aut abrotonum, aut ariſtolochiam.

Medicamen ex cydoniorum ſucco, ſanans mediocres oris ventriculi affectus.

Succi cydoniorum acerum ſextarium ij. mel liſ Amci tantumdem: meliſ ſeq; ſextarium, vel ſextarium vnũ. Zingiberis quadrantẽ: piperis albi vnciam ij. Anda inſperges, vbi malorum ſuccus cum melle & aceto coctus ad mellis craſſitudinem fuerit.

Quæ pharmacã Aſclepiades ſcripſit ad affectus oris ventriculi.

Emplaſtrum ad ſubverſiones oris ventriculi, doloreſq; atq; etiã inſtillationes. Oenanthes drach. vj. croci, myrrhæ, ſloris roſarũ, melloni, maſtiche, aloẽ, corticis mandragoræ, ſingul. drach. iij. Carnis palmarũ quadrantẽ. Omnia cerato ex roſaceo conſecto extirpito, admouetõque.

Allied Nicerati, coſtiacis, dyſentericisq; admodum generoſum.

Oenanthes vn. ij. roſarũ ſeccarum, maſtiche, aloẽ, gallarũ omphaciodis, aluminis rotũdi, acaciæ, ſing. vnc. j. cere lib. j. picis brutæ quã drautem: olei myrte lib. j. Anda cõmiſſo liquiſ. Aliud ad radẽ inſigne. Oenanthes, omphacii, gallarũ omphaciodis, aluminis ſciſti, acaciæ, cynnori malipunci, balauſii, maſtiche, ſing. vnc. j. Vini myrrine, quũrum ſatis eſt ſiſ ſubigẽ. Carnis phenicobalarum ſeſcentũ, exceptis lãticio cerato vtore. Etenim in iſs, q; ſint ſtomachica, merito aſtrictoria vis dominatur. Ar in medicamentis hepaticis relaxantia miſceri aſtringentibus debent: quẽmodo dum ſit in iſs quæ iam ſub dẽ, etiã ab Aſclepiade prodita.

Malgna Nilo inſcriptum, faciens ad præcordiorum dolores, diſſoluentũ, omnem duritiẽ, ſpleneticis atq; hepaticis maxime ſalutare. Cera, ammoniaci thymiamatis, olei cyprini, ſing.

*Suprafacitib.
miferi calca
ſtenta, vt or
ũ malignita
tem corrigant,
eorumq; vires
deducant.*

*Hiera quũ
tenuent.*

*Hiera modera
ta exhibito ad
quatuor drach
mas extendunt.*

*Drachma &
denarius Ro
manũ eſt idẽ,
ſtomachicum
Aſclepiades, di
ctum Aſter in
expugnabile.*

*Ventriculi affe
ctibus congru
ta ab Archy
ge prodita.*

Sto.

Sto.

Sto.

Sto.

*Cucurbitulas
admodum
aſſe dolenti v
triculo, monet
Archigenem.
Deliquit a
nimo pariter
en ſane ſubi
qui, quomodo
ſiſ reuocandi.*

*Singultientib.
que quã pira
lentur.*

*Diarydion
medicamen.*

*Oris ventriculi
affectib. phar
maca ab Aſcle
piade ſcripta.*

*Stomachica me
dicamenta do
bit habent ad
ſterilitũ non
preſtiterunt.
Hepatica me
dicamenta mi
ſceſſe d. hunc
re aſſiſſent.
ſiſ & roſarũ
ſub.*

lib. j. croci semivncii: aceti quod sit satis. Ammoniaco dissoluto, deinde arida addito.

Aliud Nili Crocerum, prædictis affectionibus accommodatum, faciens etiam

ad erysipelata.

Nili Crocerum.

Ammoniaci thymiamatis, ceræ, rosæ, ling.

lib. j. croci vnc. j. aceti quod sit satis. Conficito.

Malagma Erysipelati ex melibello, resorum doloribus accommodatum.

Malagma ex melioto, Hieracico dictum, ad viscerum dolores accommodatum. Nardi Celtici, cyperi, myrrhæ, ling. drachmas x. cardamomi drach. viij. meliori drac. xl. croci, amomi, vtriusque drach. viij. cythereæ sacrificulorum drac. xvj. ammoniaci thymiamatis drach. xl. refinæ terenthinæ drach. octo: ceræ minam vnam: olei cyprini drac. cxx. Vini odorati Italici heminam vnam: præpara, & vetere.

Malagma Polyarthricum.

Malagma Polyarthricum, peripneumonici, stomachici, lienosis, hydropicisq. maximè ex viscerum, et ad affectionibus circa vesicam aut venterum, ad omnesq. nervorum per consensum affectione. Ceræ, terebinthi, bdelli, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cyperi, ling. minæ vnam: meliori, amomi, nardi Indici, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, ling. drac. xxv. olei cyprini liemnam j. Vini Italici quod sit satis. Cò facto & vitior.

Malagma Andromachi ex melibello.

Malagma Andromachi ex melioto. Nardi Celtici, cyperi, in dis Illyricæ, myrrhæ, ling. drac. viij. croci drac. iij. meliori drac. xxv. ammoniaci thymiamatis drac. l. terebinthi tantundem: ceræ drac. c. Cyprini heminæ dimidium. Aceti quod sit satis.

De hepatis affectibus & facultatibus.

Pleriq. idiotæ quemadmodum stomachicus, sic hepaticus affectiones, vocant coplures dispositiones iecinoris, tamet si maximè inter se contrarias, hoc est, sub eodem genere plurimè inter se distantes. Non peccaverit autem quispiam dicens, propemodum omnia contraria eidem esse generi subdita. Exterum contrariorū notio cōtingit, vbi plurimum inter se distant. Atqui plurimum in quoque & genere vtriusque distat à mediis extremis. Porro ipsius imbecillitatis iecinoris licet nobis vicinè assignare dispositionē, seu causam, nōpe interperies: quæ quidem quā in octo interperantiis distribuatur, rursus nō malè dixerō, interperiem ipsam non vnam, sed octo dispositiones existere. Ad hæc iuxta alia sectionem duæ interperierum differentis sūt, ac iuxta aliam tres: dum videlicet aut secundū qualitates tantum alteriusve partes affectæ: aut accedente etiam humorum affluxu, qui aut spacia tantum occupent in particulis affectis cōtra: aut etiam substantiam ipsarum imbuat. Igitur circa ventrem & intestina quidem, vna in singulis aultas est, quæ possit vnosam humiditatem suscipere: circa hepatis autē tot numero sunt, quot habentur arteriæ & venæ. Etenim quā hæc omnes

Contraria esse quæ sub eodem genere plurimum inter se distant, Extrema plurimum vtriusque distant à mediis in quoque genere. Hepatis imbecillitatis rationem per se est causa. Interperies est obliqua.

Hepatis obliqua flumini ferri, quæ parte eius summa cum gibbo coeunt.

ofcula angusta posideat, quæ parte huius viscere summa cum gibbis coeunt, obstructions ab illis vitiosis succis aliquid oboriuntur, beui in frigidis interperaturis, vt teporis progressu in calidis ad quas tandem obnurationes putrefactio consequitur. Quam autē hoc viscus tot facultates fortatur, quot actionum species, contingit sæpe vnam ipsarum præcipuè ledi, sipe

duas & tres, atq. omnes quatuor simul. Est itaq. actio ipsius vna quidem, ad se cibum & alimentū attrahere: altera verò, ambire, cōtinereq. donec alterans ipsum, suavis illud partē efficiat. Atq. hæc ianē dicitur alteratrix facultas, inter alias principalissimas existens, & cui ferè primè debentur partes. Quæ verò iuxta hanc alterationē emanant excrementa, ea per excreticē facultatem exterminantur. Oñsum autē est has quatuor facultates, vniuersis, quādiu viuunt, inesse corporis partibus. Vocatur autē alteratio ipsa, donec alimentū parti quæ nutritur assimiletur, concoctus. Vbi verò iam parti apponitur, nutritio. Quum igitur hepatis præ imbecillitate ex ventre & intestinis alimentum trahere nō potest, liquida per sedem, & nondum exquisitè exsiccata excrementum, similisq. cruda, si etiam cum hoc viscere ventriculus imbecillus existat. Si verò traxerit quidem alimentum hepatis ex ventre simul & intestinis: in sanguinem autē ipsum nequeat convertere, ob facultatis languorē: quemadmodum in ventre multiformis corruptio cōtingit, eorum quæ cruda remanent, sic etiam circa hepatis. Est enim priore transmutatio in peregrinā qualitatem, iuxta cruditate facta: moderatior verò, in qua alimentum diu propriam naturam retinet, nullam dum alterationem inderuptum. At qui & terra præter has, species frustatè concoctionis existit, vbi semicoctum alimentum relinquitur. Ac per hanc sanè dispositionem, quæ ab hepate deiciuntur, referunt profus aquam, in qua victimæ recens macerata carnes ablutæ fuerint. Aucto autē affectu, nihil tale amplius excreminetur, sed multiformes alie qualitates constituentur expurgantur, vel vna ventre dum cruditate laborat. Calida igitur interperies si viscus affligat, colligationes accidunt, primū quidem in humoris, dein carnis ipsius hepatis: deinde citius bilis crassa, graueolens, atq. admodum colorata: quemadmodum contingit in pestilentibus febribus. Si verò frigida interperies præpollat, neque assidue excretiones, neq. multæ sunt: dicitur tñ affectus diutius, & per aliquos dies profluit ipsius venter confertum magis: neque fortè excrementorum similis est illis quæ ex calore sunt liquefacta: neque color aut consistentia similis: verum minus graueolentia ab his excrementis, specieim putrefacti sanguinis, non colligatæ carnis, habentia. Aliquando verò id qd deiciunt, nigrum sanguinem refert: deliquet etiam consideranti, nec sanguis niger est, nec grumus, sed veluti limus quidam sanguinis crassi, qui propè ad atram bilem accedat: in summa, plures, ægrèq. indicabiles colores circa huiusmodi affectionē cernuntur in alui excrementis. Scopus igitur curationis in huiusmodi affectibus, communis quidem sit iuxta cōtrarietatem interperantis: peculiaris autem vnicuique, per cuiusq. contrarietatem. In vniuersum autem, affectio hepatica peculiariter appellatur, vbi vni etiam cæcæ, stomachicæ, citra tumoris præter naturam circa ipsas partes ortum, cōtingit. Siquidem quum citra manifestū aliquod in viscere malum, in actionibus propriis languet

scit hepatis, tum ægrum vocant hepaticum.

Hepatis facultates.

Alteratrix facultas hepatis sit inter alias principalissimas.

Facultas quæ trahit naturalem suam vim, si, dum vni corpus partibus, Hepatis languor de al intestinis trahitur symptomata.

Medicamentum est verum per concoctionem in peregrinam qualitatem, afflicta rum omnium deteriorum. Hepatis imbecillitas iuxta obliquam in sanguinem, quæ excrementa excreminatur. Hepatis venter potius calidus quæ frequenter symptomata.

Hepatis frigida interperies signa & symptomata.

Hepatis interperantis, per contrarias facultates esse.

Hepatis quid dicitur.

Quæ

Quæpharmaca ad hepaticos ab Andromacho sint conscripta.

Hepatici remedia conscripta ab Andromacho scripta.

Antidotus cyphoides, ad hepaticos & omnia thoracis vicia. Vix passæ carnis drach. xxv. croci drach. j. calami drach. ij. s. bdellij tantundem: casie selquidrachmam: cinnamomi obolos iij. spicemardi drach. ij. floris iunci odorati drach. ij. s. myrrhæ, terebinthine, sing. drach. iij. ramæ tori aspalathi drachmas duas: mellis drachmas

Potrofolium quæ corrigi.

Vix passæ facultates.

Viscerum interpositum ex optima medicina curata, quæ non modo incomptum rem corrigunt, sed etiam alimen- tum largiuntur. Vix passæ facultates.

Mellis facultates.

Edellium, croci.

Terebinthina vicia.

Hepatici phar- macum nullis officiis debet vehere, necesse est refrigerare.

Alimentum opti- mum, medicamen- tum.

Antidotus hepaticus, nephriticus, cyphoides, croci, myrrhæ, iunci odorati, sing. drach. j. cornu cerui obolos iij. Trita cum aqua in pastillos tri- bolares redigito, ex eis vinum mane ac vespere, cum vino mulso dato.

xvj. vini quod sit satis. Conficito. Etentim cinnamomum omnes putrefraginosas, virulentasq; corrigi facultates, quemadmodum casia, & possit hanc omne aromatum genus. Crocus astringens & cœcoetorium pharmaca cum, etiam putrefactio- nes corrigunt. Vix passæ asstringit quidem quan- tum requirit affectum viscus: habetque vim ali- quam cœcoquenti crudos humores, & coercet & maligna, existens enim secum dum totam sub- stantiam iecori familiaris. Quippe ad intempe- rantias viscerum ea pharmaca optima sunt, quæ præterquam q; intemperiem corrigunt, etiam ali- mentum largiuntur. Quo nomine vinum con- venientissimum est, citra inflammationem, aut erysipelas, aut abscessum, aut intemperiem cali- dam, laborantibus. Nam & nutrit, & cœcoquit, & roborat, & putrefactioni adversatur, & si in- temperies ab humiditate & frigidityte proficiscitur, et citra omnem molestant, atque tuto per- sanat. Eadem est & mellis facultas, præterquam

q; non condensat substantiam cœtracti corporis: sed pro hoc vini extendendi, & aperienti, & pu- ros reddendi meatus, vinamq; citandi, non par- ua sanæ auxilia, possidet. At bdellium sufficien- ter emollit, cœcoquitque, necnon moderate discutit. Cœsimilem ferme vim terebinthina fortitur, supra hoc q; angustos meatus extergit, expur- gatq;: quibus auxiliis viscus coridum indiget. Si quidem obstructio meatuum fœdit putrefactio- nes efficere. Nonnulli autem huiusmodi phar- macis opium, aut hyofysum, aut ut aliud quæ- dam refrigerium miscendo, ad calidas intem- peries vltia medicamenta efficiunt: quanquam

ex hepaticis pharmacis nullum esse debet vehementer refrigerans.

Alia ad hepaticos & ieticos.

Amygdalarum amararum drach. ij. anisi, ab- sinthij, cumini, seminis apij, sing. drach. j. cornu cerui obolos iij. Trita cum aqua in pastillos tri- bolares redigito, ex eis vinum mane ac vespere, cum vino mulso dato.

Hepatica Athanasia, ad nephriticos & ieticos, copiosè sudorem promouens.

Croci drach. ij. nardi rætum dem: cinnamomi, casie, myrrhæ, iunci odorati, sing. drach. j. Melle Antico excipito: datur fabre Aegyptiæ magnitu- dine: febriarum bus ex aqua mulsa.

Potio ad hepaticos, spleneticos, nephriticos, hydropicos, stomachicisq; Auxiliatur eni mo- lestias ex partu, & cœvultus. Prodest & cœvultus- tibus: necnō ad humores vitiosos, ieticos, tus- sientes, pleuriticos, atque ad lēta venena, & secerum ietus. Nardi indicæ, costi, vniusc; drach. ij. casie, croci, vniusc; drach. j. piperis albi obol. v. seminis apij drach. j. obolos iij. Iridis Ilyricæ tantundem: acri drach. j. obol. j. opobalsami drach.

j. succi ati masculi drach. tres: vix passæ exacina- tæ drach. vj. Terito cū passio, aut melle excipio, ac drachmā vñā cum vino dulci dato, aut cum aquæ mulse cyathis iij. Nullum tamen horum medicamentorum calidis intemperatibus cōve- nit, sed aut humidis, aut frigidis, aut ex vtriusque compositis.

Confectiones hepaticæ ab Aesclepiæ de prodire.

Succi cichorii cyathum vnum cum aquæ cali- dæ cyathis tribus, et mellis Attici cochleari vno, porrigito. Aut filicis, aut seridis succi cyathum vnum, cum aquæ mulse cyathis trib. dato. Por- ro cichorii & feris ex genere cibariorū existūt. Facultas autē ipsorum subfrigida & subamara est, moderateq; astringens: quarum qualitatē ra- tione, calidis hepatis intemperantibus summè cō- veniunt. Nati vltra hoc q; moderate refrigerat, visceri firmitudinē addunt. Sed nec frigiditas in- temperies magnopere lædunt, quemadmodū iij. frigidi humiditatem absq; astrictione aut ama- ritudine possident, facere solent. Iam, ob miscel- lā mellis, humores per vinas eliciunt. Quare li- ficata & tusa quis potioni inspergat, itidem ut- ut. Ad visceris autem expurgationem, apertio- nemq; meatuum, citra manifestā caliditatem aut refrigerationē, filix optimum pharmacum est, amarā qualitatem habens prædominantem.

Catapotion hepaticæ.

Radici chamæpityos drac. viij. rad. cichorii drach. iij. contunde, & excipe melle cœcto, præ- be nuciis pontice magnitudinem: & aquæ cali- dæ cyathos iij. insuper bibendos dato.

Pastillus hepaticus.

Anisi, sem. apij, asari, amygd. amar. mūd. absin- thij, sing. drach. iij. macerata ex aqua in pastillos redigito, exhibe rōq; drachmā vñā cū vini diluti cyathis iij. febrientibus. tamē cum hydromelite.

Elegma hepaticum Paulin. auxiliatur constem.

Chamæpityos sitce lib. j. myrrhæ vnc. j. passij protropi sextarios iij. Chamæpityon & vinū dul- ce cœquido ad tertias. Postea liquore exprimito, ei; mellis Attici libram dimidiā adicito, ac ru- sus coqto. Dein verō myrrhæ addito asidue agi- tado: quæ vbi dissoluta fuerit, ab igne ablata re- ponito, & ante cibum mystum propinato. Ad- hæc cochleariū trium carnē probè trita, & cū tri- bus vñis nigri cyathis cascacia porrigito. I hæc .n. iuxta totā substantiā sunt efficienda, nō secu- dum vñā aut alterā qualitatem. Similiter & lupini hepatis drachma vna laxigata cū vino aliquo dulci, exhibitaq; manifestè hepaticis auxiliatur.

Cœfectio ciens vinas. Facit ad induratas he- patis affectiones, ad spleneticos, et egre se a mor- bo recuperantes: necnon ad hydropicos. In vni- uersum, probum colorem conciliat. Croci, nardi casie, sing. drach. ij. costi floris iunci odorati, cinnanomi, myrrhæ itæcæ, sing. drach. j. mellis costi drac. xvj. datur fabre Aegyptiæ magnitu- dine, cum vini mulsi cyathis iij.

Alia eadem cōmoda præstant, ad aliisq; inter- nas affectiones, citra rufum, cœducus. Rad. gen- tianæ, chamæpityos, marrubij, seminis petroselli ni, fellis vñi, sinapis, sem. cucumeris, scolop. drij ganacis, rubricæ sinopice, rubiæ, seminis brasi-

Hepatica cōp- sitiones ab Aesclepiæ scri- ptæ. Cichorium, Seru.

Hepaticum ca- tapotion.

Hepaticus pa- stillus.

Hepaticum elegma.

Hepaticus in- ducens vinas.

Hepaticus in- ducens vinas.

Hepaticus in- ducens vinas.

Hepaticus in- ducens vinas.

Hepaticus in- ducens vinas.

Hepaticus in- ducens vinas.

Hepaticus in- ducens vinas.

Hepaticus in- ducens vinas.

Hepaticus in- ducens vinas.

Hepaticus in- ducens vinas.

Compositio Andromachi eadem hora dentium dolorem sedans.

Piperis, pyrethri, succi thymali, chalbani, singul. drac. ij. chalbano excepta in cauernâ induto. Alia. Seminis hyoscyami, opij, nitri, myrrhæ, pyrethri, piperis, sing. drac. ij. chalbani drac. ij. trias ex vino vitior.

Collutio ad moros dentes, Critonis.

Lentiscum, myrtum, galli, in vino cocta colluenda præbeto. Eiusdem ad corrosos dentes. Capparis radicē cum acri aceto ad dimidias coquito, & colluito tepidum.

Dentificiū ad gingiuas madore laxatas, putrescentes, & cruentatas, conuulsos dentes, ozænas, parulidas, dolores, & omnia oris vicia.

Dentificiū ad omnia gingiuarum & oris vicia laetare.
Perdicij recēna drach. x. mellis, aluminis scissiridis llyricæ, sing. drac. iij. piperis albi drac. viij. nigri drach. iij. pumicis, pyrethri, hyssopi, pullegij, seminis apij, sing. drach. ij. myrrhæ, menthis sicæ, herbe sideridis, singul. drach. iij. falis fossilis drach. iij. Perdicium, sideritidem, mel, & salēm, mista vitio: alumē verō per se vltū vino extinguito: dein omnibus simul contusus vitior.

Dentificiū infusum.
Smegma dentes reddēs candidos, eosq; ab erosionē defendēs, orig. bonum odorem cōcilians. Nitri, testis sepij, myrrhæ, sing. vnc. j. tritis vitior. Aliud ad idem. Aluminis scissi selcuncē: matthes vnc. j. comæ rosarum quadrante: iris trientem. Tritis vtē, indēq; aquā tepidam colluendam præbe.

GALENI PERGAMENI de compositione medicamentorū secundum locos, lib. VI.

Quamvis plurimū interest, ex viuāne aliquis voce, an ex libris discat, non tñ parum cōmodū studiosis ex cōmentariis accedit: ob idq; ad hosce cōferendos me accinxī, quem rationalis auxiliorum inventio præstet illi, quæ soli experientia innitit. Igitur in stomatichæ pharmacie, de quibus agere in præsentī cōmentario est animus, primus medēdi scopus est communis omnium partium inflammationarum: secundus autem, proprius illius cui medemur. Porro inflammationes, ex influxu calidi sanguinis fiunt: qui repellendus est, nisi vereamur ipsum ad partē aliquam principem recursum, atque illac grauiorem aliquem morbum excitatum. Vitum igit vñz sectionē, & purgationē, & clysteribus, etiā inedia, vbi totū corpus plethoricum, aut cacoethymum exiterit. Si verō neutrum sit horum, statim properamus ad curationem per localia remedia. Impossibile autem est, pharmaco ritē vitū, qui vim ipsius nō cognorūt, secundum quam auxiliatur. Porro medicaminum repellentium genus, quibus vitum in principie inflammationum, in materia refrigerantium consistit: quorum sanē ea quæ astringēdi natura prædita sunt, efficaciorē vim habent, ad ocus repellendū influxum. Inest quippe ipsiū statim enī facultas cogendi & densandi superficiem corporis cui admoventur.

Communis itaq; scopus in oris inflammationibus est, prohibendi eos dum incipiunt. Se-

cundus autem ab ipsa particula sumitur, quum sciamus longē rariorem atq; molliorem esse oris tunicam, cure quā vniuersum integritur corpus. Taceo tunicam oris, medicamentorū insuam utatem percipere possēq; medicamēta ori indita defluere in ventriculum & pulmones: quorū neutrum curi reliquū adest. Quare formibus medicamētis, cuiusmodi chalkanthos existit, quibz venenosiā facultatem sortuntur, vti ad oris affectiones nō licet, nisi magis virgeat necessitas: Ergo succus motorum solus, recēnsq; a fluctu ipsius expressus, ad incipientes oris inflammationes est melior illo, qui, vt asserari diutius possit, ex melle coquitur: quamquam ad frequentia inflammationis tēpora, vtilior est qui ex melle est coctus. Nam quemadmodum in principio vitia sunt pharmaca repellentia id quod influit: sic post principij vsq; ad finem, pharmaco opus est ex vtriusq; misto, repellente videlicet facultate, & discutiente prædito: ac primo quidem tempore, astringens præcellere oportet ad finem verō discutens: atque interposito tempore æquales vtrorūq; partes esse conuenit. Quando verō veluti indurātū quippiam ex ipsa inflammatione relinquitur, penitus non conuenit astringēs ad discutiorum miscere, & si prius vniuersum corpus fuerit vacuatum. Similiter neque in principio bonum est discutiora miscere astringentibz. Merito autem qui pharmaco diamoron composuit, parum ex croco & myrrhā ei cōmiscuit, quod commune habeant facultatem concoctoriam inflammationū: priuatim verō crocas quidem astringat: myrrhā autem calsciat in tartum, vt sufficiens ter discutiatur, tenuium partium etiam substantiā possidens, quæ faciliē in altum subire possit, vtriusq; alicuius medicamentorum deducere. Soleo autem ipse in principio ad pharmacum diamoron miscere rhoris succū, aut omphacum, aut florem rosarum, aut ipsas rosas ficcas, necnō balaumum, cyrinus, malcorum ardidum, gallam omphacinā, pini, thurisq; corticē, hypo distidem, lentisci succum, ac breuiter asti in gentia omnia, præter ea quæ corruptentem possident facultatem, quæ & deleteria dicuntur, & letalia species quædā existit: quippe cū non omne letale, necessariō etiam deleterium, hoc est, vñ nescium existat. At vbi inflammatio iam constitit, sufficit ad mororum succum addidisse ritim crocum & myrrham, vt ipsa inflammatio coquatur. Quæ vbi concocta fuerit, addere aliquid ex discutioribz licet, cuiusmodi sunt nitri spuma, nitrum Berenicarum, sulfus viuū, sapa, origano interdum incocto, aut hyssopo, aut pulegio, aut thymbrā, aut thymo, aut calaminthā hortensī & agrestī. At verō Erasistratus, quum mororū succus illi ad manum non esset, rubi cremore vsus, seipsum curauit. Ego autem pharmacum ex succo nucum viridum confeci, facultate ad oris inflammationes ceteris omnibus stomatichis plurimum antecedens. Cuius compositio est huiusmodi. Succum externi nucum viridum corticis cū mellis iusta portione coquo, donec ex vtroque mellis crassitudo consistat. Hinc autem liquet, qualis sit eorum corticis succus, quantūq; astringendi vis, quod ne per fortissima quidem exterioria, nigredo elui possit ab eorum manibus, qui

Oris affectionibus curantur exhibenda non sunt fortissimè venenosa medicamenta. Quare inflammationes quæ oris incipientes medicamentis astringentibus non debent.

Digrediamur ab his videremus si, vbi dixerint aliqua ex vniuersa inflammationis reliqua: ceterum præterea vacante.

Croci facultas. Myrrhæ facultas.

Dilectum medicamentum.

Letalia omnia non esse deleteria.

Oris inflammatio non concocta quæ cōueniat.

Robi cremor.

Dentificiū ex parte vniuersa vñz, ad oris inflammationes cōueniētiū cōpositio.

Nucum succo viridum adest adstringens potest.

Inventionis rationem autem huius præstare illi, quæ soli experientia innititur.

Inflammationis causa, & curationis.

Astringentium facultas.

qui virides nuces decorticant. Atqui nisi in profundum manu illa facultas deiscderet, non certe egregie cluibilis esset. Quum autē descendat, indicat plane substantiam succi, tenuium partium esse. At rationi esse consonum, astringendū vim esse maxime ex viis, ubi in eiusmodi cōtinēat substantia: ineptam autem existere, quæ crassam partium substantiam esse cōiūctā. Optimum itaq; ac simul suauem esse nucum succū mihi persuadēs, eum in quatuor partes diuiso: & ad primam situm aliquid ex astringentibus misceo: ad secundam, ex croco & myrrha: ad tertiā, sulfuris & nitrī non nihil. Quartam vero solam synceram seruo, ob dulcorē futuram vtilē pueris, mulieribusq; & viris effeminatis. Est autē quod ex succo rubi cōstat, fortius eo quod ex moris conficitur: quem admodū hoc eo, quod ex multo paratur: omnib; tamen præstat quod ex succo fit nucum. Porro in pharmacis quæ deglutuntur, maxime cōnectare oportet naturam eorum qui

Africani non substantia nuda, esse maxime ex viis ad repellendū inflammationē, Stomatit ex succo nucū quā duplex compo sitio.

Stomatit ex succo nucum, ca teris omnibus præstat.

Stomatit di morum compo sitio apta omni bus.

Aromaticum complanum vi re, per ciliatū exolit. Oro indurati inflammationi bus qualia sint apta medicamenta.

Oro videntur inflammationes quibus sint co quenda medicamenta.

Punicorum ma lorum species tres, austriores, dulcior, & acidior, quæ singulorū partes, vna cō corticē. soleo ipse etiā cōfundere, expressūq; suc cū cum melle coque, ac sic cōficere medicamē

to tum aliquid ex astringentibus misceo: ad secundam, ex croco & myrrha: ad tertiā, sulfuris & nitrī non nihil. Quartam vero solam synceram seruo, ob dulcorē futuram vtilē pueris, mulieribusq; & viris effeminatis. Est autē quod ex succo rubi cōstat, fortius eo quod ex moris conficitur: quem admodū hoc eo, quod ex multo paratur: omnib; tamen præstat quod ex succo fit nucum. Porro in pharmacis quæ deglutuntur, maxime cōnectare oportet naturam eorum qui 10 pla sument. Nam qd cum molestia aut fastidio se accipitur, os ventriculi evertit. In stomaticis autem medicamentis, eiusmodi sinceritatem interdum continere licet. Si quis igitur medium aliquid medicamen cōficere omnibus aptū velit, ut (exempli gratia) quod cōstat ex succo mororum, ad quing; libras succi, vnam mellis adiciat. croci autem & myrris, vtriūque drach. j. s. Vini item auteri heminas vnam: omphaci, drac. j. Quod si non addit, pro ipso rhois succum iniciet: & si volueris par pōdus vtriūq; imponere, nihil peccaueris. At Hera drachmam vnam scissi li aluminis addit. Quod verō ad coquēdi modum spectat, ego sanē cenfeo succum ipsum solum esse per se præcoquēdum vsq; ad crassitudinem strigēntiam: dein verō adiciendū meli atque vbi iam cacabum ab igne velis auferre, reliqua imponenda esse. Etenim ut spuma argēti, & plumbago, aliāq; multa metallica, per cocturam meliora evadunt, sic vis cōplurium aromaticorum exoluitur. Ceterum ad induratas inflammationes, quum iam preterierit vigor, nec amplius influat quicquam, prædicto pharmaco diffusoria miscere oportet: cuiusmodi sunt, spuma nitrī, nitrū, petreæque stōs, sulfuris vitium. Ac sufficit sanē nitrī vnciā semis, sulfuris vnciā duas, si addideris. Quod si nihil horum sit præstō, in sapā aut mullā origanum seruefacito, ipsāq; ito matico pharmaco adicio, & gargarizare iubeto. Nihil autem refert, etiam si hysopum coniicias pro origano, aut pulgēum, aut rhytmū, aut thymbra, aut calamintum, aut hedyosmū. In vigore autem inflammationē collutionibus & gargarisiis concoquere inflammationē oportet, pinguium caricarum decocto, lēticinōq; oleo tepescito in duplici vase. Quin & ipsum stomaticum pharmacum in vigentibus gargarizare conuenit mullis dilutioni permittum, aut calidæ sapæ, aut etiā aque calenti. At meum ex succo nucum medicamentū, aliorum omnium est validissimum, vtriusq; amq;. Quum autē tres sint Punicorum malorum species, austriores, nempe, dulciū, & acidior, quæ singulorū partes, vna cō corticē. soleo ipse etiā cōfundere, expressūq; suc cū cum melle coque, ac sic cōficere medicamē 60 not solum stomaticū, sed ad multa alia vtile. Con

tunditur etiā cum illis & rubi fructus: cuius succus similiter preparatur succo mororum, melius illo pharmacum redditur, sed minus validum eo, quod ex nucum succo paratur. Quin & malorum coronorū, & pirorum sylestrium, ac mespilorum succus, similiter preparatur, stomaticum pharmacū redditur, aptiusq; etiā ut devoreretur: quum hoc qd ex nucibus cōstat, devorare nō liceat. Verū quod ex punicis constat pharmacum, aptū est exolutio & cibos fastiditū ventriculo: deficit tamen ab eo qd ex malis cōstat. Innocentius est etiā rubi mororū succus voratus, veluti & ipsorū mororū: sed succus rubi mororū habet quid quod ito machū roborat, quod ipsum, mororum cremor non habet. Iam verō succus nucum plurimo melle opus habet: & post eū, rubi mororum: modico autem, malorum & punicorum, & pirorum sylestrium. Medius inter hos est mespilorū succus. Ex cornis etiam, brabylisq; & prunis, stomatica preparantur. Ceterū si crassus esse videatur succus, statim mel admicere oportet: sin liquidior, præcoquatur: Sufficit autem pirorum atq; malorum succus parum mensuram mellis. Succus vero eorū quæ nimis acerbata sunt, veluti est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplum mellis desiderat. Porro si atramentum futurius adsumit sit, non admodum deglutire oportet confectum pharmacum, præterquā si iuxta stomachum aut alium vlcerosam affectionē fieri vereamur. Quin & si in ipso ore maligna vlcera fiant, præstant ex atramento futurius medicamenta. Sufficit autē drach. ad prædictam compositionē admissa, in qua vna mellis librā coniici dicebamus. Iam verō quum rubus sit duplex (alter enim obfonsis inspergitur, stomacho commodus: altero coriorū tinctores vntur) vterq; sanē multo incoctus, stomaticū efficitur medicamen. Multum etiam solum, citra mellis misturam in mellis compagem redactū, bonum sit pharmacum in principis, augmētis, atq; vigoribus. Ad declinationē autem præstent, si in ipso diem integram tēdas pingues præmacraueris. Quod si precioso efficere pharmacum vis, iniciet etiam casū corticem, aut nardū Indicum, aut malabathi folium, singulorū nempe vnam drachmam. Ad induratas autem inflammationes cōiiciuntur quæ generosius discutere possint, rusa videlicet, & cribrata: idque vbi olla ab igne est exēpta. Ac talia sanē sunt, coctus, amomū, macer, Cyrenicus succus, Medicifolij. Pauperibus tamen pro sumptuosius diffusoris pharmacis, aut destamniū, aut coron, aut meon, aut pyreticum, aut cardamomū, aut sinapi incoctū censeo, pari pondere ita ut ad triū drachmarum pondus, eorum mischorum moles perveniat ad prædictā symmetriā, in qua mellis libra habebatur. Verūm pro cōstitutionis affectū proportionē augeri ac minui pharmacorum vehementer oportet. Ergo pharmacū cōficienter ex multo, ad decē mullis heminas, tres iniciemus heminas rhois coniariorū, aut eius q obfonsis inspergitur. Si verō vtriusq; iniciamus, vtriusq; vna & dimidia iniciēda est. Iuxta proportionē etiam, ex diffusioribus, quodcūq; tandē in promptu habeamus. Quod si vnum tantum suppetat nobis astringēdi vim habēs, quod in principio iuticia

Stomatit ex buis, de vorandū non esse.

Stomatit ex rubi mororū succo, ad quod succo mororū non sufficit, succorū quādam plus, q; qui vna non requirant mellis.

Calcanthos quando stomaticū miscere oportet medicamentis, Alia duplex.

Melle quando et qualiter preparata vntis in ore inflama tionibus.

Diffusoria phar macia que nam sint.

Stomatit ex melle compo sita.

mus: aut vnicū discussorium, quod iuxta finem: ex illo totum pondus explebitur, qđ ex omnibus alioqui fuisset cōbundum. In vniuersum autem, austeriora quidē, in principia, & vehementibus inflexionibus congruunt: moderatoꝝ in vigoribus: vt magis disculforia in dedinaionibus. Porro ex astringentibus facilia parata sunt, rose, bacce myrti, myrtus, lēnsca, rubus, caninus, galla omphacitii, fructus Aegyptiaci spinæ, oia alumina genera, vna & aliter rhus, glauciū, 10 omphaciū, cytini, & balsuū. Ex discussentibus moderate, faciliē paratur caricarum fursurūmq; decoctum: aut mulsū, in qua origanum, aut hylēfopū, aut rhyminus, aut calamintha, aut pulegiū, aut hedyosmū cōcocta sint: quæ si duntaxat coquantur, formora redduntur: amplius autem & niri spuma, aut ipsum nitrum vsum. Fortius vero haec est sulfur viuū. Rectē autem Andromachus medicamini ex succo moroꝝ confecto addidit glycyrrhizā, vt exasperata leniret, asperitatemq; astringentium minorem redderet.

Stomacicum Andromachi ex musto, quo vitior.

Gallas xxx. Rhoss coriarij sex. ij. musti sex. vj. Gallas coactas per diem & noctem in musto macerato: dein cogto, donec ex toto quarta super sit portio: quam per lintēolū colatam, ex presamq; in olla ad mellis crassitudinē spissaro: dein trita addito, aluminis scissi, croci, myrrhæ, singul. drac. j. permixta reponito, tandēq; ea vitior. Iam verō, quod ex dulci cōfectum est musto, magia mitigatorium & moderatum erit, sed minus efficiat: id autem quod ex acerbis fit visus, vehementius quidem astringit, leniendi vim tamen non habet: ex medio vino paratum, mediū facultatem sortitur.

Stomacicum ex bēfā, anginis congruē, ab Andromacho scriptum.

Sem. anisi, apij, ammi, floria iunci odorati rot. alumina scissa, indidē Illyricę, bēfā (hoc est, semina rute sylvestris) cinnamomi, myrrhę, Troglodyce, aristolochij longe, casij, rosarū siccatij, crocomagmaria, sing. vnc. j. croci, cineris hircundinū tenellarū, vtriusq; quadrante: croci scilicet vnciam: nardi Indici, amomi, vtriusq; vnc. 3. gal- 40 las viij. tritia cum melle vitior.

Stomacicum Asclepiadia.

Hirundinū syluestriū vitarū cineris drac. iij. croci, nardi Indici, vtriusq; dr. j. melle excipito. Aliud Andromachi, ad collumellam laxatā.

Alumina liquidi lib. j. florum rosarum lib. 2. succi hypocistidos quadrante. Alumen in melle coquo, dein sicca inspergito, vitiorq;.

Aliud eiusdem ad omnia vitia oris.

Crocomagmaris drach. ij. arida drac. iij. san- 45 darach drach. 2. cerebenthine drach. ij. lycij Indici drach. j. vix passif. drach. viij. aloes, omphaci, singul. drach. j. nucum pinearum rostarum drac. viij. succi glycyrrhizę, aluminis scissi, balsamij, singul. drach. j. flora rosarum drac. ij. mel lia hem. ij. s. Conficito.

Stomacicum Asclepiadia.

Succi hypocistidos drac. ij. balsamij, lycij, ac- 50 cis, sing. drach. j. excipito oliue immaturū succo, & postea melle subacta vitior.

Si verō esset stomatica id genus fastidiat, in mo-

deratis quidem inflammationibus sufficere suc- 50 ci soli fructuum iam dictorum, vt rubi, & mororum, puniceorumq; mēloꝝ, & cotoneorū. Quia & succus nucum vbi cum solo melle paratur, gustu suauis existit: itēq; multū ex vna acerbioribus presum, si rhus in id cōducitur, optimum pharmacum redditur. Ad eas verō inflammationes quę multa astringēte indigent, austeriora puniceo, aut cotoneorū, aut vitiorūq; succus, melli admixtus, sepe mihi fuit sania. Singula autē horū succoꝝ licet omphaciū adicere. Vehementissimū medicamen reddet, si punica integra tunda vna cum corticibus, indeq; succū exprimas: atq; hoc magia si acerbā fuerint. Acerbissimum etiam fiet, si ad puniceorum austeriorum ita tusorum succū, omphacum superaddatur cum moderato melle. Præstantius adhuc reddes pharmacum, si tota cōfusa punica mēla, passio cocta excolauerit. Ne verō valde exasperet, glycyrrhizę succum admiscena, conficies optimū pharmacū. Si quid verō induratum appareat, is succus q̄ media facultate sortitur, inicies aliquid, dum coquantur, ex pulegio, aut drymo, aut origano, hylēfopo, mētha, aut calamintha: dein colabis, & habebis opusū medicamē. Quod si calidia efficiere velis, piper addes. Omnib; tamen si glycyrrhizę succū addatur, melius pharmacū efficiet.

De crustis.

In calidis & humidis corporis partibus, qualia 50 est ossa, ex quacūq; tan dem causa fuerit exulceratum, citō putredo oboritur. Ad cuius vicia fortissimis sepe vti cogimur medicamentis. Atqui fortissima sunt, quę escharam in istar cauterij excitant. In externis igitur corporis partibus, vbi parti curandę crusta fuerit inducta, si fortis, superfedemus pharmacia, trāsfigredientes ad deter- 40 siona, quę escharas tollunt. In is verō quę in ore excitant sunt eschara, natus mihi videt esse admiscere ad exteriora pharmacia, alia quę dē fortiora, & quę per se admora, crustas etiā inuenerēt. Melli itaq; maxima extergēdi vi p̄dicto, crustificā medicamēta immiscemus: quema dmodū ad sordida quę in corporis cuticula oriunt, miscere illi leuiter extergētiā solemus, vt thurs, eruum iridem, aristolochiā, & alia id genus. Porro Andromachus, ad oris crustas, ex nucib; pineis, amylo, aluminē scisso, flore rosarū, croco, & melle, composuit optimū stomacicum.

Critous ad oris crustas medicamentum.

Misfos torrefactos drach. iij. melia optimi cyathos sex: misceto & vitior. Idem etiam præstat chalcitis assata cum melle.

Archigenia ad crustas oris remedia.

Commodissimū est sterces canum, aliorum oſibus, ex melle illitum: quod etiā in angina auxiliat. Aut rhus Syriacæ ex melle, Aut hirundinum vitas & stercoſis humani par modum cum melle illitua. Aut heparia lupi aridi coſchlearia duo trita bibenda dato. Ego verō medicamē ex rhoē damno, quod astringētiā fir facultata, quę minime crusta cōvenit. Ar hepar lupinū eupatorio mistum, ad hepaticas etiā bibit affectiones. Sorani stomacicum ad crustas, stercesq; ginguias & humore prægnantes.

50 Misfos vti drachmas viij. iridis Illyricę drachmas iij. croci drach. j. Trita in pyxide lignea reponi-

Acetib; iſia p̄ mēta cōfusa dato rati.

Indurati iſti mētoſi a p̄a ſtomacia.

Glycyrrhizę ſtomacicum addito, iſſa mētoſa rati. Putredo oboritur citō in calidis & humidis partibus.

Oris puſtula ex eschara mētoſa da exteriora iſſa pharmacia, et quę per se admora, crustas re p̄ſſa eschara.

Oris crustis dolendū remedia varia.

Crustis nō conuenire astringētia. Hepar lupinū exciſe hepaticę. Stomacicum Sorani.

Inflammationi in capiti, anſerata: vnguenti moderatora: hociano, magis digerentia conueniunt. Alitrogiſia parata facilia. Digerentia me ducunt.

Digerentia va leant.

Stomacicum Andromachi ex musto.

Stomacicum ex bēfā Andromachi.

Collumelle lenata remedia.

Stomacicum ad omnia vitia oris.

Stomacicum Asclepiadia.

reponit, & tum per se, tum ex melle vitior.

Aliud nomine Anthera.

Anthera.

Iridis Illyricæ, sandarachæ, cyperi, sing. drac. iij. aluminis scissi, croci, crocomagmatis, sing. drach. q. tritis & melle vitior.

Stromaucum Ileracidis Tarentini ad velle mentes putredines oris atq; reli- quæ corporis.

Chalcitidis partem j. calcis viuz tantundem: auripigmenti partem dimidiam: tritis & mixtis 10 vitior. Aliud. Florum rosarum drach. iij. aluminis scissi, gallæ, sing. drach. q. myrrhæ drach. j. trita melli misceto, vitiorq;. Quidam fale mace rato in aceto, reficcatoq;, vtunt. Si hæc remedia putredo ipsa respuat, vtendū cautio est: postea vero colluendū vltus prædictis, imponendūq; anthera, donec crassæ abscedant.

De columella.

Caruncula illa que ad extremum oris depen dens cernitur, à veteribus quidem gargaræ, & 10 cion, hoc est, gurgulio & collina: à neotericis au tem conis, hoc est, columella, vocat: cuius sanè affectiōnem quandam, staphylen, hoc est, vus, dicimus. Raro tamen affectio hæc circa columel lam contingit, licet ea sæpe inflammetur. Et sanè quemadmodū in aliis omnibus, in quib. ex hu morum influxu contingit morbus, sic etiam hæc

prima auxilia debet fluxionem ipsam repellere: quare astringētis sint facultatis oportet: verū si quidē influxus sit moderatus, moderate astrin gentis, quam priuatim austerā vocat: h. verō velle mentior, acerbæ. Ambæ appe facultates astrin gent, sed debilius austerā, vehementius acerbæ. Porro moderate collutiones sūt ex palmulæ, rosarum, pampinorum vitis, rubi, canribi, alpa lathi, cyperi, cypinorum, filiquarum, radicū mori, hypocistidis, malōrum austeriorum, pirorum acerbiorū, ac forborū decoctū. His fortiora sunt myrri & baccarum eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, & virgulorum teneriorū ilicis, 40 arbuti, similacis, fagi, & ipsarum glandium: im- spilorum item, & cornorum, & fructus mæci li. Generosissimū autem est decoctum gallarū, & rhois culinarū, & coriarum, fructūq; myricæ, & Aegyptiæ sping. Ex his singula rō per se, tum etiā nuxtim cocta ex aqua, gargarizare oportet. Mirū. n. quāvis mixturæ ipsorum vtiliores sepe sūt ipso simplici vsu. Quin & arida etiā columellæ insperguntur. Iam vero moderate astringūt etiā lapis Ageratus, aloë, cyperus, flos iūci odorati, 50 radix ipi nardi ludicæ. Eximie astringūt omnia a luminis genera: scissū verō inter ea tenuior est partium, & ob id vtilius. At tramentū fortiori velle mentem astringendū vim possident: est ta mē ex persæ calfactore: ob id putrilaginosus vl ceribus cōuenit. Externū gurgulionem ex aspe rat, etiam si tā scirrhū contraxerit. Corruptun tur autē succi omnino, si absq; melle reponantur: aut reficcantur, si plurimū fuerint cocti. Nōnulli tantam ariditatē afficiunt, vt conteri queant. Ta les sunt hypocistidis, vuz acerbæ, glycyrrhizæ, & cetrarū succus. Ridiculum autē est querere, inter duo eiuſdē generis pharmacā, vtrū sit ipsiorū præ stitū. Omnia liquide medicamentā respectū ad aliqūd tum viliū, tum noxia dicunt. Quocirca si pronūciaueris pharmacā nihil esse sola per se,

rectē dixeris: nihil enim sunt, nisi nacta fuerint vtentē rectē. Si verō cōtrā, pharmacā deorū esse manus fatearis, similiter rectē dices. Iuuat quip pe maxime, si is q; vitū, m rationali methodo fuerit exercitatus, atq; uatura prudēs. Porro mi stura pharmacorū eiuſdē generis, mediore phar macorū vsus sit gratia: ob idq; semper duo con traria medicamēta in vno quoq; affectū vō la bere operæ precium ducō: quæ quidē permiscen do, multis pharmacis abvndabitis. Quū autem raro quis affectiōne inueniat, quæ (exempli gra tia) solis discussionis, aut repulsiōis indigeat, co gnam etiam sæpe duētū generis medicamentā miscere: quemadmodum vuz cum repellentibus aut auodynīs discussoria cōfundimus: vt si gur gulione inflāmato, ad alūmē iridem miscamus Illyricam, aut farinam eruinā, aut thus, aut myr rham. Etenim quū discussoria sint multa, est tem per à minoribus suspicandum: quandoquidem inflāmata exasperant ab acerbis.

Quæ Archigenes scripsit ad gurgulio nes inflāmatos.

Vua laxata, succum Cyrenaicū dissoluū illi ne: aut gallam tritā cum fale: aut ipsum fal dissolu tum: aut lyçi radicē tritam: aut opliacū cū melle. Si fortius medicamentum vis, aramenti su torū, squamæ xris, aluminis scissi, mysos, myr rhæ, gallæ, quas partes tritas, ac vino exceptas il line. In principio tamen fale non est priuatim vt endū, sic vt nec Cyrenaiica lachryma: sed vbi co lumellæ inflāmatio indurata iā fuerit. De gurgulionis aut inflāmatione sic Hippocrates discri t: Gurguliones cum periculo excludunt, vrunt, ac reficcant, quidū rubri fuerint & magni: q; tem pore alius artib. graciles sunt reddendi. Quū verō torū id quod appellant vus, abscesserit, extre mum autē gurgulionis mams, luidūq; reddi tum fuerit, inerior verō pars tenuior, tunc sanè intrepidē curationi admodū ex se sunt manus.

Quæ scripsit Archigenes ad vigentē inflāmationem gurgulionis & tonsillarū.

Si verō in vigore affectio pervenerit, subducatur alius, aut calidam lo nonem furfurum gar garizet, aut pinsat succum, aut passim tepidū, aut radicis dulcis decoctum cum passio & hyſſo po: aut ficiis vino incoctas: aut succum pinsat, in quo vus sint passē incocti. Magnopere iuuat tur, si amygdalinum oleum in aures indans, fornicio spōgis expressis leniter fouerit. Quin & omelys ex cruda hordeacea farina imponen da: aut ex farina feminis lini aut fennicæ. Quod si iam, ppe ad inspurationē accedere ton sille videant, coadiuuare assidue per ficū deco cū oportet, ppe modūq; incessanter id gargaris ma exultare, limitetq; aquā mullā calidā. At si nihil tale apparuerit, augeat autē malum ita, vt ægri vix transglutire possint, ac suffocationis principii sit nobis suspēctum, alius forn clytre re, aut glande subducenda est, & secunda cubiti vena, cucurbitæ cū scarificatione collo ac men to assignenda. Fomentis etiā & cataplasmatib. robustioribus est frequentius vtendum, gargaris misq; assiduis. Quod si ne his qdē remediis mi telcat morbus, sed augeat inde, vne sub lin gua secent, aut iuxta angulos oculorū, atq; illa q; in fronte consistit. Illanatur autē assidue fel tau-

Pharmacā nō est, vna sola. Pharmacā a vſu deuta manet.

Discussoria mi torū, ne cur sit in principio vtendū, vbi de gerere cō opus.

Gurgulioni in flāmato reme dia iocandū ar digent.

Gurgulionis af fectū curatio se cundum Hippo cratem.

Gurgulionis in flāmato cura tio secundum Archigenem.

Tonsillarum in flāmato cura tio secundum Archigenem.

Vena sub lin gua, vel iuxta angulos oculorū, inflāmatio in conspectu quā da mendum.

ri, & elaterium cum melle: aut fal cum oleo veteri, mellisq; & aceto: aut centaurea cum melle: aut absinthium cum nitro & melle.

Heræ medicamen ad columellam laxatam.

Gallie omphacitidis, aluminis scissi, salis ammoniaci, sing. pares poriones conteruo, inasper girog. Vel ageratum lapidem derafum in polinem similiter columelle imponito. Porro Heraculus Tarentinus recte sanè post vsum medicaminum exacerbantium, iubet colluamus faucibus lentum decoctio, ad tollendam vehementem illans astringentum a spredinem.

Ab asclepiade prodita.

Rosatum siccatum sextarium j. nardi Cetrice vna cū radicibus, & adhaerente terra, fasciculum j. nidi hirundinū sylvestriū ardi drach. in. myrrhæ drach. vin. gallas omphacitidis numero xv. cōtrusa & trita dignis apprime. Et enim hoc misce potēntæ pharmaci. Aliud. Piperis albi, myrrhæ, sing. drach. i. aluminis scissi drach. n. gallæ omphacitidis tantundem: trita adimone. Hoc tamen vtendum non est in gurgulione vehemēter rubente. Aliud eussidē facultatis, quo & nos sumus vsi. Lapidis aegerati, Asie petræ, terræ famæ, singul. drach. iiii. aluminis scissi, croci torrefacti, galliarū omphacitidū, sing. drach. n. tritis vitior.

Critone medicamentum digerens.

Osius palmarum, nucū tenerum immaturatum, siccatū, vitærunq; drach. iij. Vitis, atque in puluillum tereno, vitiorū arido admoto.

Aliud Sorani, maxime mingatorū, ac proinde convenientissimum ad videntes inflammationes. Glycyrrhizam contundito, & mel & aquam pari mensura affundito: dein coquito, & liquorem ipsum gargazandum præbeo.

De pharmaciis ad vlcera oris

aphthas appellatas.

Vlcerantes in superficie oris obortas, aphthas appellant, habentes quippiam igneæ caliditatis. Iunt aut plurimū pueris lactentibus, quum aut vitiosum fuerit lac nutriticis, aut nō probe ipsum cōcoxit infans. Curant facile, vt pote quæ vel a moderate astringētibz compescantur. Quandoque tamē diuturnæ fiūt, ægræq; solubiles, & progressu tēporis nonnihil putrida ginofum acquirūt: atq; hæ sanè fortiori medicamēta postulat.

Andromachi medicamēta ad aphthas malignas.

Aluminis scissi, viii, drach. n. fructus erice drach. i. oleo excipito, & per digitum locis apprimito.

Eiusdem ad aphthas leuiores.

Lyeum Indicū vino tritum, circumlitū, & ericæ fructus tritus, aut rosæ sicce cum melle, auxiliantur. At Crito, adipem suillum, & mel, simul liquefacta, commēdat: vt collationem etiam ex alfinio lacte mādicationemq; portulacæ innititæ melle: quæ omnia & simplicissima sunt, & pueris maxime idonea.

Quæ scripserit Apollonius ad aphthas.

Ad aphthas albas, chalcidē oleo triti penna illinito. Postquam verò puræ factæ fuerint, myrricæ fructū tritum, aut aqua mulla, aut vino dilutum, illinito, maxime infanibus. Ad nigras aphthas, vuam passim exacinatam, & animum, tria cum melle illinito. Vel aramento fortioris tria cum melle vitior. Vel æruginis vermiculata obolos tres in vini quarta hemina parte gar-

garizandos præbe. Vel moriam oliuaurum & acutum pari mētura mista, colluenda dato. Mandendæ sunt etiam oliuæ muria conditæ. Hæc Apollonius. Etenim oliuæ sic affuerat, discutiūt, atq; vehementer astringunt.

Quæ Archigenes ad aphthas scripserit.

Ad aphthas faciunt collationes ex decoctio foliorum oleæ, aut myrti alba. Facit & amurca, & marrubij succus, aut lentus decoctū. Aut fixi vini dulcis cum melle illitæ. Sumē facit ad depascētes, forniculi radicis vitæ cinis. Porro ex colore ipso facile licebit colligere, qui nam humores ipsas aphthas produxerint. Rubicundiores siquidem, sanguinem præcellere indicant: flauiores, amarū bilem: albescentes, pituitosum humorem: quem admodum nigrescentes, melancholicū succum. Qui autem hæc ritè discreuerit, noueritq; facultates singulorū medicamentorū simplicia, is vnicuiq; aphthæ speciei, propriū faciet ad ministrandū remediū. Expēdet aut simul ipsas naturas corporū. Fortiores quippe corporibus fortiora medicamenta adhibēda sunt: debiliores imbecilliora. Ego porro infanibus qui adhuc a nutribz aluntur, lentem cum modico pane, & medulla cerui, aut vituli exhibeo. Ad iuuenē etiam cibis nonnihil ex astringētibz fructibus. Quandoque etiam de lactuca, crēto, folano, & portulacæ cōicio aliquod, si aphtha sit inflammata. Quod si cibum assumeret nequeant, nutrimentum eiusmodi victui alo, vtiq; cōcoquat recte, prospicio. Verum tamen etiam infantes illino, si quidē subrubras videro aphthas: in principio quidē, is quæ moderatissime astringunt, & frigefaciūt: dein verò, eis quæ citra mordacitatē discuntur. Si verò subfluas videro, iisdē vtor, sed magis refrigeratibus. At si pituitosiores, astringentibz. vt si nigrescentes, discussis generosioribz. Cæterū in maioribus pueris, eussidē generis facultatibus pharmacorū vtor, auctis tantūm ipsorū vinibus: quem admodum etiam in perfectis & duris corporibus, singulis relatis facultatibus fortissimis vtor. Sufficit autem mihi in his per omnia misyos vsus cō vino astringēte, quod tum intendit, tum remittit vim suam, pro vt magis aut minus vini fuerit astringens: & pro vt crassius aut liquidius efficit pharmacum ex misyos ac vini mētura. Quod si fordi da appareat aphtha, misy cum vino multo tero. Is verò qui fortiora quam misy, medicamenta postulat, ærugo similiter dissoluta, est vtilis. Cōmodum est etiam pharmacū ad hanc rem, chalcidis oleo trita. Atq; hæc quidem efficaciora. Moderata verò, & maxime ad incipientes affectus, omphacium cum vino & crenometis: similiter etiam rhue. In pueris sufficit rosarū flos, & ipse etiam rosæ sicce. In summa verò, moderatæ aphthæ, maxime in corporibz teneris, moderatis pharmaciis opus habet: fortes verò & maxime in duris corporibus, curantur a validioribus. Fortia pharmaca intelligo, tum quæ astringunt vehementer, tū quæ etiam mordicāt: sicut moderata, quæ prorsus sunt mordacitatis experia, nonnihilq; astringūt. Porro oleū per se, inefficissimū est aphthæ affectui: veluti etiam chalcis: quandoquidem alterum quidem humectat, & fordes gignit: mordet autem vehementer dialicis. Verum moderata mētura ipsorū, optimum pharmacum

Oliuæ muria condita discutiunt & vehementer astringunt.

Aphtharū color in re colore de quosdā rason.

Fortiora corpora validioribus etiam medicamentis, ut imbecilliora minus.

Aphtharū quæ nascuntur in infantibus, curantur.

Columella nata modica.

Pancicini inflammatione remedia ab Asclepiade descripta.

Aphtha sunt in ore vlcera, præcipue vero admodum infans.

Aphtharū curatio per modum astringentia.

Aphtharū variatōnis de scripta.

Aphtha moderata moderatis medicamentis desiderant: ut maliciora, fortiora.

Aphtharū sit opus modicamēta chalcide et auro moderatē committit.

Serotiorem o-
pionem fieri ex
cerato & ero-
gae.

macum efficit. Nam quemadmodum ex cerato & erugine incarnans ethica pharmacum solet, tamen si ambo per se sint contraria carni gignenda: ea demum ratioe ex oleo & chalcitide apium medicamentum coniungitur.

GALeni PERGAMENI de compositione medicamentorum secundum partes, lib. VII.

De affectionibus contingentibus circa
respirationis organa.

Arteria phar-
maca qua di-
cuntur.
Aspera arteria
ex quibus con-
fist particula.

Aspera arteria pharmacum, mos est appella-
re arteriam. Vocat enim arteriam asperam,
viam illam quae ducit a larynge ad pulmones,
ex cartilaginosis corpusculis, brevibus dictis, con-
stituta: vnde etiam tota arteria, interdum dicitur
bronchus. Vestit autem ipsam utrimque quaedam
crassa membrana, quae ob crassitudinem nonnulli
tunica nominatur. Scripserunt porro veteres multa
& diversa medicamenta ad affectus organorum
respirationis: ad vocem tum interceptam, tum rau-
cam. Etenim ubi instrumenta vocis ab humiditate
vehementer atque tenacius uncta fuerint imbuta,
vox intercepta: quum vero moderatus humore
ita sunt, oboritur rauco. Organa vocis quae
dico, intelligit arteriam, et laryngem, & pharyngem,
siue epiglottida. Qui igitur ex vehementi calore
vocem amplius obsecant habet, his similes quaedam
affectus contingit in ista tunica asperae arteriae in-
terna, et quae manibus, crustibus, & muculis, vix
plurimum laboratur. Ceterum curationis genus
evadit. Si quidem crura & manus conspiciat per
oleum licet, quum per cutem in adhaerens muscula
penetrare ipsius possint facultas. Iuxta asperam ve-
ro arteriam cartilaginea post cutem sita, prolubent
in subiecta pellucula transitum facultatis vique
torum mollium. Itaque auxiliorum materia co-
gruentium respirationis organis, quum ab aliis pe-
tenda est, tum etiam ad balneis dulcibus aquarum, cibis
& lenibus, & laxantibus. Si qua vero asperam sen-
tiantur, cibis utendum est quum diutius haereat par-
tibus quae cum loco affecto commercium habent.
Est enim una, eademque sibi continua & cohaerens
tunica, quae pharyngem, laryngem, gulam, & in-
terna ipsius asperae arteriae vestit, obducitur. Qua
re cibi congruentes tunc erunt, quae ex lacte, amylo,
alica, ovis, & libis dulcibus consistunt. Si vero per
haec non curetur affectio ipsa, in vicia sunt a medi-
cis pharmacia sub lingua tenenda, ob id hypoglo-
ttides appellatae: quae eadem facultate cum arteria
cis vocis praedita, ex vino Theriaco, gummi, tra-
gacanthia, & glycyrrhiza consistunt: quae laxant
quidem reprimuntque omnes asperitates, quicquid ve-
ro reliquum est ex inflammatione, concoquant, & ci-
to persolvant. Qui autem pharmaciae huiusmodi sub-
det, patiens sit laboris oportet, ut ipsum paulatim
liquefcent, in laryngem exspirat, remittens inae-
ritum tussim, si qua excitari videatur. Impossibile tamen
est, ut huiusmodi vocem edant, citra visum pharmarum
corum ab his a cinnamomina extergunt: qualia sunt
faba fresa elixa, prunella, ac semine lili torrefectum.
His magis detergantur resina terebinthina, thius-
que, ac despumatum mel, & amygdali amarae:
quemadmodum istis rursus fortiora sunt farina
erui, semine homini, radix uridis, panacii. Ceterum

Vox quando
intercipitur.
Rauco quomodo
dignatur.
Vicia organa
qua.

Respirationis
organum male
affectum reme-
dia vnde peten-
da.

Tonica eodem
vestit galien.
pharyngem la-
ryngem, & in-
terna asperae
arteriae.

Hypoglotides
ex quibus con-
sistunt.

Hypoglotides
quomodo sit
tandem.
Extergenda ad
voca parvati
fuerunt, quae
sunt.

rum his omnibus vina mollia, & passum Creticum,
& Theriacum, & Scybelites, & sapa, & decoctum ca-
ricarum, conveniunt. Est autem ab affectionibus prin-
cipio, vix ad finem eiusdem paulatim progredien-
dum a levisimis tum cibis, tum medicamentis, ad
ea quae desunt detergantur vehementius. Igitur
primis ordinis sunt tragacantha, gummi, famini
aster, amyli, forbitio ex alica & trago, lac, panes
dulcissimi, ova forbilis, sciamia, & oues pueri,
quas strobilos vocant. Ab his autem deinceps est bu-
tyrum, & glycyrrhizae decoctum: id quod praestiterit
ad saporem exmuitum, vel ad Creticum passum misce-
re, rursusque coquere. Haec itaque in affectionibus in-
flammati circa arteriam atque laryngem ortis como-
da in principio sunt, donec moderata inflama-
tio fiat: ac post omnibus a vini potu hoc tempore
abstinendum est. Quum vero moderatum lacta
inflammatio fuerit, vinum dulce Theriacum, aut
Scybelite bibere licet: quo tempore etiam butyrum
ad aptum, & forbitio ex amygdalis, necnon ex la-
cte & melle diutius coctus, amyli iniectione, aut
filigine. Quia sane victus ratione inflammatio quo-
dem ipsa sedatur: relinquatur tamen humiditas mul-
ta, ob quam impossibile est clarum vocem proferri.
Quare transire tunc convenit ad his edulius, ad
omnia ex melle cocta, & ad fabam fresam elixam, &
prunam, & brasiliam, & porrum probe coctum. Si
militet etiam pharmacorum usus idoneus est, quo
tempore inillimano aut asperam praerellunt, eo-
rum quae detinentur sub lingua: post haec magis
detergentia & resicantia exhibentur: id quod gra-
dum facimus, donec ad ea quae acedunt non-
nihil fortium perveniamus. Deinceps igitur ex
arteriacis quae ad veteribus prodita sunt eligenda
praestantiora, huiusmodi methodo adiciantur: quae quidem
nec discernere, nec sit probum vix poterit, qui in
commentariis simplicium medicamentorum ac-
curate non fuerit exercitatus.

De arteriacis ab Andromacho scriptis.

Thurs, myrrhæ, croci, sing. drac. j. scille drac.
ij. passu Cretici sextar. iij. Scilla in passu coquitur,
donec infusisset passum: deinde scilla abiecit, in
sparguntur reliqua: huiusmodi electio, hoc est, deingi-
bile pharmacum.

Alia arteriaca confectio.

Aloes sextar. croci vnc. j. massiches tuncun-
dem. Confectio. Soluit enim alium, concoquitur
(croci ratione) ea, quorum gratia exhibetur.

Alia leniens exasperata, concoquens.

& extergens.

Thurs, succi glycyrrhizæ, sing. vnc. j. tragacil-
thæ drac. vj. nardi drachm. j. myrrhæ, amomi,
croci, sing. drac. iij. mellis Arici quod sit satis.
Confectio.

Alia arteriaca, optima ad tabidos, & oēs in ve-
teratos pulmonis & thoracis affectus. Cinnamomi,
thuris, vtriusque vnc. j. succi glycyrrhizæ,
myrrhæ, tragacanthæ, nardi indicæ, amomi, sing.
drach. iij. croci drach. j. Melle Attico expleto.

Alia ad arteriae affectus, vlcera pulmonis, puris
& sanguinis retentiones, inflammationes in thorace,
& ad ea quae regere educi possunt vehementer ef-
ficax. Resina terebinthina, croci Calici, thuris,
myrrhæ Troglodyticæ, cinnamomi, amomi, na-
cis pueri, glycyrrhizæ abique medulla, aserina
famij, chalbanij, costi, singul. drach. iij. nardi Sy-

FF iij

Vox autem im-
pedita, aut rau-
ca, ob inflama-
tionem affectio-
nis circa laryn-
gem, aut aspe-
ram arteriam
obortitur, quae
vicia organa
tunc ratio con-
veniat.

Artemia, hoc
est, ab affectu
organorum re-
spirationis
tunc conveni-
unt pharmacia
Andromacho.

Tabido ar-
temia optima.

Flavophris
arteriaca sem-
plicitate.

riacæ drach. ij. s. calix nigre drach. ij. tragacanthæ, palmularum Syriacarum carnis, sing. drac. ij. Mellis Attici heminas ij. Conficito.

Hypoglossides, hoc est, orbiculi sub lingua tenendi, ad alperdines gutturis, interceptâ vocem, & sanguinem recitantes. Tragacanthæ drac. vi. gummi drach. v. thuris drach. j. obol. j. myrrhæ drach. j. obol. ij. croci tantumdem: succi glycyrrhizæ drach. j. obol. ij. aur. rad. drach. ij. s. piperis albi grana xxv. palmularum pinguium carnis drach. ij. Tragacantham passo maceratam & tripartem reliquis tritis cōmixturâ, singulorū catapotia magnitudine fabæ.

Arteriacæ delingibilis, ad tabescētes, purulentos, atq; hydropas incipientes, & tussies in veterata cōgruens. Datur per diem & noctē cochlearij mēsurâ. Succi scillæ sext. iij. passij Cretici sext. iij. vini Falerni sext. viij. mellis Attici sext. iij. myrrhæ trientē: croci, thuris, vtriusq; sextantiē: aristolochiæ oblongæ minam j. s. glycyrrhizæ minam vnam: radicis eryngij sextantiē: scissæ, bardis Celnæ, singul. vnc. j. xylobalsami bessiem. Lignosa illa confusa in vino macerata per tridui, dein ad lentū ignem ad tertias coquito, atq; ita exprimō, & recrementis abiectis, passum, mel, & scillæ succum cōmixto, & ad mellis crassitudinem coquo. Crocum verō, thuris, & myrrham, cum vino rento, atq; vbi opem habuerint pharmacū, addito: postquā verō fuerint modicē fusa, ab igne tollito, & reponito ad vsum.

Alia arteriacæ media, mediis congruens arteriæ affectibus.

Croci, vix passæ exacinatæ, vtriusq; drach. j. amygd. dulcium drac. viij. myrrhæ obolos iij. tragacanthæ drach. iij. piperis albi obolos iij. melle cocto exiciantur.

Cronis Arteriacæ, ad vocem interceptam.

Ficum & eryngium probe coquito, & ad decoctum ipsorū gummi addito, vt melle durior confectio fiat: exhiberōq; ad noctem.

Alia etusdē, faciens ad affectus arteriæ, & vlcera tum aurium, tum etiam pendendi. Thuris obolos iij. myrrhæ drach. ij. passij cyathos iij. Passum ad mellis spissitudinem coquito: dein myrrham & thuris cū passo semicocto ablato, misce-to. Facit etiam ad dysentericos & coliacos. Rectissimē autem fecerit, qui arteriacas concoquētes atq; lenientes, in duplici vase coxerit: nempe vasculum quod coquendum pharmacū cōtineat, in aliud plenum aquæ feruentis imponens.

Confectio Cronis ex capibus papaueris, diacodyon dicta, ad affectus organorum respiratoris conduens. Capita papaueris agrestis ostēgētā: aquæ sextarios lxxx. Coquito ad tertias, hoc est, donec fæcida appareat: atq; expressis addito mellis lib. x. Si verō variâ efficere vis, adde croci, myrrhæ, succi hypocistidis, singul. drach. xij. thuris drach. vj. acaciz drach. xij. Optima tamen est simplicissima.

De vfu confectionis ex papaueris capibus.

Vfus eius est in iis qui somno opus habēt: quibus etiam ex opio confecta sepe exhibere cogimur. Opus habent maximē humidorū pharmacia ij, quib. tenuis fluxus ad capite ad asperâ arteriâ destillat, nō permitens dormire ob cōsequen-

tē rufum. In talib. ego enā ex sapa, hoc est, hepse mate, siue multo cocto, quod enī fixum vocāt, pharmaci cōpositionem parare soleo. Quin & per passum aut Theriacū Creticū mellei est q̄per mel cocturâ fieri, vbi fluxus valde tenuis existerit. Mel siquidem fugiendum tunc est, quum tenues fluxiones augeat, faciliatē tenuandi præditum. Admiscetur etiam huiuscemodi pharmacia co glycyrrhiza, ita vt simul cū ipso coquantur. Si verō in pulmone consistat copia humoris delapsi ad capite, cōfectio ex melle est præstantior. Datur cōmoderata mensura duorum cochleariorū sanis magnorum copia. Augebis autē & minues hanc copiam, respiciens ad magnitudinē corporis cui exhibiturus es, necnon ætatem, anni tempus, atq; regionē. In omnibus enim his, frigidioribus minimū dabis, calidioribus amplius.

Arteriacæ ad Asclepiade scriptæ.

Brassicæ succum melle coctum lingendū exhibe. Alia. Cremoris eryngij in aqua cocti, heminas ij. Cremoris caricarū similiter coctarum, tantundē. His adde gummi subtilissimē dissoluti drac. viij. coquito diligenter ad arteriacæ spissitudinem, & inde cubitus iuris ad cyathi mēsuram lingendum dato. Alia. Chalibini drach. vj. piperis drach. j. nitrī tantundem, mellis Attici cyathos vj. Chalbanum & mel coquito, densatāq; adicito ceteris, vitōrū. Alia insignis. Croci, myrrhæ, succi glycyrrhizæ, thuris, casis, sing. drach. j. piperis grana xxij. passij Cretici sext. iij. mellis Attici cyathos vj. Vtice.

Hypoglossides Diocoridæ.

Croci, myrrhæ, tragacanthæ, succi glycyrrhizæ, sing. drac. j. naces pineas repurgatas, contusissq; numero. lx. amygdalas mundas totidem. Excipiantur melle decocto. Datur nucis ponticæ magnitudine sub lingua tenenda.

Alia Mithridatis.

Myrrhæ, croci, vtriusq; drac. iij. nardi Indici, terebinthinæ, vtriusq; drach. ij. thuris, casis, cinamomi, sing. drach. j. passij Cretici heminas iij. Passum & terebinthinā ad perfectū compagem coquito, & cum siccis cōmixto: indeq; ad nucis ponticæ magnitudinē sub lingua tenendū dato.

Alia mirificæ faciens ad affectiones thoracis. Fiant fabacæ tostæ hem j. indis Illyricæ quadratæ, nucum pinearū tostiarum sextantiē, pulegij aridi cōtusi sesquidracemam: seminis vrticæ drac. j. piperis vnc. s. Mellis boni sext. ij. Farinā cum melle ad densitatem coquito. Seminis lini enī tusti, tostī & cribrati hemina vñ in promptu habet, cum ceterisq; adicito.

Alia ad rufum & spiritus prolationem, valde probe expurgans.

Hysopij, pulegij, vtriusq; sextantiē: iridis, sem. finapis, nasturij, anisi, piperis, sing. vnc. j. rufæ & cribrata, melle cocto excipio. Datur cochlearis boni mensura.

Confectio ex marrubio Platonis.

Myrrhæ, hyrcis, opij, succi marrubij, chalbanij, croci, singulares partes Vtere melle cocto exceptis.

Pharmacum Harmonia dictū, ad destillationes, insuperabilemq; de fluxum conduens. Syriacis, castorei, piperis, cardamomi, singulorum drach. iij. opij, myrrhæ, seminis hyocyami albi, sing. drach. iij. passo excepto in catapotia reducito,

Melle vsum su
gratum esse.
vbi tenuis fluxus
ad capite ad
asperam arteri
am destillat:
recipiendam
aerem lenem
crassam.
Diacodyon me
dicamentum vici
dicam.

Arteriacæ modi
camentum ab
Asclepiade scri
bitur.

Hypoglossides,
hoc est, modica
mens sub lingua
tenenda, Dio
corida.

Hypoglossides
Mithridatis.

Hypoglossides
varia, multoq;
vsum.

Hydropi vocen
te aptum me
dicamentum.

Vaci interce
pte arteriacæ
Cronis.

Vlcibus an
tem palmu
dis. medicam
entum.

Coquenda esse
arteriacæ leu
cissima in dupli
ci vase. q̄ quo
modo.
Diacodyon Cri
onis.

Diacodyon,
hoc est, ex capi
tibus papaueris
medicamentum,
quibus cancer
nial.

Marrubio con
flati medicam
entum.

Harmonia di
ctum medicam
entum diffusum
ad pelvis can
cerem.

cito, dardg ciceris magnitudine ad somnum.

Medicamen Andromachi, Ambrosia dicta, ad phthicos & febres repentes per circuitus, Nardi, crod, myrrhæ, costi, calix, cinnamomi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi castorei, chalban, terebinthæ, styracis, succi papaveris, seminis hyoscyami, sing. drac. j. tragacanthæ drach. vj. aulæ, sem. lini, sing. drach. j. mellis qd sit satij: vini Falerni heminam. Tragacantham vino sufficienti macerato, & reliqua simul cum melle cōmutito. Datur febrientibus sequisdrachma ex aqua mulla: febre carentibus vicia media cum melle & aceti cochleario vno, & vini Falerni cyathis duobus.

Aliud ad omnem tussim.

Anisi drac. ij. costi obolos iij. myrrhæ, castorei, chalban, piperis albi, sem. hyoscyami, opii, succi glycyrrhizæ, sing. drac. j. passio excipito, redigito in catapota, ciceris magnitudie.

Aliud ad omnem tussim, & fluxionem, & abscessus internos.

Sagapeni, gētiænæ, myrrhæ, opo panacis, piperis albi, sing. drach. ij. baccarū lauri mund. drac. iij. trita, & aqua excepta, exhibito ad græcæ magnitudinem fabæ: ischadicis tamen paulo plus, ex vini diluti cyathis tribus.

Dereiectione sanguinis.

In reiectione sanguinis primū periculū est, ne immoderata eius vacuatio fiat. Vbi verō superfluous est, curatio eius quidē, quæ ex referatōe osculi alicuius vasis conuigit, p obturationē sit osculi dilatati: eius verō quæ ex vasis ruptura, p cōglutinationem eiusdem: quemadmodū eius quæ ex erosione, p erosiorē renutritionem. Obaturatur igitur osculum referatum, per astringentia: conglutinat autem ruptum, per eadem, & quæcumq; ipsis in compositione miscetur, citra mordacitatem resiccantia, & glutinosum quiddam habentia, velut est Lemnia terra, & Samius asfer. Renutritur corrofa per cibos boni succi, & pharmaca carmen gignentia. Igitur iuxta primam rationem, ex talibus pharmaca cōponuntur congruentia ad curandā sanguinis erectionem: iuxta secundā verd, in iis qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut larynge reiecti sanguinem, miscentur prædictis cōgruenti mēsurā calidā & tenuiū partū medicamenta, quæ infestissima sunt tribus illis affectionibus dictis: miscetur in quā gratia distributionis, vt videlicet astringentibus medicamentis præparat, ac veluti sternit viam. Atque cum ex locis circa stomachū, aut alia, aut aliquod intestinū, sanguis educit, huiusmodi pharmaca rō mēsurā nō est opus. In festissimū tamē his est id genus pharmacorum, quod in tantū refrigerat, vt affectū stupefaciat: quamvis & hæc miscetur medicamentis ad sanguinis reiectiones cōgruentibus: quā alioiē somnum conciliant, & cōmodissima sint iis qui tussilancinant, sistentia nimirū sanguinē qui ad vas affectum deferretur: atq; hoc per suā frigiditatem. Atq; hi sanē sunt compositionis scopi.

Quæ Audromachio ad sanguinis reiectionem scripta sunt.

Acaciæ drac. iij. rosarum siccarum, balaustrii, sing. drach. viij. gummi drach. ij. tragacanthæ, drac. j. cum aqua pastillos facito, quorū singuli

pendeant drachmā vnam. Dato ex aqua pluuiæ: habet enim vim astringendi. Aliud siccus sanguinē. Croci Cilici, myrrhæ, indis, nardi Indicæ, thuris, acaciæ, sing. vnc. j. succi papaueris, cocti, piperis, sing. vnc. s. rosarū siccarū trientē. Mel le excipito. Datur siccæ Aegyptiæ magnitudō.

Aliud. Succo hypocistidos, balaustrii, acaciæ, gallæ, cynthorū, sing. drach. x. succi papaueris drac. vj. croci tantundem. Redigito in triobola res pastillos. Aliud egregium. Balaustrii, acaciæ, opii, myrrhæ, sing. drac. ij. tragacanthæ, succi hypocistidos, storum rosarum, seminis hyoscyami, singul. drach. iij. thuris drach. iij. excipito succo polygoni.

Aliud ad hæmopticois, & dysenterias.

Flores rosarū, opii, acaciæ, gummi, balaustrii, hypocistidos, sing. quadrantē: gallæ vnc. j. seminis plantaginis, eucladæmæ succi, vtriusq; sextātem: thymolindici, succi rosarum, vtriusq; vnc. j. redigito in pastillos drachmales.

Quæ Asclepiades ad sanguinis reiectiones scripserit.

Radices polygoni manipuli: rad. symphyti tantum demit: rubri acetabulum: aquæ sextarios iij. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathū vnum dato, cum gummi tenuissimē tritū & dissolutū drachma vna. Aliud. Mororū rubrorum nōdum maturorū lib. xvj. aquæ pluuiæ sextarios xvj. coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. Idē licetibi facere enā de corni fructu. Aliud. Balaustrii, terræ Samiæ, corticis thuris, gummi, singulorū æquale pondus. Trita & cribrata exhibe cochlearis mēsurā in aquæ frigidæ cyathō vno. Aliud. Succo hypocistidos, succi acaciæ, succi rhois Syriaci, balaustrii, opii, gummi sing. drach. iij. Vini myrtis quod iatis est. Confectio, & vitior.

Pastillus ex succino, hæmopticois, diuturnæ & recentis tussi, phthisicis, sanguinē reiectentibus, purulentis, celiacis, dysentericis, & in flatis cōfereus. Psyllij mundi drach. xlv. indis thymicæ, mastiches, ramentorū succini, croci, sing. drach. xxx. opii drach. xv. Psyllium in aqua calidā cōiectum macerari sinato. Vbi vero suo glutine & mucilage ipsam aquam infecit, liquorē exprimito, & cum eo pharmacum in pastillos coquito: ex quibus obolos tres ad somnū dato. Sint autem aquæ sextarii terni.

Pastillus ex corallio.

Coralli, terræ Samiæ, vtriusq; drac. viij. Balaustrum, amyli, terræ Lemniæ, sing. drach. iij. seminis hyoscyami albi, opii, hypocistidos, singul. drach. ij. Excipe succo amoglossæ, coqeg in pastillos, & exhibe.

Cōfectiones sedantes dolorē, tabescentibus, & sanguinē reiectantibus, intermorimq; affectibus cōmodæ, ab Andromachio scripse. Radices panacis, seminis dauci, castorei, sem. hyoscyami, opii, sing. drach. iij. Mellis quod sit satis. Dantur oboli quatuor, cum aquæ cyathis tribus.

Alia sedans dolorem, valens ad tormina, & dysenterias.

Sem. apii drac. ij. anisi drach. j. piperis albi tantundē: myrrhæ, castorei, vtriusq; obolos iij. opii, croci, sing. obolos iij. gentianæ drac. ij. Pastillos triobolares conficito, variēq; vitior.

Ambrosia Andromachi, siccus per circuitus conferat.

Tussi omni generis medicamentis optatum.

Hæmopticois curatio.

Obturbatio vasorum à quibus fiat. Circinatio ruptorum vasorū à quibus fiat. Remotio vasorum à quibus fiat.

Distributio partium medicamentis ad infestissima sunt tribus illis affectionibus dictis: miscetur in quā gratia distributionis, vt videlicet astringentibus medicamentis præparat, ac veluti sternit viam.

Suspensio medicamentis quæ ratione pharmaci conueniuntibus ad sanguinis reiectiones miscantur.

Hæmopticois remedia ab Andromachio scripta.

Dysenteria recedens.

Polypus reiectus ab Asclepiade scripta.

Pastillus ex succino Conficito, quoniam habet virtutes de Characis apud pedas.

Pastillus ex corallio.

Androsia Andromachi, ad affectus organorum respiratorum, ad infestationes internas diffinitionem congruentia.

Alia iucunda appellata.

Iridia Illyrice, succini, croci, mastiches Chiz, sing. drac. xxx. pſyllſi drach. xlv. succi papaveris drach. xv. cum aqua pluuiæ paſtillos, quorū singuli pendeant drach. j. a. conficito, & exhibeto. Pſyllum tamen per diem ac noctē aqua pluuiæ macerato: dein coquito, & exprimuro, cremorēq; cum alius misceto.

Alia dolorem sedans ad oēs internos affectus & sanguinis reſectiones, vnde cūq; erumpit. Facit & ad nepliricos & hepaticos. Hæcne prius dederis, quā mercedē accipias. Cinnamomi, caſis, vtriuſq; drach. ij. myrrhæ, piperis vtriuſq; chalbani, ſing. drach. j. opij drach. ij. Triteri cū melle pauco, in catapotia redigito, partim magnitudine fabæ, partim quātrate araci. Dato iuxta cuiuſq; vires cum aqua, aut pro iudicio tuo.

Alia ad eadem, Myſterium dicta.

Croci, coſti, caſtorij, aſari, ſem. lryofcyami, opij, ſtyracis, ſing. drach. j. Exſcipo melle, vtriuſq;

Anodyna ad eadem affectiones ab

Aſclepia de ſcripta.

Seminis cucumeris horſiſis decorticati drac. viij. amyli drac. iij. ſem. lini, ſem. papaueris albi, vtriuſq; drac. ij. Tuſa & cribrata exſepe tragacanthæ cremore, & in drachmalis paſtillos redige. Dantur oboli iij. nō febricitantibus quidem, ex vino: febricitantibus vero, ex ſucco rhois. Faciunt ad fluxiones thoracis.

Cōſectio Panchreſtus dicta, hoc eſt, multi vſus, ad tuſim antiquam, purulētoſam, orthopnoicoſ, tabeſcentes, ad omniſq; inflatōnes. Pellit ſecundas & mēſes, medeturq; veſicæ affectibus. Te rebintlū drach. viij. ſtyracis drach. vj. myrrhæ, drac. v. croci, iridis, chalbani, ſing. drach. iij. Seminis hyoſcyami, corticis mandragoræ, ironiſis torrefacti, opopanaxi, ſing. drach. ij. piperis, ſpuma nitri, vtriuſq; drach. j. paſſio exſcipo.

Antidotus Ariſtarchi a diſcordia, conſectis ad affectiones prædictas, remittitq; venenis, exterminantq; febres repetētes p circuitus, vna hora ante exacerbationē exhibita. Cinnamomi, coſti, chalbani, caſtorij, ſucci papaueris, piperis nigri & longi, ſtyracis, ſing. vnc. j. mellis ſextarii vñ. Anda teruntur & cribrantur. Chalbani coquitur cū melle: excolaris verò reliqua addunt, reponūtūq; in vitreæ pyxidem, argenteamve. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudine, cum aquæ mulſe cyathis duobus, inſiſtatis digito guttis aceti nouē.

De orthopnoia.

Qui citra febrem denſe reſpirant, ob ſymptoma id dicuntur aſthmatici, hoc eſt, anhelōſi. Eoſdem etiā ob ſymptoma aliud orthopnoicoſ appellant, quod thorace recto ſpirare cogitur, metu ſuffocationis. Minus eſt autem quod hi uſpirant, quā pro viſu reſpirationis, etiā ſi thorax ipſis plurimū dilateſcit. Ex quo manifeſtū ſit, interuallū capacitātē coarctatū ipſis eſſe præter naturā: quod de gri etiā haud obſcuro ſenſu percepit. Fit etiam & purulētiſis locorū coarctatio, ob collectū inter thoracē & pulmonē humore. Fit etiā peripneumonicoſ, ob pulmonē inflamationē. Reſtant autem adhuc affectiones duę, quę anguſtiam locorū faciunt in viis per quas aer inſpiratur: quā aut humor, craſſiorum & viſcidorū multitudo pulmonis brōchiis fuerit impaſta, aut tu

mor abſceſſus ſimilis in ipſo coſtiterit. Cæterum curatio ambarū affectionū aliquid cōmune habet, aliquid priuatiū, & alteri tantū propiū. Cōmune quidem vtriſq; eſt, vt abſuſaſi redvndāti humoris affectiones gignētis: propriū, affectioni quidem viſcidorū humorum, vt per attenuantia & extergentia pharmaca diſſipentur: verò quę propter tumorem accidunt, vt per attenuantia & euacuantia eadem conſumptio fiat: quę curatio rurfus omnibus in profundo abſceſſibus cōmunis exiſtit. Vini itaq; potus ambabus competit. Omnis autē potus modicus ſit in iis qui alibi abſceſſum habēt: multus cōtrā, in illis quibus viſcidis & craſſis ſuccis ſunt obſurgata bronchia. Quippe pharmaca eiſmodi repurgantia humores, taſſes neceſſariō excitant: nō verò facile per ſputum reiſcitur, quod expurgatum eſt, vmi mor ob craſſitudinē: quapropter lūmeſtatione multa opus habet, quō eſſeturat facile.

Quę ſcripſit Aſclepia des ad dyſpnoicoſ.

Scillæ crudæ ſuccū exprimiro, eiſq; parem Atrici mellis menſurā ad dūro, & ad prunas a demoraſ cogro. Dato inde & ante & poſt cibū myſtri menſurā. Aliud. Origanij drach. viij. comæ thy mi, iridis Illyrice, calameſis ſiccæ, piperis albi, aniſi torrefacti, ſing. tantundem. Cribrata melle coſto exſcipo. Dato nucis ponticæ magnitudine. Aliud. Vuæ paſſæ Rhodiæ, exacuatæ,

30 acerbabulū: ſernigræ ſorti tantundem: aquę plureſtatarum j. Coquito donec diſſoluantur, & liquorem excolarem reponito. Ex hoc præbeto aſiduē, & iuxta ſingulas irritationes, cyathi mēſuram calſactū. Aliud. Aniſi, ſulſuris viui, vtriſq; quadrantem: ammoniaci rhymiamatiſis, caſtorij, melanthij, ſingul. drach. iij. aqua diluta in catapotia cogro, vñq; in aceti mulſi cyathi tribus ppinaro. Hec omnia ſunt ab Aſclepiade ſcripta illis, quibus pulmonis bronchia craſſis & viſcidis humorib. ſunt reſerta. At verò abſceſſi qui

40 attenuantibus & reſiccantibus opus habēt, maxime gaudent aromatum facultatibus, quę & tenuium partium ſunt, & reſiccatorię, præter hoc quod calſaciūt. Porro iis qui propriē orthopnoici & aſthmatici nominantur, pharmaca conueniunt ſecantia citra calſactionem: ob idq; iuuantur maxime ab ſcillitico aceto, necnō ab ſcalla, & ab aceto mulſo, eo demq; ſcillitico. Quemadmodum autem in hac affectione vehemētē cauendū eſt, ne calſaciamus, propterea quod viſcidis & craſſis ſucci non modo nō iuuantur, ſed offendentur etiam viſu ſcilliticoſ: eodē modo quę valde refrigerant ſunt omnino vitanda.

Quę pharmaca ſcripſit ad eiſmodi affectiones Andromachus.

Ad dyſpnœā. Sulſuris viui drach. j. Sem. rutę ſylueſtris tantundem: ariſtoloſch, abſinthij, ammoniaci rhymiamatiſis, abrotoui, ſing. drach. iij. trita cum aceto in catapotia fabarum inſtar redigito. Dato mane tria, & veſperi totidem. Aliud. Ammoniaci rhymiamatiſis, abrotoui, ſing. drach. ij. ſulſuris viui drach. j. formato cum aqua paſtillos, & cum aquæ mulſe cyathi tribus præbeto.

Aliud. Scillæ, ſulſuris viui, bituminis, ſing. partem vnam. Dantur oboli iij. in aceto mulſo.

Potius eſſe debere modicū in quibus vrgens reſpirationis ab aliquo tanto re anguſtior: citra multū illis quibus bronchia à craſſis & viſcidis ſuccis obſtruantur.

Dyſpnœa remedia ab Aſclepiade de ſcripta.

Scillam aceto tenui orthopnoicoſ & aſthmaticos maxime ſpūantur.

Dyſpnœa remedia Andromachi.

Anodyna ad internos affectus ab Aſclepiade ſcripta.

Panchreſtis Aſclepiade, multis vſus ad vana interna affectus.

Antidotus Ariſtarchi ad diſcordia.

Aſthmatici cui ſic dicuntur. Orthopnoicoſ cui ſic dicuntur.

Orthopnoia cauſa.

Purulentiſis.

Peripneumonicoſ. Reſpirationis anguſtiam cauſa quę offeſcere poſſunt.

GALENI PERGAMENTI

de compositione medicamentorum secundum partes, lib. VIII.

De pharmacis congruentibus ori ventriculi.

Porro difficillimum est, ad veritatem eos revocare, quod sese alicui fecisse tenuiter addixerint. At qui prudentes sunt, veritatis ardore de fiderio tenentur, si (ut spero) custodient ea que de natura nobis veluti iudicandi instrumenta concessa sunt, ad actionum vires cognitionem. Experiencia nempe & Rationem quorum semper alterum, ad perfectam disciplinam, altero indiget. Etenim falsae opinionis animosa hominum praecipue cupantes, non solum furda, sed adeo etiam praecor efficiunt, ut videre nequeant, quae ab aliis conspicere cernuntur. Proinde fit, ut complures Empirici, nec pauci etiam ex iis qui sese Methodicos iactant, per pharmacata relaxantia curantes inflammationes oris ventriculi & hepatis (quae miscellae astringentium desiderant) aegros omnibus ad vnum occidant, atque in exinum adigant. Quippe nisi facultate quae firmitudinem addat, in illarum partium astringentibus ad relaxantia permisceas, vita in discrimine vocatur. Igitur astringentia omnia quae ad illarum partium affectus, partim emplastris atque ceratis mista adhibentur extrinsecus, partim intus vorantur, impraesentiarum ea ipse indicabo, auspiciatus ab illa quae convenit inflammationibus: quod maxime in ipsis aperi pectentur. — CERATUM ergo quo assidue uter, ex aloë, mastiche, cera pontica, & vnguento nardino conficitur. Ceterum ad vicia vnam mensuram nardini olei, iuxta quidem octo, restat: uteris septem cere: partes inquantur. Liquantur igitur in duplici vase, ut refrigeratis & deaetha, ad desaloës & mastiches, reductorum in polline, utriusque drachm. i. & quandoque plus, si ceram ut ad sesquidrachmā non progrediaris. Quod si ampliori opus sit attractione, nimis ranta imbecillitate existente, ut ventriculus retinere cibum non possit, addes drachmā vnam omphacis: id quod primum iniici debet in cerati preparatione. Similiter licebit abstinere succum miscere, quandoque etiam ambo: sicuti & remū hypocistidis, & quantum amantiss. Quin & rhois succum non raro admiscui. Cerati tamen augenda est copia, iuxta proportionem numeri aliorum pharmacorum. At inveteratis atque induratis inflammationibus, magis varia conveniunt pharmaca, & quae ex aromatis quippiam habeant, nonnulli etiam emollientium atque digerentium sortiantur: cuius modi est quod ex melliloto conficitur, cognens omnibus iuxta praecordia inflammationa. Porro os ventriculi, nonnulli hodie communiter stomachū nominant: quam partem olim frequentius cardiam, hoc est, cor, appellabant: unde vox cardinalia est deducta, & minime quid cordis, sed oris ventriculi dolorem & mordicationem significat. Fuit quippe in ipso tū morbus, tum inexplēbilis fames, ut intrerit etiam nauseosae dispositiones: in quibus omnibus communis quidam astringentium pharmacorum usus inventus est: ad illa autem sunt plerique ipsorum calascitica simul & astringentia. Verum affectus in profundo sitos

ut cognoscamus, maxima utamur coniecturis est opus: ob idque vniuersima Medici arria pars est, quae cognitionē ipsorum indicat. Quum igitur octo sint in singula partibus intemperantiae corporis: atque haec omnes ut secundum solas nudas qualitates gignantur, aut accedente adicius humoris complexu: certe earum singulae per contrarias qualitates sunt reducendae ad mediocritatem. Quia verò plurimae intemperantiae hominibus exte vadantia humorū, magis quam ex imopia sunt, pharmaca reficētia plerisque magis iuvant. Quum autem reficētia ipsa partim quidem astringant, cogendo astringendōque subitam eorum quae contringunt: partim verò disculant, & in hoc substantiam eorum dissoluant: ob hoc ipsum sanē plures sunt qui astringētia bua indigent. Verū si humida intemperies coeat cum frigida, leduntur qui per sola astringētia curantur, quae frigida facultata existit. Quare merito plurima pharmaca per experientia inventa, ex miscellanea materia conficiuntur, astringentia videlicet atque calfaciente: quorum omnium differētiā cognosces, si simplicium pharmacorum facultates memoria teneas.

Confectiones stomachicae Andromachi.

Hiera ad stomachicos: Floris iunci odorati, xylobalsami, mastiches, croci, nardi Indici, asari, cinnamomi, singulorum drachmas vj. aloës lotae drac. centū. Simul trita reponē, praebēque ieiunio coctilearia q̄. Sunt tamē qui ad aloës drachmā centū, singulorū aliorū octo drachmas addi cūnt. Non desunt qui ab his flore iunci odorati conficiant. Porro ad ventris subductionem illota aloë est aprior: elota autem multum de medicamentosa vi amittit: quam etiam febrecitanti dare aliter possit, si febris sit valde mitis. Infestimissima autē est aloë, vel lota, iis qui citra vitiofosuccos intemperie asiluguntur calida & sicca. Proximam ab illa eadem percipiunt, qui siccam intemperiem habent, vel frigiditatem etiam implētiā: & in vniuersum, qui ex sola qualitate pariculam aliquam affectam ac laesam possident. Etenim intemperantiae in humoribus consistentes, pharmacis ipsas evacuantibus egent: quae verò ab his intestant, penitus cōmigrant in tabem, ob pharmaci huius ex aloë constantis exhibitiōnem. At ubi vitiosa humiditas perrigat ventriculi nūmicos, hiera ex aloë est vniuersa. Omnino autē sic affectus plus aut minus adfunt nausae quaedam symptomata. Iam verò purgatio quae aloë molitur, imbecillior est, quā ut vniuersum corpus purgare queat. Addi illi mastiche, ut vires eius refringat, ventriculo existētia etiam grata, & odora. Cinnamomū verò, quum ob eandem causā, tum etiam ut partium suarum tenuitate aperire vitia meatus possit, extēgetque atque attenuare, si quid viscosum aut crassum in humoribus insit. Crassio quippe succos ob purgatorum facultaria imbecillitē aloë trahere non potest.

Quapropter biliosarum ventris dispositionū optimū pharmacum est. Ad haec cinnamomū vim obniter alteratricē vinoformis humorum, in id quod raturae modo respondet. Scire itaque licet, eas dispositiones quae a praua succi circa ventrem stomachūque oboriuntur, maxime per medicamenta ex aloë iuuari: mirum autem in mo-

Affectus interiori
ut cognoscatur,
opus est cōiunctis
m.
Intemperantia a
particularum
sunt alio, quae
per contrarias
qualitates reducendae
sunt ad mediocritatē oportet.

Stomachicae
reficētia Androm
ma ha.
Hiera a praua va
ritā capillatū

Aloë lota & ill
loca facit.
Aloë est infestis
sima est qui citra
vitiosos succos
intestantur de
Asiarum calida
& sicca.

Aloë vniuersa, laeta
raturā intemperie
vniuersam redū
dantem homin
um, deducit
in tabem.

Hiera picra
quāvis vniuersa
est inferiori,
quāvis ut totū
corpus purgare
possit.

Mastiche vni
uersalis grata.
Cinnamomū
salutis.

Aloë biliosarū
dispositionē vni
uersam aperit & ill
medicamentum.

Astringentia
vniuersa per
longa, maxi
mi laetis dispo
sitionē vniuersa
vim obniter vni
formis humorum,
in id quod raturae
modo respondet.
Scire itaque licet,
eas dispositiones
quae a praua succi
circa ventrem
stomachūque obori
untur, maxime per
medicamenta ex
aloë iuuari: mirum
autem in mo-

Instrumenta
doo nolo fuisse
data & natus
re, necessaria
ad vera a
māte perueni
tū. Quae vni
uersa, quāvis
semper ad perfectā
disciplinam ad
eum iudicet
altera.
Inflammationes
oris ventriculi
et hepatis, cum
relaxantibus
miscellae astring
gentium pharm
acorum deside
ranti.

Ceratum Gal
eni ad inflama
tiones oris vni
uersae & hepatis
maximē iuge
bit.

Os ventriculi,
quod olim cor
nominabant,
nonnulli hodie
stomachum vo
cant.

dum lœdi, ab edulib, potionibus, & pharmacia astringentibus. Cœtra verò, vbi humores nō qualitate, sed copia os ventriculi afflixerint, vtilissimus astringentiū est vſus, nimis languida tunc, existente ipſa particula affecta, inſtar laxatorum aricularum, quorum etiam per astringentia affectio corrigi. Porro polychreſta, ſive multi vſus medicamenta apparentur, quā vnum habere viginti affectionibus congruum malumus, quā tot numero alia: quum tñ ad ſingulas affectiones vnum aliquod deſtinatur, eo quod ad plures paratum eſt, melius exiſtat.

Ad ſtomachicos hiera Antipatri.

Aloës electæ drach. iij. maſtiche drac. ij. aſari drach. iij. roſarum ſiccaram, iunci odorati, mei, plu, caſia, ſing. ſem. ſum. Tritis vitior.

Stomachica Galli, affectionibus quæ caſſieri & ſiccari poſſunt, vtilis.

Corticis radicis feniculi lib. s. aceti acris ſextarium vnum s. sloēs quadranten. Mellis Attici lib. j. Radices lotas ad triduum aceto macerato, deinde coquito: atq; vbi coctſ fuerint expreſſas proſciito, & aſuſo ad acetum melle, ſimul coquito. Dein aloē inſpergito, & coſchlearia tria cum aqua dato. Etēnū vbi per profundum ventriculi, hoc eſt, altius, copioſa, ſed non praua, ſue rit deſta humiditas craſſa ſimul & viſcida, opus eſt miſtura pharmaci attenuatori, perroſuique, quale eſt tñ acetū, tū oxymeli. Si verò nec talis ſit humiditas, nec altius imbibita, ſola ad curationem aſtringentia ſufficerint. Eſt aut ſufficiens ſignum frigide affectionis ventriculi, ſi xger ſe pō ſuſine percipiat.

Ventriculicuius caſi humores craſſi altius imbibiti, qualia medicamenta deſiderant.

Ventriculi frigidi affectionem præſentat, præſentat ſuſine ſuſine.

Aſclepias ſtomachica, ad roborandū ventriculū, exprimendiq; illius advenitias humiditates cōgruentia.

Ad ſtomachi ſubverſiones. Nuculeorum mālī punici tuſorū ſicca ſextarios iñ. ſucci menthar ſextar. j. mellis Attici tantundē. Coquito in ſitilli vaſe, aſiduē agitando: & vbi denſata fuerint, ab igne ablata reponito: porrigitoq; myſtū vnum, aut duo, ante cibum.

Cōſectio ex fructibus, ad ſtomachi ſubverſionem, cœliacos, & dyſentericos faciens.

Māla cotonea numero x. ſorba numero l. me ſpila toidem. Rhœis rubri ſextariū vnum. Aquę congios vi. fructus tuſos & in aquā cōſectos, diligēter coquito: & vbi diſſolū fuerint, liquorem exprimito, ad rurius coquito. Quā verò tertia pars liquoris ſuperfuerit, addito mellis Attici lib. iij. & ad prunas aſiduē agitādo coquito, ac ſpiſſata reponito.

Catapotia ad ſubverſionē ventriculi.

Rofarum rectū deſectū vnguib, drac. viij. ſem. papaueris albi drach. iij. ſem. hyoſcyami drach. ij. aloës obolos iñ. aſari tantundē. Cū aqua diluta in pilulas redigito, præbetōq; cicris magnitudinem.

Ad ardorem ſtomachi catapotium reſtinguere ſolent.

Seminis ſatui cucumeris drac. viij. ſem. porri lacę tantundē: tragacanthę drach. iij. Tragacantham ouorum crudo recentem candido diſſolutam, pōe tritis reliquis addito, & ex eis miſtis ſingito catapotia, quorū aſſicatoriū in vmbra, ſub lingua vnum tenendū dato. Hęc Aſclepi-

des. In vniuerſum aut ſuglida ea pharmacia ſunt in ventriculi affectibus, quæ chalcantion, mandragorā, vtrūq; alia id genus recipiunt.

Ad voluſoſas ſtomachi ſubverſiones paſſillus Amazonum ab Aſclepiade ſcriptus. Seminis apij, & anij, vtriuſq; drach. vi. abſinthij drac. iij. pipetis, myrrhę, opij, caſſiorę, ſing. drac. ij. cinnamomi drac. vj. cū aqua paſſilōs ſingito, & ſumum drachmā vñ dato. ſtomachica cum protropi dulci cyathis iij. cholericis & vomentibus obum, cum frigida: cœliacos & dyſentericos cum haccarū myrrī decoctio: ſpleneticos, cum hydromelitoſis cyathis tribus. Ego verò, quod myrrha aliquod medicamentum cōtineat, ſine illa maior ſecuritate gratia hoc pharmacum præparare conſuevit, piperis quantitatem ad augens. Porro per euſum diuoluſoſas diſpoſitiones, aliquando ſtercus per vomitū reddit: vbi videlicet particula affecta, ſi ſeroſis medicatiſq; humoribus aſſignatur magnopere. Quod ſi etiā imbecilliores ſint, geminā aialum. Erit itaq; in iis curationis ſcopus, vt ad affectas partes odorata admoveamus, cuiuſmodi ſunt, aniſum, apij, daucus, cuminum, & ſefeli. Nam quemadmodum graue olenna omnia ſtomachū ſub vertere ſolēt, ſic odorata corroborat. At abſinthij miſcet in præſcripto pharmaco, quod habeat vim extergēdi, repurgādi, & ſubducendū viſcoſos ſtomachi humores: quodq; conſtringat, & deiet, robuſq; aſſectiſq; particula addat. Cinnamomū autem ſectioſis omnibus, purtiſſimoſq; humoribus aduerſatur. Ceterum ſi cinnamomū non addit, licetbit cāſiam pro illo aſſumere.

Alia ſtomachica Aſclepiadis compoſitio, viliſ ardorē ſenſentibus, & ad intenſos ſingultus, & ſtomachi voluſoſas diſpoſitiones. Coſti, ſpice pardi, chryſobalanos, roſarum viridiū, maſtiche, ſing. drach. iij. aloës, aſari, vtriuſq; drach. ij. opij drac. j. ſucco pſylliſ expriſto, atq; ad paſſilorum formā reducto, oboloſq; tres exhibeto.

Diſtū mihi tamē iam eſt, impoſſibile eſſe vt inueniamus pharmacum, ad affectiones multas optimum: multoq; præſtantius eſſe, quod ſingulis earū deſtinatur. Porro Hippocrates fieri conuulſionē prodidit ex repletionē ſimul & evacuationē: quemadmodum etiam ſingultum. Quamquam hic aliquid excirari citra plenitudinem aut inanitionē ſolet, vbi ventriculus ab acribus, ſeroſis, medicamentis ſiſq; humoribus mordicatur: quos vbi quis vomitu eiecerit, ſingultu ſubito liberatur. Multi etiā devorato pharmaco diſtatione pepererunt, ſi vinū inſuper bibant, omino ſingultuant. Similiter ex cibo in mordacē qualitatem corrupto, nonnulli ſingultuāt, conſectioſq; a vomitu liberantur: vt aq; ex rigore oris ventriculi corripuntur ſingultu. Verum pueros maxime ſingultu contingit, tum ob alimentū corruptionem in ventre, tum ob partū frigiditatē. In vniuerſum autem, vomitus eſt ſufficiens medela eorum, qui ob copiam, aut mordicationē ſingultuant: vt caliditas, eorum qui ob frigiditatē. Ex medicamentis quæ pharmacum illud cōſtituunt, opimū, roſę, & pſylliſ ſuccus, refrigerant. Spica nardi & chryſobalanus, digerūt & corroborat. Aſarum per vinas deducit viſcoſos Aloës proſanos humores purgat. Crocus concoquit, & partes

Ventriculo affecto ſuglida eſt ſi ea pharmacia, quæ chalcantion, mandragorā, vtrūq; alia id genus recipiunt.

Paſſillus Amazonum, ad voluſoſas ſtomachi ſubverſiones.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

Myrrha vnum non eſſe admodum ſuſine.

partes corroborat. Costus calfacit ab vnde, astringitq; mediocriter. Stupefacientib; miscetur calfacientia, vt eorum in alguiratem corrigant, eisq; sint instar vehicul. Quippe viuennū corpora mortificationi simile quid perpetiuntur ab eorū medicaminum vīs, quæ ex opio, hyoscyamo, & man dragora consistant, ita vt infestantes causas nō sentiant. Quare multi qui talibus affidue vtrunt, particulas ad immedicabilem frigiditatem perdunt.

Descriptis etiam Asclepiades Hiere compositionem, in hoc ab Andromacho dissidēs, quod ille quidem aloēs drach. c. ac reliquorū singul. indiderit drach. vii. hic autē octo drachmas scripserit, storacēq; iuoci odorant omiserit, quā alia miscuit Andromachus: quodq; non xylobalsamo (vt Andromachus) sed pro illo sit carpobalsamus vīs. Confert autem huiuscemodi pharmacū iis qui ob vitiosos humores, & precipue biliosos, tardē concoquunt. Siquidē quibus bilis alius tunicas ventriculi infestat, ij præstantis pharmacum non inuenient. Cuius moderata exhi bitio ad quatuor vsq; drachmas extenditur. Similiter auxiliatur viscerū tam cōcoctia infestationibus. Rectē autē hoc pharmacū tardē concoquentibus, aut bilem vomitibus propinatur ex aqua cyathis quaternis: vt ex aqua mulla, ad viscerum inclinantēs infestationes: ac deniq; ex vino mulla, dum aut vrinās ciet, aut promouere menses est animus. Adverte autem nos appellare drachmā, quod Romani vocant denarium.

Stomachicum dictum Aster in expugnabile, ab Asclepiade proditum, sedans dolorem, inducens fomnū, ac varios affectus sanans. Myrrhē; styracis, nardi Indici, casie fistule, terre Lemniæ, corticis mandragoræ, pipris, singulorum drach. iij. Croci, fucci papaueris, singul. drach. vi. seminis dauci Græci, amū, fefels, seminis apij, sing. drachmas octo. Myrrhā, styracē, & opium, vino dissoluntur odorato, & terantur: arida verō cribrata miscetur, subiganturq; atq; in pastillos coguntur, quorum singulū drachmā dimidiam pendeant.

Quæ scripserit Archigenes ad affectus ventriculi.

Vbi ructus acidus editur, cori andrum cochlearij mensura edendum ante reliquū cibum dato: insuperq; merum bibendum. Ad exolutū vētriculum absque febre, mentis rannū contritum bibendum dato. Aut cyananthē similiter tritum cum nardo Indica bibendam dato. Aut murrubij fucci cum melle: & vbi paululū quiescerint, vinum cum polenta exhibeto. Aut Chig mastiches cochlearium ex aqua frigida dato. Aueglaciens ientis quo tūde porrigito. Dolores oris ventriculi lenet, ac maxime iis quibus tristitia aut desperatio accedunt, lac asiniū, aut mubebre, aut bubulum, silicibus incoctis, potum. Si vna cum humectatione ventriculi etiā inflammatio adsit, cōstern cum meliloto, aut rosam siccam cum cerato rosaceo, parum resing vite habentē, imponito. Quibus autem ob atram bilem, quam gignant, stomaches infestatio tentatur, spongas aceto acerrimo a lido imbutas ad stomachum ipsū imponito. Quod si

tensio adhuc perseueret, alumen liquidum cum atramento iurono mto, melle excerptum imponas. Aut lac & aloēm pari portione misce, & myrro cerato excepta. Aut armenaricæ bouis stercois atidum vino incoctum. Aut polij tasci culum coquiro, & bibendum duro. Aut callamitū decoctū per noctem sub dio expositū, modico melle & pipris drachma admittis, porrigito. Solut ante dolores cuminum apijūq;

10 tota, si modica pornone cum aqua bibantur.

Aur aloēs oboles duos. cū vino mulla, aut vino, aur aqua, bibendos dato. Aut abrotoni & rhyini, vtriusq; oboles duos, ex vino præbe bibendos. Lagurata insuper extremorū fortiter adhube, & circa apium stomachū cucurbitulis & fomēns variis vtere. Quod si vehemens sit dūctio, etiam venæ sectio efficaciter auxilium, & alui solutio per glādem supplicium. Porro eo qui ex ingēti tamen linquantur animo, reuocabimus odoramentis aceti aut pulegij, aut malis, aut pins. Excitantur etiā ad carnē suillam affatam, & ad omnia quæ multū alunt, præsertim ea quæ iudoroso odorem exhibent. Intra bis autem ipsos iis quæ cōstern vires reficere possunt: cuiusmodi iunt oua sorbitia, bulbi, cochleæ.

At singulientibus rutam cum vino dato, aut nitrum in aqua mulla, aut opium, aut castoriū, aut abrotonum, aut aristolochiam.

30 Medicamen ex cydoniorum succo, si nans medicos oris ventriculi affectus.

Succi cydoniorum malorum sextarios ij. mellis Arcti tantundem: aceti sesquialterarium, vrl sextarium vñ. Zingiberis quadrantē: pipris albi vñciam ij. Anda in perges, vbi malorum succus cum melle & aceto coctus ad mellis crassitudinem fuerit.

Quæ pharmacā Asclepiades scripserit ad affectus oris ventriculi.

40 Emplastum ad subversiones oris ventriculi, dolorisq; atq; etiam infestationes. Oenanthes drach. vi. croci, myrrhē, storis rosarū, mellon, mastiches, aloēs, corticis mandragoræ, singul. drach. iij. Carnis palmularij quadrantē. Omnia cerato ex rosaceo confecto r̄cipito, admouetorūque.

Aliud Nicetani, cæciacis, dysentericisq; admodum genrosūm.

Oenanthes v. ij. rosarū siccarū, mastiches, aloēs, gallarum omphacitidum, aluminis rotūdi, acaciæ, sing. vnc. j. cery lib. j. picis brutæ quæ draurem: olii myrris lib. j. Anda cōmituto liqul die. Aliud ad radē insignē. Oenanthes, omphacis, gallæ omphacitidis, aluminis fisci, acaciæ, cynnori malis punicis, balastū, mastiches, sing. vnc. j. Vini myrris, quātrū satis est his subigē die. Carnis phœnicobalanorū fscū cū c, excerptis lēnisco cerato vtror. Etiam in his, q; sint stomachica, mrrro astrictoria vī dominatur. Intra At in medicamentis hepaticis relaxantia misceri astringentibus debent: quem admodum sit in his quæ iam sub dī, etiā ab Asclepiade prodita.

Malagma Nido inferiptum, faciens ad præcordiorum dolores, dissolvensq; omnem duritiem, spleneticis atq; hepaticis maxime salutare. Cera, amoniaci rhyzomatis, olei cyprini, sing.

G G

Stupefacientia, melle calfacientia, vt eorū malignitatem corrigant, atq; iuoci deducant.

Hiera quādam nouentat.

Hiera moderna ta reobito ad quatuor drachmas extenditur.

Drachma ædmaris ædmanū est alē, stomachicum Asclepiade dictū. Aster in expugnabile.

Ventriculi affectum contrita ea medicamenta ab Archigene prodita.

Cucurbitulas admodum eas esse dolenti, vt tricolo, monet Archigenes. Doligens a nuni parietis ex fane mli. In, quomodo aut reman di.

Singulientibus, qui quādam reman di.

Diagmedien medicamen.

Oris ventriculi affectibus, pharmacā ab Asclepiade scripta.

Stomachica medicamenta debent habere ad strictionem præparantem. hepatica medicamenta melle fuisse debent ad strictionem, bu & relaxantia.

lib. j. croci semivnci: aceti quod sit fatiis. Ammonia cum dissoluto, deinde arida aducro.

Aliud Nili Crocerum, prædictis affectionibus accommodatum, faciens etiam

ad erysipelata.

Nili Crocerum.

Ammoniaci thymiamatis, ceræ, rosæ, sing.

lib. j. croci vnc. j. aceti quod sit fatiis. Conficito.

Malagma Hir-
pationis ex me-
lilotis, inferum
doloribus acci-
modatum.

Malagma ex meliloto, Hieracii dictum, ad viscerum dolores accommodatum. Nardi Celticæ, cyperi, myrrhæ, sing. drachmas x. cardamomi drach. viij. meliloti drac. xl. croci, amomi, vtriusq. drach. viij. cyphros facrisficlorum drac. xvj. ammoniaci thymiamatis drach. xl. resinæ terebinthinæ drach. octo: ceræ minam vnam: olei cyprini drac. cxx. Vini odorati Italici heminam vnam: præpara. & vtere.

Malagma Poly-
archiæ.

Malagma Polyarchiæ, prapneumonia, stomachicis, lienosis, hydropicisq. maximè ex vni: faciens etiam ad affectiones circa vesicam aut vterum, ad omniq. nervorum per consensum affectionem. Cere, terebinthinæ, bdelli, ammoniaci thymiamatis, cardamomi, cyperi, sing. min. vnam: meliloti, amomi, nardi Indicæ, croci, myrrhæ, thuris, xylocinnamomi, sing. drac. xxv. olei cyprini heminam j. Vini Italici quod sit fatiis. Conficito & vtitur.

Malagma Andromachi ex meliloto.

Malagma Andromachi ex melilotis.

Nardi Celticæ, cyperi, iridis Illyricæ, myrrhæ, sing. drac. viij. croci drac. iij. meliloti drac. xxv. ammoniaci thymiamatis drac. l. terebinthinæ tantundem: ceræ drac. c. Cyprini heminæ dimidium. Aceti quod sit fatiis.

De hepatis affectionibus & facultatibus.

Pleriq. idiotæ quemadmodum stomachicis, sic hepaticis affectionibus, vocant cõplures dispositiones iccinoriat, tametis maximè inter se contrarias, hoc est, sub eodem genere plurimū inter se distantes. Non peccauerit autem quispiam dicens, propemodum omnia contraria ridem esse generi subdita. Ceterum contrariorū notio cõtingit, vbi plurimum inter se distant. Atqui plurimum in quoque genere vtriusque distat à mediis extremis. Porro ipsius imbecillitatis iccinoriat lecebit nobis vicinā assignare dispositionem, seu causam, nēpe intemperiem: quæ quidem quā in octo intemperantias distribuitur, rursus nō

malè dixerō, intemperiem ipsam non vnam, sed octo dispositiones existerē. Ad hæc iuxta aliā affectionem duæ intemperiem differentis sūt, ac iuxta aliam tres: dum videlicet aut secundū quā litates tantum alterit̃ur partes affectæ, aut accedente etiam humorum affluxu, qui aut spaciā tūm occupat in particulis affectis cõtenta: aut etiam substantiam ipsarum imbuat. Igitur circa ventrem & intestina quidem, vna in singulis caluitas est, quæ possit vnosam humiditatem suscipere: circa hepatis aut tot numero sunt, quorū habentur arteriæ & venæ. Etenim quā hz omnes

Contraria esse
quæ sub eodem
genere pluri-
mum inter se
distident,
Extrema pluri-
mum vtriusque
distans à me-
diis in quoque
genere.
Hepatis imbe-
cillitatis notio
per se est causæ
intemperiem esse
cõplures.

oscula angusta possident, quæ parte huius visceris sima cum gibbis coeunt, obstructions ab illis vniis fucis aliquod oboriuntur, breui in frigidis intemperaturis, vti tēporis progressu in caliditas ad quas tandem obstructions putrefactio consequitur. Quum autē hoc viscus tot facultates sortatur, quorū actionum species, conatū sitpe vnam ipsarum præcipuè ladi, sitpe

Hepatis obstru-
ctio fieri
clinet fieri
sima cum gib-
bis coeunt.

duas & tres, atq. omnes quatuor similes. Est itaq. actio ipsius vna quidem, ad se cibum & alimentū attrahere altera verò, ambicere, cõtinereq., donec alterans ipsum, suipsius illud præstet efficiat.

Atq. hæc sanè dicitur alterantis facultas, inter alias principalissimas existens, & cui ferè primò debentur partes. Quæ verò iuxta hanc alterationē remanent excrementa, ea per excreticē facultatem exterminantur. Oñsensum autē est has quatuor facultates, vniuersis, quāvis viuunt, inesse corporis partibus. Vocatur autē alteratio ipsa, donec alimentū parti quæ nutritur assimiletur, concoctio. Vbi verò iam parti apponitur, nutritio. Quum igitur hepar præ imbecillitate ex ventre & intestinis alimentum trahere nō possit, liquida per sedem, & nondum exquisitè excoacta excernuntur: similis cruda, si enam cum hoc viscere ventriculus imbecillus existat. Si verò traxerit quidem alimentum hepatis ex ventre simul & intestinis: in sanguinem autē ipsū nequeat convertere, ob fanquinis languorem: quæmadmodum in ventre multiformis corruptio cõtingit, eorum quæ cruda remanent, sit enam circa hepatis. Est enim prior transmutatio in peregrinū qualiterem, iuxta cruditatem facta: moderatior verò, in qua alimentum diu propriam naturam retinet, nullam dum alterationem in deptum. At qui & terna præter has, species frustratæ concoctionis existit, vbi semicoctum alimentum relinquitur. Ac per hanc sanè dispositionem, quæ ab hepate deiciuntur, referuntur prorsus aquam, in qua victima recens matrare carnes ablute fuerunt. Aucto autē affectu, nihil tale amplius excernitur, sed multiformes alie qualitates consensuente expurgantur, veluti à ventre dum cruditate laborat. Calida igitur intemperies vi viscosi affligit, colloquationes accidit, primum quidem humorū, dein carnis ipsius hepatis: deli citatq. bilis crassa, graueolentia, atq. admodum colorata: quemadmodum dum contingit in pestilentibus febribus. Si verò frigida intemperies præpollat, neque alisidone excretionis, neq. multæ sunt: durat iū affectus diutius, & per aliquos dies profluit ipsi venter confertum magis: neque fortis excrementorum similis est illis quæ ex calore sunt liquefacta: neque color aut consistencia similis: verum minus graueolentia ab his excernuntur, speciem putrefacti sanguinis, non colloquatis carnis, habentia. Aliquando verò id qd deiciunt, nigrum sanguinem refert: diligenter tamen consid'erant, nec sanguis niger est, nec grumus, sed veluti limus quidam sanguinis crassus, qui propè ad atram bilē accedit: in summa, plures, ægrèq. iudicabiles colores circa huiusmodi affectionē cernuntur in alui excrementis. Scopus igitur curationis in huiusmodi affectionibus, communis quidem sit iuxta cõtrarietatem intemperantiz: peculiaris autem vnicuique, per cuiusq. contrarietatem. In vniuersum autem, affectu hepaticæ peculiariter appellata, veluti etiam carliæ, stomachicæ, citra tumoris præter naturam circa ipsas partes ortum, cõtineat.

Scit hepar, tum ægrum vocant hepaticum.

Hepatis facultates.

Alterantis facultas est inter alias principalissimas.

Facultates quatuor naturales inesse vniuersis, dum viuunt corpore partibus, Hepatis languorem ad mersum trahentem symptomata.

Mutationem et horum percoctatōis in peregrinam qualiterem, esse aliam non omnium discernunt.

Hepatis imperfecti mactatōis chylum in sanguinem, quāvis excrementis discernuntur, Hepatis vniuersum calidū quæ figurantur symptomata.

Hepatis frigida intemperies figuræ et symptomata.

Hepatis intemperantias, per contrarietatem sanandas esse.

Hepatis quid dicatur.

Quæ pharmaca ad hepaticos ab Andromacho sunt conscripta.

*Hepaticus vena
da cyphoides
ab Andromacho
fempia.*

Antidotus cyphoides, ad hepaticos & omnia thoracis vitia. Vix passæ carui drach. xxv. croci drach. j. calami drach. q. s. bdellii tantundem: casie sesquidrachmam: cinnamomi obolos iij. spicæ nardi drach. iij. floris iunci odorati drach. q. s. myrrhæ, terebintlinae, sing. drach. iij. ramē tori alpatri drachmas duas: mellis drachmas xvj. vini quod sit satis. Conficito. Etenim cinnamomum omnes putrilaginosas, vitulentasq; corrigit facultates, quemadmodū casia, & post hæc omne aromatum genus. Crocus astringens & cōcoctiorum pharmacum, etiam putrefactio nes corrigit. Vix passia astringit quidem quantum requirit affectum viscus: habetque vim aliquam cōcoquendi crudos humores, & coercēdi maligna, existens etiam secundum rotam substantiam se cori familiaris. Quippe ad intemperias viscerum ea pharmaca optima sunt, quæ præterquam q̄ intemperiem corrigit, etiā alimen tum largiuntur. Quo nomine vinum convenientissimum est, citra inflammationem, aut erysipelas, aut abscessum, aut intemperiem calidam, laborantibus. Nam & nutrit, & cōcoquit, & roborat, & putrefactioni adversatur, & si intēperies ab humiditate & frigidityte proficiscatur, eā citra omnem molestiam, atque tuto persanar. Eadem est & mellis facultas, præterquam q̄ non condensat substantiam cōtractā corporis: sed pro hoc vim extergendi, & aperiendi, & purior reddendi meatus, vrinamq; ciendi, non parva sanē auxilia, possidet. Ad bellium sufficienter emollit, cōcoquitq; necnon moderatē discutit. Cōsimilem ferē vim terebintina fortitur, supra hoc q̄ angustis meatibus extergit, expurgatq; quibus auxiliis viscus curādum indiget. si quidem obstructio in eā nisi solet putrefactiones efficere. Nonnulli autem huicmodi pharmaci opium, aut hyoscyamum, aut aliud quipiam refrigeratū miscendo, ad calidas intemperies vilia medicamenta efficiunt: quanquam ex hepaticis pharmacis nullum esse debet vehementer refrigerans.

Alia ad hepaticos & ictericos.

Amygdalarum amararum drach. ij. anisi, absinthii, cumini, seminis apij, sing. drach. j. comu cerui obolos iij. Trita cum aqua in pastillos tribolares redigito, ex eisq; vniū manē ac vespert, cum vino mulso dato.

Hepatica Athanasia, ad nephriticos & ictericos, copiose sudorem promouens.

Croci drach. ij. nardi tantundem: cinnamomi, casie, myrrhæ, iunci odorati, sing. drach. j. Melle Antico excipio: datur fabæ Egyptiæ magnitudinis: febricitansbus ex aqua mulsa.

Porio ad hepaticos, spleneticos, nephriticos, hydropicos, stomachicōsq; Auxiliatur etiā molestias ex parva, & cōvulsis. Prodest & cōvalescētibus: necnō ad humores vinosos, ictericos, rufescentes, pleuriticos, atque ad letalia venena, & serarum ichus. Nardi in dice, costi, vrisusq; drac. ij. casie, croci, vrisusq; drach. j. pipēris albi obol. v. seminis apij drach. j. obolos iij. iridis Illyricæ tantundem: acq̄n drac. j. obol. j. opobalsami drac. ij.

j. succi atii masculi drach. tres: vix passæ exacina tæ drach. vj. Trito cū passō, aut melle excipio, ac drachmā vñ cum vino dulci dato, aut cum aquæ mulse cyathis iij. Nullum tamen horum medicamentorum calidis intemperaturis cōvenit, sed ut humiditas, aut frigiditas, aut ex vtriusque compositis.

Confectiones hepaticæ ab Asclepiade proditæ.

Succi cichorii cyathum vnum cum aquæ calidæ cyathis tribus, et mellis Atici cochleari vno, porrigito. Aut silicis, aut feridis succi cyathum vnum, cum aquæ mulse cyathis trib. dato. Porro chioril & feris ex genere cibariorū existit. Faculas autē ipsorum subfrigida & subamara est, moderatē astringens: quarum qualitatē ratione, calidis hepatis intemperantiis summē cōveniunt. Nam vitra hoc q̄ moderatē refrigerit, visceri firmitudinē addunt. Sed nec frigidas intemperies magnopere lædunt, quemadmodū q̄ frigida humiditatem absq; attractione aut amaritudine possident, facere solent. Iam, ob miscellā mellis, humores per vrinas eliciunt. Quare si ficcatæ & tusa quæ portioni inspergat, indēm iuvisit. Ad viscera autem expurgationem, apertionemq; meatuum, citra manifestā calfactionem aut refrigerationē, filix optimum pharmacum est, amarā qualitatem habens prædominantem, Catapotion hepaticæ.

Radix chamæpityos drac. viij. rad. cichorii drach. iij. cōtrahit, & excipe melle cōcto, præbeq; nucis ponticæ magnitudinē: & aquæ calidæ cyathos iij. insuper bibendos dato.

Pastillus hepaticus.

Anisi, sem. apij, asini, amygd. amar. mūd. absinthii, sing. drac. iij. macerata ex aqua in pastillos redigito, exhibetōq; drachmā vñ cū vini diluti cyathis iij. febricitantibus, tamen cum hydro melice.

Eclegma hepaticum cum Paulin. auxiliatur confestim.

Chamæpityos sicce lib. j. myrrhæ vnc. j. passil protopis sexarios iij. Chamæpityn & vini dulcē cōquo ad terrās. Postea liquorē exprimito, eisq; mellis Atici libellā dimidiā adiciito, ac rursus cogro. Dein verō myrrhā addito absidue agitando: quæ vix dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante coctum myrrum propinato. Ad hæc cochleari tritium carnē probē triet, & cū tribus vini nigri cyathis calcstam porrigito. Hæc .n. iuxta totā substantiā suā efficacis, nō secundum vñ aut alterā qualitatem. Similiter & lupini hepatis drachmā vna laevigata cū vino aliquo dulci, exhibitalq; manifeste hepaticæ auxiliatur. Cōfectio ciens vrinam. Facit ad mēduras hepatis affectiones, ad spleneticos, et egre se a morbo recuperatēs: necnon ad hydropicos. In vniuersum, probum colorem conciliat. Croci, nardi casie, sing. drach. ij. costi floris iunci odorati, cinnamomi, myrrhæ, stactæ, sing. drach. j. mellis costi drac. xvj. datur fabæ Egyptiæ magnitudinis: cum vini mulsi cyathis iij.

Alia eadem cōmoda præstans, ad alijsq; inter nas affectiones, citra ruisim, cōducit. Rad. gentianæ, chamæpityos, marrubij, seminis perisoteli ni, felis vrisi, sinapis, sem. cucumeris, scolopēdrij, panacis, rubricæ sinopice, rubic. seminis brasæ.

GG ij

*Hepaticæ cōp
sionem ab A
sclepiade fect
Pia.
Cibariorū
seru.*

*Hepaticum ca
tapium.*

*Hepaticæ pa
stillus.*

*Hepaticum
eclegma.*

*Hepaticæ
radix
ad mēduras
hepatis
Dysentericis
medicamēta.*

sicc, aristolochia lōgē, piperis albi, spicē nardi, costi, sem. erucę, eryngii, baccarū iuniperi, cē. fra xini, chamędryos, dictamni Cretici, lemnis cęstri, sem. dauci. sing. vnc. j. mellis Arici qđ sit facti. Cōficito. Datur nucis pōticę magnitudo, ex passū Cretici cyathis duob. Hęc Asclepiades ad indurata viscera. Miscēdo tñ in hūc affectū sunt cum difficientib. etiam mollientia pharma ca, quę preparēt indurata corpora, atq; prædictis medicamentis excipientib. efficiūt. Si quidē citra premollitionem diffundūt quodāmodo ex ipsa corpora, et evestigio manifestū im munitionem habent sed quod reliquum ex asse ctu est, vbi exiccatū improbē fuerit, immedicabi le pmanet. Ceterū quū hepatis corpus sit cōsistentia humidū, moderatē emolliēbus eget.

Quę Archigenis scripserit ad hepaticos. Vnguentū nardini cochlearia iij. quotidie bi bēda dato, & maxime in indurata. Aut aristolo chis obolos iij. ex aqua quidem, febricitantibus: fe bre autem carentibus, ex vino portigito. Aut fel vrsinum in vase leniter feruēfacto, & in sole as siccatō, atq; ex eo hepaticis cochlearē vñū dato.

In magna duritie atrotoni succū quam cras sissimū da bibēdum. Aut acori obolū vñū, panacis tantundem, propinato ex aqua. Aut spi cę nardi decoctū asidēdū exhibeto. Cataplasma hepaticū sit ex malis cotoneis cō farina hordea cea, & feno greco concoctus. Aut ex semine lini trito cum polenta vino incoctū. Aut ex capparis p radice in aceto mulso pcocta. Aut ex farina hor deacea cum scabulis. Aut ex palmari cāmētu sa, mistaq; pari rosacei cerati portione.

Malaga Andromacha ad hepaticos. Ammoniā thymiamatis drac. caliq. bdellij drach. xxvij. aceti heminas iij. Cyprii hemina vnam. Cōficito.

Malaga Apolloniana. Cera drac. lxxx. ammoniaci thymiamatis tē tun dem. Terebinthi drac. xl. manę thuris tē tun dem. Cum irino cōutidito.

Malaga Apolloniana. Cera drac. lxxx. ammoniaci thymiamatis tē tun dem. Terebinthi drac. xl. manę thuris tē tun dem. Cum irino cōutidito.

GALENI PERGAMENI DE compositione medicamentorum secundum loca, lib. nonus.

De ictericis.

Funt etiā icterici, ratione optime iudicatio nis in febris, proutē utitur ad cutem bilioso humore: ac facile sanē hī curant bal neis potabilium aquarū, & olei discussorū affric tu, omniumq; rarefacientū catē: quale est anethum oleum, chamęmelinū, atq; cicinū. Post hęc etiam vnguenta faciunt, gleucinū, & corna genum: dein itē atq; amaracnū. Verū alias confectioes privatim ictericas appellatas, ne pates ad huiusmodi ictericos cōvenire, sed ad eos, q; valōrū iuxta heper obstructionē laborāt, necnō ad illos qui ex inflammatione icterici sūt. Ceterū qui in regum morbum ex obstructio ne incidit, abiq; febre pmanet. Qui verō ex inflammatione, omnino febricitat. Quę cūq; igit tur admodū medicametosa existūt, indēq; facul tate calida, febricis magnopere laedunt. Talia sunt gēniana, struthion, heleniū, costus, aristolo chiz, polū, cētaurea. Cōveniunt aut ictericis ex

inflammato hepate, quę cūq; sanāt inflammatio nes: quemadmodū etiā iis qui ex obturatione, omnia q; strenuē extergēt, etiā si medicamento sam substantiā, calidissq; facultatem sortiantur. Si verō obstructio simul & inflammatio coeant, laxa tibus similq; extergentibus opus erit.

Ad ictericos abiq; febris, medicamen Andromachi.

In colocynthidis calcem vinū fundito, cal faciōq; & bibendū dato subducit enim alium. Aliud. Adianti obolos ij. nardi obolos ij. ab sinthij. drach. j. myrrhę obol. iij. Passū excipito, instiq; auellane nucis ex aque cyathis duobus portigito.

Asclepiadis remedia ad ictericos.

Cichori succi cyathos vi. febricit. per se dato: febre verō carentibus, cū vini cyathis tribus.

Aliud. Anchuze tenuissimē tris cochlearia ij. cum aqua potabili exhibe. Aliud Nicerati, vñq; ciens. Cicerum siccorum sextariū j. roris marini manipulum: aquę sextariū vj. fenculi manipulum j. rad. asperagorū palustriū manipulū j. Decoctū excolatum portigito asidēdū, febricitantibus, quidem sūm pliciter, febris aut carentib. ex vi no diluto. Aliud. Afari, absinthij, vñq; drach. viij. seminis anisi, fenculi, api, amygdalarū am ararū repargatarū, sing. drac. iij. Aqua subig ito, atq; passillos formato, ex quib. drac. j. cū vinū multū cyathis tribus nō febricitantibus exhibeto.

Erithion trahens bilem per nares.

Nasturij & roris marini viridū succum, aut elaterium cum lacte muliebri tritum, infundito naribus, atq; attrahere iubeto.

Archigenis remedia ad ictericos.

Chelidoniz herbe succum cū vino aut aqua multo propina. Vel aditū, vel rubig radices ob olos tres, cū aqua mulsā exhibe. Aut fellis vñq; cyathum bibendū dato. Aut stercoreis canini al bi sextantem, cum mellis quadrāte ad triduum bibendū dato. Aut adianti, & menthrę, & rubie parē mensuram in aqua feruēfacto, & hemina inde bibendam exhibeto, diutius ad solē insola to, sitientiq; & anheloso, quō post acceptum po tum exudet, quippe statim transmutat colorem.

De splenis affectibus.

Quum autem omnes corporis partes familia rem sibi ipsi ex venis humore trahāt, lien certē id qđ veluti fix sanguinis est, ex qua pignur atrā bilis, ad sui alimoniam aascit: vñdē hoc vi cus minimo negotio cōtrahere sibi scirrū est natum, sanguine nimirū in venis ipsius obtura to, & ob crassitudinē nec exenti, nec discuti fa cilitē potente. Attēntib. igitur opus habet phar maco, citra manifestā caliditatem, ne impactus in ipso succus impingatur vehemētis. Quō ve rō actioes ipsius cōsuevunt, ex austeris aliqd eis admiscetur: quale etiā astrū gentium genus existit. Porro quum vniuersę particule, proprię incolūmirantis gratia, certas quasdam facultates possideant, atraricem quē videlicet familiarium, ac tum aliorum ex pulcritem, tunc asimilanti cem eorum quę sibi extraxerunt: aliquibus ip sarum in superiust, vt ex accidenti sint vniuerso corpori ex vñ. Ex horū itaq; est genere lien, qui ex hepate ad se veluti limū sanguinis trahit, quēadmodū fellis vesica bilē, atq; renes vñq;.

Uterius qua medicamenta conueniant.

Uterius remedia varia ad ictericos conueniant.

Erithion trahens bilem per nares.

Partes singulas familiare sibi alimoniam trahere, vñdē hoc vi cus sanguinis si demota.

Lien quo induratur facili.

Lienis affectu quales conueniant medicamenta.

Uterius per morbum iudicatum, pta, ex pta.

Uterius per morbum iudicatum, pta, ex pta.

Uterius ex ob structione orta, abiq; febre pmanet. quod non conuenit il li quā ab rasti matione ducit originem.

Vine trahunt
languide, fan-
cibus sanguis
per vasa, et in
corpore diges-
tur.

Licet cur ame-
ra, paul. affra-
gentia sine mi-
lla, medicamen-
ta continent.

Leui congrua
sia pharmaca,
ab Andromae-
cho scripta.

Si igitur per imbecillitate eiusmodi sanguinem ad se attrahere sit minime potes, p vniueris corpus vitiosus humor dispergit, Ob id itaq naturalis ipsius firmitudinem custodire oportet, quod veniens tibi alimentis alliciat: per quod actio- nem vniuerso corpori ad humoris diuitate con- ducit, & excrementa genita in ipso demittere in ventre potest, vt vna qd excrementa alia exer- nitur. Igitur hac ratione ipsi valde amara medi- cameta exhibemus: quibus miscemus etiam ex- austeris nonnulla: sicuti & alia quedam, cum ma- teria congruentem ad vnguentorum & capsulama- tu copulatione: cuiusmodi sunt cera, resina, pix, & bitumen. Nam primaria ratione acetu & oxy- meli, visceri comoda existit, vt potes secare & at- tenuare crassos humores valenta, citra calidita- nem. Deinceps itaq eorum pharmacoru mentio- nem faciam, que tibi indurata auxiliantur.

Pharmaca potabilia ab Andromacho ad sple-

Pharmaca potabilia ab Andromacho ad (ple-
neticos confcripta. Potio Antipatri.

neuscos conscripta. r. f. o. n. o. n. a. m. p. a. r. e.
Carnis myrobalani drac. iij. scolopedrj drac.
vj. cort. rad. cap. colici. ij. g. drac. liij. cham. p. dyos.
drac. vj. polij drach. ij. rad. coryledoni drac. ij.
corymborj hedere nigre grana xxv. ammoniac
r. thymianatis drac. iij. fem. hyperici drach. ij.
chabiani tantundem: sem. pericyliumi drach. j.
aut rad. drach. ij. cardamomi nigri fescudrach.
fused. kille drac. vj. De naur oboli duo in aceto
mulso. Aliud stomachicum. plenecum q. Myr.
rhiz. nardi Indice. cort. rad. capparis, radice pan.
cenis, rad. p. ucedanis, dictamni, rad. perily.
muni, sing. drach. iij. costi drac. v. polij drach. ij. ru.
bim drac. ij. ammoniaci thymianatis drac. iij.
s. i. ridis tantundem. Excipio aceto mulso, da.
ndis oboli n. cum oxymelire.

Pharmaca potabilia ab Asclepiade ad
solenem cooscripta. .

Cynoglossi manipulum cum vini cyathi iij. renio, & expresum liquorem ante cibum bibendum dabo. Collapsam aemem oportet herbis singulis maon antefolis exortum. Aliud. Trixaginis manipulū cum vini sextario vno coquo, & expresum liquore reponito: siccet ex cyathis iij. ante cibū dabo. Carapotii splenicū, Myrice fructū tufum & cibrariū chalabano exipe, in carapotii redige, q̄ exhibebis pro vrbus. Pafillus splenicus. Fructus erice drac. iij. piperis albi, nardi Syriaci, ammoniaci rhyamiati, sing. dr. ij. arida tunditur & cibratur. Ammoniacū dissoluitur aceto scillitico, & arida additū in pafillis coquitur, quoru singuli pende dractm. iij. Datū ē dractm. ex oxyzelitis cynthis trib-

Epithemata & emplaftra eiuſdem
Aſcepiadz.

Foliorū tenuissimorū sambuci arboris lib. iij.
aloës lib. j. cum aceto subigito, & linteolo iofa-
cta admoueto. Vel: Cerz, resinæ pinus, & fructus
sing. lib. ij. arsenici, aluminis scissæ, calcis viug, sin-
galorum sextantem: aceti, olei, vniufq; cyathol.
viij. Conficito & admoueto.

Malgama Antiochidis, ad spleniticos, hydro-
pico, sifichadicos, arthriticosq; conveniens. Ce-
rae lib. ij. refinæ terebinthinæ tantundem: retiri-
toriorū ab expressa myrobalsno reliquiorū, spu-
mæ niri, sors la pidis Asij, ammoniaci thymia-
mæ. sing. lib. ij. olei Cyprini lib. ij. acetū qd sū

sanis ad ammoniacum dissoluendum.

Malagma aurei colonies.

Auripigmenti vnc. j. aluminis scissi, calcis viij. fing. sextantē. Cera, resinæ frictæ, & pinus fing. lib. ij. myrrhæ sextantē. Arida increta, liguatāq. per infusionem aceti cyathorū viij. liquidis excipiuntur.

Pharmaca ad spleneticon ab Archigene scripta.

10. Potus in aqua quæ terræ cædēs exstinxerit, folia
quidē, febrentibus: vino autē immittit, iis quæ febre
carent. Aut corticis radicis periculum, et semina
eius, quantum tribus digitis apprehendi possunt,
in vino albo meraco calido, leuissimi coquuntur
et dēdū bibendū dato. Aut vulpis hepar siccat
ex oxymelle pinnato. Aut folia capparis arida
et trita exhibebit. Cataplasmata autē cædēs splen-
ticis et hepaticis admovent, ampliusq; cinerem
ex ferraria officina cū aceto. Aut nasciturū et fo-
10 num græcū, et calcē vini, et nitru, cum melle et
emollita imponito. Aut faccē acris aceti, aut cap-
parris radicem cum aceto imponito. Perleuantem
tē malo cucurbitas, quæ scarificatib; affligito. Aut
venām retro finistram aurem securo, et detracto
sanguine consummat affectum lienem.

Remedia ad hydropē ab Afclepiade scripta.
Melagma aut poteris, refores humiditates ab
alto, similibus potioribus discuties. Cere, picis aride,
vntiusq; lib. j. aluminis liquida, sulfuris viui, mā-
næ, nutri rubri, sing. lib. j. resinæ frictæ lib. iij. olei
veteris heminam. j. Arida liquida permisceto.
Melagma ex bacca lauri ad eadem.

Cerez, refinæ pinus, picis brutæ, baccharū lauri ficcarū, oītri rubri, ammoniaci thymiamatis, adipis vitulini subacti, ſing. lib. j. Liquefacti bilis hœnentur, & frigeſacta miſceſtur ardiſ redactis in tenuiſſimum pollinem.

Emplastrū Tonforis, ad spleneticos & hydropicos quo etiam ischiadicos liberavit.

Picis arbor lib. liq. cera, resing. pinus, ammoniaci thymiamatis, nitri rubri, baccarū lauri aridarum, sing. lib. li. adipis taurini lib. j. Iridos lib. li. canchrysos vnc. xvij. farinæ fenicigræ, pollinis radices chamæleonis nigre tenuissimæ tritæ, sing. gol. sextantū vñū: cumini tenuissimæ tritæ sequig. lationis. pascif. sextæ: i. Conficito & visor.

Cleopatra carolinensis ad hydronicos.

Cere, refiniz, spumę nitri, sing. drac. c. chalba
ni, apolis, ammoniaci thymiamatis, sing. drac.
xij. cyprini cyathos ij. aceti tantundem. Cõfic
to capsula fima.

Archigenis remedia ad hydropicos.

Stercus bovis armata trini, coctū in posca, imperlatq; solutis vini quarta portione, recepto in cataplasma, idē toti ventri admovento. Aut elaterij, staphidis sylvestris, hyssopi, fellis taurini, aequalis omnium partes sicub. coctus ex capienti, mullisq; laeurgis, similiter applicato. Au veratrū nigrū, fel taurinū, nitrū, pipereq; ex quo

go mista, in oleo excepta, per semihoræ tepidula
 ventri imponito. Per omne aut curationis tem-
 pus cotyledonis, scilicet aridis, drach. j. in vi-
 no mulso diluto quotidie exhibe. Aut cortici-
 rad. aris, similiter drach. j. Aut radicem calamin-
 thæ coctâ propins. Ad hæc hydroplecs diutius
 ad solē, sed coctō capite, in vngiro ex oleo, c-

GG in

Lienci pharma.
ca operta ab
Archagone scri-
pta.

1. *Limosa castra*
 2. *cataphracta*
 3. *epitaphia*, quae
 4. *limosa*.

Linei si malum
sit pertinax, cu
curbatur affi
gendas esse, cu
sarcinatur.

multū salis admittit fit: ex multisq; pfundito sal-
fugine calida. Indatos verō maxime locos, vesti-
cis magnis, pbe inflatis quondie cōriū enter pul-
sato. Incisus itē aut scarificans ipso rē talis, & vul-
nusculis impactis, in ferculo ipso aut lectica cir-
eumvehito. Summe etiā faciūt Theriac oēs v-
rimā cientes, insupērg pōtiones aquā ducentes.

De pharmaciis dolorem sedantibus, ano-
dynis, & colicis appellatis.

Huiusmodi pharmacia, oō dolores ingētes, aut
vigilias, aut ne per violentā tussim lancine-
mur, vti consuevimus. Ad quas quidē affectio-
nes, si modici sint, cōfectiones ex seminibus, pri-
uam ruficulares distē, sufficiunt: quæ & ipse
aliquid ex soporiferis seminibus possident, ver-
ūm modicū inter multa adeo semina, quæ odo-
rata, & tenuius partium, ac vtiuam mouentia
exsunt: cuiusmodi sunt, cuminum, daucū, sele-
li, apiūmq; & anisum.

Phalonis Antidotus, ad omnes graues dolores
viscerum, ad aliq; multa conueniens.

Croci drac. v. pyrethri, euphorbiæ, spicæ nar-
di sing. drac. j. piperis albi & hyoscyami, vtriusq;
drac. xx. opij drac. x. Melle Attico excipito. Ete-
nim opij validissimū est inter ea quæ sensum stu-
pefaciunt, atq; soporē conciliant. Operatur au-
tem hæc etiā solum, sapā dulcē, romentorū ex-
ceptum ac sedi inditum, necnō illud fronti &
nariibus. Si verō cum alio quo pōt vim ipsius mo-
derante misceratur, moderatius hæc facit. Verūm

quæ admiscantur ipsi, aut cōcoquant, aut miti-
gent doloris cā affectiōnem oportet, aut humo-
res affectiōnem gignentes discutiant, aut disse-
cant, aut attenuent, aut iuxta torā substantiā al-
terent. Quum igitur optimus cōpositionis sco-
pus, tria sibi proponat: nimirū vt & sensus stu-
pefiat, & nullum in posterū circa partem illā inde
detrimentum remaneat, ampliusq; vti affectio-
is inde inuētur: ad hæc omnia respiciēs Philo-

predictum cōposuisse videtur pharmacum: ex
opij quidem, hyoscyamiq; mistura soporē, sen-
sificisq; facultatis stuporē inducere volens. Quō
verō hæc cinis distribuerētur, & totā affectarū
partium penetrarent profunditatē, calfaciendā
admiscuit, pyrethrū, euphorbiā, & piper, q̄uo-
cientes humores discutere possunt, extergere vi-
scidos, incidere crassos, ac deniq; statulētos atre-
nare & dissoluere. Est aut nō modica cōcoctio-
ria vis omnium frigidarum affectiōnum in nar-
do sita: quæ aut Indica, aut Celtica lusi cōda est.

At croci humorum crudorum est cōcoctoriū,
atq; item affectiōnum virulentarum.

Colica medicamina Andromachi.

Anisi drac. vj. seminis apij drac. xij. nardi drac.
iij. castorij drac. iij. petroselinij drac. iij. piperis
albi & longi, vtriusq; drac. v. myrrhæ drac. vj. iū-
ci odorati drac. tres: succi papauēris drachi. vj.
croci drac. iij. Melle excipito. Datur ad summū,
nucis regię paræ magnitudo ex aquæ calidæ
cyathis tribus: minimum, nucis ponice ma-
gnitudo.

Aliud admirabile colicum ad voluulosos,
& iterum per os reddentes.

Piperis, albi, sem. hyoscyami, vtriusq; drac. xl.
opij drac. xx. croci drac. x. spicæ nardi, euphor-
biæ, pyrethri, sing. drach. ij. Excipe melle cōcto.

Datur magnitudine fabæ in aquæ frigidæ cy-
athis iij. aut iij.

Colica Mortheos dicta, ad stomachicos, o cu-
lorū dolores, vteriq; labores, ex aqua multā, vbi
rura fuerit iucocta. Croci tēquidrachmæ: nardi
drac. ij. myrrhæ drac. viij. costi, piperis albi & lō-
gi, chalbanij, sing. drac. j. opobalsami drach. iij.
cinnamomij, succi mandragoræ, castorij, singul.
drach. ij. seminis dauci drac. iij. s. sagapeni drac.
iij. casiz drac. iij. Excipe melle Attico. Alia uō
minus admirabilia. Succī cētrautes, castorij, scil-
læ satæ, piperis albi & lōgi, myrrhæ, rutæ hortē-
siæ, hyssopi, abrotani, ridis illyricæ, sing. drac. ij.
croci, ammoniaci thymiamatis, rad acori, pho-
pontici, zingiberis, veratri albi, sing. drachmæ j.
Oxymeliter excipito. Datur etiam drachmā vj.
ex aceto mulso.

Charidis, ad colī inflationes remedium.

Cumini Aethiopici drac. vj. sem. apij drac. v.
seminis dauci Cenci drac. ij. piperis albi drac. j.
Tusā & cribrata reponito. Dantur cochlearia
duo, cum aquæ mulsæ cyathis tribus.

Cōfectio Lingonis colica, quæ data ex
frigida, statim soluit dolores.

Sem. hyoscyami albi drac. xx. opij, seminis dau-
ci Cenci, vtriusq; drach. x. petroselinij drach. vj.
croci, spicæ nardi, pyrethri, sing. drac. iij. eupho-
biæ, opobalsami, cinnamomij, sing. drac. ij. Exci-
pito melle cōcto, ac fabæ Aegyptiæ magnitudi-
nem exhibeto, cū aquæ tepidæ ut frigidæ cy-
athis tribus, in irritationibus.

DE DYSENTERICIS.

Deinceps medicamenta scribemus, quæ verē
dysentericis auxiliantur, quos nulla alia infestat
affectio, præter vicius intestinorū, aut nudū, aut
cum putredine obortum, quī nomen appellat.

Quæ ab Andromacho ad dysenteriam
scripsi sunt.

Potio ad dysentericos & hæmoptoicos. Fiorū
rosarum, opij, acaciæ, gummi, sing. drach. ij. ba-
laustij tantundem: succi hypocistidis tantundem:
gallarū, seminis plātaginis, succi eius, sing. drac.
ij. lycij Indici, succi rosarum, sing. drach. j. Con-
fice pastillos drachmāles, & variē vtere.

Ad dysentericos & cœliacos cōfectio
ex fructibus.

Mala punica integra xx. cydonia totidē: erui
sextarium j. prunorum syluestrium sextarios ij.
Sorborum Ephefinorum tantundem. Rhois Sy-
riacæ sextar. iij. pira Terētiana xx. Cestiana xxx.
siliquas xl. baccarū myrti nigrarū sextarios iij.
multi amingī ad tertias decocti sextar. xl. viij. Co-
quito simul ad mellis spissitudinem, & in figellū
nō reponito. Alia Nardi croci, vtriusq; drach.
viij. aloës, thuris, singulorū drach. h. acaciæ, myr-
rhæ, succi hypocistidis, rosarum siccatum, lycij
Indici, tragacanthæ, opij, sing. drach. iij. piperis
drach. ij. Aqua excipito, pastillōq; duarum dra-
chmarum facito, cum vino myrtæ exhibeto.

Ad dysentericos, cœliacos, & hæmoptoi-
cos, ex Cornelio medico.

Myrrhæ, thuris, aloës, croci, opij, rhois Syriacæ
& coriarj, lycij Indici, acaciæ, malicorū, succi hy-
pocistidis, gallæ, balaustrorū, singulorū parpon-
dus in pastillos cogito, & ad noctē febre carenti-
bus, ex vino, febrientibus, verō ex frigida ppinato.

Potio

Anodyni vti
quibus de cas-
u solentur.

Phalonis anti-
dotum ad gra-
ues entericorū
crociatus
conferens.
Opj rura.

Opis misculda
qualis effi do-
brans medica-
menta.

Compositio
medicamentorū
opio sur-
stantium opti-
mum soporē
viti sibi propo-
nere.

Nardi fatali-
tas

Croci facilius.

Colica medica-
mina Andro-
machi.

Dysenterici vo-
ri sunt, quibus
est aliquid in-
testinum exul-
ceratum.

Dysenterici
remedia for-
ta ab Andro-
machi.

Hæmoptoi-
cos medicinas
Corodj.

Potio Apollonij ad fluxum mulie-
brem sistendum.

*Plurimi mulie-
bri, sicut de po-
tione Apollonij.*

Corallij, balauftij, vtriusq; obol. iij. gummi o-
bol. j. Excipe oui crudi candido, & dimidiū to-
nus cum aque cyathis quaruor propina.

Infusa dysentericis cōmoda. Infusum A-
thenici ad recti intestini vlcera.

*Clysteri dysen-
terici apes.*

Omphacij, aluminis scissilis, calcis viuz, squa-
mæ zæra, sing. drach. vj. auripigmentū drach. viij.
sandarachæ drach. iij. chartæ vitæ drach. xv. cum
vino myrteo pastillos drach. iij. aur triū, forma-
to. Infunde autem cum vini diluti cyathis iij. &
aque tepidæ cyathis duobus.

Infusum Heræ.

Chartæ vitæ, cadmix, auripigmenti, singulo-
rum vnc. j. calcis viuz exsiccæ succo plantagi-
nis, vnc. i. Omnia redigito in pollinē, & cochlea-
ria duo, cum decoctæ baccharum myrti, aut vi-
no myrteo, infundito.

Infusum Nicotratij.

Calcis viuz drach. j. gypsi drach. viij. acaciæ
drach. ij. omphacij drach. j. subij drach. iij. thuris
drach. j. gallæ drach. iij. tragacanthæ drach. ij.
cum vino myrteo in pastillos redigito.

Asclepiadis ad dysentericos remedia.

*Dysentericis re-
mediis ab Ascle-
piade scriptis.*

Rhois Syriaci, farinæ poltæ, vuz passæ, sing.
drach. ij. malicorij triti & cribrati drach. j. Exci-
pito melle cocto, atq; mystrum vñū ante cibum
porrigito. Aliud probatum. Gallarum redacta-
rum in pollinem cochleare vnum: piperis albi,
rhois rubri, malicorij tenuissimæ trin, singulo-
rum rstrundem. Omnia oui luteo excipito, & in
vacuum mlii punici testam coniciro, atque ob-
turato cum farina osculo ipsius, ad prunas tor-
re: depurgata mlii punici testa, cochlearium v-
num edendum dato.

Pastillus Philippi ad dysentericos inuetera-
tos, dolorē sedans, qui bibidit & infunditur.
Balauftij, acaciæ, succi hypocistidis, rhois, apij,
thuris, myrrhæ, baccharum myrti nigrarū, croci,
gallarum, lycij, aloës, rhei pōici, malicorij, sing.
drac. iij. Excipito vino Italico, cogitōm pastil-
los pondere obol. iij. ac porrigito non febrienti-
bus quidē, ex vino: febrientibus verō, ex mullā.

Epithema celiacis dysentericisq.

*Dysentericis e-
pithema com-
modum.*

Seminis hyoscyami albi, apij, vtriusq; trienit:
anisi, floris rosarū, succi hypocistidis, balauftij,
rhois Syriaci, sing. sextantem: succi papaueris,
croci, vtriusq; vnc. j. Singula cum vino myrteo
terito: dein mista in pastillos redigito, quos in
vmbra asiccato. Inde verō quantū sufficit tun-
dens & cribrans, palmulis pāsis excipito, ac tē-
dem linteolo impolstra, ventri admoouero.

De affectibus sedis.

Sedis vitæ, ob ipsius partis sensum exquisitiss-
simum, & ob crebrum per ipsam excrementorum
decursum, agrē curationem recipiunt. Apisissi-
ma autem ipsi pharmaca sunt, quæ absq; aspre-
dine asstringunt: qualia maxime sunt, quæ ex me-
rallidis neq; acia, neq; acerbis existant. Hæc si-
quidem lora, circa mordacitatem (id quod re-
quiritur) operantur.

Medicamenta sedis ab Andromæ-
cho scripta.

*Endis medicis.
mliis ab Andro-
macho scriptis.*

Cerussæ, lithargyri, vtriusq; drach. v. thuris a-
luminis scissi, vtriusq; drach. iij. croci obolus ij.

Vini & rosacæ quod sit satis. Conscicto. Aliud.
Butyri, ceræ, vtriusq; fescunciam: medullæ cerui
næ, ægypti, thuris, singul. vnc. j. aluminis scissi
quadrantem: lycij sextantem: vini & rosacæ quod
sit satis. Misceto. Aliud. Adipis anserini curati,
ceræ, thuris, medullæ cerui, floris rosarū, pom-
pholygis, cadmix, plūbi loti, sing. drach. iij. ce-
russæ drach. viij. cerebri gruis drac. ij. succi papa-
ueris fescudrachmam: ægypti drach. v. succi feri
dis heminam j. rosacæ heminam i. Confundito.

Pinguis compositio ad achoras & pforas.

Spumæ argenti, cerussæ, vtriusq; drach. xxxij.
atramenti sutorij drach. xvj. sulphuris viui drach.
viij. Olei myrti & aceni quod sit satis. Misceto.

*Pforis vitæ
compositio.*

Ad prolabantem sedem.

Recrementi plumbi drach. viij. Rhois Syriaci
tantūdem: floris rosarum drach. iij. myrrhæ Min-
næ drach. ij. Insuper siccum, vbi præleris vi-
no austero, aut vini decocto. Aliud. Gallæ om-
phacitidis, rhois coriarij, sing. drach. ij. plumbi
viti drachmas iij. spumæ argenti drachmas viij.
trita inspergito.

*Sedis prolapsæ
remedia.*

Hæmorrhoidibus extrahendis pharma-
ca ab Asclepiade scripta.

Piperis, nitri, vtriusq; drach. j. terito admoue-
rōq. Aliud. Spumæ nitri, fellis tauri, staphidis
sylvæstris, sing. drach. j. Tenta, exceptisq; modico
melle, adhibeto. Postea verō quam eminentes
fuerint, atq; in propatulo, accipe cerussæ vnc. j.
spumæ argenti quancuncq; pompholygis vnc. j.
olei myrti bessim: vini boni tantūdem: butyri
vnc. j. Confunditōq; & applica. Cæterum ad
ardentes sedes dolores, oui affati vitellum vino
albo terito, & cerato myrteo exceptum illinito.

*Hæmorrhoidi-
bus ab Ascle-
piade scripta
remedia.*

Ad pudendorum affectus.

Exvicerati pudendi cognitio, ex manifestō cir-
ca ipsum dolore paratur: vñ cū hoc, quod etiā
circa mictiones excernitur quid ex corpusculis
viceri ipsi insiditibus. Discernuntur aut hæc ab
illis quæ ex vesica ferūtur, quod statim in ipso pri-
mo lorij exitu appareant: quæ verō a vesica exer-
nuntur, deferantur cū vrinis permixta. Cæterum
vlcera pudendorū, & circa sedē citra inflama-
tionem cōsistentia, resiccantibus valde indigēt phar-
macis: qualia sunt quod ex charta combusta cō-
stitit, & anethū vñū, & cucurbita vñā. Verū sic-
cis & cretibus vlcibus, etiā aloë bonum est
medicamen. Omnijū autem maximē dolorem se-
dat, nec vllō minus efficacē est pompholyx. Si ve-
rō humectiora sint vlcera, pinus cortex per se,
& lapidulæ maritæ: vt si profunda, manna eīse pre-
dictis addatur. Porro quæ circa vitē aut vesicā
consistunt vlcera, eisdē medicamentis indigena,
sed instrumentis insuper opus habent, quæ ipsa
intromittant, vt sunt metrenchlyte, & catheteres
vocali. Apriora itaq; sunt arida, qualis est cro-
cus, pōpholyx, & aloë, quæ facili pīraginīs, aut
alteri tali succo miscētur. Ad scroti & pudēdi do-
lores. Butyri & resinæ pari mēsurā vitæ. Aurse-
men lini cū aqua coquiro, & admixta myrrhæ fer-
mē decima parte, & resinæ tantūdem, imponito.

*Pudendorum
vlcera digno-
sandi ratio.*

*Pudendorū
vlcera valde ex-
siccantibus phar-
macis indigēt.
Pudendorum
vlcibus sicca
& cretibus,
quæ pharmaca
opulentur.*

Ad pudendum intumescens.

Foliorum vitis tenerorū drac. j. cerussæ drach.
v. trita cæraplasmatis vice impone. Aut lenticulā
in aqua coquiro, & cum mlii punici cortice tri-
tam imponito. Si verō ex sudoribus vlcera in

*Vitis rosacea
vitæq; vñū,
quibus pudorū
vlcera me-
dicamentis in-
digena.
Metrenchlyte.
Catheteres.*

*Pudendi ratio
senti remedia.*

scroto fiant, galli triti cum alumine inspergito. Ad tubercula in pudendis nascētia, piri semen inspergito, & fel hircinum oblinito. Fissuras & rimas iuuat rosaceum, amyllum, & thus, paribus portionibus mixta. Aut si horum hederæ aridorum vitiorumq; cinis, cum oleo in plumbeo mortario triti. Ad pudendorum inflammationes, farinam hordeaceā hydromelye incoquito, & vitis folia tenera cū polenta terento, simulq; omnia imponito. Excrecentem testiculorum carnem cinis farmētini cum nitro & aqua subactus sanat, cataplasmatris vice impositus.

De Priapismo.

Priapismus est auctio coloris permanentis in latitudine longitudinisq; extra rei venereę appetentia. Cuius affectionis est causa, statulentus spiritus ex humoribus crassis & viscidis genitus per moderatā caliditatem. Debent igitur refrigerari leniter partes per ceratum rosaceū in aqua maceratum, itēq; per chamæmelinum ceratum, tum pudendo ipsi, tū lumbis impositum. Victus & pharmaca esse debent attenuatoria, citra manifestam calfactionē. Præterea nympha in potu est danda, & vincis semen: necnon rura viridis obsonis misceretur, post aliorum tenuium vsum. Quod si evacuatione vi libear, administretur per vomitum. Ad eos qui se in somno permungunt, vesicam caprillā, aut ouillam vestitam, ex polca bibendam dato: & ad vesperā sili culosos inire somnum iubeto. Facit & testiculos leporis in vino odorato seruatus, atq; ita potus. Aut calamintham & myrrhā in vino antecoram bibendam dato. Oblinunt autē pudendum cimolia terra cum perdicti succo.

Ad vteri affectus.

In vteri suffocatione conngit sensus ac motus priuatio, & pulsus obcurus, & paruus, & penitus interceptus. In aliquibus verò tum sensus, tum motus adest, ratioq; cōstat, cæterum vix respicitur. Aliquibus etiam vox interceptitur. Aliis contrahuntur artus. Fiant igitur viduis sensus & motus & respirations interceptiones, ob frigiditatem: perspirantibus ipsis tunc per arterias totius corporis, neq; vtrēbus illa quę per os fit respiracione. Etenim quū prius probē repurgarentur, conciperent, atq; coirent viris, verisimile est, postea quū omnibus his priuātur, humidum & frigidum in ipsis semen totum corpus perfrigerare. Ad vulvę itaq; strangulatus conuenit agariaci drach. j. in potu accepta cum vino: & plantaginis semen & succus cum vino: necnon acetum scillimum absorptum. Oliscula excitant strangularas, bitumen, castorium, chabbanum, pix liquida, cedria, pili viti, ruta, allium, cæpa. Eandem in rem & cornu cervi sufficit: & ruta cum melle lana excepta in anum inditur.

GALENI PERGAMENTI DE compositione medicamentorum secundum loca, lib. X.

EX nephriticis antidoris, hoc est, renalibus quidam calculosos renes luanat: quidam verò inflammatos & vlceratos, quę etiam ad vesicam affectū conueniunt. Maxime autem contrarię inrer se sunt prædictorum pharmaco-

rum facultates. Siquidem quę ad inflāmas & vlceratas affectiones componuntur, mitigatoriis medicamentis indigent. Cæterum quum impossibile sit hæc citro penetrare ad regionem renum, ob id ipsis miscemus diuretica. At quę calculosis opuluntur, vnicam facultatē postulant, quę secat & extergere est nata, cum conspicua caliditate. Sunt autem talia fere omnia amara.

Confectiones Andromache ad renum & vesicę affectiones. Pono ad vesicam vlceratam, & vrinę emittendę difficultatem. Seminis lini, sem. papaueris albi, sem. cucumeris, tragacanthę, sing. drach. ij. amyli drach. iij. Cum aqua in pastillos redigro, exlibetog.

Alia ad eadem, & vesicę dolores.

Croci, seminis rutę sylvestris, seminis malux sylvestris, sing. drach. vj. sem. hyoscyami drach. xij. opij drach. vj. sem. apij drach. xij. nucez auelanas xij. amygdalas xx. sem. cucumeris drach. xij. mellis Attici quod sit satis. Datur magnitudo ponticę nucis cum vini mulsi cyathis iij.

Alia ad profluuiā sanguinis ex vesica.

Aluminis drach. i. tragacanthę drach. ij. gummi obolum j. Dato ex passo quādoq; obolum j. quādoq; duos.

Alia calculos frangēs, ita vt nō resuscantur.

Castæ, piperis albi, sem. pastinacę, anisi, sem. papaueris albi, spicę nardi, sem. smyrnę, cyperi, sin. drach. ij. seminis apij, thuris, styracis, incensis Illyriacę, amygd. amar. asari, sin. drach. ij. myrrhę min. nę drach. iij. mellis Attici quod sit satis. Cōficiro, & quondie exhibeto nucis ponticę magnitudinē ex aquę cyathis tribus, idq; ieiunio sit macho.

NEPHRITICÆ compositiones ab

Aesclepiade conscriptę.

Seminis satui cucumeris triti drach. iij. seminis malux drach. v. nucum pinearum drach. vi. sem. apij drach. vii. seminis lini drach. i. amygd. amararum mund. drach. ix. Excipe passo, & exhibeto nucis ponticę magnitudinē cum protropi cyatho i. & aquę calidę cyathis duobus. Alia. Malux sylvestris, & rutę sylvestris, & apij montani radices in vino coquito, & expressi liquoris cyathos ij. cum pari aquę portione exhibeto. Alia. Seminis balsami, lapidis qui spongias inest, pulegię aridi, seminis malux sylvestris, ocy mi andi, sing. parces portiones tandito, incernitog & reponit. Propinato autem cochleare vnum cum vini diluti cyathis duobus.

Pastillus ciens vrinās, atq; expellens lapillos.

Asari, petroselin. plu. med. sing. drach. iij. acori, sem. anisi, sem. dauci, apij montani, carpopalsami, tragacanthę, singulorum drach. ij. Tragacantham passo dissolutam aridis aduciro, & pastillos formato, indēq; obolos iij. cum passi diluti cyathis ij. exhibeto.

De ischiade, podagra, & arthritide.

Ex genere arthritidis est tum ischiās, tum podagra. Quod enim in omnibus articulis est arthritidis, hoc vno iuxta coxedicem quidē ischiās dā, iuxta pedē verò, appellāt podagram. Incipit igitur plerumq; podagrę generatio ex vno articulo, tēporēq; in omnes progreditur. Cōmūne habent hi tres affectus redundantiam humoris. Cæterum aliquando irruens humor sanguineus

Renem inflamat, quolū medicamentis conueniend.

Calculosi congrua medicamēta esse amara.

Vesica vlcem, & vrinę difficultatē remedium.

Sanguinem i vesica statim remedium supponere, Calculos frangere medicamentum.

Nephritica ē. polianon ex Aesclepiade.

Arthritidis, ischiās, Podagra.

Arteriarum morborū communis causa.

Pudendi fissurę tubercula quę nascunt.

Pudendorum inflammationes quę opulentur.

Priapismus est auctio coloris permanentis in latitudine longitudinisq; extra rei venereę appetentiam.

Mungentibus inter dormiendum remedia.

Vteri suffocationis quę sequantur symptomata.

Vteri suffocationis affligit, per arterias tantum fieri perfrigerationem.

Vteri suffocationis remedia.

Nephriticorum medicamentorum differentia.

*Testum pro-
natio sic à pu-
trosis humo-
re impa-cto in
articulis, ubi
que sunt sacra-
tabiles.*

*Articulares do-
lores à quibus
gignuntur hu-
moribus, que
nata succedunt.
Articulari
morbo curatio.*

*Repellendum
quidem vitium
quod efficit hu-
morem fluant
ad articulum
primum aut ma-
iorem, minime
autem si in co-
xendicem ve-
nerunt.*

*Ischiadici quo-
li a remedia in
principio repel-
luntur.*

*Ischiadici quo-
li a remedia in
principio repel-
luntur.*

*Ischiadici quo-
li a remedia in
principio repel-
luntur.*

est, ut plurimum autem pituitosus, aut ex pituito-
so & bilioso mixtus: quibus etiam interdum mi-
scetur sanguis. Porro ubi pituitosus humor, qui
propriè appellatur crudus, in articulis delinquit
diutius, crassior atque viscosior efficitur, rosisq[ue]
aut callis dictis præbet generationem. Qui quid-
em postquam productus fuerint, non est quod spe-
res illos posse exactè dissolvi. Differètia autem
humorū facili ex colore dignoscitur. Præ-
terea biliosus sanguis multè calidioris sensu est

Curatio autem ipsa exordida est ab evacuatio-
ne asilientis humoris: si quid ex æquo humo-
ribus redundat corpus, venæ sectione primò
omnium administranda: dein purgatione: quibus
accedat pharmacorū dicendorū cōueniens atq[ue]
opportuna visus, ita ut in manibus pedibusq[ue]
pharmacis repellentibus fluxionē vitamur: iux-
ta coxendicem verò, ea minime administremus.

Quò enim iunctura ea in profundo sit sita, san-
guis ex vicinia & ambientibus vasculis à musculis
ad illa trahitur. Mitigatoria igitur in principio
medicamentis vitanda est ad dolores coxendicis,
& que nec refrigerent multum, nec fortiter cal-
faciant. Exacerbantur enim per ipsa fluxiones,
caliditate nimirum plus attrahente ipsas, quàm
impediente. Itaq[ue] itaq[ue] sit coxendicum dolor ex
sanguinis multitudine: citiusq[ue] curatur, venis
circa poplitè aut malleolos pertusis. Quem-

admodum autem sola sæpe sanguinis evacuatio
sufficiens auxilium existit, sic contra in omni dolo-
re coxendicis, & præsertim eo, qui ex humorū co-
pia est exortus, si quis ante evacuationē totius
corporis acibus pharmacis circa affectam par-
tem vitatur, affectus ægrè curabilis reddet, copia
videlicet indissolubiliter ibidem condensata. Ob
ideò ab evacuatione incipiendum est, non solim
à cruribus, sed à cubito citè à sanguinis detractio-
ne facta. Auxiliatur etiam vomitus ipsis ischia-

dici, magis vni quàm evacuationes per venterē,
ut qui reveillant humorem repentinè detrè-
rent. Monendi itaq[ue] sunt vomitus in principio ab ac-
cepto cibopostea verò, citè per vomitoria me-
dicamèta, iuncto à medio cruribus facto. In quibus
autem vehemens humorum densatio, quæ ægrè
dissolui possit, à medicis intempestivè vitibus
acibus pharmacis facta est, iis maxime cucurbi-
ta affixa auxiliatur, & purgatio per dyssimos effi-
caciore, qualis est qui ex colocythide constat.

Compositiones ab Andromachio scriptæ ad
ischiadicoa. Emplastrum è profundo extrahens
humores assilentes coxendicem. Seminis ru-
tæ sylvestris, silphij, spumæ nitræ, baccharum lauri,
abrotini, colocythidis medullæ, cardamomi,
amij, singul. drach. iij. rutæ viridis minx octa-
uam partem. Quiddam horum singulorū drach.
xx. accipiunt: necnon picis, adipis taurini, tere-
binthinæ, myrtel, ceræ sing. tantundem: chalbani,
ammoniaci thymiamatis, vtriusq[ue] drach. vj.
opopanactis, sulfuris viam, sing. dra. ch. iij. Confi-
cito, & admouero.

Aliud ad coxendicum, capitisq[ue] dolores,
atq[ue] ad alios omnes antiquos.

Ceræ drach. xxij. ammoniaci thymiamatis
drach. vij. terebinthinæ tantundem: succi thapsiæ

drach. viij. olei cyathum vnum. Aliud. Ceræ
drach. c. visci quercini drach. xvj. myrtelq[ue] drach.
vj. terebinthinæ drach. xxv. chalbani drach. vj.
irisidis Ilyricæ tantundem: ceræ heminam s. Cy-
prini tantundem.

Asclepiadis malagmata ad
ischiadicos.

Myrtelæ factæ, bdellij onychis, medullæ cer-
uinæ, ammoniaci thymiamatis, irisidis Ilyricæ,
sing. lib. ij. opopanactis, chalbani, styracis, masti-
ches, floris lapidis Asij, succi scycomororum, can-
chrysos, pipentis albi, sing. lib. j. ceræ, terebinthi-
næ, vtriusq[ue] lib. v. Tandendum est pharmacum
ita, ut qui raudet, forem vnguētū irini adhibeat,
quod mollitas reddatur.

Aliud mirè tuans ischiadicoa, discutientisq[ue]
omnem duritiem.

Ceræ, visci quercini, terebinthinæ, irisidis siccs,
myrtel, chalbani, sing. dra. xlvij. Olei cyprini,
aut vnguētū Aegyptiaci quod sit satis. Cōfitero.

Aliud. Picis liquide bratæ lib. iij. fræcia arida
vitæ lib. ij. niri rubri lib. j. sæcinæ pini, ceræ, ita
phidis sylvestris, sulfuris viam, sing. lib. j. pyreturi
lib. a. cardamomi sextarii vnum. Picem, ceram,
atq[ue] refinam, soluto: arida tundito, cribratōq[ue],
& liquefactis cōmittito. Porro Damocrates, Ar-
chigenesq[ue] plurimum ad ischiadicos commen-
dant malagmata ex iberde herba (quam nastur-
tium sylvestre vocant) cum adipis porcino tusa
confectum: quod sanè imponi iubent ad horas
tres, indeq[ue] ad balneum accedere.

De podagricis & arthriticis affe-
ctionibus.

Scopus in hisce affectibus est, si quidem ad-
huc fluant humores, ipsos per astringentia repel-
lere: si verò amplius non influant, discutere qui
sunt iam impacti.

EPITHIMA Asclepiadis, ad arthriticos,
mirè dolorem sedans.

Succi papaveris drach. iij. croci drach. j. cum
lacte bubulo, caprillōve, & panis medulla con-
tundito, iungatōq[ue], ac deniq[ue] ex rosacro emol-
lis, cōficio cataplasma. Aliud. Stryacis drach.
ij. opij drach. j. Confice, vterq[ue]. Aliud rosos &
durinas discutens. Farinæ scenigræci, floris la-
pidis Asij, domeni fabæ nigre, farinæ lupinorū,
singulorū sext. j. Omnia mixta & aqua subacta
calida, imponito. Pashilus podagricus. Aloës
lib. j. succi cætauri sciscunt, thuris masculi trien-
tem myrtel tantundem: floris lapidis Asij, opij,
succis mandragoræ, aluminis scissis, singulorum
sextantē: passio excepta in pashillos redigito. Viso
expetente, lacte dissoluto cum pēna illine, & su-
pra illutionem linteorū passio imbutis impone.

Aliud, quod auxiliatur confectum. Visci, tere-
binthinæ, vtriusq[ue] lib. j. adipis taurini, floris la-
pidis Asij, calcis viam, mannæ, singulorum qua-
drantem: cyprini lib. j. Conficito, vtriq[ue].

F I N I S

*Ex industria omnes libellum de facilius parte re-
das, quid omnia que in illo habentur, reperiuntur
in hisce commentariis longè com-
pletior.*

*Arthriticus cum
grosula opio
librata ab
Asclepiade
scripta.*

ILLVSTRI ADMODVM, ATQVE ORNATISSIMO VL
RO, D. D. ARIO GONZALO, COMITI PVONI IN ROSTRO,
ANDREAS LACVNA SECOSIENSIS, DOCTOR
Medicus, Miles S. Petri, Salutem.



*Galeni cōmentarios de Theriaca & de antidotis, hoc nomine dicare tua Dignationi sta-
tui, Vir citra controuersiam splendidissime, vt generosum istum animum tuum, ex tam
longa lue & controuersia de se- gatum, varia eorum lectione, dulcissimāq, oblecta-
rent: contra iudiciariaq, molestias, atq, ingentes difficultates (quæ optimorum ingenio-
rum veluti deleteria & exitialia venena existunt) saluari alexipharmaco cōmunirem, atq, corro-
borarem. Quamquam hercle adeo inuicta, insuperabilisq, tua ista est animi magnitudo, vt nulli tor-
mentis succussa possit inquam euerti, aut quoquo modo labefactari. Nam tametsi varij fortunæ flu-
ctus, acerbissimāq, procella, & quæ vel fortissimū queng, prosternere minimo negotio potuissent,
iam ante multos annos in te maximū impetum fecerint, adeo tamē fortiter sustinisti omnes eum in-
sultus, tam heroicè resististi afflictionibus vndiq, tua mœnia circumvallantibus, vt ob nullam tem-
pestatem ingruentem, vultum inquam, aut colorem mutaueris. Quam sanē tam insignem consi-
tiam, animiq, raram serenitatem, non aliunde quā a philosophia comparasti: cuius nimirum ama-
tor longē indulgentissimus es. Siquidē præter alias virtutes quibus te exornasti Deus Opt. Max. e-
tiam in seuis tibi ardentissimū quendam omnium disciplinarum amorē: quo accensus, adeo illi per-
petuō indulges, vt ab ipsis renouari non possis. Id quod ipse exploratum habens, non posse me Digna-
tioni tuæ rem illam oratiōe facere existimasti, quā si ad eam mitterem hosce cōmentarios Ga-
leni, vt mole exiguos, sic plenos eruditione, variisq, naturæ mysteriis auctos. Tuum igitur fuerit, Vir
Clarissime, hoc nostrum quantulumcumq, munusculum, illius seruentissimū amoris, quo optimus pa-
ter meus prosequebatur olim totam familiam vestram, officijq, mei in tuam Amplitudinem, futu-
rum veluti monumentū quoddam perenne, equi bonisq, consuleret. Vale. Venetijs, Calend. April.
M. D. XLVIII*

1270

GALENI PERGAMENI DE
Theriaca ad Pisonem, lib. vnus.



Theriacem cum
mandato.

Theriacem posse
ita parantū
pharmacorum
operatiōem
supprimi.
Marcus Aure-
lius imp. acri-
silem Theria-
cam.

Seruent et Lu-
cili cōsiliū in
perij modera-
tione colligis-
se, magnifice cum
mandat Gale-
ni.

Edicamentum ex viperis meritis est
apud homines inter alia omnia cele-
bratissimū, Optime Pifo, & q vim
habet efficacissimā, & q neminē
promissis frustraret. Siquidem nul-
lum a feris commortum, hac statim epota anti-
doto, petiisse, memoriæ proditiū est. Nullus etiā
eadē præsumpta, vel si paulō post impeteretur,
mortui interit: id quod in dies experiuntur præ-
tores, in hominib, capitali supplicio damnatis.
Ceterum si epota theriaca nō purgetur qui hau-
sit medicamentum purgās, id nbi erit indicium,
antidotum præstitissimū esse, quæ sepius inē
solet adulterari. Porro Drius Marcus Aurelius,
qui legitime aliquod gessit habenas Imperij,
asiaticū, & vel vti alimenio quodam hoc vtebat
medicamento: primūq, fuit, qui ipsius existimā-
tionem si dēmp auxit. Verū illius quidē prin-
cipis tempore, ad familiarium tantum notitiā,
theriaces perueniebat opus: sub hisce autē mo-
narchis maximis, vñs eius prodit in publicū.
Siquidem nobis omnib, licet eorum bonis pro-
be vti, liberalitēq, aliis mederi, alio ab alio me-
dicamentum capere: quum nō solum hoc v o-
min e cæteris omnibus antecellat, quod Impe-
rium a Diis sint adepti, sed quod etiam vniuersa
bona cunctis libenter impartiant, ac non secus
quā Dñ ipsi, tantū ex æquo gaudij concipiāt,
quantum illi qui ab ipsis seruantur: quum ni-

mirum ceaseant maximā regni esse partem, cō-
munem omnium salutem. Quo sanē regio cado-
re præditi, adeo exquisitē & diligenter theriacē
præparāt, vt ipsi quidem nihil prorsus omittit:
antidotus autem, admiranda opera exhibeat. Igi-
tur morbi cuiusq, naturæ cōperta, differentiisq,
simplicem pharmacorū penes temperamentū,
cognita singulis morbis quod cōgruū sit medi-
camen cōpositum præparabimus. At simplicia
medicaminum vires sensu & experientia cogno-
scimus: quibus postea ratione iungentes, cōgru-
ce ducem sequentes, hallucinari nō possumus.
Etenim quum cernamus liquidū, & ammoniā bi-
lem flauā educere: epithymum, atram bilem: ac-
densq, coccum gnidium, pituitā: nec credamus
medicamenta ipsa purgāia, in suam naturā hu-
mores transmutare & conuerrere (id quod A-
sclepiades somniauit) sanē persuasum habemus,
quemadmodum magnes trahit ferrum, sic medi-
camenta singula, sua in sita facultate cōuenientē
sibi succum attrahere: nimirum id ratione com-
prehendentes, quod proprietate facultatis na-
ture cuiusq, pharmaci verē attestari atq, exprime-
re potest. Medicamentorū itaq, alia p totas sub-
stancias agunt: alia in substantia sua miscellanea
facultatē sortiuntur, adeo vt sæpe in corpore ef-
fectus maximē contrarios producant. Siquidē
lapathi folia comesta subducunt aluum, quam
sumptum eius semen astringit. Similiter & suc-
cus brassicæ, & vetulorum gallorū ius, & coch-
learum marinarum cremores, vtreum commo-
uent: olus autem ipsum, atque illarū carnes co-
mestæ,

1271

Regni maximā
esse partē, com-
munem omnium
salutem.

Simplicium vi-
res cognoscit sen-
su experientia
que quibus ad
iusta sit ratio.

Scammoneum
trahit fluxum
bilem.

Epithymum
atram bilem
expurgat.

Cocum gnidium
soluit pituitā.

Medicamenta a
singula propriū
sibi succum at-
trahere.

Medicamenta
plura, secundū
ducent sui q
suum partem,
varios effectus
producunt.

Lactis fabularia diversis
Trifolium affligit
qui sanas parit
ulceras
Cicuta florum
aliter nos per-
icit
Veterum alie
coturnices, ho-
mines sanant
Lepus marinus
pulmonem ex-
plebat
Cantharis vesti-
tam affligit

meffa, eundem comprimunt. Aloë, squamæ x-
ris, excreſcentes vicerum carnes ſtringunt: aſ-
ſumpta verò poſtea, vniuerſum corpus expurgit.
Lac vbi à nobis diuiditur, contrarias facultates
oſtendit. Nā ſerum ipſius habetur, ventrē reſol-
uit: Caſeus ingeilus, ipſum cohibet exactē. Tri-
foliū herba decocta, impoſitaq, ferarū morſib.
auxiliatur: quæ ſi ſanæ parti aſſicretur, nō ſecus
quā ſerum ferarum morſus eam affligit. Cicuta flur-
nos quidem alit, nos autem ē medio tollit. Vera
trum coturnicib. cibis, homines malē perimit.
Nōnulla præterea partes quaſdam certas corpo-
ris vitant. Nam lepus marinus pulmonē exvl-
cerat. Cantharis, veſicam peculiariter affligit. E-
cōtrario, aſſectio iecinori ſæpe ſunt herbas eupa-
torie ex vſu. Myrobalaſnus linem adiuuat. Saxi-
fragon & Bertonica, renes optimē efficiūt. Quū
igitur veteres illi Medici reputarent ſecū, in eui-
tabiles eſſe noxiarum ferarum morſus: necnon
deleteriorum pharmacorū ſymptomata eſſe o-
mnino letalis: quūq, etiā perpenderent, homi-
nū naturas diſſerre inter ſe plurimū, aliūq, aliū
medicamentū idoneū eſſe, merito ipſius theria-
ces accuratā, exquiſitā, & variā, ſunt moliti præ-
parationē: vt hoc nomine ipſi in omnibus ſuū
finem aſſequeretur, & ob vſus neceſſitates ma-
gno ſtudio eam mortales omnes ex peterent. Nī
liſi ſiquidem inter vix in cōmoda diſſicilis mi-
hi videtur deleterius medicamētis, ac ſeris noxi-
is. Primus autem qui antidoto cōtra ferarū mor-
ſus immiſcuit ſeras, fuiſſe perhibetur Androma-
chus, vir melior caule memorabilis, nec multo an-
te nos natus: quippe qui Neroni (cuius aſſecta-
uiſſi) ipſius vires atq, compoſitionē dicarit. Sum-
ma autem deſcriptionis habet in hunc modum.

Theriace quib.
conuulſis af-
ſoluitur,

Andromachu ſenioris, Neronis archiatri The-
riace ex viperis, cui nomen eſt Galenē, maximē
ſalutaris ad ſerpentium atq, omnium ferarum
iſtius, pharmaca deleteria, affectiones vetricū,
anhelationes, dolores colicos, morbū aruatū,
hydropem, phriſum, omnimodā conuulſionē,
pleuritidem, vellicæ vlcera, ſuppreſſiones ex vring,
cruciatuſ renū, pelliceros morbos, ac deniq, eu-
nitis rabidi morſus, ſi pondere fabæ Aegypti ſu-
matur, cū ternis aquæ calidæ cyathis. Igitur cap-
tas vere inuenire vipers, ceruices illis atq, cau-
das præſecido, quantū arcta Pygmæi manus ex-
tenditur: nam vtraq, parte venenū gerunt. Poſtea
verò excoriatas euiſceratq, ab ipſiſq, om-
ni adipē amoto, in ſicile ſas cōcūct, aſſundē
aque quod ſans eſſe videatur, addēſq, germē
anethi, ac pauillū ſalis recēſis, & ſinito cog, do-
nec facilē à carne ipſæ ſpine amoueſt. Tūc itaq,
carnes ipſas exemptas, cum ſufficienti ad paſtil-
loſ fingendos medullæ panis puriſſimi, cōtrun-
dito & lxiuigato, aſuſoſq, iuſculi quod ſans eſſe
videatur, manib. opobalaſmo intinctis, conſici-
to orbiculos, eoſq, in vmbra reponito ad totius
antidoti compoſitionem. Dein fermento illine
ſcillam recentem, non admodum magnā, eimq,
in furno vel in paſtina coque, vt torrantur om-
nes eius partes ex æquo. Id vbi factū fuerit, par-
tes eius internæ & renierius cum pari portione
optimæ farine truinæ contundantur & lxiuigē-
tur, atq, in orbiculos digerātur. Verūm Andro-
machus duplicem portionē truinæ ſitūq, adu-

Antiferum ibi
ruorū propa-
ratio.

Paſſilium ſil-
limum propa-
ratio.

Theriace anti-
doti ſcandalo
Andromachu
compoſicio

ciendam cenſet, quū tamen æqualis modus ſin-
gendis paſtilis ſit optimus. Hæc vbi facta fue-
rint, accipies paſtiliorum Theriacorū drachmas
xxiij. paſtiliorum ſcillanorum drachmas xliij.
piperis longi, ſucci papaueris, magmatiſ, hedy-
chroi, ſingulorū drach. xxiij. roſarum ſuccari, i-
ris Illyricæ, glycyrrhizæ, ſeminis napi ſylueſtris,
quæ bunia da appellant, ſcordij, opobaſami, cin-
namomi, agarici, ſing. drach. xij. myrris, coſti,
croci, caſiæ, nardi, ſcheri, id eſt, iſci odorati ſto-
ris, diuris, piperis albi & nigri, dictamnii, praſij,
rheu, ſitacados, petroſelini Macedonici, calamini
thui, terebinthine, zingiberis, quinqueſolij radi-
cis, ſingulorū drachmas vj. poli, chamæpityos,
ſtyracis, amomi vix, mei nardi Gallicæ, Lem-
nizæ ſphragidis, plu pontici, chamædyos Creti-
cæ, ſoliorū malabaſtri, chalcidici roſæ, gentia-
næ, aniſſi, hypociſtidis ſucci, carpopalaſmi, gūmi,
marathi ſeminis, cardamomi, ſeſelis, acaciæ,
dilapii, hyperici, ſagapeni, ſmeos, ſing. drach.
liij. caſtorei, aritholochis tenuis, dauci ſeminis, bi-
tuminis Iudaici, opoponacis, cetrari tenuis, chal-
bani, ſing. drach. ij. meliſ lib. x. Vini Falerni quod
ſit ſanis. Conueniebat tñ prius hedyochromum vn-
guentum deſcribere, cuius apud Magnū talis eſt
preparatio. Aſpelathi radicula corticiſ, cala-
mi aromatici, ſcheri ſtoris, plu, coſti, aſari, xylo-
baſſami, ſing. drach. vj. cinnamomi drac. xxiij.
amomi tantundem: amarici drac. xx. nardi Indi
cæ drac. xvj. ſoliorū malabaſtri drach. vj. myr-
ræ drach. xxiij. ſtictidis drac. vj. croci drach.
xix. Exapium vino Falerno, m. nib. drach. opo-
balaſmo intinctis in paſtilloſ coguntur, & aſſic-
cantur. Elegit porro Andromachus ex aliis ſeris
ſolas vipers ad huius præparationē antidoti,
quod lix minus ab uſu baſificam vim obtineat.
Nam baſilicoſ, b. elus ſubſtans, & triplici frōſis
apice munita, vel ſi cernatur tantum, aut ſibilus
eius audiat, aſtutum hominē perimit. Quod ſi
ex ceteris animalib. aliquod ſtrigerit animal
à baſilico extinctum, ſubito etiam exanimatur.
Dryinus ſerpens tam eſt pernicioſus proditur,
vt ſi qui ipſum per imprudentiam calcarit, eis
pedum plantæ excoſcuntur, totiq, crura intume-
ſcant, periclitanturq, etiam illorum manus, qui
ipſis auxilium tulerint. Hemorrhoides, & hamor-
rhois, adeo inimici ſunt homini, vt qui ab ipſis
percuſus fuerit, ſanguine per os & nares, ac per
vniuerſum corpus euſuſo, vix ſuſtinet. Cōmodo
à diſpade, cōſciantur cauſatione. Nam & inex-
pugnabili ſini, & iſtu vellem tñ cruciari, interdū
& diſrupti, diē obeunt. Aconitias ſerpens, vbi ſe
multum extendit, et, iſta ſcalum quoddam inſi-
liſe corporibus, in perimit. Inter ſpides inſi-
nata Pryas, & ceruicē exporrigens, longitudinē
intervalli meriti, venenū corporibus inſpuit.
Erenim harum ferarum vna (næ quippe aſpidū
ſunt ſpecies, hæc videlicet, & cherſera, necnō che-
lidonia) perhibet reginam Cleopatraz, quū vel
let latere cuſtodes, citra ſuſpicionem ſibi mortē
ſubito cōſciuiſſe. Nam quum Auguſtus devicto
Antonio eam capere incolumem vellet, ac viue-
re, ſtudioſiſſiq, ſicvt par erat) ſeruare, vt Roma-
nis tam inſignem mulierem in triumpho oſten-
deret, hæc, re intellecta, optauit regina adhuc ex
humanis potius decedere, quā priuata Ro-

Hedyochroi vi-
gentis præpa-
ratio.

Viperæ aliis
ſeru malis vti-
tuere baſifica
ſuſcitatu, ob
idq, ad auſu-
tem ab Andro-
machu elat.
baſilicoſ vni-
verſos aſuſ-
ſuſe, hominē
perimit.
Dryinus
ſerpens.

Hæmorrhoides.
Hæmorrhoides.

Diſpade ſuſcit-
atu ſuſcitatu
baſicoſ.
Aconitias ſerp-
is perimit.

Pryas venenū
corporibus in-
ſpuit.
Aſpidem vni-
verſos.

Cleopatra poſt
victum Antonio
omne vix de-
corat Romā
à Caligula
de ſibi meritis
conſciuiſſe.

manis cōspici. Quo cōsilio duas mulieres fidi-
fissimas, Nactā nempe & Carmineā, quas ad pul-
chritudinē corporis mundo subministrari ha-
bebat, ad se vocauit, easq; iussit vt ferā vras sicu-
bisq; testum importaret, quod (vt dixi) custodes
falleret, praua factura periculum in ipsius mulie-
bus, an lubet perimere posset. Quæ quidē quā-
ctūm perussit, ferunt ipsam postea libi exti-
mum pariter cōcidisse: fuisseq; tandem inuentū,
manu dextra capiti admodō, et diadema, sicut et
confessorem tenente, vix eoq; fœdiorē

la & furculos extrahit. Citharis similiter leuiga-
ta, cybionis radice pota, reducit verum. Scorpius
allius, atq; ex pane comestus, velis lapides
cōterit. Terre intestinū ex vino assumptum, idē
molitur. Tritum & ex medicato bibitur, arca-
tum morib; excludit. Ex rosaceo cerato mo-
sifurum, podagricis inflāmanonib; cōuenit. Ac-
cipitur in suino vnguento decoctus, hebenudini
oculorū medetur. Scarabæus in oleo frictus, au-
gineo distillato, de leucis fuscis, extirpat. Alpa-

Stellio.

morbo, ad ipſius ſacculi vel viperæ ſacculum
 poſuit, vel ſi nobis inſimicemus ſint. Traditur
 liquide nou nulla animalia, ſi ſanguinem qđ
 numquam ex vulnere manentem cōtingat, e-
 comioſo occidere: ſi verò vorentur, nec ſanguine
 deguſtanti, vulneratoſ ſeruare incolumes poſ-
 ſe, quemadmodum et de Helenio eſt proditum
 eſſe, quod nimirum Dacas, Galmariaſ autem cuſ-
 pides telorum imbuere, qđ videlicet poſtquam
 ſanguine vulneratorum attigerint, ipſa occidere
 poſuit: quum ab ipſis tū circa villā eius edatur,
 ceruicē ſi ſecurius per cōſtitum oxiſ enechi, tu

*Vipera ſole
 morboſa ab ip-
 ſius ſacculi
 opulſatur.*

*Helenio ſeru-
 mofaſa ſepa-
 rat eſſe telum.*

Polycaemum de
dusse operā, ut
cum decore ad
moribunda ca
deret.

Viperam ore ex
opere gaudet
à mare, cuius
caput abscondit
re post senten
entem.

Murex caprea.

Melini caput.

Camel core
bram,
Hernandez or

Cornu tauri L.

Cereus peruvianus

Castoreum.
Stercus bubuli

Mayfield.

Les variations
hydrauliques sa-
nent.

Vipera pallens
la mare pule
regner al.
Către flumina.

Castles

Terna rasilis
new.

Alcedo.

Stellio visum a
scorpionibus,

*Viperæ solæ
moribus ab in-
pistis fallis
opulenter.*

Helena's face
smiled at her
as she sat down.

Marie stanci
pudor fiam
ab ipso emer-
git.

Camphorae purae
resinaceae cum
essentia, alia autem
admixta salina
resinaceae reddi-
tur medicamentum
Papaveris succo
facilem.

Arana trini po
tius ex trino,
morsus ab ipso
affertur.

pharmacorum
qualitatem, et
ut per hoc ma-
fieri, conspici-
re in materia
hanc quendam
communitatem
omnium semper
esse,

Theriaca Andromachi prescripta cetera. Vipera quando venanda.

præparent, nos compositione Andromachi, cum omnium præstantissima vitur, in regionis viciis eam præparamus. Venari autem oportet viperas initio veris, cum latebris relictis, foras in apricis prodeunt, & non adhuc viciis tam exaltate retinent. Intus namque delinquentes, cum nulla ex parte differunt, magis funt permiscio. At egresse, exuvium, crassum tegumentum solent deponere. Quare non statim ipsas capere oportet, sed per-

Vipera quales sint diligende.

mittere ut aere aliquando fruantur, consuetudineque vescantur cibo, hoc est, herbis, buprestibus, cantia ridibus, & putro campis. Eligendæ autem sunt colore sublauxæ, & exumi a quadam agilitate mobiles, ceruices admodum extensas habentes, oculorum tum inflatos, tum impudetes, atque adeo in-

Vipera femina in aspidibus deservit.

tuentes ferunt. Sint enim latiore capite, corpore autem atque ventre crassiori, meatibusque habent magis ad extremum caudæ locati: quæ non in voluta, sed potius cõverti esse debet: ac denique tranquillitatem cedat: quæ sanè re a masculo distinguit terminâ, quodque caninos dentes habeat plures duobus. Iam vero si caudis capitibusque amputatis, exanguia protinus, immobilis, ac prorsus mortua, ipsa animalia cernant, ad medicaminis compositionem non conferat. At si motu, sanguinemque cõservare aliquamdiu possint, tunc eas, cui præstantissimas coques ad cõficiendos trochiscos, quatenus dictum est. Porro medicamenta reliqua cõfundere, cerebrumque incernere quibuslibet modo oportet: nisi lævia insigniter admodum mihi suare videntur, quod facilius apponant corporibus. Quæ con-

Theriacum crafimula ratio.

spargenda lævigandaque sunt, ea vino Falerno coctis, libras denas adicies. At refrenam dialbanis, scilicet prius eliquata, in mortario postea ipsi medicamento immiscibus: omniamque tandem manibus modice opobalsamo intinctis, simul atque accuratè confundes: atque itaque antidotum in vitreis aut argenteis vasibus repones. Non autem veliementer ipsa replebis, sed relicto quodam spacio, quo medicamentum perspiret. Quare frequenter operculum detrahas, ut & liberius exhalet, & maturior tibi ipsius viciis cõtingat. Quippe haud modico tempore ad concoctionem indiget, ut quod viciis possit, antidotus probe sit cocta. Con-

Theriacem reponendo ratio.

coquitur aut plurimum duodecim annorum spacio. Ceterum qui vigentior ipsa viciis volunt, etiam quin to anno, septemque eam exhibent: præsertim iis qui si virulentis bestis, & a cane rabido sunt co-

Theriaci duodecim annorum ad perfectum concoqui, officium videtur. Viginti annorum triginta, etiam sexagenarium.

morfi: necnon in medicamentis letalibus. Est autem potius medicamentum ad viginti triginta annos. Nam in aliis affectibus, ubi tanta noxæ causa non est, sufficere videtur, cum viciis exiguit, etiam sexagenarium. Etenim ubi luvius antidoti facultas est valida, si sumatur post pharvacum purgans, eius operationem suppeditat: verò imbecilla, minime purgationem impedit. Iuxta differentias autem affectuum, ipsius medicamenti quantitatè metimur, congruamque mixture modum administramus. Si-

Theriacem probandam ratio.

quid præter affectus dictos, capitis diuturnos dolores atque verigines sanant, auditusque difficultatem, & oculorum heruberudine corrigunt. Comitialibus etiam opulatur: reiciuntque sanguinem plurimum iuvat, si quis ipsam cum symphyto de-

coctis, dilutisque ex aqua exhibuerit. Insuper intestinorum vermes exterminat, hepaticos & lienos reseruit, dysenterias, leenteras, voluulorum, præsertim cum intestina vacant inflammatione, perfanat. Præterea cum corpus multis & copiosis sudoribus diffuit, ipsiusque robur est exoluit, nec morbus vini potione admittit, theriace oportet sudoribus fuit, & collapsas vires corroborat. Ii vero in mulieribus etiam menses educit, & vteri sedibus suppressas hæmorrhoidas subinde aperit. Nam cum varia mista facillime sit prædita, ideo alia diffundens extenuansque, cogit ut excernatur: alia ob viciis imbecillitatem præter modum fluentia, folet, vires instaurans, colibere. Quinetiam vniuersis articularibus morbis auxiliatio est, cum præterierit augmenti tempus, vigorisque status accesserit: tunc uanque fomentum dolorum leniens, antidotum propinabile: quæ sanè fluxiones infarctas discutit, & irruentes arcebit.

Prodest Theriace & sanis, si crebro ipsam assinant. Hoc auxilio viciis sepe succurritus elephan- nacia. Nec vero corporis tantum, sed animi quoque affectibus auxiliat. Quippe melancholicis vitiis, si sepe exhibeat, medetur, ipsam atram bilem ex- hauriens: quare pulchre ad febrem etiam quæ- rantam cõvenit, quandoquidem ab atra bile trahit ortum. Ego igitur multos laborantes quæ- rana, hoc præsidio facili liberaui. Nam vomitu prius secundo cibum ipsos evacuant, deinde insequenti die succu absintly exhibebis, ira horis duabus ante accessionem propino antidotum, protinusque eger frequenter liberat ab accessione. Aquæ etiam pauore, omnium morborum pessimis, qui morbos a cane rabido sepe invadere solet, tollere hoc medicamentum consuevit. Quo quid morbo correpti, aqua timent, ac propter multam ariditatem, humidi desiderio tenentur, ceterum a potu abstinent, quia mente alienati, id quod auxiliari possint, non considerant. Proinde fit, ut aqua fugientes, inarescant, & convellantur, ob febrem quæ intus vrunt: miserrimorum tandem mortis genere intereant. Cane potro furenti & rabidi, ab eo qui nihil tale perpessus sit, faciliè dignoscere licet. Si quid si audieris gracilem corpore, sicco, oculis inflatis, cauda demissa, spumante ore, lingua exerta, enigmis bilis colore infecta, cibum quæque infusile, citraque ratione cucurrit: dein-

de rursus subito volentè cõsistere, furorè quodam in sano percit, mo mordidè non sibi antea prævisos: hæc in quæ si in eo sic habere intellexeris, statim rabidum esse canem intelliges. Quare vulnus ab ipso illatum longe vastius efficiens, carne multo intervallo orbiculatum præficia, non facile ad cicatricem perveniat: sed foramen dicit, quodraginta vel minimis diebus, patefacit, ut per ipsum canis virus emanet. Cautenis igitur admodum candentibus locum solemus advertere, & alius viciis medicamentis, quæ extrahendi vim obtinent. Ego vero antidotum ipsam rosaceo mistam aliquando in vol-

luntis indidi, ut cucurbitulæ instar exurgeret, ab alio virus ipsum extraheret: ut quæ non modo e-

pora, sed etiam admodum extrinsecus rabidore mortibus præstaretur remedium existat. Sed neque ad pestilentem luem (quæ & ipsa veluti fera quædam existens, ab ætris putredine exorta, per inspira-

tionem, in mulieribus etiam menses educit, & vteri sedibus suppressas hæmorrhoidas subinde aperit. Nam cum varia mista facillime sit prædita, ideo alia diffundens extenuansque, cogit ut excernatur: alia ob viciis imbecillitatem præter modum fluentia, folet, vires instaurans, colibere. Quinetiam vniuersis articularibus morbis auxiliatio est, cum præterierit augmenti tempus, vigorisque status accesserit: tunc uanque fomentum dolorum leniens, antidotum propinabile: quæ sanè fluxiones infarctas discutit, & irruentes arcebit.

Theriacem corpus & animi affectibus auxiliatur.

Quæritur a fœbris curatio.

Aquæ potioris morborum pessimis de singulis.

Canis rabidi nota.

Morsus a rabido cane contra elicitur.

Morsum rabidi canis effugandum aperit, ut minimè quadraginta dies.

Theriaci etiam admodum viciis in quæritur a fœbris curatio.

Theriaci etiam admodum viciis in quæritur a fœbris curatio.

Theriaci etiam admodum viciis in quæritur a fœbris curatio.

tiones infiliens, haud vnum aut alterū dominū, sed plures quoque cunctas depascit, vastat, & populariter reperit est aliud efficacius remedium. Nam quemadmodum cōstat diuū illū Hippocratem, per solam alterationē aëris, dūcū fuisse olim ab Arhenis pētilentē eius constitutionē, nūmū per totam urbem ex aromatis lignis, & suauissimis floribus, variis pyris extractis, vt aërē purum hoc modo reddatū, inspirantē homines in mali sub sidium: simili ratione theriace, seu ipsa

Pestilentia ab Aethiopia abegit Hippocrates per totā urbem variis pyris ex materia aromatica extractis.

Theriacā, seu ignis quidam purgatorius anellus.

quoque ignis quidam purgatorius existat, praesentem quidē ipsam in pētilenti aëris statu, & eu tiquā malo corripit: correptis autem mederi potest, malini inspirantē aëris in alterā, nec ipsā amplius grassari permittens. Quare in prospera quoque valetudine, vt crebrō vtrius hac antidoto, cōsolū, sed praecipue dum per horridam hyemē iter facturus es. Iam vero antidotus haec sensus omnes cōhermat, acut mentē, adeoque ob varietatē miscellae, ab iniuriis corpus securū facit, vt ne ā deletēis quidem evinci possit: vt fertur de Mithridate, qui nō theriace (& vix nōdum erat) sed alia antidoto, quā Mithridates appellauit suo nomine, praemunitus, nō potuit veneno interire. Cū enim ā Pompeio victus, in extremis cogeretur sibi sano per venenū mortē cō

Mithridates praemunitus antidoto, vix ā veneno non potuit, ac provido opus medicamentis profectus fore.

sciscere, medicamentō copioso epoto, ipse quidē ob praesumptū antidotū defungi vita nō potuit: filix autē, quae ob eximīā erga patrem amorem, oppetere cum eo mortē volens, idem medicamentū hauserūt, subitō animi exhalārūt. Quod Mithridates sentiens, Pytho suo familiari iniunxit, vt ipsū ingularēt: q pharmacū opus absolvens ferro, cum mori violenter cōgēit. At verō theriace vitandum est post absolutā coctionem, interdum quidem iussit Aegyptiac fabā, cum bisnis aquae cyathis, vbi exiguum ad concoctionē ipsius intervallū erit: interim verō avellanae nuci magnitudine, ex tribus aquae cyathis, cum plus temporis ad pharmacū distributionē es habiturus. Ceterū per se statē neutiq id pharmacū

Theriacē videri esse post absolutā coctionē Theriacis praeparanda quatuor sunt.

capere consulerim. Similiter etate florentibus, calidissimiq naturis, nec multū, nec saepe id exhibendum censeo: iis verō qui iam inclināt, & plurimum, & crebrō, nō ex aqua, sed ex vino, vt propinet, suadeo. In pueris omnino vitandū id medicamen est, vt quod faciliē corpora eorū dissoluat. Memini siquidem aliquando puellum ex impetuetivo vsu antidoti dissolutum fuisse.

Theriacis vsus quib. aetatibus et viciis contrahitur, et quib. nominis.

Theriacē corpus praeparare dissolutum.

De salibus theriacis.

Sales theriaci ad praedictos etiam affectus faciūt, modicē tamē ac longo tempore. Neq enim evanescit ipsoꝝ facultas, tametī ex cōbūstis viperis conficiant. Multa siquidem evadunt ignis cōmercio meliora, aut latentē naturā edunt. Au rum quippe indicamus per ignē: adulteratūq igne coarguimus: ac flamma cāsēē purgatū, esse probum apparet. Ferrū igne mollescit, flexūq nobis ad multos vix vsus est aptum. Nūquid enīam plurima quae ingerunt in corpus, nutriendis nobis ignis beneficio idonea reddunt? Etenim (vt alia praeterea) vinū statim ab vuis pressum, est crudum: ā Solis autē igne concoctū, suavisimū & maximē portabile redditur. Chalcitis etiam cruda quidem corpora exviti: cocta verō

Aurum indicatur per ignem. Ferrū igne mollescit.

cicatricē inducit corporib. Lapis Phrygius crudus acerrimus est: ignisq & cum aliis quibuscūq tritus, sit oculorū praesentia ei remedium. Spongia combusta cinis, sanguinis fluxionem potēter inhihet. Vipere itaq simul omnes integratq combūstae, in istā praesentia deponent, ab ignēq salutare redduntur. Peculiariter autē sales medentur maximē affectibus per summam cutem obortis, leucis dico, lepra, atq agrestis impetigini: abiguntq pedunculos, propriē ex corruptione enaentes. Praeterea dentes optimē abstergunt, erodig non permittunt, ac flaccidas gingivas condensant, earūq fluorem atq putrilaginē reprimunt. Praeparatio autem eorū est talis: Viperae praedictis similes, & eodem tempore caprae, numero quatuor, non plus bidoq post venationem sumantur. Praestiterit tamen si eodem die quo sunt captae, iis vtrius. De insalutis ammoniaci, vel cōmuni, colore albi, & leniter splendentis, modius Iralicus. Cum quo tundatur minutatim, gentianae Creticae lib. j. aristolochia rotunda tantundē. Centaurij tenuis com. lib. ij. cardamomi, Armeniaci praesij, sing. vnc. vj. Scordij mōtani, selini, champhydryos Creticq, sing. lib. j. rutae satius feminis tantundem. Melle Attico haec vinuntur, & felibra ipsorum in ollam sicilem vacuam coniciuntur. Postea quatuor serpentes vivae: mox scilicet tenerae, admodūq recentes, quinq numero, coniciuntur minutim: ita reliqua aliorū pars dimidia adiicit: atq vbi cooperueris ollam, lutūq diligenter obclueris, quatuor foraminibus ipsam perundes, vt per eam vapor coctiois mensurā indcet. Nam primum fumus copiosus, obscurus, turbidūq exspirare videbitur, notās ignem iam in vasile bestias: quē quidem ne inspires ipse, tibi summē ca

Viperas combūstas. Salis Theriaci quib. aetatibus afflictae.

Salis Theriacis praeparanda talia.

uendū est. Postea vbi vapor cessauerit, & tenuē quandam flammā per foramina exhibere coā spexeris, tunc ipsa exquisitē esse cocta censeto: atq ita ollam ab igne tollito, tota eam die ac nocte refrigerans. Deinde exemptos carbonēs, diligēter eos tundito, & cum his quae subdam, incernito. Rutae agrestis feminis, hyssopi Cretici, sing. vnc. ix. agrestis faeniculi feminis, nardi Celtici, stachyos Scythiacq, sing. vnc. vj. petroselinū Macedonicū vnc. iij. amomi vnc. iij. origani heraclicū summitatū vnc. ix. homini feminis torrefactis vnc. iij. thymi Attici summitatū vnc. ix. Malabathri Indici fol. vnc. iij. baccarū iuniperi Laconici carnis lib. ij. coriandri sativi sem. vnc. vj. pipenis albi & nigri, sing. vnc. ij. silphij rad. vnc. x. zingiberis lib. ij. faryry sem. vel rad. pulegij montani, felis Massalioticū rufi, tornili mōtani feminis, menthae, sing. vnc. vj. caes. optime vnc. ij. cinnamomi vnc. j. Rursus omnia cōtrito, cōcernitōq, & reponito in vitreis vasib: neq vtrius ipsi nisi post dies fere denos. Porro ego sales ipsos aliis praeparavi, non viperas, sed earum loco tantundem theriacorū pastillorū,

60 vni cum aliis medicamentis combūstis: qua in dustria ipsos longē praestantissimos feci.

Quae habentur in libello de theriaca ad Pampiliū, et omnia haec quae ad Pisonem inferuntur, insunt longē exaltatiōra. Quae illam ex industria reliquimus.

GALENI PERGAMENI de antidotis, lib. I.

Antidoti quæ
dantur.

Antidotorum
tria differentia.

[Theriace, Mi-
thridaticum ab
vfu capitis:

Antidotos dum
passi venenorum
dantur, libera-
re esse exhibi-
das quoniam si
presumeretur.

Mithridates
cimonium an-
tidotos, primo-
re si veneno ni-
potuit.
Antonius Im-
perator singu-
lis diebus ve-
nator theria-
ce, castor, as-
pis faba.

Antidoti ven-
tosi, papave-
re lachrymam
longi materiam
pessident.

Galerum medi-
ca mentorum con-
questiorum gra-
tia, variis pre-
lustrasse regu-
nes.

Medicamenta
explantando na-
no.

Mel optimum
quale nam esse
debeat.

Vina quæ calor
vires omnia in-
veniantur.



Educamenta quæ non extrinsecus corpori imposita, sed intra ipsum assumpta, affectibus auxiliant, antidotos Medici appellant. Tres autem in vniuersum differentie ipsarum existunt. Nonnulla siquidem letalium medicamentorum gratia offerunt: quædam contra vi-
10 rulentas feras opulant: alij affectibus ex praua victus ratione obortis succurrunt. Sunt quæ trep hosce pollicentur vsus, vt theriace ab Andromacho præparata, quæ Mithridation dictam ab vsu hominum relegauit. Siquid et cum theriace haud exigua viperarum carnè coniueat, hoc nomine ad viperarum morsus præstator quæ Mithridation existit. Ad alia vero Mithridation nihil minus va-
let: imò et etià in quibus præstator se exhibeat. At us eisdem vires obtinet ipse antidoti, & post
20 noxia medicamenta, & ante eadè assumptæ. Nam quæ ipsarum quantitas, cum præsumunt, sufficit vt hominem illarum custodiat, ea quadruplo, aut quincuplo aucta, cum post venenū datur, auxilio est: idq; non semel quotidie, sed bis. Quod si quis etià singulis diebus, quemadmodum nostro seculo Imperator Aurelianus Antoninus, vel vt ipse Mithridates, medicamentum capiat, omnino à delectis venenis erit securus: vt Mithridates fe-
30 runt, cum extrinsecus hausto medicamento, potius mortè oppetere, quæ subici Romano Imperio, ele gisset, nihil peritisse quod perimere ipsum potuerit. Porro Antoninus summò studio singulis die bus ex ipsa theriace, in star fabæ Aegyptiæ, deglu tiebat citra vllum liquorè: à qua postea, cum in quotidianis actionibus premeretur sapore, de- traxit papaueris succū. Rursus autè cum cruci- atur vigilis, coactus fuit ex theriace inuetera- ta, ceterum ex opio confecta, aliquantulum adde-
40 re. Quippe eiusmodi medicamenta, si vetustiora sint, ipsam papaueris lachrymam longè minorè obtinent. Danda autè maximè opera est, vt medi- camenta ex quibus lusuiscemodi antidoti præ- parantur, quæ exploratissima sint: quandoquidem passim solent adulterari. Quæ quidem vt exqui sitissima haberi, ipse inuisi alijs rum Cypri, rum Palæstinæ Syriæ nauigauit in Lemnū. Porro in quo singula medicamenta alijs gustu aut odore præstāt, in illo sanè, id quod validū est, principè inter familia specie, sibi vindicat locū. Sic enim mel dicimus præstantissimū esse, quod dulcissi-
50 mū & acerrimū inter omnia alia fuerit: quodq; colore pallidum, media sit consistentia, defluensq; sensim, suam cōtinuitatem ruatur. Danda autè opera est, vt quod vinū huius medicamentis mis- cetur, validū atq; firmissimū sit, ita vt nō immu- tetur amplius. Etenim imbecillima & aquatissi- ma vina, aut vehementer aucta, maximèq; om- nium viuorū accefcentia (hæc enim sunt alba & te- nuia) vbi præueniant primis auni aclescere, reli-
60 quo tempore permanēt. Hæc autè vt caput mini- mē feriat, si nec corpus manifestè calfaciūt, nec edocetionū in vetriculo & venis quicquid perspicue conferūt, nec alendo corpori subministrāt: quæ vis inter omnia vina celerimè inueterent, hoc est,

promptè in veterascētium qualitatem mutentur: quæ qualitas, acrimonia est cum perspicuo calo- re: postea verò, amaror, in quem acrimonia mu-
tatur. Cæterū vt vina ipsa vel acorem, vel amari- tudinē contrahūt, locus in quo afferuntur reposti- ta cōfert. Qui quidē optimus initio est frigidus: postea vero calidus: aut è contrario, calidus per-
initia. Nam tepidus, facile ipsa in acorem vertit. Nonnulla autem sunt adeo imbecilla & aquosa, vt ne initio quidē frigus volent. Ac raliū custo-
dieudorū gratia, Pater meus sterbe copiosa cali-
dāq; in calidissimā domum coniecit, vasa reple-
ta occultabat: quæ ad industria vsus, nunquam ha-
buit acidum vinum, sed celerimè omnia vetera-
scentia. Quò autem nunquā ab scopō aberraret, vasa infundebat vinū non nouis, sed ex quibus aliquod iam vetus vacuasset: curabatq; vt furni,
fociq; in propinquo ipsi thecæ vinarie esset: qua-
ratione etià in multis habet locis vinum calteri-
intellexi. Verum quæ in hunc modū parantur vi-
na, vt firma durabiliaq; sunt, sic capitis dolorem
conciliant, propter sumi qualitatē quam contra-
xerūt. Itaq; eiusmodi omnia vina in medicamen-
tis cōponendis, quæ intra corpus sumenda sunt,
evitabis. In emplastris verò, & alijs quæ extrin-
secus imponuntur medicamentis, etiā talibus
viti, li meliora desint, nihil prohibet. Ad antido-
tos ergo Falernū vinum, quod nodum præ vetu-
state amaricit, optimū est. Præstat autem ad the-
riacen deligere id quod dulcissimum fuerit, gratia
50 stus granioris: cuius sollicitudo in medicamentis
quæ deglutiantur, habenda est. Iam verò mel om-
ne vetustū, redditur ex coctione amarum: neq;
id mirū est, cum vel citra cocturam, tempore ama-
rius ex dulciori reddatur. Quare quod fuerit in-
veteratū, fugiendum ad antidotos est. In vniuer-
sum autè, Medicum debere esse peritū omnium
stirpium, aut plurimarū, oportet. Siquidem cum
positorū medicaminū virtus, vires simplicium
sequitur, exigua quadam in ipsa cōposuerit ra-
tio-
60 differentia obvenire. Differentie autem
stirpium sunt, arbores, frutices, herbæ, spinæ, vir-
gulta. Porro theriaces cōposino quam de scriptis
carmine Andromachus, habet in hunc modum,

Hinc recitat Galenus carmina Andromachi, ac de-
ceps rationem cōficiende Theriaces explicat: quæ om-
nia consulo reliquimus, quod sint protius eadem quæ
habentur in cōmentario ad Pisonē. Itaq; ta tantū anno-
tabimus impræsentiarū, quorum in illo non meminim.

GALENVS.

Quod pertinet ad viperarū capturas, neq; iux-
ta marina loca, aut aquas saluginosas venan-
das sunt. Quippe antidoti ex huiuscemodi cum
positū viperis, sitim conciliat. A fortis est ab-
stinēdum. Iam verò, dum coquantur, salis iniici
debet, si quidē convenienti tempore viperas ce-
peris, modicū: sin autem æstate, nihil. Panis ad
cōficiendos articos soleo miscere ipse viperis
carnibus quartam aut quintam partem. Qui ni-
si probè sit tostus, verendum est ne pharmacum
ipsum acceat. Satius autem est vt multo citius
siccentur, aridum panem cum ipsis carnibus ac-
curatissimè luvigare, ac si tenues orbiculos sin-

Veterascitum
mutantur: quod
latus est acrimo-
nia cum perspi-
cui calore, in
quem calorem
passus succedit
amaror.

Vina reposti-
ta cōfert.
Tepidus locus
vina in acore
vertit.
Sterben ponde-
re ad alterum
concoctorem
vinorum.

Vina quæ ma-
ximè durabilia
sunt, sic capitis
dolorum con-
ciliant.

Vina antidoti
emplastrisq; ad-
moda, qualia
esse debent.

Mel vetustum
ex coctione a-
marum, id
quod tempore
vel citra coctū
rā præparatur.

Compositum
vitis, vici
simplicium se-
quitur.

Stirpium diffi-
rentia quæ sunt.

Viperæ venas
de ratione.

Artifici Theri-
aces conficiendæ
de ratione.

gere, quoniam si etiam brodium viperarum astringas, Repponit aut debent ubi affucari fuerint, in vase stanneo, vixitque, aut aureo. Ceterum vixit quidem & autem, nullum dolum admittit: itum cum vero adules: ai plumbi mixtura. Tale igitur vixit copietur in vasis aureis odorata: veluti & quod argento nō purgato confectus est. Celerime namque & luce rigor oboritur. Durat vigor ipsorum, orbiculorum, si curiose sunt pellicati, & repositis tribus & quatuor annis. At scellum trochiscis, ex tribus, scilicet optimis totis partibus, & duabus, tenuissimis farinæ erui, similiter cōficiunt.

Post hæc subdidit Galenus descriptionem magnæ Herethroli, quam habes in commentario de Theriacis ad Pisonem.

GALENVS.

Ex medicamentis quæ theriacem cōstituant, longum piper solet adulterari. Ceterum adulteratum quidem, ad usum solutum: quod vero adulterio caret, insolubile permanet. Contrā autem, verum sagapenum statim aqua rigatum soluitur: quod uō tale est, eliquisit minimè. Sciendum autem est, chalbani partem in sagapenum degenerare. Similiter etiam optima calia in cinnamomum transit. Nec secus in optima myrrha opocalpasum reperitur, ab ipsa myrrha diuersum. At opocalpasum est lerale: multique, ob insuetam myrrhæ, quæ opocalpasum continebat, cōcliauit exitum. Nam de industria nonnulli antidotum præparatum, ipsam vt laudatissimam iniecerunt: quod collyrinis inditam, optimū esse medicamentum videntur. Quemadmodū igitur in pueris gemellis inuicē similibus, qui quidem non eis assueverunt, alterum ab altero nequeunt discernere: autem qui vnā vixerunt, facillime est ipsorum dignotio: ita qui inter singula medicamenta est versatus, facile vel minimas eorū differentias cognoscit: quæ latent illos, qui ipsa semel tantū aut bis cōspexerint. Rose autem theriacem eligēde sunt aliis omnibus rubentiores, atq; odoratæ magis. Vnūquodq; siquidem præstantissimū est, quod proprium generis sui odorem valentissimū possidet. Præstant etiam in quolibet genere, nō rugosa, neq; exsilia, sed quæ probe nutritam, solidamq; cōsistentiam sortiuntur. Scordium optimū, ex Creta nobis aduenit: quod quidem cadauera supra ipsum iactata, diutissime tueri à putredine prodit. Opobalsamū adulterat plurimis modis, quos premoneo, ne q; forte doctissima mea abutatur. Quare neq; eos probō, qui scripturam leralium medicamentorum inuulgant. Porro cinnamomū optimū debet odoratissimū esse, gustanti calidū: colore autē tale, vt si que lætis colore fusco admiscuerit, cum cœruleis paucillo. At agaricū (quod sanè adulterium nullū admittit) laudatissimū est, quod leuissimū: vt densum, graue, & lignosum, determino. Crocus optimus est, qui flauissimus, odoratissimūq; exsistens, longo tempore in vigo-

Piper longum adulteratur off. fusa aqua soluitur.
Sagapenum a quo resatū soluitur.
Chalbani partem transiit in sagapenum.
Calia in cinnamomum degenerat.
Opocalpasum est lerale, repertum in Syria etia.

Præstantissimū est medicamentum quod propriū generis sui odorem valentissimū finū possidet.
Scordium calidū nec sa. optima probat.

Leralium medicamentorum de Creta nobis aduenit aduenit aduenit.
Crocus optimus nota.

Carpesio facillima.

gulis cinnamomi perfimiles. Nardus Indica, quæ cadix quidem est (licet ob similitudine fortis quæ cū spicis habet, spica nardi vocetur) non est eadem elora. Vnguentum quippe, coquens prius eam, vt ad alia ipsius decocto vrantur, postea in vtilem vendit. Rheon quoq; ipsum ad ulceratur. Quandoquidē itatim in regionibus vbi gignitur, recens nōnulli capientes ipsum, decoquant, donec totum cremorē reddat: quem postea cremorē, vbi accuratius percoxerint, ceu purum, atq; ab aquæ mixtura alienū, ad nos transmittunt: sic vt & rheon ipsum siccātū, tanq; neq; id prius cocturam fuerit expertū. Cognoscitur tamē facile dolus: nam eiusmodi rheon nec densam, cōpactamve substantiam possidet, vt quod integrū est, sed rarus apparet, aschichouēq; aut obscurū, aut planè nullam gustanti exhibet: quæ tamen rheon vigena validissimam possidet.

Spica nardi raris est, sed ob similitudinem quam cum spica habet, sic ap. p. vocatur.
Rheon adulterandi modus.

Rheon esse voluerit ostendit quæ raris.

Deinceps Galenus modum præparande Theriacis tradit: qui quidem iam expositus est in commentario ad Pisonem. Subiungit etiam compositiones eiusdem antidoti à Democrate, atq; etiam Critone proditas: quas quidem quia descriptionem Andromachi vnicè commendat Galenus, eiq; esse imberandum censet) studiose breuitatē omittitur.

GALENI PERGAMENI de antidotis, lib. II.

Vandoquidem de Theriace toto priore libro tractauimus, in præsentis de ceteris antidotis differamus, ab his quæ Andromachus descripsit, exorsū.

Androsus Mithridatia, ad leralia peculiariter efficacæ, ad omnesq; internos affectus. Dulcis radiculæ drach. vii. s. obolos iiii. opn drach. iiii. obol. n. calicet drach. vi. polij drach. v. obol. n. costi tantūde: spicæ nardi drach. vi. obol. n. casif drac. v. obol. n. thurs drach. vi. sefeleos drach. v. obol. n. hypocistidis succi drac. vi. acori drac. ij. scordij drach. vi. obol. n. solij drach. iiii. salis drach. vi. cyphos drach. vi. obolos ij. myrrhæ drach. vi. croci drac. vii. obol. n. cinnamomi tantundem: styracis drac. v. obol. iiii. dauici feminis drac. vi. obol. iiii. zingiberis drac. vi. obol. n. pluri Pontici drach. n. petroselinii drach. iiii. obol. iiii. nardi Gallicæ, formiculi seminis, nardi Indici, singul. drach. iiii. hyperici, acaciæ, vtriusq; drach. n. gentianæ drach. iiii. anisi drach. iiii. Thlaspi drac. vi. obol. iiii. meu athamantici drach. iiii. rosarum siccarum, cardamomi, singul. drach. iiii. gummi drach. n. nunci odorati rotendi drach. vi. obol. ij. opopanax tantundem: opobalsami drach. vi. obol. iiii. chalbani drach. vii. semi drac. n. obol. n. resinæ teretibundæ drac. vi. obol. n. vini Chæ quod sit satis: mellis Attici costū tantum sat esse videatur. Conficito.

Antidoti Mithridatia de Andros.

Antidotus Aeli Gan, ad leralia & virulenta omnia: quæ, si inspergatur vbi frequentat serpentes, eos fugat. Facit ad omnē colorū fluxū, & reliquarū partium. Discutit omnes molestias animi, febresq; longas & citius repetentes persanatur. Ad hæc, mentes, fortissimè absq; difficultate educit, auxilianurq; plithisicis, auellanz nucus in

Antidotus Aeli Gan fugat serpentes ad omnes pluresq; effectus paratiss.

star epota, cum aque cyathis quaternis. Ad vi-
peros tamen morfus, ex vino exhibetur. Myr-
rhæ drach. xij. croci, nardi, vtriusq; drach. xij. iun-
ci odorati rotundi drach. xij. cinnamomi drach.
ij. amomi drach. iij. chalban drach. ix. refinæ te-
rebinthinæ drach. v. piperis albi drach. x. longi
drach. xxxij. costi drach. viij. thuris drach. xij. la-
chrymæ papaueris tantundē: scordij drach. l. po-
li drach. iij. hypocistidis succi drach. xij. petro-
selini drach. viij. fefelis drach. xij. dauci seminis
drach. xvj. opobalsami drach. xij. opoponacis tan-
tundē: castorei drach. viij. mellis Attici sextar. ij
Conficito.

**Damocratis Antidotus ex sanguini-
bus ad venena.**

Sanguinis asnerini, & marinæ testudinis, &
anaris, & hædini, siccorū omniū, sing. drach. ij.
Myrrhæ stillatiz, specierū nardi, sing. drach. x. cin-
namomi drach. vi. rosæ fol. sic. drach. viij. iun-
ci rotundi, thuris, costi, sing. drach. j. amomi, pi-
peris albi, vtriusq; drach. ij. piperis longi drach.
j. s. croci drach. xij. casiz drach. viij. trifolij ra-
dis drach. v. polij tantundē: opobalsami drach.
iij. petroselin drach. iij. baccarū iuniperi, acori,
rheu pontici, meu, dictāni, phu, ammoniaci rhy-
miamatis, forniciulj, sing. drach. ij. agarici drach. ij. s.
faxanlis rutæ drach. iij. dauci drach. ij. anisi, asari,
ameos, cumini, sing. drach. j. s. sem. napi sylue-
stris drach. iij. scordij Cretensis drach. v. mellis
optimi duplū omnium. Detrita omnia, coctōq;
melle excepta, vasis indito.

Rosæ pastilli confectio ex Damocrate.

Rosæ virentis foliorum lib. iij. iunci rotundi
drach. xx. myrrhæ drach. xij. croci drach. viij. Cō-
tusis rosis atq; per feracem transmissis, addan-
tur reliqua cōminuta: ac postea rursus simul tun-
dantur, rediganturq; in prægrands orbiculos.
Crocomagmatis præparatio.

Croci Cilicij drach. c. myrrhæ pinguis, rosarū
siccorū, amyli, gummi, sing. drach. l. Omnia vino
odorato, marinæ aque experte, excipiantur &
læuigentur, ac deniq; in rothifcos singantur.

Antidotus Præfagiens nomine: qua cibita,
venenū cum cibo sumptum, prorsus reddet vo-
mitu. Lemniz terræ drach. j. obol. ij. baccarum
iuniperi drach. ij. læuigetur exactē cum olei dul-
cis pauxillo. Propinatur ex mulsa, nucis ponti-
cæ magnitudo.

**Asclepiadis, ad eos qui letalia bi-
berunt, remedia.**

Papaueris lachryma epota, cōfert mouere vo-
mitū ex hydrelo calente, vel ex oxycrato cābi-
do, aluūmq; clysmis subducere. Opio epoto, me-
rum copiosius statim bibiti iuuat: aut piper cū
vino. Conducit etiam lac asininū haustum: atq;
clysmi mitiores. Sumpto aconito, iuuat mani-
pulum rutæ, lenigatū vino meraciori, ebibere.

Si altercum nocuit, lac asininū, vel quodvis a-
liud cū mulsa calida opitulat. Si vinde cortan-
drum, auxiliai vinū meracj potū, & pingue ius
gallinarum. Lepore marino assumpto prodest
lac asininū bibere: sin minus, vaccini, aur capril-
lum. Si toxicū potum sit, vinum dulce adiuuat,
oleum rosacē, sanguis caprillus, semēq; napi
continuum ex vitio. Quibus fungi obstant, dari

debet raphani crudi quamplurimi: itē vinū mē-
racj, & cineris farmentarij bauxum: præterea ni-
trum aceto dilutum, aut fax vini cōbuita, tritaj
cum aqua: aut absinthium ex aceto, aut denique
ruta ex aceto trita exhibetur. Si iuxta fuerit iuge
fla, succurrit absinthium potum cum vino, casto-
reo, & ruta. Proderit & oxymeli potare, & vom-
itiones ciere. Buprestis assumptū, passij plurimi
potus, ac dein vomitus opitulatur: necnō lac ca-
lidum bibitum, decoctūmq; sicuum in potu da-
tum. Si canihantes haustz sint, conducit pas-
sum ex oleo bibere, plurimūq; etiā lactis hau-
sire, & plures nucleos pini esse: aur citharidum
alas, pedēq; cum melle detritos lactu assumere.
Ptilothro haustū, prodest calētis olei potio,
& vomitio exciata: necnō lac caprillū, & maluz
coctz succus, si cum oleo hauriatur. Spuma ar-
genti pota, auxiliatur, piper, apū, myrrha, cum
vino læuigata, bibitaj. Gypso infuso, dacti de-
bet potui, cineris farmentarij lixiuū, & thymus
ex aqua tritus. Lacte in grumis coacto, iuuat
aceti potio. Item coagulum ex aqua fontana bi-
bitum. Vel sulfuris, silphij æqualis portio, laui
gara ex posca, bibitaj. Hirudinē deuotatā, aliq;
munnz, aliq; niuiā, aliq; aceti potū expellere tenet.

Asclepiades spongiam tenet etiam frigida imbu-
tam faucibus demittere iubet, vt hircudo spōgie
infixa extrahat. Qui cerussam hauserint, iis con-
fert olei calidi potus, vomitūq;: necnon lactis
asinini haustus. Cū autē ignorat species dele-
teriorū quæ aut comesta, aut bibita sunt, aquam
assatim calidā cum oleo propinare conuenit, ad
vomitūq; incitare. Vile etiam fuerit, & circun-
cidere somnum, subscriptisq; cōfectionibus vii,
Apollonij phararmacum præfati-
uum veniet.

Rutæ folia x. nucis iuglides ij. salis grumus
vnus, caricæ duz. Offerantur simul icino roma-
cho: noxū quippe dī letalibus prohibet. Aliud.
Baccarū iuniperi drach. ij. lemnij sigilli drach. ij.
& obol. ij. trita exceptaj oleo reponito. Porrigi-
tur ex hydromelie instar æquallē nucis. Hac tan-
to Nicomedes rex vtebatur, si quando eorū
qui inuissent ipsū, habebat fidem suspēctā.

Antidotus Mithridatis, Athanasia dicta, ad le-
talia medicamēta, & cuiuslibet virulentū icūm,
Auxiliatur etiā ventriculo, in quo cibus ace-
scit: necnon sanguinē spēntibus, dæturna rufis
infectis, ac breuiter secorariis & liemosis, vesi-
cæq; & vteri affectibus. Piperis albi grana xl.
costi, meu, asari, acori, dauci Cretici seminis, pe-
troselin, nardi Indicæ, lapidis Nestoris, sing.
drach. iij. croci, myrrhæ, sing. drach. viij. cinnā-
momi, casiz, sing. drach. xij. mellis Attici cocti
quod sit satis. Datur nucis æuellanē magnitudi-
nē, ex mulso temperato.

Antidotus Zopyria vocata, ad prædicta om-
nia, ad aliōsq; affectus efficacissimā.
Opobalsami drach. iij. nardi Indicæ, myrrhæ
Trogodyticæ, iunci rotundi floris, cinnamomi,
claracij, costi recentis, piperis longi, hypocisti-
dis, polij, piperis Perzanij, scordij, meu Cretici,
cardamomi, sing. drach. iij. thuris malsci, car-
pobalsami, dictamni, sing. drach. vj. petroselin,
casiz rubenū, singul. drach. viij. croci Corycij

HH ij

Antidotus ex
sanguinibus
Damocrate
fieri.

Rosæ
pastillum
confectio
ex Damo-
crate.

Crocomag-
ma
præparatio.

Antidotus
quæ
Præfagiens
nominatur.

Remedia
ab
Asclepiade
fieri
pro
ad
rem
quæ
letalia
bibere
vult.

Antidotum
Apollonis
a
veneris
non
præferantur.

Athanasia
Mithridatis.

Antidotum
Zopyria.

drach. viij. mellis Amici quod sit satis. Datur nucus auellanę instar, si febris abest, ex vino febribus, ex hydromelite.

Murledatis Theriace, quæ vel ex Mithridatis vtebatur perpetuo, vt se à letali veneno asseret. Cum itaq; à Romanis captus esset, nec bis epoto veneno mori posset, gladio sibiipsum mortem intulit. Confectio ipsius secundum Andromachum habet in hunc modum. Pastillorum scillanorum drach. xlvij. pastillorum theriacorum, piperis nigri, hedychoi magnatis, lachrymæ papaueris u-

Murledatis re-
gi therace,
qua prenu-
ntia, cum polle-
re non possit,
seis gladio per-
cui.

gi, sing. drach. xxiij. rosarum siccarum, iunci ro-
rundi odorati storis, polij, scordij, seminis napi,
indis Illyricę, agarij, cinnamomi, dulcis radica-
læ succi, opobalsami, sing. drach. xq. roris mari-
ni drac. v. iunij, yrtlicę, croci, zingiberis, rheu po-
nici, quinquefolij radicis, nepitæ montanę, mar-
rubij, petroselinij, stur chados, costi, piperis albi,
thuris, sing. drach. j. obol. ij. calicę nigre drac. iij.
piperis nigri drach. j. longi tantundem: meq; asa-
ri, acori, dactylis seminis, aniserini sanguinis siccij,
anatis sanguinis, sing. drach. iij. Excipitur mel
le Attico, & cocto.

Theriaca Aelii admodum efficax.

Theriaca Aelii.

Bryonię radica drac. xvj. trisulph seminis, opo-
panacis, sing. drac. viij. aristolochię tenuis drac.
xij. roris marini radicis, iris Illyricę, zingiberis,
opij, sing. drach. viij. iunij syluestris seminis drac.
xij. cumini Aethiopici drac. xvj. myrrhę, calicę, ca-
storie, scelis, eryngij radicis, serpylli, lachrymæ
Cyrenaicę, sing. drach. vj. Medice drach. xij. sa-
gapeni drach. vj. croci drach. v. erui farinę drac.
xxij. Finguntur pastilli ex aqua triobolares,
daturus cum vino.

Theriaca Euclidis.

Theriaca Euclidis, ad internos dolores, aspi-
dum morsus, pleurindesq; & quartanę febrem,
si post vomitum, instar auellanę nucus sumatur.
Castorei drach. vj. opopanacis, sagapeni, scelis,
cachrysos, cliamædryos, cliamæpyros, marrubi-
ij, sing. drach. xvj. styracis, bituminis Iudæici,
myrrhę, singul. drach. vij. lachrymæ papaueris
drach. viij. mellis lib. j. Confectio.

Alia ad febres omnes repentes per cir-
cuitus, Harpalo autore.

Myrrhę drach. iij. piperis longi vel albi, opij,
sing. drac. ij. castorei obol. iij. scardamomi drac.
iij. sagapeni drach. ij. Tincta cum aqua in pastil-
los coquitur, qui obolos duos pendant. Propri-
entur singuli cum cyathis duobus Adriani vi-
ni, & aque fontanę coctę, quaternis. Si febris
vigeat, cum hydromelite.

Potio Cratippi ad morsus rabidi canis.

Morsus rabidi
canis potio Cra-
tippi.

Cancrorum vitiorum drac. xx. myrrhę drac.
ij. croci drach. j. s. gentianę drach. j. piperis al-
bi grana x. vini quod ad excipiendū sit satis. Da-
tur drachma vna, cum vini cyathis tribus tēperati.

Candidum Ba-
phili.

Album emplatrum Baphili, quod rabido-
rum moribus comodissime extrinsecus admo-
uetur: daturus etiam catapotium ex eo nucis auel-
lanę instar, ad dies xl. Est autem alterius diebus
amouendū à vulnere, ac rursus, vbi elueris sor-
des, imponendū. Cerę ponticę lib. ij. spumę ar-
genti, cerussę, sing. lib. c. ci veteris sextarii: myr-
rhę, medullę ceruinę, vtriusq; drach. ij. thuris
drachma. Argenti spuma oleo coquitur, & cum

mutata fuerit, cerussā inspergitur, ac cera misce-
tur. Vbi tam spissum euaserit, vt manus non infi-
ciat, ab igne subleuo, medullam, myrrham, &
thus iniucio.

Diophranij medicamentū, ad scorpionum
ictus, & phalangiorum morsus.

Aristolochię drach. iij. piperis drach. ij. opij
drach. i. pyretus drach. iij. Finguntur pastilli ta-
bæ Aegyptiæ magnitudine, denturq; duo deglus-
tendi, & vini meraci cyathis duo.

Diophran-
tis me-
dicamentum ad
scorpionum &
phalangiorum
ictus.

Aliud ad periculosos scorpionum &
phalangiorum ictus.

Rutę syluestris seminis, erucę seminis, pyre-
thris, styracis, sulfuris vini, sing. drach. vi. castorei
drach. ij. Excipio testudinis sanguine, ac ternos
obolos ex meraco vino exhibeto.

Aliud ad eadem optimum, conferens
etiam parturientibus vgrę.

Myrrhę, castorei, styracis, singulę drachmę.
Opj drach. ij. chalcaboli drach. iij. Apj seminis a-
cetabulū. Anisi rārūdē. Piperis grana xxx. Fingit-
ur ex vino, daturus drach. vna, ex vini hemina.

Parturienti-
bus vgrę, medica-
mento conueni-
enti.

Epirhema ad phalangiorum ictus, & omnis fer-
pentis: quod etiam in potu auxiliatur. Sulfuria
vini, chalcaboli, vtriusq; denarij iij. Liquoris Liby-
ci, nucū auellanarū purgararū sing. drac. ij. vino
dissoluta, & melle excepta imponitur. Ad vi-
perarum morsus optimum pharmacū ab Apol-
lodoro compositū.

Viperarum
morsibus phar-
macum.

Cumini syluestris seminis
acetabulū, testudinis maris sanguinis drac. iij.
dissoluta, & melle excepta imponitur. Ad vi-
perarum morsus optimum pharmacū ab Apol-
lodoro compositū.

Apollodori
pharmacum.

Cumini syluestris seminis
acetabulū, testudinis maris sanguinis drac. iij.
coagulati linnuli, vel leporini, drach. iij. herdini
sanguinis, drach. iij. Omnia mista, vinorū opti-
mo excepta, reponno: atq; oliuę magnitudinē,
ex vini optimi cyathio dimidio, dum visus posita
labit, porrigito. Herz antidotus, qua Marcus
Cathegetes est vñs. Trisulph bituminosū seminis,
aristolochię rorūdē, rutę syluestris, erui in-
solati, sing. drach. vi. Vino excipitur, suntq; pa-
stilli drach. iij. daturus vnus ex vino & oleo.

Alia ad leralia, icemorosos, inflationes ven-
tris, & inipientes aque subter cutē suffusiones
efficacissima. Myrrhę drach. v. nardi Syriacę
drach. v. s. iunci rotundi grana drach. ij. s. casie
drac. iij. cinnamomi drac. iij. piperis albi sesqui-
drach. thuris drachma & obolus: costi drachma.
Excipiuntur Attico melle, fingunturq; nucis a-
uellanę instar, ac dantur ex mulso vel aqua.

FINIS.

Complura alia ad eosdem effectus, ex diuersis au-
toribus congesti Galenus remedia. Nos vñ ex omni-
bus ea in tuam gratiam, Cādidē Lector, elegimus, quę
& pręclarissima videbantur, & facillius parari pos-
sunt. Habet igitur omnes commentarios Galeni, in com-
pendiū enchiridionis, redactos, excepto fortē vno vel
altero, quibus nihil succi exprimi potuit. Nā quod
pertinet ad commentaria in Hippocratem, quicquid in
eis cōtinetur cremorū (nisi sua alia decreta consilij, in
stir indicis atq; alphabeti digesti, breui in lucem ede-
mur. Tuum igitur est illis bene precari, qui in hoc sunt
posi, vt tuos comodis seruiant, rectiq;
tuis studiis consulant.

AD ORNATISSIMUM VIRVM, D. D. GASPAREM DE LA-
 MOZ, CANONICVM SECOBIENSEM, SCRIPTORVM APOSTOLICVM,
 ac bonarum literarum cultorem maximum, ANDREAE LACVNAE Secobensis, Militis
 S. Petri, de ponderibus & mensuris medicinalibus commentarius.



Etus prouerbum, & quamuis simū est, mi Gaspar, Vir ornatissime, optimū esse, mensurā in rebus omnibus: cum nimirum omnia quae in Vita & sunt & geruntur, ab ea suā absolutionem, suam lucē, suūq; ornamentū sortiantur: nihil, iustum, rectū, aut inculpabile sit, quod mensurae quae sola Virtus inest omnib. rebus desitua-
 tur. Quamobrem si ex quisi te expendamus singula, quae celestia illa machina ambiun-
 tur, quaeq; supra caelos consistunt, omnia certe inueniemus exactā quandam mensurā, cōmodera-
 tionemq; a suo conditore accepisse, quam perpetuō tuentur, dum natura leges non transgrediuntur.

Quippe uniformes illae orbium caelestium lationes, perennes astrorū cursus, ordinatae vicissitudines tē-
 porū, conspirationes elementorū, generationes deniq; omniū quae supra terram & subter illā sunt,
 non aliunde quā a symmetria quadā, quae in accurata partium mensura consistit, proficiuntur.
 Iam Verō, quod sanius quidē corporum, aliud sit nihil, quā debita & absoluta mensura eorum ex
 quibus constant: morbus autē, ab hac symmetria recessus quidā & lapsus, quis ambigit? Nemini e-
 tiam est dubium, decreta & leges Reip. mensuras quasdam existere, quae singulis suum ius dispen-
 sant. Vt autem ipsius mensurae summam efficaciam & vim, exemplo familiarissimo exponam, poemata
 optimis documentis & sententiis exculti a: si metro claudicent, hoc est, mensura non consent, confe-
 sum stomachum movent, nauisq; & fastidium oriunt. Contrā Verō, quae symmetria existunt,
 etiamsi pudicitia offendant, morisq; inuentus corruptat, magnificē ab omnibus celebrantur: tan-
 tum auctoritatis vendicare sibi videtur emmetron. Ceterū cum in aliis omnibus humanis actioni-
 bus, si rectē perfici debeat, mensura quēdam exquisita desideretur, tum Vel maxime in arte Medica
 ea ipsa requiritur: Vt in qua, vel minima a pōdere ac mensura aberratio solet semper acrius pernicio-
 siora & piacularia existere. Nam cum generatio nostra, incolunt a:q; miscella quatuor elementorū
 debeatur, certa quadā mensura confluentia & conspirantia in unā candemq; temperē: sanē si quā
 do rhythmus huius solatur, necessum est ad recuperandum habitum pristinum, reducamur eo, iuxta
 etiam, exploratissimāq; mensura eius, quod lapsum corrigere possit, administrata. Quae neglecta si
 quispiam admodum praesidia corpori, morbi seminarium ardebit, aut affectum alium maligniorem
 inducet: ita Vt non minus cauendum a tali medico sit, quā a morbo ipso. Cum igitur inter alia Ga-
 leni opera, redegerissem nuper in succinē tam periochen cōmentarios illos de cōpositione medicamen-
 torum natura & natura totius, ditissimos naturae humanae thesauros: persuasumq; habere, neu-
 quā ex eorum lectione percepturos aliquid frugis, qui in ratione ponderū & mensurarū nō essent ad-
 amussim exercitati: sed potius occasione capturos, quae sibi ignominia notam, acrius conciliare in sum-
 mam intermicionem: precum opera me facturū existimaui, si quae veteribus, ac praecipue Galeno,
 circa pondera & mensuras medicinales conscripta sunt, agerans, ea omnia paucis exposita, sub pra-
 fatione nominis tui, in publicam studiosorū cōmoditatem ederem: Vt vel ex hoc argumento, amicitia
 nostra, & nunquam peritura necessitudo, omnibus innotesceret: tibi autem, si quis hunc fructus
 ab aliquo hauriendus esset, prorsus acceptus ferretur. Nec Verō colleclanea haec de mensuris cuiquā
 aptius quā tibi nuncupari potuissent, quae tibi ceteras ingenuissimas tui animi dotes impraesentiarū
 subiceam: diu uolūq; astronomicū studiū indulgens, in eisq; felices tuas horas haud oscitāter col-
 locans, non modō plagas has inferiores, sed caelos etiam ipsos metiris, mentisq; supra illos eueheris: cō-
 trā quā facientes pleriq; alij, qui ubi semel quae pertinent ad curam curandā sunt nacti, adeo inge-
 nuarū artium, bonorūq; omniū institutorū infelices obliuiscuntur, Vt ne inesse quidem sibi animā
 recordentur: ac proinde obruti, demersiq; cerno suarū cupiditatū, corporisq; mole depressi, eam quo-
 cūq; tandem intruat, sequantur: tantum abest Vt exemplo tui) caelum inquam suspēderent, aut in
 meditatione rerū pulcherrimarū asinus suas cogitationes exerceant. Hi tamen mancipia Umbilici
 sunt: a quorum ingenio tam abes ipse, quā mi longissime. Quippe ita Virtus fortunae bonis, quae tuo
 Marte acquisita, tibi quam largissimē suppetunt, Vt eorū quidē quae ex usu sunt, nihil desit corpuscu-
 lo, amicisq; omnia communia fiant: animus autē ipse minimē ab eis praepedatur, sed ad aliora aspi-
 rans, excolatur atq; locupletur aliis ornamentis & opibus, quae tanto illis splendidiore & aurostio-
 res sunt, quantō mens nostra corpori dignitate antecellit. Quo sanē tam admirabili amore sapientia

accensus, nisi fluctibus negotiorum nunquam non obruatur, quæ maxima cum dexteritate administras: semper tamen philosophiæ studium incumbis, in cuius tam feliciter promones, ut diuinum illud ingenium tuum septenumero admirari compeller. Ne autem huic nostro commentariolo contingeret, quod patria Trivulsi, nostrum communi Secobia accidit, cuius quidē sub vrbis sunt ciuitate ipsa ampliora, non ægum hic tecum pluribus, cum tempustuum iam sit, ut promissu satisfaciamus.

1289



Orum quæ metiri homines solent, quedam solida, corpulenta, grauiora, & sibi continua sunt, vt lapis, cera, lignum, & ferrum: quedā solida quidem & sicca, sed dissoluta & minutula, qualia accumulare cōsueuimus, vt hordeū, oryza, & triticum: quedam denum in liquidis fluidisq; consistunt, e quorū numero est oleum, vinum, & mel. Quæ igitur sub prima differentia comprehenduntur, grauitate diiudicantur: cui negotio statera est inuenta. Quæ verō humidam consistentiam possident, vasculi cavitare expendantur. At ea quæ cum sint arida, aggerari in cumulum possunt, medio genere ambigūt: modō quippe ipsa librare, modō vasculis mensurare cōsueuimus: quemadmodū liquores fluentes. Quāq; hi quoq; septenumero reuocant ad stateram. Liquidis quippe omnia quæ corpori administrant, vniuersi ferē iam ponderat, si Hispanos pharmacopolas excipias. Hi namq; nō pondere, quædammodū in Italia, Gallia, Germania, & Anglia mos est, sed vasculi cavitare liquida medicamenta metiuntur: id qd equidē probare vilo modo non possum. Nam cum ex liquoribus, hi quidcm grauiores sint, illi autē leniores, atq; tenuius partium: certē necessum est, dum eos omnes ex æquo pari vasculi cavitare dispensant, grauisimē interdum hallucinentur, capitaliq; errore labant. Nemini siquidē in ambiguo est, quæ crassiorum sunt partium, ea contracta & exigua mole plurimū continere substantia: vt paucillum sub tumore laxiori, quæ rarij consentiū sortiantur. Etenim si accipias vnam heminam olei, vini alij, ac tertiam denarij mellis: cōperies planē oleum quidē ipsum, vncias ix. pendere, vinum autem x. mel tredecim cum dimidia: ita vt hoc ad vinū sit sesquiplum. Quod verō aiunt, se nō vna eadēq; mensura, oleū, mel, atq; vinū metiri, sed eorum liquorū singulis halere suā destinari: id illos non reddi ad culpa immunes. Nam cum in generibus singulis non paruum discrimen sit pes grauitatē & leuitatem (omphacinū enim oleum, exempli gratia, quod oliuæ immaturæ fuderunt, hyocyami nūmve, tenuitate partū & leuitate, multis numeris ab irino relinquitur) contingit sanē, vt dum cuiusq; indiuidui vnciā vnā sese administrare arbitrant, alterius quidē plus, alterius autem longē minus exhibet, ac sic artis præcepta evertant. Deberent itaq; aut liquoribus vniuersos librare, aut singulis eorum speciebus, mensurā peculiare præscribere: quam quidem inuestigare, esset nimis operosi negotij.

Porro mensura olei erat Galeni tēpore apud Romanos cornu, pellucidūq; & lineis quibusdam ornatum: quibus vnciæ discernentur, incisi. Sunt autē innūmera pondera ac mensurarum genera, secundū varietates regionū ac

morū. Quamobrē ea describere impresentiarum duntaxat, quæ vrbis Romæ, antiquissimæ totius orbis metropoli, semper fuerunt familiarissima: cum præsertim Galenus vniuersas ferē pharmacorū compositiones, ad mensuras Romanorū, ponderaq; reduxit: cum quibus, vbi exposita fuerint, facillimum cuiq; erit, quæ apud alias ciuitates in vſu habentur, conferre.

De ponderibus.

Nomina ponderū medicinaliū, in quæ medicamentis incidunt, sunt, minā, libra, vncia, drachma, scriptulus, obolus, siliqua, & granū. Romana igitur minā continet libras xx. Nam Aegyptia, & Attica, xvj. tantum constant. Libram autem xij. vnciæ constituunt, quarū singulæ ex drachmis octo cōstantur. Porro drachmā Galenus idē esse vult cum Romano denario: quāvis contendat aliqui, eam esse partem septimā vnciæ. Constat autem drachma scriptulis tribus, quæ à Græcis *γρᾶμμα*, scrupuli à cotericiis, corrupta voce, appellant. Quorū quisq; duos obolos continet: vt horum singuli, siliquas tres, quæ & ceratū dicunt. At verō vnaquæq; siliqua, grana quaternā pendet. Reperiuntur etiam creberrimē inter nomenclaturas pondērum, sub a Græca & Aegyptia: ac præterea nux iuglans, & Pontica. E quibus Græca quidē faba, duos obolos pendit: Aegyptia autem, drach. j. a. At iuglans nux, siliquas lxxij. vt Pontica xviij. Quæ omnia ordine resolutorio explicata, faciliē ex hac tabella discernes.

Minā Aegyptia	vnc. xvj.
Minā Romana	vnc. xx.
Libra Romana	vnc. xij.
Vncia	drach. viij.
Drachma, siue denarius, siue oīca, script. iij.	obolus ij.
Scriptulus, siue scrupulus	siliquas iij.
Obolus	grana iij.
Siliqua	obol. ij.
Faba Græca	drach. i. s.
Faba Aegyptia	siliquas lxxij.
Nux iuglans	siliquas xvij.
Nux Pontica	siliquas xvij.

Si igitur vbiq; locorū & gentiū, libra, vncia, & drachmæ, essent inter se ex æquo, liceret profectō nobis, in xra Galeni dogmata, in quavis orbis plaga & regione, medicamenta citra discrimen præscribere. Cum autem euariē passim ea pondera, certē nisi quis omnia illa ad tabellam præscriptā reuocet, singulāq; adamsūm expendat, priusquā alicui pharmacū catharticū porrigat, fieri vilo modo nō potest, quin ab scopo ab erret, videlicet aut plus q̄ sit ex vſu, propinans, aut minus quā morbus postulet. Equidē experientia didici, Hispanici vnciā Romana esse obolis duobus maiore. Parisiensem, ferē integrā drachma. Coloniensē, Bruxellensē, atq; Antuerpiensē vnciā, sunt similes: quarū singulæ Romanam tribus

tribus obolis superat. Ab hac vncia Veneta (qual experiundi grata, nuper in officina quadam libraui) propemodum sequisidrachma relinquit. Si quidem Veneta libra medicinalis, Romanæ libræ vncias x. cum dimidia, plus minus, pendet. Pro ratione itaq; harū differentiari possem ipse iam in singulis horū locorū, numerū drachmarū intrepide & angere, & detrahare. Id quod mihi nō perinde liceret absq; summa ægrotantiū clade, si proportionem ponderum quam habent inter se mutuo, accurate prius nō explorassem. Quam cūm haberem perspectam, cuidam adolescenti, quem in ædibus illustrisimū D. D. Jo. Ænt. à Mendoza, Cæsari apud Venetos, Oratoris splendidiſſi, suscepī curandū, vnciam vnam soluentis pharmaci exhibui: cuius in vrbe Roma propina re drach. vii. ausus non fuisset.

De notis ponderum quibus Medici in officinis videntur.

Vt autem Græcorū caractères, quibus pondera exprimunt, impræfentiarū præteream, ceu nihil ad nos pertinēs: Medici recentiores pro vncia, hanc notam ꝑ vsurpant: quemadmodum hanc, ꝑ pro drachma: similiterq; illam ꝑ pro scriptulo: sub dentes postea numerū quem expedire arbitrantur. Vt si ori ventriculi confirmando huiuscemodi vnguen instituerimus: ꝑ. olei absinthij, & cydoniorū, ana. ꝑ. ii. nardini vnc. a. ceræ elotæ drach. v. pul. corallij, & menthæ, ana ꝑ. i. perinde sonant ac si scribamus: Olei absinthij & cydoniorū, sing. vnc. ij. Nardini vnciam dimidiam: ceræ elotæ drach. v. pulueris corallij & menthæ, singulorum scriptulum vnum, &c. Quippe vox, ana, quæ aliquando etiam in Galeni cōmentariis occurrit, cuiusq; partes æquas significat. Præteret autem medicamentā ipsa, quæ in se humani generis vitam, necesse est gerunt, minime quidem notis aut numeris, sed literis extensis exprimere. Quandoquidē iota vnum sub latum aut additum, imō verō etiam apiculus v. nus, sꝑe ægros ipsos in exitū atq; internecionē adegit. Porro vt flores solēt dispensari pugillis, sic manipulis herbæ. Cōmuniter autem volunt esse pugillū, quantum tribus digitis apprehendi possit: manipulum verō, quantū tota manu. Ac pugillum quidem hac notā, P. manipulū autem hac M. nostri Medici exprimunt.

Græcæ liquidorum mensuræ (quæ maximè sunt in vsu etiam apud Latinos Medicos) partim ex Galeno, partim ex cōmentariis Iacobi Sylui, Medici hac nostra ætate clarissimi, excerptæ.

Cadus, siue Ceraunium, capit choas, hoc est, Romanos cōgijs xij. vel libras mēsurales cviij.

Choa siue Cōgijs, sextarius sex capit, seu Atticæ corylas xij. seu libras ix.

Sextarius corylas ij. seu libram vnam & dimidiam, seu cyathos xij. continet.

Coryla, quam nonnulli heminam appellant, quartarius ij. seu vncias mensurales ix.

Semicoryla recipit acetabula duo, vel vncias iij. cum dimidia, existens quarta sextarii pars.

Acetabulū (Græcè ἡ ἀμφοῖς vocant) sequisicyathum, seu vncias ij. & drach. ij. pendet.

Cyathus conchas ij. seu myrtia iij. seu chemas v. seu cochlearia x. seu seiscunciam.

Concha myrtia ij. seu chemas ij. cum dimidia, seu drachmas sex.

Myrtū chemen vnam, & quartam eius partem, seu cochlearia ij. cum dimidio, seu drachm. ij.

Cheme cochlearia ij. seu drach. ij. script. ꝑ. & grana iij. & quatuor quintas grani.

Cochlearium drach. ij. scriptulum dimidium, grana ij. & duas quintas grani.

Porro vinum nona parte pondus olei excedit. Mellis autem ad vinum proportio est sequisipha: hoc est, tertia parte mel ipso vino est grauius, vt liquet ex tabella subdita.

Ceraunū L. talicū habet	Oz. xi lib. x.	Vini lib. c.	Mellis lib. cl.
Congius	lib. vii. & semissim	lib. viij. vnc. iij.	lib. xij. & semissim.
Sextarius	vnc. xv. vnc. xvi. drach. v. script. i.	vnc. xvi. drach. v. script. i.	lib. ij. vn- ciam viij.
Coryla	vnc. vii. drac. iij.	vnc. viij. drach. ij. script. ij.	lib. j. drach. iij.
Oxybaphū	seiscuncij drach. iij.	vnc. ij. scrip. ij.	vnc. iij. drach. j.
Cyathus	drach. x.	vnciam j. drach. iij. filiquas iij.	vnc. ij. scrip. ij.

Mensuræ aridorum quibus Medici maximè vtuntur.

Medimnus capit choenicas xlvij.

Chœnix corylas iij. vel sequisextarius, seu libras ij. & quadrantem vnum, & vnc. iij.

Sextarius corylas ij. seu vnc. xij.

Coryle oxybapha iij. seu vnc. ix.

Oxybaphum, sequisicyathum, seu vnc. ij. & drach. ij.

Cyathus cochlearia x. seu seiscunciam.

Cochleariū drach. l. script. s. grana ij. & duas quintas grani.

Crebrō autem vsurpat Galenus hanc vocem Bessim, quæ quotiescunque occurrerit, pro vno eius octo accipiat.

Hec sunt itaq; Vir Ornatiſſime, quæ sub tuo nomine volui vt omnibus fierent communia studiis: quæ pro tua feceris dignitate, si ea cōtra vtilitatorum morsus defenderis. Vale feliciter, plurimumq; saluta meo nomine communes vtriq; nostrum amicos, atque integerrimos viros, D. Berrocaleni, Scriptorem Apostolicum: necnon D. Falconem à Guenara, luris prouidentie licentiatum absoluitissimum.

Venetūs, III. Idus Aprilis, M. D. XLVIII.

HH v

CLARISSIMO ET SAPIENTISSIMO VIRO, D. D.

IOANNI AQUILARIO, MEDICO PONTIFICIO, BONARVM

litterarum fautori maximo, ANDREAS LACINA Scobienfis,

Doctor Medicus, Miles S. Petri

S. P. D.



Vid accidere vniuersis parturientibus solet, ut dum in labore quidem versantur, se iurent amplius non partururas: postea vero extra discrimen posita, rursus et concipiant, et pariant: id nunc mihi plane contigisse videtur, Vir clariss. Nam cum haud ita pridem Epitomen omnium Galeni operum, vere laboriosissimum partum, exarandam in publicam studioforum commoditatem curare: ac partim quidem immensis laboribus fractus, partim prae difficultatibus ac molestias summas pertusus, constituissem, ac propemodum apud me deierassem, non futuram mihi amplius rem cum typographis: posteaquam factus iam edius es in lucem, violare iusiurandum compellor, Galenique Pergameni vitam toti Operi, ceu colophonem quendam, apponere. Reuocauit siquidem me ab instituto, cum illius Viri dignitas, amplitudoque, tum mea in eum obseruantia, adeoque ipsius utilitas operis. Sciebam quippe Galenum, in qui vitam illius, mores, atque instituta praelegerent, incredibilem quendam amorem sui excitaturum, ut multo ardentius, maioriq. cum voluptate, in Epitome sese nostra exercerens. Quocirca illum quidem ad viuam formam exprimere, expressumque, una cum operibus suis edere statui. Ceterum quia verendum erat, ne Galenus noster, hospes et peregrinus cum sit, si in quempiam nebulonem incideret, contumelia aliqua afficeretur, (sunt enim exteri maxime iniurii obnoxij) haud perperam me facturum existimaui, si ductorem illi et protectorem aliquem iungerem, qui eum contra insulsum Arabum, ac Barbarorum insidias, tueretur. Cui muneri subeundo, dum quoque uersus dispicerem, neminem te aptiorem inueni, Vir ornatissime, qui adeo illius semper fuisti studiosus, ut vel me ipsum etiam impuleris, ad condendam illam omnium operum eius periochen: quam prouiciam, nisi victus instigatione tua (id quod ingenuè fateor) neuitiquam suscepissem. Nam cum de nobilitate sis aequè sollicitus, ac de salute publica (quae tua summa bonitas, atque animi integritas est) semper aliquid meditaris, quod in communem omnium usum redideret. Quo nomine vniuersi tibi debemus plurimum. Taceo singulares tuas istas animi dotes, prudentiam, temperantiam, lenitatem morum, constantiam, multumque omnium disciplinarum peritiam, quae nos adducunt, ut non minori admiratione, quam amore, te prosequamur. Merito igitur ob haec tam insignes virtutes, quibus conspicuus eras, reuerendiss. et illustriss. in Christo Pater D. D. Ioannes à Toletò, Cardinalis Burgenfis (iudicio cuius exquisitissimo non solent placere nisi optima) ex Salmanticensi Academia, in qua olim cum maxima laude et gloria profectus artis Medicam, simul et Astronomiam, te alleltum, nec vulgari conditione honestatum, una secum abduxit Roman. Quae in urbe, quanta cum dexteritate studio et pietate, artem Medicam exercereres, abundè exploratum habens Paulus III. P. M. Vtrò accersuisti te, ascriptisq. inter primarios Medicos suos, summissis, tandem vita ornamenti auxit, atque locupletauit. Qui quidem non secum tua dicta amplexatur, acquiescitq. consilium tuum, ac si illa ab Apolline acceperit. Vi igitur eò inde digressa est, nostra reuocetur oratio, En mittimus tibi ceu strenulam quendam, Galeni Pergameni vitam, per quem ipse tantum honoris et dignitatis es consequutus. Quam quidem ubi diligenter perlegeris, non modo non poenitebit te propensionis, quae in illum hactenus indulgentissimus fuisti, sed etiam multo ardentius posthac amore illum inflammaberis. Vale Vir ornatiss. peregrinè, ut cepisti, de ingenuis artibus ac disciplinis mereri optime. Venetiis, quarto nonas Aprilis,

M. D. XLVIII.

GALENI PERGAMENI VITA, CVM EX
IPSO GALENO, TVM EX HIERONYMO GEMVSAEO;
aliisque variis autoribus, per ANDREAM LACVNAM
Medicum, militem S. Petri, summo studio collecta.



ON possum non excēdēscere in viros quosdam novarum opinionum autores, qui Galenum, Pergamenum fuisse insciantur. Cuius rei non modo apud varios hyloricos, sed etiam apud ipsum Galenum, innumera testimonia extant. Nam de coplura aliis omitam, certē libro primo de Compositione medicamentorum secundū generā, apertissimē patriam suā Pergamum esse testatur, hunc in modū pronūcians: Hoc medicamentū nō ex eorum numero est, quae à me primū cōposita sunt: sed iam annis multo ante, à rege nostro, Pergamenis sibus imperante, Attalo, virō omnigenorum medicaminū studioso, etc. Similiter libro secundo de Pharmacorū cōpositione secundum partes, sic ait: Nam ex frigidiorum fontium et huius, multa Romae est vbertas, quemadmodū apud nos in Pergamo. Eodem libro sic rursus subdit: Atq; ad hanc rem nostrū Pergamenum atramentum scriptorium praecellit, etc. Fuit autē Pergamum Asia ciuitas nobilissima, ingeniorūq; optimorū alitrix: quae diu quidem sub regib; Attalicae familiae flore scens, postea Romanorum legib; paruit. Quare Galenus merito ab illa oriundus gloriatur, cōtra quā faciunt Normani, qui declinaturi ignominiae notā, passim nomen patriae cōmiserant. Porro patrem habuit diuitem, Niconem nomine, geometram ex architectum ingenem, studiūq; philosophicū deditum: qui ob modestiam suam ex aequitate, probus omnibus erat semper admirationi. Mater eius fuit pudicissima, admodūq; circa augendam rem familiarem sollicita: adeo tamē in auctoritate exuperata, ut vel ex leui occasione, mordicus ancillas impeteret: nec minus cōmēlosos cū Niconē viro suo contenderet, quā Xanthippe, nequissima quidem illa, cū Socrate: quemadmodum ipsemet Galenus testatur libro de Cognoscendis curandisq; animi affectibus. Fuit autem Galenus usq; ad annū decimumquintū, arithmeticis, grammaticis, logicisq; disciplinis sub Nicone patre instructus: et quas quidem capeffendas, adeo erat natura promptus, ut vel ex primis illis au spiciis, de se maximam exhiberet expectationem. Dein verō ad philosophiam, seu ieniora q; promotus mathematica, audire philosophos optimos quosq; cepit, qui haberent ut Pergami: quorum omnium doctrinam ex mores, ut recte cōsulereit filio, explorabat pater, assidue ad illos sua cum eo veniens. At verō vitiā annū decimumseptimū attigit, euidenti patri in somnio admonitus, studiū Medicinae se dedidit, eiūq; adeo strenuam nauauit operam, ut pauculis quide annis, facile cōmilitones omnes, postea verō etiam praecēptores suos superauerit. Quem seruorem augebat summa liberalitas patris, largire illi omnia suppeditans, quae ad studia eius videbantur ex usu fore. Saepē siquidem ob inopiam ex egestate optima quaeq; in rerum elanguescunt, ex collabuntur. Nam, ut recte ille monuit Poeta,

Haud facile emeryunt, quorum virtutibus obstat

Res angusta domi, etc.

Praecēptores habuit in philosophia ex medicis musus, primū quidem, Satyrum: dein Pelopem, apud Smyrnam. Post quos Nemesianū Corneliū sedulam operam dedisse. Caterum quāuis eorum omnium amantissimus esset, eosq; ceu parentes quosdam summa reuerentia obseruaret, noluit tamen eorum cuiquam addictior esse, quā veritati ipsius studiosior. Quocirca nec seclē vllae adduxit: ex ob id saepe hominū rusticorū iudicium in plurimū esse se iudicandū monuit, quod incorruptum esset, ac liberum, vtpote ab heresi nulla occupatum. Postquam verō in Graecia neminem iam haberet, ex quo discere quicquā posset: maximeq; expedire Medico existimaret, variis orbis oris ac regionibus lustrare, omnimodisq; hominum temperaturas, ac vires medicamentorū cognoscere, incredulū tandem incēssu illum peregrinandi cupiditas. Quare primū quidem ad Alexandriam se contulit. Quā in, ut be cum aliquandiu haesisset, totāq; Aegyptum illi aduocentem lustrasset, ad Palastrā Syriae, exortandū opobalsami eratā, contendit. Nauis autē etiam in Lemnū insulam, necnon in Cyprum, ut ex illa quidem, sphaerā eadem terram: ex hac autē, cadamiā pompholygem, diaphrygem, alicā, metallicā innumera, in Iūm Pergamēnsium aduiceret. A quibus peragratiōnibus iam annos octo ex viginti natus, in patriam rediens, omnia medicamēta quae attulerat, amicis est impertitum, ut de illis periculum facerent. Postea verō ex omni natione curabat sibi asportari pharmaca exquisitissima, habens suspecta ea omnia, quae ab insuloribus venderentur. Cognita igitur summa pericia illius,

atque in curandis ægru rara quadam dexteritate, pontifex Pergamenus provinciam gladiatores curandi soli ipsi credidit, quum vix annuum vigesimum nonum attingeret: quod sane munus antea tantum delegabatur, qui ætate, ac longo rerum usu prouecti essent. Ceterum non diu illic commoratus, quod sedulio quadam esset inter Pergamenses oborta, Romam profectus est: ubi ob incomparabilem doctrinam suam & probitatem fuit statim notus & familiaris totius ciuitatis primoribus. In primis siquidem Eudemum Peripateticum, magni nominis virum, laboratē quartana triplici, ob pessimè administratam theriacem ab alijs Medicis, iamq; i grauescentem ætate, ac media hyeme, restituit, tempestiuo usu eiusdem antidoti adhibito: prædixitq; omnia quæ euentura essent: id quod nomen illius, exsultationemq; per totam urbem plurimum auxit, sic tamen ut inuidia pars etiā gradu cresceret. Postea ad Iulij uxorem vocatus, quæ absque manifesta occasione consumebarur, ex pulsu eam non modo amare, sed quem deperiret etiam, miro quodam artificio deprehendit. Simili etiam industria diuitis cuiusdam seruum, non ex morbo, sed metu, quod eorum quæ administrare rat, pro dignitate reddere rationem non poterat, contabescere agnouit. Restituit etiam Boethi uxorem, diutino fluore muliebri, & quem alij Medici non potuerant colibere, laborantem. Ob quam quidem sollicitudinem, aureos quadringentos, equipollentes mille coronatu solaribus, Boethus ad illum misit, ipsiusq; per totam urbem summus laudibus extulit.

At vero annum iam tricesimum septimum agens, ubi audiuit patrie seditionem sedatam, partim quidem ut suos necessarios inuideret, partim ut Romanorum Medicorum declinaret odia & insidias, simulans se proficisci in Campaniam (ne forte ab amicis detineretur) reuersus Pergamum est. Sed non multo interfecto tempore, a Marco Aurelio & Lucio, Romanis Imperatoribus, reuocatus, eo nomine ut sequeretur expeditionem, quam insisterant aduersus Germanos, Romam inuitus rediit. Quò dum peruenit, multum tandem precibus impetravit a Marco Aurelio Antonino (qui equus, pius, facili, & clementissimus erat) ut liceret sibi manere Roma, expectantē, illic reditum ipsius Antonini a bello: intelligens nimirum quātopere abhorrerent Musa ab strepitu armorum. Memor autem prauitatis Medicorum atque philosophorum Romæ degentium, quando Marcus Aurelius absuit, apud Commodum, filium illius primogenitum, sese continuit, qui extra urbem educabatur sub Pitholao: cui etiam fuerat ab Imperatore iniunctum, ut si quando puer egrotaret, Galenum accerferet, quò illi ferret manus auxiliatrices. Eo igitur tempore plurimum ocij nactus, varios commentarios conscripsit, ad philosophiam Medicinamq; spectantes. Quum autem interim febre corripereetur Commodus, ex pulsu agnouit faucium inflammationem causam illius extitisse: ac proinde congrui remedium usus, a phlegmone & febre confectum eum liberauit. Qua ex re Faustina matrimonio Imperatori coniuncta, cepit Galenum ipsum laudibus usque ad sidera euehere, alijsque omnibus antepone: quæ tamen commendatio, apud præcipuos Medicos illum magis exolum reddidit. Sexto etiam, alteri ipsius Imperatoris filio, quàm similiter in febriculam incidisset, prædixit crism, ac tum horam, tum solutionis modum, tum recidiuam.

Postea autem, quum reuersus ex bello Marcus Aurelius, crederet se aliquando febrire, nec minus Medici qui peregrinationis suæ comites fuerant, initium febrius accessions illi adesse putarent: ascitus Galenus, iussusq; arteriam contingere, dixit se nihil tale percipere, sed potius a cibo assumpto eius Ventriculū opprimi. Quam agnitionem quanti fecerit Imperator, significauit ter repetens, Ita est ut dicas, Profecto id ipsum, ut dixisti rei habet. Ventriculū igitur fovens nardina, bibensque Sabinum vinum cum pipere, quemadmodum Galenus suaserat, minimo negotio fuit restitutus, Galenumque postea magnopere commendare non desistebat, eum Medicum præstantissimum esse, ac tum virum ingenuum, tum summum philosophum prædicans. Nec vero argumentum vulgare Galenianæ doctrinæ, atque morum integritatis est, quòd a Marco Imperatore, omnium qui illum præcesserant, iustissimo simul & sapientissimo, quique ob singularem sapientiam suam est nomen Philosophi indeptus, celebratus encomijs fuerat, ascitusque in suorum Medicorum clientelam. Taceo eundem ipsum Imperatorem, quum singulis dabus iteretur theriace, quam summa fide preparabat illi Demetrius, primarius Medicus, postea Vita Demetrio sancto, soli credidisse Galeno antidoti ipsius compositionem. Antonino è viuis sublato, successit ei filius Commodus, certè incommodus Romanorum reipub. Nipote iuuenis omnipotens libidine, omniq; flagitiorum genere obfessus atque contaminatus. Quo quidem imperante cessauit

cessant compositis atque usui theriacis, ut aliorum omnium optimorum institutorum donec perfecta Imperator Severus institit Galeno (quem diligebat vnicè) ut antidotum rursus ipsam in communem omnium usum conficeret. Quod autem ad Galeni salubritatem pertinet, usq; ad annum quidem viceimum octauum sapius correptus est morbus: reliquum verò ætatis, saluberrima Vitæ ratione usus, sese conseruauit sanissimum, ita ut nullum morbum contraxerit, præter febrem epibemeram, in quam aliquando ob labores immodicos incidit.

Fuit autem perpetuò iam inde à pueritia sua, morbus innocentissimus præditus, adeoq; blandus & mitis, ut nunquam propria manu famulos verberaret, ne lapsos quidem: sed tum minus, cum patrum admonitionibus, peccata semper eorum correxerit: irascenti impetum nihil differre ab insania & furore predicans. In disputando tamen adeo gravis atque seuerus extitit, ut nunquam non sui antagonisti pudorem, sibi gloriam maximam concubaret. Præterea admirandam illam docendæ facilitatem, puritatem atque elegantiam sermonis, sententiarum pondus & aliu iudicem, creberrimam historiarum atque exemplorum copiam, summum denique diuidenti, demonstrandi, artificium: quibus nimirum omnibus adeo accuratè Naturam rerum expressit, adeo illam oratione exornauit, ut Verus interpret eius solus ipse dici mereatur. Fuit porro adeo constans atque incommotus animo, ut ob nullam fuerit inquam rerum vicissitudinem consternatus: sed fortunam & infortunium, honorem & contumeliam, sanitatem & morbum, pari semper alacritate exceperit, Gloriam & popularem auram sic perpetuò neglexit, ut ne libris quidem suis præscribi suum nomen sit passus. Quippe multitudinis laudem, commodum instrumentum nonnulli viuentibus aliquando esse dicebat: mortuis autem, nihil omnino prodesse: undè verò nec viuentium quibusdam: quum eis qui plurimum philosophiæ indulgerent, non paruo impedimento esset apud vulgus fama, ipsos videlicet à rebus pulcherrimis plus iusto transuersos auferens. Quocirca, cum diuino quodam afflatus numine, vulgarem illam gloriam contempsit, veritatishq; solo studio flagrauit, nullam esse nec honestiorem, nec diuiniorem possessionem existimans. Tam studiosus autem fuit humane salutis, ut quum vel maximè optaret insignem illam sapientiam atque doctrinam suam facere vniuersis communem, Veritas tamen fuerit exprimere, deſcribereq; pharmaca deletaria, ne quis forte possumus scophanta in perniciem nostram illi abuteretur. Quo etiam nomine varios modos adulterandi medicamenta, sibi notos suppressit, ne videlicet anſam & occasionem circumueniendi nos imposturis, daret flagitiosis & fraudulentis hominibus: si qui id genus artes in lucro ponerent. Extant eius pietatis amorishq; argumenta complura, in deos, in parentes, in patriam, in artem ipsam, in vniuersum denique humanam genus. Dei quippe instituta, vim, & providentiam agnoscebat, suspiciebat, maximèq; cum reuerentia admiratur, quum aliis, tum præcipue in commentariis de usu particularum humani corporis, quos tanquam hymnos quosdam, Deo consecrauit: hoc esse sacrificium illi acceptissimum censens, non si ehecatombas, victimasq; offerret quospium cruentas, aut casiam & thura accenderet, sed si mysteria illius, operaque, primum quidem ipse cognosceret, expendereq; posset, postea verò aliis communicaret: in quorum ignoratione præstebatur summam impietatem consistere. Iam verò parentis sui cum in aliis plerisque loci mentionem honorificentissimam faciat, tum vel maximè in commentario de cognoscendis, curandishq; animi affectibus, illum commendat vnicè: quod sanè opus, veluti encomiajicum paternarum virtutum est. Patriam autem, conciusq; suos, tanto est prosecutus amore, ut quò eorum usui inferret, fauores Imperatorum, amplissimæque stipendia neglexerit: idq; meritò. Nam quum maiori ex parte nemo sit patriæ acceptus (sic siquidem natura comparatum hominibus est, ut peregrina quidem & aduentitia ingenia admirrentur: sua verò, domesticæque, ob familiarem usum, despiciant) Galenum certè Pergamenses tam studiose colebant, & obseruabant, ut ipsum & seruatorem suum, & Patrem patriæ, omnes communi ore vocarent: neque id iniuria. Si quidem non modo curabat sedulo, ut suo vni cuium rectè valerent corpora, sed quem admodum legislator atq; philosophus summus, etià erat sollicitus, ut eorum animi optimis documentis insisterentur. Quocirca varios commentarios conscripsit, ad excolenda iuuentutis ingenia admodum salutare. Conciliavit autem sibi maximè plebi animos, quòd medicamentis simplicibus, vulgaribushq; & quæ minimo negotio parari apud quemuis possent, plurimum utens, eorum quos suscipiebat curandos, minimè facultates opprimeret: contra quàm faciunt hæc nostra ætate plurimi pharmacorum æggratorum eximij, qui

Ut admirandam suam illam sapientiam ostentent, ad eò miscere sacra profanis assolent, ut quem morbum faciliè depellere posset interdum radícula unica commodè administrata, eum sepe numero varia indigesta, ac longè petita medicamentorum congerie, alant, soveant, adaugeant. Quod si æger fortè bona quadam fortuna sua, vel Dei potius, quam pharmaci, beneficio, aliquando ab assectu recuperetur, necesse non haud dubiè est, si tenuiori fortuna is sit, in aliam rursus morbum, prioriorè graviorem, incidat: videlicet egestatem extremam: quum nimirum pro tot gemmis & margaritis, vel (quod plerumque contingit) calculi ex fluente aliquo allari, satisfacere pharmacopola vixenti non possit: ac proinde si quid reliquum illi suppellectili fuit, totum id exponatur sub hestâ, cogatur, tandem miser, exosam habens vitam, medicinam, & medicos, in angustiam maximam rei familiaris adactus, vna cum uxore & liberis, fame acerbissima conabescere: cui quidem præstiffet longè, si servatus non fuisset. At Galenus noster, id genus aromatariorum, institutoribus, non indigebat: quippe qui propria manu singula medicamenta conficeret, confectâque officiosissimè semper ægri administraret: in egenos interim non exiguum suarum facultatum portionem erogans ætémque ipsam, non avaritia ductus, aut quapiam cupiditate, sed propter solam virtutem, pie simul & religiose exercens. Fuit autem erga ægros semper moribus placidissimus præditus, quibus ad eò illos exhilarabat, ut vel solo sermone videretur eos restituere. Quæ sanè gratia & venustas maxime desideratur in Medicis. Sunt quippe nonnulli etiam in aula Principum, ad eò tetrico aspectu, fastidiendoque, ut ex quartana simplici duplicem suo accessu reddant, soloque visu, balisicorum instar, intermiant. Nec verò cuiquam pharmacum admovit aut propinavit Galenus, cuius prius in seipso non fecisset periculum. Quæ omnia reddiderunt illum semper ad eò inculpabilem, ut calumnia in ipsum moliri nihil unquam potuerit. Scripsit autem Attico sermone & purissimo permutata opera & varia, non ad artem Medicam tantum, sed etiam ad Philosophiam, grammaticam, rhetoricam, mathematicam, atque geometriam pertinentia: quorum non contemnenda pars, dum templum Pacis, simulque omnes Bibliothecæ Palatii, olim conflagrarunt incendio (dâ iacturam irreparabilem) nobis interciderè. Quæ verò extant, atque inter eruditiorum manus versantur, non secus suspiciuntur ab universis, quibus mens falsis dogmatum corrupta & depravata nō est, ac si planè diuina oracula sint, ex tripode pronunciata. Nam qui in sophistarum scholis sunt alii, nūquid quæ paradoxis misti referti, iis certe nec placet, nec prodesse vera Galeni doctrina potest. Siquidem quemadmodum corpora impura, quò magis quispiam solido alimento nutriverit eò magis laesit: sic animum opinionibus pravus imbutum, nisi prius ab eis expurgeretur, ne Musæ quidem ipse rectè docere possint: id quod fuisse in causa videtur, ut Galenus semper in operibus suis, primò quidem exterminaret iniqua dogmata, postea verò ipsam Veritatem tradiderit: optimi agricolæ exemplo, qui prius quam terræ sua semina mandet, spinas, herbas, sentes, radicesque omnes euellit, omniaque breuiter, quæ possunt tritici germinationem extinguere. Fuit autem tam acris & vehemens in refellendis aliorum tam Medicorum, quam philosophorum erratibus, tantumque valuit suadela, ut eorum quos persequutus est, universa scripta perierint. Hippocratem verò ita semper & reueretur & colit, ut passim eum & prudentissimum, & sapientissimum senem, summumque Medicinæ parentem, auctoremque & largitorem bonorum omnium institutorum, prædicet. Ceterum quemadmodum Traianus olim omnes Italia vias inaccessas, præruptasque, aut rupibus, imbutas, refecit, instauravit, quò facilius pervadi possent: sic etiam satetur se non quidem artem condere (quam laudem tamen iurè sibi vendicare potuisset) sed iam ab Hippocrate inuentam, incultâ tamen & asperam, explanare, ut ab omnibus intelligi ac percipi queat. Vixit sub Marco Aurelio Antonino, Commodò, Lucio, & Senero, Caesaribus. Præcipue tamen Marco Aurelio Antonino fuit summa familiaritate coniunctus. Quo extincto, tamen si postea esset Senero Imperatori acceptissimus, detinerit amen diu apud urbem Romam non potuit, quò minus in dulcissimam sibi patriam reuenteretur. In qua quidem iam factus septuagenarius, imperastèque eodem Senero, requieuit, magnam apud homines gloriam consecutus: maiorem etiam apud Deum habiturus, si CHRISTUS institutus, cuius semel atque iterum meminit, credere atque obsecundare voluisset.

Sunt tamen qui Galenum tradant vixisse annos CXL. Siquidem Ludouicus Celius, lectionum antiquarum lib. x. vi. sic ait: Galenum Philosophum & Medicum singularem, cuius scientissimæ & plurimæ extant ingenij monumenta, quæ geminam sapiunt eruditionem, memoria proditum

à nonnullis est, CXL. Vixisse annos, tantūq; in cibo & potu abstinentia usum, ut ad satietatem nunquam comederit, biberit ve, nec crūdum quicquam gustarit. Unde sit factum, ut odorsum semper anhelatum spiraret: sed, quod longe apud me mirabilius est, citra ullam omnino affectionem, sola defecera senectute, quod est in humanis rarissimum.

Magis tamen testimonio Suida acquiriscendum est, qui sic de Galeno pronunciat: τῶν ὁρίστων ἰατρῶν πρῶτος ἀμυνὸς γεγονὼς, ὡς Μερκὺς Καμύδης, ὁ Περτινάκος τῆς Καισαρίας τοῦ Σεβαστοῦ Νικητοῦ γυνίτης, καὶ ἀρχιτρίτωνος, πολλὰ σωτηρίας ἰατρικὰ καὶ φιλοσοφικά, καὶ γράμματα καὶ ἄλλα ποικίλα, ἅπαντα τὰ πρὸς τὴν γνώσιν, κατελίγει. Ἄκουον ἡγοῦμαι φησὶ πᾶσι τοῖς ἰσχυροῖς ἐκ τῶν ἀνδρῶν. Quae sonant: Galenus Medicus celeberrimus, Pergamini natus, Marci, Commodi, & Pertinacis temporibus, vixit Romae. Patrem habuit Niconem, geometram, architectumq;. Plurima non in arte Medica tantum, sed in philosophia etiam, condidit: imo verò & in grammaticis, rhetoricisq;.

Quae quidem quod omnibus obuis & notissima sint, non videtur mihi opere precium ut recitentur in praesentiarum. Vixit

annos LXX. Porro haec vox Galenus, tranquillum, serenūq; significat.

VITAE GALENI FINIS.

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

V. CIVIL

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

ANNOTATIONES IN GALENI INTER-
PRETES: QVIBVS VARIJ LOCI IN QVOS HACTENVS
impegerunt lectores, & explicantur, & summa fide restituantur:

Andrea Lacuna Secobiensis, Doctore Medico, mili-
te sancti Petri, auctore.

ILLVSTRISSIMO ET SAPIENTISSIMO VIRO, D. D. DI-
daco, Furtado à Mendoza, apud Paulum 111. P. M. Oratori Cæsareo, longè vigilan-
tissimo, Andreas Lacuna Secobiensis, Doctor Medicus, miles
S. Petri, S. P. D.



VOD non perinde nostros lapsus cernamus, ac errata aliorum perspicimus, in
causa est quidem à Philæria, Vir illustriss. Nam cum unusquisq; cecutiatur erga
eam rem quam amat (ut sensisse diuinus ille Plato videtur) cuncti autem se
omnium maxime diligant: optima ratione contingit, ut de se nemo rectè induci
ferat. Idcirco pulchrè, mea quidem sententia, dictum est illud, Gestare nos dupli-
cem manticam: è collo suspensam: vnam quidem ante, alienorum: alteram vero post, nostrorum
errorum plenà: ac proinde nos, peccatis propriis relictis, ad aliena, quæ obiecta semper oculis sunt,
exammanda inclinari. Quamquam sanè quistudio veritatis inuestiganda, non autè ledendi quæ-
piam, id faciunt, adhibitâ, omni moderatione: ij certè non venia modò, sed summa etiam laude
sunt digni. Non desunt tamen nonnulli malè feriat, qui ex alieni contumeliam gloriam sibi aucupâ-
tes, in viros eruditos & candidos, quicq; nihil inquam tam habuerint in votis, quàm ut reipub. li-
terariæ prodesse, vel ut in producores patriæ, in contemptores diuorum, communisq; humani ge-
neris hostes, acerbè simul & impudenter, vel leuissima ex occasione inuehantur: cum deberent po-
tius illis bene precari, ob egregiè in communem usum nauatam operam. Inhumanum quippe, ma-
ximèq; ferinum est, eos qui ut communia studia inuarent, sese obiectum scyphophantarum calum-
niis, ob multa quidem ac varia, quæ ex Græcâ in Latinam linguam fidelissimè translulerunt, non
cumulare suis iustis laudibus: ob paucula vero in quibus sunt lapsi humanitatis, probris & conui-
cium opprimere. Ut autem reliquos omnes prateream, qui sua vniuërsâ artem Apollineam locuple-
tarunt, certè Ioannes Guinterius Andernacum, in quem plurimi præter meritum debacchantur, vo-
nus ex primis fuit, qui Galenum introduxerunt nobis latine, purè, atq; ornatè loquentem. Quòd si
ex iis quæ iam pridem vertit, nonnulla offendant aures delicatiores, id cuiquam mirum esse non de-
bet: quandoquidè superioribus annis, cum Lucretia Parrisijsiorum politiores disciplina in operent id
remissi & florere: primùmq; ipse ad transferenda Græca se accingere: tum ut tyroni votis ob-
secundaret, qui sitie diuissimi Galenianæ doctrinæ, quemadmodum famelici pueri, qui semicrudæ
carnes deuorant, priusquàm accuratè coquantur, in confectos commentarios illi extorqueamus è
manibus: tum ut satisfaceret importuni typographorum precibus, coactus fuit tantum singulis die-
bus vertere (id quod ipse testari possum) quantum premi duplici torculari poterat: atq; ita suas tra-
lationes, nondum integrè elaboratas, præcipitare. Quare (ut idem repetam) perperam mihi viden-
tur facere, qui virum in vtrâq; literatura absolutum, exquisitissimumq; Medicum & Philosophum
(cuius studii omnes debemus plurimum) tam insolenter inuestiant: cum nullus extiterit hactenus
adeò fidus Galeni interpres, qui interdum hallucinatus non fuerit: ac proinde ad veritatè ipsam in-
uestigandam, præsertim in rebus arduis & maximis, cuiusmodi ars Medica exiit, necessariò inge-
nia plurimum desiderentur: ut videlicet quæ hunc fugiant, ille cernat exactius. Sunt enim difficilis
semper, quæ optima. Cum igitur superioribus diebus vniuërsa Galeni opera in methodum longè bre-
uiorem, ac faciliorem contrahens, obiter reperissem complura, hactenus animaduërta à nemine, in
quæ lector facile impingere poterat: rem haud inutilem me facturum existimans, si omnia loca præ-
cipua, quæ, iudicio meo, aliam requirebant expositionem, pauculis annotatam, arbitriumq; studio-
sis relinquerem, aut sequendi versionem nostram, aut consulendi Græca exemplaria. Neq; enim
tantum mihi ipsi tribuo, ut velim illis ita meam sententiam probari, ac si Lycurgi, aut Soloni decre-
tum esset. Nam & insitam mihi fragilitatem agnosco, & iudico omni ex parte difficile, ut qui ho-
mo sit, passum non decipiat: id quod Galenus secundo libro de Compositione pharmacorum se-

EPISTOLA NVNCVPATORIA.

cundum partes, non minus verè quàm eleganter confirmat, dicens: *χαλεπὸν γὰρ αὐτῷ εἶναι
 μὴ ἀπομαρτυρεῖν ἰν' ὧδε, καὶ μὴ ἑλπεῖν ἀντιφρονεῖν, τὰ δ' ἀπὸ καλῶς κρινόμενα, τὰ δ' ἀπὸ καλῶς κρινόμενα*
γὰρ ἐφ' αὐτῇ: quæ admodum certè aliquando mihi accidisse fateor, qui iuuenili prurienti olim scri-
bendi libidine, nonnulla paulò maturius edidi, quæ optarem nunquam produsse in lucem. Quan-
 quam animus haud dubiè est, ubi ocium fuerimus nacti, quæcumq; à nobis conscripta citra perse-
 ctum iudicii sunt, eas omnia recoquere, reuocareq; ad limam accuratorem: idq; patrū grauisimo-
 rum exemplo, qui vel in sacra literis, in quibus maioris cū periculo erratur, perat late propria scri-
 ptanon dubitauerunt. Quod si quis interim vir doctus iuxta & sincerus, vel in hisce nostris annota-
 tionibus, vel in aliis omnibus, quæ aliis à nobis sunt exarata, meliora in medium produxerit, ego
 primus omnium illa amplexabor, eiq; immortales gratias habebō, nec minores, quam si mihi labo-
 ranti graui ophthalmia, oculorum aciem restituisset: modò eo utatur candore & modestia, quæ vi-
 vos philosophos decet, Veritatēq; amatissimā. Semper namq; à moribus Erasistratarum abhor-
 rum: qui adeo pertinaciter suam tuebantur hæresim, ut censerent patriam potius prodendam esse,
 quàm proprium dogma. Quod verò hic præfens labor mihi institutus non fuerit, ut ostenderem in-
 genium, aut viriliū hominum doctissimorum detraherem, sed ut publicæ utilitati consulerem, ra-
 tionemq; redderem diligentia præstata in condenda Galeni Epitome, nouit quidem ille, qui animo-
 rum est scrutator, Deus opt. max. Porro ut idipsum lucubrationū quod est, sub splendore nominis
 tui publicarem, me occasiones varie impulerunt; vir clarissime. Vna & potissima, ut amor ille
 ardentissimus, qui inter Excellentiam tuam, & illustrissimū atq; reuerendiss. D. D. Franciscum
 à Bonadilla & Mendozza, Cardinalem Caurien. patronū meū nō vulgarem, inde magis
 consolidetur, ex hoc argumento innotesceret cunctis, sumūq; obseruatiā meam utrumq;. Secunda,
 ut vituperatorum calumniis ianuam detrectandi obsecrarem, tutūq; à rabidorum me canum mor-
 sibus redderem. Quippe verisimile est, quæ tibi semel sunt consecrata, tuæq; protectioni se credide-
 runt, ea vel vti in asilo quodam intermerato iam esse: cum nemo futurus sit adeo temerarius aut
 impudens, ut istam Amplitudinem tuam, auctoritatēq; summam, non reueretur. Tertia quæ me
 illexit causa est, quæ ducti studiosi omnes, te vnicum protectorem Musarum, doctorum hominū
 patrem, promotorēq; ingenuarum omnium discipularum, nunquā non consenserunt: nempe mul-
 tius ista eruditio tua, feruentissimūq; sapientiæ amor, claritudinē generis, prudentiæ, humanitatis-
 q; conueniens: ut interim singularem ad omnia ingenij tui promptitudinem, admirandūq; in
 agendu rebus dexteritatem prætereā. Quas insignes virtutes (quæ raro in vnum conspirant)
 in te cumulatam sentiens CAROLVS V. Cesar, indies cōcredit tibi maxima molimina rerum:
 quæ adeo feliciter consilio & sapientiā tuā confecta & expedita reddis; ut diuino planē inge-
 nio præditus esse videaris: id quod etiamnum predicāre de te illustrissimus hic Venetorum senatus
 non desinit: qui & superet hodie recessum tuum, nisi illustriss. vir D. D. Ioannes à Mendozza,
 aureum quoddam tuarum virtutum exemplar, dolorem ipsum foueret, leniret, ac mitigaret. Siqui-
 dem in eo præsentē cui eadem mens, idem candor, prudentia eadem, ut cognōtent idem, desi-
 derium tui absentis exaltant: in eo suos oculos pascunt: qui tanta cum gratitate, sapientiā, fide, stu-
 dio, atq; sedulitate fungitur Oratoris munere, ut minime iam ipse hinc abesse videaris. Ne igitur
 diutius quā par est, suspensam tuam Amplitudinem teneam, en offerimus tibi, vir illustriss. in Ga-
 leni interpretes hæce nostras annotationes. Quas quidem si tuo patrocinio dignatus fueris, ipsæ qui-
 dem omnes insulsi atq; incurfiones respiciunt: ego verò tuam semper Excellentiam suspiciam, quā
 in multis annos Christus nobis seruet incolumen. Veneti ex adibus illustriss. viri, D. D. Ioan-
 nis Furtadi à Mendozza, apud Venetos Cæsarei Oratoris splendidissimi. Decumo Calen. De-
 cemb. M. D. XLVIII.

AD LECTOREM.

ADVERTA Candide Lector, numerum illum qui passim occurret tibi in nostris annotationi-
 bus, referre paginas eorum Galeni commentariorum, qui in octo classes digesti, repurgatiq; ab inno-
 centis mendis, anno 1541. sub formula octava fuerunt Venetiis excusi: idq; industria clarissimi &
 eruditissimi viri, Victorii Trincavelij, Doct. Mad. pectigo diligentia Augustini Ricci, Medici etiam
 ubi solutissimi. Quod sanè minime omittendū esse censuimus, quia tibi indicarem: ne & illi, qui-
 bus talium exemplariorum copia esset, sua commoditate fraudarentur: & illi, quibus etiam hæc nō
 esset, aliquam tamen & in suis inquirendi occasionem ibi præbitam esse, cernerent.

Libro de optima secta.

Page 57.

Inus Paulus vertit: Et ægrotantes non multo in conficiendis cibis labore indigere. Græce habetur: *οἱ ἐν τῇ νόσῳ οὐκ ἐν πολλῷ κόπῳ χρὴ τὰς τροφὰς ποιεῖν*. Hoc est. Et quod ægri egent cibis, qui non admodum difficulter coquantur: vel qui longam elaborationem non postulent.

Page	Ref.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Ad huiusmodi præceptum nascitur: liquidi cibi omnes febricitantibus bene faciunt. Græcè legimus: *Cibi rari et hyerici si febricitans sit de hygu dicitur* wær talis uigilantes ferpiat. Quod est. Ex his tale oritur theoremma: Cibi humidissimi omnibus febricitantibus conueniunt.

Page 61

Aiunt enim, antiquum adhibendum reme-
diorum vires quid didicerit, nihil aliud vile ab
experientia provenit. Graecè legatur: *παλιαι
αἰωνος εἰς αἰωνος ἰσχυροὶ φάρμακοι, ὡς περὶ
ἡμετέρας αἰῶνος φάρμακα*. Quod est: Ait
nemo, propter hoc q̃ faciatres exhibendum per
eam cognoscuntur, nihil aliud vile ab ipsa ex-
perientia accedere, etc. Fefellit autē interpretem
vocalium *αἰωνος* *αἰωνοι*, affinitas atq̃ similitudo.

Page. 86.

Quandoquidem non ab effectis, sed ab effici-
entibus (quemadmodum & ipsi profitemur) in-
dicationes accipiendæ sunt. Græcè legitur: *ἡ γὰρ
ἀντὶ τῆς ἀναγωγῆς, ἀλλ' ἀντὶ τῆς ἀναγωγῆς, καὶ οὐκ ἀντὶ
τῆς ἀναγωγῆς, καὶ οὐκ ἀντὶ τῆς ἀναγωγῆς*. Quæ eodém mo-
do vertenda est: scilicet: Nō enim ab effici-
entibus, sed ab effectis (quemadmodum & ipsi fa-
tentur) indicationes sumendæ sunt.

Page 91

*Itaque uisus est semper communia vertit, non com-
munitates: ut scire vertendum est, si uelimus ve-
ram Galeni phrasim atque sententiam exprimere.*

Lib. de constitutione artis medicæ.

Ad calcem libri.

B Artholomæus Sylianus vertit quod labefa-
cti. Aldinus codex habet: *Est Artholomæus*. Hoc
est, quia corruptus est. Basilienfis autem: *Est Artholomæus*
perit, & ceteris quidem quod vertendum est: quia
digeritur & resoluitur.

Lib. I. de elementis.

Page. 190.

Leoniceus: Vel secundum substantiam quibus
 cōtingit esse elemēta. Cui versioni suffragātur
 ceteri interpretes. Græcè tamē legitur *ἀπὸ τῶν
 στοιχείων* *ἀπὸ στοιχείων* *ἀπὸ στοιχείων*. Hoc est: An
 cūdum substantias, quarū ratione cōtingit ip̄s
 esse elemētia. Cpt̄a loco *ἀπὸ* crediderim esse le
 gendū *ἀπὸ* nisi quod forte dicat Galenū vti lati
 ne phrasī vultū diu in xpo Roma vocatum.

Feb. 1911. Page 386

Lynacer. Vt si carnosus quis iuuenis in frigida
lauatione corpus eius ex accidenti, nō ex propria
potestate, calfacere dicat. Graecis: *καὶ τὸν σαρκενόν
τοῦ νεοτῆρος καὶ τοῦ ἀνδρὸς ἐκ τῆς ψυχρῆς
λουατικῆς θερμαίνει.* Quod sonat: Vt si quis dicat
frigida lauatio calfacere corpus carnosum iu-

venis ex accidenti, non faciliare propria.

Lib. de inaequali in temperie.

Page 114.

L Inacer: Calfr quidem sanguis aliquando v-
lnerifus, quicquid non naturale illum ca-
cem, qui ex humoris putredine est obortus, rece-
pit. Græce legitur : καλφρ σάνγις αλιουδινος κατὰ τὴν
ἐκείνου ἀκαθάρτησιν καὶ τῆς φρενὸς τοῦτοιοῦτος ἐπιπλοῖται.
Et sic: αὐτοῦ τῆς φρενὸς τοῦτοιοῦτος ἐπιπλοῖται. Quid verum:
Calfr quidem sanguis quandoque vnuerfus,
recipit illud calorem per iter naturam, qui ab
humoris putredine proficitur.

Pagina 348.

In qua alterum sit comprehensum. Græcè habetur: *ἡ ἀλλήλην ἐκείνην ἀπασσιν*. Hoc est, in quo etiam non adsit alterum.

Lib. de animæ morum, & corpore ætem-

Стор. 114

Bartholomaeus Sylvanus: At incorporeū sub
stantiū, cum per se ipsa esse possit, nec quā
litat ut species corporis sit, differentiam nullam
intelligo. Cui veritūi alij subscribunt interpres
tes: Græcus tamen codex habet in hunc modū.
*ἀντικείμενον τῶν σολείων, πῶς αὐτὸν ἰσχυρίζονται ἀντιπαραστήσειν, ἐν ἀντι
θέσει τοῦ σώματος, ὡς ἂν ἴσως ἐρεῖται, ὡς ἀπὸ τοῦ τοῦ ἀντικείμενου.*
Quod si sic verendum est: Incorporeū verō
substantiā, quæ ipsa quidem per se consistere va
leat, nec corporis qualitas aut species sit, equi
dem nullam differentiam invenio, etc. Quibus
nimium verbis convellens opinione Plato
nis, qui animam cōstitueret incorporeā quā
dam substantiā, & quæ posset per se subsistere,
conatur Galenus ostendere, illam esse aut quā
litatem, aut aliquam speciem corporis: cum ali
quid, si esset quid alienuū & abstractū, ab incor
poreū, nec quāquam illam diffusivē admitteret, quā
in tres species, seu differentias, vel à Platone ip
so distinguitur.

Lib. III. de naturalibus facultatibus.

11. Page 444.

L Inacet: Siquidē interna arterie tunica. Græcè legitur *αρτηριον* *αριον* *αριον*. Quod est: Etenim interna ventriculi tunica.

Lib. I. de motu musculorum.

Pag. 194.

Codices latini sunt depravati: in quibus habetur: Ad reliquum, & quartum, & motum transgressi, confideremus, etc. Græce namque habetur: *τα μετα ταυτα επι το τεταρτον μεταβαλεμεν, και οσον εστιν επι το τεταρτον επιβλεψαμεν.* Hoc est: Ad reliquum autem & quartum motum transgressi, modum ipsius expendamus.

Libro segundo. Pag. 511.

[illegible]

IN GALENI INTERPRETES.

iculis circa ipsum tonicè agentibus commiseris
figuræ custodiam, adeo illam tueretur, vt seden-
tes sepe quidam dormiuerint.

Pag. 412.

Itaque & supinum iacere, & hiare, stertoris, aut exolutionis, aut ebrietatis, aut ignaviae sunt signa. Graecè: *οἱ τὸ supinum in alio τὸ hiare*. Quod est: & hiare cum stertore.

Pag. 514.

At(dicit forte quispiam) nō assequimur men-
te ea fieri: uam ne palpebrarū motum semper,
etc. Quo in loco Galeus respōdit ad obiecti-
onem tacitam. Ac proinde ita debemus legere. At
(dicit forte quispiam) nō assequimur mente ea
fieri. Neque etiā (supple, dicemus nos) palpe-
brarū motui semper adhibes mentem, etc. ac
sic sane tentat illa evadit perspicua. Tu inter-
im consule græcum exemplar.

Lib. I. de semine.

Pag. 67.

In Anus Cornarius: Attractiorum quidem familiarium, per quam attracturū, & alteraturum, alimentumq; sibi facturū erat: expulsio nam autē alienorum & superfluum. Sic autē habet grecus versus codex: nam imperio sunt depraua μετατρέφειν τῶν τροφῶν, τῶν ἀλλοτρίων τὴν ἀπορρίπτειν τῶν ἰσχυρῶν ἀπορρίπτειν τῶν ἀλλοτρίων. Quod est vertendum: Attractoria quidem, familiarium: & qua etiam retenturum erat, quāq; alteraturum, & sibi nutrimentū facturum: ac deniq; alienorum, superfluumq; excretricum. Galenus siquidem imperfensurū quatuor aliq; facultates, maximē inter se dubitantes, ascribit semini: nec vult ipsum per attractricem, aut alterare, aut sibi alimentum conficere: id quod dictū esset planē ridiculum: eum nimirū fingulū eorum facultatem firissimum munus proprium, nulliq; alterius operationē vīat per. Attractricis quippe, est attrahere: retētrici, retinere & consistere: alteratricis, alterare & concoquere: expultricis alterare, aliena & superuacanea expellere: id quod satis superq; a Galeno demonstratum viderit, quum in aliis locis, nam vel maximē in commentariis de naturalibus facultatibus.

Pag. 167.

Vertit in hunc modum cum ceteri interpretes suffragantur: Et ob id sanguini facillimè est carnis fieri: difficulium verò membranam, & neruo, & venæ, & arteriæ, & tunica. Græcè legitur: *ἡ δὲ σὰρξ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ αἵματος* *ἡ δὲ μεμβράνη ἀπὸ τοῦ αἵματος* *ἡ δὲ ἀρτηρία ἀπὸ τοῦ αἵματος* *ἡ δὲ φλέψ ἀπὸ τοῦ αἵματος* *ἡ δὲ νεύρον ἀπὸ τοῦ αἵματος* *ἡ δὲ τὸν σπέρμα ἀπὸ τοῦ αἵματος* *ἡ δὲ τὸν σπέρμα ἀπὸ τοῦ αἵματος*. Quod est vertendum: Idcirco facillimum quidem est sanguini, fieri carnem: difficius autem membranam, & neruum, & venam, & arteriam, & tunicam. Docet quippe et in loco Galenus, ipsas particulas solidas vix posse confici ex sanguine, carnem autem facillimè: cum nimirum illi quidem, à femine: hæc autem à sanguine, originem nanciscantur.

Pag. 682.

Continetur autem in testibus seminario humore. Et paulo post: Trahunt igitur etiam testes seminario humorem. Vtrobique autem græca

exemplaria habent: *Apud del. sigla*. Hoc est humor
serosus: qualis certe genitura ipsa existit, & prae-
cipue quae in sinistram descendit testem: cum vi-
delicet sinistram vas seminarii oiciatur ab emul-
gata vena, quae serosissimū sanguinem vehit
ad renem sinistram, ut illic expurgetur.

Lib. tr. de femine. Pag 590.

Corn. Possit autem Hippocrates etiam opina-
tus eri, ex vtriusque permixtis vnum perfectum fieri
tenet fieri, et hoc ita fieri impossibile sit. Graeci
legimus: *Αὐτὸς ὅστις ἐκ τῶν ἀντιθέτων ἰσχυρὰ πλεονεχ-
εῖται, οὐκ ἐκ τῶν ἀντιθέτων ἰσχυρὰ γίγνεται, ἀλλ' ἐκ τῶν
ἀντιθέτων, ἢ καὶ τῶν αὐτῶν.* Quod nos veritatem: Potest autem
(quemadmodum existimamus Hippocrates)
ex ambobus mixtus, etiam vnum semper perfectum
fieri. Et quae obsecro possibilis essent, si haec Ita-
lia non forent? Itaque non refellit opinionem Hippo-
crates, sed illam potius (quod solus semper) eum
Dei oraculum, et recipit, et amplexatur.

Page 604

Non tamē impoſſibile eſt animo concipere tale temperamentū animalis corporis, ut perfectum animal generet ab alijs alterius coſtitutione. Grece autem legitur *ἐν γυναικὶ ἀνδρῶν*. Hoc eſt ut imperfectum generet. Quam lectionem probandam eſe indicat ſequens dictio, quæ ita habet: Animal tamen perfectum in ſeipſo concipere, verū difficile eſt. Advertat item candidus Lector, paſſim in cōmentariis de femine, Cornæcium ſe *ἴνα*, quod eſt in Greco, quod deſignat femininū ſignificat, vertere nobis muliere.

Pag. 610

Apparet ex his quatuor vasis, quæ appellatũ
vmbilicũ, similit̃ meum iuxta vragon consti-
tuuntur, etc. Græce legitur : παρὸν γὰρ τῶν ἑσπερίων
τῶν τε ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ τῶν ἐκ τῆς γῆς, καὶ τῶν ἐκ
τοῦ θαλάσσης, καὶ τῶν ἐκ τῆς ἀέρος, etc. Quæ sonant:
Apparet enim ex his quatuor vasib, quæ iuxta
appellatur vmbilicus, vnũ cum meatu, qui ad
vin aculum est, cõeunt.

Lib. de instrumento odoratus.

Page. 614.

L Vdousius Bellisarius. Eius quæ de foraminibus dixit apertis solius, quamquid non intelligentiâ fugiunt, etc. Græcus codex habet: ἀλλὰ ἡ ἀποκρίσις ἐστὶν ὅτι οἱ ἀποκρίσεις οὐκ ἔστιν ἀποκρίσεις, ἀλλὰ οὐκ ἔστιν ἀποκρίσεις. Quæ ita vertenda sunt: Cæterum quod ab eo dictum est de referenda meatuum, impossibile quidem non est.

SECTIONIS PRIMAE PAR-
TE SECVNDA.

*Lib. II. de anatomicis admini-
strationibus.*

Page 64.

ANdernacus : Quod vngues igitur ex prædictis omnibus coalescant. Græcè: *ἵνα ὅτι ἐκ πάντων τούτων ὁ ἀνὴρ ὁ ἀνθρώπος ὁ ἄνθρωπος ὁ ἄνθρωπος*. Hoc est: Quod igitur prædictis omnibus ipsi vngues accrescant.

Lab. rnr. Pag. 76

Andernacus: Amplex magnitudinis porrigi-

nervos diximus. Græcè: *ἡ γὰρ τῶν μυῶν ἀπὸ τοῦ νέρου*. Hoc est: magni feruntur nervi.

Pag. 78.

Derectis enim plurimis iam brachij partibus,
reliquos duos nervos, propter internam ipsius
regionem, conspicis: in quam etiam predicti
tres paulo inferiores, quàm tertius nervus est, in-
feruntur. Græcè legitur: *γυροποιήσις γὰρ αὐτοῦ*
πλάτος πέφυκε ἴση τῇ βραχίονι, συνεκείνη ἀπὸ τοῦ
σώματος κατὰ τὴν ἐξέτασιν γινώσκου (scilicet) τὰ περιλαμβανόμενα
ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ) ἀλλὰ τῶν αὐτοῦ πρὸς τὸ φέρειν
αὐτοῦ. Quod est: Nudatis enim iam plurimis
brachij partibus, reliquos duos nervos iuxta ip-
sius regionē internā (in quam etiam predi-
cti tres inferuntur) expende, paulo inferiores, q̃
situs fit tertius nervus.

Pag. 90.

Manu autem immissa, intercipiendū est. Græcè: *καταλαμβάνει τὴν χεῖρα, ὅταν διαταραχῇ τὸ πόδι*. Hoc est: Demetrii autem manum, intercipiendū est: cūq; subaudiendum, oportet. Vult quidem, vt manu liberē demittamus, ac sic pendulā excipiamus vinculo, ad hoc vt vixit exacte promoneā: id quod hodie etiam in quotidiano est vsu.

Pag. 101.

Omnia latina exemplaria ob typographorū
inadvertentiam sunt depravata. Habent enim:
Mox alia penitus grandis : cum penitius legen-
dum fir. quandoquidem græcè legitur, *ἀνὰ*
τὴν μέσην.

Lib. v1. Pag. 175

Andernacus: Quam possibile est solius peritonæi facere. Græcè *αὐτὸν τὸν περιτόναιον μόνον*. Quod equidem verterem: Quam possibile est à solo peritonæo fieri. Constat namque eam suturam abdominis, à nervis illis peritonæi sustentamentis consisti.

Pagina 185.

[illegible]

Pag. 187.

Hoc autem sub tenui tunica aperiri eviden-
ter apparet. Græcè: *ἡραυγὴ δὲ ὅπου τοῦτο ἀνα-
σῆται καὶ ἀναστρέφεται*. Quæ sic verterem: Per-
spiciat autem hoc sub tenui comprehensum tu-
nica apparet.

Lib. VII. Pag. 197.

Andernacus: Non tamen ipsi cordis corporicardicos hae tunica connexa est, verum in alius omnibus haec parua quaedam regio intermedia est, motui cordis accommodata, ad basim ipsius, quæ, ut est expositum, orbicularis est, proceduntibus ex ea valis connexa. Græce legimus: *οὗ μὲν αὐτῶν γὰρ ὁμοίαν τῇ καρδίᾳ ἐστὶν ἀπὸ τοῦ πνεύματος τῆς ζωῆς*, ἡ δὲ πλεονεξία καὶ ἡ ἀσθένεια οὕτως ἐστὶν ὅτι ποιεῖται ὑποκατασκευασμένη ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος, ὥστε ὁμοίαν αὐτοῖς ἀναστήσει ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος, ὥστε ὁμοίαν αὐτοῖς ἀναστήσει ἀπὸ τοῦ σώματος καὶ τοῦ πνεύματος.

In quod vertimus: Non tamen ipsi cor-

dis corpori pericardios hæc tunica connexa est: verum circa alias quidem omnes illius partes, haud parua quædam regio intermedia est, motui cordis accommodata: ad basim vero suipfius, quæ (sane vt iam exposuimus) est circulus, exors ab illo vasis annectitur.

Lab. VIII. Page. 273.

Andermæus: Quæmadmodum etiam si in contractione thoracis per sectiones inaniti, ære extrinsecus elapso, eas obturaueris, respiciet confectum animal. Græcè: ἀνὰ πνεύματι καὶ ἐν τῇ σφραγίδι τοῦ θώρακος ἀποθνήσκει· ὅταν τὸς πνεύματος ἀπὸ τοῦ περιστερίου (ἐξωθεν) εἰσέλθῃ ἀπὸ τῆς ἀνοίγιδος καὶ οὐκ εὑρεθῇ πνεύματι ἐν τῷ σώματι. Quid sic clarius vertitur: Quæmadmodum si in contractione thoracis inaniti, aëre per sectiones elapso, obstruxeris ipsas sectiones, respirabit, vocemq; edet confectum animal.

Pag. 141.

Nam intercostalibus muscularibus vehementer hoc tempore protensis. Græcè autem legitur: *μυροειδὲς*. Hoc est: Contractis, aut, concidentibus. Pag. 248.

Quæ manifestam sui inspectionē efficit. Græcè legitur: *εργα της αλ' αρετης διαφανισθησθαι*. Hoc est: Manifestam per se inspectionem faciens. Quibus verbis Galenus significat, ubi per anamomen, costas succingens membratua, sola & simplex relicta fuerit, nempe liberata à costis & muscularibus: facile nos per ipsam, ceu per cornu quoddam aut vitrum, inspecturo interna viscera.

Ibid.

At manifestior adhuc speculatio fit, quum in diaphragmate nudato, peritonæi vertex avellitur. Græcè: *anagris* di vertex di *phymen* dia *nudus* di *delappon* *peritonæi*, *anagris* *peritonæi* *di* *anagris* *peritonæi*. Nempe: Manifestior autem adhuc fit speculatio per diaphragma nudatū, ubi peritonæi vertex avulsus fuerit.

Lib. ix. Pag. 151.

Andernacus: Dum igitur membranae cerebri
plexus omnibus que ambiunt codex habet: le
quippiam abrupitur. Græcus codex habet: le
Quod est: Interim enim dum exuuntur à cir-
cumiectis ossibus, ipsius meningis plexus, sepe-
numero quippiam abrupitur, diuelliuntur.

Page. 253-

Atque ipsius vsum simul inspiciendo nudabia.
Græcè legitur: *ἐν τῷ ἵππῳ αὐτῷ ὅπου ἐστὶν ἡ γυνή*
αὐτῆς: qui locus est deprauatus: planèq; confus. nō
γυνή dicitur, sed *γυνή*, legendum esse: vt reddat-
ur ita Galeni sententia: Atque ipsius vsum simul
inspiciendo exploraueris.

Lib. II II. de usu particularum.

Pag. 404

Nicolaus Regius: Cum autē nulla iam super-
sit. *Græcè: ἔστι δ' ἀδύνατον.* Quod est: Nulla autē
iam supersit. Quam lectionem si non recipias,
tota Galeni sententiā abrupturim, vixq; intelligi
poterit. Pag. 414.

Adilia. Graece legitur: ἀπὸ τῆς ἀλφειᾶς: quod
est: per illam regionem.

Pag.

conspicuas omnes tamen tenues, obscurasque, tum gingivæ, tum reliqui dentes.

Pag. 658.

Tres enim sunt omnino capitū figuræ. Græcè: *τρία τῶν κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν καὶ τὸν ὤφθαλμον*. Quod est: Ipforum autem uniuersæ figuræ sunt tres, &c. Agebat autem de capitibus fastigians, quorum figuræ ait esse tres: nempe vnam, vbi vtrique eminentia, anterior videlicet & posterior abest: secunda, vbi anterior tantum: tertia denique, vbi posterior duntaxat est exoluta. Quod si de uniuersis capitibus figuris Galenus impræsentiarum egisset, præter has tres, annumerasset etiam naturalem figuram, atque adeo complures alias se præter naturam habentes.

Lib. x. Pag. 664.

Nicolaus Reg. Quocirca medius is vehitur ad ipsum crystallinū. Græcè habetur: *ὅτι δὲ τὸν μέσον σπινθηρῶν αἰετὶς ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod nos vertimus: Ac proinde medius in ipso vehitur crystallinus humor, &c. Air itaque non vitreum humorem in crystallino, sed crystallinū in vitreo, veluti semisectam sphaerā in aqua (hac enim vtrius Galenus analogia) natat: id quod licet videre manifestissimè. Si quidem crystallinus humor insit glaciæ est cōpactus: vitreus autem humidior est, ipsūque aquam refert. Ob idq; in eo crystallinus vehitur, veluti globus semisectus in aqua. Ibidem.

Atq; etiam ophthalmia laborantes lux quidē offēdit, eosq; deprehendit. Græcè: *ἀλλὰ οἱ οὗτοι ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod nos vertimus: Quia & lippitudine laborantes redarguit quidem splendor, ac lædit. Pag. 671.

Cū igitur opifex nostri providere vellet, vt qua est foramen hoc, tunica cornea humorem crystallinum aliquando non contingeret. Græcè legitur: *ὅτι δὲ καὶ τὸν αἰετὸν ἐν τῇ σφαίρᾳ τῆς οὐχὶ ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod est vertendum: Vt igitur nec per hoc foramen cornea tunica aliquando crystallinum humorem tangeret, cū prospexisset conditor noster, &c. Non prospexit siquidem vt aliquando non tangeret, sed vt nunquā crystallinum cornea contingeret: quemadmodum revera non tangit, nisi dum ipsius oculi fabrica omnino labefactatur. Pag. 679.

Aceruati hi omnes suis aponeurosisibus. Græcè: *ἀνὰ τὰς ἀπὸ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod est: Dissoluti autem omnes in filamenta neruosa.

Lib. xi. Pag. 751.

Nicolaus Reg. Quod si magni sint. Græcè: *ὅτι δὲ τὸν αἰετὸν ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Hoc est: Quoniam magni existunt.

Pagina 754.

Omnia Latina exemplaria habent, ad palatū columnam. Græcè legitur: *ἀνὰ τὴν σφαίρᾳ τῆς οὐχὶ ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod est: iuxta palatum atq; columnā. Pag. 741.

Qui igitur hic quoque natura contraria vni-ri inter se posse deperit aut? Græcè: *ὅτι δὲ τὸν αἰετὸν ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod ego sanè veterem: Quo pacto igitur

hic quoque natura contraria inter se mutuō vni re constituit?

Pag. 746.

Tum quod ex basi capitis est, quæ dura esse oportet. Græcè: *ὅτι τὸν αἰετὸν ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quæ sonant: Quodq; ex his sit, quæ basi capitis insunt, quæq; dura esse expediebat.

Pag. 747.

Ante hos verō tertium. Vbi legendum est: ante hæc verō tertium: cū ille articulus referat duo nasi ossa. Similiter paulo inferius, vbi verit Nicolaus Regius: supra quos alij sunt duo: legendum est: supra quæ alia sunt duo: cū nimirum etiam illi articuli manifestè referantur ad ossa.

Lib. xii. Pag. 767.

Nicolaus Regius: Ob idq; erat necesse quoddam ei parte anteriore apponere. Græcus codex habet: *ὅτι δὲ τὸν αἰετὸν ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod vertimus: Ac proinde necesse erat quoddam ipsius parte anteriori opponere musculos.

Pag. 771.

Motus enim & sensus omnium partium infernarum læduntur læso spondylo. Græcè clarius habetur: *ὅτι δὲ τὸν αἰετὸν ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Hoc est: Motus enim & sensus omnium particularū, quæ sub læso spondylo consistunt, vitiantur.

Pag. 778.

Via autem omnis, quæ est inter primam productionem, & sineo vltimæ. Græcè habetur: *ὅτι δὲ τὸν αἰετὸν ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod nos vertimus: Via autem quæ est inter primam productionem, & insertionem vltimam, &c. Quoad quidem eo in loco Galenus summam vix securitatem commendat, quæ ducit nervos à prima productione ipsorum, quæ sit ab spinali medulla, vsque ad particulas in quas inseruntur.

Ibidem.

Ad posteriores siquidem partes spinæ os attingit: quo loco cartilago quæ plurima ei circumiacet. Græcè legitur: *ὅτι δὲ τὸν αἰετὸν ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod sic potius verterem: Quatenus autem ad posteriores fines vergit os quod acantham vocit, eatenus ei cartilago plurima circumducitur.

Pag. 781.

Nisi quod in thorace quom costæ non solum eis sint, &c. Græcè: *ὅτι δὲ τὸν αἰετὸν ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quod est: An quod in thorace, quom costæ non solum eis essent articulare, &c.

Lib. xiii. Pag. 795.

Nicolaus Regius: Apparet enim perspicuè, quod nō præterit ab vtroq; ipsius sine nervos quosvis producere, ob id fuisse perturbatum. Græcè habetur: *ὅτι δὲ τὸν αἰετὸν ἐκ τῆς ἀντιθέσεως*. Quæ sonat: Apparet enim perspicuè, quod nō præterit per vtrumq; ipsius sine aliquem nervum.

IN GALENI INTERPRETES.

neruū producere: ob id ipsum fuisse pertusum.

Pag. 797.

Quemadmodum & aliis omnibus eius loci spondylis propagines quasdam exiguas mittit, quomodo & reliquis coniugationibus nervorū qui sunt in collo. Græcè: *ὅτι καὶ τῶν ἄλλων σπονδύλων τὰς ἐξίχας ἐκτείνει, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς σπονδύλοις τὰς ἐξίχας ἐκτείνει. ὡς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς σπονδύλοις τὰς ἐξίχας ἐκτείνει.* Quod est verendum: Quemadmodum & aliis omnibus eius loci spondylis propagines quasdam exiguas mittit, quo modo & reliquæ coniugationes nervorum qui sunt in collo.

Pag. 800.

Quas a spinali medulla nervos recipere præstiterat. Græcè legimus: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Hoc est: Quas a spinali medulla colli præstiterat nervos recipere.

Pag. 811.

Porro à scapulæ processibus superna quidē, quæ est ad summitatem humeri (quam quidem à cornu rostri forma *skapulæ* nominant) inter na verò, etc. Codex quidam vetustus habet: *ὡς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς σπονδύλοις τὰς ἐξίχας ἐκτείνει, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς σπονδύλοις τὰς ἐξίχας ἐκτείνει.* Quæ sonant: Porro ab scapulæ processibus superioribus, quo quidem, qui est ad summitatem humeri (quem illi cornuiformem appellat) externo verò, etc.

Pag. 814.

Qui ortus maxima ex parte costæ imæ scapulæ. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Quod nos vertimus: Qui ortus à maxima parte inferioris, quod in scapula est, lateris.

Ibidem paulò inferius.

Qui ex inferiori ore lineæ costæ imæ scapulæ proficiscitur. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Quod est verendum: Qui ex inferiori ora lateris humilioris, quod in scapula est, proficiscitur.

Pag. 816.

Fertur ad humerum. Græcè legitur: *ὡς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς σπονδύλοις τὰς ἐξίχας ἐκτείνει, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις τοῖς σπονδύλοις τὰς ἐξίχας ἐκτείνει.* Hoc est, dorsum. Et paulò inferius, Nicolaus Regius vertit: hoc quidem maximè trahit: cum verendum fuisset: hunc, scilicet humerum, maximè trahit.

Lib. x. iiii. Pag. 821.

Nicolaus Regius: Quæ propter corporis imbecillitatem, aut vitam omniū brevisiorem, Græcè legitur: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* sed legendum nō est, sed ut veritatem: Quæ ob corporis imbecillitatem vitam exquirat breuiem fortitudo. Quippe sententia Galeni est: quæ ob corporis imbecillitatem, admodum brevis vita sapientia erant, aut prædæ etiam fortioribus, quæ animalibus remedium affidui interitus exco graphic naturam, nempe fecunditatem generant.

Pag. 828.

Verum (quod nuper diximus) semina in motu est imperfectior, mas verò perfectior. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Quod est: Carterium (quemadmodū est nuper dictum) quod imper-

fectius modetur semen, si semina: quod verò perfectius, mas.

Pag. 831.

Habet enim in dextro plures flexus variciformes. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Quod est: Etenim sinistres dextro est frigidior.

Pag. 833.

Siquidem fieri potest, vt etiam finitimum à sumina sit profectum. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Hoc est: Procedente enim principio à sumina, fieri aliquando potest, etc.

Pag. 836.

Propagines quasdam ad matricem recta fertur. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Hoc est: ad matricem quæ è dextro est fira.

Pag. 838.

Fieri non potuit quin naturæ ætem admiraretur. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Hoc est: Impossibile est, quasi ibidem ætæ naturæ admiraretur.

Pag. 842.

Insunt autem matrici & corpora musculosa. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Quod est verendum: Insunt autem ei vasa musculosa corpora. Quandoquidem articulus ille, non matricis, sed sperman cum vas, de quo nimirum Galenus agebat, refert.

Lib. xv. Pag. 857.

Nicolaus Regius: Hæc membrana omnibus matricis partibus, quæ sunt intra officia, subiacitur. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Quod est: Atque omnibus matricis partibus, quæ inter officia constituent, duplex subiacitur.

Eadem pagina.

Et verò paululum progressæ. Græcè: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Quod est: progressæ autem parum: vt sensus sit, matricis vasa (non radices arborum, quemadmodum arbitratur interpres) paululū progredientia, per coniugationem coalescere.

Pag. 868.

Ac sicut aut quater non cōcīdē excīdēnt nō suffocaretur, eo certē modo accideret ex quadringentis, verbi gratia, formis centrum imposui. Græcè legitur: *ὅτι τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς μεθυστικῆς τὰς ἀπὸ τῆς σπονδυλικῆς μεθυστικῆς.* Quod dictū videri esse corrupta. Ego verò sic illam verterem: Carterium si ex tribus aut quatuor nō cōmodē excīdēntibus scēbus, vnus impeditur, contingeret vnus sic, ex quadringentis, verbi gratia, centrum profus exingui.

Lib. x. vi. Pag. 879.

Nicolaus Reg. Astuta autem fides corporibus ac tenacibus, vt ipsa perpetuò pinguedine, natura humectet, quæ celeriter in diuturnitate, ac vehemēte laboribus, & caloribus immo modicis excutitur, atque indurcescit, etc. Quo in loco interpres id pinguedinis intelligit, quod de corporibus tenacibus & succis intelligendū est. Annōv quæ Galenus: quandoquidem talia corpora facile per laborem & excutitur & indurcescit (ad id verba illa, *ἐκτείνεται* quæ interpretatur, ex, plane nobis

declarant) naturam illis seu remedium quoddam, pinguitudinem adiunxisse.

Pag. 904

Quocirca & arterie productio, quæ in dextrâ renem prorsumpit, producitur ab arteria superiore quæ ex a. sinistram it. Græcè habetur: *αριστερά η αρτηρία εισέρχεται εν τω νεφρώ*. Quod verum debet. Atq. arterie productio, quæ in dextrâ renem fertur, superiorem habet exortum, quam illa quæ ad sinistram tendit.

Pag. 911.

Tum a parte posteriore in anteriorē. Græcè: *ἀπὸ τοῦ ὀπίσθιου εἰς τὸ πρότερον*. Hoc est, ab anteriore ad posteriora.

Lib. xvii. Pag. 618.

Nicolaus Reg. Quod si ipsum primum mouens
(quod est princeps animæ facultas) reppereris,
musculi rationem instrumenti habebunt: fin ad
os quod ab ipsis mouetur, non, sed hanc effectio-
ris habebunt rationem. Græca dictio accuratius
mentem Galeni exprimit: μέντοι τῶν κινήσεων αὐτῆς
(ἐκείνης τῆς ψυχῆς) ἐργασίας λέγουσι καὶ τὸ πρῶτον αὐτῆς ὅτι
αὐτοὺς τοὺς κινήσεις τῶν μεμνημένων σφύραται καὶ ἀναγκάζει
τὰς κινήσεις. Hoc est Ad primum igitur mouens (que prin-
ceps animæ facultas existit) musculi comparati,
instrumenti rationem obtinent: ad os autē, quod
ab ipsis mouetur, & illi & ratione esse officii.

Pag. 919

[illegible]

Pagina 914.

• Licet autem ipsam perspicuas naturam vel ex
ipsis hominibus. Græcè: *ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀπο-
δείκνυται* ostendi non potest. Quod est: Cernere aut
nunc licet quendam ratiocinatricem naturam,
vel in ipsis etiam hominibus.

Pag. 944

Neg.(quod dixi) contraria de ipsius uulneri
elementa opinio, quam temere quidam posue-
runt, inhaeritis. Quae oratio aures grammaticor-
um offendit. Gerce autem legimus: *uuln de ballo
apertum* attritus *de alio uuln de quod apertum* attritus.
etc. Hoc est: Nisi (quemadmodum dixi) refraga-
tur aliqua opinio, de elementis uulneri conce-
pta, etc. *uuln de quod* siquidem est resistere, refraga-
ta, relinquere.

Eadem pagina.

Non igitur foli medico opus de Vfu partium
est vtile, fed multo eerte magis medico philofo-
pho, qui totius nature scientiam inuenit fibi com-
parare, cumq; oportet his facris initiari. Græce
legitur, *ἡ γὰρ αἴτις τῶν πάντων φύσις νοῦς ἐστίν*. Quid
nos vertimus: Luxta cuius in dagatione nos con-
fenefcere oportet. Licet etiam ad verbum redde-
re: In cuius quidem indagine oportet nos diem
vltimum claudere.

Page 218

† Omnia latina exemplaria habent, vel iaculis infixæ: fortè ob inadvertentiam typographi. Le

gendūmque est, infixis.

Lib. I I I. de placitis Hippocratis &

Plate. Pag. 970.

Adernacus. Cōmuniter reliqui huc ferri videntur. Felicianus: Plerique omnes verò in liſsentiam propendere ac ferri mihi videntur. Graeci codices impreſſi habent: *αἰσὶν δὲ πρὸς αἰσιν* et *αἰσιν δὲ πρὸς αἰσιν*. Ceteris vero quidam habet nō *αἰσιν*, sed *αἰσιν*. Hoc est: Cōmuniter autem mihi videntur homines. Atque ita legendum esse, in primis docet illa Galeni praecedens dictio, *αἰσιν δὲ πρὸς αἰσιν* et *αἰσιν δὲ πρὸς αἰσιν*. Hoc est, cōmunem imprefſum dinationē appellatur Chryſippus, cōmuniū hominū opinionem.

Page 977

Nisi claré Homerus in *his* percenset. Felicianus: Nisi *his* carminib. Homerus exprimit. Græcè: *ὁ ποιητὴς ἐν τοῖς τοῖς ὅμοιαις ἰσχυρίζεται*. Sed corruptè legitur *ὁ ποιητὴς ἐν τοῖς*. Itaq. vertendum est: Claré Homerus (vt arbitror) in *his* percenset.

Lib. 74 Pag. 1090.

Andernacus. Sed temporis spacio animal offenditur, iecore in torius corporis rabem (quasi atrophiam vocant) & pallorem clauscenscente. Felicianus: Iecore, n. debilitatur, sensum animal, morasq; temporis, laesionem in alimento & colore contrahit. Græc. ἀνδρ. ἐν τῷ χρόνῳ θινεῖται καὶ σπῆλαι ἀσθενεῖ καὶ τῷ ἰκτερίῳ, καὶ τῷ ἀσθενεῖ καὶ ἀσθενεῖ. Quæ non veritatem: Sed tēporis spacio animal laeditur, non trimentum visu non promouetur, ac pallidus contrahit colorem, iecore male affecto.

Pag. 1899.

Maxima autem pars, sicut nullum humorem
in animalis particularium nutritione cordi præ-
parare, sed ipsum vniuersum eius speciem abso-
luere, quod vna sit vena que ex iecore aut corde
procedat, altera vero non item contrā enascatur
ex alia ipsorum parte, que elaboratū humorem
in totum corpus deducat. Felicitas igitur verū
nullum humorem in alimentū membrorū anima-
lis cordi præparare, sed ipsum totū humorem for-
mam perficere, inde argumentū maximū habere
possumus, quod vna tantū vena cernitur a ie-
core seu a corde exoriri: nec alia quæpiā ex
alīa parte seu iecoris seu cordis exeat, que humo-
rem ipsum dī fucum in cōcōctum in totum cor-
pus semel traducat. Vterq; aut ipsorum coactus
est cum mendoso codice hallucinari. Legitur au-
tem in veritissimis quodā, *vi pium dicit quālibet*
14 Sententia de vltis capitulis lapidis, vltima 3 pium dicit quālibet
transpiratione autē dicitur pium dicit de vltis dicit quālibet
et opus. Que nos conuenit: Quod cum vna
sit vena que ex iecore in cor pcedit, nulla a-
liā enascatur ab altera ipsius cordis parte, que
elaboratum humorem in totum corpus deducat.

Lib. vii. Pag. 116.

ernacus. Merito igitur gene

ritus in cerebri ventriculo. Feliciusque Verumius
igitur est spiritum hunc in cerebri ventricu-
lis oriri. Græcè legitur: *ἐκ τῶν σπινθηρίων
τοῦ ἐγκεφάλου γίνεσθαι τὸν πνεῦμα*. Hoc est: rano-
nif autē est consonum, hunc spiritū gigni iuxta ven-
triculōs cerebri, etc. Etenim animalis spiritus,

1993

nō in ventriculis cerebri, sed in plexu retiformi, qui iuxta illos est, gignitur unde in ventriculos effunditur, ut illinc, veluti ex quibusdam fonticulis emanans per nervos, in universis animalis partibus motum atque sensum largiatur.

Pag. 1146.

Quemadmodū gustus humores. Felicianus:
Sicut succo cognatus. Græcè legitur: *habinp
yhu* & *xyrip*. Hoc est. Quemadmodum gustus
sapores. Ait enim visum colores sentire, prout
ut gustus sapores percipit.

Ibidem.

At coloratum corpus simul cum eo cognoscit, quem admodum gustus quod humores ob-
tinet. Felicitas: Cum illis yero posita colorata
corpus, sicut gustus id quod succos in se ha-
bet, Græcè *χρῆσις τοῦ σώματος τὸν ἴδιον*. Quod
est. Quem admodum gustus id quod faepores co-
ninet : *κατὰ τὴν φύσιν*, non modo humorem, sed
faeporem etiam crebro significat.

Pag. 1154.

Quemadmodū & tactilis sensus instrumenta
sensui renixu. Felicianus: Quemadmodū verō
sensus tactus sensilia per cōtactum. Græcè ἀπὸ
τῆς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἀνιστάνου ἀνιστάνου ἀνιστάνου. Quod
est: Quemadmodum tangendi sensus sensilia,
per renixum.

Ibidem.

Humorum digno corruptur. Felicianus:
Succorum digno etiam interit. Græcè: ἀσπλ
ρτα τῶν χυμῶν ἡ ἀφύρσις. Quod est: Corruptur
succorum digno.

Page. 166.

[illegible]

Lib. 18. - Pag. 1138.

Andrenæus: Itaq[ue] scopi secundum quos singula hæc recte alio aggrediar, omnino pauci sunt: nempe in ipsa exercitatio, quæ non parum temporis requirit. Felicitas: Fines igitur quibus singula hæc recte aliqua tractare possit, profus pauci sunt: exercitatio scilicet, quæ rationem parvo tempore videtur indigere. Græce legitur: *οἱ ἀπὸ τῆς ἀσκήσεως οὐκ ἐκ τῆς ἀσκήσεως ἀπὸ τῆς ἀσκήσεως οὐκ ἐκ τῆς ἀσκήσεως οὐκ ἐκ τῆς ἀσκήσεως*. Quod si vertezum: Scopi igitur secundum quos singula hæc recte tractare quis possit, omnino sunt pauci. In ipsis autem exercitatio, haud exiguum tempus desiderat.

SECTIONE
SECUNDA.

*Lib. Num ars tuenda sanitatis ad medi-
cinalem artem spectet.*

Page 4

1 Vnius Paulus: Ad nervorum tutorem. Græcè;
 & *νευρίτης*. Hoc est: ad illum qui nervis cōsultit.

Page 14

Sic vertitur aut pervertit potius carmē Homeri:
Dignior est questu medicus mortalibus iras.
 In aliis tamen exemplaribus legitur, doctiori
 Vrbique autem sententia poetæ est corrupta.
 Græcè siquidem legitur:

... ..

Cuius sententia est :
Veniens ex illis, p[er] se tamēn omnia collens .

Page 44

128. 44.
Duabúsq; artibus præpositis hæ singulæ de-
seruit. Græcus antiquus habet: *ἡ δὲ ἀρχὴ τῶν ἀρ-
τῶν ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων*. Hoc est. Duabúsq;
artibus separatim harum singulæ inseruiunt.

Lib. I. de alimentorum facultatibus.

Page 40

P^{ag.} 59.
Martinus Gregorius. Deinde affigentes. Gr^{ec.} *αἰσθητὴν καὶ ἀσθητὴν*. Hoc est: Ac deinde circunlinites. Monei siquidem illi Galenus, ut posteaquam cauterat cydonii malū repleuerit scammonio, malum ipsum obducat, atque circunlinitas, luto videlicet, aut fermento: ac dein affemus. Qui modus observatur hodie in preparando scammonio.

Pag. 61

Et omnium maxime per alium subfidet. Gr̃c.
 ὅτι ἡ μέγιστος τῶν ἀλλῶν ἐμψύχων ἀνὴρ ὑποτίθεται. Quod
 vertetur: Inter ceterosq; maxime per aliu de-
 scendit.

Lib: 16. Cap. de fugacibus fructibus.

Page 10

72 *Martinus Gregorius.* Viuntur autem omnes
ipsa (cucurbita scilicet) magis quam alio quouis
fructuum esculentorum, quod ceteris fructibus
sint aridiores ac sicciore. Hoc tamen non repe-
ritur in græco exemplari: nec videtur etiã ratio-
nabilis: cum cucurbitæ, nulli aut certe pau-
ca aliorum fructuum, humiditate cedant.

Page 1 - 98

Læditur autem maxime ab ipsorum esu, quod
aut inflammatur, aut scirrhus obducitur. Græci
dicuntur autem esse præparatum, cum omni præparato læditur
et non læditur autem. Quod est? Extreme autem ab ip-
sorum (palmarum videlicet) esu læditur, si ob-
ducitur phlegmone, aut scirrhus fuerit. Neque enim
tamen periculosum, aut esse fructum palmarum Gale-
ni, ut ex solo ipsorum esu possit hepar aut in-
flammationem, aut scirrhum contrahere: etiam
inflammatum; aut scirrhus induratum hepar, ab
esui phlegmone maxime oblati pronuntiatur.

... 5

Martinus Gregorius: Quoniam non temere
in ventriculo cuiusqu coastalur. Græcè: *Ad hanc
sententiam nonnulli addunt illa verba: Quod est*

proinde raro alicui fuit coagulatum in ventre.

Lib. de euchymia & cacochymia.

Pag. 107.

Erduinandus Balamus: Haud sane exquisitis admodum cibus vratur. Græcè: *ἐὶς τὴν ἀκαθάρτην καὶ ἀκαθάρτην*. Hodeit: Nec cibus admodum exquisitus indiguit.

Lib. de cognoscendis curandisq; animi affectibus. Pag. 175.

Bernardinus Donatus: Nec ramentum illud dixim melius esse, etc. Est tñ codex corruptus, qui sic iustaurari debet: *ἡ δὲ τοῦ ἀνθρώπου ἀκαθάρτης*, etc. Quod nos vertimus: Nisi forte melius esse videatur, initio, etc.

Pag. 181.

Magnum quippe fuerit credo, si nullus eorū moderatur in cibo & potu sumendo sit visus. Quod si te ipsum hoc honore afficere decreuisti, etc. Græcè habetur: *μὴν γὰρ καὶ ἄλλοι καὶ πολλοὶ ἄνθρωποι οὕτως ἔχουσιν ὡς καὶ ἐγὼ*. Quod est: Magnum quippe non fuerit si in cibo & potu illis temperantior videaris. Sed si te hoc honore afficere decreuisti, etc. Vult namq; eo in loco Galenus (id quod paulo pōt subdit) ut nō ceteros modō, sed nos etiā ipsos vincamus, modestius nempe, & continentius viuentes hodie, quā heri.

Pag. 191.

Ac per hoc ipsum præceptum singulis diebus in singulis huiusce operis partibus, nos ipsos exerceamus. Quod quidem cūm ceteris ex puerili disciplina cōingat, aliis illis, quibus in hoc fortuna non fuerit, serō tandem ea ratione quam exposui, contingit. Græcè habetur: *τοῦ δὲ κατὰ τὴν αἰσθητικὴν ἡλικίαν ἀναστρέφοντος ἀνθρώπου οὕτως ἔχουσιν ὡς καὶ ἐγὼ*. Quod est: Quod est veritendum: Ceterū si operibus particularibus circa hæc præcepta singulis diebus se exercent, quod quidem ex prima educatione cōnngit ceteris, id infelicibus illis poſtea tandem cōtingit ea, quam exposui, ratione.

Pag. 196.

Enim exiis in quibus ipsa se exercuerit, multo exultit generosior. Quo in loco reddendo, interpretes est græcam phrasim secutus, quæ habet: *ἡ δὲ ὑποφύει*: id quod præstitit vertere: Eo quod se exercuerit.

Lib. I. de sanitate tuenda.

Pag. 145.

Linacem: Nempe per nates genasq; Græcè: *κατὰ τὴν ῥίνα καὶ τὰς ὤφθαλμους*. Hoc est: Iuxta nates & palpebras. At namq; Galenus, oculum exprodere quicquid in eo extremēti gignitur, nō per nates, sed per foramen quoddam, quod in angulo interiori oculi, iuxta nates, intra palpebras consistit, quod in oculorum anarome satis superque iam demonstrauerat.

Lib. II. Pag. 335.

Linacem: At procedere tempore, ubi iam adoleuit. Græcè: *ὅταν ἔσται περὶ τὴν ἀκαθάρτην*. Quod est: Vbi iam adoleuit.

Pag. 441.

Frigidi oiang succi marcorem. Græcè: *τὸν πικρὸν*

πικρὸν τοῦ σπέρματος. Hoc est: Frigidi enim, sopores & proluciores somnos inducunt.

Lib. v. Pag. 476.

Linacem: Hæc facies, ubi naturalem planē habitum crura percipiunt. Græcè: *ὅταν δὲ τὰς αἰσθητικὰς ἡλικίας ἀναστρέφοντος ἀνθρώπου οὕτως ἔχουσιν ὡς καὶ ἐγὼ*. Hoc est: Hic ubi perficiunt, si exacte secundum naturam se habeant crura.

Lib. I. de simplicium med. facultatib.

Pag. 181.

Theodoricus Gerardus: Verū ei q eodē sensu cōmunicat, licet suggerere. Græcè: *ἀνὰ πᾶσαν τὴν τοῦ σώματος ἀκαθάρτην καὶ ἀκαθάρτην*. Hoc est: Recordari autē eum, cui talis sensus fuerit cōmunicatus, posibile est. Galenus itaq; ait, impossibile quidē esse, ut exacte quis interpretetur differentias astringens, austeri, atq; acerbis saporis: fieri autem posse, ut recorderet illorum, ubi talia semel gustari.

Lib. III. Pag. 638.

Theod. Quod si ad id nō nihil faciat ipſius raritas. Græcè: *ἐν τῇ σκότητι καὶ τῇ σκότητι*. Hoc est: Cōducit itaq; ad hoc etiā ipſius raritas.

Lib. III. Pag. 698.

Theod. Diuersa tamē hæcenus viribus omphacis acetiſ succus constant. Græcè habetur: *ἀπορρογὴν πικρὸν καὶ ὀξύφιον καὶ τὸν τοῦ σπέρματος*. Quod est: Eatenus autē facultate differt ab aceto omphacium.

Pag. 699.

Enim ad hypochondria ardentia, præstantior est succus omphacis, quā aceti. Græcè: *ἡ δὲ σκότης*. Hoc est: Præstantior est ipſo aceto. Nam aceti succus non datur præter ipsum acutum. Exprimatur autem ex vna immatura, cuius cremor appellatur omphacium.

Pag. 704.

Ac partim in hac coniugatione. Græcè: *καὶ τὸ πικρὸν καὶ τὸ ὀξύφιον*. Hoc est: Atque hæc quidem, in hac temperamenti coniugatione.

Pag. 711.

Omnia saltem curi nostræ imposita. Græcè: *ὅταν δὲ ἔσται*. Quod est: Omnia igitur, etc.

Lib. v. Pag. 731.

Theod. Tantōq; siccius, quantō vincti siccitas. Græcè habetur: *τὸν τοῦ σπέρματος καὶ τὸν τοῦ σπέρματος*, etc. Quod est: Eatenus autem humidius, quatenus siccitas superat.

Pagina 734.

Ex familiari animantis natura fiat alteratio. Græcè: *ἡ φύσις τῆς ψυχῆς καὶ τῆς σαρκὸς*. Quæ sonant: Ex propria animali materia ipsam alterationem fieri.

Pag. 754.

Alia verō ex putrescente arescenteſ generationem sortita. Græcè: *ἡ φύσις τῆς σαρκὸς καὶ τῆς ψυχῆς*. Quod est: Hæc autem, a putredine exasperante ducit originem.

Lib. VI. Pag. 799.

Theod. Idcirco mihi videntur veteres coronis ex eo plexis vti solere. Græcè additur: *καὶ τὸν τοῦ σπέρματος*. Hoc est: in conuiuiis.

Pag. 807.

Equidem vidi puelum, quandoſ octo totis mensi-

IN GALENI INTERPRETES

mentibus morbo comitiali liberum. In greco exemplari additur: *ἵσθι δὲ ἵσθι ἵσθι*. Hoc est: Ex quo tempore, vel quando radicem ipsam gestauit.

Pag. 819.

Ceterum licet zingibet & piper album. Græcè legitur: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Et piper longum.

Pag. 820.

Cui accedit & ea quæ ex salis est farinæ natura. Græcè: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*, *ἡνὶ ἢ ἀντὶ τὴν ἡν*. Hoc est: Et ea quæ ex salis est, & ea quæ ex farinæ natura.

Pag. 824.

Sicvri sanè etiam coitus semen pudendo circuncilira. Græcè legitur: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Coitus tempore.

Pag. 825.

Sed quæ illi amaritudinis dū potantur adfunt opera. Græcè: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Sed quæcumque amarissimo pharmaco, dum bibitur, adfunt opera, etc.

Pag. 830.

Quinq; partibus succi plus erat. Græcè: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Quod magis appositè vertitur: Ad vtrunq; autē succi portio erat quinta.

Pag. 866.

In semine quidem viuente habens qualitatē acidam. Græcè habetur: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Iuxta semen, vel circum semen. At quippe Gale nus id qd res est: nempe quicquid in mīlo Medico, siue citrio, iuxta semē adhæret, & vnde exprimitur succus, cum acore quodā ficcare. Quā doquidem semen citri minime talem facultatē fortiri, vel ex gustu intelligi poterit.

Lib. viii. Pag. 873.

Theod. Piri quidē silyuestris prorsum atq; absolute amarus est: scilicet fructus. Græcè habetur: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Acerbus.

Pag. 875.

Veluti & chartæ combustæ cinis, nisi quatenus infirmior est, q̄ papyri. Græcè: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Quod est: Nisi quatenus cinis papyri est infirmior. Cui lesioni suffragatur Paulus, cuius verba sunt hæc: Ad singula tamen papyri cinis multo inferior est.

Pagina 884.

Non tamen nec resiccare, nec refrigerare manifestò potest. Græcè: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Quæ sonant: Ceterum nec resiccare, nec humectare manifestò potest.

Pag. 887.

Caries lignorū, & maximè quæ particeps est astrictionis. Græcè: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Caries lignorum, eorum maxime, quæ astrictione sunt prædita.

Pag. 889.

Nōnullā itēm amarā qualitatē obinet. Græcè: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Quod est: Nonnullam itēm æquem qualitatem.

Pag. 899.

Sion quantum gustu odoratum est. Græcè: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Quæ sonat: Sion quatenus gustui vtriusq; aromaticum est, etc. Nihil siquidem est odoratum gustui, sed ipsi tantū olfactui. At quæ aromatica sunt, ea simul mouent olfactum & gustum.

Pag. 905.

Et nimirum habet humiditatis. Græcè habetur oppositum: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Et minimum habens humiditatis.

Pag. 906.

Phorbi semine ad leucomara cum melle applicant. Græcè legitur: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Vnumur.

Pag. 916.

Ceterū vtriusq; in medio est spumalini. Græcè habetur: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: In medio autem amborum est nitri sapor. Nam cim paulo superius disputasset de sapore rum aphronitri, rum salis, postea subdidit, inter illos mediam nitri saporem consistere.

Pag. 918.

Dictum tamen paulo antè est, aphrolitrum in medio consistenter habere facultatē aphronitri & salis. Corrigi est codex græcus mendosus debet, qui habet: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. quādoquidē esse legē dum *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*, hoc est, nitri, ex capite de sale liquido cōstat.

Pag. 922.

Quæ in editionibus domori, in quibus fornaces extructæ sunt, paribus colligitur. Græcè: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν* (sed legendum *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*) *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Quæ in editionibus paribus parietū ipsius fornacis colligitur.

Pag. 981.

Quod patientis in quibus, Græcè legitur: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Iliis.

Pag. 1000.

Capitibus maximo sale in veteratarum, ad sedis fissuras utebatur quidam. Græcè additur: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Hoc est: Vitis.

Pag. 1004.

Novi autē nostratū quosdam ossa potui exhibuisse. Græcè legimus: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*, *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Quod est: Novus quidē nostratū quosdā, propinantes humanā ossa cōbusta.

Pag. 1006.

Porro si laueris ea, viscerisq; ignea in aquā natura depōita, ipsam efficiunt cum tenuitate calefacientem, ad eō v̄t & putrefaciat. Quod est: Nonnūquā reliquum terrenum est, morius expers: id quod maxime implendis, cicatricēq; claudendis vlceribus humidis est vtile. Græcus codex manuscriptus habet in hūc modum: *ἡνὶ ἢ παρὰ τὴν ἡν*. Quæ sic nos vertimus: Quod, si ea, vbi exvta fuerint, laueris, quicquid habebant igneam, id totum in aqua ponunt. Ac proinde aqua quidem ipsa, ex calfaciens cū tenuitate redditur, adeo v̄t putrefaciat interdum. Reliquum verò terrosum, morius expers efficitur, maximeq; implendis, & cicatrice claudendis vlceribus humidis auxiliatur.

SECTIONE

TERTIA.

Libro de causis respirationis.

Pag. 35.

Cornarius: Sic enī circa costas musculi, quorū in medijs ipsius regionibus duo et viginti

K K

numerantur, duo quidem primarum collatum.
Graeci codices antiquissimi habent in hunc mo-
do: *ἑνὸς αἰὶς ἐπὶ τῆς κατὰ πρῶτον ὁδοῦ*, ἢ *ἐπὶ τοῦ πρώτου
ποταμοῦ*. *αὐτοῦ δὲ αἰὶς ἐπὶ τοῦ ἀρκυροῦ ποταμοῦ*; ἔπειτα *ἐπὶ τοῦ
ἐκείνου ποταμοῦ*. Quae in hunc modum nos
veritatem debemus collatum musculi, qui qui-
dem in medijs regionibus ipsarum cōfluunt, nu-
merantur viginti duo : ac praeterea duo alii pri-
marum collatum. &c.

Ibidem.

Ex dictis vero circa spinam musculis. Græcè: *εἰς τὴν σπινὰν καὶ αὐτὰ τὰ ῥαχιαία*. Quod est: Ex rectis vero, qui iuxta collum consistunt.

Ibidem.

Qui demum circa superiorem ventrem sunt
musculi. Græci: *di antra troygus*. Hoc est: Qui
verò in abdomine, siue epigastrio sunt musculi.
Etenim superior ventris Galenus sæpe vocat
ventriculum: Epigastrium autem, est tota illa me-
brana carnea, quæ molem intestinorum conti-
net, ex cute, pinguedine, quæ mor obliquæ,
duobus transversis, totidémque rectis musculis
constat.

Identent.

Violentæ verò, tum fima humerorum, tum interna mediarum costarum pars. Græcè legitur: *βίαιαι δὲ εἰσι κατὰ τὰ εὐρέα τῶν ὀστέων, καὶ ἐν τῇ μέσῃ σκαπούλει.* Quæ sonant: Violentæ verò, tum fima scapularum, tum musculorum intercostalium interna pars.

Ibid. cm.

Similiter autem & expirationis, in violenta quidem, musculi circa superiorem ventrem: violente verò, externa mediarum costarum pars. Græci habentur dīnēme di ēgēte harrōtē alēti pēo, di nārā tēyē qd pōitē fūdiōe di, tēy pōrētētiōē, di lēvō pōipō. Quod est: Similiter enim & expirationis, in violenta quidem, musculi ab domina: violente verò, muscularum intercostalium exterior pars.

Lib. I. de difficili respiratione.

Pag. 18.

Ornarius: Iuxta quæ, aut veloces, aut tardæ
appelluntur. Græcè: αὐτὰς ἱερὸς ταχὺς, ἢ βραδύς
καὶ ἀνεστῆς. Quod nos veritimus: Iuxta quæ, velo-
ces aut tardi dicuntur motus. Quippe voces il-
læ, ταχὺς καὶ βραδύς, referuntur ad τὸν κίνητον, hoc
est, ad motus de quibus Galenus paulo supe-
rius erat.

Similiter ubi paulò inferius Cor-
narius venit.

Secundum quas aut magnas, aut parvas appellant. Vertendum erat: Aut magni, aut parvi appellantur.

Pag. 11.

Vilicate multum vrgente. Græcè habetur: *ἐν πολλῇ ὀργῇ*. Quod est. Sufficenter vrgente.

Pag. 11.

Sed si utilitas multum sit exoluta. Græcè: ἀνα-
 λυσις λαμβάνει τὴν ὑπόκεινται. Quod est: Ceterum
 si quæ ad vñum pertinent, exoluta sufficien-
 ter fuerint.

Ibidem.

Eius videlicet: quæ circa expirationem con-

filiis Græcè : *Autentes eip' epi' tō' dōxōtō' mōnastē-*
roy. Quod est : Earum videlicet, quæ circa inspi-

Ibidem consequenter.

² Quare immodestia. Græcè: *ἀνέφρονος* est *ἀνέφρων*. Quæ sonant: Quemadmodum etiam immoderatio.

Ibidem.

Atque ita sanè esse, ratio ipsa pollicetur: repugnat autem quippiam eorum, quæ evidentior apparet. Græce legitur *ἡ δὲ εἰς τὴν ἀπὸ τῆς αἰτίας ἀποδείξεως* *ἡ δὲ εἰς τὴν ἀπὸ τῆς αἰτίας ἀποδείξεως*. Quod est: An igitur sic ratio pollicetur, repugnat autem quippiam eorum, quæ evidentior apparet: sic autem esse legendum, atque vertendum, indicat oratio subdita, ubi Galenus ait: Ego quidem omnia hæc consensientia reperio.

Pag. 44

Nulla est autem differentia, quod ad id quod coarctatum est attinet, ut pulmo nō possit, &c. Græcè: *οὐκ ἔστιν ἀλλοίωσις τοῦ πνεύματος ἐν τῇ στήθι καὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ*. Quæ clarus vertatur sic: Perinde autem est, ad hoc ut pulmo compressus non possit, &c.

Page 40.

Contractiones itaque thoracis citra horum
concentrationem, nonnuncquam magnam inspira-
tionem facere possunt. Græce habetur: *αἱ ἀπὸ τῆς
ἐν τῷ στήθει συστολῆς ἐκτετακται τῆς αἰσθητικῆς
ἐν τῷ στήθει συστολῆς. ὅθεν ἔκτληται ἡ ἐν τῷ
στήθει συστολή.* Quæsonant: Contractiones
sane thoracis citra horum concentrationem, non-
quam magnam expirationem facere possunt.

Pag. 14.

Quamquam & adhuc eximium quiddam ad
inæqualitatem erat generationem respirantem
habebit, præter pulsum rationem. Græcè: *ἡ τοιαύτη
ἀνὰ τὴν ἀσυνέτην γένεσιν ἔσται αἰσθητὴ ὑπὸ τῆς ἐπο-
νόας*. Quod est: Quicquid abundans quid, ac ve-
luti fluctans, ad inæqualitatem generationem
respirantem habebit, præter pulsum rationem.

Page 45.

Nimirū quod & vīsa aliquādo plus, aliquādo minus, rationem ab eo quod secundū naturam est, amoveant. Ego verō, non vīsa, sed cum græco potius phantasmata verterem.

Lib. 112. Pag. 105.

Cornarius: Propterea quod per distantia organon respirationis fit motus. Græcè magis per spicua essentia: *Aires nati sunt in parte & in parte deorsum deorsum aliter.* Quod vernius: Quia per distantiam organa respirationis mouentur.

Page 111.

Densus & magnus fit spiritus. Græc: *ωκεανος*
ωκεανος *ωκεανος* *ωκεανος* *ωκεανος*. Hoc est: Densus & par-
vus fit spiritus.

Pag. iii.

Densum autem & magnū cum, qui inflamma-
tione respiratoriorū organorū indicat, haud
quaquam quis dixerit, nisi et calidus esset, ut
Graeci legimus: *si de venter qui magnus, et si pharynx
& aures et trachea hyemum inflantur, hoc est densum et magnū*
&c. Quod verumus: Densum autem & magnū
indicare incendum organorum respirationis,
nemo recte dicere posuit, &c.

Lib.

IN GALENI INTERPRETES.

Lib. de usu pulsuum.

Page 141.

Inter: At quomodo igitur ex pulsu maxime
presagimus. An inquit, minime quidem vt
ex causis id genus, quæ plurimum momenti ha
beant: imò vt ex opportunitis signis. Græcè: *ωσ
τὸν ἐπισημαίνον τὸν ἀντιπαραπληροῦν, ὅτι διὰ τὴν ἀντι
παραπληροῦν, πρὸς τὸν ἀντί, ὅτι διὰ τὴν ἀντιπαραπληροῦν.* Hoc
est: Quomodo igitur ex pulsibus maxime præ
cognoscimus? Minime quidem vt ex causis ad
modò efficiæ causibus, aliquis dicere possit: sed vel
ut ex opportunitis signis.

Page 141.

Quominus mirum est, quum exigui illi cō-
modum ex corde suggeratur, si ingularibus ve-
nis vinculo exceptis, exiguum quoque sentiat in-
cōmodum, Græcè legitur: τὸν καρδιᾶς ἀρτηρίας
ἐκτρέφει τρεῖς ἀγγεῖα. Hoc est: Carotidibus
vocatis arteriis, vinculo exceptis.

Lib. I. de differentiis pulsuum.

Page 185.

Hermanus Crutius. Atque inter septende-
cim hos pulsus, qui ex trina dimensionibus
constant. Græce legitur. *Septem & viginti
pulsus*. *Septem & viginti pulsus*. *Septem & viginti
pulsus*. Quæ nos vertimus: Quum iraq
hi septem & viginti pulsus habeant, qui secun-
dum quantitatem in trina dimensione consti-
tunt.

Pag. 199.

Certe bifaria, aut triplici proportionē. Græcè: *διπλῆς καὶ τριπλῆς ἀνάλογου*. Quod est: Aut multipli proportionē.

Page 101.

Cuius delapsum a primo distentionis termino, nulla dirimit manifesta quies: Græcè legitur: *ἐπὶ τῇ διαστολῇ αὐτῆς ἀνέβη τὸ πνεῦμα*, etc. Quod est: Eius autem delapsum a primæ dilatationis fine, etc.

Pag. 111.

Si iam moueri omnes simul coeperint. Græce: $\alpha \beta \gamma$. Quod est: Si igitur.

Ibidem.

Non ramen in secunda contineatur, sicut nec
ipsum rhythum. Graece: *ἡ δὲ ἐν τῇ 2ῃ δεξιᾷ τῇ
ἐν τῇ 1ῃ δεξιᾷ ἐστὶν ἡ δὲ ἐν τῇ 2ῃ δεξιᾷ ἐστὶν*. Hoc est: Non
ramen in secunda consistat, sicuti neque ipse rhy-
thmus.

Ibidem.

Tempus enim partis quæ præter ceteros prima motu deficitur minimū est. Græcè habetur: *ἡ πρώτη μοῖρα τοῦ χρόνου ἐστὶν ἡ ἐλάχιστη μοῖρα τοῦ χρόνου*. Quod est vertendum: Tempus enim partis, quæ prima omnium moueri desinit, minimū erit.

Ibidem;

Et item rhythmus in singulis cōmutatur. Græcè: *ῥυθμὸς ἑστὶν ἡ ποσὶς, etc.* Quod est: Atque in hunc modum rhythmus, etc.

Page 211

Iam verò, ubi vna omnes partes moveri co-
gerint, motus æquo fiat tempore, si altera di-
stentionis non idem omnes initium partes or-
diantur, etc. Græcè tamen magis perspicua est

sententia: *vis dilatorias ditionibus non dicitur modo a se
per vis ditionis argui non potest.* Hoc est: Secundæ au-
tem dilatorias non idem omnes initium par-
tes ordinatur.

Fig. 314.

Non potest esse in vitroque genere inequalitas. Græcè: *οὐκ ἔστιν ἐν τῷ γένει ἰσότης*. Quod est: Necessario in vitroque genere sit inequalitas.

Ibidem.

Non sit autē prioris finis distentionis in omnibus æquis. Græcè: ὁ ἄριστος ἔστι πρῶτος διανοίας πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἴσους. Quæ sonant: Finis autem prioris dilationis non sit omnibus æquis.

Lib. 11. de differentiis pulsuum.

Pag. 192.

Herm. Siquidem quantitas unius dimensionis, nō magnitudo, sed longitudo est. Græcè habetur: *ἡ γὰρ ἡμῶν ποσὶς ἀπὸ τῆς μήκους, etc.* Quod nos facit maluisse vertere: Etenim quantitas unius extensionis, etc.

Page 119.

Nam longum quidem pulsum, nisi aliqua co-
iuncta sit profunditas & latitudo, non esse pos-
se, nemo causam dicit. Glaryus id graeco habet
turbidum *ἡ δὲ σφὴν τῶν ἰσχυρὰν βάσεων καὶ πλάτους τῶν ἀκρίων*
ita magis etiam exprimit. Adde autem *ἡ δὲ σφὴν*. Nempe: Quod
igitur abique aliqua rum altitudine, tum lati-
tudine, pulsum longum nequeat consistere, con-
tradictum nemo.

folgt aus dem allgemeinen Satz, dass

Page 264

Herm. Quā in secūdo libro inuentorū. Græcē
λεξις τῆς αἰσῆς. Quod est. In pennis

quod est: in
Ibidem

Etenim nō mutatas oportebat nominū significationes. Græcè habetur: *αὐτὰς ἵδων πρὸς τὸν οὐρανόν*. Hoc est: Etenim retrahere oportebat significare nomen.

Lib. I. de dignorione pulsum.

Page 175.

Herm. Quinetiam calor qualitatis, occurfus arterie motu excitatur apertius animaduertitur. Gracæ: *ἡ δὲ θερμότης τῆς ἀρτηρίας ἐκ τῆς κινήσεως ἐκτείνεται*. Quod est animaduertitur in motu arterie. Quod est Quinetiam qualitatis caloris, impulsus ille, qui in motione arterie contingit, apertius in dicat. *propterea* siquidem non modo cognoscere, sed ostendere, & indicare significat. Vnde *propterea* semper accipiuntur pro indicis & notis. Adhuc arterie occurfus nunquam animaduertitur differentiam aliquam pulsus, sed intercedente impulsu, tactus nonnisi singulas deprehendit.

Lib. II. de dignatione cultuum.

Pag. 176.

Herm. Etenim si quo videtur arterias maiores habere homo qui cōparatur, hoc maiorē etiā habeat distentionē. Græcē legitur: α ἡ, γὰρ ἰσχυρὰ. Hoc est: Si enim quātrō videtur arterias maiores habere, tantō maiorem etiam, etc.

Ibidem.

Aut sit maior, Græcè: *ἐὺν μέλει* ἢ. Quod est: Aut sit minor.

Lib. III. de dignotione pulsuum.

Page. 431.

Herm. Quæ enim ita sint, optimam rationem dā-
bimus operam ut inonstremus dignoscēdārum
singulārum dimensionum: ac de prima dicemus
longitudine. Græcè habetur: *ἡ δὲ τῆς ἰσχύος*
ἡ δὲ τῆς ἰσχύος ἡ δὲ τῆς ἰσχύος. Hoc est: Quandoquidem igitur hæc ita
habent, danda opera est, ut demonstremus mo-
dum optimæ dignotionis in dimensionibus sin-
gulis. Ac primò sanè de illa dicamus, quæ versā-
tur circa longitudinem.

Lib. I. de causis pulsuum.

Page. 438.

Herm. Causæ quæ pulsus variant, partim gene-
rationis eorū sunt, partim tantū alterationis.
Græcè habetur: *ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Quæ sic multo aptius vertuntur: Causarum
quæ immutant pulsus, hæc quidem generationis
sporum sunt causæ, hæc verò tantū alterationis.

Page. 439.

Et quæ his succedunt externæ. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Hoc est: Et præterea
quæ harū sunt procatartice, præincipienteve.

Ibidem.

Ac quæ nunc commemorauimus, externæ ap-
pellantur. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Quod est: Hæ igitur, quas nunc
recitauimus, procatartice causæ appellantur.

Ibidem.

Quæ has etiam præcedit, quæ quidem in hu-
moribus sunt, præcedentes. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Quod est: Quas verò ante has, illæ nempe quæ circa
humores versantur, antecedentes, &c. Multo
autem clarius assequens Galeni sententiam, si
hanc orationem cum superiori coniunxeris, in
hunc modum: Hæ igitur quas nunc recitau-
mus, procatartice causæ appellantur. Quas ve-
rò ante has, scilicet exposuimus, antecedentes,
&c. Nam putare quod præcedentes vocatæ, pro-
catarticas vnquam præcedant, hominis planè
fuerit Galeni dogmatis minimè exercitati. Si-
quidem præcedentes causæ vocatæ coniu-
ctas gignūt, sic ipsæ gignuntur à procatarticiis.

Ibidem.

Breuius sic habeto: Quæcunque extra cor-
pus posite quicquam in corpore alterit, exter-
næ vocantur. Quæ has etiam antecedunt, præ-
cedentes causæ corporis affectuum. Hi affectus
vbi continentes moueant, euadunt præceden-
tes illarum causæ. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Quæ so-
nant: In vniuersum autem, quæcunque extra cor-
pus posite, aliquid in corpore immutant, pro-
catartice causæ, siue præincipientes vocantur:
utpote incipientes prius quàm ipsæ dispositio-
nes corporum. Quæ quidem dispositiones, si
quando excutiantur continentes, ipsarum an-

tecedentes causæ redduntur.

Page. 432.

Quum ex his causis pulsus profisciscantur, o-
mnes illorum variationes, causarum necesse est
comites sint alterationum. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Quæ clarius
interpretes in hunc modum potuissent reddere:
Cum autem secundum has causas fiant pulsus,
necessum est ut omnes mutationes ipsorū, con-
sequantur ad alterationes causarum.

Page. 432.

Sed de his qui ambigunt, perinde ac Archige-
nes erant, qui in Magnum disputat de pulsus
celeritate. Nam à robore nō potius quàm ab im-
becillitate profisciscitur facultatis. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Hoc est: Cæterum quæ de his dubitant, in
eundem cum Archigene errorem incidunt, qui
in Magnum disputat de pulsus velocitate, quod
scilicet nō à robore potius, quàm à languore fa-
cultatis profisciscatur. Sic autē esse verum dū, col-
liget Candidus lector ex alia castigatione quā
subdam.

Ibidem consequenter.

Nam neutrum sequitur necessariò, artem
peculiaris celeritas robori facultatis est. Vbi le-
gitur Græcè: *ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Quod est
Magis tamen est familiaris celeritas quidem ro-
bori facultatis, atque caloris copix. Itaque Ga-
lenus Archigenem impræsentiarum causatur,
quod contendit pulsuum velocitatem non
magis à robore, quàm ab imbecillitate virium
procedere: quum ipsa pulsus celeritas facultat
vegetæ, quàm imbecillæ, magis sit familiaris at-
que genuina.

Page. 439.

Celeres dicimus pulsus, itēque tardos esse,
non ægrotis modò, verum etiam valentibus non-
nullis. Quod naturaliter quidem lis confirmā-
mus suppeditare. Clarius tamen percipitur sen-
tentia Galeni ex græco exemplari: *ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Hoc est: Celeres
itaque, ac similiter tardos pulsus, non ægris mo-
dò, sed inter sanos etiam, naturaliter nonnullis
adesse dicimus.

Page. 430.

Semel quidem certè tardi, vel parui, si valida
facultas sit, ut multum sit visus remissus, nunquā
fiant. Græcè: *ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς*
ἡ γὰρ τῆς γενέσεως ἡ γὰρ τῆς γενέσεως. Quod est: Absolutè enim tardi, vel parui,
haud vnquam euaserint pulsus, facultate vegeta
existente, vel si quæ ad vsum pertinent, admo-
dum exoluta fuerint.

Page. 434.

Paulò enim celerior pulsus est, ex mollitudi-
ne perfectus instrumentorum. Legendum ta-
men est iuxta græcam veritatem, non perfectus,
sed profectus. Quippe ob in aduertentiam ry-
progra-

Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quod est: Penuria enim ipse nutritio in extinguitur, etc. Non autem omnis difficultas nutritio, etiam penuria exiit: quum alimētum vino sum, difficultatem quidem importet, penuriam verò non item.

Ibidem.

Quem marcorem Philippus vocat ex morbo senium: quem ferè habent senescentes, & interrim iuvenes etiam. Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Hoc est: Philippus hunc marcorem vocat ex morbo senium. Atque invadit præcipue quidem: iam senescentes. Interdum autem, & consuetudine ætate.

Page. 511.

Iam verò etiam magis inæquales eos meritis esse, ne hoc quidem est obsecutum. Græcè additur: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quod est: Ob viciniam.

Ibidem.

Longe enim frigidior, & ut ita dicam, letalior peripneumonia est morbus lethargicus. Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quod est: Longe enim frigidior, atque (ut quis dixerit) perniciosior est morbus lethargicus peripneumonia.

Ibidem.

Si item hoc teneas, lethargum ex ipso potius cerebro, phrenitim præcipue gigni ex tenui meningi, & ex septo transverio. Græcè habetur: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quod est: Si notis autem, quod lethargus quidem gignitur potius in cerebro: phrenitis verò, præcipue in eius tenui meningi, atque etiam in diaphragmate. Lethargus itaque non ex cerebro, sed ex pituitoso humore collecto in cerebro: ut phrenitis non ex tenui meningi, sed ex bile in illa acervata, suam ducit originem.

Page. 519.

Connivent ferè oculus. Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quod est: Ut plurimum connivent oculis.

Page. 518.

Vteri suffocari pulsus. Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Hoc est: Suffocationis inducti ab utero, pulsus. Vterus quippe minimè suffocatur, sed ubi ex plenitudine vel inanitione convellitur, respiratio nis organum plurimum facit negotium, animalque in maximam anxietatem perducit.

Lib. I. de præcognitione ex pulsibus.

Page. 513.

Hermannus: Non esse venientium tantum præscientiam. Græcè legitur: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quod futurorum, quàm venientium, aptius interpretabimur.

Page. 515.

Postea in corporibus quæ ægrotant tantum. Græcè legitur: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Hoc est: Quæ ægrotant simpliciter.

Ibidem.

Nec aliter in ægrotantibus, si quidem ægro-

tant tantum, indicabit magnus pulsus morbi calidum affectum esse. Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Hoc est: Similiter etiam in ægrotantibus, si ægrotent quidem simpliciter (hoc est, si morbo simplici sint correpti) magnus pulsus indicabit calidam ipsius morbi dispositionem.

Ibidem consequenter.

Sin recens aliqua addit alteratio. Græcè additur illa particula, *ἡ ἀνάσθησις*. Hoc est: Adveniens extrinsecus.

Page. 518.

Non tamen ubi contracta præter proportionem profunditatis est. Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quod est: Non tamen ubi imminuta fuerit infra proportionem profunditatis.

Page. 519.

At cum crassior sit, si quo homo evaserit seipso crassior, hoc sit pulsus minor. Græcè habetur: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Hoc est: Si quidem, quantum se ipso homo crassior sit redditus, tantum pulsus æquior videatur.

Page. 519.

Habes primas & simplicissimas pulsuum mutationes in celeritate & tarditate: harum causas præcedentes & externas eadem inveniantur ratione atque illæ, etc. Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quæ sic sunt vertenda: Atque hæc sunt primæ & simplicissimæ mutationes pulsuum in celeritatem & tarditatem, causæ earum antecedentes & primitivæ, simili methodo inveniuntur ac illæ, etc.

Page. 520.

Ac quo sit vehementior. Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Hoc est: Et quantum vehementior fuerit. Ibidem paulo inferius (ubi legitur: Quod sit languidior) Quantum sit languidior, legendum est.

Ibidem.

Alterationes pulsuum, quædam in remissionem & vehementiam, & solæ sunt frequentes, & ab una causa. Græcè habetur: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quæ sic nos vertimus: Alterationes autem pulsuum, quæ quidem in remissionem & vehementiam fiunt, illæ certè & solæ frequentes sunt, & ab una causa.

Lib. II. de præcognitione ex pulsibus.

Page. 516.

Herm. Magna enim copia ex putrescentibus humoribus acervatur. Græcè habetur: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Hoc est: In humorum putrefactionibus.

Ibidem paulo ante.

Fuliginosorum excrementorum ingentem colligi numerum. Græcè legitur: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quod rectius vertitur: multitudinem. Numerus quippe nō de cōtinua, sed dicitur de quantitate discreta.

Page. 561.

Robur validioris, omnē excipit causam parvæ. Græcè: *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις* *ἡ ἀνάσθησις*. Quod est: Validiorum robur, relictatur omni affectui exiguo.

Page.

IN GALENI INTERPRETES.

Pag. 564.

Est autem eorum pulsuum ingens frigiditas causa generandorum, quæ occupet vel corpus cordis, vel spiritum & sanguinem, quem continent eius sinus: vel partem aliquam vicinam. Græcè legitur: *ἡ ψυχρὸς ὁ κεντρικὸς*. Hoc est: Conspicuum particularum, vel aliquid commercium habentium. At multa consensum mutuo, atque in vnum conspirant, quæ minime sibi vicina existunt. Quæmodum cor & cerebrum, quæ uterque & artenarum ratione iunguntur tanta necessitudine, ut affectio vnius, alteri compositi legi communicetur.

Pag. 565.

Siquidem generantur hi producta raritate: ac quam procurantur, revertunt per raritatem ad primum statum. Græcè legitur: *ἡ σπανισμὸς τῶν ἀπὸ τοῦ πυκνοῦ*. Hoc est: Quod nos vertimus: Siquidem generatio ipsorum fit raritate producta: solutio autem est redditus quidam per raritatem ad commodationem pristinam.

Pag. 573.

Quem primò equidem vnum ferire iterum putauit. Clarior tamen est in græco hæc sententia: *ἡ δὲ αὖτε πάλιν ἑαυτὴν ἑαυτὴν ἀφ' ἑαυτῆς ἀποκαταστήσκει*. Hoc est: Quem solim primò sanè putauerat bis ferire.

Pag. 580.

Reciprocantur modò ex vltima pulsus abolitio: modò ex paruo pulsus & languido. Quo rum quidem vocantur enam reciproci vtrique: sed hoc interest inter, quòd illi decurtati sunt reciproci, hi deficientes reciproci. Græcè legitur: *ἡ ἀπὸ τοῦ πυκνοῦ ἡ ἀπὸ τοῦ σπανισμοῦ*. Hoc est: Quæ sic nos vertimus: Recurritur autem motus artierij, interdum quidem, ab vltimæ pulsus abolitione ad quam pervenerat: interdum autem, à paruo pulsus & languido. Quorum sanè vtrique pulsus, recurrentes dicuntur: hoc tamen interiecto discrimine, quòd illi quidem, deficientes recurrentes existunt: hi autem, imminuti recurrentes, seu decurtati.

Lib. III. de præcognitione ex pulsibus.

Pag. 589.

Hermianus: Cordis calor, pulsus (ut diximus) variat. Verum quia duorum generum est, aut à putribus generis humoribus, calis acris qualitas & fumosa est: aut cum humiditatis defectu, à natura remotæ sola quantitate ille prior constans & obfirmatus est, etc. Græcè legitur: *ἡ θερμότης τοῦ καρδίας ἢ ἀπὸ τοῦ πυκνοῦ ἢ ἀπὸ τοῦ σπανισμοῦ*. Hoc est: Cordis calor, pulsus (quatenus dictum est) immutat. Ceterum quandoquidem duplex est secundum speciem est: vnus quidem, soboles putredinis humorum existit, cuius nimirum qualitas acris est, & fuliginosa: al-

ter autem, cum benigna humiditate cõiunctus, sola quantitate à naturæ modo recedit. Est autem constans & ægrè solubilis, quem primò diximus loco.

Ibidem.

Verecundix etiã atq; iræ comitatur. Græcè: *ἡ δὲ δεισὺν καὶ ὀργὴν*. Quod mallem equidè vertere: Timorē atq; iracundiam concomitatur. Quidò quidem pudor, haud quidè tanti momẽti est affectus, ut pulsus vsque adeo immutare posset, nisi & cum pudorē, tum etiam merū significat.

Pag. 591.

Nec si pestilentem animã. Græcè: *ἡ δὲ κατὰ τὴν ψυχὴν*. Hoc est: Nec quã pestilentē respira- tionem, etc. Nam tametsi per translationem in- terdum anima fumatur pro spiritu, ac præsertim apud poetas: Medica tamen ars admodum seu- ra cum sit, minime oblectatur me taptioris.

Pagina 599.

Iam os etiã attendunt. Græcè: *ἡ δὲ κατὰ τὸ στόμα*. Hoc est: Contem- plantur simul etiã partes ori adiacentes,

Pag. 603.

Qui putredini humorũ comitatur, etiã par est perperò huius magnitudo, nõ tamen vna natura, neq; aliorũ generũ, verũ cum de natura parum descendit, etc. Græcè: *ἡ δὲ κατὰ τὴν φύσιν*. Hoc est: Eius autem febris quæ humorũ putredinem sequitur (scilicet proprium indicij erit) par semper magnitudo in pulsu: non tamẽ ut in his quæ pro naturæ modo se habent, neque ut in aliis generibus. Ceterum vbi exiguũ quid à naturæ modo recessit, etc.

Pag. 603.

Tardi nõ perinde, sed si vicinis sibi frigidus sit corpus cordis. Græcè: *ἡ δὲ κατὰ τὸν καρδίας*. Hoc est: Tardi autẽ nõ vique adeo conspiciẽ, sed pro ratione excessus, quo vicinũ par- tibus est cordis corpus frigidus.

Pag. 604.

Neq; scilicet alij sensui tribuunt album, nigrũ, flauum, rufum, pallidum, fuscum:eruleum, reil quòq; colorum nomina, præter oculis obiecta. Græcè legitur: *ἡ δὲ κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν*. Hoc est: Quod est: Neq; igitur ad album referunt sensum. album, nigrum, flauum, rufum, pallidum, fuscũ, eruleum, & quævis alia colorũ nomina, præ- terquã ad visibillum sensum.

Ibidem consequenter.

Neq; etiã aliis austerũ, dulce, amarum, acer- bum, atringens, salum, saluginosum, præterq; quæ gustantur. Græcè: *ἡ δὲ κατὰ τὸν γαστήρα*. Hoc est: Neque rursus ad alios sensus, austerum, dulce, amarum, atringens, acerbum, salum, & saluginosum, præterquã ad gustum.

Ibidem.

Neque iam vllis aliis calidum, frigidum, sic- cum, humidum, molle, durum, verũ his quæ

tanguntur, omnes attribuunt. Græcè legitur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: Sed neq. in aliis sensibus colloquat. calidum, frigidum, succum, humidum, molle & durum, præterquam in taliolum sensu.

Page. 605.

A propriis ad impropria. Græcè legitur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Ab impropria ad propria.

Page. 610.

At febris hecticæ, rarissima à primo exultat. Græcè: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quæ vertimus: Rarissime igitur statim ab initio oritur hecica febris.

Page. 611.

Si adiecerimus sermoni quandam dissentionem. Græcè habetur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Dissensionem quandam.

Page. 614.

Cor ipsum ad intemperiem inducit victus, si diutius sicco vitæ. Græcè: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: In ipso autē corde sicci intemperiem producit etiam victus ratio sicciior, si diu fuerit administrata.

Page. 615.

Durorum pulsuum autē demonstravimus esse paritatem, mollium magnitudinem. Græcè habetur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Necnon: Durus igitur pulsibus demonstravimus antea esse paritatem comitem, quæmadmodum mollibus magnitudinem.

Lib. III. de præcognitione ex pulsibus.

Page. 619.

Herm. Genus igitur respirandi, omnes fluxiones idem habet: at nō eadem omnib. suffocatio, sed omnib. calidioribus comitatur potius. Græcè habetur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quæ sic sunt vertendæ: Igitur species respirationis, similis omnibus fluxionibus adeit. Suffocatio autem ipsa, non similiter omnibus, sed magis calidas omnes fluxiones sequitur.

Ibidem.

Alia præterea varietas erit, quod interim affecta pars thoracis sit, interum succingens costas iunica. Codex græcus vetustus habet: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quæ sonant: Variabit etiam vel hac ratione, quod interdum quidem pars affecta thoracis sit musculus, interdum autem, costas succingens membrana.

Page. 620.

Ac si ab solis excrementis citra febres intendatur. Græcè: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: Si igitur à solis excrementis in ipso genitis distendatur.

Page. 624.

In statu arterie sunt moderati. Græcè: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: In consistentia quodæ arterie.

Page. 625.

Qui ex multa bile feruent. ob putredinem,

hoc patiuntur: Græcè habetur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Quicquid autem ab atram bilio emersit, consensu ratione putredinis, tale quid perperitur.

Page. 626.

Si frigiditas morbofa cerebri afficiat, cum illi cor consentiat, rariores atq. rariores æquo pulsus erunt. Græcè: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quæ sonant: Frigiditate autē morbofa in cerebro genita, si cor etiam consortij lege afficiatur, minores, rariores, atq. rariores iis, quæ pro modo nature habebant, gignentur pulsus.

Page. 627.

Subtilis mening, quæ cerebrum amplectitur. Græcè legitur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Quæ disjungit cerebrum. Etenim liquet ex confectio nibus, per illam tenuem membranam, quæ mista artibus & venis totum cerebrum permeat, disingui planè dextrā à sinistra ipsius cerebri partem, atque adeo ab vitæq. cerebellum, quam vocant paracephalida.

Page. 629.

Vnum etiam reliquum est, de febribus vt dicamus. Nam hæc partes etiā intra inguina sint, ita tim febres propter vasorum vicinitatem accessiunt. Græcè vetustissimus habet: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: Quāvis enim extra inguina sint, subito febres accendunt ubi inflammata fuerint.

Ibidem.

Nam vniuentium sumi præfagia ex presentibus. Græcè legitur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quod si rectius interpretabimur: Quod autem futurorum etiam prænotio ex presentibus conciliatur.

Ibidem.

Hæc omnia ex affectibus præfagiuntur. Græcè habetur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Ex dispositionibus.

Page. 630.

Morbus enim cognoscitur ex loco affectu, eiusq. affectu. Græcè: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Et eius dispositione.

Ibidem.

Cum morbum semel superatura est natura. Græcè: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Hoc est: Quo tempore natura superauerit absolutissime morbofam dispositionem.

Ibidem.

Propter quos cibum non sentiant. Græcè: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quod est: Ob quos ciborum vfu non promouentur.

Ibidem.

Iam verò etiam animalis facultatis imbecillitates, cerebri ingenti intemperiei comitatur, eiusdem quasi suffocationis impletionibus eius ventriculorum, & obstructionibus meatuum qui in eos penetrant. Græcè habetur: *αἱ δὲ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ τῶν πυλῶν τῶν ἐν τῇ στήνῃ*. Quæ sic nos vertimus: Similiter autem animalis facultatis imbecillitates, magnas cerebri in

IN GALENI INTERPRETES.

br intemperies sequuntur. Quæ verò veluti suffocationis sunt, succedunt tum repletionibus ventriculorum ipsius, tum obstructionibus meatuum qui ad eos pertinent.

Pag. 611.

Alterius quidm vitalis. Græcè: *alterius vitalis*. Quod est: Quemadmodū alterius vita-

Lib. I. de diebus decretorijis.

Pag. 646.

Andernacus: Cum bonis signis accidet, quæ à contemplatorio prius indicata est. Græcè: ἀνδρᾶς, ἢ ἄλλος πελοπόννησος καὶ ὁ Βυζαντινός. Quod equidem malissimè se vertere: Insignem autē, quæ ab indice præostensa fuerit. Fieri liquidem potest, vt crisis aliqua prius indicata iam fuerit ab indicatore die, quæ tamen cum bonis signis nō accidat. Crisis quippe, quæ septima die in exitū desinit, omnia secum habet signa exitalia, tamētī fuerit à quarto die præostensa.

Pag. 65.

Fortida multa tum deiciunt. Græci: *οἱ ἄνθρωποι*
οὐκ ἐν ἑαυτοῖς ἀρκεῖται. Hoc est: Et fortida ut pluri-
mum deiciuntur.

Ibidem consequenter.

Sudores rari quidem aequales toto manētes corpore, & calidi; aequales si quando oboritur plurimum afficiunt quos, Græci, *ιδρώδεις* & *ανισιδρώδεις* dicunt, qui de his *ανισιδρώδεις* loquitur Galienus, *ανισιδρώδεις* autem sunt, quos non totum corpus, sed pars tantum afficit. Quod est: Sudores autem, rari quidem &, qui aequales, & per vniuersum corpus, & calidi exiūt. Quod si tales aliquando exoriantur, vt plurimum intercipiuntur.

Pag. 654.

Prope hos verò tertiusdecimus. Græc: *μ' τρι-
νός* 1370 *et*. Hoc est: Decimusseptimus.

Page 671.

Hec igitur quatuor genera, quorum partes et
sunt duae, dum natura moribus incidit, su-
binde circuitum ordinem deservunt. Graec ha-
betur: *οὗτοι δὲ καὶ οὗτοι τὸ φυσικὸν καὶ τὸ νομοθετικὸν
ἀντικεινόμενα, καὶ τὸ φυσικὸν ἀντικεινόμενα τὸ νομοθετικὸν
ἀντικεινόμενα καὶ οὗτοι τὸ φυσικὸν ἀντικεινόμενα*. Hec igitur
quatuor genera, quae varias habent spes
speciales, particulares, si naturae motus propedi-
cunt, penumero circuitum ordinem deservunt.

Ibidem.

Septimo die necessario futura est. Græcè addi-
tur, *ἀπὸ τοῦ*. Hoc est: Crisis.

Pag. 674.

Quippe cum secundus, expleti grana, & quartus, vehementissimum accessum afferat, vel primus, tertius & quintus, ad sextū diem mors prædicetur. Græcus antiquus habet: ἀπὸ τοῦ δευτέρου ἡμέρας ἐκείνης καὶ τριτῆς καὶ τεταρτῆς καὶ πέμπτης καὶ ἑξήτης καὶ ὀγδοῦς καὶ ἐννεμῆς καὶ δέκατος καὶ ἑκάστους ἡμέρας καὶ ἕως τῆς ἑβδόμη.

Pag. 677.

Et iudicia. Græcè: *κρίσεις*. Hoc est: Et iudicia.

Ibidem.

¹ Decimusoftauus autem, vigesimiprimi. Græcè δὲ δέκατος καὶ ἕξ. Nempe decimusoftauus autē, solus vigesimiprimus].

Lib. v. Pag. 601.

Andernacus: Hoc ratione omnes acuti particulae finit. Postq̃ vero omnes conuenerit, diurnus. Graece habetur, *ἡν ἴσην ἡμέραν τὴν ἡμέραν* *ἡμέραν ἴσην τὴν ἡμέραν*, *ἡμέραν*. Quia iudicio mor sic finit verēda: Atq̃ ita sanē omnes ipsius mor bi partes, acute redduntur: rotas autē morbus, diurnus, etc. Agit quippe de rotis autē imperfe- cte solaria, & quorū transiit in diebus decreto- nis nū incipit, tūc dicitur. Ad quarum fa- nē ortus, solutionē fac, si respexerimus, vnaque- que ipsarū videbitur esse nobis morbus quidā acutus, cū tū par vnius morbi diurni exiit.

'Pag. 694.

Igitur accessiones ipse ex acutissimis mor-
bis per quatuor in viginti auctæ finiuntur. Græ-
cè: *αὐτὰς τῶν τεσσάρων ἀκροῦς ἐν ἑξήκοντι καὶ ὀκτώ*. Hoc est: si igitur iam cō-
pulantur per quaternarium vsq; multiplicatim, adiectionis
ratione perveniunt vsq; ad vigesimum.

Pag. 711.

Obscuratur omnino, cum Solis lumen circa
eam emergit. Graecè legitur: *ὅταν ἡ ἀστὴρ
ἐκ τοῦ σκοτεινοῦ ἐκείνου ἐκείνου ἐκείνου*. Quae sonant: Ob-
scuratur omnino, ubi sub illo, hoc est, sub Solis
illustratur.

Pag. 711.

Item comicialis circuitus custodit, inde quod
Solis plus, vel minus participat. Græcè legitur: *ἡ
ἡμέρα ἡμεῖς ἡμεῖς ἡμεῖς ἡμεῖς*. Hoc est: Quate-
nus plus vel minus ex ipso Sole participat.

Ibidem.

Capitis dolorem conciliat. Græcè: *λεπιδασπασ*
ἀνταφύσας. Quod est: Capitis gravitatem conciliati
vel grauedinosos reddit.

Lib. I. de crisi bus.

Page 44

Leoniceus: Statim in tempore accessiohis hominem occidunt. Græci: *ἐν τῷ ᾧ ἀνέβηκεν ἡ μήνη*. Hoc est Augmenti tempore.

Pag. 216

[illegible]

Ibidem

Hęc venositas naturę passionē significat. Or-
at: *ὅτι τὸν αἵματι, ὃ παρὰ τὸν σπλῆνα ἐκέρχεται, ἐστὶν ἀσθενὲς
καὶ ψυχρὸν.* Quod est: Talis enim vrina, venosi
generis affectus existit: sicuti et exacta cruditas,
venosa. Ibidem.

ation must

Cum vero etiam ita in mangelis in vas vinarum.
Græcè: *ἔπειτα ἐν τοῖς ἀγγείοις, ἐν τοῖς ἀγγείοις τοῖς ἀγγείοις* D.
ἔπειτα ἐν τοῖς ἀγγείοις, etc. Quæ sonant: Cū autē etiā celeriter diffuit, vocat affectus is ē obsequi in manibus

hydros, etc. Agit namq. impressantur Galenus de diabete, seu de stillicidio vrinæ præter volun-
tatem efflatis. Qui affectus alteratitricis & rē-
trictis facultatis, veluti extinctio est: vtridēq.
idem Galenus testatur. Quare per talem fluore,
improprie sanè dicemus vrinam mingi, cum ci-
tra imperiū volutaris, atq. in vitro homine de-
batur: id quod explicat et ratiōne et experientia.

Pag. 760.

Color verò viridis sit in transitu ad nigrum,
& quoddam veluti principium nigri. Græcè legi-
tur: *αἷμα δὲ αὐτὸν ἀπορροῖται πάλιν*. Quod sonat:
Estq. veluti quoddam principium nigri.

Pag. 771.

Quod si ab eo quod est nihil expuere, aut ex-
puere, verum liquida, & omnino crassa fiat trans-
mutatio. Græcè: *ἢ ἡ τῆς πύλης ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Hoc
est: Si verò ab eo quod est nihil procius expue-
re, ad expuere quiddē, sed liquida & omnino in-
cocta fiat transmutatio, etc. Fieri tamen potest,
ut is error nō à Leoniceo, sed à typographo sit
commisus.

Pag. 777.

Si quæ verò vniuersa fiat permutatio, & mul-
tò magis adhuc eam quæ antecedit agitationē.
Græcè habetur: *ἢ ἡ τῆς πύλης ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Hoc est: Ac multò magis illam
permutationem, quæ permutatiōe ipsam præ-
cedit: scilicet crissim appellare consuevit.

Pag. 786.

Tertiam itaq. febrem fieri cōtingit absq. ri-
gore vehemēti. Græcè: *ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Quod est: Igitur
exquisitā tertianā haud licet fieri absq. rigore ve-
hementi, etc. Est enim Articis familiare, vt pro-
vna, duabus negotiationibus sæpe vtiatur.

Pag. 799.

Sed nihilominus hoc, si multa quiete agrotā-
ti adveniet. Græcè habetur: *ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Quod est: Nulla procius
explicatio, siue ab absolute à febre, in agrotā-
te facta.

Lib. II. de crissibus. Pag. 814.

Leoniceus: Si verò tantum febricitent, siue
alicuius visceris passione, aut inflāmatiōe he-
patie, vel renum, vel vesicæ, vel splenis, maxime
vrinæ oportet animū adhibere. Græcè: *ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Quis
sonat: Si verò tantum febricitent, absq. alicuius vi-
sceris passione: aut si quæ etiam inflāmatiō adsit
in aliquo eorū quod ad hep., vel renes, vel vesicā,
vel splenem pertinet, vrinæ sunt spectan-
dæ. Quod autē ita legendum sit, indicant Gale-
ni verba, quæ statim subdit in hunc modū: Sem-
per enim cum febris assuerit, vel ex sola humo-
rum putredine accensa, vel ex membro inflā-
tione patiente: consueo præcipue esse inspicien-
das vrinæ, atq. inde agnoscendas cōclusiones.

Pag. 818.

Febris enim quæ proprie synochus nominā-
tur, longus est status. Magis autē rota hæc febris
status est. Græcè: *ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.*

perit. Quod nos vertimus: Eius autē febris, quæ
proprie dicitur synochus, diuturnus status est.
Imò verò tota eiusmodi febris, status quidam
existit.

Pag. 817.

Tres quidē hi sunt modi perturbationis mor-
borum. Græcè legitur: *ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Hoc est: Permuta-
tionis.

Pag. 831.

Tu itaq. supponens aliquam esse vitalem po-
tentiam, stude vt agnoscas eorū ita in robore,
sicut in imbecillitate dispositionē. Græcè legi-
tur: *ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Hoc est: Ipsius facultatis videlicet.

Pag. 832.

Moriturus autē, ad declinationis tempus per-
tingere minimè potest: nō tamen necessariò etiā
non ad statum. Græcè habetur: *ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Hoc est: Sed nec necessariò etiā
ad tempus vigoris. Sic autē legendum esse, indi-
cant verba Galeni sequentia, quæ talia sunt: Cō-
tingit enim ipsum in augmenti & principij etiam
tempore mori.

Pag. 841.

Si igitur præter rationem alius comprimitur,
vel vrinæ: iam propè crisi existente, rigorem spe-
rare oportet. Si non, distinguendum est. Græcè
legitur: *ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Quod est: Qui si
arceatur, distinguendum est.

Ibidem.

Si enim multa, etc. Græcè: *ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.* Hoc est:
Si enim plura. Quæ lectio illustratur à superio-
ri, vbi Galenus ait: Considerare oportet non-
quid idui excrementa plura q̃ priora, vel pauco-
ra, ante crissim exierint. Cui orationi subdit: Si
enim plura.

Pagina 846.

Si verò ad abscessus convertantur, cōmunia
quidem omnia indicia sunt, vbi de vrgi salute
non desperatur, & neq. morbus solvatur, neq.
vrina multa & multum habens subsistentiā, sed
cruda & tenuis appareat: propria verò morbi
nō futuri valde diuturni sunt, subita difficultas
anhelitus superveniens, moxq. quiescēs, quam
grauitas capitis, ac dolor sublegetur, & grauis so-
mnus, ac furditas, his in glādulosis carnib. post
aures, necessum est abscessus fieri. Græcè legitur:
*ἢ ἡ ἀπὸ τοῦ σπέν-
δος, ἢ ἀπὸ τοῦ πύλης ἀπὸ τοῦ σπένδος, etc.*

Si verò morbi ad abscessus converti videantur,
cōmunia quidem omnia in dicitur sunt, vbi vrgi
salus non est deplorata, quod nec morbus sol-
vatur, nec vrina multa, & multum habens sub-
sistentiam, sed cruda & tenuis appareat. Propria
verò nō admodum diuturnorum morborū, si
gger in difficiliōre respiratiōe repente incidās,
breui quidem liberetur à tali respirandi difficul-
tate, sed excipiat ipsum statim dolor atq. capitis
grauitas: præterea inexpugnabilis dormiēdi ne-
cessitas, furditasq. Hinc autē, in glādulosis post
aures partibus, necessum est abscessum oriri.

Ibidem.

Ibidem.

Vel inflammatio. Græcè legitur: *ἡ φλεγμονή*. Quod non, vitandæ amphibologie studio, vertimus: Vel incendiū. Siquidem hæc vox Inflammatio, est vulgo medicorum recepta pro tumore quodam rubeo, renitenti & calido, vtpote orto à sanguine: *phlegma* autem, siue effluencia calorū, aliquando potest accidere citra talem affluxum sanguinis.

Lib. de præcognitione.

Page 860.

Leonardus lachinus:Ego enim posthac sedulo cauebo,tum ip[s]is credens,tum infamia patiens,Græcus vetustus habet:*λεοναρδου οντις διανθωμ εν τω υπερβολω*. Quod non veritatis:Tum infamiam eorum dissimulas. Cui leoboni subscribit sequens sententia, quæ est talis: Hæc cum facere decreuissem, infamiam eorum & prauitate redarguere desisti.Habetur quippe in codice græco *ωυτω*, quod non tam deiegere,vt vertit interpres,quàm redarguere significat.

Lib. de praesagiis ex insomniis.

Page 889.

Iohannes Ficardus: Phlegmatis humidi plenus
est. Gracē habetur: *quidam forsyth.* Quod est: Pi-
tuitæ frigidae.

SECTIONE
OVARIA

Libro III. de Symptomatum causis.

Page 104.

[illegible]

Lib. de morborum temporibus.

Page 117

Andernacus: Etenim inflammationis affectus calidior quam prius evadit, cum tumore maiori, item dolore simul & tensione, Græcè: *Ανδρνακός*.

ipſa evadit cum tumore maiori, dolorēq; & ren-
ſione, pars phlegmone obſeſſa.

Pag. 114.

De complexis postea differam. Graecè: *μιγλῆσι*
σύνθετοι istis *ἴσθι*. Quod est: De mistis autem
 deinceps dicam.

Lib. de totius morbi temporib.

Page 119.

Andernacus: Vnum quidem & princeps generationi eorum attribuitur. Græce legitur: *αὐτοκράτωρ*. Hoc est: Et primum. Agit eum illic Galeus de ipsius morbi temporibus. Inter quæ vnâ & primâ ordine, nō dignitate, tribuit ipsi generationi. At cum princeps aliquid dicimus, de ipso excellentiâ quandam, prærogatiuam enūciamus.

Page 34

Post quod rursus augmentum tempus est, non
æque manifestum ita in omnibus: neque illud
quod à vigore sequitur tempus omnino sensibile.
Græcè: *ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τοῦ αὐτοῦ, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τοῦ αὐτοῦ*
αὐτοῦ τοῦ αὐτοῦ, αὐτὸ τὸ αὐτὸ τοῦ αὐτοῦ τοῦ αὐτοῦ.
Quod est: Post quod rursus augmentum tempus
est, ne ipsū quidem similiter sensibile in omni-
bus. Post hæc vigoris sequitur tempus, idē omni-
no sensibile.

Pagina 148.

Vel amarum vehementer. Græcè: ὀξύπικρον
 πικρὸν. Hoc est: Aut fuluum vehementer. Disputat
 pangenilic de fœti coloribus.

Lib. I. de locis affectus.

Page 171.

COpus: Itaq̃ quot modis cōtingat yting me-
atū stipari. Græcē habetur: *καὶ οὕτως αὖτε λέ-
γουσιν οἱ ἰατροὶ καὶ οἱ φιλόσοφοι ὅτι αἰσθάνεται*. Hoc
est: Itaq̃ quot modis cōtingat obstrui meatum
colli vesicæ.

Pag. 189.

Essentia quidem nondum laeditur. Græcè, *οὐκ ἔτι τὸ εἶναι βλάπτεται*. Quod est: Substantia autem nondum est læsa. Aliud quippe dictū est non lædi, atq. aliud nō esse læsam. Siquidem quod nōdum est læsum, fieri potest ut iam laedatur.

Pag. 381.

Quod si antequam vicus induxerit, egredi desinat, affectus ipse nondum dysenteria dicitur. Græce habetur: *ἡ δὲ ἐν νίκῃ διακίνα, καὶ αὐτὴν δυσίαν*, etc. Hoc est: Si verd priusquam exulceret, perillus re desinat, etc.

Fig. 18

igitur si in ventriculo cibi non suapte natura in fumum transformantur, efficiunt causam calidam: si vero saporem acidum referunt, eam frigidam esse necesse est. Graecè legitur: *ἡ βίη τοῦ ἐν ἐντέρι κατὰ τὴν φύσιν αὐτῆς ἔστω θερμὴ καὶ ἡ τροφή αὐτῆς ἡμετέρα*. Quod est: Si igitur in ventriculo calor in fumum odorosum vertitur, idem non ex sua ipsorum natura, efficiunt causam calidam: si vero acescant, frigidum esse necesse est.

Ibidem.

Quippe ubi igneo calore ventriculus infestatur, panem, ac chondrum, sine humore

deici videbis, perquā exigua in ipsis facta transmutatione. Græcè legitur: *ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἀποκρίνεται ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου*. Hoc est: Quæ sic vertimus: Etenim v. b. igneo calore, citra humoris affluxum, ventriculus infestatur: videbis tum panem, tum chondrum deni, perquā exigua in ipsis facta transmutatione. Cui lectioni subscribit sequēs in Galeno sententiā, quam etiam interpret pervertit.

Aut enim ibidem.

Quod si humor quoque deiciatur, qui cibum corrumpere possit, videntur cibi in huiusmodi humore submersi. Græcè habetur: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Quod nos ira vertendum duximus: Quod si humor quoque in ventre prauus constituit, qui nimirum cibos corrumpat, &c.

Pag. 398.

Quocirca coniecturam feci, nervorū qui primi à septima vertebra procedunt, partē quampiam ob istum fuisse inflammatam. Græcè legitur: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Quod ita vertendum est: Coniecturam feci, nervi post septimam vertebra exidentis, statim in primo exortu partem aliquam, ob istam, fuisse inflammatam.

Pag. 399.

Ergo nervorū qui à ceruice proddeunt, vitimi exigua pars, ad minores pervenit digitos. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Vitimi humilior pars.

Ibidem.

Illi præcipui spiritus parti, quæ in affecta particula principatum obtinebat. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Quæ principū affectus partis in se continebat.

Pag. 404.

Verū animalibus instrumentis omnibus naturale quoque munus debetur. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Naturalis quoque dispensatio adest.

Lib. I. Pag. 405.

Copus: Quippe ut dolor tristis scelus est, ira voluptas blandus est sensus. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Dolor enim est tristis sensus, quemadmodum ipsa voluptas, blandus.

Ibidem.

Quod si rem accuratius inspexeris, haudquam doloris species dicendus est stupor. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Ne differetia quidem inter dolores est, stupidus dolor.

Pag. 408.

Morbus verò lateralis, membranz costas succiogeneris est morbus. Quæ vbi costas quidem vitina est, necessariò cōprimitur. At media ipsius pars, comprii oon potest. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Quæ vbi costas quidē adheret, necessest cōprimitur. Quod verò ex ea inter costas eū situm, incompressum remanet.

Pag. 410.

Alius, qui ob tensionem fit, non soli affectus partem propriam, ut qui vicinas partes interdū affi-

ciat. Græcè legitur: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Quæ sic vertimus: Alius verò qui fit ob tensionē, non amplius soli affectus partem propriam, sed ob vicinas partes etiam interdū accidens.

Pag. 411.

Negū enim ut à tenui corpore, breui temporis spacio cure poterat, sed à profundo quodā. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Sed veluti ex profundo quodam.

Pag. 412.

Quemadmodum in bene valentibus, qui liberantur respiratione. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Quemadmodum in respirationibus haud violentis facit.

Pag. 415.

Ipsa enim omnes pelli subiacētes partes, spissitudine superat. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Quod nimirū cutis ornēs sibi subiacētas partes spissitudine superet.

Pag. 417.

Quinetiam calidam sentiunt respirationem. Græcè legitur: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Expirationem.

Pag. 418.

Verumenimvero, quod principium sensus & motus ab impetu procedunt, sedem in cerebro habeat, &c. Græcè: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Quod igitur quævisimū est, nempe ducem sensus & motus ab imperio procedunt, in cerebro collocari, &c. Differet siquidem plurimū ipsius motus & sensus dux ab earum operationum principio. Quippe omnium functionū animalium principium est cerebrū: at dux est ipsa facultas, quæ in illo gignitur, & ab ipso emanat, hoc est, animalis spiritus.

Lib. II. Pag. 455.

Copus: Præterea quamvis iam dixit temperies sint cōtrariæ. Græcè legitur: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Intemperies.

Pag. 458.

Si verò simul cum vniuerso corpore facies quoque convulsa videatur, oon solum eam partē, quæ ex spina procedit, verumetiā cerebrū ipsum curamus. Græcè legitur: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Non modo spialis medullæ exortum.

Pag. 462.

Igitur quemadmodū phrenitidis, febris vniū quoddam accidens dispositionū cerebri censetur: sic & converso in ardentium febrium dementia, multis clatis ad ipsum vaporibus. Græcè habetur: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: quemadmodū igitur phreniticorum febris, vniū quoddam est cerebri dispositionum symptoma: sic delirium, ardentium febrium symptoma exiit, ad cerebrū clatis multis vaporibus calidis.

Pag. 465.

Fitz interdum ut rufio colore homines affatim in melancholicā temperiem decidant. Græcè legitur: *ὡς ἂν ὁ ὕμνος τοῦ κυρίου ἐν τῷ ὕδατι*. Hoc est: Admodum rubicundi.

Ibid.

Quippe in his venis sanguinem cōtineri constat

IN GALENI INTERPRETES.

tium & plenitudo & suspensio. Græcè legitur: *ἡ πλεονεξία καὶ πληρότης καὶ ἀσπένδωσις*. Hoc est: Vaso foras ipsum perveniens tunc, appendicam eorum, plenitudo. Sic hancque legendum esse, indicat dictio sequens, quæ est talis: Itaq; multiplicatus sanguis in venis, eas extendit, atq; vicinas ipsis appendices. Nam vbi interpretes convertit vincula, codex græcus habet, *ἀπὸ τῆς πλεονεξίας*.

Ibidem.

Igitur si equaliter vndiq; trahitur, recta erit, & sine inclinatione ipsorum transmutatio. Si vero inæqualiter, ad partem vehementius trahentem intenduntur. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις, ἀπὸ τῆς πλεονεξίας καὶ ἀπὸ τῆς ἀσπένδωσις*. Hoc est: Vbi vbi multiplex suspensio. Quæ sonant: Si igitur equaliter vndiq; trahatur vterus (apud Græcos, n. in pluribus in plurali significant vteru) recta erit ipsius transmutatio. Si vero inæqualiter, ad partem vehementius trahentem, intenditur.

Pag. 599.

Nonnullis panus in extrema illius parte exciditur, velviri viri quoq; eodem in loco nonnullam oriri solet. Qui vbi suppuratus aliquando fuerit, secari debet. Atque hanc partem siue membrum suppuratum dissectumq; vidimus, interdum ignorantibus medicis inexpertis quid incidere: interdum vero intelligentibus quoq; Atq; omnia membra ita suppurata facile excidentur. Græcè legimus: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις, ἀπὸ τῆς πλεονεξίας καὶ ἀπὸ τῆς ἀσπένδωσις*. Hoc est: Vbi vbi multiplex suspensio. Quæ sonant: Si igitur equaliter vndiq; trahatur vterus (apud Græcos, n. in pluribus in plurali significant vteru) recta erit ipsius transmutatio. Si vero inæqualiter, ad partem vehementius trahentem, intenditur.

Pag. 606.

Quippe eodẽ tempore omnes totius animalis arteriæ, inter sese similiter producantur. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Dilarantur.

Lib. I. de differentiis febrium.

Pag. 611.

Leonice. Ac nihilo minus in corde ipso, ut quæ idem cõstat cū omnibus ipsis. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Ceu consubtile & consubstantiale cum universis arteriis.

Pag. 611.

Ex quarũ numero febris est una, quoniam in

corde quædam præter naturam caliditas generatur. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Vbi in corde, etc.

Pagina 614.

Ira autem est velviri quidam fevor ac vehemens motus potentius irascibilis in ipso cordis corpore sita. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Collocata: sic vbi participium hoc refertur nõ ira candiam, sed irascibilem facultatem, quæ in corde suam sedem sortitur.

Pag. 615.

Quoniam autem confringi terminum exterioriorem, aut obstrui penitiorum partium meatus coningit. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Vbi verò, etc.

Pag. 616.

In obstructionibus quidem foraminum. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Meatuum.

Ibidem.

Quoniam nõ bene continentur. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Quod est: Cum neq; amplius vincantur.

Ibid.

Propterea autem, quicquid cibi glutinosi sunt ac crassi, sunt magis morbis obnoxii. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Idcirco quicunque ex cibis lenti & crassi sunt succi, ij magis morbosici existunt, etc. Humana siquidem corpora dicuntur obnoxia morbis: cibi autem, vel morbosici, vel salubres.

Pag. 617.

Ex quibus omnibus simul cor affici est necessarium. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Cum quibus omnibus simul cor affici est necessarium.

Pag. 610.

Sicviri in his qui nõ tempore frigidi bibũ. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Intempestive.

Pag. 611.

Et quidem sepius commouent, dormitantium more. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Ac sanè sepius commouent.

Pag. 611.

Omnibus siquidem hecticis febribus hoc inseparabile ad est indicium, allato cibo quidem, febrem accendi. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Caliditatem quidem accendi.

Pag. 616.

In omnibus siquidem febribus aliis, huiusmodi motus etiam præter cibum assumptum, sunt incomprehenso. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Inconscius insultus.

Pag. 617.

Si enim aquam frigidissimam hñstueris. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Insuetus.

Lib. I. de differentiis febrium.

Pag. 644.

Leoniceus: At in tertiana quidẽ, causam à qua provenit, rei quodammodo pungentis, ac ferientis sensum representat in quartana autẽ, re frigerantis. Græcè legitur: *ἡ δὲ τῶν τριῶν ἀσπένδωσις*. Hoc est: Sed qui in tertiana accidit rigor, seu rei cuiusdam pungentis atque ferientis, sensum causat.

LL ij

repræsentat: qui in quartanis autem, tanquam refrigerantis.

Ibidem.

Atque in pluribus circuitibus continentur. Græcè additur: *ἐν τοῖς κύκλοις*. Hoc est: in pluribus particularibus circuitibus.

Pag. 646.

Ac secundæ accessionis festinat inuasio. Græcè: *ἐν τῇ δευτέρῃ προσπίπτει ἡ νόσος*. Hoc est: Multo magis festinat inuasio: siue, anticipat.

Pag. 647.

Quicquid optimum fieri contigerit. Græcè: *ὅ,τι ἀριστα γένηται*. Hoc est: Quicquid potuerit corrigi.

Pag. 647.

Sic & leuiter, eius, humidam eius partem habet tertianam. Græcè habetur: *οὕτως*. Hoc est: Sui ipsius.

Pag. 661.

Estque tardi ac difficilis motus, frigida ac lenta existens materia. Græcè legitur: *ἀργὴ καὶ ἀσθενὴς ἡ φύσις*. Quod est: Quum uimrum u humor piger, ægre mobilis, frigidus, ac naturaliter tarde permeans existat.

Pag. 663.

Nam ex his quæ de biliosa & pituitosa febre simul conquisitis conscriptis; licet & hæc ad atræ bilis humorem transierint, eius cum utraque illarum complexionem ac confusionem pariter coniecturam. Græcè legitur: *ἐκ τῶν ἀνωτέρων*. Hoc est: Ad melancholicam febrem.

Pag. 663.

Externa autem corrumpere, quod est putrefacere. Græcè: *ὀξείναι*. Hoc est: Quod est putrefacere.

Ibidem.

Calor autem extrinsecus, sanguine opprimit. Græcè: *ἐκ τοῦ ἑξωτερικοῦ θερμότητος ὀξείνεται*. Hoc est: Incalescit autem externo calore sanguis.

Pagina 666.

Quod ex his humoribus, qui carbunculi appellatur, contingit. Græcè: *ἐκ τῶν κατὰ τὴν πυλινὰν*. Nempe: Quemadmodum in vocatis carbonibus.

Pag. 668.

Inflatur. Græcè: *ἐκταίνεται*. Hoc est: efflatur.

Pag. 669.

Ira & in interioribus quæcumque non videntur eandem proportionis similitudinē seruare, fieri concipiendum. Græcè: *ἐν τοῖς ἐντέροις οὐκ ἔστιν ὁμοιότης*. Hoc est: Si oportet imaginari etiam in interioribus, quæcumque, cum non sint obiecta visui, eandem tamen analogiam perpetuo seruant.

Ibid.

Et meatus, qui materiam in vitem excernunt: Græcè legimus: *ἐκ τῆς βίτης*. Hoc est: Deducentes. Si quidem non meatus, sed facultas ipsa expultrix excernit.

Pag. 671.

Quia videlicet humor, quæ proprius calor nō obnitet, nihil habet reliquū. Græcè: *ἐκ τῆς θερμότητος*. Hoc est: Et, quia humori qui a proprio calore nō vincitur, nihil amplius superest, nisi etc.

Pag. 677.

Neque etiā omnibus equaliter accendi aut dissolui cōtingit. Græcè legitur: *ἰσότητι*. Hoc est: Oportet.

Pag. 678.

Ut febris accendatur. Græcè: *ὡς πυρετὸς ἀναίσταται*. Hoc est: Ac febris accendatur.

Pag. 679.

Sed id solum quod ita est extenuatum, & in subtilioris vaporis naturam transierit. Græcè: *ὡς ἀπὸ πυκνῆς ἐν ἀραιῇ μετατρέσσεται*. Hoc est: Vno tenuis vaporis naturam transierit.

Pag. 680.

Quidam feruentium humorū diffusus. Græcè additur: *ἰσότητι*. Hoc est: Exultans.

Pag. 681.

Quod qui putrefacere incipit humor, in aliquo membro consistit. Græcè legitur: *ἐν τῷ σώματι*. Hoc est: Alter, siue diuerius, existit.

Libro de arte medicinali.

Pag. 706.

Leonicenus: Erius alubrum. Græcè: *ἐρίων*. Hoc est: Et morbidorum.

Pag. 709.

In vno autem tempore, quod ita est neutrum, consistere nequit. Græcè additur: *ἀπὸ τοῦ μέτρου*. Hoc est: Accuratè quidem nequit consistere.

Pag. 711.

In hac enim necesse est: ut posteriores, priorēque partes. Græcè legitur: *ἐν τῇ μετὰ τὴν πρῶτην*. Hoc est: Posteriores priorēque partes.

Pag. 713.

Mediū sunt inter eos qui omnino sunt crispī, & simplices. Græcè corruptè legitur: *ἐν τῷ μέτρω*. Hoc est: Lenēs.

Pagina 716.

Capilli quoque in his statim in lucem editis, habent in capite ortū. Græcè habetur: *ἐν τῷ κεφαλῇ*. Hoc est: Celeriter generantur.

Pag. 718.

Impleantur verd atq; aggrauantur eorum capita a calidis. At si humectentur, tunc multo magis excrementorum habent multitudinem. Græcè: *ἐν τῇ θερμότητι*. Hoc est: Quod si humectentur etiam, tunc multo magis, præcipue cum excrementorum copia redundant.

Pag. 720.

Paruitas verò oculorū, ad multa quidem cōcinnitate, ac virtutum operatione. Græcè: *ἐν τῇ ὁμοιότητι*. Hoc est: Et operanorum virtute.

Pag. 721.

Ad actiones autē prompti sunt, & iracundi, & impudentes. Græcè legitur: *ἐν τῇ ὁμοιότητι*. Hoc est: Celeres: nō impudentes, quod interpretis venit.

Pag. 725.

Sed de insitis vnicuique, ac naturalibus nos exposuisse. Legendū tamen est: sunt a nobis exposita. Alioqui non rectè fluit oratio, sic illic eam deducas, ubi Galenus ait: Quod quæcumque, etc.

Pag. 735.

Dictum verò est in tertio de causis accidentium, quod cumque potentie virtus & vitū, temperatura principalis existit. Græcè habetur: *ἐν τῇ ὁμοιότητι*. Hoc est: Et virtus.

SECTIONE

QVINTA.

Lib. II. de medendi metodo.

habetur dicitur per se et non per alium, & per se non per alium. Quare iudicio meo sic sunt vertenda: Dicitur autem est in tertio de symptomatum causis, quod ipsius potentia virtus & vitium, a tempore precedente oritur.

Pagina 736.

Ad animam ventriculi locum, quem Græci pyloron vocant. Græci: *ἀπὸ τοῦ πυλῶρος*. Hoc est: Ad lumen orificiū ventriculi, qui anitor appellatur.

Pag. 746.

Horum autē singulorū, quæ dicta sunt, qualitas in ipsa corporis constitutione est eligenda. Græci habetur: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: In optima constitutione.

Ibidem.

Alteram verō eam quæ ad optimā transferūt. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Alteram verō, eam quæ ad optimam ducunt.

Pag. 751.

Alias quidem esse salubres causas eius temperaturæ. Græci legitur: *ἀλλὰ καὶ ἄλλαι αἰτίαι*. Hoc est: Intemperantia.

Pag. 754.

Atque ad illas impellemus, quæ nullum habent principium. Græci: *ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Irritabimus autem illos, qui ad partes minimè principes, scilicet ducunt.

Pag. 757.

Intentio tamē, quoad fieri potest, curationē adhibere, ad contrarium everisionis adducendo. Græci habetur: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Quæcumque igitur in pulmone atque thorace ambiuntur, cum tussi sine expurgatur, sed à medicamentibus extenuantibus.

Ibid.

Aut per vrinam, aut per ventriculum. Græci: *ἢ διὰ τῆς οὐρῆς ἢ διὰ τοῦ στομάχου*. Hoc est: Aut per alvū. Nam ventriculus, siue *ὁ κοιλία*, ventrem superiorem significat: quæ admodum *ὁ πυλῶρ*, inferioriorem.

Pag. 760.

Prius à parte repellendum: mox dispergendū. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Prius debes repellere à parte, quam aggradiaris discutere.

Pag. 764.

Hæc igitur omnia sanare possibile est. Græci legitur: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Proptermodum est possibile.

Pag. 765.

Quare & duplex sanandi modus. Alter quidē ad oppositā partē ei, à qua facta est permutatio, intendendo atque impellendo. Alter verō, id quod cōtinet, firmius solidiusque reddendo. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Quare & curatio ipsa, in illa quidē (hoc est, in luxatione) fieri ad oppositā partē ei, ad quā facta fuit permutatio, impellentibus nobis. In altera verō (hoc est, in enterocele) id quod continet, firmius solidiusque reddentibus.

Lib. Quomodo simulantes morbum

sint coarguendi. Pag. 771.

Febrilis: Quando ex indigestione. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Ex cruditatibus.

Pag. 45.

Linacer: Nyctilopa dicitur. Græci legitur: *νυκταλόπα*. Hoc est: nyctilopa. Dicitur autē nyctilops, qui noctū cæcus est, cum clarē interdū cernat. Plin. lib. 8. cap. 30. huius voculæ meminit, dicens: Restituit vespertinam aciem his, quos nyctilopas vocant.

Pag. 67.

Quippe ipsam sequentis siue agendi infinita tionem. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Ipsam veluti consecutionis imaginem.

Lib. 111. Pag. 115.

Linacer: Sin ficior debito particula tantō fuerit, quāto corporis temperamētū iustio est humidius. Græci habetur: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: At si particula fuerit ficior iusto, quā corporis temperamētum sit iusto humidius.

Lib. 1111. Pag. 144.

Linacer: Exiguorum status mutatio. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Transmutationis meatus.

Lib. v. Pag. 171.

Linacer: Presertim per angustias, vel principis per particulas. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Et præcipue per angustias quasdam.

Lib. v 111. Pag. 185.

Linacer: Itaque si illa præsens febris est, etc. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Si igitur genitrix iam febris fuerint.

Pag. 317.

Alterā quæ ex ipsorū quæ indicantur, dignitatibus censetur. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Alteram, quæ ex indicantū dignitatibus spectatur. Huius versio- ni nostre subicibit quod habetur lib. x. pag. 394. Perpensio scilicet indicantū scoporū tum magnitudine, tum dignitate.

Pag. 394.

Perpensio scilicet eorū quæ indicent. Græci additur: *καὶ τῆς οὐρῆς*. Hoc est: Scoporum.

Lib. x. 11. Pag. 411.

Linacer: Quod ad dolores ex sensu torpore sedatos, nullo minus est celebre. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Quod ad dolores sedatos suscipiendi sensum, nullo minus est celebre.

Pag. 442.

Nam si imbecillum illi caput est, & quod facile calentibus vinis impleatur, etc. Græci legitur: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Et calidis vinis. At multa frigida vinā facile incalescere possunt, si vide- licet igni admoucantur.

Lib. x 111. Pag. 490.

Linacer: Imò postea vniuersum corpus vacuaueris, ac necessarii est, eorū quæ in infirmata parte cōtinentur, aliquid educas. Græci: *ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φύσεως ἐστὶν ἐκλεγμένη*. Hoc est: Sed postea vniuersum corpus vacuaueris, vniuersū fuerit, eorū quæ in infirmata parte cōtinentur, aliquid enā

LL ij

educere. Ibidem.

Generandis autem adhuc vitilis. Græcè: γενεῖται ὡς δ' ἔστιν ὁ καιρὸς. Hoc est: vbi verò affectus etiam in generatione constant.

Lib. x. 1111. Pag. 329.

Lina cet: His verò etiam piciari cōmodum est: id est tertio aut quarto quoque die. Græcè: διὰ τριῶν ἢ τεσσάρων ἡμερῶν. Quod est: Curriculo triū, aut quatuor dierū. Cum qua lectione in vnum co spirat sententia illa, quæ paulo post habet in hūc modum: Ergo neque astitue i ægrotanti corpori admoveere conveniet: nec cūm conveniet, scilicet illinire: verim in hyeme bis, in æstare semel id fecisse, est sanis. Vnde liquet ex sententia Galeni, minime quidē tertio, aut quarto quoque die, illos ægros picandos esse, sed semel quidem æstare, bis autē hyeme: sic tamen ut singulæ vices tri duum, aut quatrinduum occupent.

Pag. 331.

Membranulam mollem firmamque cuti gummi illitæ circumvoluens. Græcè additur: μεμβρανὴν. Hoc est: Ex charta membranulam.

Lib. I. de arte curativa ad Glauconem.

Pag. 7.

Leonicenus: Et oculorū morbus manifestus. In excusis exemplaribus græcis legitur: αἰτία. Ve tulusimus autem manuscriptus habet: αἰσθησις. Vt sit sensus: Oculorū etiam motus iudicat, etc. Nā qui fieri potest, ut manifestus sit in eis oculorū morbus, cūm vix possint (quod postea subditur) palpebras ipsas attollere?

Pag. 14.

Nam quæ velociter fiunt, ac celeriter ad statū veniunt, etc. Græcè legitur: τὰ γὰρ ἴδια. Hoc est: morbos acutos.

Pag. 17.

Non igitur notæ, minimeque exquisitæ febres diuturnæ sunt, ut quotidianæ & quartanæ. Græcè: οὐκ ἐστὶν οὐδὲν ἀπὸ τῶν ἐξαιρετικῶν καὶ ἐξαιρετικῶν αἰσθησις. Hoc est: Non igitur quædam modū exquisitæ quotidianæ & quartanæ, sic etiam nō exquisitæ sunt longæ.

Pag. 29.

Atque ideo vehementes evacuationes, quæ ex matricibus fiunt, cucurbitulæ mamillis appositæ statim sedant. Græcè: οὐκ ἐστὶν οὐδὲν ἀπὸ τῶν ἐξαιρετικῶν καὶ ἐξαιρετικῶν αἰσθησις. Hoc est: Iuxta māmās applicitæ. Debēt itaque dum sic revellere est animus, nō ipsis mamillis, sed radici earū, cucurbitulæ ipsæ applicari, si qua fides medicorum decretis sit adhibenda.

Pag. 37.

An calidæ sint, ad vrentes. Græcè: ἢ δυνάμει. Hoc est: Atque vrentes:

Ibidem.

Ac submersæ quodammodo. Græcè: ἀπὸ τοῦ ὑποκειμένου. Quod est: Veluti fumigantes.

Pag. 38.

Sed ante crissis perturbationē. Græcè: ἀπὸ τῆς ἐπὶ τῆς ἀσθενείας ταραχῆς. Hoc est: Sed in ipsa ante crissim perturbatione.

Ibidem.

Nam si quod in eo membrū agitatur. Græcè: ἐν τῷ αἰσθητικῷ. Hoc est: Etenim si quæ in ipsa facie pars palpitet.

Lib. 11. Pag. 42.

Leonic. Nam ex duabus speciebus, quæ qui-

dem nuper distæ sunt, altera, etc. Græcè legitur: ἡ γὰρ ἀσθενεία διττὴ ἐστὶν, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος. Hoc est: Aliarum verò specierum duarum, hæc quidem, culus nuper mentionem fecimus.

Ibidem.

Sed minus calidæ & acri, q̄ sit prior. Græcè: ἢ ὡς πρῶτον. Hoc est: Quam illæ species priores.

Pag. 46.

Sufficit autem in humilioris modi affectibus, vellementiam doloris mingere, cum aliquo ex his quod ex vino dulci, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroque sit liquata, conficitur. Græcè legitur: ἡ δὲ δυνάμει ἡ δὲ γὰρ ἀσθενεία, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος. Hoc est: Quæ ex passio, & oleo rosaceo, & pauca cera, quæ in utroque liquata sit, constant.

Pag. 48.

Heipetæ autem, quantum ad totius corporis evacuationem attinet, ut erysipelata curare oportet. Quantum verò ad ipsius particule patientis locum, etc. Græcè: τὰ γὰρ ἐπὶ τῇ αἰσθητικῇ. Hoc est: Quantum verò ad eam, quæ patienti debetur particule.

Pag. 51.

Aut mamillis cucurbitas apposuerit. Græcè: ἢ ἐπὶ τῇ αἰσθητικῇ. Quod est: Aut iuxta mamillas.

Ibidem.

Et cucurbitulas coxis applicueris. Græcè legitur: ἐπὶ τῇ αἰσθητικῇ. Quod equidē mallem vertere, inguinibus, aut feminibus.

Pag. 52.

A consuetis evacuationis faciendæ est. Græcè: ἀπὸ τῶν ἐξαιρετικῶν. Hoc est: coniugaria.

Pag. 54.

Iam verò, & qualitates quædam extraneæ. Græcè: ἀπὸ τῶν ἐξαιρετικῶν. Hoc est: Insolentes.

Pag. 71.

Igitur emplastica omnino medicamēta, quale est Machæronis, & Epigoni, & quod Iliis cognominatur, vbi ad emmоторū vsum deducitur, ceteri indigent admisione. Nempe hæc ad sinus vitilia sunt. Græcè legitur: ἡ δὲ γὰρ ἀσθενεία, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος. Hoc est: Quæcumque igitur exquisitæ emplastica medicamēta cūm sint, quale existit quod ad Machæronem, Epigonemque refertur, quodq̄ Iliis cognominatur, vbi deducuntur ad emmоторū vsum, ceteri miscella indigent: ea enim ad sinus vitilia sunt.

Pag. 78.

Quæ a natura purgationem nō habent. Græcè: ἡ δὲ γὰρ ἀσθενεία, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος. Hoc est: Quæ naturali sua purgatione privantur.

Pag. 80.

Passiones insequuntur. Græcè: ἐπὶ τῇ αἰσθητικῇ. Hoc est: Per cōsensum a ficiuntur cōtinuæ partes.

Ibidem.

Cūm propē loca mortalia sit insignis ad vitio. Græcè legitur: ἡ δὲ γὰρ ἀσθενεία, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἢ γὰρ ἀπὸ τοῦ αἵματος. Sed legendū est, ἡ δὲ γὰρ ἀσθενεία. Hoc est: Prope principales particulas.

Pag. 82.

Hæc quidem ad te missa, qui longe peregrinaturus eras, mediocriter se habere vult sunt. Græcè:

tem. Hoc est: Vt plurimū autē secundum reliqua viscera gignatur licēta febris, infuso bilioso humore in ventrem visceris malē affecti.

SECTIONE SEXTA

LIBRO PRIMO, DE COMPOSITIONE pharmacorum secundum genera. Pag. 35.

Andern. Doctū pariter etis primæ curationis consiliū à morbosis dispositionibus suggeri. Græcē, *ἡ δὲ πρώτη ἐστὶν ἐκ τῶν παλαιῶν καὶ ἐκ τῶν νεωτέρων διατάξεων*. Hoc est: Didicistis autē primum curationis scopum à morbosis proficiat dispositionibus. Pag. 35.

Non adliuc extremū frigus adoliemur. Græcē, *ἐν τῇ ἀποσταθμῇ καὶ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ*. Hoc est: Nō amplius egemus aduentia frigiditate.

Lib. III. Pag. 79.

Andern. Hæc sanē sed & prius ostendimus, in tertio Therapeutices commentario, diximus, quæ præcipientes ea ex demonstratone convenienti ad reliqua deducit. Græcē legitur: *ταῦτα δὲ ἐκ τῶν ἐν τῇ πρώτῃ, ἐκ τῆς ἀποσταθμῆς καὶ ἐκ τῆς ἐξουσίας*. Hoc est: Hæc igitur dicta nobis iam antea sunt, exposcit etiam in tertio lib. De medēdi methodo. Quare præcipientes ipsa cū decenit demonstratone, ad reliqua promouebit, &c. Cæterū diminutē legitur in impressis codicibus, *ἡ δὲ ἀποσταθμῇ*, id quod fecellit interpretem.

Lib. III. Pag. 143.

Andern. Huius generis est lixiua quæ stacte dicitur. Atq; hanc ipsam quæ ex materia subtili vīta est, cedrinū oleū virtute superat. Græcē, *ἡ δὲ τῇ ὑγιεινῇ καὶ τῇ ἀποσταθμῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ*. Hoc est: Eiusdem cum cedrino est generis lixiua stillatiniuocata. Atq; inter species lixiuarū, illa est potentior oleo cedrino, quæ ex materia tenuiorū partium composita, connecta fuerit.

Pag. 153.

Iam aliis multis pharmacis potentia pauculis annis retinere cōtingit: attamen euphorbiū alio nullo sanē minus post thapsiam. Sed clarius in græco exemplari: *εὐφορβία δὲ ἐν τῇ ἀποσταθμῇ καὶ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ*. Cæterū aliis etiam compluribus pharmacis accidit, vt pauculis annis eorū vis evanescit: id quod post thapsiam, nullo minus euphorbiū contingit.

Pag. 172.

Tale igitur consecutus, & hanc ipsam cōmemoratam vnctionē aduaceter punctatū imponito, vbi oras hiare metus est. Cuius contrariū habent prorsus codices Græci: *ἡ δὲ ἀποσταθμῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ*. Hoc est: In quibus veritus fueris ne conueant atq; occludantur oscula. Siquidem vt hiare Græcis est *ὑγιεινῇ*, sic p̄terit claudī, & orificia obstrui: id quod in punctū neruis est summū malum. Ac proinde Galenus, vt omni ratione aperiantur, ducit esse magnū op̄ere precium.

Pag. 110. Vbi agitur de sumptuosiss pharmacis.

Vbi enim quipsi pharmacorū medicorūq;

studiosus nō plura quingētis myriadibus haberet, nullo simpliciiori dignabatur vti multo magis vel duet aliquis vel monarcha odoratum si mol, & quod multa cōstet pecunia volēt habere pharmacū. Illa tamen sententiā prior clarius ex dictione græca percipitur. *ἡ δὲ ἀποσταθμῇ καὶ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ*. Hoc est: Quandoquidem enim quidam pharmacorū & medicinæ studiosus, tamen non haberet plures quinquaginta myriadibus, dedignabatur tamen vti medicamentis vulgaribus: multo certē magis, &c.

Lib. III. Pag. 197.

Andern. Non tamen cum refrigeranti oleo liquare ipsum oportet. Græcē legitur: *ἐν τῇ ἀποσταθμῇ καὶ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ*. Hoc est: Quæ sunt vertenda. Non tamen obvio quovis oleo ipsum liquare oportet. Quam lectionem confirmat sequens sententiā, quæ talis est: Sed si quidem rubor aut calor aliquis in circumpositis viceri paribus præpollere videatur, ex quopis affringentium simul & refrigerantium: cuiusmodi myrtinum atq; melinum est.

Lib. VI. Pag. 319.

Andern. Quod auxiliōriū quædam ratio sola inuenit, quædam experientia, quæ & ipsa rationem requirit: nōnulla vtriusq; opem postulant, subinde nobis est declaratum. Græcē habetur: *ἡ δὲ ἀποσταθμῇ καὶ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ*. Hoc est: Quod auxiliōrium quædam à ratione sola inueniatur: quædam ab experientia sola, nec desiderante rationem, &c. Multa siquidem sola experientia citra rationis opem inuenit.

Lib. VII. Pag. 380.

Andern. Porro ex iis quæ à glutinatione igitur nominantur, nullum auferendum est prius, quā sua sponte abscedit. Atqui si laueris, permittenda sunt. Græcē legitur: *ἐν τῇ ἀποσταθμῇ καὶ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ*. Hoc est: Imo verō etiam si quispiam lauet, sinenda sunt vt adhæreant. Monet itaque tenacia medicamenta, quæ applicamus corporibus, ne in balneis quidem esse amouenda, donec vltro ipsa decendant.

Lib. I. de compositione pharmacorum secundum partes.

Pag. 433.

Anus Cornarius: Aliis verō herbis quæ iuxta humiliores regiones proveniūt, reliqui totius corporis pilis similem generationē habent. Græcē legitur: *ταῦτα δὲ ἀποσταθμῇ καὶ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ*. Hoc est: Reliquis autem herbis quæ in marcidis exvccis proveniūt regionibus, &c. Nempe, alii totius corporis pilis similem generationem fortiuntur. Comparauerat siquidem primō ipsos capitis pilos tritico, auro hordeo crescenti in aruo aliquo præpluigi & fecundo. Nunc verō lanuginem reliqui corporis, similem his herbis habere generationē ait, quæ in aridis locis, Rerlibusq; proveniūt. Confirmat hanc lectionē nostram Galenus lib. xj. de Vsu partium humani corporis, vbi agit de pilis ciliōris. Cæterū codices qui excusi habentur, nō *ἀποσταθμῇ*, sed *mutata* *ἐν τῇ ἀποσταθμῇ*, hoc est, superiores, habent: quā-

quoquam interpretes non superiores, sed inferiores venit.

Pag. 483. De aceto.
 Viprote quod substantia sua modice calidum
 est, plurimè vero frigidum, & parnù tenuum.
 Græci habetur: *αἰμακρὸν ὡς ἡ γὰρ τοῦ αἵματος τοῦ ἰσχυροῦ
 διακρίνεται, ὡς καὶ τὸ αἷμα καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸ γάλακτος.* Que
 mallem sic reddere ad verbi: Viprote quod sub-
 stantia quidem sua obtineat paucillum calidi
 plurimum autem frigidū, atq; tenuum paruum.

Lib. 11. Pag. 516.

Corn. Quæ Archigenes cōsequēter scripsit, in quibus est etiam Galeni cēsurā. Græcē: *ἡ δὲ τοῦ Γαλιήνου κριτική*. Hoc est. In quibus etiam habetur Galeni dīctū et iū.

Pag. 425.

Trax balnea repera, & vnctiones, & porus
dilataci ex exhibenda sunt: omnisq; dacta liqui
dior & boni fucci constitutenda. Græcè habetur:
Hoc est. Omnisq; vnctus ratio humidior,
& boni fucci eligenda. Atqui non omnis vnctus
ratio liquida, est humida: cum plurima sint cō-
sistenda fluida, quæ maxum tamen excedit vim
posidendi, exempli gratia, tum mel, tum aceti.

Pag. 555.

Post exacerbationem verò pharmacis hemi-
craticis uti vrendum: si quidem multa caliditas
percipiatur, his quæ refrigerans quippiam ha-
bent, contra verò hanc, his quæ multum exalfaciit.
Vbi Græcè legitur: *ut in interiori diffundatur*. Hoc est:
his quæ sufficiens calfaciunt.

Lib. 116. Pag. 56.

Comarius: At verò confimilis dolor est ex fe
rore & famiofis humoribus in corpore aurium
generatis, ei qui ex mordacium humorum illa
pū foris usque facto contingit. Græcè tamen nō
habetur, in corpore auris generatis, sed simpli
citer in corpore genis. Visenus si, cōsimilem
fieri dolorem humoribus ex toto corpore in au
res illapfis, ei qui ex mordacium humorū insul
tu foris usque facto, coningit.

Lib. v. Pag. 791.

[illegible]

Lib. v. 4. Pag. 741

Comarinas: Quando vero velviti induratum quiddam de iofimatione relinquitur, pentu non convenit, astringens ad discufforium mifce re, nifi prius totum corpus fit evacuatum. Contrarium Græci codices diftante: *βρωσις δὲ οὐκ ἐπιφέρει ἀλλὰ τὸ ἀντιπαρατίθεται τῷ ἀποκαταστατικῷ, ὅτι καὶ ἀποκαταστατικὸν δὲ τὸ ἀποκαταστατικόν, ὅτι καὶ ἀποκαταστατικὸν δὲ τὸ ἀποκαταστατικόν.* Quod est: Cum verò ex inflammatione suppurat.

velyti indoratum reliquum fuerit, penitus nihil attingens mifcendum difcutiendibus eft, vi vniuerfum corpus fit evacuat. Galenus itaq; precepit, vt poit totius evacuationis corpora, in plethorone in fcorbutum degeneraverint, folis digerentibus, difcutifforifiq; vtamur: quandoquid tunc verendum non eft, ne humores coctitimus ad partes: nimirum corpore ad omnes diuidantur libero & immuni exiftente, ob precedentem evacuationem.

Lib. de Theriaca ad Pisonem.

Page 1045.

Adernacrus: Quoniam non solum hoc nomen ceteris omnibus precellit, et impetui ad diem sint adepti, fed etiam quod vniuersa bona, vniuersis libenter impartantur: sic ut & di ipsi tantum ex xquo gaudij copiantur, quantum eorum numerus existerit, qui ab ipsis reddatur incolames. Hec tam en postior sententia videtur esse longe durior in grecis codicibus, qui sic habent
αυτοι οι αριθμοι η του ειναι οτι ουδεις απο αυτων δεχομενος το ποσοδος της ευχης ης αν εστιν αμνησιν αυτου. Quod est:
 Non secus quam di ipsi, tanti ex xquo gaudij copipientes, quantum illi qui ab ipsis seruauerunt.

Pag. 1049.

Nos verò cum hæc videamus, sciãmusque id quod posuit ratione vniu'ssalis medicinæ naturæ virtutis proprietatem verè agnoscere. Græce legimus: *ἐπεὶ δὲ τοῦ ἰσχυροῦς καὶ αὐτοῦ τὸ ἐκείνου ἐστὶν περὶ τὴν φύσιν*, etc. Quem loquimur dicimus, etc. Quem loqui diffici- lem ego sciam sic vertere: Nos verò cum hæc cer- namus, assequamur ratione id, qd verè possit exprime propriætatem facultatis naturæ cuiuslibet pharmaci, etc.

Page 1067

Adhuc enim peculiariter verba porius habeo, quoniam manifestiores enim in corpore cōversiones, mutationesque nō indicat. Grgce legitur: *οὐ γὰρ παντὶ τῷ σώματι μετατρέσσεται ἐν τῷ πνεύματι*. Hoc est: Quoniam manifestiores in corpore cōversiones, mutationesque indicare potuisset.

Pag. 907.

Porro erunt animalia colore subflava, corpore robusta. Græce habetur: *αἰσίνερα ἐπίφω*. Hoc est: Eximia quadam agilitate mobiles; viperæ scilicet. Lib. II. de antidotis.

Lib. u. de anni

Page 1171.

Andemacus: Hæc Nicomedes rex viebarur, si
quando eos qui eum vocauerant, in suspitione
liaberet. Græce legitur: *ἂν ἴσθαι ἄν τις ἀνδρα-
νήναι*. Quæ sonant: Si quando eorum, qui invi-
tassent ipsum, habebat libi fidem suspectam. Si
quidem *ἂν ἴσθαι*, tum vocare, tum invitare, ad
conviniūmque hortari
significat.

ANNOTATIONVM AND. LACUNARVM
IN GALENI INTERPRE-
TATIONE FINIS.



EPITOMES GALENI RERVM

MEMORABILIVM, QVAE
IN ILLA CÖTINENTVR OMNIIVM, IODEX
PER QUIV M COPIOFVS : CUSVS PRIOR
NVMERVS COLUMNAM, POSTERIOR
VERÖ EIVSDEM COLUMNAE
VERSVM DENOTAT.

A



BDOMEN vulnerati
cöfuerndi ratio 875.

Abdomine vulnerato,
cur medicare forant

fit salutaris angustia 871,3

Abdominis descriptio 874,37

abdominis musculi duo obliqui 174,33

abdominis musculi octo, quatuor con-
gationibus comprehensi 94,30.

abdominis musculi obliqui quatuor
330, 16

abdominis recti musculi 175,31. 330
10

abdominis musculi transversi 175,30.

abdominis musculi octo, quatuor con-
gationibus comprehensi 94,30.

abdominis pars anterior eam adnata,
aegrius curatur his que consistunt
ad latera 874,33

abdominis urinae 146,3

Abdominis potentiae alteratiles duo
sunt genera 681,37

Abitus redduntur mordacitatis expertis
1024. 61

Aberfus quem constitutionem sequatur
300, 56

Aberfus 86,11. quando accidit
297, 16

Abrotani cinis ex aliquo oleo calido, bar-
bam lardis nascentem elicit 1066,8

abrotani duo sunt species 1061,43

abrotani temperata & essentia Ibid.
16

abrotano si quis perficitur ante inna-
scentiam, morbi a febrili rigore infusa
bitur Ibid. 30

abrotanum inuicem utericulo est I-
bid. 39

abrotanum acrius perimit Ibid. 33

Abstersibus qualis soleat inesse corpo-
re 978,49

abstersibus qui in miseribus delitescunt,
medicamenta que ex aromatatis com-
ponuntur, maxime sunt ex usu 949,
54

Abstersus quando ferendus sit, & que in-
pore 935,42

abstersus quid 978,43

abstersus quomodo fiat 706,41

Abstersum curatio 978,62

abstersum duplex genus 949,33

abstersum modi duces 63,1

Abstersus duplex facultas 928,7

abstersus naturae & species 480,
15. 1065,45. & 50. & 53.
1073, 37

abstersus potius quibus sit eductus, &
quibus congruus 410,49. 816,
36

abstersum hepatis opitalatur 921,5

abstersum vocis repurgat meatus, foris
nequaquam 1057,13

abstersum Ponticum eligendum ad lece-
ris & urinis phlegmaticis 922,11

abstersum remedium summum contra bi-
lis molestias 961,17

abstersum utericulo gratum 1065,
40

Abstersgentia leniter, producte de carni
sunt idonea 1116,10

Abstersendum ab omnibus mali succi cibis
180, 19

Abstersgentia omnimoda induci nascuntur,
ac praequam succum accommodat 453,
61

Abstersiva sensui, quaedam inuicem di-
persa, quaedam essentiae cogno-
scentur 10,35

ACACIAS facultas 1067,69.

Academicon falsum dogma 3,45

Acaphyes sunt vocae facultas 389,16

Accessio morbi naturam commouet
610, 7

Accessione febrili inuadente, cur argi so-
pere conueniat 717,14

accessionem futuram cognoscere in febrili-
bus, maxime est utile 809,9

accessiones febriles unde oriuntur 899,
6

accessiones longiores aut breviores unde
emittunt 800,21. & 30.
& 33

accessionis febrilis declinatio est humo-
rum essentiarum diffusio 801,
39

accessionis febrilis tempora describuntur
Ibid. 26

accessionem circueas quando desinunt,
& quando persuadent Ibid. 57

accessionem imparitas unde contingat
800, 18

accessionum proportio quomodo expla-
randa 699,59

accessus queq; fortius quatuor tempora
619,9, 21

Accidentia decretoria 819,19

accidentia & symptomata quomodo dis-
fruant 844,27

accidentia propria indicant locum effe-
ctum 727,13

accidentia superuenientia trifariam diui-
duntur 619,33

accidentium proprietates, morbum decla-
rant 727,31

Acipitris vires 1275,7

Acetia que sunt 1020,15

aceticis valentibus austeris cur asfringunt
383, 45

aceticis & acidi deservunt 1042,27

Acetritatis ut duas qualitates mutatio
1043, 3

Acetrum corpus tripliciter excolitur
1042, 64

acetrum, frigidum est Ibid. 12

acetrum quid 861,47

aceticus acido sapore magis terrensus
1042, 37

Acetisiant in uterulo cibi, ob causam fri-
gidam 726,14

Acetabula 1062,3

acetabula sunt cotyledones que 109,1

acetabulum capii sequebatur 119,2

Aceti facultas 418,35. 909,14.

921,65. 1018,3. 1044,49.

1099,8. 1162,30. 1180,8.

aceti temperatura non longe a media di-
stat 1017,13

aceti usus quando induratus constat
945, 47

aceticus quomodo utendum 909,39

aceticum ardorem & obspasum excitationem, suis
refrigeratione refinguit 1017,33

aceticum biliosis utroque humore, melius debet
adacrisse 1019,3

aceticum cui sit remedium sit 1017,52

aceticum cur rosaceo miscetur ad phren-
ticum 1201,45

aceticum ex contrariis facultatibus constat
1040, 63

aceticum frigidius est minui ex parte quam
calidius 1016,55. 1017,18

aceticum magis refrigerat quam mel calidi-
us 1045,4

aceticum misceatur fortius facilius 946,
54

aceticum quando miscendum phlegmona-
rum medicamentis 923,24

aceticum quando sit rosaceo miscendum in
capitis affluentiis 1201,54

aceticum que ratione dicatur neutrum
1017, 41

aceticum que ratione sanguinem fluentem
sistat 1017,4

aceticum rosaceo mixtum, quibus pro-
prietatibus inflamationibus & quibus mixtum
1201, 59

aceticum scilliticum 1006,51

aceticum scilliticum orthopneicis & albi-
maticis maxime opitalatur 1247,
46

Achorem suauitatis, curatio 1195,38

Achorem quid 709,2. 1195,44

Acida frigida tenuiora est puriora
1041, 15

Acida omnia sunt frigida Ibidem 3

Acida que dicuntur 1020,39

Acida rursus a quibus eduntur 615,15

Aciditas unde oritur 1045,49

Acida-

I N D E X.

- Accidens in aëre 1041,63
 Accidens semina affrigent, nihil mu-
 tantur in corpore 351,2
 accidens substantia ex quibus consistit
 libid. 1
 Accidit hydrops facies 1064,44
 acrimonie purulentes quoniam sunt ba-
 terici libid. 41
 accipiens serpens ut perit 127,152
 Accipio quid esse debent 1186,43
 accipio ex abute compositio contra omnia
 infirmitates valens 467,50
 Accipio ad articulares dolores 1187,33
 accipio ad dolores catarrhales, articulares
 impetiales, & per alium admodum
 effluat 1188,19
 accipio ad omnia acris, cum dolore
 1187, 19
 accipio Apoplexia, fatidum libid. 15
 accipio Cistis 1187,15
 accipio ex castoris 1187,15
 accipio ex melle libid. 11
 accipio Hæmæ 1188,19
 accipio Thymæ 1187,15
 accipio unde Halici libid. 64
 Accur. facultates 1064,34
 Accur. amore calidum 1057,59
 Accur. amore calidum 1046,17
 Accur. com. calore incident, acris cum re-
 frigentia 1183,53
 acris & acria corpus parcius nutriunt
 390, 56
 acris largius sumptis, que mala infirmitas
 414, 1
 acris nix, ferid habent adorsum dule-
 dinem 1047,61
 acris omnia mordacitate sunt & cali-
 da, truci ac uiolenti 414,41
 acris omnia partuantes admixta, fluctua-
 nem augent, nisi corpus purum repe-
 riant 996,66
 acris omnia; succos crassos truciare pos-
 sunt 415,64
 acris que sunt 413,62, 1010,17
 acris quibus conuenient 391,6, 414,8
 acris seruatæ, sua acrimonia exacerant
 interna 57,47
 acris remanent admodum, dum adolefcent
 414, 35
 acris ulceri admota, rigorem afferunt
 714, 59
 acris, affluunt usui deuitandus 197,4
 acris facies 414,1, 1140,12
 1176, 39
 Acrobardones 709,10
 Acrobardones curati 953,14
 Adia alteritatem attrituam quando abo-
 litu, interduca, & deprauata dis-
 tur 667,55
 Adia animalis sensibilibus quinduplex est
 667, 13
 Adia animalis triplex libid. 31
 Adia cur non delectat esse absoluti 845,
 56
 Adia duplex 667,19
 Adia & passio quid 664,31
 Adia ex accidenti que 21,9
 Adia ex commoda oritur temperie 79,
 40
 Adia gubernatrix triplex est 669,40
 Adia leuiter necessaria, leuio ipsius in-
 firmamenta 724,14, 725,19,
 735,54, 846,51
 Adia leuio partem affectum inducit
 727, 13
 Adia membri promptissime ad calorem in-
 modico leuiter 427,60
 Adia motrix variata pro infirmitate
 diuersitate 667,37
 Adiaque, accidentaria qualiter indican-
 de 674,49
 Adiaque corporis præcipue in punctis
 agunt, ut animales in prouidentibus
 473, 19
 Adiaque corporis unde oriuntur, dignatio
 114, 19
 Adiaque, magnæ et minores sunt ad
 stantibus aut sedentibus rebus 210,
 27
 Adiaque, mas inie necessaria & inbe-
 menissime, que figura sunt 104,
 53
 Adiaque, motrices que dicuntur 719,7
 Adiaque, naturales quatuor 666,44
 Adiaque, partium duplex, simplicis ac
 pæ & compositarum 215,19
 Adiaque, partium firmitas, seruata ille-
 rion temperie 120,14
 Adiaque, præcipue que dicuntur 759,
 6
 Adiaque, relique sequuntur in leu adia,
 post adiacentem mandendi 107,60
 Adiaque, sequuntur corporum constitu-
 tiones 411,13
 Adiaque, substantie immutantur proprie-
 tatem 114,14
 Adiaque, ualida, uigentium atrium infe-
 parabilis sunt nota 694,56
 Adiaque, uariarum ob deflectionem qui illi
 accidit crebriores reddunt 157,55
 Adiaque, uoluntarias quoniam partium sunt
 propriæ 445,17
 Adiaque, uoluntarias duplex significatio
 136, 46
 Adiaque, appetitibus symptomata 666,
 38
 Adiaque, cognitio motum conferri ad co-
 gnoscendos affectus partium 310,
 5
 Adiaque, imaginatricis symptomata que
 666, 8
 Adiaque, interduca, motus immutantes
 ostendit 699,51
 Adiaque, leuio est affectus partium symp-
 ma 735,16
 Adiaque, motrices symptomata triplicia
 667, 62
 Adiaque, nutritoria symptomata 666,
 40
 Adiaque, rationatricis symptomata libid.,
 12
 Adiaque, sensus leuiores que 865,42
 Adiaque, utrum quando promouendum
 sit morbus 411,1
 Adiaque, enim, principium singula
 quid significat 87,55
 Adiaque, animalium quinduplex sunt sym-
 ptomata 666,49
 Adiaque, duplex natura 21,6
 Adiaque, interduca non est uerba na-
 ta, nisi sit præter naturam 430,53
 Adiaque, leuio duplex 667,17
 Adiaque, naturalium symptomata duplex
 666, 28
 Adiaque, rebus, ad uisionem fortitudinem
 sequitur 697,49
 Adiaque, robur consequitur, ad eadem
 & suum temperantiam 118,
 43
 Adiaque, nutritoria naturalis exordia 674,
 Adiaque, quoniam magna ex parte à propria
 organo substantie procedit 197,1
 Adiaque, propria singula meti, propter sub-
 stantie proprietatem 341,19
 Adiaque, propria que 22,8
 Adiaque, partium quid sit 31,5
 Adiaque, quid dicatur 715,9, 736,35,
 744,19, 846,64
 Adiaque, rationatricis que copulatur animæ
 666, 19
 Adiaque, sentiendi triplex symptomata admi-
 ni 668,16
 Adiaque, toxice que 97,49
 Adiaque, calidum, frigidum, humidum, sic quod
 modis dicatur 55,12
 Adiaque, & potestatis calidum quod uoluntarie
 dicatur 61,10
 Adiaque, præfens quid & perfectum 55,
 46
 Adiaque, Aliquid, commune multis præ-
 ribus 531,10
 Adiaque, quod dicatur 60,16
 Adiaque, quoniam habent essentia & uirtus
 1143,43, 1189,14
 Adiaque, crebro subiectis 257,14
 Adiaque, crebris contra succos intestina
 eroderentur cur facias 1019,18
 Adiaque, & pinguedo prius sunt carnis
 nos elementum condimenta, quoniam di-
 minuta 395,7
 Adiaque, gellumque atque aserunt, quoniam
 inflammationis auribus medentur 6
 Adiaque, quibus adherent parib. 310, 6
 Adiaque, qui pinguitur 49,32
 Adiaque, quomodo à pinguedine diffin-
 1135, 51
 Adiaque, quo potest pinguitur, & quibus
 partibus adheret 453,1
 Adiaque, tenuium partium lenis dolorem
 1166, 39
 Adiaque, quid 691,19
 Adiaque, differentia 1044,49-1055,
 55, 1155,55, 1182,50, 1186,57.

EPITOMES GALENI

adipis usui	110,4	arri est facultas	122,7	fluxione orientis, sunt quatuor	
Adiuvante seipm, ad unitatem in re-		ar matris est respirantis	482,41	7081	1
bus abstractis inquirendum	13,29	ar naturae frigidum elementum	70,	Afflictum uentris acquiescentiam, dif-	
Adiuta sanctoris	216,17	48		ferentiae odo	417,1
Adolescentes ad omnes uelutarios alio		ar purus a colore mutatur	147,47	Afflictio parvis duplex	101,14
ris aptissimi	411,17	ar nobilis designat phlegma, siccitatem		Afflictio alacris unde	699,19
Adrianus imperator	809,14	conferat ad coram candorem	115,16	Afflictio cognita facile invenitur remedia	
Adrianus rector	64,13	ar quide usui nobis sit instrumentum		471,	5
Adultera medicamentorum, cor non sunt		147,	16	Afflictus in summo calido, frigido in sum-	
decenda	111,42	ar quando nos ledet	430,23	mo parandum medicamentum	61,9
Adversaria sunt & astringentia que		ar quatenus in morbo sit praesidium,		afflictus mentium maxime in genere dirigitur	
sunt	865,48	vel causa morbifica	907,31	semper curantibus consilium	187,1
¶ AIDES fibrinibus quales effici-		ar quatenus nos afficiat	819,59	afflictus in crassa fluxione orti	411,13
unt	90,10	ar qui optimus	435,14	afflictus aliorum, medicamenta uerbementis	
Aeger quando consulendus	87,14	ar redditus ferocissimus spirante brevia		causa erigunt, quon si in superficie	
Aegleas quid sunt	1067,43	689,	11	consilium	975,18
Aeglepis descriptio & curatio	121,41	ar solus efficit uocem	649,43	afflictus animae principalem facultatem,	
51		ar temperatas temperant conuenit: in-		consilium in cerebro	719,61
Aeglepis in berberis	378,17	temperatis contrarius	435,40	afflictus animalis nec innoxio, nec ira-	
Aegri excruciantur non opus habent		ar unde suas mutationes fortiter		tionali animanti innasci potest	315,
161	16	914,	30	47	
Aegrotare quando caput ducatur	715,	Aeruginis uis	850,4	effectus animi qui	410,9
52		1172,	29	effectus animi quicq;	411,16
Aegyptia Andromachi	1180,40	aeruginis species & uires	112,33	effectus in crassa fluxione orti	411,13
Aegyptia Claudii Philoxeni	118,11	Aerugo per se adhibita, rostem &		effectus calidi	713,55
Aequitas iniquitasq; in uno pulvis		polegonum excita	115,43	effectus co-ferentia non inducit	115,17
in pluribus sit, ordo autem confusioq;		Aetiae crescit ipso pulsu, sed longior-		16,	10
in pluribus sonitu	111,9	fit facultas	639,17	effectus corporis existit fundentis causa	
aequalitas quid	497,16	assidue temperis	630,56	843,	14
Aequiliter mutari que dicitur	121,55	Astutus uisus ratio conueniens		effectus diabete similis quatuor	771,
Aer accensio sit fluxione	1040,29	411,	1	11	
aer alius est calidus, medicamenta potan-		Actes florent in medio extremorum		effectus distinguat a uisus	310,5
tia	1017,61	46,	35	effectus est motus animi, rationis inobedi-	
aer ambiens tale inter uidentem sit in-		ates omnis postea uigorem frigida est &		dictus	318,53
firmamentum, quale uerus in corpore		fusa	805,14	effectus & morbus quid differant	
141,	43	ates puritas quantam uim habeat ad for-		664,	16
ar calidissimus quomodo refrigerandus		midos mores	414,19	effectus & passio quid differant	
907,	44	ates que facile & diffundit uacua-		15	
ar frigida quando uidentem	908,61	tiates integritas frat	964,42	effectus fibre qui uacent	596,47
909,	10	ates sensu frigidissima diarum & sic-		effectus frigidi	713,59
arrem ambientem esse ueluti cognoscunt		cissima	46,43	effectus bonitatis quid a molli differat	
corpori	439,19	ates uigens omnium biuississima	790,	465,	50
ar imperio calidior, quid in corpora		54		effectus hypochondriaci que frequen-	
nostra molitur	781,15	Aetates numero antea non circumferi		tor	741,59
ar impurus, emet aetati aduersatur		hinc	471,13	effectus hypochondriaci	613,35
415,	37	aetatem calores que methode dignificandi		effectus inmodici succus quid inducit	
ar in curandis morbis uel tuenda soni-		47,	1	465,	59
tate, obuium rationem casus sine qua		Arthropes ob facilitatem cutis habent pil-		effectus in alto sitis, uerbementum me-	
non	902,10	los paruos & incrementi nullius, cal-		dicantem non requirere, quoniam ut ex-	
ar differens	435,14	uiscant tamen arge	278,59	olus in itinere possit	813,60
ar frigida effectus	908,51	Arthropes omnes crispi	51,1	12	
ar inspiratio quantitas, in quibus reser-		¶ AFFECTIBVS cognoscendis co-		effectus infestantes per circuitus	797,
detur magnitudinis dilatationis labora-		ducit aetatis, conformationis, causarum		42	
tis	716,61	procacitatem, consideratio	471,	effectus lethargici & cataphorici si-	
ar positiua constitutio que sit	781,	2		ad aduocandos, quibus curamus	113,8
51		Affectibus, locisq; effectus cognoscendis,		5	
ar portio uisus ad cerebrum, alia ad pul-		que sunt necessaria	27,31	effectus magnitudinis est triplex	887,8
mones illabatur	482,44	affectibus rheumaticis quid consistat		effectus melancholici qui	191,19
ar purior unde acidit	781,19	1150,	56	effectus melancholici quomodo in deben-	
ar sequens & floris facultas	1110,8	effectibus similibus facilius singula		di	705,24
ar subtiliora transformat	781,17	corripuntur, minus tamen periculatu		effectus nullus sanatur persedat, monen-	
ar temperata in ulceribus curandis		tor	119,61	ter ipsius causa	887,10
e dependenda	84,11	Affectibus per consensum species duae		effectus emmum partium unde cognos-	
ar trinitas unde inducit	1017,46	728,	11	cantur	87,17
ar uisus	1126,2	Affectum que ex humorum assidue		effectus per consensum quando sit pulan-	

I N D E X.

duo	717, 11.	739, 33	ratio	94, 166	alica quomodo asserendum	413, 16
efficitur per se labefactionis functionem,			efficitur ratione, curatantis scopum docet		Alia: lentur corrigendus acris & por	
modus	80, 16		119, 7.	62	ro	438, 64
efficitur presulentes quid iacet	1117, 34		efficitur soporiferum causa	716, 57	alica sorbibus quibus sit propinquenda	
efficitur prater naturam est triplex			efficitur triem prater naturam pro-		172,.	43
664, 12.	843, 19		pria & communia que	846, 36	Alimentum mente cap raram & maxime	
efficitur primarij distinguendi ab illi, qui			Assuetudo rei aptitudinis, maxime obli-		gustatione reddens	493, 14
fuerit per consensum	716, 28		veti aut ex capiendo efficitur		Alimentum mente obliuiscitur amantem	
efficitur primarij qui sunt	719, 50		776,.	11	obliuiscitur, que postea conseruit &	
efficitur profundi phlogica diuersa ab			Assuetudo quod pati est	664, 34	& magna obliuiscitur	493, 13
illis que in superficie habent, deside-			efficitur per consensum quando dicitur ce-		Alimentum duplex	797, 64
rant	1201, 35		redram	717, 62	Alimenta ad suam naturam immutat	
efficitur proprium	330, 10		efficitur quando dicitur caput	713, 10	carum, & immutatur ab ille 687,	
efficitur quando primarij sit putandum			efficitur quid	ibid. 42	39	
737,.	9		AGARICI optimi notae	1281, 56	Alimenta & medicamenta, que sapore	
efficitur quid	312, 39-316, 36		Agarici radices faciliates infignes		conueniunt, conueniunt faciliates quo	
efficitur quid inducit	914, 6		1067,.	13	que	370, 13
efficitur quomodo compensatur	331, 60		Agrippen quoniam non possident	ibid.	Alimenta intemperata quomodo corrigi-	
efficitur sedari tempore, etiam si opinio			37		da	1047, 2
asym permanent	331, 57		Agrotati uis	1139, 6	Alimenta medicamentosa	369, 48
efficitur similiarum partium sunt	394,.		Agere in seipsum nihil potest, sicut nec		Alimenta tabula que conseruit	1084,
394,.	47		se continere	697, 21	19	
efficitur simpliciter, simplex remedium pro-			agere quid	718, 41	Alimenta laxantia	360, 31
stulata	452, 62		Agglutatio praeteritae assimilationem		Alimenta trahit facilia que	108, 12
efficitur soporosi omnes conspiciunt in ce-			281,.	60	Alimenta uenerata	710, 15
rebro	745, 64		Agni casti, uel uicis feminis faciliates		Alimenti distributio	341, 13
efficitur stomachicus inducit animi deli-			578,.	2	Alimenti incrementi ratio	38, 44
quum	557, 15		Agria carminet diuorant albidum		Alimenti instrumenta prima & princi-	
efficitur suum ipsorum sublationem duc-			106,.	3	palsissima que	219, 58
teat indicent	16, 53		agria factum contigit totum	106, 4.	Alimenti instrumenta secunda que	219,
efficitur tempore conquiscent	55, 13		124,.	30	60	
efficitur thoracis ac pulmonis distentiones			agria: membrana que	105, 14, 305,	Alimenti instrumenta tertia	ibid. 64
sunt febre, a quibus uicis immor-			16		Alimenti principium spiritus	324, 36
419,.	4		agria: tunica quere sui generata	110,	Alimenti temperata, intemperata seruanda sunt corpora	363, 57
efficitur typis carentes qui	810, 7		31		Alimenti priuatio unde accidit	687, 36
efficitur uarij si in unum conspiciunt, quid			Agria quid	681, 60	Alimentum celer tardiusque transmutan-	
agria	453, 34		Agria omnia diuersisibus carina		di	569, 27
efficitur unde profuscentur	310, 26.		1069,.	40	Alimentorum corrigendum fides unde	
419,.	39		Agria	387, 50	pericula	1047, 6
efficitur causa cognita plurimum ad re-			ALABASTRITES Quas uires		Alimentorum faciliatum indicatibus ut	
medij immutationem conseruit	314, 62		habet	8109, 38	de seruatur	561, 22
efficitur causas consistere in anima fa-			Alia aseruit gallinacea	398, 34	Alimentorum secunde qualitates expla-	
cilitatem irrationalem	310, 15		Alia que uocantur	131, 61	rande	770, 11
efficitur cognitio quid iacet	465, 36		Alia uoluntium, Alimenta quida praeferat		Alimentum ab hepate in uentrem regeri,	
efficitur cognitio remedium existit			407,.	25	quando necessarij sit	699, 60
materia	170, 43		Alauda ista colicos mouet	3273, 10	Alimentum a medicamentis que differat	
efficitur computationem remediij consi-			Albugini bonoris usus	267, 50	1039,	50
lilium commune	432, 6		Albugo cui ad ophthalmia uisus	1121,	Alimentum coquitur in intestinorum trans-	
efficitur consensu in uterico & ce-			23		sunt	321, 40
rebro	741, 31		Alumen cui quibus efficitur conferat		Alimentum ex piscibus promouens, fan-	
efficitur corporis prouidentia omnis,			319,.	61	gamentum gigit tenuis consistens	
in duobus consistit	470, 44		Alumen ouorum agere carcoquitur		quoniam quod ex piscibus	1999, 45
efficitur curatio pro differentia affec-			930,.	57	Alimentum diuersis, distribuitur, diffinit	
tionum partium moribus	712, 15		Aluminis omni usus in efficitur uolun-		tarij carnis	392, 50
efficitur duplicia genera	44, 12		rum	1216, 13	Alimentum rostris corporibus accommo-	
efficitur interuentione cognitis, conuul-			Alysiarum faciliates & differentia		dationem quod	408, 19
si nititur	1249,.		1142, 51.	1891, 14	Alimentum omne cur crassum debet esse	
efficitur aqua unde sumantur	717, 11		Alcipharmacum media sunt inter ables a		& lenum	808, 14
efficitur per consensum curatio	716,		carpora, & lenum medicamenta		Alimentum omne quod supra modum ca-	
37			1000,.	28	lesum, praesertim dulce & pingue, de	
afflictum propria signa que sunt	72,.		Alcipharmacum commodum inferre in in-		amarum conuertitur bilem	616, 53
60			terendum letalia		Alimentum si a quale caput substantia	
afflictum qui cum peragatio & diuino			Alge uis	1075, 16, 1112, 61	afflictus	317, 21
infirmitate curatio	941, 59		Alia biliosa naturae conuenit	890, 16	Alimentum triplex secundum Hippocra-	
afflictum qui cum sapore transmutat cu-			Alia ex genere tritici	871, 38		

EPITOMES GALENI

121	4, 12, 19	Alimentum inaleuticum uelut fides	amara bombaris et plantis sunt aqua
alimenon ualentius uelut exhibendum	123, 18	quod uacuat, magis conducit 961,	sa 1040, 44
alimenon ubi plus elaboratur, ibi am-		16	amara minus amon putrescent ibid.
plius superfluit gignitur 416, 64		419,	10
Alim ut	1061, 31	Alteratio circa consilium non fit	Amara ubi uis 1969, 28
Alisma cibus fit facultatis	1076, 37	16	amara odorata non sunt 1050, 33
Alismu acculator dolori colici 913, 33		alteratio humorum 2 quibus fit 819, 15	amara emissa sunt calida 1042, 63
alium elixum, inebullans quidem, bren-		alteratio in animalibus triplex 1033, 59	amara que dicitur 1010, 15
gnum tamen reddunt 391, 64		Alterationes in genere sunt duplex	amara quibus morbis conueniant 1042,
alium cibus ut medicamentum. Ibid.		1019,	17
61		54	amari facultates Ibid. 16, 117, 6, 31
alium status dicitur	932, 14	alterationi naturali, prout naturam, et	amara coloris fit excessu 1043, 19
alium dicitur rusticiorum dicitur Ibid.		medic, que insunt	amara dulci caliditas 1044, 28
36		alterationis eorum causa, temperies ut	Amalgamum ubi effecti sunt omnia sub sen-
alium utrumque quam habet uim 1107, 7		tricoli	sui cadent 1021, 22
17		alterationis error, conueniens est sym-	Ambrasia uult ab omnibus humoris
Alae biliosorum dispositionum uentris		poma	419,
optimam est medicamentum 1149, 60		alterationum differentia ubi	63
alae grata est uentriculo 1061, 64		84, 4, 1	Ambrasia Andromarbi, fibris repe-
alae infestissima est in temperie calida		84, 13	teribus per circuitus confertur
et sic circa uisum fuit 1249,		alteratio per contraria molenda 30, 17	1244,
36		alteratio putris humorum conceptio est	4
alae infesta, salutare est medicamen-		813,	Ambrasia ut 1069, 31
tum sedis et puluerem dicitur		84, 39	Ambulatio, curfus, statio, quomodo fi-
871, 60		alteratio quid 842, 45. 845, 65.	ant 105, 14
alae tota, ad nihil aut parum purgat		1255,	ambulationi qui musculari sunt necessarij
1033		10	217,
alae purgat humores in iunctis uentriculi		alteratio quae motus	8
imbibus 1163, 33		73, 14	ambulatio prima est eris alio Ibid. 7
alae quibus afflicti sunt confrat		Alteratio facultas singulari inest ani-	ambulatio quomodo fit 210, 54
1061,		malis partibus	Ambustus omni inopossum meles
66		1111, 50	1140,
alae elata facultas 1163, 35		Albae radices cum seuo aspersio uis	15
1249,		945,	ambustus que competant 1090, 31.
alae facultates 615, 5. 1061, 62.		19	1116,
1220, 35.		Ala facultas in crudis animalibus re-	41
alae nullus est usus in phlegmones me-		medicus est	Amantia tactum animalibus inest, quon-
dicamentis 941, 10		Alumen ordinata dicitur	iam humoris 70, 13
alae usum in febribus, improprie Galenus		945, 9	amantia quid 666, 13
470,		Alumine sola cur non fit ad electa utra-	Amantia thymianatis uires 1185, 51
alae usus, in temperie laborantibus circa		dam	amantia ut 1070, 14
humorum redundanciam, deiecit in		Aluminis differentia	amantia aceto liquatum lino indur-
talem 1249, 44		Aluminis omnes genere excludit aspergius	ato conducit: idem quoque musculari
Alopecia alius progressus remedia Ar-		1133, 11	induratis 945, 54
chigenis 1191, 1		Alumina sola cur non fit ad electa utra-	amantia inter emollientia principa-
alopecia causa 1169, 12		dam	lia dicitur 1180, 53
alopecia facile curabilis argumentum		Alumina sola que confertur	Am omni facultas 1070, 18
1191,		891, 41	Amar in procreta 297, 19
5		Alumina sola que confertur	Amphibienem que multum grauida su-
alopecia rebus curatio Ibid. 35		891, 41	pergreditur, facit abortum 1275,
alopecia quando accidit 278, 51		Alumina sola que confertur	14
alopecia curandam scopis prima-		891, 41	Amara uires 1069, 35
rius quis 1193, 40		Alumina sola que confertur	Amara quid 1016, 53
alopecia quid inest 1074, 54, 1091,		891, 41	Amalgama amara, dulcibus potantibus
35. 1098, 35. 1133, 35. 1136, 35.		Alumina sola que confertur	358,
1141, 34.		Alumina sola que confertur	54
alopecia inde 954, 1		Alumina sola que confertur	Amalgama, curae, mactis, pistulae, mactis
alopecia uteris medicamentum e-		Alumina sola que confertur	ponit, quid ad tramen uis ratio
poma 1190, 46		Alumina sola que confertur	nem confertur 418, 7
alopecia medicamentis simplicibus que co-		Alumina sola que confertur	Amalgama non multum metroni 385,
gunt Ibid. 10		Alumina sola que confertur	57
Alphorum generatio 1098, 14		Alumina sola que confertur	Amalgamum facultas 385, 51, 1070, 3
Cura 1098, 14		Alumina sola que confertur	Amali loti facultas 1217, 1
Alutabile facile omne primis calere		Alumina sola que confertur	Amali facultas 372, 63. 1103, 52
63,		Alumina sola que confertur	Amantia induratis uires et com-
Alterabilium natura que fit 1030, 14		Alumina sola que confertur	posita 1184, 38
		Alumina sola que confertur	Amalgama et aqua que dicitur
		Alumina sola que confertur	1140, 20
		Alumina sola que confertur	Amalgamum utriusque facultas 1070,
		Alumina sola que confertur	21
		Alumina sola que confertur	Amagri facultas Ibid. 39
		Alumina sola que confertur	Ande-

animalia leui pectoris & calidiora, tra-	do	759,4	7
cordiora sunt	351,60		
animalia montana compressibus amia-	122	116,21	
sunt calidiora & superora, atque ideo	animal omne humidum est	1049,16	
præstantiora	416,35		
animalia naturaliter ad ea patria acce-	49		
dunt, que illis magis sunt familiaria	animal que ratione reddatur matron		
427,	128,	19	
animalia non dicuntur calida in summo,	anim al reddi matron insigniter laesu ner		
sed per excellentionem	us, qui excutuntur propter arterias ca		
39,51	rotiles	182,47	
animalia emia, particula uentris sunt	animal sibi simili alimento nutritur	56,	
ac nota sunt	34		
17,7,5	animal sine animæ facultates præstati		
animalia omnium imperfectissima que	citra de dehem	193,35	
plantis similia	animal tribus facultatibus gromibus om		
298,14	ni gubernatur	900,52	
animalia ore prona sententia cibum, ma	animal triplex planta	110,11	
iores habent collum & maxillam infe	animal uelut prius mouetur	315,12	
riorem præterea	Animam appetitoriam Plati in hepate		
27,1,44	collocat	313,3	
animalia plantis præstanti sensu & mo	animam consensu corporum naturis		
tu uoluntaria	90,	11	
900,30	animam deliterre in corpore Chrysip		
animalia pulmone carentia singulum	pui quibus rationibus probet	321,	
tonum cordis habent uentriculum	8		
336,	animam esse sensum qui putant		
56	324,	63	
animalia que à quibus animæ faculta	animam habitare in ipso cerebri cor		
tibus differuntur	port, primum autem illius instru		
335,23	mentum esse animalium spiritum		
animalia que similia dicuntur	344,	6	
177,	animam totam suspicatur Celsus corpa		
30	rean	126,2	
animalia que sunt aptiora anatomicæ ad	anima naturalis quæ qualitates non ap		
monstrando	prehendat	90,40	
169,12	anima nostra constat ex partibus omni		
animalia quo pacto ad ueritatem exarum	no inter se differuntibus	313,15	
entur amia	anima nostra triplex	33,4,8	
77,5,13	animæ omne ad ipso certis indices secus		
animalia sectioni apta, si sinuæ copia ob	fu	435,4,8	
detur	animæ uelut ueritatis insitæ sunt uerit,		
37,7,21	deficientis ac desiderati appetentes		
animalia siccioris temperamenti, oua pa	429,	35	
raueri abque masculo commercio	animantis uoce audita, indicari potest de		
117,	ipsius instrumentis	127,4,3	
27	Animæ obnoxia affectibus in corde com		
animalia superius carentia dentibus uen	prehenditur	324,12	
triculum habent gromum	anima per se mouetur in perturbamini		
178,21	bis	329,62	
animalia aciale, recteque, ac diu, esse sunt	anima perspicacior temperata ac com		
inexpugnata	deratione redditur	70,53	
890,55	anima platiatice eam sui rationis e perri,		
animalibus adepti arbitrariorum motus	non format fertum	126,5	
211,	anima rationatrix sola scientie diuina		
65	compos	345,15	
animalibus capite destitutis quales oculi	anima rationalis, honestorum desiderat		
insunt	rix	68,62	
35,2	anima rationalis, immortalis, Platonis		
animalibus carnioris que insunt	serietatis	69,15	
209,	anima rationalis non format fertum		
34	126,	15	
animalibus berbioris que insunt Ibid.	Animam cum corporibus comparatio		
33	nes diuise	332,50	
animalibus timidis que insunt Ibid. 37	anima sui ne meritis, Galenus ambigit		
animalis differentie proprie			
842,19			
animæ principia tria car inter se sunt			
conuicta			
212,16			
animalis spiritus continetur quoque in tota			
cerebro			
356,4,4			
animalis spiritus gignitur ex uitali			
259,			
22			
animalium corpora in perpetuo fluere			
uidentur			
429,52			
animalium latentium calor, transpiratio			
ne seruatur			
774,150			
animalium natura à nullo deesse			
195,			
37			
animalium propria			
732,1			
animalia dormientes, sensus non format in			
tegrus sentientes			
130,4,6			
animal non moritur, nisi prius cor de offe			

90,	Animi affectibus quibus moriens affe		
	rant	759,16	
	animi affectionem quædam corporis mori		
	habenda cura, & car	166,3	
	animi affectus, corporis à naturali statu		
	inuenient	810,3,7	
	animi affectus, pellendi & conciliandi		
	morbus haberi uim	262,4	
	animi affectus tremulis functiones ef		
	ficiunt, ac similitur corporis	677,	
	47		
	animi affectus uehementer, senes præci		
	pul ac imbecilles exolunt	964,	
	62,		
	animi constitutio, corporis constitutioni		
	similis	332,49	
	animi atroxitas præferenda pulchritudi		
	ni corporis	2,3	
	animi uis expertis rationis, duplex est		
	423,	3	
	Anisi seminis facultas	107,10	
	Anus quid	613,14 610,2 7.809,42	
	anus quod tempus dicatur	127,1	
	anus quod diebus consist	126,15	
	Anodyna ad internæ affectus ad Ascle		
	pade scripta	124,6,3	
	Anodyna Andromachi, ad effectus orga		
	norum respirations, aliaque internæ		
	dispositiones congruentia	124,3,35	
	Anodyna nihil debet astrictionis inesse		
	1060,	18	
	Anodynis uti quibus de casu soleamus		
	126,2	10	
	Anodynæ ad podagram Nyctrosum		
	1211,	32	
	Anodynorum differentia duplex	1060,	
	64		
	Anodynorum opera	lib. 53	
	Antebra	123,6,3	
	Antibyllus utroque quam uim habeat		
	1073,	11	
	Antidoti unde	693,10	
	Anticipatione atfectionis non semper mor		
	bi incrementum agni	602,	
	18		
	Antidoti Nutritiæ desiripio		
	1181,	35	
	antidoti post uicem liberalis exhibi		
	debe, quam si præstantur	1240,	
	20		
	antidoti quæ medicamentis dicantur		
	1280,	4	
	antidoti utroque, papaueris lachry		
	mam (sive) mitterem præstulerit Ibid.		
	40		
	Antidotorum differentia tres Ibid. 7		
	antidoti Achyl figuri serpentes, ad cõ		
	plurimæ effectus præstati	1283,39	
	antidoti Apollonii à ueneno præfer		
	unt	1215,17	
	antidoti Aristarchi admiranda	1246,	
	39		
	antidoti ex sanguinibus Democriti		
	1284,	6	

EPITOMES GALENI

gula 1013,35
 aqua optima dicitur eadem solis afflu-
 mi qualitate 401,58
 aqua optima, omnis gustus qualitate ex-
 perts 375,100, 435,140, 1008,11
 1117, 11
 aqua per se frigida 58,15
 aqua pluvialis non refrigerandi habet
 12,45, 1
 aqua potabilis frigida existit 1013,20
 aqua potabilis sola est humidus 1014,1
 aqua putealis cum apparet rigentibus
 frigida 1050,64
 aqua que sit laetissima 1008,35,
 1016, 39
 aqua quomodo pulsionem invadat 514,15
 aquarum differentie 435,18
 aqua sicca esse nequit 1040,14
 aqua siccior frigida in quibus calorem re-
 movet 1013,9
 aqua non frigida tam feruens, cuius co-
 gis ut claudis 435,10
 aqua vino permixta quibus sola, cum effi-
 cacius sicut refrigerant 1018,37
 Aquilonem curatio 954,44
 ¶ A. R. A. B. 111 Lepidus vis 1119,15
 Arachnoides tunica 268,17
 Arteriarum facultas 376,61
 Arteriarum, securitatem, et aperire in lente
 178, 19
 Arteriis triis potius ex vino, morsus ab li-
 psis affertur 1275,52
 Arteriis et vasis facultas 1018,43
 Archidamopus conciliatur 1012, 31
 Archigenum siccum Gal. 551,31
 Archigenus inconstans 718,3
 Archimedes industria 57,2
 Arthrum quem habet visum 107,35
 Arterialis que dicitur 64,1,12
 Arteria quatenus erasit timentem ab a-
 qua inter eam carnem 111, 61
 Argemone vis 1071,44
 Argenti visum vis 1135,19
 Aris Cephalici Asclepiadis usus et co-
 positio 1172,48
 Aristas in rebus duris valdeque succis in-
 venitur 416,13
 Arisium caro 417,2
 Aris facultas 1072,40
 Aris facultas 1071,46
 Aristolochia rotunda admiranda opo-
 ra 117,60
 Aristolochia triplex 1071,49, 1209, 27
 Aristolochia interpretatur Cadenus
 106, 36
 Aristoteles calidus et frigida omnem a-
 diantem tribuit 71,65
 Aristoteles negat testes facultatem habere
 gignendi semen 112,21
 Aristoteles plures omnia facultates dicit
 sua in uno corde constitutas 327, 48

Aristoteles presertim Platoni 555,47
 Aristoteles et Posidonius sententia de spe-
 cibus anime 317,1
 Aristoteles opinio de cerebro resiliunt
 351, 7
 Aristotelis opinio improbat 106,51
 Aristotelis sententia de elisideris meati-
 bus confutatur 410,50
 Aris Peripateticus, infectis medicorum
 est eximius 426,58
 Armatum corum facultas 383,27,
 1120, 5
 Aroma omne calidum 512,61
 Aromaticorum plurimum vis per colorem
 excludit 1231,40
 Arum quem habet visum 590,45
 406, 18
 Arquato que accenditur 1091,37
 Arquatus et cholera eadem sententia
 rationem curantur 116,33
 Arquatus morbus a liene ortus, nigrescit
 80, 48
 Ars compuncta vitiosa et adulterata ex-
 fecti 359,65
 Ars constructrix, secundum aliorum
 materiam est quadruplex 364,28
 Ars constructrix, medicatrix et confensa-
 trix Ibid. 1
 Ars instatur naturae opera 345,56
 Ars longa 514,42
 Ars parviora 31,52
 Ars quilibet a suis notione suam habet
 constitutionem 21,3
 Ars que sit parviora 2,65
 Ars sanitatis tuenda quid proficiat 465, 11,
 478,31
 Ars unica, que circa corpus humanum ver-
 satur 360,19
 Arterius utriusque facultas 1072, 45
 Arteriam non constitui ex eundem sensu
 10,46
 Arteria aperta 122,15, 511,55
 Arteria aperta ex quibus consistit particu-
 lis 124,0,16
 Arteria Andromachi 124,1,40
 Arteria Asclepiadis 124,1,39
 Arteria leontina, coquenda sunt in
 duplici vase, et quomodo 124,1,47
 Arteria media Ibid. 15
 Arteria corrupta tangitur ab eplonanthibus
 pulsionem 165,55
 Arteria duplici constat tunica 31, 4,6,
 181,19, 183,15
 Arteria absque venis 128,61
 Arteria absque venis in perfectis animalibus
 149,1
 Arteria ad venas se aperientes, sub-
 alidum sanguinem hauriunt 33, 19
 Arteria affectus viciniores promptius in
 meliusmodum aut duriciam transiunt
 604, 16
 Arteria aorta insunt tres membra in
 his fures argenti 357,31

arteria ad quibus sensus indurascit
 59, 64
 Arteria aperta composita 103,16
 Arteria aperta ulceribus que ratione ma-
 dendum 161,62, 569,56
 Arteria aperta usus 488,46
 Arteria arteria dum dilatatur, expel-
 lunt dum contrahitur 517,5
 Arteria aut venae aditus non est simul
 86, 62
 Arteria carotides 16,15
 Arteria circa ultimam spinam stans
 subiacet vena 315,42
 Arteria circularis figura in pulso depre-
 bendi potest 347,54
 Arteria continent naturaliter sanguinem
 124, 6
 Arteria corpus quale 519,59
 Arteria cubi meatus citius quid indur-
 141, 61
 Arteria deducta facultatem possident
 199, 19
 Arteria descendentes in intestina 124, 3
 Arteria dilatata trahunt arteriam, contra-
 ctas expellunt sanguinem 566,31
 Arteria dilatatur dum trahunt spiritum
 508, 16
 Arteria dimensiones sunt tres, quarum
 nullam totam percipimus 547,57
 Arteria dorsalis pulsionem in subditi ab
 domen disternit 541,40
 Arteria duae cor involvant 185,37
 Arteria durities elicit plurimum ad per-
 cipendum systolem 540,58
 Arteria et nervus compuncti regnerari
 nequeunt, et cor 112,3
 Arteria et vena, et prima, et vena
 dolore afficiuntur 61,41
 Arteria et vena prae omni ex se-
 mine oriuntur 124,12
 Arteria et vena sunt sensus expertes
 137, 1
 Arteria factus per auctum ferit recipiunt
 a vena spiritum 240,19
 Arteria implentur, quia dilatantur 916,
 10, 240,19, 340,49, 508, 54
 Arteria in cruce distributa 168,5
 Arteria in quibus effluibus sentitur
 99, 49
 Arteria insensibilis in rebus 157,19
 Arteria interdum non eodem tempore o-
 mnes influentem facultatem a corde
 recipiunt 59,5,61
 Arteria inter se mixta et simul cum cor-
 de sunt semper motum ferunt
 545, 28
 Arteria iusta distans Ibid. 57
 Arteria lumbi in cruce disarticulatio 148, 35
 Arteria magne arteriae partis distribu-
 tio 314,53
 Arteria magne diffusio 147,12, 509, 153,
 314,59
 Arter-

I N D E X.

arterie magne inferius rami, superiori maior & cur	233, 14	conne dolorem soluit	999, 10	indur	168, 13
arterie magne ortus	314, 16, 231, 29,	arteria in eorum distributionem et tendi-	310, 14	arteria unosa ferit in pulmones et fini-	stro cordis ventriculo, unica conflo-
arterie magne primæ partis distribu-	314, 35	arteria inter indicem & pollicem in musculis sensibiliter mouetur	165, 58	tonica	182, 62
arterie magnitudinem quomodo cognoscun-	546, 11	arteria magna spinæ incidit	287, 54	Arteria unosa longi cordis pulmones	321, 55
arterie motus principium habent à cer-	de 595, 13	arteriam contrahendi modus	548, 13	arteria una in totum manum propagat	164, 12, 165, 39
arterie, necni & arterie nifi nequiquam innotuerit, ubique sunt	341, 24	arteriam inter indicem & pollicem cum frangit Galeum, liberatus est diuturno præcordiorum dolore	999, 3	arteria iuxtaferit mouetur uno eodemque tempore	91, 46
arterie nusquam spiritum solum con-	ducunt 90, 62	arteriam quæ mollem reddunt	587, 18	arteris contentio inest	519, 40
arterie nutriendi animalium spiritum ce-	rebrum 315, 18	arteria nulla reperitur sine acta remi-	ss. & cur	arteris & uenis pro ratione magnitudi- nis perceptus utriusque inest, necni au-	tem non semper
arterie omnes à corde non habent, quæ dilatantur & contrahuntur	88, 34	arteria prætergressa umbilicem in du- borum arteriam inferiorem	105, 50	arteris inest sanguis	186, 35
arterie omnes in dorso arteriam consti-	tunt 225, 3	arteriarum carotidum diuisio & pro- cessus	316, 30	arteris singulis inest fibre à uenis de- ductæ	564, 40
arterie omnes inter se & cor similes habent pulsum	508, 14	arteriarum contractions per somnum cur celeriores ipsi dilatationibus	570, 34	arteris unosis cur tantæ raræ sunt	24, 19
arterie parum cordi succurrunt	508, 49	arteriarum corpus annuatur inter co- lcentes pulsum generationis causa	551, 16	arteris consistentia inest & cauitas	519, 43
arterie per se sensibilem pulsum ede- nt, quæ	510, 36	arteriarum dilatatione cordis calor uen- tilatur, contractione purgatur	661, 51	Artes distinguende sunt scilicet	361, 20
arterie quando non pulsant	346, 3	arteriarum distinctio & contradio quan- do fiat	553, 22	Artes indicande ex fine	361, 35
arterie quando secundæ in capite	479, 53	arteriarum duplex	182, 12	Artes liberales alij præferende & cur	3, 9
arterie quæ sanguinem tenent	338, 27	arteriarum interceptiones, cur uocem cri- pant	661, 47	Artes liberales quæ	Ibid. 12
arterie receptaculum spiritus	315, 58	arteriarum motum in corpore esse oculis perceptibilem	536, 43	Artes non distinguende per singulas a- diuncas	361, 5
arterie secus aures & temporum, quan- do incidunt	1217, 25	arteriarum motus, uenarum plenitudinem ostendit	700, 50	Artes non ex materiæ diiudicande	Ibid. 45
arterie scriptas mouent, eadem quæ faciunt	508, 62	arteriarum omnium & uenarum majus- culæ & minores, numerus, formatio, et positio eadē	112, 11 (147, 13)	Artes omnes in subiectæ materiæ bonæ uersantur	Ibid. 15
arterie sese dilatantes attrahunt	1015, 14	arteriarum origo, sensus cordis uentricu- larum partes omnes dum se natura-	liter habent, tamen tempore mouen- tur	Artes parant sibi ex iudicio naturæ dicendi organa	4, 11
arterie si non pulsant, malum extremum	5915, 37	arteriarum quædam dignoscendæ	740, 54, 10	Artes ualio ignote	10, 57
arterias sua contractione expellere stic- cas excrementa	221, 19	arteriarum quædam	563, 39	Arthroitis epiblenaria Asclepiadi	1169, 40
arterie sunt distributæ cum uersantur non	225, 34	arteriarum radicatione	341, 124	Arthroitis quid	131, 57
arterie superficiales ubi cernuntur	14, 31	arteriarum sanguis quid sit	708, 10, 772, 50	Arthroitis quid	131, 57
arterie systole quando deprehenduntur	519, 42	arteriarum secunda in foram progres- sus	121, 25	Arthroitis quid	131, 57
arterie trabunt dum dilatantur, expel- lunt cum contrahuntur	508, 42	arteriarum tunc in fluxu pulsifica uis à corde	346, 10	Arthroitis quid	131, 57
arterie & uena quid	341, 33	arterias effundere spiritum in uentricu- les cerebri	259, 28	Arthroitis quid	131, 57
arterie tunc differunt quæ	553, 59	arterias læues inferas esse cotidie fini- stro uentriculo	243, 27	Arthroitis quid	131, 57
arterie tunc consistunt	86, 2	arterie fortius tres dimensiones, ut alio corpore	519, 35	Arthroitis quid	131, 57
arterie uasa pulsan-	182, 54	arteries tunc differunt quæ	591, 44	Arthroitis quid	131, 57
arterie uasose adnati mēbris dunt fora inter uenarum	217, 16			Arthroitis quid	131, 57
arterie uasose confuso, cur diuē tantum membrane adnata	238, 12			Arthroitis quid	131, 57
arterie uasose omnes & duratior	318, 25			Arthroitis quid	131, 57
arterie uasose æque & duratior	998, 58			Arthroitis quid	131, 57
arteria in molleuo diffusa distansum				Arthroitis quid	131, 57

EPITOMES GALENI

articulos quid	154,47	finis	390,2	asthenia sepe frigida causa	664,64
Artificum reddit atlantion pulchritudo		Asthenia arteria, uocis simul et respiratoria organum	241,64	asthenia tensioni substantiarum, maxime repleta inflammatione	213,2
Artificum nemo ex libris casus	370,55	asthenia quod ducatur	389,49		
artificum boni moris	277,7	asthenia arteria quoniam adhesionem sit in strumetum	241,21		
Artis quod tribuatur	355,26	asthenia arterie cartilagineum sicut quare talis	241,1	Asthenia bina omnia congelantur: nec glutinosa omnia asthenia	1019,20
artis consensumque partes que	364,54, et 36, et 38	asthenia arterie membrana interne usus ibid.	241,14	Asthenia, commune genus est asthenia et asthenia	1010,18
Artificios liberi consensumque ratio	1134,40	asthenia arterie motus unde	241,35	asthenia duplex	1035,23
Artis consensumque consensumque a fine sumi intentionem	361,60	asthenia arterie sicut inter uinum et leuon arteriam	241,2	asthenia exasperata omnia, est frigida	1041,58
artis consensumque finis, est scopi consequentia	160,11	asthenia arterie sicut bronchi consensumque	241,2	asthenia frigida et crassum est partem	1041,16
artis consensumque scientiam qua ratione acquiritur	900,27	asthenia arterie tunica interna, cur tenet, densa et medicamentum succa	241,25	asthenia genus commune est asthenia et asthenia	1273,33
artis consensumque pars, et ea que sunt in uisceribus, que in re differant, et que in uisceribus	901,6	asthenia arterie tunica exterior	241,19	asthenia non est contrarium purganti	1034,1
artis finis quis sit	360,38	in Asthenia arteriam semper nimium potest illud	241,11	asthenia omne terrere est et frigida	1074,6
artis medicus finis	ibid. 13	asthenia, quibus sunt leuaganda	241,23	asthenia bina omnia refrigerant	1019,27
artis pars consensumque et exortoria, quomodo differant	119,18	asthenia quibus de causis sunt	241,32	asthenia omnia sunt omnia uisceribus	1065,41
artis pars consensumque, primum omnium est consensumque	565,16	Asthenia radialis facies	390,62	asthenia parum facilia que sunt	1214,7
artis principia uelut esse ignota debent	10,56	Asthenia uiscerum refrigerat	70,8	asthenia que	942,15
artis salubris pars est gymnastica	363,31	asthenia tres species	1273,57	asthenia quatuor uentris dispositio	1249,66
artis salubris pars exercitatoria, minima est	564,45	Asthenia uis	1072,66	asthenia sunt	437,26
asthenia, ut finis, ipse asthenia est	361,36	Asthenia fixa, sicut quidem elata dant a licentiam corpori	393,14	asthenia uiscerum, sicut	584,47
asthenia duo in liberales et sedentarias	364,34	Asthenia lapidis uires	119,9	asthenia uiscerum que sunt	1216,46
asthenia salubrum duplex genus	21,51	Asthenia que qualitate habent et generationem	75,13	asthenia uiscerum refrigerant, a licentiam in fluxum reprimunt	1192,55
asthenia finis diversi	21,9	asthenia alicuius est	75,17	asthenia in quoniam partium affectionibus non sit utendum	922,54
asthenia omnia infirmitas unde sit asthenia	645,25	asthenia alicuius que requiritur	75,13	asthenia in quoniam utendum	921,58
asthenia omnia scopus	360,9	Asthenia non sunt materiam	471,35	asthenia qualitate opera	379,35
asthenia opera, frequenter exercitio absoluitur	1130,13	assumptiones proprie substantialesque	321,29	asthenia sanitas	1114,37, 1171,36
Artanell	923,18	Asthenia medicamentum	1175,7	asthenia natura	1041,62
Artibus inflammationis, a coniugatis sanguinis uisceribus est, nisi passio fuerit inueterata	974,59	Asthenia Samia	116,3	asthenia opus	1019,44
artem cognoscere requiritur exacta in carentibus affectionibus	161,44	Asthenia cur dicatur	1246,51	asthenia sicut et refrigerantem usum, que ad supprimendum sanguinem applicentur extrinsecus, non ubique probat Galenus	867,1
artem motus duplex	94,13	asthenia quid conferat	1014,41	asthenia usum in his, qui et uisceribus habent amplexum, ad aliam de intentionem conducit	477,19
artem natura ex quibus consistit	164,41	1091,40	241,42	asthenia usus quando utendum	39,4
Arytenoides cartilago	24,6	Asthenia glandulosa	120,9, 302,35	ATHANASIAS hepaticae sanitas	125,64
et A. A. R. facialis	1071,51	asthenia glandulosa non feminale organum	120,24	Athanasia Mithridatis	125,50
Asthenia curatio	950,17	asthenia glandulosa constructi ad leniendum humorem suo penis ariditatem	120,24	Athene Andromachi	121,12
asthenia	551,42, 579,6	asthenia nariosa	301,16	Atheroma quid	949,40
Asthenia error	76,12	Asthenia quoniam non habent	1075,13	Atheroma que dicatur	707,4
Asthenia opinio refertur circa medicamentum purgantia	38,61	asthenia	213,12	Athlete omni arte dicto abstinentia	2,59
Asthenia facies	1206,40	asthenia coniungitur non formi asthenia	213,3	Athlete omni bonorum genere deficiunt	2,30
Asthenia moris maiores	71,29	asthenia sunt tales, quare magis inter uisceribus	213,12	Athletarum anima uelut multo demissa	ibid. 15
Asthenia quoniam habet ut in	1071,16	Asthenia cati, quomodo fibris sequitur	782,30		Athle-
Asthenia duorum olivum	389,52	asthenia erit a frigida	204,4		
asthenia petri uti que	1072,63		29		
asthenia uiscerum inuisceribus quoniam					

I N D E X.

absterium crassa plenius uisus ratio,
non extrinsecus se periculosa 371.

43

absterium genus inutile 367,10

absterium gymnastica intemperim ex-

cessum; molitur 361,41

absterium balneo maxime periculosa

2,30. 67,39. 359,59

absterium balneo uisuperantes 163.

34

absterium morbi Ibid.48

absterium profusio non confusenda

con artibus homine libero dignis

3.

absterium robur inutile 3,54

Absterium excretatio pulchritudini pluri-

nam obest 1,43

Atomes boni posse esse corporum ele-

menta 33,44

Atramenti scriptorij uis 112,34

atramenti satorij facultas 115,43

Atrophia 684,35

atrophia defectus quod refringit 687,

18

atrophia sequitur necessarii alimenti de-

fectum 694,30

Attalus rex Pergami, patris Galeni

1163.

Attenuatio uisus ratio que dicitur

433.

attenuatio uisus ratio quibus affluens

confrat Ibid.50

Attractiones sunt substantiarum simi-

litudinis 1038,33

Attrahentia que dixerat 1059,49

atrabeculentia digerentium discreta

1081.

attrahentium essentia duplex 1059,58

Aethestio moris milerum rectorum sit

224.

Atriphis & blui natura & facultas

318,23.

AVARITIA uel uoluptas facio-

rum causa 5,33

auritum, uentriculi uirantati compe-

rat 425,8

Audio & dimissio, ex alteratione &

lucore, compositio motus 73,41.

78.

audio quod sit 4559,74,31

Audire facultatis proprium 73,11

Audire facultas quando uigat, et illius

semita que 75,3

Audiret uisus aures 35,43

Audire bene uel male affectu, que uer-

etis consistant 673,11

audire que obducunt 673,42

audiret gratitatis curatio 1216,45

audiret instrumentum arceum 128,

61

audiret sensibile, sicut & uis 33,41

audiret symptomata unde proficiscuntur

670,34.

750,60

Auena admodum calida 374,53.

1067.

44

Aurifus molenda in contrarium 947,

37

Auris & pisces uisus sicut sicut 430,33

auri sunt uapores 210,1

Auriger Loxon uicinia 78,16

Auriger secundum trinum distensionem,

semita nature opes 75,15

Aurigeri tempus quod 624,33

aurigenum sit quousque esse conformen-

tur 67,30

Auricle montane tenuiori uisus acci-

mode 416,31

Aures cur cartilaginee 176,49

aures cur hominibus immobiles Ibid.

63

aures cur prominent Ibid.54

aures intrinsecas cause, extrinsecas uero

conuocare cur sunt 277,1

Auribus animal illoque quomodo extra

hendum 132,54

auribus puri fluitibus quid consistat

1107,64. 1130,24. 1102,30.

1209,37. 1210,32

Auricula maris facultas 1069,15.

1097.

Auritus quod obstruente icteris orie

quid moderatur 1113,50

1117.

Auri inflammatio que consistat 8,

14. 937,36. 1208,51. 1209,39

1210.

Auripigmenti uis 1120,63

Auris utraq; cur flexuosa 277,5

Aurii dolores que cause excitare pos-

sunt 1208,26

aurium doloribus fluitantis remedium

Andromachi 1220,40

aurii doloribus plegmausis, quid co-

ducit 1079,27

aurium doloribus quid moderatur 1143,3

21. 1208,35. 1209,16.

1211.

aurium doloris uehementis remedium An-

dromachi 1210,27

aurium fluuiis uisus quid opine

tur 1087,59

aurium uisus obstruente que referent

1209.

an tum uisus 251,14

aurium putredinis ulceribus medicamen-

124,1.

aurium sanguinem effundendum reme-

dia 1210,64

aurium sonitus remedium Ibid.43

aurium uisus quid enecet 1083,39.

1084,42.

aurium uisus excreta remedium

1219.

aurium uisus quid moderatur 481,28

103,61.

aurium uisus per ignem 1278,35

aurium uisus in ore 1116,64

Austeria urbenecit & pontica, sicut

termi uisus rationis aduersa 418,3

Austerium uisus sicutibus maxime ad

19

uisceratur 101,19

Auster patrefacit omnia 41,24

Austerum, acerbum, asringens, qualitas

ita uisus significat 51,43

austerum quod 86,46

austrum quod 6,12

Austrum ad sicut declinat 41,2

astrum quare sit morbosus 40,56

Austis quod 83,6,43

Austis circa nature aduicium cau-

sa uis extirpat 19,10

austris effectus non aduersatur, sed ef-

ficientibus 16,59

austris iustitiam motus nature insistent

19.

austris que uis uisceratur 1180,16

austrum cur prima & ultima sanitas

causa dicatur 914,16

¶ A X I I I. Alcantaria à duobus fit

modis 172,33

Axillis uisus 14,15

axillaris uisus sedis laborantibus infra

clauis accommodatissima 165,

31

axillaris uisus, humilis est maior 14,5.

21. 164,14

Axiu 27,9

b

BALNEUM facilitas 1074,

Balneo 403,27 (3

Balneo diuine cur nos et obit

at mori trahit 486,59

Balnea dulcia calidificant nos & huius-

modi 427,14

Balnea dulcia cur febris tormentum axillis

tur 961,20 (127,12

Balnea immodica facilitatem dissoluit

habent calida ad soli frigidi usum cor-

pora preparant 911,63

Balnea qualem reddunt respirationem

492,

Balnea frigida quomodo pulvis inue-

niunt 572,14

Balnea quibus conuocant 908,1.

471.

Balnei moderati caliditas uisus 449,2.

920.

Balnei partes diuersae 910,27,912,

48

Balnei partes singulae, quousque presens

911.

Balnei utilitas 108,19. 608,45. 807,

41. 914,17.

Balnearum dulcium immodica uisus, hu-

miditates trahit praeter naturam

662,

Balnearum frigidorum uis 572,18

Balnearum moderatarum commoda

372.

Balnearum scopus 961,19

Balnearum uisus in studiis 456,

35

Balneo tempus aptissimum in febribus

intermittentibus quomodo sit 924,

59

balneum cibum in optimi habitus pueris se
quitur 434,54
balneum frigidum quibus interdicitur
quibus contra administrandum 911,
46
balneum intima corpora febricitantia,
quomodo sint preparanda 892,56
balneum utempestivum horribis, ca-
lidijs, densitudinem gignit 903,
41
balneum quando conducit 914,19
balneum quando tabidis sit administran-
dum 808,56
balneum quomodo administrandum
914,31
balneum sepe conditum in accessionem de-
clinationis 910,59
balneum somnum conciliat 1200,24.
458,45, 738,52
Balsami & opobalsami facultates
1073,64
Barbari compositio Andromachi 1161,
23
Barbarus Lucij Imperatoris amicum
646,48
Basilini vel acryni ses 389,40
Basilium confectus oculis fuit hominem
perivit 1171,39
Basilis instrumenta 111,30
Basilides brachij emittentes 107,48
Basilis, rubi fructus sunt 182,48
BELLII facies 1074,40.
1183,51, 1156,33
B E C H I C A dicuntur biferum
1061,10 52
Bellaria abridga ad semina 469,18
Bellum qui significatio Galenus aser-
uit 1129,44
Betas facultes 587,54-1109,44
Betonum facultes 1086,45
B I B E N D U M id est de carne quibus
non fit 883,18
Bilem atram nullum animi gustare susti-
net 703,18
Bilem cum pinis vel novellis assidat 10-
pant 816,49
Bilem flauum quid exporet 1101,41.
1104,48
Bilem gignit 54,35
bile uentriculum redundans, terramque ci-
bos concoquit facies 1102,12
bile argentea quae 702,64
bilis atra a liene in uentriculum mittitur
457,35
bilis atra car tunc corrodit 703,31
bilis atra car tunc concit 744,7
bilis atra differt crassitie ab acria 703,
11
bilis atra effi cit 793,35
bilis atra differt 741,15
bilis atra generatur & facies 947,
47, 683,26, 1171,1, 701,19
bilis atra purgatione qui affertur indi-
gitur 1002,35
bilis atra quando sistitur excretionem
437,38
bilis atra est acida, terramque fermentat
703,8
bilis atra ex fluxu immediat affata orta,
omnium perniciosissima 705,23
bilis atra expurgatur a liene, quem alit
981,37
bilis atra fluxu sanguinis 48,44
bilis atra, flaua acrior & malignior
80,34
bilis atra frigida & sicca Ibid.32
bilis atra in autumno crescit 80,33
bilis atra in quantum qui ratione rigo-
rem gignat 681,40
bilis atra nascit uentriculi adionem
227,7
bilis atra nascitur ex sanguine immediat
affato, spiritus frigida: non tamen calo-
ris est por 690,6
bilis atra peraffata qualis fiat 10,63
bilis atra, perniciosissima facies 27,39
bilis atra post punctione frigida 63,51
bilis atra quies 707,32
bilis atra quando in cerebri corpus, &
quando in animum reptat 741,
19
bilis atra quid nocet ad uentribus medi-
cis 81,8
bilis atra quos morbos pariat 686,61
981,47
bilis atra quos tumores gignat 616,18
bilis atra sanguine excreto est pleu-
riticus 690,4
bilis atra si cunctatur, semper perien-
dit perniciem 709,27
bilis, crassitie excrementi excrementis a-
pustulosa 116,32
bilis differtur pro amissionem diversi-
tate 1110,15
bilis flaua ad ultimam affata, fit crassa,
ignea, & uiscidula 80,61
bilis flaua & pallide discernit 119,
56
bilis flaua facies 116,39
bilis flaua quibus flaua in uentriculum ge-
nerat meatus 53,35
bilis flaua species 702,51
bilis flaua in excretionem infestum excre-
mitur 1181,8, 1161,4, 1163,23
bilis flaua in sellis uiscum excipitur
80,56 57
bilis flaua obiectus sunt deficiendi 579,
9
bilis flaua quibus humor 961,7
bilis flaua quibus de causu retineatur
417,31
bilis flaua quibus in uentriculum influit
51,61
bilis flaua quos tumores gignat 616,
16
bilis flaua, sanguine calidior existit 48,
46, 80,32, 614,49
bilis generatur cum sanguine in iecore
& uenis 709,11
bilis in uentriculo orta, quem colorem ha-
bet 701,62
bilis in uentriculum non confuit, si ci-
bum citius exibat 479,64
bilis nullam portionem demittit flaua
in uentriculum 116,32
bilis orta ab igne uentriculi calore, &
eius quae confuit a iecore, indicia
541,26
bilis pallida per corpus flua, quae mor-
bis gignat 686,60
bilis plurima in uentriculo, causa suis per-
petrat 80,23
bilis profusa in quorum uentre gignat
54,12
bilis quibus uariata in iecore influit
Ibid.1
bilis quomodo fit medicula 474,5
bilis quo pallio accommodatur oculis
1130,18
bilis non pallida non flaua in calidis &
siccis temperamenti abundat
474,1
bilis uibementer mota, rigorem facit
641,42
bilis uisum copiosum quae praece-
dunt 1162,41
bilis uisusque facultates 701,35
Bisphagendi ratio 388,11
Bismuthi facultes 1176,43
Bismuthum in mari mortuo proueniens fa-
ciles 1143,61
B L A E S I I ad graui quae sunt 111,3
Blas facies albae 80,10
Blas facies 107,13
B O R N I uicem laborantem sus-
suscipere ueni, quae ratione resistit
in Calenis 649,12
Boethius ab refinitione uicem quadra-
gentis acri Calenis demittit
649,57
Bolus facultes 591,33 406,63
Boli Aemulij descriptio 117,34
Bona animi & corporis multipliciter di-
ci 360,10
Bonitatis diuinae speciem perficitur
115,33
Bonorum species tres 118
Boreae frigilites est tamen partium
120,41
Boreas seruat impetria uisoria 44,12
B R A C H I A gracilia, & picea,
& omni modo excreta 467,53
Brachij capsa 107,34
Brachij descriptio 98,45
Brachij epiphyse 107,34
Brachij cretacea & flexio a quibus ma-
sculis fit 99,12
Brachij motus & musculi 94,7, 172,
39, 394,61
Brachij musculi interior duo habes su-
persa capsa 159,60
Brachij opita figura 107,64
Brachio articuli duo 98,47
Brachio uicem est es, atque id augmen-
ac resistent 98,49
Brachium 102,10

I N D E X.

brachium assilentes & circumagentes
nusculi, robustissimi amicum 295,
 34

brachia bis terne clare facies, uentrem
soluit: ipsa autem supponit 1033,
 16

brachia faciles 387, 65, 1089, 49
brachia folia calida macerata, chrisiati
obstant 1199, 47

brachia & leui uisum breuiant 335, 38

brachia melancholicum succum sole ex
olebrius gignit 743, 2

brachia uapores reficiat 1199, 59

bergamici effe 281, 20

beruicis uis 1075, 16

beruicis ducendi uentribus familiarissima
510, 38

Brani facultas 1075, 31

Brata artum expertis 1135

brata car regionis muent 694, 60

brata libidine & iracundia regi 335, 30

brata semen excrecentia post colum ubi
conspiciunt 106, 16

brata subspis dux natura, medetur
986, 59

Bratis inesse rationem recandunt 117, 19

Brachia 110

Brano 709, 18, 978, 24

Bubonis uis 1075, 7, 1074, 66

Bubonis curio 914, 48, 1129, 15

Bubonocle qua ducatur 709, 43

Bubulum quon facit pises car non-
mali facilius conficiunt 368, 19

Buccarum foci inferni feruunt muba-
tionis 273, 36

Buccarum & purpurarum testa ubi,
quam uen habet 1118, 31

Buglossa uis inuicem bilariatem pe-
rit 1075, 4

Bulbi satius uis 1074, 18

Bulbi uentris facultas *ibid.* 64, 19

8

Bulborum succus 406, 59

Bulborum unde accidet 675, 7

Burbitthalmus quon habet uis 1075,
 10

Burpitis casus sit facultatis 1141, 58

Butyri facultas 1119, 9

Butyrum extenuat infantium ritum den-
ebus *ibid.* 18

butyrum pleuriticis expautionis con-
ferri *ibid.* 24

C

CABALICE 363, 32

Cacitri facultas 1084, 2

Cacochyma qua ratione meridi-
calioris sanetur 1014, 13

Cacochyma correctio 956, 26

cacochyma uide uide sanetur 457, 3

cacochyma symptomata 1114, 60

cacochyma que ducatur 700, 62

cacochyma quid 936, 10

Cacorbis uis qua ducatur 708, 55

Calorie differentie, atque cum uires
1113, 19

caloria quomodo fiat *ibid.* 3, 1119, 64

Calor capis tergis Romanos duode-
cim 1291, 59

Calci interflui figura & usus 214, 13

Calorem fororem 261, 43

calorem interfluum in plurimis ambus du-
plex 224, 40

Calorem interfluum quantum 180, 50,

115, 58

Corpe facultas 1090, 60

Calami flos uicet auditum 1082, 64

Calaminabe uires 1081, 12, 1083,
 16

Calami odorati uis 1083, 47

Calamici cutis durissima 1113, 53

Calamorum merorem esse et, firmis-
simis, deacurulatione 214, 14, 212,

47

Calamorum subiacere ad perpendicularum
lani crui 211, 65

Calamorum quando stomacis miscere
expediat medicamentis 1133,

30

Calci steres 1172, 30, 1115, 29

Caladonem casse 397, 25

Caladonem generatio & curatio 405,
 45, 939, 16, 945, 18, 1072,

47, 1074, 43, 1077, 11, 1079,

56, 1095, 3, 1106, 44, 1110,

65, 1186, 24, 1267, 5

Caladonem nullo modo danda ualde cal-
facientia 482, 5

Caladonem nos qua ducatur 1017, 19

Caladonem corpus nostrum totum, ut
eis diuim refrigeratam partem re-
cto 1080, 47

Caladonem aliu et potentia unumquod-
que dupliciter ducatur 1016, 11

Caladonem corpus, ad eo inuicem calo-
ris affluunt 1015, 13

Caladonem dandi omnia necessarii ste-
cent 55, 19

Caladonem uerbenter & siccentia, di-
gerent subtilia, reliqua negis impu-
gunt 945, 16

Caladonem ordinis quater, quos re-
tion reperiit est in ceteris qualita-
tibus 1149, 23

Caladonem uires 712, 3

Calida car uigilias efficiunt 717, 2

Calida & frigida facultas que ducatur
1012, 42

Calida imperfe siccent 884, 23

Calida potestate, ut nos calfaciant, prius
in tenua communi debent 1014,
 53

Calidi & frigidi iudex est testis 47,
 46

Calidi & frigidi qualitas in febribus e-
pialu committitur 612, 20

Calidi & humidis breuius foris sunt co-
trati 818, 10

Calidi & fieri offenduntur ab immo-
dis uicinationibus 964, 15

Calidi & succi oti graciores 474, 15

Calidi frigidi uis ubi ubi nostro corpori
uis 1161, 28

Calidi, frigidi, eu, respectu nostri, iudicium
quomodo fieri debeat exactum 60,
 23

Caliditas crispipetosa & pbrmons-
sa, quando inficit 783, 10

Caliditas fibrilis multum densum, spori-
um reddit 503, 30

Caliditas humida uires habet eadem uires
res 789, 16

Caliditas moderata uniuerso corpori me-
xiunt necessaria 487, 35

Caliditas nostra crassior est essentia
1014, 63

Caliditas salua esse non potest sine re-
frigeratione 487, 4, 1661, 43

Caliditas amonitum materia est san-
guis 486, 3

Calidum atrabitis, frigidum repletur
1059, 53

Calidum calido additum, efficit bilium 79,
 62

Calidum duplex 1042, 9

Calidum ex accidenti refrigerat 60, 60,

976, 23,

Calidum & frigidum proxime unitatem
soluunt 64, 11

Calidum facultate & aliu utroque qu-
tripliciter accipitur 1917, 12

Calidum frigidum magis aduicium 297,
 61

Calidum, frigidum, etc. quos modis ducatur
363, 7, 583, 1, 1012, 49,

1059, 29

Calidum innatum, est multum habet, sal-
tem ex frigore & calore 713,
 40

Calidum innatum non est animalis gene-
ratione posterius 713, 21

Calidum innatum quomodo intelligitur
idem 1055, 19

Calidum innatum quomodo intro & fo-
ritis nouatur 713, 7

Calidum natura omne a calefactione pri-
ma calefit 61, 44

Calidum partium tenuium uerbementis
atrabitis 1059, 54

Calidum potest esse, quod facit in ignem
uicetur 1014, 18

Calis generatio 834, 50, 878, 11

Calles in statu propria seruati
878, 27

Calles minuentia que *ibid.* 25, 1058, 8

Calles que medicamenta promouent
878, 28

Calles glutinantis offibus nascitur ex
offium alimento 876, 33

Calor a corde, membris etiam demittitur
per uenas 507, 56

Calor alacritas affluat maior, notatis
minor, hincque contrari 512, 24

Calor aduicentis, facillime reddit in-
uicentis 569, 61

Calor citra humiditatem non humectat

1161,	62	calor omnis subtile frigus	251,30	Causa quam uim habet	1083,57
calore cocente cum molitudine instru-		calor per seminum ad interna, conuer-		Cantharidum uires	1141,49. 1175,1
mentum, quæ pulsuum differentie		tor	509,37	Cantharides comode miscentur diarr-	
oriantur	556,50	calor puriorum laetumq; differt		ticis	1038,8. 1049,4. 1144,5.
calore communis cum instrumentorum du-		ribus qualitate	4733.693,16	40,	
ritie quas pulsuum differentias produ-		calor quibus signis deprehendatur	559,	cantharides eligendi ratio	1141,55
cat	557,1	35		cantharides & thapsia, crostose & pu-	
calore mordaci potestatis quæ aducri-		calor qui gemit corpore, perimit nes		trifolium erucant	1048,4
tor	471,63	801,	26	cantharis uiscum crudelat	58,18.
calor est aptus ad conciliandas ac reci-		calor uirinis res omnium maxime altera-		1038,112.	1173,14
piendas fluxiones	798,41	re potest	691,40	Capilli designantur cordi liquore	1193,
calore proprio singula sentiuntur, cor-		Caluarie ferenda ratio	879,23	43,	
ruptumque contrario	1045,46	Caluarium post alia ossa emia compingi		capilli uereri facultas	1067,31
calore somno accedente ad materiam,		124,	6	Capillorum diffusio casus	1193,35.
constituitur ignis	36,10	Calus tota ossa est	51,55	& 55	
calor extremi accensus, est causa pulsus		Calusectibus matutinis remedia	1193,	& 59	
creberrim-	554,30	12		capillos crissos reddendi ratio	1194,
calor, febri animi inimicus est	911,3	Caluicæ causa	51,61. 954,7.	18	
calor furiosus et iracundus quis	342,1	1189,	11	capillos argenti ab Archigene predicti	
calor uisus dicitur à quibus ascendunt oc-		Caluitus cur in fyncipite magis	52,12	Ibid.	9
culisibus	660,42	caluitus ex sterilitate	54,40	Capit dolenti ex consensu lege totius	
calor uisus ad quid conducit	1035,	Calx cineru est species	1110,1	corporis quemodo proficiendum	
60		calx, ex pedis maximon	158,61	1204,	53
calor uisus, est temperatus: acquisiti-		Cantharum mustrie creberrime comitia-		capiti laboranti intemperie calida, fre-	
tus, intemperatus	569,55	libus medicis ex aceto	1174,39	quenti balnes dulcis aque medentem	
calor uisus, in quibus morbis materiam		Canoni radicis facultas	1084,2	479,	57
frigide multitudine opprimatur		Cancer crudelitate oritur ex atra bile		capiti repleto succurrendum embolatio-	
505,	13	703,50. 704,21. 707,25.		nibus ante cibum	477,49
calor in quibus augeratur affectibus		982,	31	capitis effluuiis frigidis uentura-	
444,	21	cancer, qui affectus dicitur	708,58	tis, quæ medicamentis confrant	
calor iustus consistit in pituita & sen-		Cancer exent capite	150,65	1106,	62
guine, iustisq; temperat ex caliditate		cancer curatio	948,4. 982,56.	capitis distensio totius ex quibus cogno-	
te & frigida	351,11	985,	10	scenda	816,63
caloris causa de temperis, ipsius affio-		cancer flumatis uires	1174,66	capitis dolentis per consensum curatio	
nus causa	794,46	cancer generatio	948,3	968,	5
caloris exuberantis signa	118,35. 714,	cancer medicatio periculosa	982,60	capitis dolentis remedia	1104,39
54,	753,4	cancer uisus ratio comenens	982,18	capitis dolor à bile quibus principium ab-	
caloris innati substantia quemodo au-		cancer uisus uires	1140,56	oriatur	Ibid. 43
genda	1055,3	Cancer & polypodes quid eliquet		capitis dolor ex ista obortus, cui sepe se-	
caloris marcescentis pulsus	554,43.	1077,	41	existat per uisum suum caput	1200,
575,	50	cancro sanando incipienti quæ medica-		52	
caloris natui differentie quæ	553,32	menta sunt idonea	948,10	capitis dolor ex plaga quando sit pericu-	
caloris naturalis custodiendi ratio	413,	Conditi ex pipere compositio	1152,52	losus	Ibid. 60
38,	917,13	Conis pices	401,21	capitis dolor intra caluarium situs, cur	
caloris nostri & fluxione ignis dissim-		Conditum Andromachi	1151,9	extendatur ad oculorum usq; radices	
ilando	804,10	conditum Democratis	1155,7	1205,	64
caloris emouum partium præter cor ou-		conditum Galeni	1151,10	capitis doloris ab ardore contracti indi-	
stodia est duplex	507,53	conditum Heræ	1153,56	cia & curatio	1198,9
caloris opera	317,28. 439,14.	conditum Manseri	3154,6	capitis doloris à bile orti indicia & ex-	
804,	16	Conem ex lupo & uulpe concipere, nec		ratio	1204,30
caloris apus in uenas	48,62	non è concipere	1209,13	capitis doloris ex magnitudine fibræ or-	
caloris perulacis pulsus qui	594,58.	Conis præ sistantione cæces catulos e-		ti, curatio	968,52
595,	4	dunt	1199,36	capitis doloris ob imbecillitate contra-	
calor, motus causa	736,65	Cocu qui sunt	52,3	cti, curatio	Ibid. 33
calor natius coquit, alienus corrumpit		Coniubi fructuum facultas	382,56	capitis dolor ab plaga non eras, quos me-	
796,	51	Conis bursidior formicis & apibus	41,	dendi fescos præbet	1200,43
calor natius est natura	804,21.	43		Capitis dolor ob totius corporis plenitudo	
976,	5	conis rabidi notat	1177,43	oborti & indicia, & curatio	1202,
calor naturalis augeat atque confirmat o-		conis facior homine	41,43	24. 1204, 58. & 64	
mentis, istisq; uisum largitur	917,10	conis solus rabie corripitur, cuiusq; spiritum		capitis doloris ob americanis confortum	
calor non 7ei est ad indicandas medica-		rabiem excitare potens est	776,	oborti & indicia, & curatio	1202,
mentum uires	1031,60	13		1206,	4
calor noster quemodo augeatur & mi-		Conines cur in temporibus poties	52,13	capitis doloris orti à frigore indicia &	
nuatur in corpore	803,56	Coniubi semen calidum, frigid; caput		curatio	1199,9
calor omnis eget uentulo	486,56	377,62.	1084,7	capitis	

I N D E X.

capitis dolor quorum extinctionem sui si-
gnum insuperabile 968, 39
capitis dolorum ab ebrietate curatio
1199, 38
capitis dolorum cum febri ab initio affli-
gentium curatio 120, 16
capitis dolorum inueterationem curatio
1199, 35
capitis dolorum species variae 968, 6.
1197, 33
capitis figura conuulsa semper bene di-
spostionis indicium 817, 11
capitis figura naturalis, quid esse debe-
re 132, 17, 817, 16
capitis fracturam curatio 878, 16
capitis in omni dolore quae sint uitanda.
1205, 20
capitis motum securitas 173, 16
capitis motus 170, 4, 7
capitis motus ad anteriorem quibus sit
maius 174, 10
capitis motus duplex 134, 13.
121, 3
capitis motus sensum deorsum, & in
obliquum unde proficiantur 233,
50
capitis musculorum actiones variae
284, 30
capitis ossa scelerum praeter inferiorem
meccellum 285, 30
capitis ossis fracti, simul & coniuncti cu-
ratio 288, 61
capitis priorem motum quae ueritatem
praestent 114, 57
capitis refrigerandi ratio 893, 10
capitis repletio somnum conciliat 675,
56
capitis secundum motum quae ueritatem
afficiant 134, 19
capitis suturae tres 312, 21
capitis uibremetis, seu dolores, & mode
rati qui 1197, 16
capitum acutum figurae tres 264, 10
capitum extremum in quatuor partes de-
combitur 479, 1
Caput uel uentris facultas 1084, 10
Capparis epilepticis congrua 1006, 50
cappari ex exquieute confert obliuio
ni uitae 913, 6
capparis ex extenuat facit ad crudelitatem
464, 24
capparis facultas 386, 30, 1034,
16
Capra temperamentum 392, 40
Caprifolius quid, & quae eius facultas
1107, 43
Caput satus in ipso partu primo uel di-
a matre debet hanc parandi figuram
contrariis omnes periculosissima
107, 46
caput sagittatum dominum 132, 28
caput leporis quibus affectibus censetur
1116, 53
caput murem quibus censetur affectibus
Ibid. 46

caput magnum quando su bene dispo-
sitionis indicium 817, 11
caput quodlibet placitum affici potest 719,
35
caput quibus applicatur facili 746, 6
49
caput refrigerandum ubi sanguis fluxit
per uenas 965, 6
caput sanctorum quibus confertur 1136,
56
caput uacuandum est post totius corpo-
ris uacuacionem 1206, 10
caput uibremetis affluens, refertur re-
creandum 479, 50
Carbo est terra succresca 1035, 43
Carbonibus quales medicamenta com-
muni 975, 53
Carbonis curatio 948, 13
carbonis scarificandi passio sanguinis
missionem 949, 10
carbonis quae competat 1098, 60
1179, 14
carbonis unde exsistunt 707, 21
783, 10
carbonis cataplasmae idoneae 948,
61
carbonum descriptio 907, 11
943, 41
carbonis & plegmonae ignes qui
sunt 1091, 10
particulae a bile atra oritur 703, 44
704, 21
carbonis absque febre non reperitur
948, 51
carbonis semper cum acie tenuitate
660, 5
Cardialgie causa 324, 15, 675, 4
cardialgiae proprii quid sit 1148,
60
Cardamomum 1206, 56
Cardamomum facultas 1084, 14
cardamomum lumbos interficit Ibid.
57
Carica cum ruta medicis praesumpta
adversatur uentris 410, 6
carica & fucus aduersatur inflores-
centi uentri, & licet communem amonem
dulcem ratione 380, 48
carica largius sumpta, pedicellorum gi-
gnunt malitiam 380, 44
409, 64
Caricem deo diu facultas 1280, 6
carica lignorum cuius sit facultas
1105, 17
carica quid 275, 9
carica unde gignatur 665, 61
Carifolius facultas 1034, 60
Carum ex sanguine, necnon ex semine
generari 23, 13
carum habet omne animal 1113, 64
carum animalium cum cibis inueterat
1114, 34
carum animalium dura simul & ex-
crementum, sunt conditurae apae,
contrario autem modo se habent,

incepta 403, 15
carum aserine sunt dura & carum
mixta 408, 17
carum aserine & conculina qui uisuntur
371, 35
carum affia stiores sunt diuisi 1135, 8
carum castrorum suauiores sunt & sic
educuntur 394, 17
carum castrorum sunt praesentiores,
uoluntatem 391, 58
carum probè cuxa, optimi gignunt san-
guinem Ibid. 16
carum ingorde minanda quid frui-
tio perfusione desideretur 882, 15
carum differentiae secundum aetatem
398, 3
carum denotum non imitabile 23,
54
carum elementum non unum 23, 42
carum gignenda materia est probis
di. sanguis spiritus ipsa natura 856, 17
carum genitalia ex subiecta carne, si sa-
ne sit, sit 855, 14
carum bitumina & bubula facultas
416, 63
carum intemperies humida quomodo ed-
rigenda 857, 36
carum intemperies quomodo dignoscen-
da Ibid. 44
carum intemperies siccis, quomodo cor-
rigenda Ibid. 10
carum plures sunt species 47, 64
carum productio, naturae opus 878,
50
carum quod multa sunt differentiae se-
cundum praeparationis modos, & lo-
cus animalium 398, 11
carum uisceris facultas & continu-
da motus 1134, 12
Carosia omnia ex sanguine orta 111,
21
carosa regenerari possunt 111, 26
Caro agnata humiditate 392, 51
417, 6
Caro animalium agrestium uidentur na-
trix, & faciem gignit meliorem
398, 39
Caro aserina & stiores animalium re-
crementum est, & conculina differt
398, 13
Caro animalis, quae sit bitumina 192, 57
Caro bubula melancholicum gignit san-
guinem Ibid. 12
Caro canina & uulpina siccis tempera-
mento 417, 19
Caro caprina, praeter succum uiscerum, ab-
crementum sortitur 392, 54
Caro canina malum faciem gignit, &
conculina est differt Ibid.
61
Caro non subiecta internae digestum re-
gionem, minuit autem externae
104, 24
Caro equina, asinina, uulpera, & porci-
na, uide uentris tenet fugienda 33

INDEX.

- causa externa ad laedi nisi interna pre-
 sent 17, 19
 causa generis accidi indicat 15, 13
 causa inaequalitatem efficiens, semper in
 pluribus ordinatis forma et forma est
 566, 22
 causa inducens arterias que sunt
 399, 63
 causa morbi que sit dicenda 658, 39
 causa morbus morbi, omnis sunt frigi-
 da sine calida fuerit, horrentem rigore-
 rem; inducere potest 680, 40
 causa non potest agere, sine patientis a-
 ctitudine 782, 43
 causa quid dicatur 935, 4, 664, 501
 599, 13
 causa quatuorplex 664, 11
 causarum continuationem arietatum pul-
 sus, odia coniugantes 587, 17
 causarum differentia triplex 566, 54
 causarum diagnosticandi modi exten-
 duntur aeterni positi 581, 18
 causarum diagnosticandi que sunt arti-
 faciles modi 581, 13
 causarum efficientium differentia duplex
 17, 35
 causarum genera praefer naturam que
 sunt 920, 14
 causarum genera quatuor 236, 61
 causarum genera tria in cordis 55, 12
 12
 causarum generis duplex 599, 12
 causarum medicinalium quatuor genera
 4, 6
 causarum motionis differentia quatuor
 sunt 18, 5
 causarum praecedentium febrem putri-
 dam, qualis simplex inducit 920, 13
 causarum praeservationem differentia
 triplex 339, 7
 causarum praefer naturam differentia
 5, 14, 34
 causarum proclatitatem usus 85, 3
 7, 24
 causarum pulsus gigantium tria genera
 7, 59, 63
 causarum pulsus multorum generalis ab-
 no exemplo tradito 552, 13
 causarum salubrium differentia duplex
 11, 82, 96
 27, 11, 53
 causarum salubrium naturae que sunt
 10, 390, 6
 causa salubris 159, 47
 causa sine que non, que 664, 54
 Causae in quibus utendum medicamen-
 tis 11, 82, 96
 Cauteris sanguinem supprimunt quod re-
 quiritur febrem 1017, 3
 cauteris, congestis in quibus utendum
 865, 33
 cauteris in oris paralytici, aliter
 17 quando utendum 82, 6, 4
 et C. 1818: que prodeunt ures
 1086, 53
 Cerebra, haud omnia sunt melius 1032,
- 64
 Cerebra facultas 1085, 49
 cerebra quod 1085, 43
 cerebri facultas 1085, 43
 cerebri uires 1193, 46
 cerebri utriusque facultas 1085, 40
 1085, 1
 Cere, qui morbus 175, 4
 Celeritate pulsuum diiudicande quod
 expendere oportet 541, 1
 Cerebrum maiori facultas 1086, 3
 cerebrum maiori facultas ibid. 13
 cerebrum non recipit Celeritas utroque
 fuisse 109, 17
 Cerebri utriusque 1102, 33
 Centrum quod 172, 3
 Cerebrum, aliterum, pariterum ampelo-
 praeferent facultas 129, 55
 Cerebrae symptomata diversae a causis
 morbi producta 1001, 51
 cerebra a magis facultatem dicitur cer-
 phalagia 1205, 48
 cerebra quod 72, 15, 1205, 32
 32
 Cerephalgie et cerebrae differen-
 tia 746, 25
 Cerebrum catenaticis generosioribus sunt
 1160, 40
 cerebrae medicamentis 878, 45
 cerebrae ad que medici utantur 1160, 35
 35
 cerebrae Hecce ibid. 46
 cerebrae esse corrupta dicitur 117, 5, 30
 30
 Cerebra obducere ratio 1152, 35
 cerebra est complexa 1041, 53
 cerebra morbositas est caput 1032, 57
 cerebra quod 1087, 3
 cerebra usui alteri casu est periculosus
 850, 3, 1123, 16
 cerebra per se non congruit ulceribus forda-
 dis 1155, 41
 Cerebra generi facultas 1086, 37
 cerebrae facies et facultas 1086, 33
 40, 1086, 33
 cerebraeque salubris 386, 10
 cerebrae plurimum: cerebra medicamentis
 quando misceantur, et quando rei-
 maz 1170, 43
 Cerebrales tunc gigantia a crassa me-
 ningibus utantur 1066, 323
 660, 157
 Cerebra Galeni frigida, quomodo uleri-
 dum 909, 55
 cerebrae facies 1086, 40
 cerebra ex hypostha 800, 61
 cerebra Galeni ad inflammationem oris
 ventrali et deperit maxime conu-
 lunt 1243, 33
 cerebrae humiditas abluunt frigida, ca-
 lida efficitur refrigerata omnes 10, 35
 55
 cerebra reborando, uterque calidus conu-
 lunt 891, 46
- cerebrum simplex actio abluunt, ultra in-
 mures calidus opus est praesidi-
 1019, 9
 cere Typhoides 1154, 41
 Cerebrum praeteritum 679, 13
 Cerebra que dicuntur 415, 20
 Cerebrum est principium spirituum me-
 dulla 817, 11
 Cerebri effectus symptomata 327, 45
 cerebri altero ventriculo ulnerrato quod
 dum fuisse firmatum 355, 59
 cerebri anaxore 182, 40
 cerebri anterior a posterioribus divini-
 ter intercedens dura meningi
 233, 2
 cerebri anteriores ventriculos inflationis
 non expansionem atque inflationem
 efficere 25, 10, 149, 10
 cerebri aut meningem inflammationis ne-
 cessario febris atque delirium sequuntur
 602, 44
 cerebri calidi et humiditatis indicia 818, 65
 cerebri calidi et frigidi indicia ibid. 37
 cerebri calidi indicia ibid. 10
 cerebri et meningem inflammationis
 matricibus quando excutitur com-
 10, 913, 16
 cerebri et meningem crassitudo per fuit
 expelluntur 158, 16
 cerebri excretionis uterque 194, 10
 cerebri exortus, versus nasi radium
 112, 23
 cerebri frigidi et humiditatis indicia 819, 43
 43
 cerebri frigidi et frigidi indicia ibid. 31
 cerebri frigidi indicia 819, 13
 cerebri functiones proprias que dicun-
 tur 730, 8
 cerebri humiditatis indicia 818, 53
 cerebri uterque humiditatis quod se-
 10, 913, 16
 cerebri lacrimae 129, 43
 cerebri maxillam ad palatum descendens
 1125, 39
 cerebri maxillam declinam usum 129, 56
 cerebri morbi quomodo diagnosticandi
 82, 4
 cerebri motus 318, 9
 cerebri natus 894, 5
 cerebri naturam quatuor indicium gene-
 ra ostendunt 1125, 56
 cerebri pars anterior, melius melius,
 posterior dicitur, dicitur generaliter
 1125, 56
 cerebri partes quod posteriores, ed dicitur
 1125, 56
 cerebri productum maxillae, quod ad
 1125, 56
 cerebri productum maxillae usum 129, 56
 10
 cerebri refrigerandi, evenit productum, alio-
 1125, 56
 cerebri frigidi 818, 45
 cerebri temperata quatuor uterque comu-
 1125, 56

I N D E X.

- cibus car frigores in cornu dandi 351,
 29
 cibi dulcis & crassi facti, que male in-
 ducunt 408,15
 cibi frigiles Ibid. 14
 cibi in mediocritate consistentes omnino
 commendatissimi 405,15
 cibi instrumenta triplicia 377,49
 cibi instrumenta magna ex parte in auge,
 quatenus nonnulli ipsum conficiunt
 359, 22
 cibi in claudibilibus succo gignentes qui
 741, 36
 cibi omnes in modis semper morbos gi-
 gnunt frigidos 611,31. 987,
 26
 cibi admodum expensis non egent,
 qui ante cibum exacerbi possunt
 405, 6
 cibi tardè permeantes posteriores sunt
 diuulter priores 382,22
 cibo ingesta cur prout ad somnum in-
 ducant 675,48
 cibo tractissimo quando uti conuenit
 916, 43
 cibi diuturna diuturna consistentibus
 accretus 170,47
 cibi durior, crassiores gignit succum
 401, 40
 cibi excruciat & intercruciat accre-
 scunt, melior 416,50
 cibi melius quodlibet ducunt
 681, 17
 cibi omnis inuendit exalatus, pu-
 tris 685,18
 cibi omnis in sanguinem uersus, natu-
 ralem augeat calorem 60,3
 cibi quibus est purissimus, seu cruciati-
 onis 615,39
 cibi refrigerate hepate in sanguinem
 uerit non possit 766,18
 cibi sunt, facilius illi quæ ex aqua
 sunt salubres, conuenerunt 315,
 27
 cibi uberior ej dandus, qui longius ab
 fuerit status, & morbus clementior
 611, 4
 Ciceronum usus in medicina 114,1,16
 cicatrui inducentia medicamenta que
 1059,24. 1159,5
 cicatrui inducentia succenta desiderari
 835, 35
 Cicer ad uenter incitat 376,3
 cicta nigra calidos remou committit
 376, 5
 Cicerale uis Ibid. 57
 Ciceris agrestis facultas 1069,65
 ciceris facultas 409,50. 415,38
 1079, 52
 Cichorii us 1105,15
 cichorium ex genere cichoriorum 1157,
 15
 Cicuta cum medico uino & minime ge-
 nerose semper opus perit 1037,
 13
 12
 cicuta cur homines enecet, fumes autem
 alit 1036,4,1271,9
 cicute uis 109,119
 cicute stultitiam inducit 69,19
 cicuta fume nutrimentum exiit 601,
 20.
 Cilicem producta & usas 169,21.
 168, 44
 Ciniis quom uim habent 114,4,47
 Cineris facultas 1109,53
 Cinnabari uires 1121,30
 Cinnamomi facultas 1251,30.
 1087,15. 1149,54
 Cinnamon optimi note 128,53
 Cinnamoni uires quæ præstati sunt
 1181, 61
 Cirsacæ facultas 1087,20
 Cirsacibus quæ totis tribus, uires idemq;
 bono potest simul corripit 654,3
 cirsacus minoris qui ducunt 615,
 57
 cirsacus perfectissimi qui 615,61
 cirsacus quatuordecim, tertiorum, & que
 latus quid 717,11
 cirsacus, uti periculosus, typus uel ordo
 quid 809,5
 cirsacus diffinitio 619,11
 cirsacus ordinem que perueniunt
 802, 15
 cirsacus ad iram facili septem, quem ser-
 moni ordinem, & a quibus oritur
 266, 21
 cirsacus ad iram primus qui huius fa-
 cultas Ibid. 25
 cirsacus secundum facili ueris formi men-
 brans Ibid. 26
 cirsacus tertium efficit totius charactere
 Ibid. 27
 cirsacus emulgens huiusmodi 265,
 57
 cirsacus quartus 266,28
 cirsacus quid 271,2
 cirsacus quintus unde 266,29
 cirsacus sextus unde Ibid. 33
 cirsacus sextus apocryphus Ibid. 30
 Cisthi facultas 1073,25
 Cisthi uires 1095,44
 Cisthi cortex, comeditioni accellat
 381, 56
 Cisthi facultas 1096,43
 Cisthi pars acida in actum induratum
 comeditionem, reddit id acrius 386,
 56
 Citronum uel malum Medicum conficit tri-
 bus ex partibus Ibid. 50
 Citre cause: & quæ maxime infestet
 664, 49
 Citre quæ sunt 764,44
 Citra quid 479,27
 CLAVICULAR colligens 1294,
 21
 claudet que ducit 116,49
 claudetum uis 293,55
 claudet quæ habet facultates 1081,2
 Cleopatra pars uisum Antium ne ut-

ut diceretur Roman à Casare, 40
 fide sibi morum confusit 1271,
 59

Clinopodis facultas 1087,64

Clysi diffinitio apti 1064,8

clysi euacuans quæ, que in hepatis si-

mibus haurit 1204,33

clysi fortes ualide reuolunt à capite

Ibid. 30

clysi ex solo oleo alio decedente co-

modiflitas esse 470,42

clysi non posse ad interflum uenire

la proxima peruenire 869,34.

940, 19

Cnicus agrestis uis 1079,20

cnicus facultas 1038,11

cnicus pinus similis 1084,8

Cnogvi facultas 1129,24

cogniti leporum facultates infestis

Ibid. 14

cogniti omne dissoluti la, & sangui-

nem in uentre coarctant Ibid.

40

Coca cinidi facultas 1088,18

coca gaudium solut pinetum 1274,

15

Coccyus opis consideratio 135,49

Coccyus, ex quod sit 135,47

Cochleæ crassi sunt font 406,33

cochleæ uisum ex peris, admodum uen-

tri aqua inter eam laborant, et

alii tunc uires eos deficiunt 1240,

46

Cochlearum caput drachmam uenit, ser-

pationem dimittit, gyna duo, & duo

grati quiescit 1293,22

Cochlearum uis & facit uisum

deficiat 1151,15

Cochlearum cineris facultas 1140,44

Cochlearum uel lumen uires Ibid.

57

Cochlearum permutaciones que inducit

619, 14

Codium accretus, proprius succum non

ferat 128,6

Carliac quid inuit 1061,22. 1089,

19. 1166,66

Carliac quid confert 1104,10

Carliac lapis quem habet uim 1124,

54

Carliac, oculis optatissimum est color

672, 49

Carliacum sensibilem emittit differen-

tiam in natura, excitatione & ap-

plicationis modo consistit 54,24

Carliacum similem & dissimilem sufficit

ad causas, uti methodum consi-

derationem 354,53

Carliacum spiritus quatuor capitis affe-

ctibus presit 1196,60

in Cere si permutacionem organorum

commisit 101,64

Cere in modis cur reddat inuallu-

res 114,23

Cephalic uis uis uis habent 1282,20

Colem à spiritui aucti contingit 779,
25
colici 127,30
Colica enterica qualis 770,10
colica presens magis est & car-
minum & prognosticum Ibid. 17
colica remedia 733,10,113,19
colica symptomatica præcedentia que
731, 45
colica medicamina Andromachi 1162,
34
colici affectus ex cruditate refrigeratio-
nis gignatur 653,64, 753,3
colici à nephriticis quomodo distingui-
tur 769,59
colici dolores, & cui qui ab impetu la-
pide oritur, sunt communis præsidia
calascientia 733,36
colici dolores, & orti à lapide, signa di-
versa Ibid. 32
colici maligina Antipatri 1185,5
colici alius unde deprehendi possit 773,
35
colicæ uti glutinis facultas 1088,12
colli longitudo in uicis acinabibus ue-
ris 350,43
Colligantia que sunt 1058,15
Colligantiones p. artu quibus modis sol-
uantur 651,4
Collisio casu 663,65
Colli spondylorum prædictiones unde-
cun 181,55
colli spondylus primus, posteriore præ-
dictione curi, foraminibus obli-
quis 119,47
colli uertebra prima due sine membra-
na, que reliqua consurgunt
334, 44
colli uertebra quibus partibus urines
largiantur 150,55
colli uertebra confusio 114,43
colli uiscæ mufculos per omnia funis
est sed mufculo 181,6,4,16:19
colli uiscæ funis 251,12,305,3
colli uiscæ spondylus æqualem portio-
nem ad uicem uicis præbet 190,18
collium æstere arterie gratia fudum
250, 18
collium cum pulmone semper & uiscina
& perit Ibid. 10
collium matris 301,41
collium non habentia animalia sunt mu-
ta 250,35
collium que animalia habent, & que
non Ibid. 12
collium septem constat spondylis 116,
17, 193,6
collium uiscæ farnine breues & le-
uiss uiscæ 103,19
Colletio Asclepiadis ad malarum dolo-
res 1119,17
colletio Crisiani ad dentes motus & e-
rosos 1150,8
colletiones moderate ex quibus sunt
1156, 34

collationes ualde asstringentes Ibid. 38
Collyria largiendi modus 1:17,40
collyria Libyana & cygni que dicuntur
Ibid. 35
collyrium ex opio confectum faul-
tas 931,2
collyrium ad oculorum dolores à crisi-
mas 1111,18
collyrium diarrhædon Ibid. 57
collyrium ex malarum fucis 1115,18
collyrium ex uno asfrinadonibus acum
modatum 121,7,58
collyrium Pactionum 1239,12
collyrium sicum ex pterygio lapide, scu-
lis addi robur 481,16
collyrium tryphera dictum 1123,35
Colocintib. facultatem quam habet
1088, 59
Colou, infusum quintum 110,5,1
colou suppuration interdum in uita bubo-
nis 777,46
Colophonia duplex 1183,15
Color corporis quando ex quibus sit lu-
men nota, qui subest 451,4
color corporis quot modis atari possit
766, 46
color cuius qualitatem bonorum subus
putrefcentium indicat 1189,
16
colores ad medicamentum uires digna-
scendas parum conferunt 1051,3
colores medij unde oriuntur 673,9
colores qui alius sunt calidiores 1053,12
colores uisui qua conferunt 671,5
color flammæ rubicundus 616,60
color in plantis uires bonorum indicat
991, 43
coloru rufi flauis discrimen 916,17
color plumbeus quid indicet 457,10
colorum uicissitudines unde oriuntur
693, 47
color uiridis quomodo fiat 627,26
Colombæ carne felis uiscæ 705,40
colombæ uiscæ, domestici sunt præ-
stantiores 416,41
Columella inflammata curatio 1216,
36
columella læuata remedium 1254,51,
1158, 16
columella quando fit excidenda 950,
26
columella quid 141,58,1556,18
Columnaris processus 135,8
Cenari fructus uicino 187,10
Combustum nullum est frigidum
1114, 55
Comitiali morbo obnoxius quid arguat
1137, 16
comitiali obnoxius quid sonet 1067,
19, 1105,50, 1138,37
1141, 30
Commentarios de usu partium erui quos-
dam hymnos conscripsit Galenus
214, 60
Commiscentur arterie, uicæ, & nervi

inter se sicut in corpore 116,65
Commodi morbus 631,11
commodum sepebatur in Italia Cle-
mus, dum M. Aurelius bellum infere-
bat Germanis 651,11
Commensus que medicamenta consti-
tuit 1253,4
Communiter euidenter non sunt 1,35
communiter magnitudo, remedium
magnitudinis non uidetur Ibid. 55
composita cognosci non possunt simpli-
chis ignorantis 1018,19, 53,12,
1153, 16
compositus articulus, ex Apollonii li-
bris 1210,31
compositus Menecrati squamas decide-
re facies, & corpora attemperat
1216, 64
compositantes hepaticæ Asclepiadis
1157, 10
compositantes nephriticæ Asclepiadis
1167, 36
compositantes primæ causæ 683,46
composita uisum ex uicibus Philocrati
1121, 40
compositum semper simplicibus posse-
rit 490,11, 128,137
comprehensio integra quomodo fiat
196, 33
Conceptionis ratio 83,40, 105,11,
& 31, 107,18
Concretio pulcherrima que dicitur
425, 54
Concha capiti mysta duo 1193,6
Concludunt thoracis & euident de-
uiscis de uiscis 499,3
concupi aliquid perfectum sine alterius
necessitate nequit 117,54
concupiscendi infirmitas 296,15
Concordia inuoluitur prout falsa, deinde
amara redditur 79,55
concordia & cruditatis ex propriis co-
gescantur excretionibus 29,45,
617, 5
conducent non sustinet myrrha, nec thus,
nec aloë 1158,13
conducentes quid indicet 29,55
conducentes sunt expendende in cog-
noscendo præsentibus & futuris cri-
sibus 618,1
concoctioni ciborum magnopere præ-
sticiendum in singulis febribus
921, 8
concoctioni que conferunt 50,41
81,13, 463,52
concoctionis abstrusa imbecillæ signa
659,12, 638,4
concoctio dicitur bene & male casu
219, 43
concoctio in leuicia, quocumque tempore
apparet, subleuicia 624,57
concoctio in organa & successiones
408, 64
concoctionis signa 637,40
concoctio in leuicia unde 684,27
684,27

I N D E X . T I

concoctio uiscerum causa conueniens
que 683,55
concoctio uiscerum causa extra uiscerum
causa lesio, que 684,8
concoctio uiscerum contingit bis feriens
684, 52
concoctio uiscerum quid ibid. 43
concoctio que fit ad uiscera calere, ab
externo calido haurit 1054, 8
concoctio quid fit 83,23. 640,49.
653,42. 691,16
concoctio requirit temporis diuinitatem
126, 43
concoctio triplex 408,55
concoctio acutissimi uiscerum febribus
79, 16
concoctio facili, facile corruptur
168, 33
Concoctendum aliquid quomodo in uis-
ceribus fit 1055,11
Concoctio in glaciem facili, tem-
peramenti sui frigidiore si uisceribus
eodem consistens infit 1016, 19
Concoctio quomodo corpori auidet
680, 60
Condensio que 1058,35
condensio, frigida est proprium 1040, 16
Condensio coequum plus interdum
absorbet quam profuit 359,17
Condensum genus uaria 593, 29
condensum uiscerum 1046,56
condensum simplex ex quibus consistit
1007, 9
Condito sal, quoniam habent facultatem
404, 21
conditio magnifica commendatio
126, 4
conditio artem splendescere etiam in uis-
tute matris 215,14
Conditus in uisceribus quid 96,15
Conditio ad omnes sanguinis reuictio-
nes 1246,9
conditio dicta incocta ibid. 2
conditio ex fructibus Asclepiadis, uen-
trici subuersio, catiaco & dysen-
terici conuocatus 1250,45
conditio Romaciac Andromachi
1249, 26
conditio sedes dolorem & uiscerum ad
termina & dysenterici 1145, 61
Confluxio in toto corpore est una 564, 52
Confluxio aris medicæ in affectionem co-
gitationis consistit 1101,46
Contra famulas 1091,12
Contra ad uiscerum circulum dissolu-
tum omnino que circa rotunda cor-
pora fuerit 265,43
conuersiones in exquisitis rotundis sella-

ciore, qualem placidioribus 1692, 38
Confectio animantis morali præcedit
con, que administratur in uno 191, 30
Confectus & disceptantæ qualitates
infanti rebus uicioris 1030,35
Consequencia que decedit 1133, 161
Construere medicine parti triplex
161, 16
Consilium in uisceribus placidioribus
ad rectorem quod 1059,32
Consistentie humidioris omnia corpori
denti exiguum diuinitatem: dura uero et
terrestria, copiosum, & quod æquid
absorbetur 376,19
Consistentia quid 355,43
consistente que sunt humida, à quibus
uisceribus haurit 379,17
Conspicuos metatens à quibus humi-
dus fuerit 804,7
Conspicuos causa 661,23
conspicuos que ratione febriem gignit
658,6. 889,64
Cristallio corporis optima que fit 66, 26.
673,6
cristallio membrum in quo consistit
487, 61
cristallio animalium ex diffusi elemen-
torum miscella 39,40
cristallio mollescit animæ incommo-
ditas 121,11
cristallio esse aliquid condonandum
616, 14
cristallio correctionem habende est
ratio 466,61
cristallio ad dyspnoiam haurit exigui
non habet 427,59
cristallio ad inuentionem remedium,
& ad fontem secundum plurimum
potest 903,30
cristallio est signum naturalis causæ
proprietatis, atque etiam causa inter-
dum 427,21
cristallio non sicut ac proprium tem-
peramentum seruanda 896, 23
cristallio plurimum potest ad uiscerum
indicationem 964,37
cristallio quoniam ad maris bonita-
tem uel prauitatem possit 72, 64
cristallio quomodo curatio rationem
inducit 903,37
cristallio reddit inuentionem epistemon uis-
cerum genus 423,57
cristallio uiscerum acquirere habere 49, 51.
617, 19
cristallio rationalis ad inuentionem
necessaria 359,12
cristallio sua sorte uero caret tristitia
426, 8
cristallio qui dicitur 129,45
cristallio ad modestiam una est una

424, 19
cristallio inuentionem haurit quod haurit
423, 43
cristallio que solum 120,33
cristallio arterie habet quatuor pul-
sum genus 587,37
cristallio arterie quatuor distincta
541, 23
cristallio arteriarum in quibus consi-
stunt sit passiva, & in quibus ab-
soluta 540,14
cristallio arteriarum exteriorum soli-
do 606,13
cristallio arteriarum uiscerum 351, 33
cristallio & distinctio uiscerum 591, 41
cristallio in arteriis electis, magna
non excrementis salignis indus-
ta 587, 50
cristallio tanquam alio instrumentum
nunc 95,57
cristallio ad solis contrariis tolli 120, 7
cristallio contrariis ratione 25,18.
350,46. 474,7. 504, 52.
519,14. 571,4.
586, 53
cristallio maxime sub eodem genere con-
tinentur 843,21
cristallio quoniam dicunt esse 919,52.
1254, 18
cristallio quatuor indicanda 58, 51
cristallio exhibitis quoniam uiscerum co-
gitationem requirit 903,20
cristallio per se uiscerum uiscerum
sa 427,43
cristallio una est scientia 159,43
cristallio unde nascitur 334,30
cristallio ac calumnia a quo animæ
seruanda 421,71
cristallio quod 2158,856,4,4
cristallio unde accidet 931,39
cristallio atque sicut reuictio ratio
859,60
cristallio modius eorum præbe-
tur 194,4
cristallio & sicut diffinitio qua-
lis 859,55
cristallio uiscerum ratio 881,45
cristallio uiscerum, dupliciter dicitur: sicut
dum qualitates, aut secundum substan-
tiam 474,54
cristallio 271,7
cristallio 12,54
cristallio ad sicut oris, inuentionem est
617, 19
cristallio & tremor in solis obtingit ut
his 517,40
cristallio fit ad repletionem sicut et im-
missionem 1051,4
cristallio in uisceribus consistit 661,3
cristallio epileptice quoniam dicitur
NN in

EPITOMES GALENI

fieri in affectibus per consensum		cordis affecti symptomata	127, 46	507,	44
745,	35	cordis motus que vocentur	124, 4	cordis sinister utriculus, receptacu-	
canalis foris que curari possint & que		cordis antiquiorum numerus	libid. 53	lum spiritum est	642, 242
interius	913, 42	cordis capiculus incombentium membra		46	
canalis foris ab humore copia aut in-		naves numerus & figura	libid.		
flammatione oritur, curatio	716,	159		cordis sinistra pars cui sit crassior ac du-	
11		cordis arteriam substantia	237, 2	rior dextra	328, 42
canalis foris epilepticorum causa	745,	cordis arteriam utilitas	124, 48	cordis sinister utriculi officia duo	
32		337,		284,	26
canalis foris omnis causa	776, 47,	cordis calidi & humidi indicia	821,	cordis situs & positio	312, 48
740, 21,	733, 28	46		cordis similitudo in inferiorem arteriam o-	
canalis foris arteriam spermaticorum ad		cordis calidi & siccis indicia	821, 15	mnibus eadem	185, 44
ferentis extremitatem conducat	301,	cordis calidi indicia	820, 48	cordis substantia ac citro qualis	397,
62		cordis calor duplex	595, 15	24,	407, 8
canalis quod	715, 61, 15, 6, 42	cordis calor nuda minor atque maior rel-		cordis substantia permittit diffusi mu-	
canalis quo differt a naturali motu		dat	590, 18	culi	184, 8
740,	18	cordis caro calidior universis corporis		cordis temperies & intemperies ex	
canalis tensiones quando comitatur		partibus	42, 23	quatuor constanter elementis	584,
732,	24	cordis caro qualis	314, 18	20	
Conque utriusque facultas	1088, 18	cordis contraxionem que inest	335, 38	cordis temperies necessaria est cerebro	
Con ad passum motum cerebrum non e-		cordis contraxio quando fiat	334, 40	& hepati	759, 6
get	324, 8	cordis corpore immiso a frigidiore, motus		cordis duo utriculi	123, 44
cor egerit hanc cessat citius motum in-		detinere non possit	590, 39	312,	39
perem	1036, 41	cordis cum pulmone commercium	235,	cordis usque oritur ab illius basi ali-	
cor aomatibus indubium aut foci ignis		34		rum partem principalem	
121,	55	cordis dilatatio quando fiat	334, 16	334,	2
cor animose facultatis initium	184,	cor & arteriarum motus non est vo-		cordis usque que maiore minore	339,
45,	239, 10	luntarius	347, 15, 184, 10	7	
cor a qua venit alatur	239, 15	cordis & hepatis generatio	209, 32	cordis utriculus dexter, pulmonis	
cor arteriarum arteriam origo	144, 10	cordis & musculi discernit	91, 40	gratia conducat	235, 10, 236,
148, 53,	309, 47	cordis facultas que	594, 19	54	
506, 21,	69, 6, 60, 45, 12, 19, 9,	cordis figura	324, 1	cordis utriculus dexter pulsus, qui	
16,	805, 34	cordis frigidi & humidi indicia	821,	sumus a iecoris inferior est	340,
cor arteris sunt passibilem suppetit		61		43	
240, 36,	828, 41	cordis frigidi & siccis indicia	822, 8	cordis utriculus tertius nequam est	
cor calidissima corporis particula	311,	cordis frigidi indicia	821, 12	147,	21
13		cordis subugnum expelli in sistole per le-		cordis utriculus uterque pulsus indicat	
cor caloris nativi fons	234, 10,	nes & magnam arteriam	241,	238,	31
351,	51	30		cordis uterque situs pulsus	206,
cor cerebro connectitur per tria usum		cor & gremio unde materia	122, 16,	18	
genera	321, 53	& 59		cordis uterque quando flatum perimit	
cor consentit hepati, vinculo causa uter-		cordis humidi indicia	821, 39	759,	64
601,	54	cordis intemperies comites est facultatis in		cor egerit crassiore alimento quam sit spi-	
cor consentit septo transverso	libid. 55	brallitas	589, 16	ritus	339, 18
cor cum arteris perpetuo pulsus	512,	cordis intemperies proxima ceteris par-		cor est principium compositi arteriarum	
57-74-24-	311, 46	tibus communicantur	590, 44	motus	501, 28
corde affectu necessariis afficiuntur ar-		cordis intemperies est minor inflammato-		cor est siccus atque calidus hepate	
terias	594, 54	ne	829, 34	341,	47
cordis & hepatis ex se mixta commigra-		cordis morbi unde cognoscantur	827,	cor existeret que possint	700, 1
ne acuti fructus tribui sunt	311,	11		cor frigidissimum calidus cerebro cali-	
30		cordis motus a natura	243, 19	dissimo	820, 39
cordis iuncti est corologium	185, 18,	cordis motus duplex	321, 7	cor haurit spiritum a pulmone per arte-	
139,	51	cordis officia quatuor	236, 50	riam utrosum	338, 28
cordis infusio quatuor tantum ora usum		cordis officia inveniendi ratio	185, 15	cor humidum hepatis siccitatem non po-	
rum	339, 51	cordis partes	234-4-239, 55	testi ad habitum contrarium perducere	
cordis interitum infusio varia temperatur-		cordis assus usus	125, 27	821,	44
14	596, 3	cordis primarii affectus	759, 43	Coriandri facultas	1089, 8
cor dilatatore trabii, contractione inari-		cordis quies quando fiat	234, 64	Coria utrum ista quibus affectibus con-	
tur	321, 59	cordis siccis indicia	821, 23	ferant	1118, 44
Coris non infusio tria sunt	185, 19	cordis simplex sive perpetuo mouetur	64,	cor incalefcentem refrigerantem quidem e-	
cor de multo & comiso, nulla nobilita-		64,		dem spiritum	760, 18
ria alacritate acendi impeditur	312,	cordis sinister utriculus	234,	cor in diastole spiritum trahit, in sistole	
46		25		pellit	243, 55
cordis nunquam oberrantur naves pul-		cordis sinister utriculus longe malo-		cor unum caloris origo	758, 65
sum dum efficiuntur	600, 32	rum habet calorem ceteris partibus		cor infusio caloris fons & principium	
				504,	10

- eruditio quid 631, 46
 eruditio quid significet 631, 29
 eruditum patrum, quoniam facit ut
 febris uideatur, et quia agit 712,
 39
 eruditus nullum necessarium symptomata
 sequitur 694, 18
 eruditus quid indicent 20, 55
 eruditus qui potius cibis congruat
 459, 9
 eruditus quod seruitur commodum 458,
 56
 eruditus cause 764, 50
 eruditus differentie 291, 6
 Erubescere simpliciter quodam sit 613,
 36
 Erura duo soli homini data inter pede-
 stris omnia 107, 63
 Erura erga aculea picae et carui erunt
 da 467, 39
 Erura in solis hominibus ad resiliam lineam
 subtrahenda sunt 310, 7
 Erura plegmone obfusa quomodo cu-
 rantur 936, 14
 Erura altero afflicta, reliqua non est scissi-
 cutum 915, 4
 Erurum anatomica administratio 156,
 60
 Erura siccio extensio, quando accidit
 308, 27
 Erura uere 346, 44
 Erura actiones quae 303, 31
 Erura, motus, et temporis mensura
 et motus 94, 14
 Erura, erga cum ambulationis 310, 40
 Erurorum us 403, 31
 Erurum non conuenient agnoscere
 121, 59
 Erurum in uero naturae 165,
 7
 Erurum humor cur non facit sit u-
 minus siccior 168, 14
 Erurum humor cur retentus sumit ei
 oblongos 272, 7
 Erurum humor, principalissimum ut-
 sus instrumentum 323, 43, 263, 31
 341, 63, 84, 7, 9
 Erurum quid 165, 9
 Erurum uritur in uero, ueluti
 sicciora sensibilia in aqua 165,
 52
 ERYTHROFORMES 311, 55
 Erythra consideratio 116, 60
 Erythra extensorum muscularum diffusio
 151, 38
 Erythra murescit 94, 20
 Erythra processus duo 117, 3
 Erythra uenerum consideratio 143,
 68
 Erythra uelut columnarum processus 117,
 14
 Erythra quid 116, 60, 203, 63
 Erythra radio subest 116, 63
 Erythra sunt alba 203, 60
 Erythra, perperas, melio perperas, si
 non celeriter perficiuntur ac degra-
 tur, in faciem letalibus uenerum si-
 milium conuertuntur 410, 14
 Erythra facies 380, 4, 1106, 7
 Erythra sima quomodo reponantur
 in hyemem 179, 3
 Erythra uel colicymbis facies
 1088, 37
 Erythra uel et facies 179, 30,
 410, 36, 1000, 17
 Erythra summa et uel afflicta, reuel-
 la a morbus sanguinem 267,
 31
 Erythra ista, praecipue uelibus con-
 gruit 1066, 9
 Erythra aduoca, dolorem a solo statu
 excitatio soluit 914, 11
 Erythra et uel aduoca, capitis sedat
 dolorem 997, 69
 Erythra cur inuola 940, 43
 Erythra cur ad inuolam affliguntur
 ibid. 61
 Erythra diuersis partibus aduoca,
 quas fluxiones reuolunt 941,
 6
 Erythra quando affligenda occipit
 1105, 19
 Erythra sanguinem a parte reuolunt,
 atque ad ipsam, si sit opus, attrahunt
 941, 2
 Erythra sunt scissitudine adhibere
 excitatio colorum 715, 35
 Erythra fluxio discutienda est uelut
 946, 26
 Erythra hypochondri afflicta, san-
 guis ad uires impetum reuocat, in
 medicamentis ex uero effluam
 1000, 1
 Erythra quando intrudunt 940, 51,
 94, 8, 1000, 14, 34
 Erythra aduocanda esse dolenti ut
 trienio monet Archigenes 125, 15
 Erythra umbilico aduoca, uelut do-
 lores sedat 978, 19
 Erythra in capitis afflicta quando
 intrudunt 1106, 16
 Erythra intrudunt in afflicta ubi si
 sit 28, 63
 Erythra facies 1091, 44
 Erythra uelut, uelut, uelut me-
 ritus atque tristitia causa 425, 31
 Erythra facies 1091, 51
 Erythra uelut tria sunt animalia uelut
 950, 31
 Erythra corporis uelut redundante
 melancolicis sanguine 743, 35,
 741, 18
 Erythra epilepsie tertiae speciei 745,
 20
 Erythra quae indicat 1188, 42
 Erythra 5, 60
 Erythra quae sufficiunt 16, 47
 Erythra adolescentis uelut morbo cor-
 repi exemptionem 616, 1
 Erythra scopus 811, 11, 914, 25
 Erythra totius summa in quibus sit sita
 1005, 11
 Erythra partium sicciorum a uenerum be-
 stis 945, 15
 Erythra per contraria molenda est
 736, 50
 Erythra pro partium discorde uolunt
 946, 2
 Erythra morbus necessaria est corporis
 naturae cognitio 840, 51
 Erythra per aquam, de uelut in pla-
 na, consideratio 323, 64
 Erythra nimis, ex tenui corporis habi-
 tum 167, 19
 Erythra sit per similia 915, 14
 Erythra quae desunt 657, 8
 Erythra circa oculos motus, conserui aptum
 ut se claudendo oculis 117, 55
 Erythra quomodo relaxanda 454,
 31
 Erythra frigida et uelut sit 51, 6
 Erythra gignenda ratio 353, 17
 Erythra hominis temperatissimi est regula,
 secundum quam omnia diuisantur
 1052, 43
 Erythra in regione temperata, similia par-
 tium sicciorum naturam producit 57,
 64
 Erythra lacera in abscessibus medicatio
 981, 16
 Erythra leua quae ratione facienda 454, 29
 Erythra media, quae non esse debet 445,
 57
 Erythra emulsi indolentia pars 662, 5
 Erythra experimentum conuenit omnibus
 250, 47
 Erythra pro quibus subest 114, 16
 Erythra quae producit 316, 53
 Erythra quatuor diffundit 415, 1
 Erythra sicciora, similia terre fluxio intrante
 afflicta 50, 35
 Erythra sicciora ad generandas pilos intrant
 ibid. 10
 Erythra similia si quae perit, restant non po-
 test 81, 14
 Erythra sicciora quae fuerint praesent 407, 39
 Erythra summa afflicta, quae remedia po-
 stulant 28, 57
 Erythra superat similitudinem omnes subiectet
 partes 734, 10
 Erythra, uelut est instrumentum 443, 7
 Erythra totius animalis 179, 9
 Erythra uelut minus in homine temperat
 est extrinsecum media 44, 11,
 45, 52
 CYATHVS capit uelut de-
 cem 1191, 48
 Cyathus capit conchae alius ibid. 4
 Cyathides est 139, 7
 Cyathides uelut in magnis fructibus capi-
 tis quando probet Galenus 870, 5
 Cyathus et pueri nulla edenda sunt
 in alium 674, 14
 Cyathus mali cum si quisque preparatur

EPITOMES GALENI

ad solvendum ducit 170,26
 cylindricam et strabonem faciem offer
 nandi ratio 1096,19
 cylindricam strabonemque faciem duc
 afferunt cum mille et octo, firmisq;
 crebrius utriusque robur 184,19
 Cypri facultas 1092,7
 cypsi facultas 1092,16

D A M O N maffus 334,46
 Daplicis herbe adus 1077,
 18
 Dauri frons quem habet facultatem
 ibid. 3

DECIDENTIAE tres motus 95,
 50
 decidit sui prae voluntatem 95,
 44

Decimessimi ardo, aliter qui ad decima
 ediam fit, longe sectione coexistit,
 614, 17
 decimessimi index est nigrescit et
 nigrescunt, magis tamen nigrescit
 618, 11

Declinatio in pueriliute quando adfit
 619, 19
 declinationis meriti argumeta 612,
 14

declinationis optima, qui pulsus 64,1,
 6
 declinationis tempus quod 614,42
 declinatio quid 612,26,717,10

Decima omnia propriam qualitatem in
 aquam transmutant 40,153
 decimum artem, quando in coquatur, sem
 per solius coadit ibid. 46
 Decretoria tempora tria 610,5
 decretorianum propriis semper est ser
 vanda 615,45

Decubitus in alterum laeas commenda
 tur 100,15
 decubitus supinus ducatur, et cur 100,
 12

Deficere ab optima constitutione, tribus
 de causis contingit 466,9
 Definire omnia velle, ad soporificum per
 tinet disciplinam 512,12
 definitio duplex, substantialis et nomi
 nalis 812,13

definitio essentialis quid 512,7,
 744, 40
 516, 40
 definitio, quae sine constituit, non exi
 guas parit ambiguitates 359,
 34

definitioes sunt rerum non nominum
 510, 64
 definitioes sui sint, quot res 511,2
 definitioes non opus est in rebus no
 tis 536,22, 512,1

definitiois opone iust 812,11
 definitio nominis quae dicitur 536,39
 definitiois prae generis duo, notio
 nalis materialis atque essentialis ibid.,
 29

definitio rerum quae in generatione con
 sistit, quae habet ab optima 517,
 64

Defluxus unde in uterum accidit
 689, 38
 Deglutitudo difficultas unde 752,54
 Deglutitudo car facilius quam vomere 85,
 11

Delictum ciborum celerem quae sequi
 tur 667,15
 delictione quando utendum 456,54
 delictiones intemperantiae sunt prae
 voluntatis imperium 689,1
 Delictio mentis ac delapsus differunt 95,
 45

Delictio et dolor quibus scribitur ma
 ler, minoris adest 672,19
 Delictoria generis quae sunt 584,9,
 1064, 14

delictoria bene autem naturae quae sunt
 102,7, 56
 delictoria quae praefacienda erant,
 quomodo ab eis differant, quae sunt
 frigiditate et angustia 1016,
 53

delictoria, tota substantia 1060,11
 delictorianum genus primum 58,63
 delictorianum genus secundum ibid. 64
 Delictio gravissima quae antiquissimum le
 gonatoris impetus relinquitur
 1000, 61

Delictio exacerbat particulas quibus sit
 molenda 1172,53
 Delictio delectibus quibus sit adhiben
 da, et quando solvenda 1171,5
 Delictio animi ad vacuantes immodice,
 curatio 965,10
 delictio animi ob fules, curatio 966,
 3

delictio animi patientes ex fame infi
 gi, quomodo reuocantur 1153,18
 delictio animi quae inducere possit
 965, 11

Delirium spiritus magnus simul et
 rarus 497,4
 Delirium ex septo transverso ortum, quibus
 762, 9
 delirij causa 69,55, 762,7,
 716, 56

delirium a delirio febrium quomodo fit
 744, 47
 delirium a septo transverso ortum, quo
 modo a phrenitide distinguitur
 762, 46

delirium in asynus febribus curatio
 487, 52
 delirium quid 666,85,683,13
 delirium quodam sit primum 762,
 43

delirium quod cerebri affectus sequitur
 603, 19
 Deliriosus 401,27
 Deliriosus effert bonitas 70,15
 Deliriosus 648,14

Deliriosum duo principia 168,
 13

Deni caninus hominis utrinque unicus in
 est 274,54
 Denitas unde oritur 452,9
 densitatis alimen non causa, prius a
 bonis defectus 497,11
 densitatis mensuram exiguerunt causa
 905, 147

densum quid 442,5
 densis exemptis quae remanent albus a
 liquid doloris 1127,12
 densis a quibus fauenter humoribus
 ibid. 61

densis augentur et nutriuntur, quod li
 quer ex eis qui sunt exemptis opposi
 ti 1127,14
 densis canini 114,7, 274,17
 densis consensum remanent 1129,
 14

densis dolentis quid frangat 1074,
 36

densis dolent et pulsant 1127,99
 densis ducibus affectibus sunt obno
 xij 1127,40
 densis summa ex Ambiguitate 1129,
 49

densis incisivi 114,5, 274,10
 densis incisivi phores duplo sunt canini
 274,60
 densis inferiores superiores per omnia
 aquales 274,41

densis interdum inflammationis sunt
 quiddam perpetuum 1127,31
 densis in auroque maxilla sedent 114,
 4

densis maxilla superiori infest, acrior,
 inferiori diti radibus adhaerescunt
 114, 10

densis maxillares quini 114,9
 densis molares 114,14, 114,12
 densis molium nervorum cerebri parci
 per tantum 114,18

densis praefrontalis contra eruptionem
 1129,65, 613,62
 densis prominentes extrahi ratio 1129,
 37

densis quosque sapores dividunt 110,
 19

dentibus car inter ossa carteris, solis sit
 nervus molles tribuit 110,17
 dentibus eximendis cura a dolore reme
 dit 1128,60

dentiformis praefrontalis 287,33
 dentifricum ad omnia gingivae et
 oris ultera faciens 129,89
 dentificum opimum 1129,9,
 1130, 37

dentitionis praerogativa congruentia medi
 camentis 1129,36
 dentitionis affectio ex redundantia, inveni
 bus est familiaris 1127,55

dentitionis affectio semibus familiarior,
 quibus medicamentis curatur ibid.,
 56

dentitionis affectio ex inopia semibus acti
 da citius 1127,54
 dentium

I N D E X.

- dentium dolori eadem vera auxiliis me-
 dicamentis Andromachi 1130,
 14
 dentium et osorum dolores quid personi
 1100, 20
 dentium fortiori remedia 1229,5
 dentium fortitatem curatio 2128,1
 dentium dolor alias in ipsa substantia
 alius in gingivis 1227,17
 dentium dolores fortiter, que minigi
 1104, 19
 dentium dolores lenitatis que sunt 931,
 60, 1072,8, 1101,16
 dentium dolores quid sunt 1072,61,
 1067,15, 1084,11, 1097,11,
 1099,5, 1112,19
 dentium doloribus medicamina Archi-
 gaei 1122,22
 dentium & gingivarum utrius
 261, 39
 dentium liidorum causa & curatio 10-
 tridem 10
 dentium molarium negotiatur 174,
 19
 dentium molarium numerus definitus nō
 est, ut plurimum Lenz, habent utrin-
 que quatuor 274,65
 dentium radices Ibid. 24
 dentium redundantia que ratione curan-
 da 1227,47
 dentium fridus 67,2
 dentium stupori portulacæ acutius
 1219, 58
 dentium tenuitas ab alimentis incipere
 - invariabilis 1227,49
 Dens que attribuit Gal. 275,11
 Densitatem modi curat 864,25
 Densitas sit ad uicinas 879,44,
 860,58, 971,60
 densitas per uicinas partes tendendi
 - quibus sit 482,20
 Desidia tenetiam aliquando habet 471,
 35
 Despirantes cur oblatiosi redduntur
 499, 51
 Despirantia proprium symptoma est re-
 spiratio magna simul & rara Ibid.
 41
 Desillationis pituitæ remedia 1108,
 21
 Desillatio quid 691,5
 Desperantia que sunt 892,58
 Desus Galenus quomodo desinit 84,1,
 26
 Desus Hippocrates uocat naturam, illius
 autem manifestum medicum 116,
 4
 Desus & natura praeueniunt partes cor-
 poris, earum effectus prae exemplari-
 is 1150
 Desus non genitus, ab aeterno & non ex
 - se, frivus 42,29
 Desus suislibris in omni animalium gene-
 re ferre 500,18
 DIABETES nec dispaces quilibet af-
 - fectus, cuiusq; symptoma 626,35,
 771,28,
 Diabets causa que 771,49
 Diacalambes confessio 462,
 14
 Diacalambes medicamentis usus Ibid.
 38
 Diacodon Crisostomi 1142,55
 Diacodon medicamine utendi modus
 124,1, 11
 Diacodon quibus conueniat 124,1,62
 Diacodon quid Ibid. 53
 Diacotionis 124,15
 Diaria tenuitate utentes abstineant à si-
 milagine 415,35
 Diamoron ori gratum 121,46
 Diamoron quid sit medicamentum 869,
 22, 1151,38
 Diapledus casus 861,37
 Diapledus quid 866,50
 Diapledus quomodo sit curanda 867,
 17
 Diaplegma inflammation cur deliria
 sequuntur 602,17
 Diaplegma solidam partem, que sunt
 sub clauibus, uenit à spina medulla
 accipit 190,20, 291,57
 Diaplegmatis motus quomodo intercat
 190, 20
 Diaplegmatis nervorum origo clarior
 thorace 188,62
 Diaplegmatis usus 249,11
 Diaplegma in biliosis ex cruditate saepe sunt
 891, 2
 Diarie in patribus ac bellis facili transi-
 unt, nisi probe tractentur 897,
 7
 Diarie unde producuntur 905,15
 Diariorum accessus est uicinis, die uicinis cir-
 conscriptis 897,4
 Diariorum affectus multiplex 905,
 19
 Diariorum affectus simplex 904,
 18
 Diariorum cause quando recedunt &
 quando persistant in corpore 905,
 5
 Diariorum differentia multiplex 905,
 41
 Diariorum solutioni que accidunt 956,
 15
 Diariorum stupore insuperabilis que sunt
 905, 23
 Diariorum causa, ciborum conuulsio
 asellus 78,59
 Diariorum quando ceciderit 124,49
 Diariorum quid conueniat 1078,
 130
 Diariorum triplex species 1130
 Diariorum medicamentum 870,
 59
 Diariorum medicamentis usus 871,
 130
 Diariorum uterium quoque alio est
 109, 9
 Diariorum uterium, substantiam speciem
 attrahi, systole eisdem subiungit ex-
 - pellit 508,12
 Diariorum pepercione quartanis uile 967,
 33
 Diariorum pepercione per offerendi modus
 460, 31
 Diariorum pepercione simplex, cruditas
 medicamentis est oppositum 460,11,
 894, 5
 Diariorum pepercione simplicitate compositio
 460, 8
 Diariorum que 905,39
 Diariorum uires 1077,11
 Diariorum uires decernendi facultas que 610,
 35
 Diariorum quarto que affert 615,26
 Diariorum septimum natura 960,14
 Diariorum sextum natura Ibid. 15
 Diariorum septimum, qui imitetur 609,16
 Diariorum sextum qui reseruat 600,10
 Diariorum primo si multa letitia deprehendat-
 - tur signa, egerit intra quartum mori-
 tur 611,59
 Diariorum accessoriorum decretoriorum
 temporis contentum est, dum infirma
 purgantur 1003,20
 Diariorum decretoriorum cognitio ad cura-
 tores morborum non leue momentum
 affert 608,18
 Diariorum decretoriorum differentia duplex
 614, 45
 Diariorum ardo post vigintiannam 610,16
 Diariorum partem imparitalem expre-
 dere oportet 611,22
 Diariorum eorumque 615,34
 Diariorum decemque uires ut finis secunda, i-
 ta initium tertie septimae existit
 614, 9
 Diariorum decretoriorum omnia decretoriorum
 - indurabilia non autem decretoriorum;
 fortissimum que in medio utranq;
 615, 38
 Diariorum decretoriorum qui sunt 608,13
 Diariorum sexto quibus excrementis 601,55
 Diariorum facultatis decernendi omnino expe-
 ri que sunt 610,49
 Diariorum intercalari quid 611,60
 Diariorum maximi & minimi qui sunt diariorum
 Romæ, & in magna Alexandria
 476, 38
 Diariorum non primario, sed ex accidenti de-
 cretoriorum quid 620,15
 Diariorum omnes post quibusque conuul-
 sione penitus moritur & asperitibus
 quibus crilibus interuenit 610,18
 Diariorum primi in breuibus morbis uidentur
 - rei sunt alius eorum in longis 619,
 51
 Diariorum primi et secundis appellari ori-
 - nari quomodo possunt 610,24
 Diariorum quatuor ut septimi, ita & sexti in-
 - dex 609,15
 Diariorum quid 126,57, 670,21, 809,40
 Diariorum qui subit morbos nō soluant 609,
 129
 Diariorum septimi absque, quod quarto non
 00

EPITOMES GALENI

potest	613,33	201,	14,	dispositiones rhematicae plures inu-	
dies septimus, optimus decretorius	607,	digestum masculi	155,15	lusioni Roene	3150,24
51. 608,13.	615,14	digestorum ossa cur comarica quidem ex-		dispositiones simplices per se sunt na-	
dies septimus regi assimilatur	609,4	trifecis, iuxta ueri nequaquam: si-		scilicet	690,17
dies sextus pessimus decretorius	607,	ut neq: in lateribus	298,16	Dissecandi ratio	152,12
32.	615,17	299,		Disimilis, inimica et inuicem nociva	
dies sextus quando malignior sit septimo	608,	digestorum quatuor pedis motum obliqui		64,	47
608,	39	musculi qui efficiunt	160,36	Dissonantiam motuum respiratorii cau-	
dies sextus typho assimilatur	609,6	digestorum singulis propriis inest muscu-		se	498,15
dies tertius et quibus qua ratione de-		lus	203,7	Discretio princeps pulvis pars: pluri-	
decernunt	620,19	digestorum tresdones uenerunt	200,3	munq: ad praesegendum conducti	
dies tertius, principum est decernendum		Dignitatem albonis esse primam, secun-		342,	42
aut?	615,14	dum secundaria	213,55	dispositio ad causas corporis caliditate et	
dies uigessimus cur uigessimus primo		Dilatari facile possunt melle omnia		stimulanda	345,46
decernat	621,10	678,	1	dispositio magna quae sit	348,60
dies uigessimus est finis trium septimanarum	613,63	dilatatione arteriarum atrobatur spiritus		dispositio arteriarum unioni et contra-	
dies uigessimus quos morbos induit		606,	15	ditio finem imperceptibilem esse	
621,	24	dilatationis arteriae quoniam, signum est		349,	21
dies uigessimus, decimi quarti est index		septem pulsuum differentias comple-		dispositio arteriae quatuor generales	
619,	43	ctum	536,27	sunt differentiae	586,11
dies uigessimus plures absolute fuisse sa-		dilatationis arteriarum triplicis usus	351,	dispositio ad sergum copiam, creatio	
lutes morborum indicationes	614,	11		931,	56
15		Diversitates corporum sunt tres 510,35		dispositio contractionis arteriarum	
Differentiae interdum accipiuntur pro		Dandum scilicet, qui bene capui, habet		usus	517,44
generibus et speciebus	513,51	879,	35	dispositio spontanea unde accidit	931,
differentiae in uocem pulsuum incidentes,		Diminutio quae motus	734,1	44	
quae sint	519,10	Docet aut alimentorum facultates sola		Disiungenda quae per se, et ex acciden-	
differentiae nomen quibus possit mem-		experientia notae esse	368,10	n dicuntur	58,18
modari	513,17	Diognes Cynicus libenter debet operam		Distributio alimenti quomodo fiat	72,
differentiae nomen unde sit diuina		773,	23	pui sunt	59,14
334,	15	Dioscoridi typho incrementa	266,60	distributio humoris uulox, unde per cer-	
differentiae nullius aliter esse peccit,		Diophanti medicamentum ad suspensa-		pus sunt	748,21
quod per se et sursum consistit		um et podalgiam alius	1287,	distributio ratione miscetur ascri-	
335,	52	7		gentibus medicamenta quatuor di-	
Diffinitum corpore duplici modo	782,	Dispositum singillat Galenus	1019,	stinctioni diuinae 1244,	
31		31.	1109,57	46	
Digestio Alexandri	1182,7	discofides exaditione tradidi historiam		distributio uirtutis quid	145,24
Digestio medicamentis quae sunt	1234,	plantarum	1075,12	Dumio quid	356,44
12		Dispositio medicamentis compositio du-		Dietarum prima finis qui sit	424,63
digestio quae	1168,40. 1206,39	plex, quatuor utraque cruditatibus apta		dietam ac propaetentum mollioris cau-	
digestio ualenter quae	1234,17	459,49.	481,4	sa omnium malorum	645,10
digestio quibus quando utendum	943,5,	Diphryges quos uires habet	1121,33	Dietetica medicamenta quae	1057,60
1182,	49	Dipsaci quales	1077,25	dietetica praesentia, cruditatibus non	
digestio solum quales utendum ad		dipsaci suum uisum incompugnabile	1273,	utilia	459,145
oris inflammationes	1211,23	49		diuresis quid esse debeat	836,2
digestio Asclepiadis uires et compo-		Dispositio omnes unde carperit negli-		Dissipio	22,63
sitio	1182,22	5	643,16	DOCTRINA ad finis notione quon-	
digestio Alexandri uires et compo-		dispositio in studiis plurimum ad ad-		do primum exposita	313,11
sitiones	1182,7	plurimum ad ad-	424,22	destrina definitio utitur Galenus in ar-	
Digestio nimia assidua uentris de-		dispositio quid in principio adhiben-		te medicandi	114,14
clinatione	478,39	da	1224,14	doctrina graui optimam quid	3197
digestio ciborum symptomata, sym-		dispositio in uisum quid sit in principio		doctrina ordinata tres	811,5
ptomatumque casus	686,28	utendum ubi digerere conuenit.		doctrina quae per rerum elementa insti-	
Dignum medium articulum in pede, qui in		1194,	18	tuitur aliis omnibus utilior	444,
sua flectit	160,42	Dispositio efficaciter quae	464,12	80	
dignum singulis consistit tribus ossibus	137,	dispositio quae sunt	1277,18	doctrina, una uoce explicata optima	
46.	197,50	dispositio fortiter, et semper sunt		370,	57
dignum quadrifarium mouendi, quadri-		misenda colluenda	979,47	Dodecadactylon sunt irium secundum	
farium applicat tendones	199,	dispositio uires quando sit augendus		infirmum	150,45
51		817,	15	Dognatice et Rationales uirtutes ratio-	
digestorum aliones omnes per tria ossa		dispositio quae uerbenotum calida		ne	6,9
complectuntur	198,25	sunt, in quibus sit usus conuendens		dognatice omnes contra melio-	
digestorum fictio unde	95,16	114,	11	ditos	8,14
digestorum uisus quales ad quid conducit		Dispositio conuulsiue quae sit	584,	Delictus mendit simul cum salis	
		51		372,	51

316,60. 140 37. 1245,

16

diffinitio epistola cum 1264,

46

diffinitio remedia Andromachi 1: 637

12. Asclepiades 1264,13

diffinitio qui 1263,32

Diffinitio ultra per dicitur 1154,

13

diffinitio medicamentorum congruentia,

cur sunt in dicitur 1169,

33

diffinitio palicorum differentia ibid 5

Diffinitio casuum in dicitur 755,

60

diffinitio remedia Andromachi 1247,

56

diffinitio remedia Asclepiadis ibidem

12

diffinitio est respiratio lesio 489,

43

diffinitio ob refrigeratum calorem natu-

ralis quod 493,16

diffinitio ob solum ardorem produdum,

quod ibid.18

diffinitio simplex quae sit dicitur, et

quae componitur 490,7

E

EEENIS 1078,7

EEENIS MOMIA 708,30

EEENIS curatio 862,29

EEENIS quid 835,47

EEENIS dicitur 108,33

EEENIS maris cura 403,35

EEENIS miris 416,32

EEENIS in puerum 1157,41

EEENIS est febris et febrilis

123,18

educatio optima quibus pariter 435,

34

EFFECTIVUS nullus absoluitur in arti-

bis humanis, nisi cause consequantur

eventus 695,8

efflatio arteriae a frigore abito 250,15

efflatio, inspiratio violenta 312,30

efflatioem quae facit 755,49

efflatioem serpentem quae effluunt

755,50

efflatioem contraria urbens inspiratio

102,42. 110,13

efflatio quid 102,42. 110,13

efflatio quomodo fiat 755,11. 477,

51. 499,1

effluat puris scilicet faciendum est apte

980,18

effluat quae corpora maiorem, et

quae minorem patiuntur 317,22

effluat avertit a puribus principa-

libus ad quodlibet 834,13

effluat molendit in us ulceribus, quae

apertae expurgari non possunt 856,

10

lunae, et 445,6

ELAPHOBOSCOS quomodo

brat

1079,4

elateris

1106,17

elateris

1079,2

elementa animalium propria sunt quae

ducentur 174,7. 183,1

elementa constituntur dicitur ex ma-

teria et qualitatibus 37,17

elementa corporum nostri mundi inter se

patiuntur, ac ita per tota misceantur

17,17. 617,39. 990,4

elementa corporum quae

713,51

1113,6

elementa insunt corporibus facilitate,

non alia 349,62

elementa nec in atriis, nec in aliis partibus

quae vitam offiunt 104,5,48

elementa omnium generabilium et cor-

ruptibilium quae 343,63

elementa omnium sunt aerea, aqua, ignis,

et ignis 24,29. 35,62,32,

1065,7,43

elementa prout sunt in atriis 441,3

elementa quae 41,12

elementa sensibilia sunt similes par-

ter 74,14

elementa siccantia sunt ignis et aerea

419,12

elementa sola absolute dicuntur calida,

frigida et, 41,61

elementa auctum sunt quatuor 102,

64

elementa uno plura, non alteratione ob-

stantia 34,13. 34,63

elementa et principia dicitur 14,21

elementis soli sunt insunt qualitates

36,1

elementorum in se invicem transitus 37,

53

elementorum proprium index non po-

test esse sensus 110,2

elementorum qualitates intereant, anti-

malis perneant 71,82

elementorum singulorum quiddam suum

le in amantiam corporibus repre-

sentat 55,44

elementorum substantiae ad propria re-

vertuntur elementa, animalis per-

neant 17,10

elementorum usus inmoderatus ad inte-

ritum dicit 36,63

elementorum corpus, non est animi

31,26

elementum non potest esse impatiens

34,13

elementum parum multum reperitur 35,

30. 100,8. 12,19,17

elementum quid 33,9. 34,18

elementum, quod corpus dicitur 36,

53

elementum semper aut ex parte corpo-

ri aut apponitur 16,60

elementum si vel unum periret, periret et

animal 36,54

elephantus collucet ut per aethera 983,4

elephantus ut inopia medicamentum eger-

gum

1125,11

elephantus in Germania rarior 983,

6

elephantus quae purgatione congruit

983,8

elephantus 66,11

elephantus ab aethra oritur ibid 703

46

elephantus curatio 114,16

elephantus in Alexandria plurimum

invenitur 983,4

elephantus ut in prodigiosa tanquam

monstrum, ac per eam respirat 318,

23

elephas, qui sui affectus 687,61

708,19

elephas non habet proprie substantiae de-

mentum in aqua et maxime ab illa sibi

aliquid diffundit 363,49

elephas acrimonia deponit 1156,

26

EE MOLLENTIA debent esse em-

plastica 1056,42

emollientia et per aquam quomodo

diffundit 1054,46

emollientia quae 1054,60. 1056,15

emollientia quibus conveniunt 1055,

36

emollientia recentia, praestantiora 1056,

29

emollientibus candidis inter purissimum

quid 1166,13

empedocles opinio resiliunt 116,64

empirici trans dicitur et putantur dicitur de-

bet non 1079,18

empirici cur similia tantum medicantur

ita committunt 1164,14

empirici dicitur athenis dicitur 6,12

empirici methodicis quibus inter se sint

concordes 123,

empirici quomodo utantur transitu ad si-

mile 24,19

empirici sola dicitur experientia 6,7

empirici suae usque dicitur congruunt tres

species 6,19

empiricorum arguenda contra metho-

dicos 84,1

empiricorum ars quid 84,1

empiricorum artem imitatur methodi-

ca non confusio 6,28

empiricorum hylarum inanis 14,1

empiricorum methodicorum in Ratis-

nales obditi 114,4

empiricorum proprie 116,

empirici quae vocandas 84,159

emphatica quae 116,53

emphatica oppositum quale 1057,10

emphaticorum essentia quid 116,5

emphaticorum natura duplex 104,1,42

emphatica rursus sunt per longam cessan-

tem 1152,49

emphatica a kinonibus composita et us-

us 1177,53

emphatica a kinonibus composita et usque ibid.18

emphatica candida, Galeni facilius

1153,14

I N D E X.

1151.
 emplastrum ex chonacilente Asclepiadis
 uires & compositio 1151, 21
 emplastrum ex chonacilente compositio
 1151, 43
 emplastrum ex salicibus compositio & u-
 sus 1177, 43
 emplastrum Macbarianis facultas & com-
 positio Ibid. 15
 emplastrum Moschianis compositio & u-
 sus 1159, 43
 emplastrum pharicinis facultas 1150, 36
 emplastrum pyracani campolina 1159, 21
 emplastrum Serapianis compositio & usus
 1180, 12
 emplastrum Scribonij largi uires & com-
 positio 1175, 10
 emplastrum Thebanonis uires & compo-
 sitio 1159, 44
 emplastrum uiridis Andromachi uires &
 compositio 1177, 63
 emplastrum melinorum & uiridum di-
 fformen 1158, 2
 emplastrum ex caricis 979, 22
 emplastrum ex diuisione ad multa uale
 1177, 5
 emplastrum ex Ladano 1159, 8
 emplastrum Haleri ex suscipe 1177, 32
 emplastrum Hygieni. male usus 1153, 35
 emplastrum melinon Andromachi Ibid.
 10
 emplastrum melinon Heraclidi Ibid.
 emplastrum uiridum Meneii Ibid. 23
 emplastrum melinon Serapianis Ibid.
 25
 emplastrum rufum Galeni Ibid. 54
 Emprothensis quid 716, 18
 Emulgentes uires emplastris 145, 53
 ¶ E N A E M O N habens 1164, 10
 enacum nigrum Heri 1161, 18
 Enardrosus quid 131, 16
 Encantibus 709, 58
 Enterocetes generatio 661, 53
 enterocetes quid uirt 1091, 58
 Enule compositio 1079, 7
 ¶ E P H E M E R A cum habent infe-
 rram ab ulcere originem dicitur 957, 69
 epibromes cui aqua sit intrepidus propi-
 rianda 807, 2
 epibromes cum quibus & cretionibus de-
 sunt 905, 33
 epibromes sunt nulli putredine interce-
 dente 714, 13
 epibromes interdu a sanguine calido
 erantur 796, 44
 epibromes omnes a procatartica causa
 erantur 785, 15
 epibromes superuenientes tumoribus in-
 gerantur, quomodo a putridis diffundant
 784, 28
 epibromes calor est perpetuus fixus
 785, 30
 epibromes a causa 711, 24. 955, 4
 epibromes a causa, contraria sunt ad-
 molendas 957, 19
 epibromes a causa 955, 63. 957, 21
 epibromes a causa accidit cum se-
 dare uirtute 785, 18
 epibromes a causa & uirtute quid
 785, 21
 epibromes a densata cute discernendi 74
 957, 21
 epibromes ex tristitia et salubritate in-
 dicat extrinsecus corporis 956, 47
 epibromes si moritur in putredine quibus
 dignoscatur uirtute 786, 1
 epibromes ex inflammatione inguinum,
 que accidunt 957, 14
 epibromes uirtute ratio conueniens 957, 33
 Epigenes quid 901, 39
 Epididymides in seminatione testiculis
 maxime obstruunt 304, 2
 epididymis que uocatur 112, 10
 epididymis radix ac principium uasorum
 seminalium 114, 45
 Epiglysty musculorum opus 101, 22
 Epiglotidis corpus 246, 22
 epiglotidis fissura & uirtutis 246, 6
 epiglotidis subtilitas magnitudo & fi-
 las 247, 64
 epiglotidis usus Ibid. 54
 epiglotis siue ligula, ad uocem & spi-
 ritus cohibitionem necessaria 246, 3
 Epilepsia aliquando oritur a uentriculo
 741, 59
 epilepsia consistit in cerebro 740, 40
 epilepsia causa 740, 41. 741, 28. 631, 9. 661, 15
 epilepsia obmaxillam uocatur siue ex cru-
 ribus 991, 16
 epilepsia tres differentiæ 744, 33
 epilepsia quid 666, 11. 676, 7. 750, 21
 777, 10. 740, 34. 750, 21
 Epileptici inter uirtus uicia sunt purga-
 ti 1005, 12
 epileptici plerumque melancholici sunt, et
 a comersio 743, 9
 epileptici abstinentiam est a laetitia
 1006, 1
 epileptici que carnes conueniant
 1007, 1
 epileptici qui fructus conueniant
 1006, 19
 epileptici purro quod prandium sit can-
 ueniant Ibid. 6
 epileptici purro uirtus ratio conueniens
 1005, 14
 Epimedi facultas 1079, 45
 Epimedi facies 709, 11
 Epimedi uires 120, 43
 Epiphysis radij & ulne, que committi-
 tur corpori 246, 24
 epiphysis uermi similis 256, 65
 Epiploce 709, 27
 Epiploon quid 179, 14. 22, 123
 Epithymus 1079, 42
 epithymum atram bilem purgat 1071, 14
 14
 Epoxide 332
 Epomidis musculi 313, 12
 Epulides 705, 10
 Epulones que dicuntur primarij, &
 que secundarij 1059, 36
 Epuloticon fons quis 1164, 10
 Epuloticon opere 1121, 61. 1161, 6
 Epuloticon Andromachi 1159, 14
 Epuloticon candidum Telephanti Ibid.
 61
 Epuloticon Critonis ex Ladano 1173, 57
 Epuloticon ex calmia 1159, 14
 ¶ E Q V A N O N recipit semine hominum
 209, 22
 Equi uocatur 194, 15
 Equitatione concitantur uiscera 44, 5
 64
 Equum lictens quibus medentur mor-
 bu 1158, 17
 Equus uelociter leone 149, 54
 ¶ E R A S I S T R A T V S ne minimum
 firmamentum sunt de sanguinis degra-
 datione 981, 10
 Erethismi depressiouis pudendi uirtus,
 necessaria sustinere uirtutis corporis
 generatice, quod a pubis obitus na-
 scatur 304, 33
 Erigeri qualitas 1081, 32
 Erinaei combusti facies 1140, 35
 Erulentio, putrescentia & liquescens
 corpus nostrum, potestatem ducunt
 talia 59, 2
 Erulentio que dicitur cum quere tunc co-
 medentur 37, 18
 Erulentio uocatur species 1048, 38
 Erofienis causa 856, 54. 981, 49
 Erubina 1106, 16
 erubina quibus liquescit leniantur
 1107, 16
 Erubina a dicitur hinc per uires 1259, 30
 Errores circa agrum admissi, producant
 morbum, uel accerant mortem 29, 24
 errores in formatione quoniamque con-
 sistere possunt 832, 11
 errores sunt prout iudicia 115, 50
 error eorum tripliciter accidit 631, 61
 error de minimis communis 419, 12
 Erubina circa agrum cohibent, uirtu-
 tem decetorem duri obstruunt 611, 47
 Erue facies erubina strumatica 1191, 21
 Erue facies que habent uires 60
 Erule, dolichæ & psofili facultates
 415, 8
 Erum, bouem non hominem est alimen-
 tum Ibid. 10
 Erum siue orobus prout est succi cant
 00 nj

gelle lumen crassius thoracis humores
et purg it 377,16
erum solent ariditas 1105,14
Erysip facies 1080,2
Eryngy facies 1081,14
Erysum facies 1080,8
erysimum sifano detritus 377,14
Erysipelas e fluxu crassius bile 704,
19. 708,4. 791,17. 943,51.
970,56. 1301,43
erysipelas a dematofum unde accidit
944, 51
erysipelas pblegmonodes quando acci-
dit 971,1
erysipelas pblegmonosum quod dicitur
707, 61
erysipelas quid 943,66
erysipelas quid a pblegmonoe differt
943, 54
erysipelas quod dicitur 707,47
erysipelas scorbosum unde accidit
944, 55
erysipelas solus cutis est passus 971,7
erysipelas urum, in aliquo ulcere con-
sistens frigidus potus sanatur 899,
50
erysipelati refrigerandi medicamenta li-
dones 944,19
erysipelati generatio 991,14
erysipelatis curatio 917,15. 944, 35.
1101,61. 1190,40
erysipelatis lucentis curatio 1190,50
erysipelatis refrigerandi terminus quo
944, 10
¶ ESCHARAE ingenuis natus
exquidie sternatoris sunt 1115,
4
Escharum quae detrahunt 952,11
Essentia cuiusque particulae quae dicitur
111, 35
essentia cuiusque rei est principium, à quo
ordinatum est ad eandem omnem in
quisitionem 841,44
essentiae proprietates essentiae partis indi-
cium est 774,7. 712,31
essentia rei prius qualitate requiritur
549, 34
essentia singulis accedit ex temperie qua
nunc qualitates primarum 996,59
Esula facies 1092,66
¶ EVACUATIO inaequalis quae fit
1004, 44
evacuatio in humoribus propter naturam
duplex 944,18
evacuacionem quando partes expellat
994, 39
evacuaciones proprie per loca sunt, in
quibus coaccruuntur 891,33
evacuaciones subitae ac multae, quid co-
mune sunt 964,11
evacuaciones modis multiplex 819,10
evacuaciones speciales 813,41
evacuatio corpus quae sunt prius consi-
deranda 971,57
evacuans morbum necessariis portansit

illius tempera universalia 64,43
Eucraton quod dicitur sit 1031,23
Eucraton quid 1031,10
Eucraton quod dicitur 116,61
Euphorby qualitas 1080,35
Euphorby as Ibid. 10,1189,61
euphorby uti cito cunctis 116,4,6.
1207, 59
euphorbum ad piosos tradens facit
1161, 42
euphorbum recens candidus, pallidus
autem inquitur iton 1207,61
euphorbum uetus recensior est insensit
1166, 39
Euphrates in Mesia ait tres fuisse ani-
mae facultates vehementissimas
117, 1
Eusari qui necessarij sunt 49,24.
421, 16
¶ EXACERBATIONIB. quatuor
modis, quod medicamentum confert 715,
47
Exanguia omnia, sanguine praedita fri-
gidiora 4,2,1,13,55
Exanthemata medicamentis resuscitan-
tibus indigent 1115,31
Exasperatio quid 1042,23
exasperatio et irritatio quibus de cau-
sis contingat 661,17
Exardescens inuicem calorem reuoc-
at et dissipationem reddit respiratio-
nem 504,62
Excessus corrigendus per contrarij ex-
cessus resorbantem 465,51. 466, 1.
889,17
excessus dissolunt vires 421,10
excessus immoderatus omnis, emissus in
dubitudine ad aliquid 64,16
Excories metuciosi 116,60
excrationibus pedibus quid confert
1092,60. 1091,10
excrementa alia quibus esse debet 613,
55. 615,23
excrementa alia quibus de causis suppri-
mentur 416,43
excrementa à quibus casu mouentur
680, 29
excrementa cerebri crassiora, per quae
insensibilia excedunt in nasi me-
tus 118,19
excrementa corporis duobus modis au-
cuntur 778,51
excrementa cum interdum citius, interdum
tardius quam oportet à natura ex-
pelluntur 619,57
excrementa cum non plura non parano-
ra, quam pro ratione cibi assump-
ta, excrementa 615,39
excrementa cum nequeat pars una ad al-
iam mittere 801,4
excrementa diuisa in corpore morantia,
computrescent 16,16
excrementa et cernendi ratio 210,24
excrementa fouent colorem propter na-
turam, quemadmodum ignis ignem

799, 34
excrementa hepatica quae dicitur
767, 1
excrementa in singulis membris animae
naturam habent certam propriam
metus 416,14
excrementa in thorace et pulmonibus
deluscentia, expelli transire de-
bet 447,17
excrementa nigra quomodo ab atra bile
differt 701,5
excrementa non trahi ab organo ab-
sque qualitate committit 119,7
excrementa prius similia in urinis, gigni-
tur in urinis 771,23
excrementa pituitosa cernenti diuideri,
incidere, comminari et dissolvere
116, 10
excrementa putrescentia quos afferunt
merces 157,43
excrementa quomodo accruantur cunctis
797, 63
excrementa quibus de causis nobis inuol-
tis cadunt 100,13
excrementa quid indicent 829,7
excrementa sanorum cum fluxu 116,62
excrementa semper et pelluntur à for-
tidioribus inbecilliores partes 119,
49. 48,14. 661,50. 798,10
excrementa à fincra substantia secretis,
quomodo fit 416,21
excrementi subigiosi quomodo prius, et
quomodo minus accrescit 157,15
excrementum mediocritatis immolue du-
plex cause 616,57
excrementum pellens varia organa di-
uisis facultatibus praedita, natura
diffinita 410,3
excrementorum alia propter naturam pla-
res species 615,10
excrementorum color non magnum de-
bet aut ad inferiori virebus indi-
dum dispositionem 615,10
excrementorum copia unde deprehendi-
tur 606,61
excrementorum crassiorum quatuor sunt
differentiae 690,11
excrementorum duo genera 257,150
excrementorum et purgatio à cerebro ex-
pelluntur basit 155,5
excrementorum proprietates in regio mor-
bis considerandi 761,11
excrementorum quantitas respondet ean-
dem solum succorum 566,19
excrementorum speciei partem esse non
indici 717,16
excrementorum suppressio, aut ventris,
aut intestinum 416,60
excrementorum maculatio, omni fidi est
inhibenda 91,1
excrementorum urinis peraugmentum à
sanguine, via generis 686,47
excrementorum aut duplici Ibid. 18
excrementorum autis molendum cunctis
focpi, uacuo et alacris

INDEX.

415.
 exercitatio omnia que exercitatio
 carni 890,50
 exercitatio ad incertum quale non
 sit 635,44
 exercitatio carni non potest, sed nu-
 tus 814,40
 exercitatio hepaticum à dysenteria
 quò distinguendum 769,41
 exercitatio infusit aut qualitate aut
 quantitate 663,49
 exercitatio in primæ carnis generatio-
 ne duplex 850,36
 exercitatio singularum partium quò-
 bus de casu supponitur 417,35
 exercitatio sola quantitate aliturum,
 quid sit 689,43
 exercitatio unum, aut corpus affe-
 ctibus esse obnoxium ostendit 626,
 4
 exercitatio ubi non est, sed in, me-
 dibonem percutiuntur signifi-
 cat 665,50
 exercitatio carnis in utero à subter-
 itis suscitibus excitatur 954,19
 exercitatio carnis quibus requiritur medi-
 camenta 861,52
 exercitatio à cole & usque quomodo distri-
 buenda 778,19
 exercitatio naturalis semper sequitur con-
 cussionem 606,51
 exercitatio critica gravis procedit
 symptomata, ægrius maxime prius
 dano 607,31
 exercitatio involuntarie quid fiat refe-
 rentur 676,53
 exercitatio præsumitur, quæ facili possit
 969,48
 exercitatio que in quibus modis præ-
 cipue expendenda 612,8
 exercitatio que pectore 607,3
 exercitatio in corpore sensum effugit
 356,39
 exercitatio & retentionis prout natu-
 ram, casus 979,1
 exercitatio instrumenta duplicia 101,
 16
 exercitatio quibus modis fiat 931,
 659,42
 exercitatio differtentia 812,50
 exercitatio qui supponitur & qui infer-
 tur partibus debet 467,44
 exercitatio carni, si alit trahitur
 ut, dantur plenitudo, & car-
 nis 459,40, 451,61
 exercitatio coactis facere sunt 113,1,
 16
 exercitatio per profundum dormit 679,
 50
 exercitatio assidue solum & scientiam
 cognitionem concitat 584,33
 exercitatio rati ante cibum administranda
 410,14
 exercitatio excedere modum, & calidum
 corpus 1005,38
 exercitatio in actionem liberalium studiis
 413,6
 exercitatio in particularibus consistit
 900,23
 exercitatio corpus exercitatio ani-
 marum oblectantes nullissime 325,
 55
 exercitatio sunt mediocres 413,17
 exercitatio thoracis sunt diffundit
 nes & uires 445,24
 exercitatio uirescentes caput replent
 1005,40
 exercitatio circa affectionum locorum
 nonnulli tres modi 750,21
 exercitatio commensuratum tempore
 419,29
 exercitatio duplici commoda 491,
 6
 exercitatio forme sensus uires, ut
 de sunt conicienda 466,49
 exercitatio incompressibile incommen-
 surabile 419,33
 exercitatio terminis sit alteratio res-
 piratio 114,3
 exercitatio omnes exercitatio, sicut ca-
 loris augmentum excitat 444,
 19
 exercitatio in omni periodo & ma-
 la 167,50
 exercitatio qualitas 444,3
 exercitatio usus 912,3
 exercitatio paræ sphaera omnes cor-
 poris partes exercitatio 166,16
 exercitatio per totum uires requiritur,
 ut quæ in profectus redant 423,
 31
 exercitatio præparat corpus ad bibe-
 um frigidum 912,3
 exercitatio quando inhibenda 445,34
 exercitatio quæ motus uocatur 411,64
 exercitatio robur auget, ignis soluit
 780,42
 exercitatio uirescentes ex robore uires-
 centes 445,10
 exercitatio quæ uirescentia frigida potu-
 ergit 413,17
 exercitatio laxam quæ debet esse
 446,41
 exercitatio 359,39
 exercitatio corpus quidem ab apolbe-
 rapis uirescentia 447,7
 exercitatio corpus quando laxum
 446,17
 exercitatio carnis 445,19
 exercitatio in uirescentia 114,3
 exercitatio moderata, quando inuident
 pulsus 344,34
 exercitatio muscularum maxime propria,
 quæ 444,42
 exercitatio post eruptionem quæ nulla pro-
 ducit 477,46
 exercitatio quæ uirescentia absque robore
 præterit 445,1
 exercitatio quando præstent cibis & me-
 dicamentis tenentibus 459,60
 exercitatio robusta sine celeritate 444,
 31
 exercitatio uirescentia, & solida & roba-
 sta corpora uirescentia efficiunt 1043,
 16
 exercitatio improprie augetur quidem calidi-
 tas, spiritus aut animalis absumi-
 tur 492,40
 exercitatio uirescentia rationis 444,3
 exercitatio genera 443,54
 exercitatio prima genera tria 412,59,
 444,32
 exercitatio quæritur circa pulcritudinem, et
 quæ uirescentia possint administrari
 444,17
 exercitatio uirescentia 10,62, 443,59
 exercitatio aduocata, alio & uirescentia pri-
 mo soluit, & solida partibus molli-
 fricatione coalescit 419,45
 exercitatio uirescentia cibum meliorare, confer-
 nat corporis temperationem constituit
 acm 405,46
 exercitatio ante prædium mediocritatem, con-
 fert ad sanitatem dandam 406,1
 exercitatio corpus quæ sunt 81,37
 exercitatio quarto gradu etiam uirescent
 1064,37
 exercitatio uirescentia interdundum melius misce-
 la, uirescentia autem oleo aut cerato
 126,5
 exercitatio manifeste refuit balorem
 106,39
 exercitatio plenitudine quando curanda
 966,12
 exercitatio ob prauos succos uirescentis in infi-
 flentis, quando curanda 114,48
 exercitatio à calore curanda 967,8
 exercitatio à uirescentia uirescentia erit,
 curatio 114,53
 exercitatio ex uirescentia puris aut aquæ
 inter eadem uirescentia, curatio 114,
 19
 exercitatio ob animi affectionem ut, ca-
 lido 114,44
 exercitatio ob febrem aut pleuritidem ma-
 gnam, curatio 114,53
 exercitatio ob uirescentiam dolorem, ca-
 lido 114,53
 exercitatio ob uirescentiam præcipue obstru-
 ctionem curatio 114,57
 exercitatio ob uirescentiam curatio
 966,83
 exercitatio ob uirescentiam furore præ-
 cipue 967,14
 exercitatio ob uirescentiam uirescentiam,
 curatio 966,13
 exercitatio præter expectationem ob-
 struere, curatio 967,14
 exercitatio quæ dicitur 769,43
 exercitatio prima uirescentia spiritus carni
 325,61
 exercitatio præcipue 114,64

Expiratio ratione diuerse 1016,33
 experientia aenebodus mittit fornice
 solus sanus, non aut ordine
 841, 60
 experientia falsum inuentorem compro-
 bat 471,45
 experientia medicamentorum facultates
 indicat 1020,47
 experientia quid 11,64
 Expiratio que & quomodo medicamen-
 ta de bonis 1021,12
 Expiratio a somno cur se distendit
 680, 2
 Expiratio confert ad sanguinis expel-
 lendum fuliginem 476,24
 e-piratio cur in somno maior 509,41
 e-piratio est ad hunc remissio Ibid. 14
 e-piratio & sistit in puris excellent
 Ibid. 44
 e-piratio febricitibus qualis 494, 46
 e-piratio frigida, cur mortis nuncia 504, 6
 e-piratio in dormientibus cur magnitudi-
 ne & uoluntate inspirationem ex-
 cedat 491,47
 e-piratio magna simul & tarda in de-
 bilibus accidit 491,47
 e-piratio maxima fit interius musculis
 intercostalibus 101,51
 e-pirationem que faciant 755,47
 e-pirationis aer cur sit per inspirato
 489, 18
 e-pirationis magnae & uolacae cause
 493, 3
 e-pirationis nullas musculi opifex
 101, 19
 e-pirationis species pro causam dif-
 ferentis uarie 492,14
 e-pirationis usus 331,57, 491,24
 e-piratio parua simul & tarda quibus
 fit 493,10
 e-piratio parua simul & uelox 493, 12
 e-piratio quid 312,49
 e-piratio rara simul & magna conti-
 nuamen otificationem signum est, ne-
 dele cossit 504,14
 e-piratio tacita, sonora, quomodo fiat
 643, 41
 Expiratio ex potere quid promouat
 1080, 9
 Expirationes que cruditate significant
 611, 17
 expirationes que per uicem significant,
 expulsiuibus que sunt idonea 101,51
 expulsiu facilius bona 611,24
 Expirationes excrementorum impeditur,
 causa triplex 636,32
 Expirationis alio per uicem qualis 671, 51
 expulsiu & reuolui utri facilius si-
 ni uolui succedit 42,17
 expulsiu uti quando immodice mouat
 617, 39
 Expiratio a non expulsiu quomodo di-

stinguatur 960,49
 Extendentes etiam, mouentur 711,16
 Extensio artiodi sit ab externo tendone
 199, 45
 extensio sit per tendones musculi externi
 96, 52
 extensio tanquam motus instrumenti ani-
 mae 95,59
 Extensio cordis corporibus, uicibusq; orien-
 talibus commoda medicamenta que
 sunt 950,63
 extensio rationis effectus est duplex 306, 21
 extensio reficiendi ratio 951,19
 Extensio ad uicis puritatem facien-
 tia, que sunt 124,2, 60
 extensio autem quidem debet esse cor-
 adit miosa: uicis autem, uel si ab
 quod ostensionis fortissimum, uel si ab
 uicis 1057,18
 extensio leniter que sunt 1135,144
 Extensio quid 681,10
 Extrema plurimum distans utriusq; a me-
 dis ut quoq; gerat 1154,40
 Exuberans emere est uicem 30,7
 Exulcratio omnis ex arabile oris; in-
 sanabilis 704,36
 Exulsa omnia redduntur subsistentia te-
 nueris 1111,35
 Exulsa sit penitus medicus doloribus di-
 stant 313,30

FABA Aegyptia drachma con-
 tinet cum diaphana 1290,27
 faba Aegyptia, nostra est humidi-
 dia, & excrementis 375, 57
 fabe inflationes parui 375,40
 faba 409, 43
 faba graeca continet obolos duos 1190, 16
 Fabam substantia 375,44
 fabam uti 4161,1091,6
 fabis pise proflant 4163
 Facies musculi omnes, acutus a uicis con-
 inguntur respiciunt 374,6
 facies atri inspicit 351,10
 facies unde suos nervos recipit 749, 62
 Faciles a cerebro descendens per ner-
 uos sit ne corpora, en uicorpora,
 Calorem antrig 344,50
 faciles alimentis gerit indicat 39,51
 faciles alimentis deponit qd inter alia
 principia sunt 395,4
 faciles animalis in somno quiescit, pa-
 uialis fortis agit 675,34
 faciles atriene extreme inderula, uel
 aliquis mole butatum oppressa, quos
 elat pulsi 360,24
 faciles atriatrix semitruis singula
 iacti 39,30, 396,12
 faciles atriatrix & motu adest uti qui
 gestant in utero 75,3

faciles bifariam leditur 683,60
 faciles canaliculi in somno se intro re-
 cipit magis 570,21
 faciles distantes arterias a corde fan-
 tem habet 912,7
 faciles duplex, alia felicit & pecca-
 tia 1013,19
 faciles est causa effluuii 697,4
 faciles excurrere quando mouentur
 799, 35
 faciles repulsiu facit crises 606,31
 619, 64
 faciles externi, quibus bebitis in-
 sua 1061,56
 faciles formatrix 74,64
 faciles inuicandi, quibus bebitis in
 sua 1061,58
 faciles mensuram profundit indicat 15, 15
 faciles non indicat remedium 19,27
 faciles omnis consistit in relatione
 74, 5
 faciles prohibet ne accipiat id quod
 requiritur 191,4
 faciles pulsiu a corde insuli arteris
 per ipsam nunciam subsistentia
 501, 30
 faciles quantitate ciborum fropus
 191, 56
 faciles quid 1013,18
 faciles rationis consistit in cerebro
 377, 37
 faciles reuolui in quibus continet 12, 10
 faciles reuolui, drachma & expul-
 siu media intercedere debet 81, 41
 faciles respiria quadruplex 351,26
 faciles uicis per corpus dispersa
 118, 52
 faciles uicis quibus effluuiat
 616, 31
 faciles uicis est libera 496,6
 faciles uicis & neuralis, amandisq;
 unde proficiunt, & ex quibus di-
 gnosia dant inderulitas posui
 567, 59
 faciles uicis quibus negata, & quibus
 uicis inderulitas data 606,7
 faciles uicis cognoscitur 604,60
 601, 29
 faciles aliquid ex uicis dissiluit
 quod alio 1014,4
 faciles expulsiu crescent inderula
 quid accidet 687,46
 faciles inderulitas remou sustinuit
 ner, plurim fuerunt uicis 352, 12
 faciles inuicis, quae natura quae
 effluui, uicis inuicis non est 307, 16
 faciles inderulitas consistit in cor-
 de 337,47
 faciles quae deprimat 587, 12

I N D E X.

- facultates in uitalem salutaria* 514, 17
facile et robusta et plene, dilata et ho-
rari non malis moris fu 491,
 46
facultates alterari ut in animalis,
quos elementares paries 746, 57
facultates animalis quicquid sunt ple-
ris 997, 3
facultates essentia et actus ut differe-
unt 1236, 31
facultates elementares ac prime que
 744, 4
facultates fortes, corpus in suam natu-
ram mutant 81, 10
facultates naturales necessarie ad ui-
tam 77, 34
facultates naturales semper sunt adiu-
uantes naturam 497, 2
facultates naturales sunt quatuor 56,
 20, 652, 45, 676, 19, 1251, 2,
 446, 16
facultates per uniuersa solidiora perme-
ant 700, 10
facultates que proprietates ratione in-
ferunt a morbo de sunt alime 117, 20
facultates quas, que actus habent in se
uero et inordinat 623, 3
facultates que naturam sunt, que ratio-
ne inueniuntur 74, 15
facultates tres diuersas in se habent
 53, 7
facultates ualde et lentum a maximis de-
mentibus et ceteris 589, 5
facultate ualente utrumque pulvis est
per se et in se non potest 163, 44
facultates ualentes magis pulvis pe-
ccat 567, 29
facultates autem, que cordi in se,
quod proprium 127, 10
facultates anisynon naturae 1060, 45
facultatis appetitus effectus 422,
 54
facultatis et ceteris symptomata
 666, 2
facultatis differentie sunt robur et in-
debilitas 51, 11
facultatis essentia cuiusque parit, u-
erum eadem eiusdem parit ut in
mentis consistit 873, 51, 597, 22,
 697, 2, 766, 1, 1012, 26
facultates essentia lesionis proprie-
tas 61, 64
facultates est animalis, motus uelut in-
ter 724, 51
facultates inordinat, quos morbos se-
quantur 694, 61
facultates inordinat immoderata 413,
 14
facultates inducunt experientiam
sentendum est ab ea re, ad quam di-
citur 1012, 12
facultates matris inferentia, sunt
utrum et mascula 712,
 48
facultates nutriti opus assimilatio
- 75, 16, 606, 2
facultates nutriti symptomata 687,
 12
facultates oblescentes diuersae, uariis
pulsibus inaequalitates producant
 503, 2
facultates ualde apud 606, 1
facultatum de ipharumacorum natura
duplici 1060, 16
facultatum corpus nostrum regentium
tria principia 724, 48
facultatum medicamentorum effectus
et gradus differendi sunt 1013, 7
facultatum naturalium ordo 81, 62
facultatum nes dispensationem robur in-
debilitat, ex propriis inducantur
 991, 53
facultatum principia distincta sunt, et
ipsae tamen miscetur in singulis in-
fermentis 606, 18
facultatum singulorum lesiones in be-
ne, que signa indicant 767,
 32
factis sanguine duplex species 708,
 9
facti quid 1215, 10
facti uisum, utque corrupti carum
 81, 18
fagi et uici familiaris 1077,
 56
falterum ex nimis probatissimi facti
 411, 46
falsi nulla comprehensio 914
fames aduersus illis qui mordaces humo-
res colligunt in ore uenerunt 1202,
 61
fames canina 179, 13
 1053, 41
fames cur a calore impetitur 674,
 47
fames quid Ibid. 22
familiaris cuique est animus, aliena au-
tem placet 1046, 32
familiaritates rerum unde oriuntur
 1030, 19
fames eadem 674, 43
fames sensus in conspectu mentis 123,
 43
fames toleranda et cetera 87, 13
fames ualde facit suscipit letum 106,
 6
fames ualde membrana 105, 15, 105,
 20
famines ualde membrana continet humo-
res flammam 106, 1
famines ualde erit ab utroque 124, 47
famines ualde principium uici 105, 61
famines ualde 415, 12
famines ualde tollit fames lentes 275,
 47
famines ualde quidem maxime ad sup-
puratorem premouet: hordaceae ue-
ro differt 979, 12
famines ualde circumspectus quosque
et quosque 448, 7,
- 666, 14
famines ualde, refrigeratio 601, 58
famines ualde, refrigeratio 601, 58
 1212, 14
famines ualde, refrigeratio 412
famines ualde, refrigeratio 651, 47
 891, 49
famines ualde, refrigeratio 597, 63
famines ualde, refrigeratio 810, 53
 807, 27
 952,
 34
 715, 14
 755, 45
 172, 51
 631, 1
 172, 51
 647, 12
 795, 61
 955, 6
 98, 57
 713, 6
 611, 24
 897, 18, 905, 16
 905, 2
 710, 23
 540,
 51
 631, 44
 791, 41
 637, 38
 631, 15
 952, 17
 952, 17

Le portum inflammationem 952,4
 febris ex pituita, ut in aequilium ca-
 loris talis educatur 797,28
 febris belluae ne leuissimum quidem ex-
 tiorum tollant 911,46
 febris belluae occupant solidas corporis
 partes 785,44
 febris belluae quae dicuntur 889,10
 febris belluae quoniam ab initio sunt
 597,27
 febris belluae rarisunt à principio ori-
 tur 599,2
 febris belluae nulla accendit causa
 896,56
 febris belluae post sumptum cibum ex-
 candescere, ex acutiori, æquidit
 718,37
 febris homogenea 791,41
 febris Lypurie 612,7
 febris lypurie et bipale 1014,54
 febris marismodi eo quae infirma mor-
 ti ex parte accidunt 909,4
 febris emaris ardensiussione, pulsus for-
 titur cerebrum 590,51
 febris eructus ob obstructiones meatuum
 791,56
 febris arte et sanguinis permixtione
 in alios humores, maiores exortis pu-
 tridus sunt 790,11
 febris putrefactio 790,42
 febris per circuitum moueri unde contin-
 get 799,36
 febris pestifera à putredine oriuntur
 714,12
 febris pestilentes non paucæ ab initio sunt
 belluae 597,24
 febris pestilentes non urbescentes sunt
 calide 1117,40
 febris, præter bellucas, omnes dupli-
 ci, inaequali constant interpreti 63,
 44
 febris putride 64,56
 febris putride et belluae quae dicun-
 tur 897,10
 febris putride quales pulsus fortiorum
 591,41
 febris putridas causa procacissima nulla
 præcedit 735,49
 febris putridas ex talis diiudicandi ra-
 tio 987,23
 febris, quæ accendunt 781,46
 febris quæ subterrene et pestilens
 ludenda ex decretis die 614,
 61
 febris quæ typis currant 810,11
 febris quartana dissoluit atque bilis ex-
 cretio 611,56
 febris quomodo inter se miscetur
 611,62
 febris quotidianæ à pituitoso oritur mu-
 rare 310,58
 febris quotidiana cur assidue parces co-
 ripiant 632,59
 febris quotidiana non cum rigore, sed
 cum refrigeratione qualem inuadit

611,45
 febris quotidianæ præcipue gignuntur
 hyberno tempore 613,1
 febris quotidianæ quibus naturis sunt sa-
 millares 790,62
 febris scitior quæ dicuntur 889,10
 febris semicrurians, quæ excretionis sol-
 uunt 613,57
 febris sunt affectus uenosi generis
 614,26
 febris synochæ diuersæ sunt à continuis
 640,2
 febris synochæ nullum habent cernitum
 619,7
 febris synochæ quæ dicuntur 897,41
 febris tabida quæ sunt 787,1
 febris tertiana à fluxu producantur bile
 150,60
 febris tertiana quibus naturis sunt fami-
 liari 790,52
 febris synocha detentus quidam absque cibus
 seruari debet 915,1
 febris tabida quando animal laboret
 789,46
 febris bellucas naturæ calide et fe-
 uor à principio corripitur 906,62
 febris bellucas nulla adest assensio
 718,46
 febris bellucas, quibus alie non occupa-
 lentur, balnea quous tempore coque-
 rant 806,57
 febris putrida adest uelox systole
 716,28
 febris putrida post concessionem hu-
 morum, balneum opulenter 806,54
 febris quæ cum alio fluere infestant,
 non opus est illa euacuatione 964,
 2
 febris quartana quæ originem præ-
 stant 791,10
 febris synochis nullas adest circuitus,
 ac proinde neque accessio 718,42
 febris continente detentis, nec balneo nec
 uicino, nec uentribus rarefaciuntibus
 utendum 917,60
 febris nuncque pulsus post cibum dila-
 tatur in magnitudinem et uolucritatem
 789,1
 febris nec in accessione initio, nec in
 ipsius incremento laeuas 910,53
 febris quibus quales artes eligere, præpa-
 rare debemus 901,1
 febris continente à conspitatione rate qualiter sunt
 fricandi et abluendi 890,64
 febris continente ex lassitudine signa 617,
 15
 febris continente pulsibus uicinis semper ad-
 est celeritas 596,20
 febris continente respiratio qualis 492,52
 febris gignende quæ reperiuntur 661,8
 febris caler in synochis quando minuitur,
 aut augeatur 808,1

febris cur non ex aqua contingat comi-
 bus 661,4
 febris à animi affectibus 191,6
 febris à circutatione interdicta 712,
 12
 febris ab assensu producat, curatio 191,
 11
 febris ab inuadenda quando gignatur
 781,9
 febris à conspitatione producat, curatio
 819,49
 febris acuta quibus gigni ex occasione
 possint 614,50
 febris à cute densata 712,18
 febris à diuturna oritur, curatio 899,
 17
 febris à frigore oritur, curatio 891,14
 febris amphomeria, diuturna 629,7
 febris ardens, si superueniat rigor, solid-
 tur 611,11
 febris ardens solutio cum quibus excre-
 tionibus fiat 617,26
 febris continens in quibus gigni non pos-
 sit 898,10
 febris continens dique species et ita-
 ri poterit absque humorum putredine
 892,4
 febris continue quotidiana descriptio
 613,11
 febris continue quartana descriptio
 17
 febris continua quæ dicatur 616,42
 613,11
 febris continua quartana rari reperiuntur
 791,58
 febris diarie propria signa 598,13
 febris epichemæ generatio 64,58
 febris epiala quæ 65,41
 febris ex cute affricta 790,10
 febris ex assensu quomodo oritur
 660,62
 febris ex disingendi frequentia 893,14
 febris ex frigida 790,17
 febris ex insolata 790,14
 febris ex quibus ardens quando nocetur
 611,23
 febris bellucas doloris expertus 64,22
 febris bellucas inuestigatio 718,16
 febris bellucas speciat 911,52
 febris bellucas occupat solidas corporis
 partes 64,17
 febris bellucas quando excutitur 595,
 12
 febris bellucas quando sit expectanda
 907,44
 febris bellucas quæ ratione secundum reli-
 quæ uisera oriuntur 807,38
 febris benivolentis descriptio 614,19
 febris benivolentis non exquisita quæ
 dicatur 795,43
 febris bipale causa 791,60
 febris indicationes 889,51
 febris intermittens quæ dicatur 619,
 11
 febris orta à tristitia 781,11

I N D E X.

- febris pestilens ac letalis causa 596,
 7. 783,13
 febris putride inducit duplex 833,
 34
 febris putride propria signa 598,9
 febris putride propria est calor 599,
 9
 febris putrida quando epidemice succi-
 dat 783,60
 febris quando accendatur 433,43
 febris quando gignatur 819,31
 febris quartana ab atra bile fit 613,18
 febris quartanae curatio 137,27
 febris quartana exposita gignitur ab a-
 tra bile 793,10
 febris quartana maxime oritur in autu-
 mno 613,13
 febris quartana quae diurna 633,26
 febris quatuor febris, aquae frigidae est
 perpetua remedium 918,30
 febris quid 574,26. 716,61. 781,
 31. 907,47. 991,1
 febris quotidiana cum singulis diebus ac-
 cendatur 792,61
 febris quotidiana descriptio lib. 30
 febris quotidiana et tertiana differunt
 612,48
 febris quotidiana solutionem efficit pi-
 nate curatio 618,12
 febris quotidiana fit a pinata 613,19
 febris quotidiana quae diurna 613,19
 febris remedia sunt humectatio et rissi-
 gretia 901,48
 febris requirit nihil rationem frigidam
 atque humidam 893,50
 febris semitertiana et cessio nunquam in
 tegri desistit 719,3
 febris semitertiana ex quibus constat
 715,8
 febris semitertiana maxime insidit in
 aut 719,22
 febris synocha requirit nihil rationem
 tenuissimum 911,6
 febris synocha totus novus status est 613,9,
 34
 febris synocha quae dicitur 788,46,
 915,
 47
 febris tabida a tabe quomodo differat
 787,
 19
 febris tabida indicia quae 787,12
 febris tertiana duplex quando adesse di-
 citur 614,17
 febris tertiana accessiva tempora sex
 o. distribuitur, quatuor reperitur et
 in aliam intermissionem circun-
 dat 717,61
 febris tertiana accessiva quo temporis in-
 tervallo sonatur 792,5
 febris tertiana accessiva ultra duode-
 cim non protrahitur bona 652,
 16
 febris tertiana brevis solutionem quo
 prius indicat lib. 30
 febris tertiana descriptio 717,21
 febris tertiana et quartana mixtae,
 596,
 quatuor coniugationes 794,30
 febris tertiana et quotidiana discrimi-
 nes penes sensum caloris 792,
 47
 febris tertiana exposita descriptio
 631,
 19
 febris tertiana solutionem, exortio bilis
 testatur 638,10
 febris tertiana symptomata 792,1
 febris tertiana ex genere ardentium est
 130,
 61
 febris tertiana oritur a flava bile per cor-
 pus nota 631,30
 febris tertiana pura intra septimum cir-
 cuitum absoluitur 633,43
 febris tertiana quando dicitur 633,26
 febris uterumque, musculosorum interos-
 tium diffundit, perit uox et efflatio
 187,
 60
 febris tertiana correptis quo accessibus
 tempore est potius diurna 632,6
 febris ab humorum putredine et ratione
 tempora quatuor quae 720,7
 febris accessiones quae faciunt lon-
 giores et breviores 792,10
 febris accessibus remissa unde 897,
 49
 febris caloris differentia triplex 781,
 33
 febris causa, nonnunquam sunt aliqui
 affeetus 433,31
 febris collaestionem curatio 914,
 11
 febris complexio et confusio quid
 796,
 17
 febris continens remedia maxima
 duo quae, et quatuor in utendum
 899,
 59
 febris continuam citra accidentia in-
 festantem, curatio 961,10
 febris continuam duplex spectat
 791,
 29
 febris continuam indicia 959,
 66
 febris cum accidentibus infestantem,
 curatio 961,13
 febris diuturna in bilioso tempera-
 mento cum communis omnium, cum
 cuiusque propria actus ratio 891,
 37
 febris differentia ab accidente desum-
 ptis 780,60
 febris differentia a materia cui barri-
 calor penes naturam semper, sunt
 tres 781,5
 febris differentia tres generalissima
 806,
 50
 febris diuturna 851,40
 febris epidemiarum causa et indicia
 636,
 20
 febris exposita ardentium et tertiana,
 nonnunquam discrimen 633,7
 febris genus compositionem, consuetudinem
 dupliciter 51
 febris helicarum duo propria signa
 596,
 15
 febris helicarum notitia ex urina le-
 nestigari nequit 197,12
 febris helicarum nulla fit statim in
 primis diebus, sed in progressu
 637,
 28
 febris intermissionum differentia tres
 791,
 25
 febris intermissionum et continuam
 discrimen 791,19
 febris intermissionum typi singuli, quot
 boris expleantur 809,60
 febris longiora et breviora unde de-
 pendenda 635,48
 febris maxime principales differen-
 tiae, sumuntur ab ipsorum substantia
 780,
 51
 febris mixta ab eorum complicatione
 differt 781,10
 febris mixtionem non ignorabit, qui sin-
 gulas simplicium cognovit 636,
 46
 febris non intermissionum tempore
 peritiam quinq. 718,21
 febris penes differentia 889,26
 febris putridarum differentia 917,
 11
 febris putridarum indicium calor est
 mordax et actus 786,19
 febris putridarum pulsus quatuor lib.
 32
 febris putridarum tria genera 634,
 43
 febris putridarum universae differen-
 tiae simplices sunt sex 796,37
 febris putridarum urinae quatuor 786,
 40
 febris quartanarum signa et sympto-
 mata 633,18
 febris, quae ex locis patribus ac-
 cidit, formam esse compositionem
 635,
 4
 febris quotidianarum indicia 632,46
 febris simplicium tria genera 633,
 46
 febris synocharum curatio et indicia
 ratio 894,48
 febris synocharum differentia tres
 897,
 63
 febris synocharum genus duplex
 lib. 46
 febris synocharum maximam pressu-
 ram quod 898,12
 febris tabidarum proprium est siccitas
 788,59
 febris tertiarum et adtertium di-
 stinguuntur 615,3
 febris tertiarum quartanarum se-
 cundum pulsus discrimen 634,31
 febris tertiarum signa et sympto-
 mata 631,63
 Felicitas quo ratione sumis utitur
 352,
 32
 Felix qualitas 1139,47
 fellis visus sanguinem repugnat a bile

EPITOMES GALENI

117,	3	figura circularis difficillima ad patien-	sibilis omnia sunt leuia	1015,32
Femoris consideratio	158,8	dam	¶ FLAMMA, aer est accensus ibid.	
femoris forma	118,16	figura angularis proprium	44	
femoris motum ad interna, qui masculi	118,16	figura arcuum media, quae requiruntur	flamma à quibus accenditur	485,19
miscentur	158,11	97,	flammae quot modis extinguant possint	
femoris masculi	166,4,3,116,39	figura doloris expertes	485,	31
femoris masculi descendunt ad caput mo-		figura extremae manus quatuor	flamma extinguere sicut sub curatibus	
uente tibiae articulatione praeterita		98,2	medicinalibus	506,19
217,		figura ex quibus media, carci dolore 97,	flamma ignis, non omnino comparanda	
femoris et omnis maximam	118,11	8,	cum dolore animatum	804,6
211,	61	figura extrema, sunt dolorificae	flamma a omni, opus habet aere modera-	
femoris pari suprema pro sede ischi co-		46	ti frigida	485,53
tylen fortior	211,1	figura omnis maximae quae sint	flammularum motus duplex	ibid. 42
femoris structura ad sessiones idonea est		119,	Flammulas extingui à sereno sole	
ibid.	8	119,	1045,	25
femoris auctera glutinandi ratio	1164,	figura rotunda quae infini	Flatum discutunt calefacientia et te-	
46		213,28	nuantia	575,41. 894,25.
Femur circumagente masculi	109,21	figura motus simpliciter media quae fit	978,	5
femur ex trochanteris agentis masculi	ibid.	98,	flatum in ventriculo grauium quae sequen-	
15		figura media cum utriusq; masculi intra-	ter symptomata	689,19
femur intro ad dactylum masculi	109,5	line, affert dolorem	flatus in ventre causa	ibid. 5
Fermentum facultas	1080,66.1103,55.	figura media dolore carens, quomodo	Flatus Boethius	648,21
1164,	18	inuenienda	Flectentes digitis cum magni dupliciter	
Ferrum facultas	1122,15	figura media, dupliciter dicitur	tendentes sunt dati	200,12
ferrum igne malleabile	1178,58	97,59	Flectio utriusq; sit ab interno tendone	
Ferrule us	1098,2	figura media in arcuum motionem quomodo	199,	46
ferrule quomodo attendit ad ossa fradia fir-		seruatur	fieri sit praesente musculo interno	
manda	877,53	figura media in singulis articulis est indol-	96,	31
Ferrus uel firmamentum quid	947,50	lent	Floridum calor aris	47,26
¶ FIBRAE circulares in intestinis loci		figura media quae fiat	Floris aris uires	116,6
tum Cuius	84,54	301,51	Flas flatus quibus habeat facultatem	
fibrae masculorum thoracis interna, le-		figura non simpliciter media quae duplex	1144,	44
uonem habent contrariam externarum		98,	Flas corporis nostri quomodo refusa-	
lacionem	174,28	figura omnis constat aut lineae curuae, ca-	ta	429,18
fibre oblique opisthomeris reuolunt po-		na, aut recta	Flas in bonorum ad dolentem partem	
teritae	85,64	figura portis quid indicet	708,	46
fibre quae quibus adhibitis feriantur		figura partium à quibus causae ueniunt	Flacchides metuum quibus medicamen-	
211,	4	693,	ti pariter	924,19
fibre rectae tradendi gratia sunt uentri-		figura animal tripliciter potest, si recta	Flacio calida in uentriculum quid molia-	
culo	84,49	lineam officia spina cum enervibus	tar	479,17
fibre thoracis musculorum externa quae		210,	flacio frigida in uentriculum quid faciat	
lacionem quomodo si non seruiantur		19	ibid.	19
173,	60	figura rotunda ad patendum difficillima	flacionem tenam oculorum, erossionem	
fibre transversae contrahendi gratia co-		287,	esse reddendam	915
ducunt	84,51	figurarum cuiusq; digiti sex uisibiles	flacionibus arum et oculorum quid au-	
fibrarum altitudo uaria	214,50	circa et praecipuum differentia	311tar	1080,14
fibrarum differentia et usus	219,25	197,	flacioni discutiente quae medicamenta	
fibrarum seruum genus est obliquum		60	conueniunt	977,26
115,	54	figurarum excessus dolorem affert, et	flacionem ostiduae causae	688,63
Fibula	112,61	cur	flacionem ostiduae causae	
fibulae utilitas	215,61	figurarum extremarum eleuam optatum	flacionem ostiduae causae	
fibula extrinsecus tibiae est attensa	ibid.	mutationem, media uero tardum	flacionem ostiduae causae	
57		ibid.	flacionem ostiduae causae	
Ficus maiores congruere sensibus	470,	in fibrarum non simpliciter mediorum	flacionem ostiduae causae	
5		differentia, arum genus semper mu-	flacionem ostiduae causae	
ficus arbor quae habet facultatem		sculorum agit	flacionem ostiduae causae	
1108,	38	figurarum rotunda sole patitur apud	flacionem ostiduae causae	
ficus arida et uiridis facultas	ibid. 26	107,	flacionem ostiduae causae	
ficus et uere ceteris autumnalibus fru-		27	flacionem ostiduae causae	
ctibus praestantiores	409,61	figurarum uarietas conserui ad patendi	flacionem ostiduae causae	
ficus ex acie manna	418,49	difficultatem	flacionem ostiduae causae	
ficusum facultas	380,14	101,39	flacionem ostiduae causae	
fieri per se, et ex accidenti quid	664,	Filulae	flacionem ostiduae causae	
57		107,45	flacionem ostiduae causae	
figura arcuum extrema dolorifica	97,6	Filulae uis	flacionem ostiduae causae	
		1059,62	flacionem ostiduae causae	
		Filulae in articulis, ligamentis	flacionem ostiduae causae	
		fortitudo et ex ea compositis effi-	flacionem ostiduae causae	
		ciis	flacionem ostiduae causae	
		Filulae arae ad quid uis	flacionem ostiduae causae	
		173,57	flacionem ostiduae causae	
		filulae quid	flacionem ostiduae causae	
		707,1	flacionem ostiduae causae	

I N D E X:

- ferrius mare imperfectio, quia frigidi-
 277. 64
 ferrius mafculo humidior & frigidi-
 127.21 350,12
 ferrius vires 109.4.64
 ferrius alium olim etiam in totum exuunt re
 pondebat 389.4.4
 ferrius et de colli faciles 121.6.18.
 127. 49
 ferrius et ceteri facies fimples cum mel-
 le, fubdaci inefpinatione graves hu-
 mores 376.10
 ferrius et fuccos maciliter diuturnis
 doctores affertibus 376.17
 ferrius et uis 376.14.416.14.110.10.
 12. 1183.4.1
 ferrius et de colli oculorum tenfioni
 confert 941.4
 ferrius et grecum non boni fucci est 409.
 37
 ferrius et grecum inter calfacientia legumi-
 na recenfetur 376.26
 ferrius et alium quid maciliter 180.7.1
 ferrius comparatio ad plantas 110.10.
 123. 2
 ferrius, dum à fola natura regitur, nec ar-
 tificiarum nec cordis fimplicione indiget
 123. 63
 ferrius formatio ratio 78.1.115.23
 ferrius ut ferrius uis ubi continen-
 tur 103.37
 ferrius in vitro diffenfatio 239.37
 ferrius non indiget cerebro, & quare
 123. 64
 ferrius nouum menfibus perficitur 12.20.
 779. 52
 ferrius per que uafa diligerit 121.31
 ferrius per que uafa trahit ferrius &
 fanguinem 307.9
 folium malachabii 111.3.
 Formae corporis ofibus fimilis 351.19
 formam naturalem que uident 661.56
 formatio animalis prima, confuit ex fe-
 mine & fanguine menfibus 46.11
 formatrix natura effingit particulas fe-
 cundum animae mores 54.47
 Formidabilia inducunt rigorem 714.
 64
 foribus infunt dentes fortes & multi,
 timidi contra 274.47
 fortius uinum altero, biferian dicitur
 3001. 7
 fortitudo improbus inconfenfus 1.38
 fortitudo minus, non uirtutis efl, diuifus
 praefert 425.13
 fortitudo que tribuitur 355.28
 fortitudo & et per auxilia morbus pro-
 fugit 914.40
 fortuna raro quicquam rectè operatur
 318. 43
 ¶ FRACTURA 22.51
 fractura curatio 876.43
- fracturae quae uis ratio conueniat
 834. 63
 fracturae facies fci callo adueniente
 bidem 39
 fracturae scopus, uisio 876.18
 fractura quod 856.43
 fractura, quod pertinet ad intentionem
 praeterit, efl incurabilis 834.45
 fracturae longae curandi ratio 878.19
 friabilis in mollibus inuenitur 414.
 14.
 friandi epileptici ratio 1005.49
 friandi uifera ratio 446.3
 friatio apotherepauit quem ufun praefi-
 cit 442.31
 friatio dura, confringit: mollis folat, mol-
 la minuit: melioret auget 444.58
 442. 20
 friatio efl certitudo, imbecilliorib. praefi-
 citur corporibus 1005.46
 friatio ex oleo equatilis efl, fucca autè in-
 equatilis 1026.11
 friatio ex hydrateo quare fucci corpori-
 bus maciliter 1028.34
 friatio media inter mollem & durum ad-
 hendenda 447.19
 friatio mollis quid efficit 442.33
 friatione exercitacionibus fubfacientibus
 442. 26
 friationes mediae 440.48
 friationibus uariis attendenda ibid. 10
 friationes ex oleo ufus 1026.6
 friationis naturae poft fomnum adhibi-
 tibus utilitas 446.34
 friationis methodus indicia foni rubor & tu-
 mor 441.14
 friationis praeparatorie finis 441.37
 friationis terminus, quae carnis augenda
 gratia praeflat, fit uirgens humor
 ibid. 20
 friationis uirtutes quae 951.40
 friationem contrarietas alia in friatione
 genere, alia in effeclui quae ab ea praue-
 niunt confut 440.56
 friationem differentiae in uicirfom fex
 ibid. 40
 friationem diuerfam uarij ufus 440.
 35
 friationem praeuia omnia dicuntur refpe-
 ctu collatione 441.38
 friationem menfura in ea quae fit uirtutis
 da 442.49
 friationem particularum coniugationes ad
 uen 441.20
 friationem uiles differentiae car deftin-
 xerit Hippocrates fecundum affe-
 ctuum contrarietatem 441.3
 friatio praeparatoria quomodo admi-
 niftranda 442.35
 friatio prohibet dolores per circulatione ac-
 cidentes, fi diu: uel tres horas ante ac-
 cefum adhibita fit 467.29
 friatio quid efl debet 439.61
 friatio uiciorum alius fomnum 927.28
 friatio uiciorum quibus utilis 454.
- 36
 frigeret extrema per accenfiones unde in-
 tingit 715.8
 frigida applicata, acqifitionem calorem
 mouent 59.6
 frigida cum foporem gignunt 737.3
 frigida potu quando uiciorum 899.15
 frigida potu cum macilentis exangui-
 bus, ut ob id bectius ledat ibidem
 33
 frigida potu intempertius & inno-
 dicitur: quae mala conuertit 890.38
 frigida potu quibus periculofus 885.
 42.
 frigida natatione quando poftumus uis in
 fynochis 918.11
 frigida non à corpore noftro uiciorum,
 fed ipfum uiciorum 88.1
 frigida opportuna exhibenda, quae à fi-
 bri liberet 696.17
 frigida quando fit propinanda in qua lae-
 borant fynochis 916.61.918.8
 frigida quae uiciorum morient
 104.0. 23
 frigida quibus offerenda & quibus non
 899. 43
 frigida omnia alioquin efficit
 714. 2
 frigida mollior organorum cantum-
 da, quae pulfum differentia produci-
 cat 557.15
 frigida fominis et utilitas 398.40
 frigida inmodice caufe 661.8
 frigida aperta 317.20.104.4.121
 frigida, acris inimicum 1161.6
 frigidum nobil promptè comburitur
 220. 25
 frigidum partem craffam, uiciorum
 repellit 1059.36
 frigidum poftlate 61.12
 frigidum quare ratione fit mordax 1039.
 37
 frigidum ubiq. efl debilius, corporum
 692. 35
 frigoris caufae triplex 1073.22
 frigida cum corpore fibrin adferre poftat
 695. 34
 frigus efficit corpus ad motum iners
 717. 2
 Frigus pius madata 277.46
 Frigus catus 279.6
 frigus catus, uoluntarij motus pariceps
 263. 38
 frigus pediculus, fibras habet derifum
 uiciorum tendentes 168.43
 frigus offa car dura fimil & dura
 281. 9
 frigus ad reponendum apertum 423.
 41
 frigus ardore omnes mali foni fucci praefi-
 citur eglefias 409.54
 frigus fugaces corampti, fi diu in uiciorum
 calido harent 379.41
 frigus horari fi coramptor in uiciorum,
 fimilis letidibus uiciorum finit 409.58
 PP

EPITOMES GALENI

fructus durarum ægri feruenter 178,64
 fructus durarum qui dicuntur Ibid. 60
 fructus omnes coquantur & mactentur
 calido 1043,8
 fructus omnes in primo sui ortu sunt ægri
 in 1045,7
 fructus, quibus in medicamentis utitur
 410, 10
 fructus qui sicari non possunt 408,4
 fructus tenuis nihilis ratione apti 417, 34
 fructus utuntur ex terra & aqua glaci-
 bus 55,52
 fructuum arborum facultas 380,24
 fructuum differentie 1043,9
 fructuum qui jaciuntur, & qui moriuntur
 1047, 16
 fructuum supports 1041,65
 fructuum semina, ab ipsius maxime dis-
 dent 373,8
 Promenta que dicuntur 417,22
 ¶ EVLIGNIS item dicuntur, quas
 resistent diffinitur induci
 401, 55
 subigitur in 1097,59
 subigo ex remedia ipsi glaciunt 194, 1034, 15
 Funariae succi, oculorum aciem acut
 1034, 15
 funes ex seminis nascitur 894,53
 Functores et dicitur a corporibus simili-
 bus 847,2
 Functambus aliis que instrumentis sunt
 conuoluerunt 692,17
 Functores causa efficiens 846,62
 Functores laesi, symptomata non meritis
 est 651,56
 Functores lesio, terminus mutationis in-
 iusque parit 642,1
 Functio nullas parit impeditur, illa
 efficiens 691,19
 Functorem omnium causam, aciem 846, 52, 431,20
 Functorem requisitam ad aliam tres
 differentias 605,9
 Fungi 391,12
 Fungi faciles 1097,8
 Fungi sicari non possunt, proinde anni
 in se habere tunc 408,44
 Fungorum eius proculosus 191,13
 Fungorum noxæ, que opidinetur Ibid.
 39
 Fungorum qualitas 406,65
 Furfur aliud deterforia facultatis for-
 nitur 27-3,1055,49
 Furfures capitis a serosis succis oriuntur
 1195, 5
 Furfures capitis curatio Ibid. 11
 Furfures quibus cubiti arteria urbenen-
 ter pulsatur 74,6
 Furunculorum descriptio, curatio & spe-
 cies 123,134
 Firmidus 709,12
 Fuscum Andromachi contra pueritiam
 1108, 58
 Fixata non licet in principio cognoscere

nisi alioquin prospecta morbi spe-
 ciem 613,53
 Furor non hysteria, sed dominatio po-
 tens 14,6
 G
 AGATES quæ vires habeat
 119, 33
 Galatidis vires Ibid. 45
 Galbanus 1115,4
 Galeni constantia 444,54
 Galeni genus clarum 455,15
 Galeni iustitia 646,17
 Galeni in parum reditus 650,3
 Galeni in seruis benignitas 421,56
 Galeni mater uacua 424,17
 Galeni opacitas 425,2
 Galeni palinodia 311,51
 Galeni potius in amari dispositionem ge-
 nere utitur 407,3
 Galeni præceptor fuit Asclæpius Empe-
 ritus 1147,63
 Galeni præparatio 648,4
 Galeni de genio Romæ, non gloriæ, ut
 quo augetur inuictus 648,18
 Galenus à M. Aurelio Imp. magnifice
 commendabatur 651,26
 Galenus de causa epistole factus & de a-
 nimæ substantia dubitat 126,13
 Galenus dormis integrum finem præter-
 fluitum 100,13
 Galenus Eadem Peripeteticus prædicit
 febri quartanæ 616,16
 Galenus Eadem liberat à tribus quar-
 tantis Ibid. 52
 Galenus ex omni regione curat sibi ad-
 ferri omni genera medicamenta 162, 57
 Galenus exoptatissimo talis fuit prædi-
 ctus 651,2
 Galenus infemius patris adducit, stu-
 dium medicinarum 646,3, 805, 36
 Galenus medicamentorum conuoluerunt
 non gratis, natus peritiam regis
 1180,43
 Galenus Maffia sententia de omni-
 potentia Dei relatuatur 27,6
 Galenus nulli librum suum proprium
 nomen præscripsit 81,27
 Galenus patrum Laudes longis videri de-
 creuit 424,14
 Galenus quando ab amari interpetere in-
 mouit præteritum 404,58
 Galenus qua ratione prædixit cadum
 affluum sanguinis suum per na-
 res 652,3
 Galenus qui ratione quondam matronam
 Romæ ex libidine amoris ægroare
 cognovit 648,57
 Galenus sanguinis fluxum acerbentem à
 nare dextra quomodo compescuerit
 652, 31
 Galenus Sexti Antonini seio prædi-
 modum, dicitur, & reditum morbi
 650, 44

galenus athen Rome imperante Marco
 Aurelio Antonino 649,61
 galenus exoptatissimo 465,17
 Galenus vis 1141,10
 Galenia 401,19
 Gallæ facultas 1086,17, 1120,18
 Gallæ nomen unde & facies 1075, 44
 Gallæ nomen in quantum habet 1141, 35
 Gallus perit sanguinis detractum
 995, 74
 Gallorum iure vires 1141,19
 Gallorum iure præsertim signaturam
 præparatum 194,46
 Gallorum utrum ius uentrem subducit,
 caro autem cubet 1051,23
 Gangrene iure 951,52
 Gangrena quid 707,11, 708,14
 911, 43
 Gangrena unde fit 707,17
 Gangrenæ ex multa, in qua ruse de-
 cet fieri, Conuoluerunt Imp. fauces
 Galenus herit 651,18
 Gariu 1144,15
 Garum 393,19
 Gaudet, qui in cere promouitur aciem
 amere flagrant 421,43
 Gaudis naturalis fuisse & animatus
 652, 15
 ¶ GEMINORVM instrumentorum
 usus 355,56
 Genarum processus 274,56
 Genarum quæ nequeant 304,53
 Genarum absoluti, quid dicatur 146,9
 generatio, adu composita 74,27
 generatio masculi & feminæ tribuitur
 temperamento quædam aduacum
 118, 19
 generatorem primum regitatem tra-
 dari ad uentris dominum 375, 60
 generationis annuum corporum ex qua-
 tuor elementis constat 1046,1
 generationis facultatem in quibus nati-
 ra conuertit 297,14
 generantis progressus 74,116
 generantis nati 296,60
 generatio nostri prima unde 140,15
 generatio quibus prout, & quibus posse
 rius conuertit 134,63
 generatio quid dicatur 72,10
 generatio, quis motus 72,45
 generatio dicuntur species 451,8
 Cerebræ facultas 1107,50
 Cerebra ex semine regenerari uix possunt
 111, 29
 Cerebræ omnium faciem partem de-
 bilitate 119,51
 genitalis partes que feminis non con-
 gunt 119,15
 genitalia faciem inter formata sunt,
 sed in utero coloris uerbositate præ-
 pulsari duntaxat 298,16
 genitalia mascula & faciem quæ de-
 frant

I N D E X.

frons 119, 6
 genitalia masculia & feminæ proportio
 ne sibi correspondent 118, 57
 genitalia sensibilia cute 104, 10
 genitalia nervi, uterque utriusque quales
 130, 1
 Genitor & corruptor quæ quatuor qualita-
 tes sunt easque 111, 53
 genituræ principium initium ob genita-
 rum interperationem 175, 58
 genitalia præparationis quod cohibeat
 109, 2
 genitalia rectus contritus descriptio
 113, 1
 genitalia in se ipsos quibus generatio fit
 114, 1
 genitalia 110, 59
 genitalia quæ uocantur 109, 61
 genitalia liberat ab obstruente 107, 5
 49
 Genus articulus tria habet lignamenta
 160, 1
 genus inflammatum coracis 97, 63
 97, 2
 genus inflammatum dolorem magnam leniti-
 bi, hyeme calida, æstate frigida sunt
 adhibenda 97, 13
 genus quatuor regentes quibus prædictis
 succedunt 116, 18
 genus humoris flantes quid diffinit
 119, 1
 Genitorem agrosiles mores Galenus
 docuit 414, 38
 genitalia uerbarum & fraticum 190, 7
 Genitor quæ 805, 15
 Genitrix in quibus uterum 467, 77
 GENITRIX unde acida 751, 49
 Genitor uis 1075, 53
 Genitor quid 159, 63
 Genitor & genitalia faciles 109, 12
 1075
 Genitor uide uerbarum propagatio
 accipit 161, 43
 genitalia inflammata alium lenisunt
 priuatur 1118, 15
 genitalia laxa quid curat 1118, 4
 GLABRA sunt, quæ sunt frigida
 & humida 50, 16
 Glabris uis 109, 16
 gladius erant secundo bebesu 1016, 12
 Glendon penis semper candem magis
 tumorem ferunt 779, 14
 glomeris ligatur nitide 408, 1
 glomeris querne 186, 55
 glomeris quæque crassi sunt 407, 59
 glomeris magnus, 31, 11
 glomeris adhaerens laryngi laxior et
 fungosior 124, 18
 glomeris cor sicut maxime succumbit
 obnoxia 914, 17
 glomeris parvi 110, 19
 glomeris lingue adhaerens 170, 10
 glomeris mæmorum quoniam succum præ-
 bent 407, 42
 glomeris, metis diuidendis subtilibus
 semper infertur 233, 19

698, 27
 glomeris uide 699, 10
 Glomeris uis 1099, 47
 Glomeris generatio 107, 1
 Glomeris in corpore præter naturam ob-
 tentis, quæ sequuntur symptomata
 775
 GLA ciborum ad uentriculum uis
 11
 gula affectus, quæ parte catoplesia ad-
 bibetur 940, 20
 gula affectus duo genera 761, 12
 gula cur totius dupliciter sunt date
 761
 gula externa hinc infertur uis
 deglutitionis 85, 22
 gula exaltata medicamenta esse pos-
 sunt affluens, 119, 12
 gula inflammata indicia 761, 14
 gula per se quæ 686, 3
 gula sunt 85, 18, 761, 51, 940, 14
 gula uis deglutitionis hinc infertur
 85
 gula uentriculi pars prelonga 119, 19
 Quam faciles 1084, 46
 genus & tragacanthæ uis in oculis
 medicamentis 119, 10
 Gurguleni inflammatio quæ consistit
 8
 gurguleni inflammatio remedia seruata
 Archigeni 1117, 25
 gurguleni effectus curatio secundum Hip-
 pocratem 111, 11
 gurguleni succo columelle uis 276, 10
 gurguleni præcisus perit ubi uis, pa-
 tiens & pulmonem refrigerat
 659
 Gurguleni actio ob quam partem efficitur
 corruptione aut uisum 670, 46
 gurguleni infertur a quibus affluens
 671
 gurguleni bene malis effectus qui sunt con-
 ferunt 673, 18
 gurguleni quæ subiacent 1019, 50
 gurguleni quid proprium 890, 14
 gurguleni differens, differens effluens
 non substantia arguit 114, 12
 gurguleni qualitas quæ 1061, 18
 gurguleni sepe percipit 146, 59
 GYMNASIUM artem quæ
 fuerit exerta 101, 12
 gymnastica duabus artibus infertur di-
 uisus 101, 12
 gymnastica 111, 1
 gymnastica legitime actores 101, 12
 Gymnastica 111, 1
 Gymnastica 111, 1

H

HABITU effectum quid dicitur
 146, 5
 Habitudines corporis affectionis
 passus et naturales inueniunt 174, 54
 habitudines corporum quæ sunt facili
 gurguleni infertur frons, & quæ dis-
 111, 1

PP 4

EPITOMES GALENI

fridus 964, 35
Habitus bonus quando dicatur 66, 13
habitus bonus quid 360, 6
habitus bonus qui laudatus 361, 27
habitus bonus saluberrima constitutio 66, 15
habitus bonus similium & dissimilium in quo consistat 354, 31
habitus bonus simpliciter 67, 49
habitus de quibus dicitur 67, 44
habitus non simpliciter bonus ibid. 51
habitus que virtutes accendit 143, 12
habitus simpliciter bonus & ad conseruandam discrepantiam 67, 65
habitus simpliciter bonus ad seruandam peruenire, virtutibus ad affectibus 67, 61
Habitus Romanus consul que auctoritas faciat, mores causas a posterioribus ad anteriora spectantes obindebat autem 276, 57
Hedi bilisus apud 290, 34
Hematis lapis commode oculorum medicamentum misceatur 117, 85
1219, 62
Hematuria vires 110, 45
Hematuria curae sit facultatis 108, 19
Hemodia quid & unde 67, 18, 73, 65
Hemopticus arteria 124, 63
hemopticus & collicis quid conuertat 109, 5
hemopticus medicamentum Carnely 126, 1
hemopticus remedia ab Andronaco scripta 124, 4, 64
hemopticus remedia ab Asclepiade scripta 124, 5, 23
hemopticon curatio 124, 4, 18
Hemorrhagis quibus modis fuit 667, 56
Hemorrhoides aperientes que 105, 32
hemorrhoides capsa aperit 1090, 61
hemorrhoides fluentes suppressi, quorum bonorum atque malorum sunt causas 986, 44
hemorrhoides supprimuntur febri cuticulari: promouitur autem in que in cruribus sunt peruersi 996, 18
hemorrhoidibus aut mensuris suppressis, sanguis est detrahendus 993, 53
hemorrhoidibus remedia Asclepiadis 116, 1
hemorrhoides que dicuntur 703, 63
hemorrhoides & hemorrhoides dominibus iniectionibus 127, 3, 46
Heliocabi facultas 111, 17
Habitus post spiritum tenuissimus 88, 46
Harmonia quid 121, 4
HECTICA cognita, refrigerantia extrinseca adiuuanda cordi 607, 22

heduce ardentibus solent superuenire 786, 63
heduce cui respiratione affligit suum in illis, curatio 807, 47
heduce cum diuersis in que conueniunt, et in quo discrepant 966, 59
heduce expositus nota 808, 8
heduce interdent ab initio inuadunt similes habentes cum ephemeris generantur 787, 7
heduce saepe absque scititate consistit 712, 60
heduce ex septo transfuso ortum dyspnoia & delirium capitis 909, 12
heduce viscerum interdent sunt patride 790, 8
heduce qui ab initio prebentur 789, 12
heducum que dicitur agri, quod non facit curantur 787, 12
heducum ad balneum accedunt nihil inueniunt, nisi in frigida sunt demissa 912, 12
heduci ex septo transfuso quomodo digressantur 909, 13
heduci quomodo sint per quatuor partes balnei transeunt 912, 49
heduci statim sunt refrigerandi cum ratione 912, 31
heduci humidum & frigidum conueniunt nutritionem 913, 7
heducis oribus quodam sit conueniunt 788, 57
heducum uisus ratio 913, 9
Hedera facultas 1087, 49
Hedysari vires 1081, 10
Hedysari succo infusa sagitta letales sunt 1125, 24
Hedysari vis 1112, 61
Hedysari Antrodami compositio & vires 1281, 19
Hemorrhoides quid habeat uim 1081, 35
Hemorrhoides causa 1207, 18
Hemorrhoides curatio ibid. 41
Hemorrhoides descriptio ibid. 16
Hemorrhoides frigide que epulenter 1208, 18
Hemorrhoides inueteratas remedium 1207, 55
Hemorrhoides qui dicuntur 746, 41
Hemina fuit & qualis uinum unius librae Romanae 1153, 10, 1180, 64
Hemina pro unius nouem accepta 1180, 64
Hemorrhoides duplex generationis modus 794, 57
Hemorrhoides adfunt quatuor: conueniunt autem 811, 10
Hemorrhoides aliquando interueniunt ibid. 37
Hemorrhoides consistunt ex bituose pinetis salsis: fides per se totas confusis, uel ex interdum inter se complicatis, quod fieri quod dupliciter potest 634, 29
Hemorrhoides est continua 795, 22

hemorrhoides expositis quomodo consistunt 795, 17
hemorrhoides inuadit cum dicitur 794, 43
hemorrhoides quid ibid. 46
Hemorrhoides quibus magis sit similis 811, 33
Hepar est agreste prout 212, 10
hepar a liene purgatur 704, 45
hepar amplius uisceribus 120, 20
hepar asperum uicem commendatur 391, 31
hepar a quatuor instrumentis purgatur 229, 2
hepar benignum & crasso morbo sanguine 123, 12
hepar calidum & humidum facile corrumpitur morbo a putredine & nitescit humoribus crassis 122, 62
hepar calidum ex sanguine gigni 121, 64
hepar calidum facultatis principium & fides 121, 3, 319, 42
hepar cum poris arteriis induratur 123, 33
hepar & lien si uicino quare opportunitatem 919, 24
hepar & lien similia nutrimenta & medicamenta requirunt 940, 3
hepar induratum sanguini extremum ornatum 127, 58
hepar in prima generatione, inter uia et mundum inuadit, apparet maximum 122, 41
hepar lapidum confert hepaticis 122, 61
hepar quare uisum magis dicitur sit nutrimentum unum, quam ex arteriis 140, 3
hepar quibus inflammatur, atrophica leuatur 516, 3
hepar, vires & testes, crassi sunt fusi 407, 3
hepar uinum sanguinis, & nutrimentis facultatis initium 199, 16, 309, 47
318, 63. 306, 51. 319, 40. 696, 61. 766, 1. 805, 55. 837, 64.
hepar uinis facultatem suppeditat 810, 41
Hepate affectu alteratur totius corporis calor 736, 18
hepate affectu quid exuere solent 767, 64
hepate inflammata, que uine secundas ueniunt 974, 54
hepate ac uinis non infusantes fuisse opus arteriis aut uicibus in prima generatione 306, 61
hepaticis sunt mista ex astrigentibus & relaxantibus 1253, 59
hepatici qui dicuntur 1255, 61
689, 54
hepaticis maligna conueniunt 1215, 18
hepaticis medicamentis ex astrigentibus, quod ad admiscenda, et que armata ad uinum

I N D E X.

- non absterunt 818, 6
 hepatis remedia Andromachi 119, 6, 1
 hepaticum cataplasma 1257, 30
 hepaticus pusillus Ibid. 35
 hepatis nigrescat ex coxis 221, 54
 hepatis obfessio plegione quales chyli
 conuertant 393, 16
 hepatis vitia, sanguinis est generatio
 266, 47
 hepatis affectus quomodo à pleuritide
 differantur 796, 6
 hepatis, aliter atrici laborante facillime,
 o. quibus excrementis excrementa 1255,
 29
 hepatis arteria 221, 40
 hepatis calidi & humidi indicia 822,
 77
 hepatis calidi & siccit indicia Ibid. 17
 hepatis calidi indicia Ibid. 18
 hepaticus & sanguificationalis promoue
 r. gonon utranqueque promouet 321,
 18
 hepatis cataplasmatum misenda sunt a
 stringentia 924, 40
 hepatis causa & gibba, qua partes sunt ut
 curanda 917, 60
 hepatis causa plegione obfessio, uena
 misenda sunt ut inflammantur
 914, 16
 hepatis corpus emolliendibus moderatis
 eget 1198, 15
 hepatis cum ceteris colligata 221, 10
 hepatis erysipelate affecti accidentia
 765, 37
 hepatis & lienis obstruentes que po
 ssimum tollant 1017, 46
 hepatis & utriculi indolentibus
 quid subueniat 1112, 48
 hepatis functiones 1255, 8
 hepatis frigidi & siccit indicia 823, 3
 hepatis frigidi signa 823, 14
 hepatis gibba pars sensus & peris 698,
 18
 hepatis gibba uena habet sunt arteria
 104, 16
 hepatis gibbis inflammatis que ad sint
 symptoma 765, 12
 hepatis humidi & frigidi indicia 823, 2
 hepatis humidi indicia 823, 35
 hepatis induratis, in temperis est cau
 sa 1254, 42
 hepatis in durati curatio 977, 47
 hepatis inflammati curatio 917, 19,
 919, 41
 hepatis inflammationi necessarii ad si
 bris 734, 12
 hepatis in temperantiarum singulari
 quid efficitur tribuuntur 766, 32
 hepatis interperin frigide signa & sym
 ptoma 1255, 40
 hepatis interperin calidam que sym
 ptoma sequuntur 1255, 15
 hepatis interperis per contrarios sunt
 fenecide Ibid. 54
 hepatis languide ad intestini trahentis
 symptoma Ibid. 13
 hepatis morbi unde cognoscantur 827,
 18
 hepatis aeris 121, 38
 hepatis obstruati curatio 117, 44
 hepatis obstruentes filii, que parte eius
 & sunt con gibbis coeunt 1254, 57
 hepatis partes afflictae que regione sunt
 & maculae 1001, 7
 hepatis partes conuexae, quibus excre
 mentis soluentur 618, 50
 hepatis partes, per quas uias, & quibus
 purganda remedia 939, 1 940, 6
 hepatis recrementa expurgantia 874,
 84 339, 3
 hepatis scirrhus inueteratus est infima
 bilis, cum ei succedat necessarii
 drops 765, 65 977, 42
 hepatis siccitatis indicia 811, 39
 hepatis similes testicularis que ad sint sym
 ptoma 765, 41
 hepatis situs 227, 30
 hepatis timore 221, 3
 hepatis uice Ibid. 43
 hepaticus uicem consideratio 114, 33
 Hepatica sit quaeque à priore arida
 794, 13
 hepaticae que sit febris 791, 3
 Heracliti sententia de animo 701, 37
 Heracliti lapsus 775, 16
 ex Herbo, quodam cibi & medicamen
 te calida simul 59, 50
 Herophilus 115, 10 589, 10
 Herpes ab erysipelate quid differat
 953, 46
 herpes depascens 708, 32
 herpes duplex est 845, 18
 herpes eiusdem est generis cum exulera
 te erysipelate 952, 40
 herpes exulens, quidam dicunt 940,
 44
 herpes miliaris unde exoritur Ibidem
 52
 herpes exulens & miliaris à quo huius
 re gignatur 707, 50
 herpes causa Ibid. 48, 791, 17 1360,
 50 952, 42
 herpes curatio 952, 61 973, 12,
 1089, 33 1099, 35 1101, 61
 1102, 18
 herpes exulens curatio 973, 16
 herpes generatio 970, 43
 herpes miliaris descriptio 953, 11
 HIERA Anapatri ad stomachi
 faciens 1250, 44
 Hieracites cuius sit facultas 1118, 18
 hiera cum melle confusa facit 886,
 53
 hiera moderata & ihibita ad quatuor dy
 chmas & tendit 1152, 12
 hiera picea composita 1163, 17
 1149, 36
 hiera picea optimi medicamenti ad ex
 purgandas humores toxicis uentricu
 li infusa, descriptio 1201, 5
 hiera ex alio est infirmis, quod ut lo
 cut corpus purgare possit 1249,
 50
 hiera ex colocythide 1119, 29
 hiera picea duplex 1186, 16
 hiera picea expurgat humores acri de
 met intestinum limbidus 931, 50
 hiera picea menses promouet 907, 13
 hiera picea quibus constat afflicta
 716, 50 749, 19 1201, 10
 1249, 4 1251, 18
 hiera qui picea sit 1201, 12
 Hippocampi ues 1184, 19
 Hippocrates & q. u. uelut 742, 3
 hippocrates ues & aduoluit natu
 ra 1184, 12 76, 15
 hippocrates quidem siccit uelut ab
 oriat 107, 44
 Hippocrate de diebus decretariis senten
 tia 614, 61
 hippocratis de sepium, sibi forma senten
 tia 127, 3
 hippocratis documenta in oculis explana
 ut Galenus 906, 46
 hippocratis grauitas 502, 40
 hippocratis patria temperatissima
 443, 3
 hippocrati Platonicis enonies 127, 33
 Hirsuta sunt, que calida & siccit 101, 19
 Hirsuti cruribus, salutes 51, 10
 hirsuti pedibus, ualde auides 52, 18
 Hirsutis de sepi, cruribus est ad
 mouenda 999, 41
 hirsutis afferendi, dendi, & appo
 nendi Ibid. 13
 hirsutis uelut in sole aut corne
 isferum ore uersum Ibid. 39
 hirsutis natura sunt frigide Ibid. 54
 hirsutis sanguinem carnis tantum ex
 agunt Ibid. 40
 hirsutis ut depauperant intercipi
 unt, praevidenda in corde sunt 999,
 37
 Hirsutis cerebrinis 1174, 11
 hirsutis cineres alios 714, 10
 Hirsutis uelut ab Empiricis expe
 rientiis, & à rationalibus causis 14,
 26
 Hirsutis non suppedicare uicinis 1180,
 14, 12
 hirsutis oreis aut praesentation aut pra
 tritorum 14, 5
 HOMERVS 142, 41
 Hominum ab initio quo patio secundum
 uirtutem formare atq. instituire opor
 tet 314, 14
 homines terre statum 215, 12
 hominibus etiois, que pices sint acrio
 modati 940, 10
 hominibus confusio 17, 12
 homines fortissimos non de dentibus, sed
 uirtute & moribus 223, 10
 homines soli inter animalia terrestria cor
 dationem corpus tribuunt 294, 12
 294, 4

I N D E X.

hydropicis remedia Anthigris 1161.
53
hydropicis emacandi ratio 1072, 63
hydropicis fructus ratio 1261, 61
hydropicis opium medicamen
1247, 14
hydropis aque non potest tanta simul us
uari cura cum deliquit 965.
7
hydropis cause 704, 35. 766, 61.
768, 12
hydropis causa prima, sanguificationis
defectus 745, 7
hydropis curationis scopi tres 984.
17
hydropis tres species 518, 31. 709.
40
hydropis 551, 43
hydropis signi non potest, nisi afficiatur
hepar 706, 1
hydropis quibus occasioibus fiat 73.
40
hydropis singule species quae formen
tur p. diem 579, 1
hydropis augur f. autem, seu pulsus in
suo motu 503, 4, 5
hydropis in hepate 030, 4
hydropis c. p. apoplecticis et epilepsia
coniuncti 245, 4, 5
hydropis aqua argumenta duplicia 248.
52
Hyperemesis vis 1111, 65
Hyperemesis facialis ibid. 57
Hyperemesis, oculi totius circ. instrumenti
est morbus 847, 21
hypochyma semel diffusum punctum,
rursum 954, 57
Hypochymatis transgressio 950, 7
Hypochymis 1320, 17
Hypoglossus ad usum faciens 1243.
55
hypoglossus Diocorides ibid. 33
hypoglossi facies 1114, 65
hypoglossus, ad asserendum gustus,
interceptum motum c. sanguinem re
tinetis 1242, 4
hypoglossus ex quibus conficitur
1240, 50
hypoglossus natus, multaq. usat 1243.
40
hypoglossus quomodo sit accedat
1240, 56
hypoglossus Mibridatis 1241, 39
Hypoplasia, caput concussione lapsus sa
natu 954, 52
Hypoplasialis quae committit
1117, 19
Hypoplasia 1112, 3

I
IACENS si in pedes delabitur, si
quomodo est fundatus et. brevis labo
rans 7110, 10
Iacris acrius quae vires habeat 1113.
Iacris 1265, 1 (15
ICTERICIS videtur omnia ob-

trigo 142, 45. 357, 16
iccar utrius sanguis est emaciat 343.
34
iccanatibus diutius constantiae, quae
emaciat 79, 51
iccanatibus multae 215, 64
iccanatibus secundum intestinum semper re
periri vident 215, 54
iccanatibus naturam, cur infamabile
175, 10
IGNIS genera sunt flamma c. pri
ma 1040, 32
ignis blandi amnis est tenax 1017, 52
ignis maior copia conflatur ad utrumque
nostri generis ramis principium
429, 28
ignis utriusque dissoluit 697, 12
ignis utriusque tenuissimus c. calidissi
mus est, ob idq. facile penetrat
1014, 61
ILEO verbo vestiente stercus emu
nitur 87, 32
Ilium suae tenae, tertium intestinum
115, 57
IMAGINATRICEM non recte
dari 100, 65
Immoderati ad temperiem rebus, pra
immoderatiorem contrariam fit
21, 9
Immoderatiorem videtur non esse 17, 17
Immoderatiorem omne duplex 489, 56
Immodica omnia sunt praeter naturam
514, 19. 811, 28
Immodica rationi animal delictum
431, 68
Immodicum omne subito irritat perma
nat animum, consuetum non tenet
131, 29
Immodicus ab affectibus esse, qui non pra
sentibus sed iam praesentibus non
tenet 331, 12
Immodicus duplex 842, 42
Impatiens sunt coquenda, attrituenda c.
discutenda 1104, 1
Impellere sedum solius stagnationis
non necessitate committit 550, 35
Impetigini aggravi ad cetos congruit
1110, 8
Impetigini congruentia revocanda 1126, 3
12
Impetum posse c. a ratione, c. ab ira
causa morbi 129, 14
Impetum summa quae 215, 6
Implantationes tendunt ad dignas cen
tam c. duodeviginti 2021
Impatiens impatiens est facile 647, 49
Impatiens ad impetum, quare tantum diu
brachia alii sustinet 97, 33
INAEQUALITAS collectiva quae
512, 38. 559, 49. 589, 23
Inaequalitas corporis arteriae esse in una
parte non potest, in diversis potest,
motu duobus 527, 6
Inaequalitas creberrima, raritatis c. rhy

thori in uno pulsu continetur, ex omni-
nibus 329,3
inequalitas in crebritate, variatēq; se-
cundum duos pulsus 329,19
inequalitas intermitens in uno pulsu,
motum praesentem annuntiat 329,19
inequalitas in uno pulsu quando accidit
329,19
inequalitas pulsu ab infusa materia
327,20
inequalitas pulsuum laxis accessiones
quod indicet 329,10
inequalitas quantitatis dilatationi, di-
versas arterie partis occupans 326,48
inequalitas ferratilis pluvitionem ma-
ximam propria 326,15
inequalitas unius pulsu ex latet inter-
dum 329,43
inequalitas unius pulsu, longē est quam
colleimus detrior 329,16
inequalitas ex sua arterie cause
326,4
inequalitatis motus in uno pulsu 321,32
inequalitatis status contrarius diffe-
rentie 326,60
inequalitas inequalis que nominatur
322,19
Inequalitas inequalitatem differentia
321,14
Inanis duplex 418,15
Invidendi facultatem que habetur
414,4
Incidentia quibus esse debeant 304,8,
54
Inclinatione corporis in anteriora, et le-
vitas motus unius 329,10
Inclinatione contritus unius hominibus, ad
apprehenda bona, mala propiusda
72,23
Incantibus qui veniunt 329,45
Incrementum terminum unde possit digressio
62,9
Incrementum morbi 717,8
Incrementum morbi unde consistere oportet
622,17
Incompatibilium in omni genere veteris
et regule preceptor 418,46
Indicatio ab arte, natura, regione, anni
tempore, et flumini, et, quando sumi-
ludo et si similibus habeatur 326,13
Indicatio à facultate sumpta, curationem
inimam 321,46
Indicatio à fobri sumpta, reliqua superior
existit 326,17
Indicatio à particulari sumpta necessariū
324,29
Indicatio à viribus sumpta in plurimū die-
rum febribus, maxime est momenti
321,54
Indicatio à virtute omnium prima sumi-
tur, non locum curationem nos docet
302,21

Indicatio curationis à causa praesente su-
mitur 323,12
Indicatio curationis generalis est uni-
cam, vel contrarias 305,19
Indicatio intermitentium partium omnium co-
muni 326,12
Indicationem conferentem non sumi ab
effluviis 321,6
Indicationes agendum in paucis febri-
bus unde petenda 320,4,53
Indicationes à laborantibus temperari su-
nt, diversam habent rationem ab il-
lis, que ab ulcerum differentis sumi-
tur 321,27
Indicationes febrium à arteriarum et ca-
pum que pluribus diebus affligunt,
unde sumantur 320,31
Indicationes in putridis unde sumantur
321,43
Indicationes medicatrices unde sumantur
320,21
Indicationes morborum corporum sim-
plicium sunt omnia, particulariores 320,43
Indicationes quatuor sumuntur ab effluviis
partibus 320,4,5
Indicationes remedium unde sumantur
324,64
In indicationibus contrariis expenden-
da magnitudo corporis, que ad indica-
tionem conferunt 326,25
Indicationibus curationis una communis,
compositiva sit medicamentum 329,52
Indicationibus inter se pugnantibus, quid
in se ipsi indicationibus sit perpenden-
dum 321,38
Indicationum dignitates sunt estimandae
302,9
Indicatio non primarium fore due differ-
rentia 321,14
Indicatio quando à febre, et quando à fi-
brili causa sumenda sit 320,4,127
Indicatio quod 32,62,84,5
Indicatio remedium à natura partu la-
borantem de sumpta, est simplex
327,47
Indicatio ultra ab effluviis causis in-
frigidanda 321,14
Indicatio utilis nulla, sumitur à causa non
permanente 324,12
Indoles et natura causae, et plenitudo in
puerili etate, dicitur unamquamque ar-
tem naturae suae aptam docendum
321,21
Indoles exemplis validior 302,17
Indoles autem sunt frigida et humida
305,6
Indoles quibus medicamenta conveniunt
327,1
Indolentum naturae medicandi rationes
303,8
Indoles a adhaesione calidus et factis natu-
ris 306,51
Indoles post unam sectionem cum magno
danno quibuscumque 328,30

Indoles, que symptomata inducit 328,7
Indoles ut faciat ut phlogistonem, longum
tempus de faciat ex et quod unum
fieri corpus inuenit 325,13
Indoles et non est febrem simul causa
unam tunc in, et agere non esse usum
paulum 329,13
Indoles longissimum ferunt, quibus cor-
pus crudis facit redolent 327,60
Indoles non esse utendum in casu bilioso
320,42
Indoles non, sed est citis rariis evacuat
327,46
Indoles, privatio citis sit, nec morbi, nec
in, nec post 327,35
Indoles tribuunt, ex epimeris febri res,
de arterie 325,65
Indoles a natura, sed longi tempore, et ad
periodo 328,41
Indoles longis quibus contra dicitur super-
natant 328,25
Indoles sibi laetate nutriendas, donec pri-
mae venae dicitur 414,14
Infantes et gravidi 321,18
Infantes nudaendi ratio triplex 412,46
Infantes natura propius ad nos, de
et triplex 328,17
Infantes ne incident in urbescentes mo-
tus, tunc dicitur 413,10
Infantes quatuor artibus quadripedum
instar gradientes 308,2
Infantes quibus de casu plerum 411,17
Infantes 327
Infantibus a natura naturae robustifi-
cantur, animalis almodum esse inveni-
les 324,13
Infantibus motum triplicem exegita-
runt naturae 412,55
Infantes priusquam involuturi saltem esse
infrigidant 412,17
Infantes aliter, lac et balnea 412,21
Infantis corpus frigidum oleo dulci, id
post longissimum somnum 414,17
Infantis etas habet naturales functio-
nes multo urbescentes, quam reli-
qua etates 411,20
Infantis etas anni ratio 412,15
Infantis olim apud Germanos, prima
edita in lacum, demergenda in fri-
gidum 414,61
Infantis bex omnia recipiunt ornamenta
nec à superioribus 617,8
Infantis etas abentis expellentiū fa-
cultatis causa 417,14
Inflammata ab acibus exasperantur
323,7
Inflammatio calidus est effectus 715,10
Inflammatio crispulata que dicitur
307,64
Inflammatione incipiente, repellentibus
est utendum 1000,26
Inflammationes diversam partem ad-
114

I N D E X. I

- ria symptomata inducunt 574,4.
 inflammationes in alto corpore, cur me-
 dicamentis actura possident, quid
 pro pblegmone natura 940,
 44
 inflammationes non statim in principio
 solvuntur 623,4
 inflammationes omnes curandas cr-
 febri Erasistratus 917,6,4
 inflammationes tria quod sunt 2139,15
 inflammiones quae excretionibus solvantur
 618,1 41
 inflammationes quae febres faciunt ad
 plurimum ex plenitudine sunt 928,
 41
 inflammationes quando se ariscunt
 921,1
 inflammationibus cum his commune est
 immoderata caliditas 970,1
 inflammationibus deorsum tendentibus extra du-
 ritur quae phlegma coarctat 1022,4
 inflammationes ex adu et dno cataplas-
 mata calida et humida 819,5,7
 inflammationes incipiunt, agunt et in-
 solvantur, quae conueniunt phlegmata
 112,2, 3
 inflammationes casu et torione 616,6
 124,7, 15, 25. 970,10. 971,10.
 953,19. 1031,7. 1035,4.
 1180,1. 1210,4,7
 inflammationis et usque una est fluxio
 971, 39
 inflammationis humida multiplex differe-
 rentia 970,15
 inflammationis oris a sanguine indicia
 ibid. 22
 inflammationis prima differentia ibid. 6
 inflammationis tempora quatuor quae
 719, 54
 inflammationis suppurande congruere
 cataplasma et forma triticea, quae in
 oleo et aqua ebullit 972,53
 inflammationem extra uulnus uel con-
 iunctionem contingentem causas
 794, 59
 inflammationem incipientem curatio
 1212, 62
 inflammatio quid 659,65
 inflammatio seu phlegmone quid 9,5
 inflammatio quomodo febris superueniat
 708, 62
 inflammatio ab ardore quomodo differat
 946, 15
 inflammationes inarteriae quomodo curan-
 dae ibid. 15
 inflammationes uiscerum quomodo diffen-
 tur ibid. 22
 inflammationibus quae competunt 1101,13,4
 inflammationem propriam 946,19
 inflammationem repellentia 1216,35
 ingurgitum suppurant febrius forma 935,
 54
 ingurgitum glandulae quomodo produci-
 tur facit 215,63
 ingurgitum inflammatio, ex optimo sen-
 tencie fit 616,30
 ingurgitum cibo distole et syphile
 qualis 509,14
 intusum a natura constitutum, cuius desci-
 plinum a seipso fieri 1159,47
 intusum dilatans arteriae, et contra-
 ctum finis, cur nosstrum sensum effu-
 git 541,51
 intusum inuentiois opimum quod sit
 159, 9
 intusum morbi quod sit 609,37
 717, 5
 intusum arteriarum mini si rigida uisceri-
 bus unum 147,62
 insalubre corpus simpliciter quod sit
 814, 22
 insalubre corpus ut rorae, quod sit ibid.
 25
 insalubria quae dicuntur 813,37
 insalubria signa quae 815,17
 insalubria simpliciter facile a morbositas
 casu superuenit 816,6
 insatietas communiter colliditur in te-
 nibus 168,8
 insatiabilitas fundamentum est omnium
 cupiditatum 426,3
 insensibilia sunt ab omni latere semi-
 per et fractione per quod mobile cor-
 pus moritur 490,11
 infames quae degunt 701,17
 infamia quae, quos homines refrant
 651, 49
 in in omnes consideranda, quorum ratio
 fit habenda 652,56
 ex infamias quod corporis dispositio in
 lectu deprehenditur 652,47
 inspirandi compositae difficultates sunt
 numero quatuor, totidem similes ex-
 pirandi 495,48
 inspiratio expirationi contraria 101,45
 inspiratio expirationis quomodo contin-
 get 1211,18
 inspiratio sui thorace dilatata: expiratio,
 eodem disposito 648,18
 inspiratio in cerebrum ad uitam neces-
 saria 254,50
 inspiratio libera 1212,18
 inspiratio maxima sui exterioris interve-
 stibus muscularibus 102,50
 inspirationem quid efficiat ibid. 47
 inspirationes ab exhausto spiritus quales
 49, 1
 inspirationes augefactionem et decremen-
 tum quales 492,18
 inspirationes ex caloris excessum quales
 ibid. 1
 inspirationes ex immodico frigore, quae
 1212,18
 inspirationes cum expiratione collatio
 495, 55
 inspirationis duplex ratio 677,7
 inspirationis magne et actiois causas
 497, 49
 inspiratio omnis modis 1219,16
 inspirationis praesentium densitas et ut
 locitas sequitur, si facilius robusta sit
 71 494,10
 inspirationis usus 2311,6. 491,22
 inspiratio quid 1212,18
 inspiratio porae simul et actio 497,
 57
 inspiratio sublimis quae sit dicta 755,7
 inspiratio refrigerat uocationem calorem, ca-
 puto eundem purget 508,6
 inspiratio, uoluntaria est actio 351,8
 instrumenta inuentionis sunt duo, ratio
 et experientia 841,49. 849,19
 instrumenta inuentionis rememoranda
 sunt duo 849,19
 instrumenta nota uideantur alicuius duo
 sunt a natura data, ratio et experi-
 entia quorum alterum alterum semper
 indiget ope 1234,46
 instrumenta mutationis seruanda, nota
 751, 50
 instrumenta prima quae dicuntur 657,
 61
 instrumenta quibus omnia inuentionis
 dogmata sunt data, ratio et experientia
 84 13,62
 instrumenta quomodo sunt conueniunt
 573, 46
 instrumenta franda quae dicuntur 654,1
 instrumenta singula germina habent fa-
 cultatem 814,9
 instrumentis functione quando notetur
 653, 28
 instrumentorum exercendis exercen-
 tis dispositionem duplex ratio 229,
 65
 instrumentorum morbi 674,2
 instrumentorum naturalium et anima-
 rum differentiam 710,1
 instrumentorum naturarum singulorum
 duodecim attribuantur symptomata
 666, 47
 instrumentorum singulis inest unica pars
 actus, cui tota actio tribuitur 664,
 21
 instrumentorum uis quomodo inueque-
 li pulsi efficiant 560,34
 instrumentorum uisum uel integritas in
 magnitudine, numero, figura et suis
 conspectu 1214,43
 instrumentorum molle facile dilatur, con-
 tra quid dicitur 556,13
 instrumentum primum unius functionis
 gratia conuenit 17,52
 instrumentorum quid 842,46
 instrumentum unum pluribus elumbi-
 bus sufficit 235,12
 intellectus et memoria ad omnes artes
 necessaria 426,7
 intellectus intelligibilium index est
 352, 57
 intellectus temperiem sequitur 126,51
 intelligentiae parti arduis 70,16
 Intemperantiae frigidae capitis et men-
 tris quomodo iuuantur 480,
 33

EPITOMES GALENI

intemperantia parum sunt esse, que
per contrarias qualitates reducenda
sunt ad modicam tamen 12.4.9.3
intemperantia quando ad melius fuit tra-
ducenda, & quando sic conservan-
da 821.62
intemperantiarum genus est duplex
189. 18
intemperantiarum que magis sunt febri-
bus obnoxie 829.15
intemperantibus cur non sit modendum
992. 25
intemperantia calida frigida sit, aut sem-
per contraria exhibenda 4.75.2
intemperantem quodvis faciles ad pro-
prium naturam reddit, quoniam ad tem-
peramentum epimum 4.71.10
intemperantia sola alteratione sanatur
114. 19
intemperantia equalis & inaequalis disci-
men 62.5
intemperantia calida symptomatica 767.
11
intemperantia differentie 904.9
intemperantia inaequalis differentie natu-
ram esse ceteram corporum sequitur
62. 15
intemperantia sanitatis nota quod 49.13
intemperantia calida & humida maxime
putredinis morbus est obnoxia 194.
62
intemperantia calida & sicca ad febres ex
epidemicas opprobriosa 195.23
intemperantia calida ad ceteram esse sunt
45. 5
intemperantia dolorem inferi 731.63
intemperantia dum sunt in actio, contraria
corrigenda: ut secundum similibus,
dum sibi nocere non possunt 4.7.16
intemperantia equalis cur nulla efficiat da-
lore 679.13
intemperantia est octuplex 1154.47
intemperantia est sanitatis & morbi 49.
52
intemperantia frigida & humida quando
ab inedia iacuat 895.16
intemperantia humida ceterum facillime cu-
ratur 885.49
intemperantia inaequalis, dolores parant
679. 59
intemperantia inaequalis que fit diurna
662. 15
intemperantia inaequalis que dupliciter con-
tingit 61.60
intemperantia morbi que 49.53
intemperantia omnis maxime efficit facili-
tati 677.53
intemperantia omnis, morbus est 667.
46
intemperantia per contraria curanda 818.
21. 915.1
intemperantia primorum membrorum causa,
& quare, 79.42
intemperantia que intra sanitatis fuit can-
sistent, per omnia quod cetera possit

lent per labores aut similia 4.7.19
intemperantia sanitatis que 49.54
intemperantia sicca solidum alii non solidum
partem occupantes, nunquam integrum
sanantur 181.60
intemperantia sicca in aegris est, quod simili-
tudinis 181.7
intemperantia simplices per contrarias qua-
litates curantur 976.16
intemperantia urbens omnis uires detra-
hit 685.10
intemperantia uentris a quibus gignitur
417. 5
intemperantia vitiosa quando seruanda, &
quando distringenda 915.23
intemperantia uita per se dare diu non
possit 4.71.14
intemperantia circa salubre & insalubre,
sunt qualitates & quantitates & igitur
demon 810.14
intemperantia animalium conceptu difficilis-
sima sunt, quoniam caro 4.79.1
intemperantia ob ciborum inopiam aciem
917. 18
intemperantia animalium patitur, nisi eis ad
manere agendi esset, 1016.40
intemperantia modi sunt quatuor 803.63
intemperantia arteriarum periculosus est alius
inaequalitatis ceteris 589.10
intemperantia in pulsibus sit ne naturalis,
an non, quomodo discernenda 652.
36
intemperantia quid nocet 621.4
intemperantia singulare, quarum par-
tium lesiones continentur 957.
27
intemperantia secundum uide mouetur
153. 20
intemperantia serena quid sanet 1121.
12
intemperantia quid sanet 1101.64
intemperantia ad distributionem condita
119. 61
intemperantia crassa sanata sunt facilia terro-
re, difficilia 876.8
intemperantia que nati inuoluta 123.55
intemperantia, naturae inferentia sunt 102.
21
intemperantia nec attrahere nec retinere ne-
cessum est 119.28
intemperantia non indigent tractare facillime
119. 50
intemperantia non trahunt ad uentriculo 771.
45
intemperantia solo duabus consistit partibus, qua-
rum singule ex fibris transuersis con-
stantur 86.4
intemperantia suprema, cibo & potu infusa
difficili curantur 716.53
intemperantia terra, siue hominibus quod uim be-
neant 114.1.43
intemperantia crassi dolor ut distinguenda
712. 10
intemperantia cur duplex sit tamque 180.18.
224.35.102.44. 931.35

intestina dolentibus que opulentia
1031. 47
intestina exacerbatibus per abdomenis in-
dura, quod agendum 875.5
intestina exacerbatibus quomodo succurren-
dum 861.12
intestina inest illi expellendi infusio
638. 50
intestina superioribus uel inferioribus ex-
acerata, quomodo succurrendum
769. 11
intestina aliquo uoluerit quid agendum
876. 5
intestinarum curatio facilius diarum in-
ternarum partium, & cur 704.
34
intestinarum dolorem ubique, signum
aut ad haberi & per seidem uentris me-
dicamentis 973.12
intestinarum doloris causa. 770.11
intestinarum fibrarum plexus circularis
150. 12
intestinarum motus lenitas 894.
21
intestinarum natura & ordo 180.42.
215.50. 770.14
intestinarum ebulatio distributionis pri-
ma salubra 175.27
intestinarum substantia non melius ad
uentriculo differt 123.49
intestinarum uentris que ratione me-
dicandam 869.12
intestinarum utraque tunica uillos habet
transuersos 119.46
intestinarum rectum 178.4
intestinarum rectum quibus inuolutum
101. 11
intestine que propinanda non sunt 861.
38
intestini uel firi facultas 187.43
intestini uel erga sunt duo, ratio & ex
peritentie 989.48
intestina dolet ex acrimonia bilis 424.13
intestina acrimonia uiciorum facillime
424. 11
I R A, caloris iuxta cor est firmus
660. 52
Iracundia nationes que 81.10
iracundia dum illi timor est alimen-
tum, pulsus inaequales efficit 560.6
iracundia ceteris pulsus quod 514.
64
iracundia que superuenit 125.15
iracundia efficit ueluti inuati caloris firmus
560. 3
iracundia uis 475.10
iracundia igitur reddi calorem infusum
71. 11
iracundia ad natura esse tribuit ratio-
nem contra cupiditatem 115.63
iracundia ad uires apud dentem curant
71. 40
iracundia esse alimen- & esse
flum, secundum uarias animae partes
116. 40
iracun-

I N D E X.

Iracundia quibus sit ratiocinanda 341,
 35
 Iracundia quid ibid. 39, 71, 169
 Iracundia se naturaliter habens, opinio-
 nem rationis sequeatur 336, 14
 Iracundia si non auri possit, et cur re-
 primatur à nobis 421, 49
 Ira cur acrius periret 512, 11
 Ira cur pariter excrementa calidiora 681,
 48
 Ira furem refrigerato, prudenter mendi-
 ca somnia 412, 4
 Irascibilis impetus nobis ab infamia dis-
 t. 1. 1. 1.
 Irascibilis deformes ibid. 32
 Ira utinam firmit calor in corde 444,
 24
 Iri agrestis cinis fit facultatis 80, 80, 7
 Iri vel corvini quid 266, 19
 Irrationandum animae partem irratio-
 nales virtutes esse: rationalem au-
 tem, solus ratiocinatrix 314, 40
 Irrigabilis capitis delirii que conse-
 quatur 1104, 31
I S A T I S utraque, quoniam utriusque possidet
 1083, 48
 Isterionem Andromachi 1215, 14
 Isterionem argente, auribus ubi est iustitiam
 ante evocationem corporis 1268, 35
 Isterionem quid proficiat 1083, 1083
 40
 Isterionem cataplasmata 1175, 18
 Isterionem consuetudinem utriusque in cubito
 et nervis 1268, 17
 Isterionem quod indicantem in principio
 conueniunt ibid. 33
 Isterionem à sanguine arte, sessa in poplite
 utriusque curatur 907, 11
 Isterionem raro oritur à sanguine: si autem
 oritur, quomodo curatur 1163, 17
 Isterionem naturalem functionem cohibet
 766, 54
 Isterionem quid et quando accidit 773,
 37
 Isterionem quoniam sit symptoma 690, 17,
 773, 37
 Isterionem Epigoni, ad mala medicamentum utile
 1176, 51
 Isterionem compleretur utriusque et compositio 1175,
 12
 Isterionem ossa 354, 58
 Isterionem compositio, et 1175, 11
 6
I L V C V N D U M, gressu est duplex
 1043, 47
 Isterionem lapidis utriusque 1181, 45
 Isterionem utriusque, infusa vel iustitia,
 perculsa, obliqua, mala, absque,
 firma, tuta, manifestata et bona dura-
 tio 607, 39
 Isterionem morborum diuturnorum ite-
 pus confinium, est animae 619,
 17
 Isterionem differentie acrie 607,
 59

Isterionem quod in morbis infirmitatibus fluctuat
 bus, et complicatis 75, 33
 Isterionem fieri per sensum instrumentum
 et facultates instrumentum interius
 352, 44
 Isterionem maiori ex parte in acrisiis
 fuerit 609, 63
 Isterionem morborum acutiorum ex natura
 diuturnorum, longiorum ex parte fi-
 nerit 617, 1
 Isterionem que in acrisiis sunt, quibus de-
 his sunt tribuenda 610, 10
 Isterionem facti et faciendi cognitio ad
 quod proficiat 614, 54
 Isterionem rerum sensus evocationem atque oc-
 culationem differunt 10, 14
 Isterionem naturalis infirmitas, que con-
 ditione communis infirmitas 352, 36
 Isterionem naturae singulari indicat 433
 Isterionem utriusque differentie, quod diuturnum
 decretorium 707, 49
 Isterionem rerum intellectus persequendum
 unde somnia 10, 18
 Isterionem rerum que ostendunt cogni-
 tionem, unde 10, 20
 Isterionem utriusque consideratio 11, 14
 Isterionem utriusque 143, 11
 Isterionem utriusque consideratio 143, 4
 Isterionem utriusque consideratio 146, 24
 Isterionem utriusque 146, 42
 Isterionem utriusque facies 1109, 17
 Isterionem utriusque facies 1091, 64
 Isterionem utriusque facies 1113, 59
 Isterionem utriusque compositio 464, 34,
 1100, 11
 Isterionem utriusque compositum 400, 69
 Isterionem utriusque 391, 13
 Isterionem utriusque compositum, atque appro-
 prium gallinarum, alium subda-
 cium 416, 35
 Isterionem utriusque proprium 271, 35
 Isterionem utriusque ex symmetria motus tri-
 bus partibus 145, 8
 Isterionem quod patitur percipitur ex analo-
 gismo 32, 61
 Isterionem per indicantem patet 12,
 44
 Isterionem utriusque floridus similis, utrius-
 que, utque baridus canis tangere-
 re 392, 35

K

Kaudusque fuit 1175, 11
 Kaudusque 385, 2
 Kaudusque 385, 6
 Kaudusque, pater utriusque 709, 13
 Kaudusque articulus inferioris malle-
 culi 381, 33
 Kaudusque, contrahi fructus 381, 56
 Kaudusque, infusum quoniam 381, 59
 Kaudusque corpus 381, 59

L

Labdoeides 191, 16
 Labdoeides fuit, quod 112, 13

Labdoeides in digitis 199, 4
 Labdoeides infusum infusum principis
 quoniam 179, 21
 Labdoeides utriusque 399, 12
 Labdoeides motus edo 169, 48, 279, 33
 Labdoeides motus rebus sit à duobus obli-
 quis 279, 40
 Labdoeides motus 93, 48
 Labdoeides musculi unde 168, 38
 Labdoeides nervi 169, 45, 363, 10
 Labdoeides substantia 169, 56, 279, 18
 Labdoeides cibum precedat 418, 54
 Labdoeides in quibus debeat cibum precedere
 474, 56
 Labdoeides animum boni habitus, boni est
 fuit 407, 55
 Labdoeides cum melle somnia non co-
 gnoscat 911, 11
 Labdoeides multum habet substantiam
 rebus 396, 14
 Labdoeides plenum fieri est 112, 12
 Labdoeides quoniam 469, 44
 Labdoeides raro alia in acrisiis cogit
 et cur 396, 6, 466, 49
 Labdoeides sicut est habitus maxime tan-
 tum 883, 28
 Labdoeides solum utriusque rebus, calido-
 re, sit cum totius corporis, faciat
 56
 Labdoeides utriusque, qui acrisiis erodit utriusque
 rebus 112, 55
 Labdoeides modum utriusque habet inter utriusque
 terra 406, 15
 Labdoeides sine melle somnia, peria-
 culum ibid. 32
 Labdoeides quoniam 469, 48
 Labdoeides quoniam plurimum nocet
 391, 13
 Labdoeides angustum latus 112, 49
 Labdoeides cor contrahi nervi 397, 23
 Labdoeides educit somnia 469, 10
 Labdoeides et fenter ex sanguine exadit edo gi-
 gnatur 391, 13, 349, 349
 47, 41, 43
 Labdoeides ex quibus substantia conficit 396, 11
 104, 7, 30
 Labdoeides est sanguis mensura
 300, 50
 Labdoeides recens nata proprium diuturnum
 tum 307, 55, 41, 43
 Labdoeides Cyrenica per se non tantum se
 rebus 576, 0
 Labdoeides non adest, quod non gerunt utriusque
 929, 38
 Labdoeides non gignit, quibus mensis cessat
 tum ibid. 39
 Labdoeides incidit in uterum ingreditur calido-
 rem, tam diu diuturnum contrahit, quod
 tam meli conuenit 104, 7, 19
 Labdoeides ignis, vel ferreus articulus
 quod extrahi debet 395, 60
 Labdoeides nobis semelsum 407,
 49, 112, 68
 Labdoeides tabidi maxime congruum
 870, 4, 881, 14

I N D E X.

lasiando concessoria qualis & quando sentatur	450,14	lasiando condescens	680,12	lasiando, in quibus sit quiete solvenda	451, 43	lasiando interdum lasitudine solvitur ibid.	40	lasiando phlegmonesi unde contrahatur	455, 24	lasiando que phlegmonesi sensum infert, curatur per sanguinis resolutionem usque ad animi deliquium	464,1	lasiando quassans que corpora pluri- mon infestet	451,1	lasiando quid	1005,14	lasiando spontaneis que	455,22	lasiando spualida	450,21	lasiando traxius quando accidit	450,9	lasiando traxius spontaneis que	610,7	lasiando traxius superacui plethorici	455, 23	lasiando ulceroza in que corpora macu- lari cadat	450,28	lasiando ulceroza magis accedit moris, quoniam quiescentibus	610,12	lasiando ulceroza non ex abundantia ne sunt	455,29	lasiando ulceroza que	610,10	Lateritia obsequio durare	987,41	Lateritia dolores inueteratas quid persa- net	1019,60	Lateritia, quid morbus	713,7,842,44	Lateritiosus morbus quando in pulso obse- ratur	58-4,10	Laterum musculorum inuerti Galenus	169, 39- 263,5	Lateris frigida ubi periodicior sit quid calida	453,11	Laterione frigida infertur, medium quanti sufficientis attingit	449,24	Laterionis frigida commoda	449,15	Laterionis frigida morbi unde descendat	40	Laterionis frigida tempora, & gymnasia sunt aptiora	ibid. 17	Lateris solentem uires	1077,3	Lateris uires	1129,65	Lateris inuolutio, & uolunt rebus, atque partibus faciliorem	976,2	Lateris plenus & carochymis adnotat, fluxum ad affectus partes conuoluit	1152, 46	Lateris specieris uarie	1016,66	Lateris ubi sunt, & quando	1056,59	Lateris uires conuoluit uires	9,13	Lateris causa	963,24	Lateris causa epileptici que con- uoluit	1007,25	Lateris, amara frigida, conuoluit sunt difficilia	175,10	Lateris diffinitio tres	1151,42	Lateris rubrica	1115,37	Lateris quid periculis	1027,62	Lateris interdum a carochymis uires,		lateritia effrigitur	1024,40	lateritia per se, ab his, que ex accidenti id faciunt, quatuor indicis distinguan- tur	1024,24	Lateris	159,14,4	Lateris aduersus qui reuertuntur crasso ac melancholice facio	175,30	Lateris his cecidit supprimis uiresum flum- inem corroboratque	175,14	Lateris largius sponte elephantiasmus & ed- eres inducit	275,29	Lateris passus rursus, optimam calidum cadit	ibid. 25	Lateris quibus possit usui esse	ibid. 18	Lateris uiresum interdum bebetat	ibid. 22	Lateris quoniam habent	409,45	Lateris	416,5	Lateris palustis quibus	1112,11	Lateris uiresum solvere & sistere po- test, sed diuersa ratione	381,9	Lateris facultas	1109,6	Lateris & brasica decoctum alium sub- ducere ipsa autem corpora sistere	368, 46	Lateris subtilitas & succus quibatur in ter se contrarium habent	175,20	Lateris natura	394,17	Lateris spiritalis facultas	2092,55	Lateris ossa amara medullis expertia	280, 21	Lateris satura	151,45	Lateris per se causa	682,46	Lateris quid sanis	1003,22	Lateris marinus pulmonem erodit	127,2	Lateris causa	69,57,57,6,50-577, 31- 603,30	Lateris morbus febres sunt tepide	1137, 53	Lateris est effectus contrarios febrem obli	941,19	Lateris, letaliter morbus periculis nisi	576,16	Lateris quid	942,5	Lateris hanc omnia sunt deleteria	122,1	Lateris	45	Lateris antri uires	1004,65	Lateris facultas	ibid. 62	Lateris facultas	1093,2	Lateris expertia obsequia tracta- ribus	238,62	Lateris NOTIDIS sunt tres	1093,31	Lateris uires facultas	ibid. 12	Lateris infertur prudenda qualia	780, 37	Lateris que ratione castigari queat	422, 62	Lateris reddit hominem bellis aggressibus similem	422,67	Lateris confect drachmas nonaginta sex	1154, 12	Lateris conficiunt uires duodecim	1290, 14	Lateris mensuralem olei, continere uires decem ponderales, Galenus experitur		est	118,3	Lateris solida, mensurantur banda	1152, 60	Lateris, monumentum tradidit quidem	370, 52	Lateris de natura satus, dabitur fuisse Hippocratis	121,5	Lateris facultas	1092,56	Lateris excoctos medicamentis sunt ita	2216,57	Lateris medicamentum excoctis	1226,16	Lateris a quibus humoribus gignuntur, & quibus medicamentis deficiunt	125, 20	Lateris uires	2092,54	Lateris remedia Critonis	1226,14	Lateris	175,42,10,4	Lateris affectus inuoluit se sua uires in fini- stra moris uires amularem dignum	996, 18	Lateris aliquando melancholicum succum mi- ti in uentriculum	88,22	Lateris crescit, corpus minimi, & contra- rio	80, 47	Lateris crassum utitur alimento quid breui- or	904, 6	Lateris crasso nutritur sanguine	704,59	Lateris	763,41	Lateris car facili induitur	1159,50	Lateris imbecille, que accidit	80,41	Lateris inflammato, que uires sunt secan- de	974,55	Lateris elaborat melancholicos succos	232, 50	Lateris ac uires obstruunt quid libere	1103, 2	Lateris induratus quid discat	977,28	Lateris	1068,16	Lateris	1069,61	Lateris	1084,12	Lateris	1097,21	Lateris	1100,21	Lateris trahens longitudo, sanguis facili- ter per corpus digeritur	1206,1	Lateris effectus que medicamentis conueniunt	921,21	Lateris arterias multas atque magnas effe- tribus	1223,4	Lateris cur amara asstringentibus misce con- ueniunt	1260,2	Lateris epibemata cataplasmatibus Ascle- piadis	1260,55	Lateris in suis locis reperitur sanguis nisi a melancholice succo	179, 32	Lateris	1218,5	Lateris	1219,22	Lateris opulenti sectionem uires inter an- e mitem & mediam dignum suscitatur	1260,2	Lateris pharma Andromachi	1260,20	Lateris pharma Asclepiadis	1260,37	Lateris pharma optime Archigenis	1260, 40	Lateris malo pertinacis quomodo curaretur idem	1260, 12	Lateris moris	125,15	Lateris ob fluxum differtur curatio	927, 11	Lateris obstruunt medicamentis	922,65
--	--------	---------------------	--------	---	---------	--	----	---------------------------------------	---------	---	-------	--	-------	---------------	---------	-------------------------	--------	-------------------	--------	---------------------------------	-------	---------------------------------	-------	---------------------------------------	---------	--	--------	---	--------	--	--------	-----------------------	--------	---------------------------	--------	--	---------	------------------------	--------------	--	---------	------------------------------------	----------------	--	--------	--	--------	----------------------------	--------	---	----	--	----------	------------------------	--------	---------------	---------	---	-------	---	----------	-------------------------	---------	----------------------------	---------	-------------------------------	------	---------------	--------	---	---------	--	--------	-------------------------	---------	-----------------	---------	------------------------	---------	--------------------------------------	--	----------------------	---------	--	---------	---------	----------	--	--------	---	--------	---	--------	---	----------	---------------------------------	----------	----------------------------------	----------	------------------------	--------	---------	-------	-------------------------	---------	--	-------	------------------	--------	--	---------	---	--------	----------------	--------	-----------------------------	---------	--------------------------------------	---------	----------------	--------	----------------------	--------	--------------------	---------	---------------------------------	-------	---------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------	--	--------	---	--------	--------------	-------	-----------------------------------	-------	---------	----	---------------------	---------	------------------	----------	------------------	--------	--	--------	---------------------------	---------	------------------------	----------	----------------------------------	---------	-------------------------------------	---------	--	--------	--	----------	-----------------------------------	----------	---	--	-----	-------	-----------------------------------	----------	-------------------------------------	---------	--	-------	------------------	---------	---	---------	-------------------------------	---------	--	---------	---------------	---------	--------------------------	---------	---------	-------------	---	---------	---	-------	--	--------	---	--------	----------------------------------	--------	---------	--------	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	---	--------	---------------------------------------	---------	--	---------	-------------------------------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--	--------	--	--------	--	--------	---	--------	--	---------	--	---------	---------	--------	---------	---------	--	--------	---------------------------	---------	----------------------------	---------	----------------------------------	----------	---	----------	---------------	--------	-------------------------------------	---------	--------------------------------	--------

EPITOMES GALENI

Arteris quoniam hepatis vicia, nigritatem reddunt colorem	766,47	Arteris	275,4	Léclatun ex ceteris quam vire habuit	112,5	49
Arteris subulacis	112,60	lingua duo nervorum genera adfuit	310,51	lénatun ex spongia applicitum, ex- terminat partium jactus disjunct	94,6	28
Arteris usus	112,46	lingua duplex	260,37-275,110	li hunc quid	104,66	66
Arteris male affectus, initiat totius corporis colorem	704,38	lingua affectus primarius qui sunt	750,51	q l o b i hortenses	4,626	6
Arteris, meli uolubili est fuerit	407,7	lingua arterie, urinae, et nervi	8,40	Lora petriana quomodo affectus sui in fluitat	614,8	8
Arteris metis, quod elaborari nequit, ad vici- num ventriculum	112,58	251,40. 251,33. 254,20.	251,51	lecti affectu notitia, que ratione Cadruus variationem inuenit	728,64	64
Lienosus cataplasma	118,17	lingua carnis substantia	391,63	lecti ostendunt affectionem	727,43	43
Lienosus eodem que C hepaticus cata- plasmata opusculatur	126,17	lingua constructio	118,63	lectis affectus inueniuntur que sunt neces- saria	734,58	58
Lienosus quid opusculatur	108,757	lingua car plures nervi tribuit	104,6	Locorum affectionum nota unde fun- atur	727,8	8
Lien receptaculum atræ bilis	80,39	19	1046,1046,16	locum affectionem ostendit certius, locum per quem fit excretio	727,57	57
Lien tenuis sanguinis portione nutritur	33,14	lingua duplex, linctu facilius	670,39	locus affectus quid inducit	75,14	14
Lien hepatis	33,14	1046,1046,16	1046,16	locus affectus unde cognoscendus	721,51	51
Licetritia castanea que	770,50	lingua ligamenti inferioris usus	875,57	31. 721,42.	727,46	46
Licetritia castanea	65,64	lingua nervi quid	94,7	locus omnium in corpore diffusissimus	258,49	49
Licetritia quid supponit	297,19	lingua nervus	94,7	locus tepidus sine in aerem arterie	1181,8	8
Lien in alacur lantim per intestina	940,1	lingua musculari motorij à septimo con- gatione	262,50	Legitimus vel archibodius qui si dicuntur	84,8	61
Lien urbe-citissimus potiones tolerat	977,26	lingua nervi sensibili	262,47	Loliq temperata	1067,47	47
Ligamenta	1116,112,31	lingua paralytis	676,52	lolum in urtica maxime reperitur	18	18
Ligamenta articulorum in digito	199,8	lingua voluntarius motus à quibus ner- vis fiat	750,3	Lomentum sabacrum	1124,24	24
Ligamentis quoniam videri videntur que sunt per manu de venter	874,10	lingua usus	251,53	Lombis cum sit facultatis	1094,1	1
Ligamentis fœmori tibiam adnectentia	116,21	lingua gustus sensorium	118,41	Longiori maxime, sunt humidis	473,52	52
Ligamenta gignunt circa masculos mem- branas	92,51	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamenta, membranas, nervi, unde matri- antur	89,31	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamenta oriuntur ab ossibus	874,25	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamenta sunt sensus expertia	874,11	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamenta sunt sensus expertia	874,11	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamentorum affectus aut periculo in- certi	1164,57	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamentorum in corpore triplex usus	155,41	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamentorum usus et constitutio	155,41	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamentum ab affectu transit in os, infestis- simus est, nec potest quicquam moue- re	109,40	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamentum nec sensum nec motum habet cibi ariter ex affectu	212,9	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligamentum quid	92,9	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligula	80,10	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligula consideranda	24,118	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligula facilius	1090,25,1197,9	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Ligula facilius etiam subdant, caro au- tem res cœlestis	393,39	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Limonij facultas	1092,47	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Limonij medicamentum	1190,13	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Lingua ab intus irregularibus accipit ne- ces	145,31	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Lingua à quibus nervis accipit tactum et gustum	749,46	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Lingua conductu plurimum nutritur	275,34	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Lingua car sensum habuit exquisitum	1035,3	lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48
Lingua diuisa serpentinis car ceteris bonis		lingua ut omnem partem mouere liberet	275,8	Lora que ratione vinasior reddatur	1124,48	48

EPITOMES GALENI

manus homini tribuitur a natura pro a-
 mibus defensoris armis simul 194
 44
 manus mellis salis: dunt, capiti acci-
 mediores 44,55
 manus musculi septem 20,119
 manus amicum comprehendit figuram
 196, 9
 manus est organum ante organa 195,
 51
 manus sunt organa sapientia animali con-
 uentionis 194,5
 manus sagenda apta quid non esse de
 bit 54,137
 manus tota 16,64
 manus totius unius due 24,4,4
 manus duplex usus 44,52
 manus motus non omni adione musci-
 lorum fit 95,17
 Marasmus a colluquantiis febribus
 quomodo diffinit 913,65
 Marasmus duplex est 82,52
 Marasmus inuicibilis 912,13
 marasmus quid 101,47,88,65
 marasmus quomodo incipit 787,53
 Marti Aurelii Clementian Galenus re-
 statuit 650,18
 Marti Aurelii dispositionem non fuisse
 febriem, contra quem ceteri incideri,
 deprehendit Galenus 651,1
 Martis nomen unde translatione 575,
 43
 marcor quoniam partem incidit ut plu-
 rimum comitatur 272,16
 Martis Auresia, imp. axis filen Tiber-
 rianus 1270,17
 Marti corpore car nec plantam, nec ali-
 lum animal alit 1040,19
 Martis de tris, faminae singula, ut plu-
 rimum comitatur 113,19, 197,1
 39, 778,14
 Martis mortis aqua cinisio sit 1049,
 19
 Marthy facies 1101,2
 Marthianus columbarius Galeni predi-
 ctiones 646,65
 Maryll puri caratus, cui car detraction
 fuerat 186,1
 Masculinum generationis principium de
 plex 100,39
 masculus gigni in calidiori et fieri il
 peruenit sapientiam in humidiori et
 frigidiore 119,52
 masculus breuiter tempore formatur qui
 formatur et parit 114,25
 masculus formam facies et calidior
 117, 32
 Masseteres musculi 169,62
 Masseteres facies 1095,7,113,118,
 masseteris contraria et 1149,52
 Masseteris alteram corpus sunt quatuor
 363, 21
 masseteris remedium quadruplex genus
 470, 53
 masseteris impetus contrarius cuius affectus

44, 31
 materis species, temperamentum 70,
 42
 materis ingenerabilis, inextinguibilis
 16, 18
 materis prima uelica quatuor elementis
 subiecta est 35,18
 Materis laborante, uelica secunda est in
 melle clo aut popule 712,40
 materibus et paribus que ad materiam
 testiculos pertinet, parum opus fuit
 uelica 303,32
 materis collum cur nervosum ac medio-
 criter durum 296,43
 materis connectiones ad uicinas corpora
 105, 55
 materis motus 297,45
 materis plures sunt sunt numerosos ad-
 ductibus partes 297,7
 materis receptaculorum numero, mani-
 lorum numero et qualis 194,19
 materis similes in homine est genus
 194, 21
 materis tunicae cur in se omne fibrarum
 genus 303,50
 materis uasa 555,47
 materis similes opportunitas 296,
 31, 303,11
 Materis cur uelica tunica consistit 194,41
 Materis fructibus prout in solari ca-
 lone 1044,44
 Matris figura media morientibus acci-
 du 100,15
 maxille inferioris figura extrema et qui-
 bus musculi sunt 106,17
 maxille inferioris musculi 271,1
 maxille inferioris usum consideratio
 134, 32
 maxille inferioris tres partes 168,16
 maxille ossa tris 113,44
 maxille superioris uelica, qua parte in ea
 inferatur 160,61
 maxille superioris ossa nouem 281,37
 maxille superioris iuxta 155,15
 maxilla inferior ex duobus ossibus con-
 flat 170,19
 maxille inferioris nullum procerum surti-
 tur, quatuor nichilominus continet
 280, 45
 maxilla inferior, superius innata, in a-
 nimalibus cunctis propter crocodon,
 et uocatur 161,53
 maxilla homo fortiter est breuissimum
 108, 26
 maxilla inferior circumagentes mu-
 sculi 173,3
 maxilla inferior sutura 111,3
 maxilla superior cur sit distincta maxilla
 110, 56
 Maxilla apertis coqueat poribus bordera-
 tura, sicut magis necessarium implet
 174, 10
 Maxilla et peruenit descendit

303,1
 maxilla cur peris uenerit, secundum 1950-
 ram medium subiecti 295,1
 maxilla partes quibus partibus sunt tri-
 bun ad tractum excreta 437,
 59
 maxilla peruenit ad medium ueniri-
 culum ceteri 293,62
 maxilla femoralis in farnis aperitur
 circa cornu, intra ueniam, uelibus fa-
 men sunt effundunt 115,14
 maxilla et ceterum in testibus sunt,
 implantationes 101,32
 Maxilla animalis calorem perfrigit
 58, 10
 Maxilla facies 226,79
 maxilla medicamentum 57,11
 maxilla gradus rationem superius
 126, 18
 Maxilla methodi principium unde 15,5
 maxilla ratio conuertenda ad effectus
 organum 779,31
 maxilla rationes uariis 360,64, 77,7,
 56
 maxilla tot sunt rationes quoniam maxilla
 idem 846,61, 810,10
 maxilla tota est 926,15
 Maxilla uelica consideratio 144,11
 maxilla in quo genere, ut specie que du-
 tur 421,7
 Maxilla uelica sunt et confere-
 tris 11,19
 maxilla in inflammationes uigentes
 accommodatissimum horum 113,38
 maxilla castorum quale 113,7,7
 maxilla confusum maxilla 114,3
 60
 maxilla contra uicinas fuerit in uen-
 tris tunicae praefundissimum 886,
 41
 maxilla Critonis ex cholecole
 1174, 22
 maxilla diarrhoea 115,11
 maxilla dolor 47,15
 maxilla cura de uelica 1178,64
 maxilla de uelica harmonia de uelica ad
 pus confere 114,1,62
 maxilla de uelica confere: non
 fuit de uelica 462,38
 maxilla de uelica 1177,14
 maxilla ex carie et ceteris, duo sol-
 uuntur apertum 470,10
 maxilla ex carie et ceteris, duo sol-
 uuntur 960,9, 1179,5
 maxilla ex columbis stricte 1167,
 40
 maxilla ex caprobio ad ueniam
 pantheos commodum 1166,47
 maxilla ex uelica confusum 1167,
 47
 maxilla ex pice, uelica ad carie rubell
 moris 194, 11
 maxilla ex populo ad articulares do-
 lores 1157,77
 maxilla ex uelica confusum epilepsia
 com-

Maxilla et peruenit descendit

I N D E X.

- melancholicis termini rerum non natura-
 lum qui 530, 19
 medium in universis substantia confusior
 ex mixto extremorum 44, 9
 medium natura quod sit 355, 38
 medium omne ex contrariis est medium
 10, 5
 medium semper expetitur, confusius in
 relatione ad aliud 411, 33
 medium sit, quia unumquodque extremis est su-
 periorum materia 1019, 12
 Medulla ac adipis sunt medicamenta
 furibus dantes 9, 7, 7
 medulla omnis infensibilis 698, 4
 medulla spinalis membranae 348, 13
 medulla spinalis processus inest porus
 sensibilibus 315, 32
 medulla spinalis tertia tunica 393, 1
 medulla cerebri 1130, 3, 7
 medulla conjungens oculos nutrimentum
 1015, 108, 110, 19, 19
 in Medullam à canis lumbos percipien-
 ter per singula spine ferantur in
 gula infusantur acuta 126, 9
 medulla optum humiditas ac magis succi-
 da 92, 18
 medullarum medulla est optima 1111, 12
 medulla spinalis nervi transierunt, quid
 accidit 119, 118, 21, 15
 medulla spinalis distinguitur in nervos
 quinquaginta octo 217, 13, 119, 8, 26
 medulla spinalis se habet inter tertium &
 quartum nervum, spirantem annu-
 distans confusum 190, 1, 2
 medulla spinalis non potest 393, 17
 medulla spinalis continet nervorum du-
 rum primum 363, 19
 medulla spinalis erit à cerebro 348, 11
 medulla spinalis quale prebetur corpori
 alacritatem 194, 63
 medulla spinalis velut truncus arboris
 252, 44, 309, 58
 medullas respondentis ratio quae 1116, 17
 mendo officium, non iurica, pendet à
 voluntate: quomodoque deinde
 mitem, non infusuram 772, 61
 Mel 403, 60
 Mel compitum in tritico 378, 21
 Melancholia causa 74, 31
 melancholia hypochondriacae à humida
 lo erit, signa 743, 12
 melancholia hypochondriacae causa
 74, 1, 46
 melancholia hypochondriacae sympto-
 mata & signa 764, 18
 melancholia hypochondriacae quae 743, 17
 melancholiam recurren quae ratione Cla-
 usus curat 744, 16
 melancholia vnde 69, 56
 melancholice alienationes unde orian-
 tur 683, 19
 melancholici qui ciborum auditum sunt
 762, 52
 melancholicorum merces 703, 11
 melancholicum excrementum in ueni-
 culum excrevit 116, 6, 4
 melancholicus sanguis in quibus habita-
 tor in quibus amittit 743, 4, 4
 melancholicus pueri qui dixerat 704, 31
 Melanchria vires 1183, 31
 Melanchria 703, 11
 mel cas matori sit utile 807, 17
 mel cum lacte confert mentis siccum
 pensat refrigerat 114, 58
 mel cur in calidis corporibus cito verti-
 tur in bilem frigidum autem accrescit
 densum sit 403, 17
 mel bectis immiscuit 913, 22
 Melchior quid 707, 5
 Melioratio 403, 15
 melioratione esse aptum finem conglutina-
 do 980, 46
 melioratione quando excretionem exciet
 1169, 19
 Melioli decolorum 1119, 59
 meliolum quoniam habeat siccum 1095, 27
 mel in florentibus uritur in bilem 79, 6
 mel in sensibus uritur in sanguinem
 791
 Melion Lucy præceptoris Galeni
 121, 1, 8
 Melius vires 1119, 48
 mel largus sumptum, neminem provocat
 403, 24
 Melle corrigere placentarium praeclat
 469, 19
 mellis armonia quomodo retinetur
 401, 11
 mellis coctis munda uritur ibidem
 20
 mellis crudi facultas Ibid 17
 mellis facultas 1095, 11, 1116, 19
 mellis materiam veri esse congenitam
 401, 1
 mellis optimi aetas 760, 18
 mellis idem quatuor frigoris aut reci-
 pendus in succibus a capis in asse-
 ram arctam 143, 6
 mel longa coctura amarum efficitur
 791
 mel maxime extergit 1135, 41
 mel nihil ut se eura corpus tenentur bilis
 78, 1
 mel non patrefcit patrefciturque quid
 maxime congruit 1176, 45
 mel omne adfacit, atque in corporibus ca-
 lidis bectit 411, 43
 Melopossum natura & facultas
 579, 80
 mel opacum quod sit 881, 44
 1280, 50
 mel optimum ut brevissimo tempore co-
 quatur, ita maximum spiritum evomit
 460, 60
 mel plusculum igitur adnotum, amarat
 1047, 19
 mel pifane adethum, incommodum be-
 panis & lincis afficitur 451, 46
 mel quando pifane misceatur 415, 44
 mel quibus confertur & quibus non sic,
 1, 17, 15, 4, 3, 10, 1047, 16
 mel refidum & arctum 403, 64
 mel succum igitur confusum tenuissimum
 418, 44
 mel temporis spacio amarefcit 1047, 79
 16
 melabile densum 403, 4
 mel veridum in sanguinem, postulat na-
 turam & arctum frigidum 79, 16
 mel usum ex eo amarat quod
 tempore cura coctum patitur
 1231, 31
 mel non est gravior tertia parte 1191, 15
 Membra corporis extrema minus alent,
 sed promptius decedunt 101, 14
 membra infestior ab una forma sunt,
 excrevendo imbecilla 406, 5
 membranae costarum cingens duplex 112, 1
 membranae quare usum oculis cordis
 applicata 83, 10
 membranae ibidem substantia
 176, 8
 membrana ex qua seminis parte gignat
 tur 108, 13
 membrana in utero semini obducitur
 107, 43
 membranae cerebri consideratio 191, 11
 membrarum dolores sunt Lati ac aqua-
 les 73, 51
 Membratosa omnia ex semine oriuntur
 116, 25
 Membris nullis arte conciliandis dices
 817, 44
 membrum naturalium oris 11, 113
 membrum principalem necessitudo
 564, 16
 membrum mortificatione quatuor sit ad-
 fundendum 98, 13
 Memoria oblesca, causa 713, 10, 18
 719, 18
 memoria et oculo refinitivo, quae sunt
 consideranda 711, 13
 Memula imbecillitas, omnibus melioris
 310, 39
 Memigen terribi valorem, quae con-
 glutinant 1101, 16
 meningis crassae partes omnes adhaere-
 sunt & abstrahit in otalem munit
 191, 45
 meningis crassae nles 355, 19, 359, 46
 meningis curanda siopi unde prescri-
 bantur 1101, 18

morbus in magnitudine qui sit 659,16
 morbus in numero duplex, cuius unaque
 differentia bifariam scinditur 658,
 62
 morbus instrumentalis dupliciter accidit
 ibid. 39
 morbus instrumentalis quadruplex
 847, 39
 morbus nunquam solvitur nisi convales-
 centis signa in excrementis praecesserint
 29, 52
 morbus omnis eandem sibi perpetua-
 tur et effectum sortitur 725,1
 morbus omnis alius 64,12
 morbus privatus communiter quid dica-
 tur 616,16
 morbus quid 410,62, 610,19 653,
 32,664,14, 725,45, 843,16,
 844,1, 848,19
 morbus qui distinguitur sit a singulari
 partem unam 24,54
 morbus, quomodo sit immoderatus 657,
 17
 morbus simpliciter acutus qui dicatur
 616, 39
 morbus, symptomatum causa est 26,9
 morbus unde cognoscitur 604,59
 Morbida dicitur omnia sunt calida
 1017, 58
 morbida nimia sunt temeraria, si parum
 facultatem continent 312,16
 Morbida et dysenteria, biliosa et
 cacodynia 216,55
 Morbida et alia sunt facultate calida,
 alia frigida 1019,66
 Morbida quae volent 1040,51
 morbi aliterius cibum qui sunt 1014,
 10
 morbus quibus saporibus sit commu-
 nis 1047,53
 Moris et quomodo expendendi 496,
 22
 moris animi quae corrumpant 432,16
 moris coequebantur ex passionibus 71,
 22
 moris pietatis sequentes ergantur natu-
 ram ibid. 13
 moris redduntur prodi a recta ratione
 412,12
 moris sunt duplex, cuncti et naturales
 813, 13
 moris abscissi in accipiendi principia,
 quibus contingat 641,61
 moris cum nemo posuit in totum morbi de-
 terminatione, nisi ab errorum commu-
 sionem 64,10, 64,12
 moris repetit quibus contingat 735,57
 moris facies 1096,62
 moris utendum, dum accutissimum et simul
 382, 16
 Moris ut huiusmodi in personis accutis-
 simis temper 612,40
 Moris ut facies 410,19, 382,
 1199,4
 Moris ut 1110,14

Morsus a vipera steris capillum acci-
 do est 1112,42
 morsus a rabida cane cor ad ratio 6,65,
 114,12, 113,54,
 mors quid 46,52, 640,54, 804,13
 mors quo morbi temper sit 641,11
 Morsus, rabidus canis potio Cratippi
 1186, 53
 morsus rabidi canis conferendus est a-
 pertus in minimum quadragesima dies
 1277, 54
 morsus stomachi quid faciat 1097,56
 Morsionem plumbum confert ad confi-
 cienda medicamenta refrigerantia
 1184, 83
 Morsionem absque crisi accipiunt quae indi-
 cat 642,38
 morsus dies quae ut cognoscatur ibid.
 41
 morsus esse tres modos, ut qui sine crisi
 moritur 643,9
 morsus periculum quid promittat 599,
 40
 Morsus generatus prima ex temperantia
 10, 116,5
 morsus pueritiam diversitates 68,17
 Morsus cunctis quid sit commune 73,
 46
 Morsionem articularum in digitis duplex
 articulum 193,60
 morsionem post cibum incommoda 406,
 4
 morsionem quartum genus 95,60
 Morsus propria, velocitas et tarditas
 490, 34
 morsus quae infert 542,48
 morsus quae requiruntur 282,56
 morsus contrarium naturae non melius sit
 ut quoniam priorem sed acrius 519,19
 morsus non sensus, sed ratione colligitur
 547, 11
 morsus voluntarii illa seculi quae pa-
 tes amittunt 671,59
 morsus alius quid 73,58
 morsus alius ab alio sit morsus 94,19
 morsus, animales unde procedunt 91,3
 morsus arteriae et cordis est morbus
 800, 51
 morsus acrius max defunctus 880,52
 morsus acrius facilius abstrahit,
 moris acrius 91,33
 in Morsus celeritate indicanda, quorum
 sit habenda ratio 542,60
 morsus celeritatem aut tarditatem ex lo-
 ci ubi inquantur corpora indicari
 547, 6
 morsus celeritatem tarditatemque, adoma-
 86 640,14
 morsus compositi qui 73,4
 morsus cordis et arteriarum nunquam in-
 terminat 445,17
 morsus cruris ad latera ex abundantia est
 217, 17
 morsus in quo articulo digitorum pedis mu-
 lis est naturae quatuor 237,40

morsus cum plurima facultate animal in-
 digerit 672,17
 morsus depravati species 666,3
 morsus est duplex 725,48, 842,40,
 845, 61
 morsus est substantia est animalium 280,
 29
 morsus in adhaere confusus 310,42,
 346, 14
 morsus in pulsu interrupto differentia qua-
 tuor 56,19
 morsus longius corpus reddunt frigidum
 et praestant 433,42
 morsus naturae contrarij sequuntur potius
 naturae contrarias 87,17
 morsus naturales unde procedunt 91,1
 morsus noster, corpus reddunt biliosum
 433, 40
 morsus passivus quid 73,55, 112,
 10
 morsus propria sunt velocitas et tardi-
 tas 501,46
 morsus sensibilibus duplex existit 710,13
 morsus simplices qui sunt 73,19
 morsus urticentior, est urticentior 419,
 10
 morsus velocitatem distinguunt affectus dolo-
 rificos organorum refrigerantibus, ab ut
 qui citra dolorem infusant 494,
 35
 morsus mollium, viribus superiores, sunt tre-
 muli 710,18
 morsus voluntarij omnes a musculus sunt
 397,10, 713,57
 morsus voluntarij origo cerebrum 124,
 29
 morsus voluntarij symptomata 676,46
 morsus voluntarij qui 100,48
 Morsionem diversorum effectus diversi
 446, 8
 morsionem in musculus quatuor differentiae
 96, 1
 morsionem naturalem species diversae
 445, 51
 morsionem qui a moris non sunt triplex dif-
 ferentia ibid. 58
 morsionem qui sibi invicem succedunt, morsio-
 nem est una pervenit, perire et duri
 94, 59
 morsionem se invicem consequuntur dolo-
 rem sine dolo servari est impossi-
 ble 485,55
 morsionem varietes pugnat cum constituti-
 onibus frigiditate 208,60
 Morsus primus, principis animae facies
 105, 13
 Morsus qui ubi quiddam agere 739,
 31
 Morsus qui sale conditus afferendus
 199, 39
 Morsus qui moris prodi facit, quibus
 caret morbus 926,18
 morsus praegnant, quae prius signa-
 tur 105,9
 morsus qui carum pili moris 277,13
 multis-

I N D E X.

- mulieres glaciæ. *et* cor. *ibid* 50
 rudi res p. r. l. 3. p. 2. j. 505, 50
 mulier ætatem juvenitatem natura compos
 17, 10
 mulierum similitudo *et* dissimilitudo ad
 viros *ibid* 62
 Multi br. p. 199, 66
 multi mandant capillis 400, 27
 multi sunt frigidi aere 399, 51
 Multæ c. d. b. 50 927, 40
 multæ facultates 919, 13
 multa ex planta aqua conficitur 463, 4
 multa in natura biliosis dissoluta facile
 890, 31
 multa quibus non sit convenientia 924, 22
 Mundus rerum omnium maximus *et* pal
 cherrimus 215, 11
 Murescentia Rorer æmulum frid. marisur
 piscium murescunt 400, 48
 Murescunt 182, 15
 murescentia pulvis sanis ab ipso enar
 fas 127, 5, 12
 murorum capita ista ad speciem mendum
 117, 4, 35
 Musculi de eis *ibid* 55
 Musculi abominosus 48, 10, 24
 4, 9 10
 musculi ab esse bypide productum 247, 10
 musculi ad collum u. sicut localis, usus du
 pie 250, 63
 musculi ad eam partem trahuntur duaj,
 ad quam vergunt ipsorum fibrae
 246, 47
 musculi, caput ad obliqua trahentes, ni
 lunt 287, 7
 musculi caput moventes sunt obo *et* in
 gigni 281, 58
 musculi carentes tendone, nullum movent
 es 91, 52
 musculi caput flexantes 151, 16
 musculi constitutio 119, 24, 79, 12
 musculi concurrentes ratione ad pronum
et supinum 204, 10
 musculi crura extendentes *et* flexantes
 moln *et* metum 107, 14
 musculi cubiti articuli flexantes, duo sunt
 11, 10
 musculi digitorum 15, 15
 musculi a. s. r. a. r. coram capitis, non
 abeunt tendones 190, 27
 musculi exor. fures. 420, 14
 musculi *et* tendones interni flexationem
 eant, extensum extensum 91, 10
 musculi excretionem retentionem dicunt
 200, 28
 musculi excretionis furescentes inter cubi in
 strumenta moventur 178, 7
 musculi expulsi excretionem fer
 mantes 436, 14
 musculi extendentes articulum grom
 157, 45
 musculi in abdomine in reddenda urina
 nobis sunt ad illa 82, 63
 musculi in brachio b. uis obliqui monent
 rectum conficiunt 208, 10
 musculi iuncti præfunt 21, 11
 musculi in iuncto a. i. r. i. c. habent quod in
 unilicibus 91, 18
 musculi inter costales duo *et* a. 200
 488, 54
 musculi intercostales duplires *ibid* 65
 musculi intercostales qua ratione resolu
 unt 118, 54
 musculi irrigantur sanguine ex venis *et*
 arteriis profusente 9, 58
 musculi lani. fibrae à quibus initii orien
 tur 169, 4
 musculi lani iuvandi ratio 168, 5
 musculi lani origo 279, 50
 musculi lingue carent tendentibus 95, 35
 musculi mag. catores 168, 47, 273, 27
 musculi motum capitis præstantes obli
 quum 287, 17
 musculi obliqui in brachio 28, 16
 musculi obliqui obliquos præstant motum
 214, 37
 musculi obo à uteribus ignotum 151, 57
 musculi oculum moventes, sunt sex 74, 26
 musculi omnes in extremam resistunt cen
 trationem 97, 16
 musculi palpebras detrachentes sunt duo
 748, 58
 musculi pars quæ in se habet motum co
 gnationem adhibet cottinam 95, 16
 musculi prædum eluantes qui 160, 18
 musculi que ratione primarum motu
 189, 11
 musculi recti, ex ædem flexionem ad ex
 tensionem moventur 214, 59
 musculi retentionis excretionem dicunt
 224, 44
 musculi retrò ad dorsum contrahentes to
 tam seculum, unde recipiunt nervos
 311, 22
 musculi abdominis una cum septo tras
 verso interius, quod accidet 447, 34
 musculi ac tendentibus totis transfusum
 abfissu, motus passivorum partium
 218, 10
 musculi fupulsi abboraci admoventes
 17, 57
 musculi semper trahunt nervi proprium
 principium 270, 7
 musculi unius vocem tantum fibram gra
 vium 214, 40
 musculi singuli, singulis habet motum sin
 gulari 214, 47
 musculi magni ex parte infimi fibrae se
 cundæ longitudinalis c. p. portatæ 224, 55
 musculi soli voluntaria motu præditi
 310, 17
 musculi omnibus infirmitatibus, aut in
 ipso caput, aut partem capiti præ
 manant 246, 41
 musculi parvi imbecilliores commovent
 habet adiones 205, 19
 musculi sedis *et* viscæ voluntarii res
 soluti, excretionis retentionis esse pos
 sunt 7, 33
 musculi temporales nihil credito præ
 parant 72, 51
 musculi temporales conficiunt quos, ma
 sticationi 271, 28
 musculi temporales, inferiorem molle
 gram sunt conditi 17, 16
 musculi temporales in quibus sunt maxilli
 17, 16
 musculi temporales lesi que symptomata
 inducunt *ibid* 46
 musculi temporales quales nervos ferunt
 aut 260, 55
 musculi tres in magnam trochanterem in
 feri 159, 4
 musculi valde parvi in pede ab anatomi
 ci ignorati 214, 11
 musculi aliam flexionem unde oriuntur
 277, 25
 musculi unius trahunt nervos proprium
 principium 275, 16
 musculi voluntariae molitionis sunt infir
 mitas 51, 58, 124, 51, 321, 20
 310, 14, 87, 54
 musculi usus 281, 32
 musculi inextensæ abfisso, extensa pars
 moribis 95, 5
 musculorum efficiunt *et* adhibent
 motus 496, 52
 musculorum ab aliis cognitis maxime cu
 usa 151, 32
 musculorum caro qualis 91, 54
 musculorum excretionis que medicamen
 ta confrant 946, 11
 musculorum cubiti *et* manus ingeni ares
 202, 50
 musculorum cubiti usus *ibid* 56
 musculorum denervationes duplires
 100, 49
 musculi extensibiles abfisso, pars flexa
 amplius extenditur 91, 7
 musculorum flexionem atq. extruden
 tem dicunt, qui iuncti 208, 6
 musculorum flexio arbitrio animalis sub
 sistit 184, 15
 musculorum in extensum brachij nodo via
 capiti 154, 13
 musculorum inflexionis ratio 96, 12
 musculorum intercostalium fibrae
 34
 musculorum intercostalium fibrae quan
 tibus possidentur inter se 249, 1
 musculorum intercostalium usus 210, 50
 musculorum interiorum cubiti origines
 154, 49
 musculorum motus usus 202, 15
 musculorum n. flexionem adio 275, 32
 musculorum momentum singulis, abf

EPITOMES GALENI

oppofiti funi contrarij motus autem
 284, 2
 mufculorum motum in fufcipere parti-
 bus, æquales ad dextræ partes 135,
 53
 mufculorum omnium altio fu pro fibra-
 rum poffibilitate modo 284, 53
 mufculorum qui græ articulatione movent,
 malidiffimam functionem obducit qui
 extrahuntur 157, 60
 mufculorum refpirationi infertionem di-
 nominatio 481, 60
 mufculorum feftio moliente pro fibra-
 dubio 131, 47
 mufculorum fingulis ut una altio, fit &
 motus unicus natura inefci 94, 44
 mufculorum fufceptura ex quibus conficit
 811, 57
 mufculorum temporalis ficut fecurifimæ
 271, 55
 mufculorum & tendonem nutritionem
 quale 407, 11
 mufculorum thoracis altiores particula-
 res 488, 61
 mufculorum totam manum extendentes
 duo principia funt 156, 8
 mufculorum tranfverfe feftiones adha-
 rent carum diffolunt 151, 48
 mufculo temporalis utrique tres nome-
 figuntur 262, 36
 mufculus coftis univcrfis incumbit 152, 2
 mufculus dexteides 262, 19
 mufculus dion tenditur, trahit ad fe par-
 tem in quam inferitur 95, 30
 mufculus cæcærentia ad inferiora pro-
 pellens qui fit 230, 19
 mufculus inftrumentum animale & na-
 turale 94, 62
 mufculus later 150, 32
 mufculus later ad fermonem & mufcula-
 tionem multum confert 279, 55
 mufculus later fibras omnes recipit à col-
 li fpendylis 311, 6
 mufculus later unde nervus recipiat
 751, 26
 mufculus non exquifitè contrahitur citra
 animalem facilitatem 96, 14
 mufculus nullus caret æritia & uria
 116, 25
 mufculus nullus in foveæ manus exte-
 riore regione 164, 1
 mufculus omnes carnes, idcirco boni-
 dior carne 51, 18
 mufculus omnium in corpore maximus
 quis 308, 30
 mufculus proprium inftrumentum motus
 91, 4
 mufculus rectus, reftum miniftrat motu,
 obliquus obliquum 137, 18
 mufculus temporalis, dextris & minimis
 homini 272, 33
 mufculus tendens infigniter feftio nocet
 emi particule motibus 91, 3
 mufculus tranfverfus feftio, in quam par-
 tem frangit 91, 12

nardi montione facultas Ibid. 64
 nardi facultas 1261, 48
 Nervi funt refpirationis motus 679, 3
 Nervus fufius pifci producit Tyberius
 longè melior 400, 48
 Nervus demitti portanem cerebri 251,
 36
 Nervus ferentina cur in eis obliquè detor-
 quantur 276, 30
 Nervus meatus utilites 234, 40
 Nervus mufculi quales 269, 5
 Nervus obftitit motibus prævia obftas
 147, 27
 Nervus pinæ dilatatur ob fpirituum
 organorum imbecillitatem 751, 32
 756, 31
 Nervus ultra quibus medicamenta cau-
 rentur 1215, 28
 Nervi ale quando fpiritus dudum adu-
 erunt 458, 63
 Nervi alarum mufculi & nervi 279,
 60
 Nervi alarum utilitas Ibid. 55
 Nervi meatus uterque bipartitus 128, 18
 Nervi offa tenuiffima 280, 64
 Nervi offium confideratio 113, 58
 Nervi tonica excoquis 218, 33
 Nervi tonica interna cur conftricta 180, 2
 Nervi ultra que medicamenta defiderent
 869, 9
 Nervi ufus 670, 57
 Nephritus vel cordani feminis facultas
 1084, 2
 Nervi 268, 18
 Nervus via offitillium 122, 31
 Nation carnis 277, 14
 Nation fomes mufculi funt radiculi 308,
 7
 Nativæ utrique poffunt foveles effe paren-
 ti fecundum partes diverfas 118, 1
 Natura ægri in prout medico confide-
 rande 853, 63
 Natura animalia & dæa in lucem altiores
 autem partem docet 107, 30
 Natura à flatuaria qui differunt 77, 44
 Natura calida, frigida potione immutat
 894, 36
 Natura cuius animanti corpus affectibus
 idcirco ficit 177, 33
 Natura cuius ex primarum qualitatibus
 temperie confat 850, 40
 Natura cuius quomodo dirigitur 61, 21
 Natura eadem æqui in partem ac in ma-
 gis corporibus effe poffit 545, 33
 Natura animalium varia 291, 13
 Natura æritiam poffunt admitti, ad
 autem imitari 266, 48
 Natura bilis ex longiori inedia fibri-
 bus acutiffimis corripitur 889,
 61
 Natura calida & humine, magis quàm
 calida & fucca funt & ficut per-
 ferunt 895, 16
 Natura commutatio 355, 30
 Natura diverfa, diverfa videtur ratione
 dicende

N A T U R A in ficit, que detergit
 1102, 41
 Nervi omni fu facultatis 1091,
 6
 Nervus facultas Ibid. 1
 Nervus calidus 1097, 60

I N D E X.

alendo 413,3
natura facultates primas, ipsarum inter
se et aliarum desiderans ministerium
75, 32
natura effugit corporis formam, animam
moribus congruentem 277,35
natura gaudet confectis 895,61
natura boni omnia possibilia 275,10
natura impetrit quando moritur sui ius
dis 1211,14
natura in distribuendis nervis tres scopi
228, 38
natura industria circa formandas uter-
bras 290,26
natura in puerili aetate calidior 32,36
natura in singulis praedominans 613,20
natura ipsius inclinata tantum in crisi
modo investigando consideranda ut-
rit 643,13
natura metus quando determinat ordi-
natis, sunt, et quando non contrarij
642, 24
natura nostrae cum exercitiis habetur ma-
gis necessitudo 413,7
natura opera, incommutabilia 801,32
natura opera longi huiusmodi natura
247, 36
natura opera prima, et velut capita
75, 29
natura opera quae 71,25, 803,14-
851,41-951,61. 950,54
natura opusculum perpetuum 296,18
natura praedominans in colloquendi instru-
mentis 200,4,6
natura redit unde cognoscitur 29,4,9
natura scopi, circa corpus fingendum
125, 62
natura scopus in procreandis animanti-
bus 804,42
natura sollicitudo circa particularum si-
cilitatem 205,10
natura et animo, nihil aliud quam cal-
dum sunt 73,25
natura ex quibus confert 914,44
natura infirma, vel dum neq. motum neq.
calorem sustinet 1045,29
natura in morbi incrementa laborant, ad
bibit rem diu, magis opprimunt
19, 18
natura hinc inferior et destituta magnopere
superatur, ab eo quicquid habet bo-
ni, recipit 613,27
natura de omni ex contraria temperie na-
scitur 667,4
natura aliis se habentia corpore, similia
sibi praeter naturam autem, contraria
possibilia 854,45.
natura obmodum esse medicamentis
1003, 62
natura in huiusmodi corrupta, et ad-
tactum in meliorum naturam 443,46
natura cum cognoscere medicum o-
portet 955,11

natura, erroris et vitia eorum qui nos
procreant, facere sua industria
276, 46
natura laborantem cogitare, quae sunt
necessaria 951,19
natura, nervorum securitati, quando co-
sistat 113,59
natura nihil frigore melius 107,64.
120,16,202,12.
240,47
natura non est impedienda, sed humando
985, 55
natura non ipsam naturam usque ad semic-
laborat materiam, et ad omnino co-
sistat 339,21
natura non infecta corpora plurimum dif-
ferentia 109,13
natura multas materiam veterem servat
formam 77,51
natura opera omnia exhibenda mi-
seri indicat 443,36
natura operatur appetit, quantum
consequitur 810,4,6
natura operatur constantia, omnia requirit
medicaria 81,8
natura operatur esse quid indicat 974,
9
natura partium patientium, accidit
materiam indicat 977,59
natura per totum corpus partes extendit
77, 41
natura plures morbos soluit per fun-
gum excretionem 985,47
natura praeparat corpus animae moribus
aptum 116,3
natura prior et sapientior arte 145,53
natura quid 613,15
natura refertur eo quod ex semine sunt et
ita non potest 25,50
natura rerum quo pacto inveniunda 55,2,
19
natura semper actus, minus et actus
a propinquo partibus inveniunt 314,
21
natura superante morbum, aeger servat-
ur 720,59
natura temperata ut uteribus est praeter
missa 40,4
natura temperata, regula est constituen-
dae iustitiae rationi 40,11
natura calidus et sicis quo iustus ratio
convenit 890,12
natura calidus quiescendum 471,53
natura humidus et frigidus quo conue-
niunt 472,1
Nausea, expultricis facultatis est modus
depravatus 635,59
nausea inveni quid indicat 716,40
nausea praedicta vomitum 679,12
NECANTIA frigore, sole quanti-
tate letalis sunt, contra quoniam ea quae
praeservando aut erodendo intermi-
nunt 1056,63
Nephriticorum urinae quales 770,7
nephritici quo inveniunt 1090,11
Nervi ad cerebrum, musculus suus descendit

facilitates 92,4,8
nervi ad percipiendum infestantia nutritio-
nis organum tribui 228,52
nervi effertur efferri musculo omnem mo-
tum et sensum 92,27
nervi contigunt semper eadem magnitu-
dine 150,4
nervi consensu curantur 874,2
nervi deductus facultatem animalem
199, 18
nervi duri et fortes praesentia materia, con-
feruntur ad ea quae crassius sunt por-
tatum veluti dissolvenda 213,16
nervi duri quibus tribuuntur partibus a
frontali medulla 310,17,111,3
nervi ex cerebro substantia propagantur
912,16,124.
874,19
nervi ex cerebro producti musculus suum
larguntur motum 312,21
nervi exiles quibus sunt 218,34
nervi habent suum similem 489,13
nervi in maricatis eodem modo apparent
162, 7
nervi in quibus locum effertur, et in
quibus tenduntur 73,10
nervi longius corpus motum et sensum
192,49
nervi motum et erant quae differant
315, 53
nervi molles ad sensum, duri ad motum
apti 124,16,265,15
nervi molles recti ad sensoria tendunt
252, 12
nervi motores omni sensu veluti sunt praer-
diti 340,27
nervi, motus voluntarii opifices 149,13
nervi moventes longius musculos, si ab-
scedunt, aut contrahuntur minus, a-
nimis recti motum 648,49
nervi moventes thoracis veluti sunt ex-
ercentur 747,13
nervi musculus principium motus, longius
est 745,56
nervi musculorum inspirationi instru-
tionem 489,17
nervi non ad dura meninge, sed ad medulla
allius exercentur 343,49
nervi videtur quam medendi rationem po-
stulant 1161,65
nervi omnes producantur coniugati
110, 2
nervi optici, veluti oculorum naturae
146, 40
nervi per directum casu curantur 973,8
nervi puncti alio calido fuerunt 171,41
nervi puncti quibus medicamentis possi-
bilia 872,44,875,5
nervi puncti quoniam modo accione pharma-
ca possibilia 1161,21
nervi quibus sensus gratia sunt maxime
tribui 125,43
nervi quod magis digreditur ad cerebrum,
et magis durescit 247,53
nervi recurrentes refrigerant, necum in-
pediunt 755,4

EPITOMES GALENI

In Nervis carne nudatis quæ cunctis sint
1165, 30
nervus dicitur officium non accidit 733
47
nervus sensorius quod sit 146, 10
nervus septimus copule sicut primi exqui-
situm dicitur 162, 10
nervus septime copule unde oritur et
in quas partes diffinitur 161, 11
nervus sunt interpres partes in quas se
reddunt, diffinitur et sensu et
motu 106, 3
nervus inhiat ut dicitur superio principi
92, 17
nervus sunt ne foraminibus præditi. Ode-
mus dicitur 671, 11
nervus non usque cunctis conspicuus 304,
17
nervus omnibus sentiendi et movendi sa-
cillus insit 184, 34
nervus opticus sili, sensibilis in est me-
tus 149, 41, 310, 61, 343, 18,
665, 15, 748, 25
nervus parvis empletur optimus
871, 65
nervus parvis quibus medicamenta con-
tinentur 1161, 60
nervus subducitur arteriis et nervis 733,
42
nervus ulnaris in brachio et crure,
quod medicamentum adhibendum
173, 64
nervus ulnaris nihil frigidum adnasci-
tur ibid. 18
nervus tertie sexte et septime conju-
gatus et confusor, tendentes ad in-
feriora capitis 150, 19
nervus ibi dicitur moventes et spiritus medu-
lae oritur 115, 14
nervus transfectionem ulnaris circulo 871,
19
nervus ulnaris curatio 871, 51, 1163,
11, 1164, 16, 1163, 11
nervus aut medulla spinalis inhiat trans-
fectionem, quæ infra sectionem sunt par-
tes, et motu et sensu præstant
92, 40
nervus punctus, nullus est dilatandum
872, 18
nervorum affinitas duplex 190, 14
nervorum a spinali medulla oritur con-
jugatio quarta, quinta, sexta, septima,
octava et nona 194, 4
nervorum a spinali medulla oritur con-
jugatio ibid. 48
nervorum deachi exteriorum origines
162, 16
nervorum in cation formæ differtur,
radices quæ sunt 166, 16
nervorum magnorum in cubium descen-
dentes sunt quædam membra 163,
40
nervorum molliori ac duriori estiman-

de merbedas 161, 8
nervorum molliorem duriorumque ortus ac
progressus 152, 10
nervorum mollium prima, secunda, tertia
et quarta copulatio 149, 47,
161, 15
nervorum mollium quinta copulatio 150,
11, 153
nervorum mollium septime coniugatio
130, 43
nervorum mollium sexta coniugatio 150,
16, 161, 44
nervorum opticeorum consideratio 149,
34
nervorum opticeorum ortus 311, 1
nervorum ortus a cerebro 740, 1
nervorum par diffinitur in nervosum
lum 119, 9
nervorum præfatis sacri foramina præ-
ducuntur tria prima 114, 7
nervorum principum cerebrum et spi-
nalis medulla 190, 14
nervorum punctiliones arguunt non in-
ferunt medicamentis curantur, quibus
nervus medullæ 1164, 63
nervorum recurrentium ortus, progressus
et reditus 311, 63
nervorum resolutionem nervum variæ se-
quantur symptomata 671, 14
nervorum sex et coniugationis in nervi-
cium oblique implentatio 163, 17
nervorum tertie coniugationis proce-
sus diffundit se in faciem, dentes, et
gingivas 150, 18, 731, 1
nervorum tertie coniugationis gustatio
150, 18
nervorum totius corporis ortus 156, 4
nervorum ortus differtur 112, 11
nervus molles natura quibus tribuit
110, 15
nervus recurrentes in nervis Ode-
mus 728, 47
nervus septime copule cum illis qui dicitur
se oritur, copulatio natura 161, 6
nervus sexaginta oritur a spinali medulla
147, 11
nervus aut ligoementum, scissa, refectur-
sus non possunt 111, 11
nervus molles semper in sensoria, ab omni
musculis illa moventes inferunt
110, 11
nervus nullus in cor diffunditur 139,
31
nervus nullus sine musculo motum præ-
stat 729, 18
nervus omnis exiguus et frigidus 44,
61
nervus omnis sensu præditi 91, 11
nervus omnis vel a cerebro vel a spinali
medulla oritur 146, 18
nervus quando reddatur insensibilis 146,
4
nervus quando transfectionem secutus
855, 40
nervus quando mollior, tantumdem sen-

sus sentit 182, 6, 146, 18
nervus quibus influuntur spiritus cer-
ebrum, ac sunt mente alienati
91, 30
nervus quid ibid. 19
nervus ut est motus facultatis a cere-
bro dicitur 92, 19
Nervus dicitur tripliciter 85, 60,
1017, 30
nervus quæ dicitur 813, 40, 1017,
63
nervus signa quæ sunt 815, 19
nervorum corpus quod sit, in via primi si-
gnificatio 814, 44
nervorum iuxta secundam significatio quid
sit ibid. 58
nervorum iuxta tertiam significatio quid
sit 815, 7
NIGRETTAS facultas 1095, 17
nigra oleo vitæ et inspirata, mer-
tur grandis 179, 16
Nigredinis cerebrum cause 80, 11
nigredinis quæstione tria adferuntur
671, 55
Nihil a familiaribus infestatur 119, 9
nihil ex nihilo sit 84, 18
nihil ex propriis affinitatibus conficitur 331,
21
nihil in contrariis qualitatem totum si-
militer 84, 18
nihil minus fortis, parum agendi facul-
tas sentit 57, 57
nihil sit sine causa 89, 35, 310, 11,
841, 9
Nihil cruciatum 1134, 5
Nomen omne vitiosum 167, 16
Nervi spiritus et aphorismum quam ha-
bent facultatem 403, 68
nervi vitæ 1121, 11, 1123, 10,
1143, 41
Nervi usus quæ incommoda efficit
412, 21
Nomen quæ dicitur altera sit 179, 1
Nomen diffinitur res, quibus dicitur in-
hiat in ventriculum atque in intestinum
542, 5
Nomen communis 66, 4, 842, 11
Nomen in medicina experientia quæ
634, 49
Nomen aphorismum 11, 6
Nomen præparatio 11, 5
Nomen nihil in facie corporis
160, 34
Nomen quando sit 617, 11
Nomen a vino illata quomodo deprehen-
denda 514, 41
Nomen in regie notitia, aphorismum
513, 35
Nomen picea vel strobili facultas 339,
14
Nomen picea et mellis substantie
et facultas 385, 10, 108, 18
Nomen vitæ succi adhiat diffinitio pe-
netrat 1121, 63
Nomen de præparatio cause 664, 10
Nomi-

INDEX,

Nutritio in dies ratione quam diligentissime consideranda	414,6	C ^o linte	684,56	Occiput nec facile coarctat, nec citius	
Nutriendi consilium unde petendum in egritis	907,17	nutritionis organa	600,40	nam refrigeratur, principium spiritus medullæ clausi	119,11
nutriendi in prima accessione inuisione qui sunt	906,4	nutritio quando fiat C ^o eius causa	75,	Oculi nati quales esse debeant	103,8
nutriendi modus unde colligi possit	613,	nutritio quid	74,33,114,31,69,156,	27	
nutriendi qui non fiat in ipsa accessione declinatione	907,14	nutritio quomodo fiat	408,59,146,41,	Oculi sola ratione comprehenduntur	11,
nutriendi tempus in synochis quale sit aptum	916,55	49		Occupati negotiis, non mutant temperamētum	474,4,3
nutriendi tempus unde sit considerandum	914,	Natura grana, lactando infans est in epia	434,118	Occultius	1114,17
nutriendi uti que ratione formetur	475,	Nux ingulos continet siliquas septuaginta dies	1190,29	Occidit et cito sit facilius	114,15
nutriendum ante, similiter sibi succum ex sanguine trahit	111,42	nux pinta	407,3	Oculi cum lacrymentis	644,18
nutriendum utinodum aut interpositum sumptu infirmitas	57,15	nux P ^o antica continet siliquas decem C ^o 650	1190,19	oculi fabrica	146,17
nutriendum simul C ^o medicamenta	59,	nux regia sumpta cum carica C ^o rata, fit alexipharmacum	111,41	oculi glauci C ^o nigri unde sunt	110,9
nutriendum sunt mediocriter calida	104,3,	nux regia uiridis, apta est soluenda utinodum	115,46	oculi humoribus que productiones vocantur	110,9
nutriendum utinodum soluentia, huiusmodi utrinodum aut alia cibis ingerenda	477,	N ^o Y M P H A I A T facilius 1098,19		oculi muscæ nigri	109,47
nutrienti principis quatuor	114,37	Nympha matris propugnaculum 105,		oculi offendentur a uicinis sibi	110,9
nutrienti qualitas ob effluia C ^o tempore fit succunda	916,48	14		oculi qui parte expurgantur	417,10
nutrienti quando minuenda quantitas aut malanda qualitas, aut utrinodum circundum	477,4	OBSERVATIO cibi digestio minueretur, augenda autem calida		oculi quare grolini	109,15
nutrienti quantitas a virtute, qualitas a tempore succunda est	916,33	obesitas curatio	910,55	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum duplex genus	104,3,	Obesitas plene distantia quibus contingat uidere	669,41	non infans	110,9
27		obesitas quando senescit utinodum		oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum æquiuoce dictum	76,9	obesitas quando uideatur duplex	668,40	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum a medicamento quomodo differat	84,9	Obesitas a frigore gignitur	613,3	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum animalis quod non sit carne uicinis	84,10	Obesitas quod	101,4	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum attribuitur ut nature	78,	Obesitas consilii siliquis tribus	1190,33	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
34		Obesitas absque ratione non fit	11,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum omne dulce	104,3,13	obesitas C ^o experientia idem	11,1	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum proprium quod sit	57,15,	obesitas fieri debet in pluribus	11,42	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
56,44, 58,41, 76,6,	1012,13	obesitas hanc in similitudinem acciderunt concussibus colligitur	11,12	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum tripliciter dici	57,13	obesitas qui fieri debet integra ac ob soluta	114,34	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum uicini ad eo quod nutritur	1051,	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
1051,	33	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientum ut alteratur, sic etiam quoquo modo alterat id quod nutritur	417,	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
417,	27	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientur uti, que nature nostre sunt a melioria	404,43	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientur corpus que p ^o uicinis C ^o que uicinis possunt	390,57	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientur utinodum dunt horrent qui possunt	906,	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
906,	39	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientur utinodum perfida	56,13	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientur utinodum necessaria	75,13	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientur utinodum adueniens est prima	657,	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
657,	6	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientur necessaria que	81,1	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9
nutrientur utinodum utinodum, est elephanti	81,1	obesitas C ^o densitas cutis ex eo a fuita erit, quod conueniat remedium	451,	oculi quare posterioribus capitis parit.	110,9

EPITOMES GALENI

oculorum pharmanon 1122,3
 oculorum h. deinde a crasso humore or-
 te, quæ accitetur 1091,2
 oculorum inflammationem non fluxione,
 quæritur Galenus curati 996,56
 oculorum inflammationis quando dicitur,
 C. ex candida 942,33
 oculorum magnitudo quid indicet 819,
 60
 oculorum maris curatio 942,48
 oculorum motus qualis 914,6.94,11
 oculorum motus quatuor voluntarij, to-
 tidemq. illis præfati masculi 169,
 12
 oculorum motus unde perat 748,10
 oculorum musculi facilitatem consequuntur
 409, 24
 oculorum musculi obliqui 169,42
 oculorum nris 15,12.14,2,40
 oculorum nris, crassiores nris lingue
 112, 42
 oculorum nris moleres unde oriuntur
 151, 8
 oculorum parietes quid significet
 120, 2
 oculorum phlegmonas sunt cui albumen
 942, 19
 oculorum plagi quæ opulentur
 122, 26
 oculorum pus, colluria ex myrta desci-
 tiunt 954,59
 oculorum pus quomodo uacuandum libi.
 64
 oculorum pus quomodo curat 954,49
 oculorum scissus aliorum omnium cras-
 sissus 310,46
 oculorum sensus unde perat 748,17
 oculorum situs longi brevissimus 352,12
 oculorum temperantia quomodo digno
 sciuntur 819,49
 oculorum tunicis induratis quæ conscribitur
 1210, 50
 oculorum uasa quando sunt prævidenda
 941, 10
 oculorum uisio quid expurgat 1077,42
 oculorum uisio, qualia medicamenta po-
 tuerunt 1118,57
 oculorum uisum scopos 1219,4
 oculis crinere tantum quæ pupille i di-
 rectio opposita sunt, ob idq. uolubiles
 esse 169,26
 oculis pharmanon roboretur 1210,64
 oculis uisio clausa, omphalytæ alterius pu-
 pillæ 167,61. 145,2. 668,
 58.
 oculis facies propter opticos nervos
 160, 65
 oculis organum lucidissimum C. quan-
 tissimum soli 215,17
 oculis utique quatuor habet motus re-
 ctos C. duos curuatos 94,40
 ¶ O P O R A B I L I V M substantia est
 uaporosa 1050,12
 odorandi sensorium, principium est an-
 teriorem cerebri uentriculorum

670, 55
 odorata omnia conciliant capitis dolorem
 746, 60
 odoratum sensus ubi perficiatur 747,
 61
 odoratus sensorium uaporosum existere
 129, 9
 odoratum non omne suum 1050,35
 Odorem non indicant facultates medica-
 mentorum 1021,57
 odore pleriq. similiter seporibus nos af-
 ficiunt 1050,9
 odori uoluntarios caput continet lie-
 ditur 211,3
 odori sensus in quibus cerebri uentricu-
 li collocatur 1050,27
 odor non perire ut sepor sensibilibus ite-
 perat indicat libi. 46
 odor refrigerationem conferit capiti ex al-
 fado 129,63
 odorum digno lucet plurimum telum
 refrigerationem 255,9
 odorum digno promouetur ab infusa
 te cerebro 255,3
 ¶ O E D E M A ex cibus humoris afflu-
 tu nascitur 708,1.991,13
 edema in quibus symptoma sit 976,
 14
 edema quid 944,16.976,31
 edematis pinatosis ibor ex C. icter non
 quam infestatur 601,51
 edematis C. anasarctis discernit
 708, 35
 edematis ex inflexu orti curatio 976,
 38
 edematum curatio 944,64.1099,
 54
 Oenopia radix narorem discit 69,
 61
 Oesophagi in uentriculum insertio
 111, 46
 oesophagitis C. usus 233,16.76,
 60
 oesophagus singula 217,37
 Oxyper 219,40
 oxyper quomodo habet 1133,57
 ¶ O L I A calida C. relaxantia 451,
 22
 Olea uis 1078,12
 Olei cum uisum collatio 1037,47
 Olei differentie complures 922,32
 927,14. 1023,2. 1156,12.
 1075, 20
 olei dulcis natura C. uis 1026,2
 olei effectus uarij 1021,10
 olei facultates 2176,18
 olei ex oleis facultes 1078,17
 olei inuicem prohibet succorum exalta-
 tionem 478,12
 olei lenissimi facultes 2174,42
 olei partes 1025,50.1041,45.
 olei calidi persusio, quibus conueniunt
 1022, 57
 olei refrigerandi ratio libi. 49
 olei uisio qualiter expendenda libi. 44

oleo chamæmelis in quibus sit utrumque
 corporibus 1192,16
 oleo in cibus redduntur sicca 1022,12
 oleo post fritionem membra subigenda
 419, 54
 oleosa inflammum ueritatem 55,61
 oleo augendi qui sunt, C. qui minui
 1028, 7
 oleacea omnia catochyme 410,22
 olea omnia signant puritatem sanguis
 nem 187,37
 olea quæ ob lentorem facile deservunt
 169,21
 oleum emulsion radices excrementitias
 sunt 417,42
 oleum plerumque calidis temperatis
 succis, quoniam solia 189,33
 oleum uarie speciei succis 410,33
 Oleum abluu cordibus redditur 1024,
 62
 oleum alium subducit 1022,29
 oleum acritum 463,17
 oleum calidum, at non cadentem 1026,
 50
 oleum calorem parum eis, quibus applica-
 tur, accendit libi. 62
 oleum chamæmelis 463,24
 oleum corpori alium, caloris C. sudoris
 effluuium præhibet 2018,3
 oleum cur defusum nos calfaciat 1016,1
 oleum est aliorum medicamentorum mate-
 ria 1028,17
 oleum C. uris non propriè nos calfa-
 ciunt, sed obstricta frigori 1017,21
 oleum experientiam est in hominibus
 1026,28
 oleum expertis salis C. salsum, quomodo
 alium subducit 1021,9
 oleum fritionibus accommodatissimum
 1016, 16
 oleum ossibus perimit 1022,21
 oleum lassitudinem lenit 1021,27.
 1023, 20
 oleum lauem est minimè mordacum 1078,
 32
 oleum lucernarum est tenuius commotum
 1191, 17
 oleum medium inter hunc clausum C. sic-
 cantia 1021,5
 oleum mulierum dicitur nos calfacere
 1017,38
 oleum oculis mordicat 1021,18
 oleum ampharionem ostingit 1025,2
 oleum pingue tenuis quo ratione aspi-
 mentur 1078,62
 oleum quod cōferat ad fritionem 447,
 13
 oleum quibus fluxionibus sit nexum
 1016,57
 oleum reparandi ratio 2024,8
 oleum ratarum acriter dolagibus cū
 eis a frigido succo ortis 931,23
 oleum saluum 450,38
 oleum sompnybinum 461,10
 oleum simpliciter C. per absum dei
 1022,63

I N D E X.

1012,	63	omphacium	1220,27	bus	251,18.170,53
oleum solum fructus nostrum temperum,		Omphacium facultas	1116,12	epicorum nervorum conspiratio in uocem	
qualem accipit	1013,19	Omphacium et actum in quibus differant		didactyle	270,51.241,8
oleum temperis est medium	1013,28	1044,	56	opacorum nervorum ceteris	344,
oleum tepidum necis castis non congruit		¶ O N A G R I facultas	1098,56	63	
1163,	15	Ondrydus cuius sit facultatis	libid.	opacorum nervorum progressus	251,62.
oleum utriusque materiam quoniam non medica-		Oncobolus	1067,2	164,	61 (165,19
mentum	1027,10	Oncolea quibus morbis conueniat		opacorum inferi in crystallinum humorem	
oleum ulcera redditis sordida	873,13	1066,	59	opacorum in omni genere uocem cristis	
oleum ulceri cito aduersum non medica-		Oncosis cuius sit facultatis	1099,2	4-2,	64.
mentum est	869,60	Oncosis cuius sit efficacia	1092,59	Opus de usu partium commendatur, bon-	
oleum uulsum et hyematum quibus ef-		¶ O P E R A T I O leuatur tripliciter		quam theologiae uerum principum	
fectibus presit	114,2,15	827,	48	519,	16
Olifacientis ratio	150,6	Opera uoluntaria duplicia	101,14	opus de usu partium philosophus longe	
Olifacientis sensum neque esse nisi pellicu-		opera uoluntatis que don plant sunt li-		uissimum	libid.20
culum neque rursus os	119,12	bera, que don corporis affectibus in-		opus quid dicitur	7,151
Olifacientis sensus in ueneriis scribi		feruunt	101,15	¶ O R C H I S seraptes quid habet uon	
ueneriis fuit	119,50. 254,	Opera de usu partium commode	320,1	1099,	53
16		Opusculi unde	954,7. 1180,12	Ordo et aequalitas, nature familiaris	
Olifacientis uis à quibus labefactetur		Opusculi cuius sit facultatis	1118,12	Ordo	506,24. 594,26
760,	58	Opthalmice siue appropinquatio medicamen-		Ordo quid	497,17
Olifacientis subtilitas	119,5	ta congruentia qualia esse debeant		Organa ad alterationem quare plura sint	
Olifacientis instrumentum sedes	34,7,16	1218,	52	infinita	75,16
Olifacientis qui uapores uoluptatem uel do-		Opthalmice laborantes offendit lux		Organa omnia in animalibus infusa ha-	
lorem efficiunt	673,4,4	167,	4	bent à natura facultas	120,18
Olifacientis uis uapores infestant	672,	Opthalmice quid	31,11.9-110	Organi respiratores procedunt uis,	
40		Opthalmice autem, manifesti quid indicet		que eorum, ne graui dolore animalis	
Olifacientis de quibus dicitur	119,5	125,	38	figatur	495,2
Olifacientis et gustus cibum discernendo-		Opthalmice uis	1162,14	Organo elementa que	74,53
rum instrumentum	413,60	Opinio rectius mai praesentia, uel uis-		Organo uentriculi nasebuntur existit cū	
Olifacientis sensibile	129,1	litionem inferat uoluntatem autem, nequa-		alio existit, quid agendum	4,11
Olifacientis sensibile crassiorum est partium,		quam aut non perinde	311,14	17	
quoniam sensibile acutius	153,13	Opus confectum utendum est post tempus		Origini facultas	1090,27
Olinae	470,13	compositiois ad minus semestris		Ornamento tria musculorum genera de-	
olinae et uis quid tenui uisui consistat		978	973,11	stinata, opertitū, claudens et cir-	
418,	16	Opio confectum medicamentorum com-		compositum	273,61
olinae balneum et colymbade eductum		positum siue tria proponit		Oris et eductum differunt	161,30
ante alios cibos, ueneriis subducenda		1162,	38	Oris effluuiis cum medicamentis fer-	
gratia	385,22	Opio qualia medicamenta miscenda	libid.	ta et ueneriis non exhibenda	
olium maris conditum diffundit et uis-		50		1311,	7
mentum agitur quod	1159,4	Opio quando in capitis dolore utendum		Oris erisitis delendis remedia uaria	
olium parum nutrimenti largiatur		1201,	11	1315,	50
385,	19	Opisthotonus quid	716,17	Oris functiones musculis quoniam genere	
Olifacientis	1097,50	Opium quibus misceri debeat ad aures in-		ambuntur	125,17
Olyra	347,27	flammatis	1207,58	Oris inflammationis curatiois communi ser-	
Olyra uis	415,56. 1098,55	Opium recipientia medicamenta dolorem		pus que	11-0,85
¶ O M E N T I constitutio et usus		tollunt, ipsum tamen dysphosionem re-		Oris inflammationis uigentes quibus me-	
120,	24	linant	978,2	dicamentis siue co uer de	1312,52
omnium figura	179,40	Opes aliorum ad affectiones indigentes		Oris inflammationis inuicem, que me-	
omnium natura	110,19	calore non magis perire opulari		dicamenta conueniunt	1112,21
omnium origo	libid.64	1199,	19	Oris inflammationis siue in dicendis quod	
omnium purgationis utilitas	211,10	Opes aliorum est letale, reperireque in		opulenter	1211,11
omnium uis à mercurio oritur	142,	meritis	1212,12	Oris inflammationis conuoluit que con-	
18		Opoponaxis facultas	1100,13. 1183,	gramat	libid.47
omnino excidente per uolus quid agendum		54		Oris, musculi	170,5
876,9		Opotici nerui productio affectionum crystal-		Oris partes uis de neruis ad superos di-	
omnino generando unde principium		lin buncus ad cerebrum ueneriis		ferentes recipiunt	160,1,4
179,	30	num, uis	265,42	Oris postibus eximendis phormace que	
omnino fauendi caloris gratia condi-		Opotici nerui cur intra cranium interponit,		conueniunt	1215,17
tionem	175,35	postea autem diuidentur	271,16	Oris uis a durior est omnibus ferri facit	
omnino quid	179,14	Opotici nerui siue, consistens, et consue-		partibus	261,28
omnino agens materia ex qua, et effluui-		ditur	346,29	Oris uis a quoque quod diuidentur superos	
te a quo sunt	695,11	Opotici nerui soli cerebro non apparent		276,	4
omnino sunt medicamenta	412,55	duriores	251,15	Oris ueneriis affluuiis phormace A-	
Omphacium facultas	1044,7. 1150,27	Opotici nerui soli, sensibiles feruunt me-		scipulis	1253,40

EPITOMES GALENI

os uterique affligitur, cur maxime am- mal infirmitas 675,9	os sacrum quatuor conficit ossibus 386, 19	pus autem imbecillus dicitur 401,7
os uterique affligitur primarij 764,3	Ossa cur autem rarij crediderintur 1317, 64	ostrea carmen habent molliscentia ibid.
os uterique dolores que leniunt 1252, 36	Ossa cur tam exiguis servata sunt uterque 317,7	ostrea edicantur cruda ibid. 11
os uterique et hoc patitur inflammatione qualis per amara desiderant 1148,8	Ossa frusta deligandi ratio 877,5	ostrea quomodo non habent 1137,63
os uterique acria, insigni præditi sen- su 601,24	Ossa frusta, utroque die solvenda sunt ibid. 43	ostreorum corpus humilium, cutis sicca 552
os uterique partes cur frangit acutissimæ prædite 1611,61. 741,53	Ossa frusta minora sunt gestantibus 336,60	ostrea que dixit ostrea 1138,43
os uterique situs 233,52	Ossa humilia epilepsiam curant 1138, 32	os uterique cur à cerebro recipiat ner- vorum sincerissimum 312,25
os uterique que medicamentis requirantur 869,11. 1135,33	Ossa humilia quædam 380,37	os uterique cunctis omne quod cum sa- stidio accipitur 2:31,32
os uterique ob atrum hilem inflatione tristat, que conficiantur 1252,63	Ossa imbecilliorum animalium magis co- cuntur et leviore, fortiorum densiora magis compelluntur 280,13	os uterique exquisitissimo est sensu præ- diti 673,64
os uterique opus est sensu quampluri- mo 128,46	Ossa interduum fluxu insuadit 706,35	os uterique instrumentum appetitum ci- berum 318,23
Oreum sive gallitrichum 377,58	Ossa maiora cur semper carentiora mi- noribus 208,46	os uterique que symptomata infirmitat 764,1
Oreum duplex ibid. 30	Ossa parva carent medulla 280,32	os uterique quibus præcipue vitantur 314,15
Orthopæa laborantes cur iuxta spina- tis recta 503,50	Ossa petioris septem 115,65	os uterique quorum affectionum sit causa, lege consensit et proprii ratione 674,3
orthopæa qualis cometur spiritus 503,45	Ossa puerilia cadescere possunt 834,4 53	os uterique uterque eorum nominabatur 324,14. 1248,55
orthopæa que iuxta 1095,51	Ossa sunt dispersa iuxta muscularum im- becillitatem et robur 280,21	Quædam ossa in cherubis 308,55
3104,4	Ossa ut coalescant, que sunt apta 876, 30	ossis fixa pessima ibid. 57
orthopæa quid sit, et unde gignatur 494,1. 735,1. 1246,57	os scapulae magna ex parte cartilagine te- nuitur 336,13	ossis subventura animi excludendo be- ne 399,19
orthopæa cur sic dicatur 1246,52	Osse frusto simul afficiuntur muscoli 834,55	ossis subventura circa gallinæ operum sunt 116,56
orthopæa et alibi notantur 1247,44	Ossibus componendis que requiruntur 281,53	ossis suffocata, tunc et asis sunt meliora 399,59
Oria ab alijs, similibus speciebus esse opor- tet cum origine sua 161,23	Ossibus medullis infestis utrinque capi- ta 281,10	ossis suffocata perinde modis ibid. 60
Oryx facilius 1099,41	Osti frasto que figura sit eligenda 377,40	ossis tremula que sunt 406,37
Oryx utatur ad sistendum alium 379	Osti colatorij usus 354,53	ossis tremula mitigat aerem delictum frigore ortis 1208,47
¶ O S animalis que ratione aperitur 173,8	Osti sacri consideratio 355,55	ossi temperies 1139,61
es animalis que ratione elaudatur 271,61	Osti sacri usus 392,18	Ossium collationem facilius 398,53
es aqua replendum est, dum erubescit quis inter 1107,23	Ossium animalis similitudo usus 328,17	ossium differentie ibid. 47
es à quibus organis aperitur 281,40	Ossium capitis consideratio 332,16	ossium omnium differentiarum facili- tas 406,34. 1159,52
Osculationis continue causa 504, 47	Ossium capitis differentia 333,1	ossium præstat unica est usus 113,9
os colatorium 258,47	Ossium cognatio, modus est necessaria 131,23	ossium sorbitionem facilius 398,51
os cubitaneum quod dicitur 211,33	Ossium combustorum usus 1138,14	ossis toto et crudo ad que utatur 1140,8
os byades 171,55	Ossium differentie 1134,33	ossium in aceto percoctum ac est, disfen- terit aculeatur ibid. 11
os iugale 170,10. 368,54	Ossium generatio 110,61	ossium sorbile quibus commenta ibid. 27
Oryxus facilius 1099,60	Ossium genus in digitis, sicut gratia rari quod melius 397,18	¶ OXYACANTHOS cuius sit si- culatus 1099,12
os lapideum 261,7	Ossium motus ratio 56,13	Oxycephalus continet sesquialbum 129,1. 43
os lator cur omnium finit osium ma- ximam 216,61	Ossium natura et motus 331,29	Oxyerum ex quibus conficitur 1018,58
os lator finit extremis 261,51	Ossium nutrimentum medulla 110,40	Oxyerum vires ibid. 32
os nasiforme 211,58. 211,36	Ossium structura cuius gratia sit 280,5	oxyerum videtur glutinac 1019,17
os post locutionem prælocutionem su- am 198,33	Ossium structura in digitis 198,52	Oxygallus usus quibus eductus, ac qui bus non 396,43
Ossa ad aures posita petrosa 333,6	Ossium substantia cur non facili solvantur 317,37	Oxyloperis sive ramicis vel lapidis ari- di facilius 386,49
Ossa capitis sex 332,58	Ossium substantiarum usus 351,11	Oxymeri 396,49
Ossa corporis plurima ducuntur 125,58	Ossium liberacis spectatio 111,38	
355,1	Ossis agere usus 879,28	
os sacrum ex tribus conficitur particulis 125,39	Ossis agere quid 495,30	
	Ossificatio quomodo tenet 111,13	
	Ostrea etiam valentius subducuntur, ac 39	

EPITOMES GALENI

Parti coninge carnes median requirit po situm	304,41	corde	467,26	380,	36
part dextre sola, vel sinistra, car resolu- tur	729,41	partes instrumentarie	342,10. 349,9	partibus singulis quatuor infans iaculis 163	767,11
part influmate omnis dolet agnada	761,	60		partibus superius influmatis externas urnas directas illis secundas esse	35
part nulla in factu generatur citra fon- guinis substantiam	121,60	partes matris dextre car edidiores si- nistris	299,62	974,	74,60
part nulla propter se habetur	318,19	partes maxime case que	81,12	particulæ corpori à natura sunt constru- tæ congruentes animi moribus	13
part omnis que mouetur, auriis nititur musculus	94,50	partes nervis carentes	309,60	particula nulla ex se habet sensum	6
part queq; corporis, quod fuerit magis il- perata, tantò promptius mucus sunt obis	581,33	partes nervos usq; pinatissimos sunt.	194,	particulae uoluerse sibi immixta consen- tuunt	196,40
part queq; propter qualitatem temperi habet functionem	79,19	partes non impellunt animam ad agen- dum	195,13	particulæ uolueratæ sicut	864,45
part que, simulat que nati sunt animalia, sunt habet usum	121,19	partes omnes alimentis indigent	317,9	particulae uolueratæ sicut	864,45
part quid dicatur	194,23. 342,19	partes omnes alimentum subipsis asimi- lant	301,45	particula nulla ex se habet sensum	6
part similes que recipiunt	84,157	partes omnes ratione temperamenti agi- tati	73,	particula omnis agit secundum proprie- tatem temperamenti	767,64
part superfluaque decipiunt, quæ esse de- beat	970,34	partes per quas fit fluxus, corroboran- tes	965,59	particulæ ornamenta obcurant à sibi dare ipsius aditatis	277,17
Partes ægritudinis dignoscendi ratio	3,6,	partes pleneque oppressæ, duplici ef- ficantur effectu	6,11	particulæ tria genera	196,4
partes effluere quando auctores et quæ de trepidi uacuari debent	881,4	partes primariæ que	349,57	partis consiliter sanctio perit uiti tem- perati	79,31
partes animalium extreme, quædam car- pori alimentum præstent	407,21	partes principes sunt cerebrum, cor, he- par et testiculi	816,43	partis consiliter usus ad cognitionem esse deorum locorum conduct	724,6
partes à ferre oris	121,1	partes que aliis præcipue fluctuant et cipiunt	992,16	partis inflammata curatio, si uoluerit corpus sit plenum	816,35
partes à similibus temperatione sue cas- sus delectat facile modus uero con- trariatione usu uoluerit	819,56	partes que citius, que posterius in ui- ris formantur	46,21	partis imbecillitas ab interpretis nati- tæ	818,6
partes à uisceribus amissæ laniis: à renibus, sunt conuulsus similes	774,3	partes que cōstunt ad uisum principes	134,	partis inflammatae dolor quando solua- tur	61,16
partes carnosæ uacuari a calidiores	49,17	partes que corrigi, et que minimi pos- sunt	832,48	partis puræ radix aduenda est	982,
partes corporis omnis uerum sunt ob potes	348,42	partes quædam interdum per deos pur- gatur	767,51	partis solutæ substantiam conservant ne dioriter exiccatia	814,17
partes corporis seruatur aut uisus rati- one, aut medicamentis, aut munitione operta	32,35	partes que uacuantur facile, et que a- criora medicamentis desiderant	817,18	partis uisibilis ex effluere cognoscitur	199,11,
partes corporis uniuersæ, opera sunt na- ture	74,19	partes que uia con effectu amputantur	950,	partium aditus semper usus est exiccatia- tis	318,21
partes dextre, sinistra sunt partes	355,33	partes reductantes reserantur tripliciter	838,	partium constitutionis prima secpa u- tilitas	177,25
partes dextre et musculorum sinistra, sit minorem esse generatrics	100,2	partes resuscitate, pigre ad motum sunt	1202,	partium corporis diuina temperare	41,6,
partes diuturnæ, ut uisus quibus modis ad- ducantur	852,19	partes firmes admodum sicce, licet me- dicæ copacitates superflua humiditate redundat	475,13	partium differentie	975,42. 816,
partes eas pleiti solere, quibus quis pec- cant	342,47	partes sensu uacue nullius symptomatis sensum possunt percipere	698,1	36	
partes ex defectu nutrimenti celeritè re- frigerantur	884,17	partes singulas trahunt alimentum fami- liare: licet alia sanguinis sedimenta	1259,	partium formationes quomodo curatio- nes uariant	974,27
partes exardescere redduntur fortiores et solidiores	427,61	partes solide ex semine generantur et nutruntur	114,28. 914,45	partium inflammationum quoniam magis et que minus sunt exiccatæ	974,
partes familiaris alimento destitute, ex- pleantur succis atrofis	157,41	partes solide nullo modo humidiores ef- ficiuntur	825,17	11	
partes fortiores ad imbecilliores extra- menta propellunt	87,22	partes tardi frusque continent omni me- dicamentum	883,64	partium profundarum effectus, quæ re- media possident	128,60
partes imbecilliores à fortioribus humo- res recipiunt	992,42	partes uoluntarie motu præditæ, ad mi- nimum ductus egenti uisibus sibi op- positis	269,52	partium similiarum natura et quibus con- sist	189,9
partes imbecilliores car animam primæ corruptione exarmentatibus morbus libet	49	partibus cunctis in se facilius proprium trahendi materiam	259,16	partium similiarum morbi in pura intem- perie consistunt	1197,48
partes infirmæ dum laborat non sunt fri-		partibus inflammatis acidis necessariis immodicus calor et tensio	574,22	partium similiarum morborum duo ge- nera	8189,13
		partibus similibus primum eximen- tis fundantes feruntur acceptæ		partium similiarum proprium diuinitatem quod	

I N D E X.

quod	815,21	PECCARE quibus aut minus dicatur	983,60	Peponem natura & facultas	379,47
partium singularium singulis quae nutri- mentum suscipiunt, symptomata sunt	666,55	Pecata à falsae opinionis nascuntur	419,18	Peponum semen, renum calidos committit	379,52
partium singulare per quae custodienda sunt	911,13	peccata aliena quam nostra clarius perscrutans	419,64	peponum sunt uonum praeuocat	379,56
partium singulae per quae regionē pur- gentur	774,13	peccata in se a modum non adferant detri- mentum	1190,10	Periusti animo, qui ratione aduati alio nis trinitas	710,37
partium singularium, meatus in pblegmo- nis sunt reddendi fluentes	924,10	Pectinis ossa	137,64	Periculis arteriae nullis impositis	517,61
partium temperies quomodo conserue- tur	880,45	Pectore affectio paries miscenda sunt ea laplasmatis asstringentia	923,40	Periculis carporis humani una est	360,19
partium ulcerat erum, quae non in se sit succus utrosque, curatio	1169,22	pectori pblegmonem obfesso, quae medica- menta conueniant	940,32	Periculis & tueribus non mordende re- centes praequam iocum diuin sustine- re fuerint	417,17 & 34
partium utilitas triplex	314,12	pectoris excretionibus quae conducant	1090,31	Periculis esse quid sit	304,41
Partumetres quando in sella collocanda	82,57	pectoris excrementa educi cum duxi à medicamentis tenuantibus	835,63	Perigratorum pulsus	492,16
partumetres aegri medicamen conue- niens	1287,9	pectoris ossa res, quae coeque cum eo com- mittuntur	106,51. 249,17	Perisusio frigide calidit ex accidenti	976,21
partus & abortus differentia	16,13	pedes homini praestant esse sibi detestos, tem molles	210,51	Perisusio quid sit	319,49
Parturientes	709,50	pedi conuulsiuus motus quatuor	214,8	Pericardij situs	281,44
Parvigena Hecae quomodo componatur	115,11	Pedicularis morbi remedia	1195,17	pericardij substantia	218,55
Pascae animarum plurimum conseruat ad libitum bonitatem, uel malitiam	460,34	Pediculo in capite à quibus causis orien- tur	114,14	pericardium inuoluit cor	176,10
Pasilo fit ab altero	14,18	Pedioli, siue planta, metacarpij similitu- dinem refert	211,13	Pericardij quid sit	219,49
Pastili Amaranthi, ad uoluptates uen- triculi dissoluentes	115,14	pedis anteriores partes aduersionem per fuites comprehendens	212,26	Pericardij recipit propagines tenuis neruorum	219,17
Pastili diuise contra profusa sanguis ex crassitate oborta	866,59	pedis cauitas trum contemodum gratia efformata	114,55	Pericardij in morbis minus quibus con- tingit	1194,4
Pastili ex glacio ad inflammationes aures	320,44	pedis iuris inferior media inter mollem & durum	215,16	Pericardij in crassa meningi ortum, ad non illam annecti	255,43
Pastili nigri, Galeni compositio	117,21	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij accessio quid sit	810,5
Pastillum Aristarchi compositio & usus	114,4	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij arteria & quarta quae di- catur	810,43
Pastillum alio tempore usus, libet.	114,4	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij infectio	106,15
Pastillum ex succino confectio, quos barbari trochiscos de charate appel- lant	114,138	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastillum resacorum confectio ex Da- mocrate	1184,13	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastillum scilicet preparatio	117,159	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastillum Theriaci usus & compositio	117,16	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastillum Andronis	1209,60	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastillum ex chara combusta libet	64	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastillum ex Corallio	1245,55	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastillum sanguinem compingens	1178,46	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastilla, Aiani, & cari facultates	391,17	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastilla consideratio	118,45	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastilla usus	216,24	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Paste quae dicantur	846,11	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastigromatica quae	16,15	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pastu conuulsi ab quod ab alteratione et seclusionem continet	216,62	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pati medicum singula, ex similitudine genere	347,41	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61
Pati medicum caro	398,1	pedis motus à quibus de articulationibus proficiscuntur	212,41	Pericardij quae membrana	268,61

EPITOMES GALENI

sub seipso in seipso origo 114, 31
 Peritones quid sunt 115, 30
 Persus fructus in Persis letalis est, in
 Aegypto venenosus 116, 45. 1100,
 55. 1106, 52
 Persica ur non possit alios cibos munda-
 re 118, 11
 Perspirata carentia, celeritè putrescunt
 61, 56
 Perturbationes maxime faciliè deprehen-
 duntur ab omnibus, levis autem ne-
 quaquam 419, 54
 Perturbi membrorum ratio 835, 40
 Perturbi angularis 116, 16, 18
 Pes cerebri actus 115, 43
 pes hinc, quàm maximè maxime im-
 tat 211, 15
 pes quoque erga omnes apprehensorem
 104, 16
 Pestis conficiendi modus ad leniendis
 dolores colitis 911, 49
 Pestilens lues est arbori fera quodam,
 ab arvis purcedit oris, cui nihil ef-
 ficacius ebrietas medetur 117, 7, 61
 pestilentià ab Aethiis qui ratione Hip-
 pocrates abegit 117, 9, 4
 pestilenti febre que corpora faciliè
 difficiulter corripitur 781, 45
 pestilenti morbo corrupti fingendi 781,
 19
 Petasites quem habeat facultas 1101, 4
 Petroselinum 1101, 6
 Petroselinum 1101, 4, 1
 PHAGEDAENAS & ceteri cal-
 crati curatio 951, 51
 phagedæna quid 708, 50. 845, 17.
 1179, 14
 Phalangy alius effluat totum corpus
 775, 41
 phalangy morsus 744, 61
 phalangy quem nim habeat 1112, 18
 Phaleris cuius sit facultas 1104, 18
 Pharmacia artemia que dicitur 114, 0,
 13
 pharmacia cephalica unde dicitur, & qua
 facilitate sunt praedita 1160, 5
 pharmacia discentia quæ sunt 1133,
 49
 pharmacia fortis quæ intelligitur 1139,
 58
 pharmacia liquidiora minus sunt mole-
 sta 1164, 18
 pharmacia polytrechta ex contrariis con-
 flant 1175, 62
 pharmacia purgantia sunt simplicia, non
 reuerant possunt 994, 12
 pharmacia que disti subsistunt 1144,
 41
 pharmacia sola nihil sunt 1137, 1
 pharmacia sunt decem morbus 1137, 2
 pharmacia utroque suis facultates omni-
 bus 1190, 15
 pharmaci pharmaci compatiuntur & u-
 sus 1149, 60
 pharmacia benivola quando in boni

crania extendunt 1107, 49
 pharmaco alius cur interdum non cedat
 1004, 16
 pharmaco assumptio, piscina cremor est
 facilius 1104, 9
 pharmacum Acrium affectibus o-
 calorum acceptum 1113, 4, 6
 pharmacum anodynum conficiendi ratio
 1152, 18
 pharmacum Asclepiadis ulceribus diffi-
 cilibus 1172, 9
 pharmaci hysticon quod dicitur 1108,
 51
 pharmacum hepaticum nullum uetemen-
 ter refrigeret 1136, 42
 pharmacum Nicotati cardiacis diffin-
 itis; canonicis 1151, 48
 pharmacum urum multis affectibus opo-
 num hanc reperitur 1111, 4
 Pharynx 150, 19
 pharynx est causa effluionis, spiritus co-
 bibet, in ipsa uociferationis 44, 7,
 59
 pharynx principalissimum uocis instru-
 mentum 245, 48
 Phoselen & trias facies 1176,
 45
 Phoselenum caro 1197, 61
 Phoselen quem tenet nim 1082, 53
 Phidias 77, 47
 Philantia emittit est 420, 2
 Philonium stupefaciens 916, 40
 Philopoeia partes, naturalis, ratio-
 nis, moralis 110, 10
 philopoeia immores reddit à peccatis
 343, 27
 philopoeia omnium disciplinarum do-
 ctina 644, 1
 Phlegmonae incipientes rursus inuen-
 tate est ipsi affectus paribus u-
 cuant 997, 41
 Phlegmonae quando augentur 911, 3
 phlegmonae quando in furibundum degen-
 rant 1186, 11
 phlegmonae quoniam tenor superat ta-
 lorem, qui ratione curande 921, 10
 phlegmonae uocantur facillime per son-
 gnis detrahunt 985, 20
 phlegmonem curatio que sunt confide-
 randa 934, 15
 phlegmonem curatio 61, 55. 60, 61.
 706, 4. 931, 61. 1117, 59. 1149,
 65. 1150, 25.
 1151, 1
 phlegmones cur febris sequuntur 908, 3
 phlegmones erysipelatodes quod persi-
 nit 1089, 17. 1150, 14
 phlegmones nascentes quod uocant 1102,
 13
 phlegmones quarum calor tenorem se-
 perat, quibus medicamentis curare de-
 beamus 913, 12
 phlegmones testium & ubrum quod se-
 net 1118, 15
 phlegmonae affectionem particulam, nec ra-
 rarent, nec densiorem, nec duriorum

efficit 9, 6
 phlegmonae affligente uentriculum hep-
 at, peracutissimum est ante accen-
 sionem cibare 935, 10
 phlegmonae erysipelatosa, uel erysipelat
 phlegmonosum quod dicitur 944,
 10.
 671, 13
 phlegmonae est infulsi in uiculis inter-
 perantia 61, 46
 phlegmonae in ore quomodo curatur
 938,
 3
 phlegmonae partes affectus quando fieri
 fiunt 935, 9
 phlegmonae partium supernarum quæ ra-
 tione curanda 916, 18
 phlegmonae quando digerenda 915, 10
 phlegmonae quid 500, 43. 705, 64
 phlegmones accidentia quæ 716, 54
 59
 phlegmones à punctis uersus an-
 exant, curatio 917, 2
 phlegmones causa 1013, 16. 1013, 42
 phlegmones curatio, curatio est huma-
 rum 910
 phlegmones diffusio, quæ est altera cu-
 ratio, maxime optanda 612, 8
 931, 55. 943, 19.
 991, 9
 phlegmones scitib; eadem quodanno-
 do generantur & curatio 1155, 61
 phlegmones sedis remedium 1124, 11
 phlegmones suppurantis curatio 915, 11
 phlegmones concisionem que necesse
 est frequentare 61, 59
 phlegmonis hepatis commotionem ca-
 taplasma 921, 46
 phlegmonis incipientibus comodi adhi-
 bentur asringentia 1043, 936,
 60. 991, 37.
 1150, 8
 phlegmones in tabernula aut consensu-
 bus sensu, quod uocatur 1018,
 16
 Phoca 401, 18
 Phocæ facili uocis obstruant 408, 12
 Phocæ, de uis, palenta 1184, 65
 Phocæ facies 1112, 51
 Phocæ & musali epigastrii, omne in
 stomenta 102, 19
 phocæ que 761, 60
 phocæcerum infensia quomodo ab ar-
 ditione febrium delatio differat
 741,
 19
 phocæcerum pulsuum inmodica artri-
 tas, proximum denunciat syncope
 577,
 7
 phocæcerum solui multus à capite fuit
 & calidos 618, 14
 phocæcerum quæ requiruntur
 683,
 19
 phocæcerum causa materialis 577, 10
 phocæcerum diffinitio 741, 17
 phocæcerum in istis symptomata 762, 8
 phocæcerum nota principia quæ 1104, 13
 phocæcerum uaria symptomata 749,
 27.
 761, 12
 phocæ-

I N D E X.

phrenitis gignitur in tenui meninge, & in lepta transfusa	577, 13	exhalat	1025, 18	pisces mollescentes	406, 41
phrenitis quid	631, 16	pinguis omnis stomachum subducunt	377, 19	pisces qui in aqua transibunt spiritus ab- ducunt, & qui maxime	599, 10
Phrygi lapideis vis	1118, 65	pinguis que dicitur	1010, 11	Pisces faciles	409, 43
Phrygi habent ut febris, ita et pulsum beatum	576, 15	pinguis a calore liquefit, ad frigore co- firmatur	1006, 6	Pisces qui quam habent facultatem	1101, 3
phrygi oculi	583, 8	pinguis cur oculis circumspiciat	170, 0		
Pis faciles	1112, 57	pinguis ut contrahatur	48, 57	Piscine ut sibi, qualiter obtinent a- erem	181, 61
Phrygi quid	709, 13, 92, 17	Pis. rationem calorem circa prunas acras et ungui	490, 18	Piscine acide crudicatem designat	110, 15, 4
Phrygi dyacutias & diarrhas m- nas	1112, 64	Piper calidum	1014, 55		46
Phrygi quid	921, 16	piper cum aqua singulis diebus bibendum, ad quartum facit	961, 54	pinatate non per peculiaris instrumen- tum expurgatur	81, 5
phrygi & furunculi que discunt	1031, 19	piper cum cibo exhibendum per cruditi- tem	459, 43	pinus dulcis animati solutaria libidinis	44, 7
phrygi unde	955, 6	piper & vitru & differentie	1100, 0	pinus dulcis comestibilis est facit	30, 40
PLICATIONE quando utendum	41, 2, 3		48	pinus cruditas quomodo intelligenda,	81, 48
Picaronis vis	951, 15	piper nigri, albi, & elictio	460, 11	pinatate differentie	741, 1
Picaronis fructus vis	1101, 59	piper longum adhibetur, affluat aqua sola aut	1102, 13	pinatate in ore sentiri colligitur facili- tatem	701, 23
Pis ut ut faciles	1173, 62	piper longum quale sit eligendum	460, 20	pinatate paranda, cur nullum dolum sit instrumentum proclat ut estipes ex- crementis	705, 53
pis faciles	1101, 19		20	pinatate species diversae, earumque usus & faciles	701, 9, 79, 16, 4
Pis ut ut, & compositiones diversae	480, 18	piper quomodo singulum exiret	655, 52	pinatate frigida & benida	80, 19
		Pis quomodo excitari debeat	184, 4	pinatate frigida	61, 50
			34	pinatate gygas ardentia	616, 10
				pinatate in leuopis & pinatate denta ut per unum corpus habet	701, 8
				pinatate non desiderat excitari, sed magis aliter	1113, 8
				pinatate omnis sit albo colore, nec contri- sit	702, 52
				pinatate omnium vis in corpore haberi- tur frigida	48, 47
				pinatate oris necat corpus	84, 37
				pinatate oris ex cibo, non ex nosse cor- pore	55, 16
				pinatate quos morbo per oris	636, 65
				pinatate iussa computru	114, 7
				pinatate excrementis copiosius colendi mo- di sunt	116, 30
				pinatate per se	44, 17
				pinatate faciles	1102, 8
				pinatate centurion facili	406, 11
				pinatate agrestes que	116, 68
				pinatate ossa	111, 7
				pinatate calices facient ad dentium de- lites	117, 14
				pinatate agili succos, sanguinis effusivitas opinionem remedium est	166, 10
				pinatate vis	1074, 17, 1113, 88
				pinatate metaxo apio omnia porporum responant	111, 15
				pinatate pedis cur glabra	52, 8
				pinatate pedis quomodo constat ostibus	140, 6
				pinatate pedis unde sentiat	115, 50
				pinatate pinosorum vis	111, 53
				pinatate simonia non animi est	71, 21
				pinatate non uest singulis corporum que sibi desunt	111, 60

EPITOMES GALENI

Placoti faciles	1101,11	pleuritis eorum pulsus quales	655,13	potenta quibus pleuriam & quibus ul-	
Plato de uero	776,16	pleuritis insuperant respiratio à solo se-		mus alimen praesit	Ibid. 61
pleuritis circa febrium subtilitas duplex		pto transverso perficiunt	731,61	Polyas	1101,48
error	950,51	pleuritis ex aequali qui pulsus signifi-		poly miniis faciles	Ibid. 51
pleuritis de elementis sententia	349,10	cat	602,41	Pulsus quor oppositus quatuor digitis re-	
pleuritis de ueritate sententia	343,20	pleuritis incerta quae	761,46	ligant	39,6,19
pleuritis de uisione sententia	347,10	pleuritis quod confertur	1089,18.	Pulsus motus unde	158,16
pleuritis eponia de Dre	356,6	1155,	60	pulsus tendentes cur tales	200,15
pleuritis eponia de inspiratione & respi-		pleuritis crude signum, nihil stare		pulsus tendentes & musculi	209,61
catione cognoscitur	353,35	631,	5	Pollutiones feminis contra sunt abspu-	
pleuritis sententia de corde	342,15	pleuritis expositae symptomata	760,	re	105,14
pleuritis sententia de flaua bile	350,	44		Polybrestra relinquenda ab his, quae ad singu-	
65		pleuritis generatio, signa & sympto-		las affectiones parantur	2180,7
plata tres animae facultates, tribus rei-		mata	26,31. 623,1. 615,4.	Polybrestra regula	66,4,7
pub partibus comparat	351,61	715,	12	polybrestrae in eorum suo celebris naturam	
Pleuritici contrahentes breues sunt, du-		pleuritis insuperabilis symptomata		est imitator	318,16
turne contrahentes	618,13	761,	34	Polycremon quon habet ueni	1101,2
Pleuritidis ad uires non requiritur ne-		pleuritis proprium signum est serratus		58	
cessaria magna humorum colluctas		uocatus pulsus	574,13	Polygala quon habet ueni	Ibid. 15
698,	18	pleuritis symptomata quatuor semper		Polygenetis	Ibid. 39
pleuritis perpetua adest tumor & pu-		se ostendunt	500,57	Polygoni faciles	1104,18
dit	700,1	pleuritis putorem differentiae pro uir-		Polypti descriptis, causae & remedia	
pleuritudinis ad frigiditatem insensibilis		ritate humorum can gignuntur		1111,	45
tu indicium est grametis	698,13	760,	54	Polyptides	909,56
pleuritudinis species quibus notis sunt di-		pleuritis maris accidentis pro differen-		Polyptidis quiditas	1102,63
stinguenda	700,58	tiis humorum à quibus gignuntur		Polyptidem deesse operam, ut cum deo	
pleuritudinis uariis quoniam quid-		374,	53	ro uen morbanda cadit	1274,13
tas, quibus signis de finienda sit		pleuritudinis differentiae	516,20	Poma praerocae quae	417,64
994,	33	pleuritis necessarii sequitur infus	27,	poni pluribus facultas	1079,49
pleuritis ad uires, facilius in putredinem		13		Pompholyx optatum oculorum fluxioni	
abit	994,5	pleuritis et in quibus quando fiat	760,	bus medicamen	115,63
pleuritis distentia, dicitur uerba nasa		43		porphyry quibus uilis	1114,60
697,	23	pleuritis indicari potest die trigesimo-		Ponderum medicamentum nomina quae sunt	
pleuritis duplex, quoniam utraque egrit		quarto	619,50	1290,	10
uacuatione	696,46 990,10	pleuritis quod	31,23-574,47-731,	Populis sile uia ab uero administrantur	
pleuritis graues etiam si non distendit,		29,	971,31	musculi	157,64
ad uires sensitives si ferunt, non aut		Plexus reiformis	315,18	populis musculis silebit genu	317,6
ad naturales	697,39	plexus reiformis elaborat animalium spi-		Populi alba uis	1099,16
pleuritis uerba nasa reperitur in rebus		ritum	344,71	populi alba temperata	1067,33
quod maximis	Ibid. 12	plexus reiformis ex pleuritis arteris co-		Porcelli quales nutrimentum exhibent	
pleuritis maior colligitur byeme & ue-		teritis	115,56	392,	47
re	701,16	plexus reiformis recipit productionem		porcellorum pedes coniecti in prisaum,	
pleuritis secundum uasa quae ducunt		quandam et crassa minge	264,17	milicem reddunt	393,57
700,44- 899,17- 990,		plexus reiformis ubi locatus	352,52,	porcellum hesternum quon recens neta-	
18		316,51,	318,16	tor, facilius conuolui	323,14
pleuritis secundum uires quae ducunt		plexus reiformis uenis caret	149,9	Pori quomodo generentur	1186,13
700,43- 732,81- 899,15-		plexus uisum circa uires & motum		pori uisus felis, ueni gratia confundi	
990,	20	caus gratia sit salus	318,11	211,	34
Pleuritis cammediosum uacuat uenae		Pleuritis uires	211,58	Porvici hilem excipitium sunt	Ibid.
scissae	302,23	pleuritis faciles	112,42	54	
pleuritis curatio	937,13	pleuritis lancia adnota lumbis, notatur		Pori agrestis faciles	1069,39
pleuritis quomodo sunt uacuat uenae		pollutiones egeret	1114,13	Porte quod	120,58 217,48
1198,13		pleuritis uisum mole & pondere au-		porta ueni cur ducit	28,24
pleuritis quod	482,42. 700,61,	grui	Ibid. 9	Portulae uis	322,12. 1070,48,
916,	13	pleuritis uisum quibus condit ad offi-		120,4,	27
pleuritis bant omnes egeret uenae scis-		bus	Ibid. 39	portulae stuporem dentium facit	13,
ne	989,16	Pleuritis aquam Caleni non probat		61,117,11,	1070,13
Pleuritis cor acule febricitant	574,48	461,	14	Posca dissoluta grametis	867,16
pleuritis quomodo sunt uacuat uenae		PODAGRICE uacuat sunt ex		Posidani semina illustri	71,55
Hippocratem	916,5	caus	996,15	Posidani indicat partem offi diti	727,18
pleuritis et peripneumotici cur caput		Polemomy uis	1102,44	Potomogiton quon habet ueni	1102,
peripneumotici	574,64	Potentia	415,50	61	
pleuritis secundum uenae in cubito partis		potenta epota cum uino austere, uentrem		Potentia naturae alie, in quibus robu-	
afflicta	996,5	defecit	371,60	stiores ueni ueni, ueni alie sunt	
pleuritis unde semper duriores habent		potentia luidissime unde fiat	Ibid. 55	692,	17
quon peripneumotici	604,43			poten-	

pudendi infans duo	304,61	puerum educatio similis culturae plas-	lerem evacuatiorem	117,14
pudendi uerum totum	181,60	terum	414,15	pulmonis calida intemperie affecti notis
pudendi partes mulieres uiriles sunt si-		puerorum et infanticum indicio medi-	600,	57
mus, nisi quid sint uiriles	393,4	cus à coquo mi differt	646,6	pulmonis caro, detractionis aeris primam
pudendi infans casus	304,62	puerorum ingruia omnia ad affectus sunt		arguunt
pudendi uirilis; epiphyseos etiam graui-		propense	414,24	pulmonis caro laetissima nutritur et pe-
construitur	203,8	puerorum pasci ad uirtutem natura pro-		spitans sanguine
pudendorum inflammationem que opor-		pensi	71,50	24,2,53
teat	1104,7	pulmonem substantia car minus carerit		123,1
pudendorum pili calui gratia erui	399,2	egroti praesidio uacante	901,54	pulmonis caro quibus, et quod uisum per-
pudendorum infans casus	146,38	puerorum substantia car copiam famili-		stet
pudendorum ulcera diuulserandi ratio		mi digeratur	903,51	24,1,49
3265,	36	puerum iam habili ad ludem reddito, quod		pulmonis dolores car rempessus sunt,
pudendorum ulcera, quibus medicamenta		peragenda	455,6	quam thoracis
possunt	871,46	puero post cibum, quoniam debetum carpe-		65,4,20
pudendorum ulcera quibus phlegmaticis in		rit, car non statim sui debendum		758,17
digunt, et quando curantur		414,	49	pulmonis exsternum curatio
1265,	41	Puerperae, aut quibus menses fluunt, car		868,6
pudendorum ulceribus quid obferat	1071,	facile refrigerantur	397,6	173,4,2
pudendo non sentiens remedia	1165,63	puer quousque exercitum debet	446,10	816,5
pudendum uirile car preparatione habet		Pugili nota est P.	329,45	pulmonis inflammatio que sit
glandularum auctum	120,46	pugilis quid continet	181,43	758,14
pudendum uirile quale	199,1	Pulchritudo adueniens ubi ornatur		pulmonis inflammatio symptomata
Pueri car non sunt immutandi cogens ad		513,	31	734,
modum	431,6	pulchritudo anime in quibus consistat		62
Pueri opino gradum corporis habuit,		181,	31	pulmonis intemperie et quibus et tu-
autem quousque mores inest patet fortun-		181,	31	quid uirtutis
ta	413,15	pulchritudo arte non exaltata inuoluit	1,63	758,12
pueris potio frigida à cibo est commoda		pulchritudo corporis in quibus consistat		pulmonis quatuor lobus comae gratia con-
435,	32	181,	24	ditur
pueris admodum acutus, calorem illius so-		pulchritudo uera ad quid refertur	277,	213,61
let	183,8	277,	24	pulmonis quintus lobus uirtus substanti-
Pueri carent patiente	336,19	pulchritudo uera in quibus consistat		etiam uirtus carum
puer car magnis dilatactionibus arteria-		360,	1	240,19
rum egrotant	566,14	pulchritudo uera quod dicitur	196,50	pulmonis sicut indicio
puer car simulanti	718,55	Pulegius facilius	1076,5	600,43
puer moris perspicui sunt tercio sepe-		Pulmo agnitus, porcinus et uulpinus,		pulmonis structura inspirantibus aerem
nis	415,58	quibus affectibus confrant	117,6	omnibus eadem
puer quoniam puberes, car plus et cre-		pulmo à thorace uidetur distare in anima		186,47
bris respiciunt	486,57	lobus quomodo colligitur ex aliis	191,10	pulmonis substantia laxa mollis; eam
pueris ante decimum quartum annum fan-		pulmo car bellissimum fieri non possunt		sit, à pinatissimo inflammatur sangui-
guis non est amittendus	991,7-910,	807,	31	ne
44		pulmo quoniam in iis qui geruntur uero ad-		576,19
pueris car permittendum sui uisibili, que		modum habet	506,63	pulmonis tuberculo orto, quid sit respi-
non inspicitur leuatur	1006,36	pulmo et dexter cordis uentriculus qui-		ratio
pueris secundum septemnon ingressi tem-		bus adit	335,14	716,54
peramentum	415,45	pulmo ex se motus expers, mouetur ad mo-		pulmonis tuberculum que ostendunt
pueris maioribus duplex fricandi et leu-		tum thoracis	335,49	757,
uandi tempus	414,42	pulmo fieri respos expers	495,1	43
pueris opino imperatis car interdum		pulmo frigida fluxione inflatur quid		240,64
dam sit uirtus	415,10	edat respirationem	601,10	pulmonis uasa à quibus occasionibus re-
pueris plurimum inest spiritus habitus		pulmo medicus circulator similis		puer
1035,	15	416,	31	758,17
pueris post decimum quartum annum, quid		pulmonem et dextro cordis uentriculo ca-		315,
do sanguis mittendus	910,51	retur animalia ex arte non respira-		115,
pueris rationem esse imbecillam, uolent		ta	339,19	pulmonis uasa quo ordine proprie in-
autem euadere curia quoniam dicitur		pulmoni car maxima uera sit à corde in-		pleantur uentris
autem	314,13	plantata	314,43	348,43
pueris uerbosiores pluresque affectus		pulmonem inflammato abstinentem ab a-		pulmonis uasa tria, et unde oriuntur
quam adultas obornantur	313,41	ferantibus	92,46	240,
pueris uera non est scienda	991,10	pulmonem inflammato applicando cura-		pulmonis uale descriptio si inflammatio suc-
pueris uirtutem non habent imbecillia-		bita, si prius corpus sui uacuationem		eris, car afflicti nequeat consolida-
rum, expulsi rationem non admodum for-		181,	51	186,18
tem	691,64	pulmonem interuenit, interuenit uicem		pulmonis uis respuen. quando infanabile
puerorum calor mitis	47,25	cordis dextrum uentriculum	315,18	sit
		pulmonem amia infusa, que facili ad et		669,53
				pulmonis ulcera et quod carum 714,
				10
				pulmonis ulcera car difficiat sentia
				sunt
				167,64
				pulmonis ulcera et mali sunt crescentia et
				tralla, infanabilia prorsus sunt 871,
				10
				pulmonis ulcera in indeplentis carum
				per tria
				871,15
				pulmonis uicem diquendo per uirtutem
				purgetur
				774,10
				pulmonis uis
				331,63
				pulmo non quoniam uerbosiores dolore cru-
				clatur
				717,15
				pulmo metitur sanguine uaporis et
				no
				315,62
				pulmo

I N D E X.

- pulso omnia celeritatem cordi delationem 600,43
 pulmo per quos uis purgans 18,41
 pulmo per se non mouetur 761,14
 pulmo quide prebat nutrimentum 395
 pulmo sensu caret 731,28
 pulmo solus inter omnia uisera ex corde nutritur 77,13
 pulmo spiritus promptuarii 115,64
 pulmo uisus et respirantis instrumentum Ibid.50
 pulmo uocis gratia et respirantis conditus 115,11
 Pulsus infanti 112,59
 Pulsus arterie dicuntur quando sunt in una dilatatione inaequalis 113,12
 Pulsus duri crebritates, mollibus raritates autem esse 116,17
 Pulsus peritricorion quodam adit peritricorion 117,17
 Pulsus celeri modo magnitudo, modus aduenit crebritas 113,45
 Pulsus cui motus fuerit ut lenis sit utianda 113,62
 Pulsus inest grana quies 119,15
 Pulsus gignendo inaequali que requirantur 119,42
 Pulsus magno gignendo quid requiratur 119,18
 Pulsus uermiculi fuerit formicans 117,13
 Pulsus uersosus et uermiculi que conueniunt et que proprias 117,16
 Pulsus uersosus succedit uermiculus 118,10
 Pulsus aboliri hiforion 119,15
 Pulsus cuius proprium e peritricorion 112,40
 Pulsus duri duri aut mollem ex acciderit 116,16
 Pulsus diffinitionem simul et maximam non reperiri inquit 114,0,2
 Pulsus esse nifion motum cui Zenon 117,57
 Pulsus moderation et immediatam utianda ratio 114,61
 Pulsus uermiculatum ab uersosus non quilibet, sed quantitas sola distinguit 117,54
 Pulsus partes priuata, non magnopere laeduntur 101,64
 Pulsus absolutus aequis 112,17
 Pulsus absolutus aequis non admittit fluctuationem 112,16
 Pulsus absolutus inaequalis 112,18
 Pulsus absolutus magnus et paruas qui di casus 111,46
 Pulsus absolutus ordinatus, partes sortitur circulus omnes 112,43
 Pulsus absque uermiculis latum protrudere non potest 110,33
 Pulsus a cordis calore uariantur 110,14
 Pulsus aequalitas quomodo iudicanda utiand 117
 Pulsus alii latius ubi errantur 111,16
 Pulsus alii qui sunt dicendi 115,12
 Pulsus alius quando excretionem significat 606,51
 Pulsus angustae 117,17
 Pulsus angustae laborantium 118,18
 Pulsus arteriales et circumuoluti unde gignantur 114,9
 Pulsus ante alia omnia indicat conuulsum cause constitutionem 117,15
 Pulsus a quibus mutari possit 119,49
 Pulsus 112,4
 Pulsus arhythmus triplex 111,48
 Pulsus bis seriens, interperit cordis corporis proprii symptoma est 117,4
 Pulsus breues qui dicuntur 118,12
 Pulsus calidiorum 111,15
 Pulsus calidi inest corporibus 113,15
 Pulsus calidi copioso qui sunt familiares 114,2
 Pulsus capricios 119,18
 Pulsus capricios quando gignantur 118,50
 Pulsus capriciosus dicuntur discrimen 113,13
 Pulsus cathecōn 117,15
 Pulsus celer et tardus qui sunt 114,42
 Pulsus celerior, calidius temperamentum tardior, frigidius dicitur 118,15
 Pulsus celeritas et tarditas quid 110,55
 Pulsus celeritatis quando gignantur 114,20
 Pulsus celer, tardus et moderatus qui 119,59
 Pulsus circulator inordinatus 112,48
 Pulsus comitatus, pulsibus apoplethico non sunt similes 118,6
 Pulsus contentus quis 113,13
 Pulsus contrariationem sentiri 119,10
 Pulsus conuulsiu conuulsi, 114,18
 Pulsus conuulsi et uibrati 118,11
 Pulsus 119,3
 Pulsus comotus 117,45
 Pulsus cuius gratia instituti sunt 113,11
 Pulsus cui suus inaequalis, partibus arteriosis inflexionibus 114,13
 Pulsus decretionem excretionem indicantur 111,39
 Pulsus decurtati deficientes 113,13
 Pulsus decurtati reciproci 116,15
 Pulsus decurtati significant facultates inbecillitatem 119,45
 Pulsus decurtati unde proueniunt 116,61
 Pulsus deficientes reciproci 113,41
 Pulsus deficientes myari 111,1
 Pulsus definitio essentialis 117,12
 Pulsus dicitur frequens, rarus et moderatus, pro ratione quietis interducentis systolem et diastolem 111,6
 Pulsus dicuntur qui necessarii etiam uibrati sunt generati 116,15
 Pulsus dicuntur 119,18
 Pulsus dicuntur qui dicuntur 116,1
 Pulsus dicuntur, siue iterum seriens, non dicitur sed uis tantum pulsus est 112,42
 Pulsus dicuntur uibrati unde 116,12
 Pulsus differentie in dilatatione quantitate 110,43
 Pulsus differentie uis in parte inaequaliter inaequalis 111,49
 Pulsus diffinitionem quiete interpellationem differentie 118,1
 Pulsus dolorifici quid sentiantur 115,8
 Pulsus dormientium 113,18
 Pulsus diuersi, partes nervosae edidit 117,64
 Pulsus duri et molles ab arterie tonice mollietate uel duricia sunt 116,16
 Pulsus duri proprii est peritricorion 113,15
 Pulsus duri simul paruas, autem ferre sunt uibrati 118,18
 Pulsus durissimi unde accidunt 119,15
 Pulsus diuersi et molles ad tonicas arteriarum referuntur 110,59
 Pulsus duri, partes spiritus et diu et efficitur 110,12
 Pulsus duri citra uibrationem quid signifi- cant 119,12
 Pulsus elephantiasis 119,24
 Pulsus elephantiorum 118,39
 Pulsus eorum qui sompferunt elebantur 118,63
 Pulsus epilepticorum 113,10
 Pulsus epileptorum apoplethico sunt similes 111,1
 Pulsus est datus caloris fermenti gratia 110,7
 Pulsus est naturae opus 119,1
 Pulsus et respirantis non idem uisus: et quibus uarietibus persuaderi possit 119,39
 Pulsus eurythmus inuoluitur et uisus 112,47
 Pulsus eurythmus qui dicuntur Ibid.51
 Pulsus expectoratum a summo 113,45
 Pulsus 117,4
 Pulsus facultatis oppressae 114,45
 Pulsus facultatis solutae Ibid.44
 Pulsus facultatis uitalis solutae ob alimentum inopiam Ibid.53
 Pulsus febrium pestilentium parum a natura recedit 119,12
 Pulsus sui a corde et arteriis 111,18
 Pulsus florentium 113,1
 Pulsus fluctuosus 111,64
 Pulsus formicans est omnium minimus, non tantum celer 111,16
 Pulsus formicans non est celer 112,15
 Pulsus 114,2
 Pulsus formicans qui dicuntur 112,15
 Pulsus 119,11
 Pulsus formicantes quando gignantur 117,1
 Pulsus frigidi cordis temperiem committunt 119,18
 Pulsus generationem uero 113,15

pulsus gracillimus 512, 56. 567, 60
 pulsus gracillius simul et uideretur o-
 mni domensione confusus 542, 50
 pulsus brevis etiam marcescentium
 communis 516, 42. 576, 4
 pulsus brevis qui 512, 4. 575, 59
 pulsus hydropicum 518, 55
 pulsus interictum 518, 61. 579, 15
 pulsus comitati recipitur 531, 6
 pulsus uniuersatur et à regionibus
 569, 65
 pulsus inaequales à quibus causis pro-
 ficiantur 559, 12. 569, 14
 pulsus inaequales infestis, qui magnum
 aliquod facinus sunt aggressi
 64, 8
 pulsus inaequales quando per crises sunt
 64, 4
 pulsus inaequales qui sit ordinatus, rari
 repetitur 577, 5
 pulsus in aetate quales 569, 3
 pulsus in inflammatione omnium ferrati-
 lis 515, 4
 pulsus in hyeme quales 569, 8
 pulsus in nullis febribus intermissione ad
 fluxum naturalem recurrere poterit
 quum in epidermide 956, 18
 pulsus in omni genere moderates immo-
 deratus inueniendi ratio 546, 27
 pulsus uideantur in absclusa consistit
 circoscium in epidermide 52, 51
 pulsus morbi natus suspicetur ibid. 44
 pulsus in quibus paruis clarus percipitur
 512, 9
 pulsus inter aequalem et inaequalem nul-
 lus est medius, sicut neque inter ordi-
 natum et inordinatum 512, 13
 pulsus interictuales 562, 51
 pulsus interictuales 571, 13
 pulsus inuicem, intermittenti ad-
 iungitur 590, 40
 pulsus intermissio quid 511, 5
 pulsus intermittens 525, 35. 561, 27
 pulsus intermissi non pertractantur in
 raris 590, 55
 pulsus intermittentes minus ordinati per
 motus senes et pueri, quum huius-
 modi ibid. 1
 pulsus intermittentes à quibus causis oria-
 tur 561, 40. 569, 14. 590, 45
 pulsus in ure quales 586, 64
 pulsus in utero, per omnia matris, accre-
 scuntur incipit natiuitas 599, 18
 pulsus uterum alius 585, 14. 565, 15.
 573, 6
 pulsus inuicem est maximus 562, 16
 pulsus longius lenius conuertendi
 519, 52
 pulsus longius et uerbens quid
 510, 58
 pulsus lenitiae 571, 6
 pulsus lenis quando accidit 565, 43
 pulsus longus, breuis, lenis, expulsi, al-
 ti et humilis, quos 510, 2. 532, 12.

565, 57. 566, 7. 571, 30
 pulsus lethargicorum 516, 65. 576, 45
 pulsus magnitudine corp. non contenti bu-
 mery cognoscimus 550, 37. 551, 54
 pulsus magni et ceteris causis quos
 54, 22
 pulsus magnus et parvus sub praedi-
 camento ad aliquid est, et quantitatem
 significat 512, 4, 8
 pulsus magnus et uerbens brevis aut
 quam adit 599, 4
 pulsus magnus longus, lenis, alius, uer-
 bens, mollis, celer, frequens, aequis
 ordinatus et his ceteris, quos dicitur
 512, 32
 pulsus magnus, parvus, gracilis, hargidus
 qui 512, 3
 pulsus magnus praefertit fluxum san-
 guinis et uerbum 641, 62
 pulsus magnus vel parvus, quando dicitur
 546, 22. 554, 53
 pulsus maioris et illi, consistit quinquaginta
 sex differetias 511, 19
 pulsus marcescentium unde quos est et
 quibus, cum consistit in solidis partibus
 516, 16. 575, 54
 pulsus maridorum simul cum inflamma-
 tione quales 576, 1
 pulsus maximus, et leuissimus simul et cre-
 berrimus quid significet 595, 10
 pulsus maximus et uerbens, inordinatus, ual-
 idem fieri compressionem 574, 40
 pulsus maximus quid dicitur 511, 41
 pulsus medius omnes sunt naturales, pre-
 ter eum qui habetur uel in uerbem-
 tem et longius 554, 55
 pulsus medius uel longius et uer-
 bens quomodo dignoscatur 561, 43
 pulsus medius qui naturalis sit, nullus in-
 ter longius et uerbemtem dicitur
 586, 45
 pulsus meturmum 515, 18
 pulsus minores efficit facultates extremi
 deinde 588, 9
 pulsus moderati non agere consuetudine na-
 turales 55, 18
 pulsus moderati soli singulis generibus in-
 diuisibiles sunt 513, 16
 pulsus moderatus est inueniendus 544, 40
 40
 pulsus moderatus ex sole motus qualitate
 explorandus 547, 46
 pulsus moderatus in quibus non re-
 puitur 510, 46
 pulsus moderatus qui dicitur 564, 60.
 582, 31
 pulsus moderatus quomodo iudicandus
 546, 6
 pulsus moderatus quos modis dicitur
 585, 19
 pulsus mortuum 515, 17
 pulsus mollissimi causae 561, 10. 600, 14
 14
 pulsus mollissimi sunt, qui ex effluuiis ure
 et pulmonis oriuntur 604, 6

pulsus mulierum quum uirorum celerum
 est 547, 43
 pulsus mutatur ab acquisitis habundis et
 improprietatis prouide ac a naturali-
 bus 511, 4
 pulsus natus qui 516, 42. 520, 63
 pulsus natura calidiorum 567, 55
 pulsus naturae optimae, aliorum anomum
 regula est et mensura 545, 12.
 564, 16
 pulsus naturalis cur dicitur semper uideat-
 ur 564, 53
 pulsus naturalis memoria tenendus 510, 5
 17
 pulsus nec celeres, nec magni esse pos-
 sunt, nisi alius posuerit 559, 24
 pulsus nunquam fuerit perfecti tardi non
 perueniunt facilius ualida consistunt 555, 34
 pulsus omnino intermissus, mortem refert
 590, 7
 pulsus omnium personarum qui 591, 18
 pulsus optimae constitutioni periculosus
 quales 569, 19
 pulsus ordinati inordinatis, causae 560, 18
 pulsus ordinatus in circumscriptione prius et
 513, 39
 pulsus ordinatus inordinatis, quomodo
 discernendus 516, 35
 pulsus erit optime acutus 516, 39.
 578, 32
 pulsus paralyticorum 518, 2. 578, 12
 pulsus pariter per accidens arteriae quie-
 tes dicitur 541, 8
 pulsus per alios quid 511, 4
 pulsus per laues arteriae fit 496, 18
 pulsus peripneumoniarum 516, 54.
 576, 17
 pulsus phreniticorum 517, 8. 576, 59
 pulsus phibiticorum 516, 52. 576, 62
 pulsus pleuriticorum 516, 8. 574, 17
 pulsus pleuriticorum celer, durus, uisus
 quam febri expedit, nec non crederi
 est 574, 51
 pulsus pleuriticorum si in maiorem cre-
 bratatem mutatur, uocatur peripneu-
 moniam, aut syncope 55, 6
 pulsus praegestum magis, arduiores
 et celeriores 570, 7
 pulsus prauus quid 512, 17
 pulsus profusus de robore facultatis ni-
 tatis 514, 50
 pulsus prauus quos sit paruos 544, 44
 pulsus prauorum celerum, magni, et cre-
 bri 565, 10
 pulsus prauitatem super ordinatum
 516, 19
 pulsus quomodo et quibus de causis mutetur
 445, 141. 594, 53
 pulsus quid 519, 14. 516, 45
 pulsus qui excretionis criticae significet
 641, 60
 pulsus qui inter se scire possint et non
 540, 4
 pulsus

I N D E X.

pulsus qui naturae modum egressi sunt, quomodo cognoscendi	510,40	ris facultatem possidere declaratur	585, 7	pulsuum differentiae pro miselle modis, quibus facultas et instrumenta misceantur	557,20
pulsus quomodo dignoscatur	514,61	pulsus vibratus unde fiat	563,33	pulsuum differentiae pro modo cibi assumpti	514,13
pulsus varius et creber qui dicitur	537,49	pulsus auriens ac malarum quales	512,50	pulsuum differentiae pro multitudine uel duritie organorum	516,20
pulsus varius unde gignatur	590,12	pulsus vitalis facultatis est opus	59,41	pulsuum differentiae pro varietate dolorum	515,14
pulsus reciproci de cartis	593,43	pulsus undulosi et nervicantes sua differunt quantitate	563,26	pulsuum differentiae quatuor dum facultates simul et usus mutantur	555,47
pulsus redolentes uerberantes per bonas indicationes	572,1	pulsus undulosi ex humida mollitie arteriae nascitur	593,60	pulsuum differentiae secundum aetates	544,40
pulsus scitis	512,60	pulsus undulosi nunciat sordem	643,18	pulsuum differentiae secundum diversas synopes	515,4
pulsus sensibilem et bibitoris contrariis nec, quid sit debeat	540,34	pulsus undulosi quando sudorem decretorium promittit	592,53	pulsuum differentiae secundum diversa tempora	513,167,64
pulsus scitum, paru, tardu, et rari	568,14	pulsus undulosi quomodo fiat	527,43	pulsuum differentiae secundum motum sunt tres	519,56
pulsus simpliciter brevis qui sit	566,15	pulsus undulosi semper in altis soporibus est	576,49	pulsuum differentiae secundum quietem arteriae sunt tres, rari, creber, et medius	521,43
pulsus simpliciter magnus qui sit	551,43	pulsus animi inaequalitas a si de arteriae profecta	527,37	pulsuum differentiae secundum tempora, referuntur ad usum, facultatem et instrumenta	569,32
pulsus sine quibus magis non possit	510,6	pulsus unius motus, proprius est ad alterum	519,46	pulsuum differentiae viginti septem	532,4
pulsus suffocationis productae ab utero	513,33	pulsus voluptatis	515,16	pulsuum differentiae pro varietate humorum exasperationem	701,14
pulsus suppurationum	575,27	pulsui abolito a deficiente pulsu differunt	561,20	pulsuum differentiarum genera, Arabi generis propter quatuor qualitates vocant	514,20
pulsus uinoris	573,19	pulsuum aequalitas et inaequalitas quomodo cognoscenda	547,51	pulsuum dignotionis, admodum longum tempus desideratur	518,18
pulsus totius corporis, antequam cor contrahat partem prius efficitur, perturbabit in conuersione alterationem non potest	600,13	pulsuum alterationes quae a quibus causis magis proficiuntur	551,47	pulsuum diversitates deprehendendi ratio	541,5
pulsus tremulus quid indicet	594,12	pulsuum bis seruatam generationes tres	592,24	pulsuum duorum mens intermissis, Coddens dubitas an quatuor uicibus possit	589,50
pulsus tristitia	573,15	pulsuum celeritas a quibus causis eriri possit	553,26	pulsuum diuersis a quibus augetur	575,24
pulsus uacuus quomodo intelligendus	535,8	pulsuum celeritatem uel tarditatem in cognoscimus, neque temporis neque interualli quantitas spectanda	546,55	pulsuum essentialis definitio, quae breuitas sit, nullae essentiae potest	556,19
pulsus uariari in animi perturbationibus	649,4	pulsuum cognitoris permutationes, tria sunt spectanda	544,19	pulsuum et respirationis similitudo	507,23
pulsus uariari pro ratione diversarum causarum	541,60	pulsuum crebrius et uel tarditatem in cognoscimus, neque temporis neque interualli quantitas spectanda	546,55	pulsuum et respirationis unde colligatur eundemque esse usum	506,26
pulsus uerberans, longidus, durus, mollis, plenus, uacuus	521,15	pulsuum cognitoris permutationes, tria sunt spectanda	544,19	pulsuum examen quatuor in modum fit	544,4
pulsus uerberans magnusque quibus adijci	540,37	pulsuum crebrius et uel tarditatem in cognoscimus, neque temporis neque interualli quantitas spectanda	546,55	pulsuum generandorum primae causae sunt usque ad facultates	600,19
pulsus uerberans, semper a facultate reboratur	586,11	pulsuum decurtatorum dignoscendorum ratio	591,4	pulsuum generandorum usque duplex	580,29
pulsus uerberantes sunt ualidi contrariam di	589,55	pulsuum decurtatorum discrimen	561,13	pulsuum generationis causae continentes sunt tres	559,58
pulsus uerberans est proprium creberrae	551,24	pulsuum decurtatorum duplex genus	591,1	pulsuum inaequalitas contingit interdum ob sanguinis copiam in urnas et in arterias infusam	560,54
pulsus uerberamentis optimis	591,18	pulsuum decurtatorum a sferentiae in quibus constant generibus	525,63	pulsuum inaequalitas quid	511,33
pulsus ueloces tardus sunt secutores	590,62	pulsuum differentiae diuersae, pro uariis et uentriculi affectibus	511,16	pulsuum inaequalitatem compositae ibidem	55
pulsus uelox unde oritur	491,2	pulsuum differentiae in distinctione, secundum singulas diuersitates, sunt nouae	519,61	pulsuum inaequalitatem simpliciter ibidem	50
pulsus uermicatus	514,50	pulsuum differentiae in trinis simul diuersis in quibus acceptum sunt septem et uiginti	510,2		
pulsus uermicatus et formicans sibi mutuo succedunt	542,11	pulsuum differentiae pro balneorum diuersitate	514,1		
pulsus uermicatus infirmum facultatis denunciat	592,46	pulsuum differentiae pro exercitiorum diuersitate	513,30		
pulsus uermicatus quid accidat	511,60	pulsuum differentiae pro inflammatione et paruum inflammatorum naturis diuersis	539,55		
pulsus uermicatus solus sine si bribus accidit	592,63				
pulsus uermicatus et undulosi unde disti	563,49				
pulsus uermicatus quibus afficitur accidit	571,47				
pulsus vibratus quando accidit	515,1				
pulsus vibratus	519,6				
pulsus vibratus acrius quid gignatur	597,8				
pulsus vibratus si adijci, nonnulli robore					

pulsam inaequalitatis, quae secundum di-
uersas arteriae partes fit, differentiae
536, 11
pulsam in contraria affluunt permuta-
tionem quod proprium 562, 15
pulsam in contrarium et eundem tractum
causa 59, 4, 11
pulsam intermittentem quae existat per
nocturnos 591, 23
pulsam linguam quando per universum
corpus, et quando in una parte ac-
cidit 605, 30
pulsam magnitudinem ut si ex qua duo occa-
sionibus possit 555, 32
pulsam mutationem a causa extrinsecam
modo discernende 520, 61
pulsam mutationem primam et simpli-
cissimam in celeritatem et tarditatem
535, 55
pulsam mutationis differentia triplex
517, 36
pulsam mutationis in paritatem, tres
numeros sunt differentiae 571, 42
pulsam myororum differentiae multipli-
ces 32, 1
pulsam cordis perturbatio quid signi-
fiet 594, 18
pulsam et quid indicet 59, 17
pulsam primario in corpore alicui non
quam cadere possit 532, 8
pulsam pro cuius quantitate mutatio
572, 18
pulsam pro dolorum varietate mutatio
571, 27
pulsam pro exercitacionum varietate
mutatio 571, 19
pulsam pro inflammationis ratione mu-
tatio 571, 44
pulsam pro varietate caliditatis balneorum
mutatio 571, 61
pulsam quae superius, quanta sit, indicem
discriminet: inferius non item plant
521, 34
pulsam tot differentiarum primae quae cau-
santur 551, 29
pulsam variacionem, pro causarum alte-
rationibus finit ibid. 27
pulsam urberiter frigiditatem duo tan-
tum genera habentur 550, 64
pulsam urberiter est nullus 590, 57
pulsam ubi semper causet qui albarer-
fiant, tamque subleui indicent, et qui
rursus semel huius tantum ipsae causas
dicantur 551, 5
pulsam ubi non esse mutationem qua ratione
deprehendamus 510, 37
pulsam ubi 510, 1
pulsam ubi augetur ab oblationem
spirituum, et incrementum caloris
577, 53
pulsam ubi est in ea locatio caloris
517, 1
Pulsam ex latet et forma, hepatis ob-
structionis, et colicis morum gigne
572, 1

Pulsis et finis faciles 1118, 2.
11, 3, 13
Pulsio 11, 57
pulsionem ore angustae quomodo dila-
tandae 1165, 7
Pulsus et curatio 815, 7 872, 11
pulsura nervi, cur ad extirpandum con-
uulsionem sit prompta 815, 3
Pungi debet nervus et a suffragis, ante aequali
tatem humorem percutiendum 32, 11
Punicarum succum ad oculos polyposi
magnitudine commendat Galenus
1115, 10
punicorum succus cordialiter utilis
384, 47
Pungilla dierum oculorum compressa, op-
portet duplia quae antica simplicia
erant 378, 47
Pupille cordiales quando facit et quid
de agri curacionem suscipit 669, 10
pupille: serapis efficitur quando visui
incommodet 668, 48
pupilla morbos animalium cur sit lata
367, 64
Purgantia quidam sive trahendi habent
1061, 40
purgantia medicamenta debent crassius-
cula in qui 462, 11
purgantia omnia facultate sunt calida
900, 1, 28
purgantia omnia ventriculum solvant
1004, 27
purgantia cum modis misceantur conge-
nera esse oportet ibid. 37
purgantia ubi a natura vincuntur, ipsam
gignunt humorem qualem erant du-
rantes 1018, 14
purgantia alia duos trahunt humores
1061, 40
purgatio humorum non caloris gratia ad-
ministratur 1009, 10
purgantia mensuras certicas quae si-
gna praeparant 644, 48
purgantia sub laxa et ante perulsio-
nem 8, 5
purgantibus inopii qui 1001, 35
purgantia superarcentia discriminata
917, 15
purgatio purgati a sanguine 1001, 31
purgatio quomodo adhibenda 260, 26
purgatio quibus debentur humoribus, et
quibus 301, 7
Pur morbus quae congruat 1054, 1
Pur et 17, 1055, 34
Pur et crudum humorem discernit 17, 10
Pur et hypostasis discernit 696, 21
Pur et thoracis contenti indicia quae
757, 54
Pur etiam oporata quibus effectibus
prosumt 1119, 53
Pur etiam cur celeritudo suffocatur
756, 48
Pur etiam unde gradus spectent 1146, 60

Pur et thoracis capacitate contentum et
paratius tempore in pulmonis efflu-
entibus arteriis transmittitur 761, 12
Pur et laudabile quale esse debeat 764, 60
Pur et morbus ab emulgentibus quomodo
differtur 1052, 14
Pur et morbus: calida et humida quae
nos dicuntur 1054, 14
Pur et morbus, breuiter qui praesent in pur-
tibus uiderentur conueniant ibid. 14
Pur et morbus: modis exasperant, bu-
rentibus 1056, 4 1176, 15
Pur et morbus: non immutatur partem sub-
stantiam, sed huius sunt nata 1053, 53
Pur et morbus: suppurationem quibus mo-
dis uincendum 1113, 34
Pur et per febrem abfessum si totum si-
mili acciderit, uerit deicit 965, 4
Pur et quae mouent 859, 50
Pur et si cum urina excretauerit, nihil in
ipsis esse considerandum 771, 60
Pur et urina et opus in: de uero 1196, 64
Pur et urina quae requirantur 878, 18
Pur et urina quae sunt ipsae 1176, 49
Pur et urina calor morbus de uris exiit
990, 62
Pur et urina: accessio, diffinitionis est pro
bitio 915, 56
Pur et urina ab aliis caliditate produciunt
796, 48
Pur et urina: febris causa est antecedens
918, 43
Pur et urina: febrim est causa, quae plures in-
festant dicit, et prouidet prius est tol-
lenda 904, 10
Pur et urina: humorem quae in usum fit, du-
plex in genere 784, 52
Pur et urina: humorum quodplex est aciditas
907, 6
Pur et urina: ad calidum et humidum 706, 15
Pur et urina: 559, 48. 990, 50. 1037, 61.
1161, 52. 1215, 19
Pur et urina: quid 917, 8
Pur et urina: quomodo sit sananda 917, 25
Pur et urina: absque morbo 1178, 41
Pur et urina: quae cum nem absque dolore
ligant 1059, 16
Pur et urina: nec si fuerint portione
minuta, corriguntur animal 1017, 61
Pur et urina: nec, quibus sunt 1059, 9
Pur et urina: quae corrigant 1156, 10
Pur et urina: si fuerint necesse est acriditas
1179, 14
Pur et urina: si sequitur ad icterum obtu-
rentur 1254, 62
Pur et urina: omnia a calido et humido,
feruntur in corrupta a frigido et sic-
co 41, 10
Pur et urina: facit calida et humida quon-
do 781, 58
Pur et urina: adfectibus calore cedunt, na-
ture frigunt 55, 19
Pur et urina: redduntur calidiores quon-
do 1146, 60

I N D E X.

antea 990,55
 patrefecitibus apta medicamenta que
 981, 62
 patrefecitibus circa articulos curatio
 1165, 3
 patrefecitibus curatio per que fieri de-
 beat medicamenta 1164,51
 patrefecitibus substantia qualis 1143,3
 23
 patrefecit que nullo modo possint ibid.
 10
 patrefecit calida & humida que in si-
 mulous condita persilari non pos-
 sunt 915,55
 & CYNOCOMIUS 1103,37
 Pylorus 142,11
 Pylorus ventriculi officium inferius
 32, 32
 Pyretici as 1103,44
 Pyretici asus fu salubritas 1118,51
 Pyreticis 144,1

Q VADRYPEDA cu re-
 quent federe arte flare
 210, 9

quadrupedibus que comeditis aditu ex
 illa corporis fabrica 1095,4
 Querulones et hominibus humanis inuicem
 que sunt 1144,62
 questio omnis sub definitionem cadit
 162, 51
 Qualitas aeris refrigerat & siccit
 274, 51
 qualitas aeris in aqua refrigerat facit
 912, 21
 qualitas asfringendi, est in astringentibus
 seu in aeris intensa 408,5
 qualitas & quantitas per hominem in
 agendo dicitur 1118,14
 qualitas gignere in matris & perit
 16, 20
 qualitas propria ab aliis obscuratur
 1012, 45
 qualitas sine substantia, nulla esse potest
 16, 65
 qualitates alium, caliditas, frigiditas, hu-
 miditas, & siccitas 24,22,118,12
 qualitates efficacissime calidum & fri-
 gidum 61,26
 qualitates omnes quodam tenore in se mu-
 tud agunt 1016,10
 qualitates primae & secundae que dicun-
 tur 1175,66,1051,25
 qualitates specifice que sunt, & cu se
 dicuntur 1010,1
 qualitates sunt organa officia 54,55
 qualitates utiles que sunt 1155,61
 1019, 48
 qualitates utiles totum proxime rei sub-
 stantiam dicuntur 14,19
 qualitates cuiusque virtutis aut visum conse-
 quuntur temporum 876,40
 qualitates experte inclinant ad frigidos
 88, 42
 qualitates false facultas 1143,19

quidam que in quibus functionibus
 exsiliu efficacitate 921,56
 quidam summaters frangitur con-
 trarium virtutis 1014,37
 Quantitas differentis & contrarietatis
 119,19, 511,38
 quantitas unius extensionis non est in-
 genitudo 511,56
 Quarta detentis ingente sunt usura
 augumentis cataplasmatis, emolli-
 entibus 967,65
 quarta detentis sepius purgabilis esse,
 apparentibus iam ceteris signis
 961, 3
 quarta causa 791,9
 quarta pars ab initio incipit 812,3
 quarta longissima minime periculo-
 sa 960,22
 quarta pars curatio 962,31
 quarta pars indicia 955,65
 quarta pars confert nominis 962,5
 quarta pars ratio conueniens 962,3
 44

Quarta septima est index 609,47
 611, 39
 Quaterdecim circiter sufficit ad cogni-
 tionem futurae crisi 614,10
 quaterdecim qui se pariter & qui in-
 uicem coniunguntur 621,52
 Quatuor iam inuicem habet 1077,49
 Quatuor arteriae duplex 528,9
 Quatuor arteriarum utriusque quid sit pro-
 prium 522,17
 quatuor arteriarum quid sit commune
 521, 32
 quietis interme tempus in pulsu non ex-
 acte dignosci potest 542,31
 Quinque duci copulatis tertio quoque
 die accessione facere 610,47
 Quinque medicos ab uicibus olim Ro-
 ma est pulvis 645,18
 Quis non alius modo sed scriptum quo-
 que debet inueniri 421,46
 Quod pro suo affectu ab omni consue-
 tione seuit 1014,18
 quod ex quoque trahere, & in quodque
 mittere potest 28,24
 Quotidiana causa 791,18
 quotidianae curatio 962,10
 quotidianae quae praecipui corripunt
 959, 46
 quotidiana prolixior est & periculosa
 960, 24
 quotidianarum declinationes non termi-
 nantur salubritas 959,36
 quotidianarum indicia ibid. 16

R ABIDORVM morsibus quid
 accideret 1151,48
 Rabies uarietate & potentissime
 sale & solis que sunt 180,18
 radices eleum artemisiam habentem,
 sacrum gignunt radium 410,29
 radices que gustu nullam referunt uiri-
 tuem, morsum aut eadem tenent in

bus sunt aduersae 417,46
 Radice crude propter quid non possit
 curare 191,10
 radice utriusque facultas 1103,61,
 593, 46
 Radix dearticulationes 107,14
 Radix & ulnae quod pertinet ad figuram
 & constitutionem difformis 107,23
 Radix musci praedictus sunt quatuor
 154, 59
 Radix posio obliqua 107,10
 radix 105,1
 radix cuiuslibet incombatur 107,22
 radix, alia est 98,11
 Radix albae & bene discutit pinato-
 ris humores, quod non dicitur in faro-
 sis 990,24
 Radix rhodia quoniam habet uirtutem 1104,13
 Numerum aliorum est figuram 774,6
 Ramex carnosus 709,24
 Ramex, quia sit in orbis 175,4
 Ranae sicut in res 1144,11
 Ramexi speciei & facultates
 1074, 30
 Rape uel huiusmodi facultas 1103,37
 rapas 1076,51,1091,22
 Rarescentia que dicitur 1058,13
 Rarescentia que ratione refrigerat 662,1
 Rara que sunt 1015,12
 Rara quae sunt ad accedentes facit
 1015, 39
 Raritas ab intermittente pulsu quomodo
 distinguatur 590,18
 raritas corporis quibus salubritas, quibus
 insalubritas 674
 raritas pulsum nunquam uacat pericu-
 lo, sicut nec remissio nec paritas
 590, 56
 Raren quid 442,1
 Ratio est ante alias artes 195,11
 Ratiocinandi vis interit, & quare 69,
 14
 ratio canonis 654,6
 ratio cuius interponenda sensibus 1011,
 15
 ratio duplex 989,19
 ratio inest hominibus 1191
 ratio inest dantur cum dicitur canonis
 24, 28
 ratio inuenit 2710,45
 ratio inest posse rationem mutare, quod
 Empirici non habent 154,4
 rationes quo pacto asperant ad simile
 transiunt 14,51
 rationum affectus contra methodos
 12,18, 166
 rationalium contra Empiricos rescripta
 12, 7
 rationalium obediunt aduersus Em-
 piricos 12,8
 rationalium progressus 6,16
 ratione haec sequitur aut uirtus aut uisus,
 affectus inuenit 110,13
 ratione lesa, saepe memoriam laedit con-
 tingit, & de comersio 738,16

rationi relideri que dicuntur 318,4,4	radix 95,7	cessaria 37,1
rationis semper ita media abscindit in summi philosophi 326,3,6	refrigeratio completa, sensum et motum tolit 730,30	remedium asus apus, in arte medica est proprium 27,33
rationis que contra inest, aperta 327, 17	refrigeratio in febribus, que brevis sit temporis atque periculosa 908,14	remedium Cleopatre ad acerbos 119,6, 51
ratio per experientiam indies redditur gutturifer 416,4,1	refrigerationis usus in plethore 917, 23	remedium Cleopatre capillos argenti et draganti 1193,14
ratio, potissima omnium sit et absolutior 124,4	refrigeratio respiratorii finis 915,16	remedium contra defluas capillos Ar- chigenis ibid. 8
ratio potestate calidum indicat 46, 64	refrigeratio totius corporis et particu- lar afficit, supprime sanguinem pro fluantem 866,1	remedium Critiani ad acerbos 1196, 39
ratio prout intransibilis anime, ut eques e- quo 326,1	refrigeratio medicamentis 65,4	remedium sursum Archigenis 1195, 18
ratio (que homo est) in cerebro colloca- tur 122,1,3	refrigeratorium ex palmis 910,1	remedium sanguinem sistens 1245,1
ratio quando concutit effectum 129, 31	Regni maxima pars communis omnium facultas 1171,1	remissionis tempus duo quod debet 718, 14
ratio quando feliciter suo sanguine ma- nere 124,1,6	Regiones interpretat quales produci corpora 443,19	Rex dexter sinistro elatior 1812,0. 217,28.
ratio quando resistit effectui 339, 31	regionem cum temporibus comparatio 350, 42	renes cum lotio atque abest bilem et san- guinem 127,51
ratio sensus est continentia 547,23	regionum varietas, discrimen in moribus facit 331,63	renes et visceris due, hepatis gratia con- ducit 122,21
Rauca dum quid acutior 1108,11	regni morbus permixtus 768,58	renes expurgant serum a sanguine 218, 26
cauendo quando gignatur rauculo quid 693,7	Rex de qua diffinitur, in primis oppo- tubere substantia 354,44	renes facili firmiter contrahunt 919, 32
RECESSIBVS à naturali tempe- re exiguus, exiguus opus est mutare ut congruant 887,1,6	Relexantibus quando sit utendum 921, 54	renes quibus inflammantur, urina sup- primatur 516,4
Recidiva morbi quando timenda 607, 18	Remedia ad eos qui letidia hibernant 1284, 51	renes si gignant calculos, totum ante cor- pus sit gracile, que utendum uisus ra- tione 491,36
Recidiva qui fiat 95,4,1	remedia Apollonii ad acerbos 1196, 29	renes sunt prout facit et concoctio diffi- ciles 394,31
Recordatio prateritum quid consistat 465, 37	remedia Archigenis ad acerbos ibid.	renibus inest ut trahendi lotij 76,60
Recti qui spirare solent 756,42	25	renibus mali affectus, que uetus sunt fe- cunda 997,7
rectum, intestinum sextum 110,11, 225, 59	remedia Archigenis ad altera continua- cia 1174,48	renibus si gignat calculos, totum autem corpus sit obesum, que uisus ratio est uenit 481,63
Reductio ad temperiem, non medica- cia presidia possunt, sed contra- ria, et que et qui à medio recedunt 1032, 14	remedia acribus accidia 482,30	renis exacerbat indicia que sunt 771, 10
Redundantia morbi quando oritur 476, 51	remedia hanc impune administrantur, cum omnia sint prater naturam 19, 4	Renitentia que 1053,4
Refrigerandi medicamenta ratio 2198, 45	remedia pedagogica à uerborum diffinit 472, 1	renem alio et sitis 217,7
refrigerantia ex trisectis, in febribus que- lia esse debent 909,29	remedia repellentia idonea sunt pleg- matis incipientibus 921,48	renem calidos quid frangat 1086,46
refrigerantia immodica, naturam calorem extingunt 976,3	remedia Sorani contra acerbos 1196, 57	renem sanatus 691,7
refrigerantia quando scorbos produci 1186, 27	remedia uacuantes omnia prout ex- elant 901,15	renem inflammationibus que medica- menta concoctum 1167,1
refrigerantia, sensum asferentia et in- ducuntia teporem, potestate sunt fri- gida 56,4	remediorum inuoluta ex uera demonstra- tione parata, in raro contrariis longe prestat experientia 717, 27	renem positio in aquali 315,10
refrigerantia simul et asferentia quibus morbus conueniens 1073,19	remediorum inuoluta rationalis prestat ibi, que experientia inuoluit 1210, 41	renem spissitudinis casus due 127,45
refrigerantibus quando circa partes in- de sunt sanguis, utendum 167,13	remediorum quantitas prout reddit atque medicum conueniens 994, 22	renem substantia, sanguis asferentia in- flar facit 127,58
refrigerantium facultas 712,5	remediorum refrigerantium alia per se, alia ex accidentis refrigerant 910, 18	renem uentris 181,28
refrigerantium filia, quibus tunc uti in capitis doloribus possunt 1198, 61	remediorum refrigerantium bene dila- tumque, duplex est materia 908, 15	renem ulcerationem certissime nota que 771, 16
Refrigerari quid 1016,10	remediorum refrigerantium bene dila- tumque, duplex est materia 908, 15	Renitentia etrosorum à quibus fiat 1244, 40
refrigerari cur sint excitandi ad rem 504, 61	remediorum refrigerantium bene dila- tumque, duplex est materia 908, 15	Repellentia que sunt 1206,12. 1214, 36
refrigerandi debent maxime circa unguem	remediorum refrigerantium bene dila- tumque, duplex est materia 908, 15	repellentia sunt applicanda regioni su- peraposte alteri 1171,15
	remediorum refrigerantium bene dila- tumque, duplex est materia 908, 15	repellentibus quando utendum 1268,18
	remediorum refrigerantium bene dila- tumque, duplex est materia 908, 15	repellere humores à capite, que commo- di possunt 961,13
	remediorum refrigerantium bene dila- tumque, duplex est materia 908, 15	Repersusio sui per asferentia et refri- gerantia 816,61
	remediorum refrigerantium bene dila- tumque, duplex est materia 908, 15	reper-

I N D E X.

Repreſentantia que dicuntur 1099, 10
 repreſentantia ſunt applicanda pmo ſe-
 pra partes patientis 971, 10
 Reſpirantes immoderate que ſequuntur
 98, 18
 Reſpirantes immodere reddat pulſus qui
 ſonantiores, reſpirationis autem mi-
 noris, qd. crebriores 506, 40
 Reſpiratoria quomodo mitemda miſuamē-
 tiu parandum 1119, 59
 Reſpiſ diffinitione 101, 4
 reſpiſ propter naturam duplex eſt diffi-
 nitione 919, 46
 reſpiſ propter naturam tria ſunt genera
 101, 10 104, 41
 reſpiſ que in noſtro corpore habetur,
 quatuor genera 784, 10
 reſpiſ ſineſis ex diſtinctione, et per ſe non co-
 gnoſci ſon. ad reſpiſ noſtre 101, 11
 Reſ ſubſtrentes reddunt cognitiōem loci
 aſſiſtiōem 911, 51
 reſ ſu ſu nutritio non non eſt alii na-
 ſu ſu propter quod eſt cognoſcens 111, 1
 reſ cognoſci in paribus propter natu-
 ram ſuſcit ad cognitiōem locum
 eſt. ſuſcit 711, 60
 reſeruat uſus qui reſeruat ſuſcit ſuſci-
 ſione diſtinct 761, 54
 reſ expendende ad medeo 360, 49
 reſ ſine omnes caſus ſunt 114, 56
 reſ ſine erredunt ſuſcit 110, 41
 reſ ſuſcit diffinitione 461, 41 110, 41
 111, 61, 61 116, 61, 116, 11
 116, 43
 reſ naturaliter in p. artibus contente ſa-
 ciunt ad cognitiōem locum aſſiſtiōem
 711, 41
 reſ non naturales quatuor corpora no-
 ſtra aſſiſtiōem 119, 60
 Reſoluto principat dicitur, ubi motus
 perit 747, 49
 reſoluto quid 116, 5
 reſoluto muſculo dicitur partu pars ipſa
 in contrarium contrahitur 751, 17
 Reſpondens diſtinctionem compoſitionem,
 que ſunt uſuſque conſiderationem
 491, 41
 reſpondens ſimpliciter diſtinctiones ſuſcit
 inde ſon. conſiderationem ad iudiciū
 maxime ſalut. perducunt 491, 11
 reſpondens ad cerebrum que de cauſa ſuſcit
 111, 9
 reſpiratio ambuloſa unde ſuſcit 101, 11
 reſpiratio conſiſt ex contrariis membris
 490, 41
 reſpiratio continue uſuſque ſuſcit poſſit
 ex cauſa reſpirata 104, 16
 reſpiratio cordis gratia ſuſcit 111, 11
 reſpiratio diſtinctionem ſuſcit ſuſcit
 quatuor 100, 14
 reſpiratio duplex 541, 61
 reſpiratio eſt arbitrio ſubſiſtens 496, 61
 reſpiratio eſt uoluntatis motus, et opus
 100, 44 114, 60, 491, 61

reſpiratio et deſignatio non quā ſuſcit
 ſuſcit 141, 6
 reſpiratio et pulſus iſdem ex cauſa me-
 diatione, ſuſcit reſpirant 506, 11
 reſpiratio et pulſus uſuſque diſtincti
 501, 10
 reſpiratio ſuſcit ad ſalutem magnam
 eductum 504, 11
 reſpiratio ſerē amittit, pulſus proportionem
 reſpondet 491, 11
 reſpiratio ſuſcit propter arterias et uſuſque
 ſuſcit 496, 40
 reſpiratio ſuſcit tunc calor inſuſcit grana
 486, 30
 reſpiratio inflammatio thoracis 491, 10
 reſpiratio magna et parua quando ac-
 cidit 486, 48
 reſpiratione celobilit, quid ſon. ſuſcit
 morum conſciunt 101, 10
 reſpiratione dicitur inaequalem 491, 61
 reſpirationem ſolam ſuſcit ſuſcit
 tranſuſcit 107, 10
 reſpiratione praeſciunt motum uſuſque
 reſuſcit 414, 38
 reſpiratione ſuſcit que conſeruat
 759, 17
 reſpiratione ſuſcit uſuſque que orga-
 ne ſeruat 489, 18
 reſpiratione albens inter ſe conueni-
 ent ſuſcit quatuor 711, 49
 reſpirationis cauſa in genere ſuſcit tres
 481, 28
 reſpirationis diſtinctionem conueni-
 ent in artibus
 oppoſitionibus comprehenduntur
 501, 57
 reſpirationis diſtinctio quatuor conueni-
 entes 116, 17
 reſpirationis dolentia organa, quatuor
 ſuſcit ſuſcit 497, 44
 reſpirationis duplex uſuſque 506, 61
 reſpirationis et pulſus idem uſuſque 490, 64
 reſpirationis et pulſus nō idem ſeruat
 conueni- 111, 1
 reſpirationis pulſus et quatuor que ſuſcit
 dilataſcit, breuiter poſt compreſſi-
 onem longior 491, 17
 reſpirationis inaequalitatis cauſa 496, 55
 reſpirationis inſtrumentorum ſpecies mul-
 tiplices 481, 17
 reſpirationis magnitudinem eandem cauſa-
 ram conueni- quatuor uſuſque poſſi-
 bilis 491, 10
 reſpirationis motum offeſſio duplex
 499, 11
 reſpirationis opifici, tres ſubſtitionem tho-
 racis muſculorum conueni- 111, 36
 reſpirationis organa 487, 44 600, 38
 reſpirationis organum med. aſſiſtiōem, rene-
 da unde praeſciunt 114, 38
 reſpirationis organum aliquo dolentia,

ear parum, ſed crebrius agnoscit ſuſcit
 101, 18
 reſpirationis organum aſſiſtiōem labo-
 rationem circulatorum ſuſcit conueni-
 et proprii quatuor 114, 7, 11
 reſpirationis organum aſſiſtiōem quatuor
 efficiunt 114, 6, 11
 reſpirationis partes quatuor 489, 15
 reſpirationis ſpecies eandem eſt omnibus
 fluxibus pulmonum 501, 17
 reſpirationis totum quatuor ſuſcit diſ-
 tinctum 501, 11
 reſpirationis uſuſque motus ad uſuſque impul-
 ſus praeſciunt conſiderationem conueni-
 ent 499, 14
 reſpirationis uſuſque poſſunt eandem cauſa-
 ſuſcit quatuor pulſus uſuſque 491, 11
 reſpirationis uſuſque 774, 43 911, 61
 reſpirationis uſuſque primus et maximus
 141, 11
 reſpirationis utilitas, inter alios cauſas
 eductum praeſciunt 481, 11
 reſpirationis utilitas praeſciunt, ſecundum
 116, 8
 reſpirationis utilitas principalis ſuſcit eſt
 conueni- calor inſuſcit, conueni-
 ſuſcit nutritio 490, 16
 reſpirationis non conueni- per ſuſcit
 rationem interuentionem, quatuor ſuſcit
 cauſas 501, 11
 reſpirationis duplex cauſa 499, 9
 reſpirationis opus eſt conueni- poſſunt pul-
 ſus, uſuſque 509, 1
 reſpirationis, opus non plane uſuſque li-
 berum 101, 15
 reſpirationis ordinata et inordinata
 496, 1
 reſpirationis parua frequenter in quibus di-
 ſtinctionibus aſſiſtiōem 487, 11
 reſpirationis parua et rara, quatuor ab or-
 ganis reſpirationis reſpiratio
 501, 61
 reſpirationis quando leditur 751, 16
 reſpirationis quibus de cauſis eſſet 111, 11
 reſpirationis, reſpirationis cauſa ſuſcit
 481, 19
 reſpirationis, ſuſcit tranſuſcit et thoracis mu-
 ſculorum eſt aſſiſtiōem 100, 44
 reſpirationis ſuſcit ductor calorem
 507, 51
 reſpirationis ſuſcit unde 501, 47
 reſpirationis aſſiſtiōem ſuſcit ſuſcit
 reſpirationis propria ſuſcit ſuſcit
 ſuſcit 498, 58
 reſpirationis eſſentia, ſuſcit diſtinctionem
 101, 16
 reſpirationis plerum ſuſcit et aſſiſtiōem ad ba-
 ſum cerebrum conueni- 507, 11
 reſpirationis excretionem cauſas, con-
 traria adueni- 417, 11
 reſpirationis quomodo ſuſcit 778, 61
 reſpirationis et caput uſuſque diſtincti
 110, 9

ventilandi ratio 864,32
 Ventositas est fluctuans humorum melle-
 asat deriuatio eorum qui iam obse-
 runt partem 974,36
 ventositas est deriuatio à matrice quibus
 fiat modis Ibid. 49
 ventositas fit ad quatuordecim distantia lo-
 ca 859,42,93,7,54
 ventositas humorum fluctuans, in cibariis
 molenda est 860,54, 931,60.
 916,43-972,5. 100,5
 ventositates cum evacuationibus, insperni-
 tibus fluere humanis adhibenda
 sunt 998,1
 ventositatis modi diuersi 968,16-999.
 59
 ventositas per sedem urinae quatenus sit
 effluat 994,61
 ventositas sanguinis fit ad contraria, deri-
 uatio ad uicena 864,3
 ¶ RHODAS PAPAIRIS SPECIES 1035.
 62
 Rhagoides solutio quando usum exualat
 669, 23
 rhagoidis tunc usus Ibid. 16
 Rhinoceros facultas 1105,59
 Rhinoceros 1104,2
 Rhinoceros adhibendi modus 1128,6
 rhinoceros effluenter affligens quibus
 1283, 17
 Rhinocerosis ventriculi et intestina-
 rum maligna conueniens 1181,7
 Rhododaphnes usus 1098,15, 1104.
 42
 Rhos duplex 1233,14
 rhos quoniam possident facultatem 1104.
 51
 Rhythmi inaequalitas quomodo fit
 519, 22
 rhythmo dignoscendo quid explorandum
 549, 37
 rhythmorum differentie multiplices
 527, 59
 rhythmorum mutatorum causa 566,19
 rhythmus inaequalem effici proportionem
 conuersionis 519,64
 rhythmus in quo consistat 549,17
 rhythmus in solis pulsibus uerbosissim-
 us dignoscitur Ibid. 62
 rhythmus quando aequalis et quando in-
 aequalis 528,61
 ¶ RICINI uel cici facultas 1087,10
 Rigore homine sole partes extremas re-
 friguerunt, recurrente sanguine ad
 interiora 681,45, 682,4
 rigorem ex humore frigido curatio
 715, 44
 Rigor absque fibri quibus accidit 61,
 30
 rigor acidit inflammationi conuersa in
 abscessum 714,62
 rigor à tremore quo diffinit 712,55
 à Rigore car corpus uicinos quoniam
 antea insensit 714,15
 rigores circa febrem quando gignuntur

621, 25
 rigores per circulos rednentes, quid ex-
 temnet 1067,31,1088,58
 rigor est referendus ad uim expultricem
 672, 26
 rigor febrem ardentem illi superueniens
 cur soluit 680,46, 714,58
 rigor fit à frigida et calida causa 632,
 23
 rigor fit, flatus bile lata per membra sen-
 sibilis 715,12
 rigori adest motus malus, eius et fre-
 quens 678,18
 rigori febris cur superueniat 682,30
 rigor interdum à pituita uicena oritur
 715, 18
 rigori quid requiritur 711,4
 rigori causa 455,38, 681,18, 715,1.
 882,48. 906,24
 rigoris medietas 672,12
 rigoris motus est compositus ex causa
 prius naturae, et facultate animae
 672,19
 rigor morbosus quid 711,44
 rigor quando expultricis 643,33
 rigor quando obstruitur 714,23
 rigor quando fit letidis 681,24
 rigor quatuor modis qualis 715,50, 793,11
 rigor quid 715,64
 rigor super citra febrem acidit 653,7
 rigor sunt febre ex pituita interdum ori-
 tur 793,53
 rigor irritans et quartana quomodo
 differunt 611,12
 rigor tertianus et quartanus quales ad-
 fit 791,14
 rigor tertianus qualis 715,53
 rigor uicinos non adest febribus in-
 sensibilibus 719,3
 ¶ ROBUR inueniuntur omnibus post
 uicem et aetatem 472,28
 robur ipsius arteriarum illas, in quoniam
 possum sit 534,52
 robur quae ratione conciliandum corpe-
 ribus 20,51
 Polus qui effluat 270,40
 Romana regio admodum humida 53,
 47
 Rosacci compositio 479,12
 rosacci facultas 1035,38,1104,24
 rosacci optimi preparatio 1156,41,
 1209, 14
 rosacci temperies est, quales sunt rosa-
 rum inest 1029,10
 rosarum commodè insensibilis per ora-
 nis fructus 1127,24
 rosarum ex oleo et resu confectus
 1029, 9
 rosarum crassius commodum qualiter co-
 fici debet 1198,34
 rosarum in primo gradu refrigerat
 1029,16.
 rosarum quando conueniunt inflammationem
 robur 1035,10
 rosarum quae habent dicatur neutrum

1017, 44
 rosarum refrigerandi modus 891,16
 rosarum refrigerant et calfacit diuersa
 corpora 1032,18
 Rose facultas 1104,13
 rose infusi excrementa tria 1050,53
 rose partes quatuor 1034,4
 rose partium exarum 1050,59
 rose rosarum; succus eadem refrigerat
 1031,23
 rose est frigida in secundo excessu 1031,
 46
 rosarum pulvis in quibus curat polypus
 solent 1215,24
 rosarum succum asservandi ratio 1034,
 16
 rosarum succus tepidus quando cal-
 ditate possidet, odoris, diuersum
 augmentum exualat 910,7.
 1034, 16
 rosa quid rubra sunt, calides esse dicen-
 tes, quod plerumque peccat 1072,26
 Rosarum alimentum quale 407,13
 ¶ RUBIAE possunt uti 1050,14
 Rubi armentis usus 1131,56
 rubi facultas 1074,14
 rubi fructus uires et facultates 381,
 48
 rubi mororum succus est uicinali roba-
 rat, id quod succo mororum inest
 1233, 11
 rubus iniquus non extrinsecus accersitus;
 sanguinis plenitudinem significat
 700, 44
 rubus acidi meritis 726,45
 rubus aridi uicinalium ostendunt imbe-
 cillum 531,18
 rubus acidi unde oritur 1045,32
 rubus fumosi uel acidi casum insensibilis
 diuersio 726,15
 rubus fumosi, significat ignem uicinali
 calorem Ibid. 1. 53,17
 Rubus in carne consistit 664,3
 rubus pulvis uicinalium usum unde de-
 prebendunt 798,32
 rubus quid 856,44
 rubus unde contingat 911,18
 Rubus semen copiosè sumptum medetur
 priapismo 947,15
 rubus facultas 1066,35,1101,29
 rubus feminis facultas est tremendi 4,15,
 16
 rubus splasitilis efficacia 1097,43
 5
 RUBINAE 1077,14
 Rubi rubus 1069,47
 Rubi facultas eadem est cum
 nostro melle 1095,36
 Rubus pulvis 1105,6
 Rubus aqua rigatur solent 1282,
 31
 Rubus diuersus igni aduocatus, uritur
 59, 22
 Rubus est frigida ad hominem
 1030, 30
 Rubus-

I N D E X.

- salomonie* cinis quibus medetur effe-
 ctibus 114, 62
Sal capitis fementis non est apud 1106,
 46
Sal emollientibus non miscendus est,
 quæ crassat valde 1036, 19
Sal obtruncus extenuat corpora 95, 13
Saltes theriaci quibus amentibus effe-
 ctibus 1279, 7
Saltes theriacos præparandi ratio ibid.
 15
Salutis foliorum vis 1082, 64
Salus fies in uiscia appositus, licens in-
 ratos sonat 977, 40
Salis genera 1049, 60
Salis uires & differentie 4013, 9
 1049, 46, 1130, 48, 1143, 10
 & 11, 1157, 67
Salis uis facultas 114, 137
Salis uis in quibus proditor ibid. 55
Salinis hominis ac uisceribus, utraque alteri
 perniciosa 64, 42
Salina hominis ieiunio scorpion curat
 62, 43
Salina hominea aduersatur bestis homi-
 num perniciosis 1111, 61
Salina ieiunio uentris ad quæ confert
 1121, 50
Salina amarescent, amplius exaltantur
 1040, 35
Salina que dicuntur 1030, 21
Salisminera Sardica, optima 404, 17
Salis Andromachi uires & compositio
 1181, 39
Salisminera eam esse ad salicidum opti-
 mum, cui quoniam inuolare uidetur
 1049, 51
Salisminera facultas 1144, 19
Salisminera ex accidenti nomen quod mor-
 dicationes sanant 1033, 33
Salustella si distinetur, credunt curare he-
 nem 996, 1
Salubre corpus simpliciter quod sit 114,
 8
Salubre corpus ut mori, quod sit ibid.
 11
Salubria que 565, 561, 15, 813,
 33
Salubria signa que 815, 14, 559,
 45
Salubritas corporum dignationes uide
 piteat 815, 14
Salus facultas 1079, 13
Salutis spes quando adit, & quando sit
 deperita 604, 63
Sanando tropus communis 816, 13
Sanus similibus seruanda 471, 8
Sanationis intentio, est ablatio uel trans-
 passio 826, 12
Sanatio quid 903, 15, 919, 51
Sanctorum facultas 1115, 4
Sanctæ quoniam non habet 1116, 23
Sanguis faciens ad feruorem misti colla-
 to 80, 49, 217, 39
Sanguis in uero alius 432, 40
Sanguinem detrahendo, que sunt conside-
 randa 963, 61, 989, 31, 991,
 24, 993, 13
Sanguinem detrahendo in synochis que
 consideranda 900, 1
Sanguinem è uiscia fluantem remedium
 iupponimus 1167, 33
Sanguinem ex dextera uel sinistra nate
 profusum suppressi ratio 864,
 13
Sanguinem expurcibus, repetenda est
 misto sanguine 868, 16
Sanguinem fluantem ab hepate & sple-
 ne, curabitur adhibe illis uisceri-
 bus retrahant 969, 13
Sanguinem mittre in emetibus puris
 febribus quando sit saluberrimum
 924, 38
Sanguinem per uires quid trahat 1090,
 12
Sanguinem resistenti ob refrigerata si-
 rius ergo, morbo 170, 52
Sanguinem per uires emittit ex mensura
 sanguine gignitur 31, 12
Sanguine per uires fluente quando &
 quid secunda uenia 864, 11
Sanguine præditi que insint 180,
 24
Sanguis ex profundo profusum quomo-
 do occurrendum 866, 17
Sanguis à pulmone recedit indicia
 734, 5
Sanguis causa calor temperatus & mo-
 dius bonitas 80, 19
Sanguis erraticus & erectionem per na-
 rti quoniam inducit 969, 18
Sanguis detrahendi mensura, quæ a-
 liorum accidentum facultas multide-
 prehenditur 987, 13
Sanguis detrahitur iteranda est, & cur
 463, 2, 996, 52
Sanguis detractione aut purgatione
 quibusnam proficiendum sit morante
 nere 472, 16, 991, 9
Sanguis detractione humores conuerti
 in uires ex quo nascuntur 1001,
 30
Sanguis detractionem quæ postulat
 900, 19
Sanguis detractionem quæ prohibent
 ibid. 7, 903, 38
Sanguis detractionem quando sit plenitudo
 nascenda 991, 61
Sanguis detractioni primæ & secun-
 dæ cur interponendum sit tempus
 464, 59
Sanguis detractioni quæ commoditas
 insit 994, 27
Sanguis eruptionem uires scilicet tampe-
 rit 994, 9
Sanguis eruptionem uires laborantibus
 que sint 996, 3
Sanguis eruptioni quid proficit 1012,
 58
Sanguis eruptio per uires quæ ratione
 miranda 994, 11, 1215, 38
Sanguis euacuationis systema, medi-
 ca habet libram potestatem, aliam
 autem nequaquam 987, 10
Sanguis extrinsecus amittit præter na-
 tum à sunt, mensura excepta 687, 32
Sanguis extrinsecus quid codat 1119,
 60
Sanguis fluit, subtilis, spirituosus & cal-
 idum origo, finitior cordis sinus est
 341, 53
Sanguis fluens per uires multo de-
 plex 867, 23
Sanguis fluens causa triplex 687, 57
Sanguis fluens è naribus concutitur
 proceras alonae composit 965,
 40
Sanguis fluens quæ bonum uel malum
 faciat erigit 644, 38
Sanguis humidus & rubri generatio sit
 in leuore 341, 31
Sanguis in semen degeneratio 1115, 5
Sanguis misto in quantis quatenus
 celebranda 962, 14
Sanguis mistus, in quibus adest crudor
 humorem copiam, quomodo celebra-
 da 994, 42
Sanguis nescientem prohibet aeris con-
 stituo imprefe calide aut frigide
 964, 17
Sanguis misto quando ad animi dese-
 ctionem usque celebranda 1015, 5
Sanguis misto quando sit eodem die re-
 petenda 464, 6
Sanguis mittendi principes scopi qui
 sint 991, 9, 993, 1
Sanguis mutatio post uenam scilicet
 quando expectanda sit 991, 37
Sanguis partes diuerse 18, 49
Sanguis profusus per uires, que sint
 signa 644, 13
Sanguis redundans non indicat uires
 scilicet 867, 16
Sanguis resistentis à catarrho producti
 ita curatio 870, 18
Sanguis sex libras totid detrahas fuisse
 995, 59
Sanguis supra modum affert parti pri-
 mæ, in flammam, crassius in atram bi-
 lem conuertitur 797, 8
Sanguis ten periculis quibus de causis na-
 scitur 701, 42
Sanguis uacuat iterata quando fieri
 debeat 993, 44
Sanguis uisceribus facultas 1127, 7
Sanguis suppressio emphysemata cur sint
 crustifici optima 805, 1
Sanguis absque plenitudine notis quan-
 do detrahendus 893, 10
Sanguis à corde calorem habet 45, 2
Sanguis ad intestina & urinariam per
 mensuras uires in longius inedia
 retrahitur 124, 59
Sanguis, effusus thorace, per pulmonem
 educitur 754, 17

sanguis à ieiunio & licet uacuetur utitur 764, 53	sanguis in synochis cur nō immedie de- trahendus 921, 13	sanguis quando mittendus 456, 52. 860, 14
sanguis articularis subtilior & uisore suo 223, 9	sanguis in uenae sectione supprimendus, cūm alterantur pulses 995, 24	sanguis quando mittendus sit ad animi usq; deliquam 994, 52
sanguis attenuatus & absoluitur antequam possit balium transfusionem esse in cer- uice 281, 47	sanguis in uentriculo continetur prout naturam 688, 28	sanguis quando necessario putrefiat 799, 7
sanguis à uisū effluere potest quatuor modis 863, 29	sanguis leporinus & caprinus suauissi- mus 397, 50	sanguis quae parte externi solent 751, 60
sanguis cū natura familiarissimus uac- uetur omnino postmodum 1019, 18	sanguis male afflicti qui dicitur 689, 1	sanguis quare uacuetur omnino uacuetur 99, 13
sanguis ciborum inopia arefcit ac densior scipso redditur 918, 24	sanguis materiale principium partium no- stri corporis 77, 61	sanguis qui ad spicem attrahitur, et af- fici est illo qui consistit in hepate 223, 37
sanguis columbinus hypophlegmaticus con- fert 1127, 14	sanguis, medius inter chylum & hepatis efferentem 223, 25	sanguis quibus euacuetur per intestina certis quibusdam prout 86, 36
sanguis columbinus infundatur per crurii fracturam lib. 5	sanguis melancholicus an uisum cor- pus occupet, uel cerebrum solum, quo- modo discernendus 742, 42	sanguis quibus quae uenae, ubi & quae castrationis, parus detrahendus 899, 2. 993, 31. 995, 54
sanguis columbinus neq; suauitate, neque concoctionis facilitate suum sanguinem inferat 999, 5	sanguis mensitrus non est prima mate- ria, generandis; animis propria 296, 31	sanguis in arteriis quoq; continetur 507, 53
sanguis communis materia est lauis & mensis 1062, 28	sanguis mensitrus quantitate & quali- tate est mutabilis 705, 9	sanguis quous die mittatur, si id morbus ante uires fuerit 999, 96
sanguis eo potius in uenis sanguis dupliciter in uenis redditur 901, 44	sanguis mensitrus utro non familiaris 106, 20	sanguis si fluat secundum uisceris redditur dumtaxat, hominem 644, 36
sanguis dum fluit, pulsus sunt explorandi 994, 58	sanguis nec puero nec seni detrahendus 892, 8	sanguis si rubri argenti, aut probrebat a- liud, quando sit mittendus 995, 44
sanguis ex quatuor constitutur humoribus 349, 42	sanguis niger quibus uacuetur se fla uena 703, 31	sanguis subtilioris a de uro cordis sine transfert in sanguinem per mediam se- ptam 88, 64
sanguis extra sua uasa, subito in gnum concrefcit 702, 29	sanguis non est simplex 32, 53	sanguis suorum optimus 43, 43
sanguis facili sit caro 111, 19	sanguis non solum dat animi, sed colo- rem cuius naturam conferuat 990, 36	sanguis suales tempore est hominis per- fectus 116, 58
sanguis sit à propria hepatis carnis sub- stantia 340, 61	sanguis melles est frigides 1126, 55.	sanguis utrum uacuetur 3127, 48
sanguis sit ex mediocri calore 79, 15	sanguis ob plenitudinem uasorum, tu- cas distrumpit 66, 44	Satis quae purgationes grauiter ferant 1002, 5
sanguis fluxus immedie, quando sup- primendus 855, 16	sanguis omni concilio diffusus 997, 48	senis expedit quae necessaria 363, 28
sanguis gelluacius 399, 4	sanguis in arteriis inflammatur ex pble- gmae promou 62, 38	seni nouis opus ad resuscitandum ore 276, 99
sanguis in cerebro contentus, alteratur bi- sorum 742, 30	sanguis in cerebro contentus, alteratur bi- sorum 742, 30	Sanitas animi 833, 1
sanguis in febribus & pblegmatis sine febre ortu, quando mittendus 998, 52	sanguis optimus à quibus sunt 414, 11	Sanitas corporis quae 932, 63
sanguis in generatione, materie ratione ubinet: solum, opificus 429, 9	sanguis per quae instrumenta ab utraque bile purgetur 81, 29	Sanitas elementaria est commodatior 333, 27
sanguis in gramis caudis, gramiosa symptomata induit 406, 23	sanguis post bilem calidissimus 61, 50	Sanitas est duplex, una temperatissima, altera uelut atrox expedita 423, 43
sanguis in inflammationibus putrefcit, quae febres gignit 584, 4	sanguis, potentia semen est 116, 21	Sanitas & morbus unde orientur 657, 44
sanguis in inflammationibus, quando de- trahendus 995, 32	sanguis probus naturae possessio est 901, 41	Sanitas inculpabilis conseruanda: quae si no expedita est, reducenda per con- traria ad moderatam temperan- tiam 431, 46
sanguis in inflammationibus partibus dupli- ci de causa corruptus 796, 61	sanguis produlius ex moderata quatuor elementorum temperie 350, 8	Sanitas in quibus inuicibilis 657, 11
sanguis in lapitudine quando sit mitten- dus 412, 19	sanguis proflatus ex uasis aliis densifus, quomodo supprimendus 864, 47	Sanitas instrumentalium partium in quibus consistat 428, 61. 430, 50
sanguis in principio flauis mittendus, si quorunda febre laborans ualidis sit uicibus nec eruditus subit 910, 17	sanguis parus excrementoso euacuetur 299, 61	Sanitas laetudinem habet 675, 4
sanguis in pulmonis, aut inter pulmonem & capsum putrefcens, talem efficit 350, 18	sanguis putrefcens, proprii diluam pro- ducit inflammationem 636, 28	Sanitas morbo, digestat, et tempore pri- or 412, 52
sanguis in reliquo corpore quando ex pblegmatis accendatur 62, 21	sanguis putrefcens ad amara bilis natu- ram transit 636, 32. 766, 39. 802, 10	Sanitas operantis aptitudine, non alia, deservenda 657, 14
	sanguis putrefcens in uentre, aut in gra- uim coctus, extrema pericula indu- cit 350, 23	Sanitas primorum corporum in bona con- sistit temperie 349, 17
	sanguis quando externa calore incalcfat 796, 52	Sanitas quado dicitur 66, 11
		Sanitas quae 360, 5. 361, 40. 436, 12. 611, 43. 843, 24
		Sanitas

I N D E X.

sanitas familiarum partium que sit	65,	Sarcocicon facies	1161,4	scirbus cancerosus ab usu emollientium	
60,428, 60. 430, 37. 850,		sarcocicon fons quis	Ibid.13	exafferat	1056,19
48		sarcocicon optimè confusi ex argentine		scirbus et quisbus quid	976,31
sanitas scopos communis amicum mēden		cerato simpliciter admissa	1149, 7.	scirbus familiaris est tantum duris	97
tum	161,6	1240,		scirbus corporibus	604,13
sanitas seron non est sanitas absolute		Sardae, Myli, Pelonides, Gerani	401,	scirbus infensibilis, minime curantem re	
471,	36	35		capit	976,54
sanitas tripliciter dicitur	364,22	Satyrismus uti principis qui sit	708,	scirbus quid	946,7,1056,9
sanitatem alia naturalis, pulchritudinis		65		scirbus quomodo ad ineptiam curantem	
consequitur	360,37	Senfragon & betonica renes optimè		signatur	976,60
sanitatem que sciens	30,65	efficiunt	1272,16	Scissura quid	12,53
sanitatem curandam esse similibus	64,	SCABIES & lepra quid spectent		Scolopendra	109,49
49		708,	56	Scolymis	1107,2
sanitas quando membra fruantur		Scannonium trabis flavum balum		Scopi in nemis distribuendi tres	101,
798,	3	1189,26,	1271,13		
sanitates hominum diuise	410,89	Scandis uti	1106,59	scopi secundum quos singula res ad quos ag-	
sanitates habitus discernit ex functioni		Scaphoides os	115,58-119,8	gregiatur	356,28
bis secundum naturam obitus	430,	scapule processus recarui sunt	29,4,36	scoporum indicantem dignitas unde sit	
32		scapule processus superiores	Ibid.54	indicanda	951,43
sanitatis latitudo omnia	49,59. 66.	scapularum confideratio	116,10	scopus actionis, prima agendorum cau-	
473,	32	scapularum lati musculi	311,43	sa	216,60
sanitatis turbae studium, medendiq; me-		scapularum motus à quibus proficiunt		scopus curacionis primus à morbisq; di-	
thodis, consilij in corporibus casus,		musculis	170,25.171,4,8.	ffusionibus nascitur	1149,14
& signis	438,1	295,	39	scopus in curandis ulceribus præcipuus	
Supra est musum plurimum cōtium		Scapularum usus	191,40	quis	1156,11
418,	48	Scardari ex oleo usus	1271,9	scopus in ozænis curandis quis	1184,3
supra est magis dolorem sedat	1208,63	Scarcifanda crura, prius sunt foveada		34	
Supiens deo similis	421,3	per spongion calente aqua	1000,	Scardij facies	1107,8
Supiens omnino à peccato immunis		46		securum cadavera interrupta tueri	
421,	3	securificat quas partes, & in quem usum		1232,	47
Supientia quid	840,26	seleamas	Ibid.16	Scoria quale medicamen	1125,11
Supientissimus solus scipsum perfecit co-		securificatione quādo sit utendum	975,1	Secordopragli natura	1170,10
grosit	419,44	securificationes profundiores quando con-		Scorpij aculeus	745,8
Supor acris est calidus	1047,58	ueniunt	979,17	Scorpedes quem uim possident	1170,
Supor acridus fuscus reperitur in exaly		securificatio quibus morbis conuenit		23	
de & oxylepabo	1045,61	1000,	49	Scorpionis ictus grauisima inducit sym-	
Supores acridi sunt essentia simul tenuis et		securificatio quibus mulieribus sit adhiben-		ptomata	775,45
frigida	Ibid.55	da & quibus secho uerue	994,2	scorpionis uentrem refrigerat	745,8
Supores acres quomodo ab amaris diffe-		Scorus inter faciatiles pisces primus ob-		scorpus, hominis ictum sputo miratur	
rent	1048,41	tinet	400,21	404,	53
Supores exalidè exponere est impossibile		Sceletos uocatur ossum humani corporis		Secretis qui sit saluberrimus	37,43
1020,	10	compactio	111,46	Scripturi nota que	1291,149
Supores ex miscella quantur primarium		Sebiu floris facies	1109,18	Scrupulus continet obolos duos	1790,
quodatum nascuntur	Ibid.36	Sebystris quas uires habent	1100,2,	21	
Supores qui mutant	1046,43	Seientiam habens, nulla in re hallucina-		SCETAE de elementis differētes sicut	
Supores dulcis natura	1043,10	tar	330,90	quantur	34,11
Suporis salji & amari discrimen	1049,	seientiam non inueniunt in rationalibus ani-		scilicet medicorum tres	11,18
57		mae facultatibus	384,16	scilicet principes inter medicos duos	
Suporum acrimo facies	1048,10	seientia ordinandi uictus ex quibus con-		6,	11
Suporum differētia in uariis fructibus		sistit	971,19	se tharon trium conuaria	81,45
1041,	8	Seilla aceto incolla, neruis non inuaria		se tharon forma in parte supparante	
Suporum diuisiones ex doctrine Platonis		1007,	58	581,	51
1019,	60	seille succum recipiendi ratio	Ibid.55	seilio quomodo administranda	162,10
Suporum facultates & opera	1064,	seille uti	1106,63	Secunda	110,45
4		seillonorum confectio	1272,10	seconde alimentum est facinorū dicitur	Ibid.49
Suporum qualitates efficiunt reliquas ean-		Scirbi curatio	945,22. 1054,40.	seconde conuicia cum uero	105,17
dam partes, in linguam, licet non per		1186,	4	seconde constitutio & de scriptio	1059,
uide ab eis percipiuntur	1034,61	scirbi generatio & causa	976,57.	9.109,3. 121,12. & 27	
Suporum singularum qualis sit finis aut		991,11. 1054.10. 1056,9. & 11		seconde nasa in duas uenas & totidem	
terminus	1048,10	scirbi incurabiles ab alijs quomodo di-		arterias coram	121,18
Suporum temperantia	1061,63	seruantur	1186,6	seconde uictus uisum offensa tertium ac-	
Suppyon uti	1118,11	scirbis à priuata uiscida teris, quida me-		erescit	105,19
Sarcocle	709,24	dicamenta conueniunt	1057,19	seconde que parte contingit ut utrum	
Sarcocelle facies	1105,21. 1219,	scirborum species due	708,6	121,	33
56					

EPITOMES GALENI

*secundarij arterie mouentur ad corde for-
tus delitescunt in utero* 240,28
*secundarij arterie omnes sunt propa-
gines arterie ad corde arte* 340,19
secundarij sine charij usas 305,12
*secundarij urine omnes, propagines sunt
maxime urinae* 340,10
*Sed in inflammatione procidentij cataplas-
ma conueniens* 1086,60
secl in inflat quod conferat 1068,32
seclis et musculis et motus qualis 94,
26.
seclis medicamentis Andromachi 1264,
65
seclis muscularum usas 181,48
*seclis muscularum resoluat inmodico frigo-
re* 729,53
seclis prolapsi remedium 116,1,16
*seclis ulcera curare debent, et qua-
lis pharmaca possint* 1264,35
*Semen calidum copiosius gignit, ubi
ad id ipsos ad expansionem priori-
ter, quod uetus ac medendi ratio co-
munit* 481,14
semen ebullientia 483,32
semen cur et candulum 301,4,7
semen, efficiens principium animalis
77,
62
semen extinguitur initio per conuulsiones
779,
7
semen ex semine gigni 111,59
*semen est facultas et materia mensurae,
matris et facultas* 116,15
semen seminum quo pulis gignatur
301,
19
*semen seminum tenet frigiditas mas-
culi* 108,63
*semen genitale extra propria uasa con-
ti-
pi* 834,13
*semen gignit uerum, arterium, uerum, et
prima animalium organa* 107,55
*semen maris, principium animalis efficit
non iterum; motus* 298,60, 199,31
*semen muliebri confert animalis genera-
tioni, et uoluptatem excitat* 301,3
semen muliebri quide 775,1
*semen muliebri solum potest facere ma-
lem gignere* 115,26
semen muliebri uis in utero misetur
108,
56
semen non esse permittunt que fuerant
106,3,
27
*semen non gignitur in astibus glandu-
latis* 120,60
semen opificis habet rationem 124,61
semen profectum quide esse debet 117,
33
semen prouocantia supprimunt
106,3,
13
semen que gignunt extingunt 1064,
7,
1118,12
*semen que materia trahit ab utero, et
per quos uis* 108,29
semen quod se 116,19
semen quod imperfectum mouetur si se-

mina: quod perfectum, masculum
299,
9
*semen quo tempore preterit ad concipi-
tar* 106,34
*semen retentum quom mensura suppres-
sa, quibus grauiora symptomata uise-
rat* 775,6, 10
semen sanguine succus 419,16
semen simularum est partium 117,10
*semen succus est matrici conuenientissi-
mus* 301,38
semen supprimant omnia refrigerantia
106,1,
11
*semen et mensurae qualia habent prin-
cipia* 116,23
*semen ubique prepollet, ex pars domi-
nanti sit succus* 117,61
semen uisile et muliebri nutritur 301,9
*semen uisile est membrarum et uisio-
rum omnis origo* 302,6
semen uisile quide 299,4
semen uisile spiritus plenior 108,13
*semen uisum perfectum ex uisili et ma-
luebri constat* 113,19
*semen utrumque necessarium miscendum ad
fecundationem* 299,16
Semicytula recipit aculeola duo 119,1,
61
*semina distansum reposita, cur uires be-
neant inbecilliores* 373,50
semina facultate suis plantis similia
414,
63
*seminibus uasa formine profecta ad testu-
bus, inferuntur in cornu matris*
108,
10
seminibus meatus 112,15
*semina parua mole multum substantiam
reddunt, optimi sunt succi et mul-
ti alimenti* 374,40
semina praeformata que sunt 403,31
semina praeformata que sunt 374,41
semina sensientia que 413,12
*semina quebus necesse est diligenter pur-
ganda* 128,14
*seminaria in feminis uasa continent se-
men* 105,1
seminarij meatus positio 304,57
seminarij uisus inferio in pudendum
113,
40
semina rugosa deteriora 273,38
seminibus quando utendum 116,41
*seminis infort quatuor facultates natura-
les* 108,15
seminis et lassis elaboratio 344,31
*seminis excretionem et compressionem
comitari ingens uoluptas et cupidi-
tatis* 673,60
seminis sensientis usas quis 108,59
seminis muliebri proprium 116,51
seminis substantia 301,23
seminis substantia quibus aptissima
108,
10
Semper uis facultas 1067,18
*Sensitibus ad inclinante etiale, non gra-
re sed magnitudine differt* 803,19

sensitibus interperies quide est 677,53
sensitibus morbus naturalis est 471,14
sensitibus quae ratione possit obsequi 805,
49
sensitibus quid 804,1
Senes consueti laboribus sunt extingendi
467,
8
senes crebrius et parcius cibandi 468,2
Senesque corpora ob inuatum calorem
304,
29
*senes cur sent ad uires suas functiones cor-
pus malis effluuiis feriat* 693,19
senes cur tremuli 710,43
senes cur uigiles 738,56
senes desipunt frigiditatis ratione
70,
65
*senes extingendi consueti opere, ut si ma-
dum notum sit* 470,59
*senes naturae temperie sunt facili, humi-
di et crementarum copia* 461,6
senes amores carere robore 99,17
*senes quibus praesidiis uti debeant, ne in
obstructiones incident* 469,4
*senes solibus paribus sunt facili, excre-
mentorum aut copia uisibili* 1014,
28
senibus ad quibus cibis abstinentiam
468,
53
*senibus deligenda que humectant et cal-
faciant* 470,55
*senibus ratione que condescentibus ex-
pedit uisum ratio* 467,63
senibus quide esse debet exercitio
466,
39
*senibus respiratio est parca et breu-
486,
65
senibus saluta meliora recitanda 469,2
senibus systole tardior 509,46
senibus uisus humectans et gignit 470,3
*senibus uisus et alius quibus medicamen-
tis augere cibum mouenda* 470,8
Senij accurata descriptio 429,40
senio omnia animalia sunt obnoxia 803,
39
*senium ab inclinante quibus uisus distin-
guetur* 105,39
senium ad interitum est uia 46,30
*senium corrigendum per caliditatem et
humectantia* 466,14
*senium ex morbo absolutum, est incurabi-
le: non absolutum, cibo inflaturan-
dum* 101,19
senium ex morbo quid dicatur 575,64,
384,1,
913,35
senium ex morbo quomodo introducat
806,
5
senium nec curari, nec sanari potest
105,
23
senium quid 470,47
Sensibilia multa sensum fugiunt 91,3
*senibilibus cognitio inestione scholae co-
firmatur* 1162,40
Sensoria instrumenta in capite quatuor
253,
20
sensoria possunt aeternum mobile 252,28*

I N D E X.

- fenforia que quibus sint crustiora aut le-
 niura 749, 51
 fenforia voluntarie agentia duplicia ha-
 bent actuum genus 352, 35
 fenforij alteratio, ut fiat fenforis, percipi de-
 bet ab imaginatione, retentione, et
 memoria 353, 35
 fenforiorum instrumentorum singula, qua-
 lita esse dicuntur 347, 33
 fenforiorum dum sentiuntur 352, 30
 fenforiorum non immutatur a quocumque fenfori-
 biles 353, 44
 fenforiorum oritur geminatio 354, 55
 fenforia acutissima praeclara, et de amara
 acris non tolerant 976, 10
 fenforia amissa, quibus contingit motus per-
 diti 719, 34
 fenforia iudicanda eucrasia et dyscrasia
 724, 7
 fenforia alterio si sit consuetudo cruditas tunc
 in primis uris, quibus in externo cor-
 poris habitis consistens, quid agentis
 463, 46
 fenforis communis symptomata que sunt
 665, 60
 fenforis depravati symptomata que
 676, 31
 fenforis est alterationis dignitas 347, 35
 fenforis et motus non ex eisdem nervis, sin-
 gulis digitis differant 1615, 6
 fenforis et motus erigo consistit in erec-
 tio 716, 14
 fenforis et motus qui via suppeditatur
 344, 43
 fenforis inest partibus nervis praeclara
 913, 7
 fenforis in iudicandis medicamentis non
 sunt continendi 1018, 39
 fenforis in passione consistit 510, 47
 fenforis instrumentum alteratur dum sen-
 tiuntur 348, 23
 fenforis intra se nullum affectionem venien-
 tem patiuntur 673, 49
 fenforis non est sine alteratione 64, 35
 fenforis non fit absque nervi affectu 346, 23
 fenforis nullas, quibus et quibus sit sen-
 gus in arteriis continens, potest con-
 monstrare 551, 15
 fenforis partis affectus que exhibet indi-
 cantes 388, 63
 fenforis quomodo sunt 675, 14
 fenforis que potest excrescere 1046, 20
 fenforis sensibilem iudex 552, 6
 fenforis alterius, aerem se quibus humorum
 quidaten 693, 64
 fenforis ulceratus nullus plenitudo est
 propria nota 699, 37
 fenforis ulceratus triplex 455, 33
 fenforis ulceratus unde proveniat 455, 38
 906, 31
 fenforis ulcerosis pro sentit, et dicitur humo-
 ribus ab alio in corpore habundant
 distrahens, que medicandi ratione sit uten-
 dum 461, 63
 fenforis instrumenta que 338, 47
 fenforis qui maiore minore voluptate
 afficiuntur, et crustiora obiectis pos-
 sident 673, 39
 fenforis, aeris quiddam est pati 719, 20
 fenforis aeris facultas 1093, 47
 fenforis corpora plurimum immutat pin-
 guis frigiditas, post fenforis manutinet
 adhibita 466, 15
 fenforis nemo quietem ex solo possidet,
 sed neque excruciatum urbem ibidem
 27
 fenforis ista quoniam non habet 339, 14
 fenforis nemo in ventrem descendit
 141, 16
 fenforis nonales aggressivis moribus
 71, 35
 fenforis cordis semina 338, 65
 fenforis foremina duo 376, 24
 fenforis decretoria est merdorum au-
 torum 619, 39
 fenforis nemo tres viginti diebus semper de-
 scribuntur 615, 49
 fenforis perfecta est periodus 613, 47
 fenforis quod diebus consistit 621, 18
 fenforis per se satis, citius centum odogin-
 ta quatuor diebus et di non potest
 327, 35
 fenforis istis partes et dendi primis termi-
 nus 336, 45
 fenforis quatuor est index 608, 39
 fenforis transversi affectus, ut passus veni-
 mus 603, 3
 fenforis transversi conectiones 172, 64
 fenforis transversi et motus et musculus
 qualis 94, 28
 fenforis transversi figura, situs, et nervi
 391, 50, 489, 24
 fenforis transversi origo 127, 8
 fenforis transversi partes 175, 60
 fenforis transversi substantia et centrum
 174, 37
 fenforis transversi substantia et tonica
 249, 7
 fenforis transversi substantia, exilis mu-
 sculus: figura, arcuatus est 178, 54
 fenforis transversi usus 174, 54, 322, 42, 483, 52
 fenforis transversio animalis utitur solo in par-
 tes et proportionibus 189, 4
 fenforis transversio inflammato quam caler-
 runt commotiones erit, quem admo-
 dum suffocationes pulmonis plethorae
 ne obfist 516, 1
 fenforis ageris quomodo mixtus sanguis
 sit 995, 17
 fenforis transversum interiacet cordi et
 hepati 222, 17
 fenforis transversum nascitur a costis spu-
 ritum 178, 60
 fenforis transversum, piores, diaphrag-
 ma, idem 186, 51
 fenforis transversum respirations argu-
 mentum, distinguit spiritus a non-
 valibus moribus 336, 39, 500, 65
 fenforis transversum separat transchilum
 a non faciliatem ab appetitiva 62
 fenforis transversum solum perficit lenem
 respiratorium 751, 43
 fenforis transversum substantia et usu
 musculus 187, 32
 fenforis transversum alterius tensionem
 mutat 490, 4
 fenforis a mente non ex mente, sed ex sim-
 pli, mo guttore profusissimum 321, 57
 fenforis mentis rancitas 184, 15
 fenforis quae efficiunt 795, 32
 fenforis quas optime utatur 530, 60
 fenforis terrena que 754, 47
 fenforis fructus 186, 19
 fenforis genera omnia, excrescentia 813, 5
 fenforis facultas 1105, 43
 fenforis ex genere cibationum 325, 7, 3
 fenforis bonitas que in matricem con-
 sistit ubi ineluctat, partes exilis ad
 agendum, voluptatemque maxime ad
 citat 503, 13
 fenforis facultas 1080, 5
 fenforis quatuor, eisdem generibus a quibus
 corrumpitur 433, 5
 fenforis alium laxat 1015, 9
 fenforis, est sanguinis utridum 328, 10
 fenforis sanguinis quas affectus producit
 687, 2
 fenforis vis 1106, 53
 fenforis magis et albi facultas
 1105, 58
 fenforis cum melle in placentas cogitur
 377, 51
 fenforis et erysimum cassum ibidem 35
 fenforis subitum et ineluctum ibidem 27
 fenforis fides et albi ibidem 50
 fenforis quam habet non 135, 49
 fenforis mado nomine vocatur fuit An-
 tonius 899, 54
 fenforis nervorum conectionis pars in
 la in aliis quoniam rhorax musculus pro-
 pagatur 190, 54
 fenforis caput etyles duo 329, 57, 129, 42
 fenforis Romanus continet antiquas viginti
 1151, 60
 fenforis a largo calore liquata efficiunt
 humiditas refriguit 51, 10
 fenforis citra resonant que sunt 117, 09
 27
 fenforis corpus nostrum citra conge-
 lationem 1055, 13
 fenforis simul et astringit 1176, 40
 fenforis amentum dura sunt 47, 48
 fenforis quoniam madra melius sonat 142, 28
 fenforis aridibus utiliora 414, 14
 fenforis necesse est corpus possit consi-
 stendi nigorem non contingit 850, 32
 fenforis causa est omnis morbiditas cor-
 porum 475, 48
 fenforis consummata, insonabilis est
 861, 8

I N D E X.

mus	99,61	speciem animalis à morte potius suscipit	run	161,47	62
formam quid conciliet	1109,19,1111,20	furdo	116,40	spindulum musculorum fibræ oblique	176,
formam à balneo conico quid uelidat et males	453,4,4	species indiduas reperitur in singulis rerum generibus	349,6	spindulum musculorum præteritus	176,
formam ad illam rationem esse uale	571,4	species omnes uolari possunt pars, non autem contrari	337,31	spindulum musculorum quatuor capite	60
formam conuocat	917,14	speculatio circa medicorum studia, quid proficiat	35,54	spina supra diaphragma unde gignatur	121,
formam diuersam crudus succus digni probetur, et uiscera reddi grauiora	917,19	speculatio diuisoria et compositiua maxime necessaria ad artem constitutionalem	353,	spina tota per decursum spandylum diuisa in partes octuaginta æquales	229,
formam moris frater	570,64	353,	40	33	
formam naturalis qui	571,18	speculatione artis ratio conformande experientia	4,31	spina nigra quatuor uertebriis consistit	234,
formam post coalescentes succos perdurant, immodecitas excipit	570,58	Spemla uertebra	57,3	Spina et uita separari non possunt	774,
formam præter naturam	571,18	Spine faciles	1080,37	spicatio et non quando percant	181,14
formam profundam, suspendi functiones laetæ	676,4	spicatum eorum uisum situm et prægrissum in masculis	303,82	spicatio et non quando percant	181,14
formam quomodo fiat	571,15	spicis sunt ita	374,14	spicatum erigitur simul et rara frigida-tion significat	757,10
formam quos pulvis faciat	577,13	spicula, quod	708,42 877,7	spicatum facili in quibus acutis uertibus ad salutem magnam habeat momentum	616,
formam iudicialis	1107,4,3	spicula et pueri exercitationis remota-tis	366,10, et 52, et 61, 367,	spicatio frequens quid inducit	757,12
formam morum remedia uaria Ardy genit	1111,17	33 et 39		spicatio magna simul et rara non est inseparabilis à delirio	499,64
formam auriem non sunt compescunt in febribus	ibid. 11	spicere parue exercitatio uariæ omni puerulo	367,46	spicatum resolutio unde contingit	759,
formam auriem ab exasperatione sentendi faciliorem auriem in uno per sepe faciente	ibid. 10	spicorides os	112,50	spicatum resolutio unde contingit	759,
formam in auriem cause	ibid. 6	spicorides os fortissime apophyses ptery-gorides	112,51	spicatio possima que	747,43
sophismata à quibus possunt discerni	115,	spiculus Lemnia	1115,35	spicatum à corde uentis, corpus auriem	91,
sophismata celsitudo ex similitudine quoniam cum ueris habent	ibid. 16	spiculus nardi sanctæ	1097,51	spicatum animalis partem à ueris, partem et præcipua ab auriem gigni	112,
sophismata exterminanda sunt	1148,66	spiculus nardi radii, quare sic dicta	118,11	spicatum balisam quæ gignatur	947,
sophismata res ipsas negligunt, de nominibus sciunt	310,53	spina	230,15	spicatum alterationis cause que	919,50
sophismata uentis inductionibus et exen-pis	1011,64	spina et corporis quædam carina	210,4	spicatum animalis à cerebro demittitur ad oculos	669,1
sopor consensu sequi uolentes dolo-res	750,18	spina constat ex quatuor et uiginti ossibus	116,13	spicatum animalis à cerebro nascitur	919,
sopor quid	ibid. 12	spina et extremos, et latera	116,14	spicatum animalis, anime propriæ muta-tia	771,40
soporifera quare uideantur	916,11, et 30	spina figura media non recta, sed aliquam curua	104,55	spicatum animalis continetur in cerebro ut tricus	142,66, 31, 10, 14, 11, 1
soporifera sunt, que extremis refrigerant	675,	spina partes aliter, præstantiores sunt	751,16	spicatum animalis quid	129,1, 510,
soporifera quando utantur	916,14	751,	38	spicatum animalis non est anime substan-tia	344,10
soporis causa	757,10, 718, 63, 75, 19,	spina partes à quibus masculis fluitat	276,43	spicatum animalis nutritionem, esse minus commune respirantem et pulsat	508,
Sorbi faciles	1098,19	spina partes maxime quatuor, collum, dorsum, lumbi, et sacrum	116,15	spicatum animalis præcipua nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28
Sordes ab arte medicamento exstiter, quomodo discernende ab illis, que uel ex propria ratione producit	1171,41	spina, que corporis uetus quædam cari-na est, constructio	115,4,4	spicatum animalis quædam nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28
Sordes excretionum	1120,57	spina reuocet	117,23	spicatum animalis quædam nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28
Sordes breuiter quibus affectibus confon-tur	1121,53	spina uasa quæ uia instrumentum	101,16	spicatum animalis quædam nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28
Sordes quam uia habeant	1104,60	spina uertebra quinta affectu resoluta manus	677,53	spicatum animalis quædam nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28
et SPACIA per uentis insita	62,15	spina uisus, constructio et constructio	116,	spicatum animalis quædam nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28
Spadones inter coruam que ratione uoluptate fruuntur	102,21	spina uisus, constructio et constructio	116,	spicatum animalis quædam nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28
Spadones oculis perit uirtutes	112,49	spina uisus, constructio et constructio	116,	spicatum animalis quædam nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28
Spargam faciles	1107,4,8	spina uisus, constructio et constructio	116,	spicatum animalis quædam nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28
Species animalis ad fabricas generatio-nis materiam consequatur	116,9,119,60	spina uisus, constructio et constructio	116,	spicatum animalis quædam nutritur ex in-spiratione que fit per uentis	487,28

EPITOMES GALENI

spiritus cohibitus ad appetitum con-	ferre	167,46	status motus est	71,5
ferens, quo suo modo	443,2		status morbi	717,9
spiritus cohibitus cum operi conferat		500,16	status morbi cognoscendus est; perco-	
447,71.	443,24		gnoscendus	614,16: 640,41
spiritus cohibitus, est muscularum libera-		877,16	status morbi, omnium crifidum est regula	
vis & ad diuina exercitatio		640,		19
446,	5	223,18	status tempore elapso, paulatim morbi	
spiritus cohibitus interperenda excrecio		1124,50	soluatur, amicus, ab est periculis	
inherenti	448,17		libet.	41
spiritus cohibitus, color in respirantem		290,14	status tempus in pleuride quando iam	
organum ingreditur	679,44	111,	adesse significatur	629,17
spiritus cohibitus que probanda & que			status inchoentis, tunc totius morbi, par	
improbanda	447,40	216,		624,
spiritus cohibitus quomodo fiat libidem		41	Stenoma quid	707,6 949,40
54		793,11	stetile in magnis solis defectibus melius	
spiritus cohibitus coadusque plurimum co-		1108,65	ex profundis puris	267,8
ducit ad sensum facultatem, ad dispo-		283,	stetile iuxta ad descriptionibus, est perit	
latus contra	669,6	14	1175,	81
spiritus densus quid significet	502,48		Stercoris asceris & ciceronem milus	
spiritus densus iuxta & magnas quando		290,20	usus	111,17
reddat	503,1		Stercoris habet uti	1122, 61. 1124,2
spiritus dui cohibitus sanat singulas		287,18	53. Capilli 1122,27. Gallinacei	
504,	53		1122,12. Ocelli ibid. 5. Canis	
spiritus effluuium que corruptum		287,	1122,1. Columbae 1122,11	
919,	51	61	stercus columbinum in flammam potest	
spiritus est in ipsa generatione motus			5,64. Cracodylem & sterna-	
precipuum	296,51		rum quibus affi debet conferat	112, 1
spiritus flatulentes in acribus mensibus		287,44	45	
unde colligatur	1209,20		stercus binarium sanat gutturis phlegma	
spiritus frigidos are et nardus effluuium,		114,4,5	net 1122,12. Lapsum quibus con-	
in acuto tenent morbus periculosus		112,8	ferat	112,14
502,15.	503,6	114,14,8	stercus morium alopecias curat	1121,42
spiritus iuxta qualitas quorum effluuium			stercus nullum nec refrigerat, nec hume-	
net	493,51		facit	1127,52
spiritus membris & per malum tempus,		619,	steriles ac iudae frequentissimè spiritus	
quid significet	5-1,14		interceptione laborant	505,49
spiritus magnus & rarus delirium indi-			sterilitatem quid indicat	1100,65
cat	757,8		sternu: amictus auxilium grandis	
spiritus naturalis 124,54. In hepate			110,55. Quando sunt	120,56
conuocatur	919,40		sternum: amictus auxilium grandis	612,
spiritus nihil aut parum in cor transfusi-		27,19	54	
unt	91,11	615,	sternum: amictus quoniam nescit ualidius à pe-	
spiritus obfcuri qui dicantur	505,53.		dicere impeditur humores exultat	679,
Quibus sunt mali	112,47		14	
spiritus acuti conferat ad oculorum adha-		611,12	sternum: amictus 1121. Fit ad solem, &	
erent	163,11		quare 110,63. Interdum ex acciden-	
spiritus parum & dens doloris est si-		112,14	ti conducti excrementis preteritis edu-	
gnum 495,14. Quibus superuacua			endis, purgatis uicem & gulum	
offi debet 112. 49. 50. 49. 502,		715,	682,	57
55.	505,41	26	sternum: amictus interdum expat ea que rui-	
spiritus princip aliora instrumenta que		615,15	ci per usum non potuerunt	681,6
112,	10	¶ S Q V A M A B	sternum: amictus quid prouocet	1074,
spiritus qualitas, non substantia, cordi est		1122,	35-	2108,17
ex ipso	91,14	58	sternum: amictus usus	2015,10.
spiritus quantitas distentionis organorum			Est utilitas	112,1
spiritum semper proportionem re-		112,4,5	sternum: amictus phorimum inuit caput, nisi ob-	
spendet, quando naturaliter se habet		¶ S T A C H Y S	deficiationem accendit	679,23
495,	28	1107,	sternum: amictus interdum admittunt	
spiritus subtilis quid	505,46		lenienter	1207,4. & 18
spiritus ubi conficiatur	242,59	1048,25	sternum: amictus quomodo accidit	200,10
spiritus subtilis que 144,21. A corde		123,6,21	Scaly facies	1220,1
reficitur	124,52. 144,16.	1076,60	Stimuli canis sui facientis	112,17
919,	38	Staphylomata	stipens canem que sunt	890,61
spiritus huius in musculi facultas	1075,40	709,61	stipato duplex	897,24. 905,45
Splendor oculi inuicem cum externis in-		Stare homines possunt duobus modis pe-	stipato in foribus uisum unde cen-	
		ditur, at moueri non item	tinget	
		Stetioni forme, emptos & oblongos pe-		
		des esse appropos		
		211,10		

I N D E X.

tingit	916,4	quid induit	689,10	Non admittunt aene seditionem, quid carent robore	991,11	
stipitamentum quae excident	905,11	Striginea balnearum quom non habeat	1076,	succis plantarum omnibus duplex extre- mentum inest	1015,47	
stipitamentum curatio	916,19	Strumae quando fiant	949,16	succis unioles in mentridio cellulis quas conferunt	1011,12	
Stipites a natura gubernantur	73,12	Struma et choras	709,13	succi unioles ad gignendos morbos magna habent vim	404,40.684,52	
Stipites dupli ex causa corruptuntur	954,5	Struma quid	914,43	succorum calfacientium differentie	1162,	
954,5. Habent congruentiam solu- tionis, et praeclara sunt quaeque facul- tates naturalibus	90,15	Strumae quid difficiat	1089,14	succorum proprietates quando cernun- tur	1044,17	
Plato uocat animalia ibid. 4.6.	Q20	Strutibon quom habeat vim	1108,15	succorum quoniam plus minusque requirant mellis	1231,15	
modo gignuntur	317,59	Suturinae causa	683,107.11,64	succi acri quae gignant	906,18	
Stipitibus uicisse solum appetitiorum idem, aut Plato	337,21	Suturinae quid	718,131.719,13	succi carni cumq; barcentis evaporantia	461,	
Stipitibus inest anima uergetatrix	73,19	Superficientibus inficuntur calfacientia, ut coron malignitatem corrigant, ro- mentis uires deducant	1151,2	succi frigidos super: calidos aegilae gi- gnunt	458,54	
Stipites conducere ad celere concitatio- nem uisum	1170,61	Stupidas frigiditas efficit	714,1730,	succi frigidos subesse quis pulsus indi- cat	918,6	
Stipites quom habeat vim	1108,5	35	Stuporis dispositio qualis	731,14	succi lentos et crassos quid sciet et externum	1123,13
Stipitibus de anima opinio	703,7	Stupor medicis dolorum soluit	739,53	succum melancholicum purgatis	941,1	
Stomatibus Asclepiadis	1150,37	Stupor omnibus accidere paribus potest ibid.	61	Quae gignant	703,16	
Stomatibus debent habere aspiditiam uim propellentem	1151,57	Stupor quid	1060,49.	succi appositus aluci parti, non reuelli- tur ab altera	88,19	
Stomatibus Galii	1150,19	modo	677,11.	succi atre	81,6	
Stomatibus Asclepiadis	1151,13	Sturi abhorret cinis	710,	succi caerulei pomi seruisat ut mition	1044,	
Stomatibus inextinguibile	217,39	Syracis differentie	1183,19.	13		
Stomatibus acribissima conficiendi ratio	1231,	facilis	1108,10.1105,18	succi Cyrenaei	1076,17.	
Stomatibus inflammationibus induratis a- pta	ibid. 21	Substantia aerea mista est per omnia sen- sum	781,11	Vitres	458,13	
Stomatibus diuorem compositio apta o- mnibus est	1133,14	Substantia cerebri, uerum non et spiritalis medulla, eadem	1144,9	Sudores cerebri quando soli sint expellun- tur	643,51.	
Stomatibus ex maslo compositio	1133,59	Substantia cuiusq; rei a quatuor pri- mis constituitur	37,63	643,51. Rotasus uires inellu- cent	691,12.	
Stomatibus ex succo nucum quadruplex co- positio	1133,10	Substantia generum omnium supremum	41	Frigidi quid signi- ficent	630,5.	
Stomatibus ex succo nucum aridum ad o- mnem inflammationem conuenientissimi- mo compositio	1131,60	Substantia generum omnium supremum	41	Omnes febribus sunt proprii	618,54.	
Stomatibus ad omnia oris uitia	1131,4	Substantia partium deflata atq; mutatur	127,	Quos diffi- cult affectus	ibid. 58.	
Stomatibus Andromachi ex bsa, origani congruent	ibid. 19	Substantia partis quid induit	11,5	Retinent odorem et colorem eius, quom pur- gent, humores	691,17	
Stomatibus Andromachi ex maslo ibid.	24	Substantia quid	356,18.	Sudoris color a succo profectus, non a solidis animalis partibus	457,59	
Stomatibus Asclepiadis	ibid. 61	Succo uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Sudoris materia et generationis modus	1130,	
Stomatibus ex nucibus deuorandis non est	1133,8	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	41		
Stomatibus ex nucum, ceteris om- nibus praestat	ibid. 18	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Sudoris tonitruis fluuiis tonitruis causae	691,19	
Stomatibus ex nucibus deuorandis non est	1133,8	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Sudor	714,45	
Stomatibus ex nucum, ceteris om- nibus praestat	ibid. 18	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Sudor sanguinolentus	710,51	
Stomatibus ex nucibus deuorandis non est	1133,8	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Sudor succorum uisum corpus nota	457,	
Stomatibus ex nucum, ceteris om- nibus praestat	ibid. 18	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Suffocantur animalia ob qualitatis pen- nam, dum respiratio rebotetur	415,12	
Stomatibus ex nucibus deuorandis non est	1133,8	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Suffocantur medulla expirantia	414,58	
Stomatibus ex nucum, ceteris om- nibus praestat	ibid. 18	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Suffocantur quid 611,11. Quando accidit	661,	
Stomatibus ex nucibus deuorandis non est	1133,8	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Suffocantur laborantes, quid cernere pos- sunt	347,13	
Stomatibus ex nucum, ceteris om- nibus praestat	ibid. 18	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Suffocantur incipientem quid perferant	1213,	
Stomatibus ex nucibus deuorandis non est	1133,8	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	21		
Stomatibus ex nucum, ceteris om- nibus praestat	ibid. 18	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Suffocantur gigni inter crystallum et eburnum	1251,4.	
Stomatibus ex nucibus deuorandis non est	1133,8	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Quomodo differt a uisporibus ad oculis a mentridio e- lentis	749,5	
Stomatibus ex nucum, ceteris om- nibus praestat	ibid. 18	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Suffocantur caracida quae uoluerit fini re- cessisse	112,1.	
Stomatibus ex nucibus deuorandis non est	1133,8	Succi uis acciscant aut compietrescent: so- la autem eleum, mel et uinum in lau- gum durant tempus	1034,9	Eodem quae accidunt		

EPITOMES GALENI

367.	30	70.	59	Tabes	661.11
fussillorum purgandorum ratio	267.	Symmetria omnis duplici ratione dicitur		tabes cives composita que	803.5
55		430.	42	tabes quibus supervenire consueverit libi.	
fussillorum quantum possint usum recipere	668.61	symmetrium quid dicatur	1064.31	11.719.34. Ex passis quando dicitur	787.59. Incurabilis quando sit
fussillorum remedia	1220.55	symphysis quid	111.48	160.17. Non sufficiens autem principio afflicto	805.18
Suzgallano vel hypopion quid sit	1223.	symphysis dupliciter differt	152.6	tabes omnes quo modo sint ceteras	806.
54. Curatio	1221.60	symphysis magni vis	1108.61.	tabes quibus sit morbus, et unde generatur	479.10.188.31. Quorum effectus dicitur
fussillorum medicamentum Hecet	1324.	facultas	121.50	2. Quibus de causis accidet libi. 8.	803.15
43		Symptoma duplex	844.2.	Synapsis quando accidet	806.17.
fussillorum pharmaca ab Archigene prodita	1220.15	ne et morbo quid differat	665.8	Vera curatio quo partes omnes occupet	805.62
Sulfuris vires	1121.47	symptoma largus sumptum quid	665.1	Tabes partes quibus alimenta possunt	808.19
Suis extremas partes epilepticas conscribit	1007.	Propter diuini triplicem est	121.16	tabes et partem expirantes fugiendi	781.
1007.	4	symptoma sequatur morbum	121.1	tabes arteriarum optimam	1241.35
Sumptionem diffinitione quatuor	55.12	symptoma symptomen succedit	667.11	tabes terribile causa	806.15. Quarta
Supercilia ambrosia cantantes ofium quibus coherent	191.56	symptomata ex se, nec curatio ratio nem inducant, nec primum immutand	925.	nam et obijciatur	803.15
Supercilia et si omni inde nervorum propages accipiant	261.45	925.	47	Tantum nostrum qui motus repellunt	550.
Superciliorum usus	268.51	symptomata que sese modo ac necessario sequantur, et que non	693.65	tabu non plures explorare in hydrope. Summar ne accipiant in ventris, re	551.58
Superfluitas cuiusque partis, illius propriam diffinitionem inducit	621.52.	symptomata que dicenda	668.8	tabes cognoscendum qualiter est in	48.49
Superfluitas mordax et aeris quibus effluat	78.153	symptomata judicare negligit morbo quando cognoscitur	925.56	tabes et gustus quibus intercedunt	347.23
Superius ex ea expelluntur semper a for moribus ad imbecilliores partiales	934.	symptomatum in corpore afflicto	699.39.	tabes facies omnium crassissime	128.
35		systemum, differentia prima quidem	699.39.	10. Hamis temperant medius est	8051.47.
Suppuratio quid	1052.51.	plex	667.25	ludex est duri et molli	335.58.
acutis	575.16.	symptomata in universis adhibentur tria reperiuntur genera	614.44	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Quo ipso prohibent	979.7.	Synachis quo vocet Hippoc.	742.15	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Quo et quibus medicamentis morbo	1113.11	franchie quid	971.51	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Suppurati qui dicantur	755.14	Synarthrosis	131.52.	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sura que accipiat	118.16	33.1.	1	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sura tota cariosa	513.62	Synchysis nihil in corpore	218.12	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Surdasit contrarius profectus opus habent, ut quo aurium doloribus infunditur	1222.17	Synchondrosis	131.9	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Surdasit remedia ab Archigene conscripta	1221.12	Synchysis ossa quadrilatera	121.62	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sursum effluere quod	210.57	Synchysis stomacica quomodo vires exal	764.59	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sus magnus, aptissimus ad anatomen sibilatorem organonem	187.62	mat	691.20.	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Suppurantes ex ludis, post longum tempus inflammationem magnam efficiunt	500.	Synchysis quid	691.20.	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
14		759.	47	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sutura coronalis per medium anteriorem ventriculorum cerebri fitur transversa	260.16	Synchysis laborantibus omnibus quide	119.12	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
51		non sit exhibendum	928.16	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sutura capitis quinz	151.46	Synchysis preceptis est aurium lapsus	929.	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sutura cerebri tres	264.28	15. Quibus succedat casus	911.17	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sutura labiodentes	259.53	Synchysis ab ore utriusque arterie curatio	920.19.	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sutura in quo capite perit	264.57	920.19.	Acrobatis	928.14	ludicantes temperantem, sit ac
Sutura media que	122.26	Synchysis	132.10.	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sutura per capitis longitudinem semper servatur	118.40	Synchysis generatio	802.14	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sutura quid libi. 2. Rella	260.18	Synchysis quando orientur	899.1	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Suturas etiam quibus ossa desiderantur	11	Synchysis universion tempus est unica ac	791.31	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
et SYCOMORVM substantia et fa	136.59	cessio	802.10	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
culas	136.59	Synchysis tres differentias	791.36	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Synoph. extensor quorundam fraudulentum	581.21	Curatio	915.51	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
Sydera preclara esse summa intelligentia		Synchysis non incidit in imbecillitas vires	920.	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
		920.	43	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
		Synchysis	132.10	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
		Synchysis reperiri quo effluat pro	509.31	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
		1. nione respiciat	509.31	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
		Synchysis naturalis est relaxatio aditus	509.	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
		509.	25	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
		T		ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
		Tabes cor quibus de causis posita	789.55	ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est
		corpe		ludicantes temperantem, sit ac	quisitum autem qualiter est

Tellurum salisum, utrum facile

114, 1.

Temperamentis distincta, pulvis ut natus

71, 1, 39

Temperamentis complentur particulari sub

stantia 196, 57

Temperamentis corporis, animae motus ut

rationis, illiusque et plodius 70, 3

Temperamentis dominum et cibum con

sideranda 370, 3

Temperamentis incoagulata, similia postu

lent 895, 54

Temperamentis non indefinitis ex natura

excrementorum indicanda 55, 31

Temperamentis fructibus similibus, alte

ratibus contrariis 474, 60

Temperamentis actiois quando similia, et

quando contrariis requirunt 895, 55

Temperamentis calidi et humidus indicia

814, 31. Calidi et siccus indicia ibi.

25, 890, 1. Calidiorum indicia 824, 5

Calidi triplex differentia 473, 18.

Frigidi et humidus indicia 824, 30.

51, 49. Frigida indicia 524, 14. Hu

midus indicia ibi. 22. Moderati indicia

66, 52, 823, 62. Siccus indicia

814, 19

In Temperamentis indicanda secundum

mutantes, ex quibus in quae sunt

55, 3

Temperamentis calidioribus absque excessu bu

miditatis aut succitatis, quae adfunt

473, 53

Temperamentis calidis absque humoris et

humiditatis excessu, quantum vixi offere

dam 473, 33

Temperamentis calidis et siccis praedictis,

partibus mollioribus excretionibus ex

creandi 474, 13. Quibus visus rati'o

conueniat 475, 22

Temperamentorum calidiorum differentia

41, 47. Differentiae novae 43, 43

Frigidiorum differentiae tres 476, 3

Temperamentorum indicia 825, 4

Temperamentorum calidum et humidum,

quae cura maxime debeat 475, 59.

Calidum et siccum, si per decem

si tempus in frigidum et siccum de

beat, quae sequatur 824, 65

Temperamentorum contrariis visus ratione

mutatur, consideratur autem simili 475,

14. Fit per quilibet 90, 6

Temperamentorum frigidum et humidum

quae debeat visus ratio 476, 20.

Frigidum in utroque, causae se

te habentes, quae cura debeat ibid. 23.

Hemorrhagiae quomodo considerandum

5, 20. Haemorrhagiae licet in principio

detritus, temporis tamen progressu

fit alius melius 475, 57. Medium

conservatur ex duobus remediis atque

contrariis 830, 14. Plantarum co

gnoscitur assidue et gustu 390, 14

R. calidus siccus dom. in modis ut ca

ter baronem absumit 473, 62. Sicut

et frigidum quae ratione fit calidum

diffusum et incoagulandum 476, 7

temperans quis 319, 47

temperantia naturales quae differunt a

morbosis 819, 30

temperantia naturae aliterum omnium con

49, 11

temperantia nullum, calidum et humidum

46, 7

temperantia ad infirmitatem 42, 54

temperantia calida quae 43, 53

temperantia corporum tripliciter assu

monta 43, 30. Frigida et siccis

indicia 824, 60. Partium, curantibus

affectionibus variis 974, 23

temperies quae sequuntur 71, 7

temperie media per ditionem, quomodo co

gnoscatur 1030, 44

temperie medium utriusque extremis testr-

is 1037, 13

temperies aeris pessima quae 41, 9

temperies calida dicitur vel ab eis vel po

testate 44, 1. Calida et siccis, bis su

815, 19. Calida siccis iracundis 73,

20. Duplex est 974, 60. Laboranti

bus, quid indicat ibid. 22. Necessarii

species seu forma est 60, 23. Non

temperata quae 43, 30. Optima cor

porum in adolescentia accedit 473, 17

Optima semper servanda 915, 17.

Optima unde conueniunt 68, 18.

Proba consistit ad animae viuitatem

68, 11. Siccis car pessima 476, 4.

Singularum partium, ex earum frui

tionibus praestanda 52, 62. Tempe

rata quae 43, 42

tempera animalium morborum non ce

dem 187, 18

tempera generationis feruntur quatuor

quae 109, 38. et 60, 190.

2. et 6

temperantia muscularum usus 168, 30.

tempera morbi non dicitur numero de

finiuntur 623, 14

tempera morbi totius sunt quatuor

ibid. 8

tempera morborum 8, 2. Ab animalium

estate quomodo differant 716, 17

tempera morborum ac remedium tri

plex distinguuntur 183, 5

tempera morborum, differentiam reme

diarum non indicant 120, 12

tempera, quod a facilitate requirunt, in

tervenit interdum 183, 33

tempera tria circa nutrimentum condisi

nem distributionemque 87, 56

temperibus singulis qui cibi conueniunt

875, 33

temperi potendum 809, 19

temperum differentia apud medicos du

plex 18, 1

temperum masculi 94, 14. 176, 7

temperum ortus 617, 45

temperum alimentis nec quantitate nec

qualitate indicat 196, 48

temperum a primo conceptu quatuor 12, 4,

11

temperum morborum comparatur aetali a

nimialium 716, 28

Tendit hanc sine periculo consuevit

116, 43

tenetines mouentes digitos 151, 60

tenetines atque nervorum affectus a quo

periculosi sunt, eademque merendi ra

tionem desiderant 116, 4, 43

tenetines capiti 152, 23

tenetines uolens mundum tenet 151, 6

Tendo 11, 16

tendo in alicuius inferos ex tribus a

lis tendentibus constat 114, 39. Ne

nam superius quibusdam in horis crasi

siu tenet scutula et dextera 9,

31

tendo non omnis sensus exprimit ibidem

11

tendentes car uisum membrans atque ro

tendi 199, 47

tendentes digitum unde oriuntur 121,

27. Extendunt et sunt carum

207, 2. Inducunt quae tenent euerunt

945, 38. Mouentes digitos proce

dunt a cubiti musculis 199, 28. Ner

uosi corpora sunt 731, 44

tendunt generatio et usus 93, 23.

199, 32. 104, 43. 121, 30. 874,

25. In articulis digitorum inferiorum

ratio 200, 59. Latitudo et consue

ratio 101, 57. Mouentem digitos pe

dum duo tantum genera producantur

a musculis tribus 213, 34

tendunt natura media est inter ligamen

tum et nervum 93, 8

tendunt, qui insinuantur prebibus, impli

cationes 213, 58

tendo omnis in os insinuat 912, 31.

Primum motus insinuantur 121, 31.

Tento dicitur actus, quando mollior

ligamentum 91, 8

Tentis et perterrescent 683, 31

Tentis uterum asseperre 16, 41

Tentis et interferunt a omnia, facili

ter sunt moderata 414, 19

Tentis conueniunt triplex 9, 12

tentis duplex omnibus inest musculis

201, 65

tentis et consuetudo unde fuit 53, 4, 27

tentis acruerunt quibus de causis contin

gat 716, 5

tentis causa 677, 14. 699, 3. et 11.

105, 65

tentis quod induit 699, 46

tentis quod uenerit ibid 5

Tentis facultas actus et per melle in

tenet: remittit autem oleo 414,

31

tenet facilius alteratur crasso 78, 16

tenet omne, et efficit ad melle superet

677, 60

tenet, sine oleo in testem tenet 150,

47

EPITOMES GALENI

terrena facile digesti 462,19
 terra non contra sunt ignis 1017,15.
 Prompte insalescunt atq; refrigerant
 1016,12. Quando miscetur a-
 stringentibus 925,62
 tendunt et crassum partium que di-
 cuntur 1011,59. 1040,43
 tenuium partium contra prompte alteran-
 tur 615,4
 Tepida si admouantur, dissoluunt men-
 tricali fermentum 891,37
 Terebellæ nson in fratribus capitis Gale-
 nis dantur 878,18
 Terebintha faciles 2109,23
 terebinthina resina 1052,19
 terebinthina soluit alium abstergeatq; in-
 fusa 470,35
 terebinthine faciles 1176,4,2
 1256, 35
 terebinthine et præparata 1176,8
 Terminus sanum prout temporis quis
 122, 14
 tertium tertione exquisitus longissimus,
 sept abfoluitur circuibus 610,50
 Terra accessi sui prima 1040,10.
 55, 64
 terra Ampelites 1117,8
 terre Cadmeæ & Criticæ faciles
 Ibid. 8
 terre Chie nis 1115,28
 terre Comolæ nis Ibid. 38
 terre differentia 1114,63
 terre Eritreæ faciles 2117,32
 terre infusa est in superiorum corporum
 117, 52
 terre interflui nis 227,5,4
 terra elementaria cuiusmodi esse debet
 55, 84
 terre passim uocata differentie comple-
 rit 1115,20
 terre Pignis faciles 1117,23
 terre Sclausiæ nis 1116,28
 terre purgæ ratio 2115,10
 terra igni calida non soluitur 1116,55
 terrenum abluendi ratio 1116,59
 terra quous facies una possidet ibi. 5,4
 terra Sacra 1116,62
 Territrenæ que sunt tenuium partium
 1162, 18
 Tertiana ab ardente continua quomodo
 differat 714,57
 tertiana cause 791,17
 tertiane exquisitæ accessio, dicitur ad
 summum hunc completitur 960,
 44. Caratio 961,2
 tertiane neque curatio Ibid. 61
 tertiane ex intermittentibus breuissima
 mensura 960,21
 tertiana exquisita que 792,7. Quando
 induitur 960,16
 tertianæ duci copulatas uniducere sangui-
 nis dicitur 610,45
 tertianis exquisitis que in dies ratio con-
 ueniat 961,4,3
 tertianis nobis conferri nouitas possi-

biu promouetur 962,16. Visus ra-
 tio conueniens — Ibid. 14
 Testes nis 1124,4,7
 Testacea duci carnis quibus conferant
 402, 15
 testaceorum succi crassi 406,4,8
 testaceorum succi alium subducti
 407, 1
 Testi eorum succi omnis alium deiciit
 406, 50
 Testium cunctis uires 1219,13
 Testes aliorum totum corpus 113,15
 Testes multi sunt sunt 940,14. De
 ne mendi principium sunt 112,34.
 Testes cunctis soli corpori seminis
 qualitatem communiunt Ibid. 50.
 Testaceorum carnis ferre 1040,60
 Gallinæ truci in dies non comprimit
 417, 2. Gallinæcorum præstati cor-
 poris laudabile alimentum 394,29.
 398,19. 407,6. Inflemmat cur sit
 am fides accendunt 604,37. Ma-
 rion humiores sunt ac meliores su-
 munt 304,6. Quo nomine præ-
 sent carni 213,9. Semen conficiunt
 Ibid. 43. Sicut ex genere glandularum
 394,14. Trabant strom humo-
 rem 114,1. Viriles masculinib. cur se-
 men exalibus concoquant 104,17
 Testiculi carnis faciles 1099,4,4
 Testiculi formamque quales 145,6,3
 298, 52
 Testiculi masculini solidiores seminis
 268, 58
 Testiculorum arterie 315,11. Calidiorum
 & siccorum indicia 821,22. Hæretus
 eorum uariiformes 299,10. Fami-
 nearum posito 104,52. 301,3.
 30,62. Pellicula 104,60. Eorum
 temperaturæ que significat 821,
 14.
 Testiculi dexter masculis singulis potius
 facilius gignit 111,43
 Testiculi singulis in uiris. & matris sui
 sine in formam, recipi in partum
 sanguinem 299,55
 Testium ablatio in formis periculosa,
 & quare 11,60. Calidiorum & hu-
 midiorum indicia 821,22. Eorum cor-
 pus nutritur ab humore seroso, quem
 continent 111,40. Fæuacorum ac
 uirilium discrimen 104,54. Fæuacorum
 nase Ibid. 63. Frigidiorum et
 humidorum indicia 821,40. Frigi-
 dorum & siccorum indicia 821,48.
 Eorum situs dicitur 113,10
 Tetricus quid 716,18. Quando fiat
 96, 12
 Tetræpharmacis nis 869,2. Ex quibus co-
 fici 2116,16
 Tetræjis nis 1109,4,9
 Tetræjis faciles 1082,37
 Thapsia humile expirat profus 1163,52
 Thapsie faciles 654,21. 2081,4,3
 2189,55. Sanguinem attrahit ad

partes quibus fuerit applicata 971,62
 THENAR 100,29
 Theriacale quid dicitur 10,64
 Theriacis omne ad propositum pri fructu
 refrigerandum 10,11. Aerium firmum,
 proprium, utrum utile, con-
 ferentia; esse debet 9,47,11,1
 Theriacis artis purioris 3158, 18
 quibus consistunt 10,60
 Theriaca aduersa: uictri, accitatur mos
 sui carni rabidi 1277,61
 Theriaca Andromachi cæteris præferunt
 1176, 8
 Theriaca cum ignis purgatiues 1278,11
 Theriaca Eulidæ 1216,13
 Theriacum confectum pharmerum
 qualitates totæ per totum infirmum,
 conficiunt, in naturalem quodam
 communiunt, omnium temporibus
 175, 56
 Theriacum duo decim annis ad perfectio-
 nem conuocet, effugit uictri, ad
 triginta annis, uictri, fræuacorum
 1276, 58
 Theriacum reponendi ratio Ibid. 19
 Theriaca per se pharmerum purgan-
 tium operationem supprimit 1270,14
 Theriaca Arty 1276,28
 Theriaca corporis & animi effectibus ad-
 uoluit 1277,23
 Theriaca Alphabeticis confici, consue-
 titat 984,11
 Theriaca in quartione principio exhibita,
 quid maluit 961,23
 Theriaca, Mulieratione ab ufa expulsi
 2280, 13
 Theriacum posse crudos sercos mouere,
 concoquere autem ad dissoluit per
 balium nitunt 646,32
 Theriaca puriorum corpora dissoluit
 1278, 46
 Theriaca quibus effectibus conueniat
 971,18. 1272,16. 1276,60
 Theriacis antidoti secundum Androma-
 chum compositio 1273,62
 1276,21. Eius opportuno ufe Gale-
 nis a quartana tripli. Eadem u-
 berant 64,20. Visi probanda
 1276,55. Prependende quantitas
 1278,16. Quodammodi faciles
 870,28. Eo ufe quibus attoluit
 & temporibus congrua, & quibus
 nitunt 1178,43
 Theriaca utendum post abfolutum cætra-
 nem Ibid. 34 (53
 Theriacum artificum præparatio 1272,
 Theriacis uictri et uictri 140,
 41. 84,13
 Thlipsis quam uictri habet 1081,64
 Thoriacum inflammato, que sit curatio
 975,23
 Thoracis copartus in duci dissoluit
 276,5. Dolentis quibus respiratio
 960,26. In fructura eius quæ sibi
 manet propolitis suspes 192,14
 ibiatis

I N D E X.

- thoracis interperies, huncresque qua
 lem pulsus alteratorem inducunt
 604,36. Eius latitudo caliditatis in-
 dication 820,55. Mordorion eius co-
 gnatio 827,52. Mater ab initio
 249,60. Mafculi 322,99. A qui
 bus uenis aliter 146,8. Olfum eius
 confutatio 195,61. Partes eius in-
 flammate expurgantur per affirum
 arteriam 733,31. Situs 219,13.
 820,59. Vfus 482,50. Vterque eius
 uentre confolio, perit *et* uix *et*
 spiratio 232,42
 Thorax cur ex osibus simul *et* musculis
 consistit 249,55. Cur in duas uerres
 distindus 232,43. Duodecim consist
 ueribus 392,21
 Thorax necessarius uoci atq; respirationi
 Ibid. 11. Principalsimum respirationi
 nis organum 109,56,295,44.
 760,1
 Thorax quid 186,42. 191,40. 23
 uelut murus cordi *et* pulmioni 232,23
 Thorax lapideus uires 219,35
 Tibiam falsi sunt merities recentibus
 40,1
 Tibialis cortex asfringit *et* succat 936,4
 Tibialis cortex *et* mamma 1220,22
 Tibialis facultates 85,20. 109,30.
 215,614. 117,632. 118,39
 Tibi carum gignit 112,46. Dolorem
 lenit, conuulsiq; 1219,43. Pari me-
 uendo quatuor uiderunt 935,63
 Thyri quae habeat uires 1108,36
 Thyrius 143,21,333,2. 709,51
 Eius facultas 108,113
¶ TIBIA 212,60
 Tibia anterioris musculi sunt sex aut se-
 piem 214,47
 Tibia consideratio 332,13
 Tibia musculi exteniores tres 159,46.
 Nerus 166,59. Posterioris parus
 sex musculi 214,45
 Tibia stridit 121,11
 Tibia tredecim tendonum infert capita
 214,4
 Tibia inter faciem, *et* quare 226,7
 Tajo uire aban siffit, *et* crudus buuo-
 res gignit 37,18
 Timor affectus inaciditatis contrarius est
 560,1
 Timor diuturnus, corpus refrigerat 322,15
 581,55. Inueteratus a tristitia non
 differt 873,20. Subitus quando
 peruenit 682,7. Vehemens qui re-
 nans pulsus iniquales efficit 560,1
 15
 Timor de scriptio 769,48. Eius ortus
 690,1
 Timorandi uis 110,10,27
 Timymalorum genera septem Ibid 16.
 Quibus affectibus merdeantur Ibi 15
 Tiry fabula 142,43. 327,58.
 731,1
¶ TIGORVM generalis unde, *et*
 quare incurabiles 1168,3
 Tonsillae 709,52
 Tonsillarum inflammationum curatio scilicet
 dum Archigenum 117,51
 Tonsilli inflantur, uix sub lingua, uel
 iuxta angulos oculorum quando inci-
 dendae Ibid 64
 Tophos arthriticorum quid distingat
 1129,1
 Torcular 259,65
 Tormenta fieri ad aliorum contrariis fa-
 cultatibus inter se pugnantibus
 368,1
 Torpedinis marinis uis 1141,65,486,6.
 44. Piscatoris moru reddit torpi-
 dam per medium tridentem 775,53
 torpido, passiva, rana 403,44
 Torpor quibus de causis orti solent
 671,9. 718,25
 Tragacantha quon faciliatem habet
 110,1
 Tragy uis Ibid 48
 Tragen quibus affectibus merdeantur
 Ibid. 52
 Trageriani uis 2099,31
 Tragus 405,30
 Tragus quomodo praeparatur 374,10
 Tracheni omne, expeditus ex directo op-
 positi trahit 227,14
 Trachena omnia, calida sunt necesse est
 1060,1
 Trahere totum ex toto 86,54
 trahit quod est uoluntatis, euacuaturq; in
 cellulis Ibid. 61
 Translatio qua figura facilius fiat
 763,1
 Transmittit ad similia 6,14
 Translatio materiarum quid requiratur
 337,1
 Transmutatio semper fit in alteru 34,47
 Transperatio sui per arterias, carumq; no-
 tum 757,30. 774,57
 transpirationes unde probantur
 916,1
 Transpiration duo genera 81,53
 Tremor in muliere ob purgamenta
 post partum retenta, scilicet in multo-
 lo uero curant Hippocrates 712,33
 tremor cor senex uacuitq; intemperan-
 tes corripit 677,34
 tremor quid, *et* quomodo fiat 677,34
 34. *et* 47. 710,20. *et* 46.
 711,37. 712,18
 tremoris cause diuerse 712,18
 Tribolius 110,61
 Trichomeres tates sui facultas 111,9
 Trifolij facultas 1094,27
 trifolij odorati uis 1095,53
 trifolium affligit partes feras 1173,6
 Trifolium uis 1105,15,111,5
 Tripoly facultas Ibid 3
 Trifidus inard conuulsiuus caloris motus
 579,1
 Trifidum quae signa arguent 637,3
 trifidus quid 521,23. Quon molorem
 ferriat 682,4. Refrigerat 573,16
 Triclii diffrenia 370,60. 415,29
 tritici elen incommoda 372,54. 415,29
 25
 Tritici faciles 1103,49. Eius succus
 415,23
 Triticum mansum feruoris quamecunq;
 me concipit 242,12. 110,32
 Triticum uis habet trahendi humorem si-
 bi inuenit 76,55
 Trochanter 238,18
¶ TUBER 407,1
 tubera quon habent facultatem 391,1
 28
 tuberculum 709,14
 Tuber terrae quon uis habeat 1111,43
 Tumor corporis non semper signum ple-
 thorae 700,13
 Tumor composui 1203,43. hunc cum
 linat quali intemperie 65,46. Prae-
 ter naturam exardantes septem tras-
 uersum, parum, uisum, *et* densum
 facies spiritum 493,57. 949,61.
 Pro humorum effluuium differe-
 tiis uariatur 662,42
 tumor facies a uariis quomodo differt,
et qualia medicamenta possidet
 12,1
 13
 tumoribus guttaris quae conserant
 1076,6
 42
 tumoris color, causam ipsius declarat
 947,19. Flauentem curatio 977,54.
 In serbum abnormis curatio
 979,36. Suppurat curatio Ibid.
 51
 tumorum causa, humorum est affluens
 636,1
 43
 tumorum praeter naturam uarietas unde
 nascitur 934,17
 Tunica amphiblastroides 346,48
 tunica eadem uisum, gula, pharynx,
 larynx, *et* interna afferit arterias
 1240,1
 44
 tunica instrumentorum breu *et* purgan-
 tium externa *et* interna quales
 110,18. Melles quando sunt agilio-
 res ad motum, *et* quando tardiores
 509,1
 59
 tunica uisum in palmore commu-
 tatio quare 235,18
 tunica uretridis, gula, *et* omnia quae
 in eis sunt, cur sui uis continet 219,53.
 Quae siue illes affligit 219,43
 Turba humorum causat acron 901,43
 Turor *et* torpido 417,1
 turbis marinis oculis 744,64
 Tussi uictritate acutior 1086,10
 Tussilaginis ut angule caballinae uis
 1074,4
 48
 Tussim exantia non necessaria sunt mo-
 dula *et* arria, sed contra 1015,7
 Tussi emegre merdeantur optimo
 1244,4
 22
 Tussi quid accidit 1074,48. 1108,20
 20

hæc reiciendo, quædam spiritum intercipiunt 679,34
 hæc caput nihil conducit 679,22. Eius causa, & usus 681,52. 1025,12.
 Eius in pleuritide ratio 278. Magna, pauca exipit duobus de causis 751,2. Naturæ est symptoma 761,16. Ob refrigeratæ respiracionis ægrom spiritus cohibentur prohibetur 679,40. Quid sit ibid. 9. Quoniam excitat 242,45. 351,64.
 Quorsum animi induta 761,35.
 Quos humores i pedore facit eleat 679,13
TYMPANITES 551,43. 179.
 12. Vniuersum corpus replet spiritus 579.
 10
 Tympha 374,10
 Tympani compositi qui 810,18. Duplicationem advenientes qui sunt 812,30.
 Hystericus qui 310,26. Mobilis ibid. 32. Permutatus 810,31. Primi & secundi ibid. 16. Preleptici ibid. 24.
 Quorsum accurate descriptio 811,47. Quorsum omnibus ceteris diuturniores ibid. 54. Simpliciter qui 810,27
 Typorum benivitiæ eorum proprium 812,34
 Typorum differentie 810,14
 Typorum quantumque consequuntur 811,47. Quoniamque que continentur 810,47. Tertiumque sequuntur ibid. 58
 Typus accrescitionis quid ibid. 4
 Typus febrium unde mittendus 809,37
 Typus benivitiæ seu, periculosis unde deinde portendens 811,15
 Typus quartanus duplex 812,17
 Typus quartanus qui 810,43
 Typus quotidianus duplex 811,32
 Typus quotidianus quartanus ibid. 44
 Typus quotidianus qui 810,19
 Typus quotidianus tertiano & quarto interitus 812,41. 47
 Typus quotidianus ventriculo malè affecto constituitur 810,57
 Typus tertianus duplex 812,14. 58
 Typus tertianus quartanus ibid. 53
 Typus tertianus qui 810,41
 Tyrie Democriti vires & compositio 1181,48

V

VACUANDI modus unde petendus 917,49
 Vacuati protinus sunt, qui ab eis, que temperant naturæ habent, excipiantur 1015,63
 Vacuandi qui sunt liberatius, & qui parcius 995,1
 Vacuandi qui sunt virre incute, & quomodo 1001,11
 Vacuandum corpus cur ante sit, quoniam obstructionibus liberandum 823,25

vacuandum in accrescitionibus per superiora: in remissionibus, per inferiora 1003,34
 vacuandum semper per communicantes vias 712,42
 vacuandi que sunt 917,49. 937,7
 vacuare discentem capitis humores que commodè possunt 961,39
 vacuare quando corpus emaciat 935,12
 vacuari in quem modum singulas partes debent 975,7
 vacuatio fiat per trahentia 30,20
 vacuationem plantæ qui mortui possunt 1001,39
 vacuationes copiosas qui ferant, sapient, qui difficile 817
 vacuationes fieri ob causas que illas possunt 428,27. Immodicæ quibus de causis succedunt 652,12
 vacuationes immodicæ quando et quomodo accidunt 1039,2
 vacuationis modus quomodo à figura partium affectus sumitur 881,42. Eius quibus ex quibus mittenda sit 991,32
 vacuationum modi diversi 1053,33
 vacuatio optima que 18,52
 vacuatio per fridorem solum, quibus et quomodo administranda 927,1 Per partem lesam non est mittenda, vniuerso corpore pleno 316,46. Quoniam de sit in duas partemque dicit 996,14
 vacuum nihil in corde datur 515,7
 Valere & agrotare quando se dicitur habere vires 842,15
 Vapor crassus est humor 671,14.
 1014,16
 Varices 709,15
 varices curandi ratio 943,46
 varices prius sanandæ, quoniam aliter ab eis fluxum recipiunt 858,25. Quando sunt excidendæ 1174,20. Unde oriuntur 701,63
 Vari descriptio & curatio 665,58
 122,5
 varium est quod præter naturam existit 489,47
 varicem colloformem remedium 122,5,49
 varicem remedium Criterion ibid. 43
 Vasa conficta corroborandi ratio 943,16
 126
 vasa emgentia 299,18
 vasa excidendi ratio 941,17
 vasa in renes inserta à magna vena et arteria 181,22. In testem delata 181,40
 Vas apertum obstrui quoniam facit possunt 861,63
 vasa que dolorem admittunt, & que minus 1232,3
 vasa que intra matricem facta alendo crescunt 305,75
 vasa quibus modis disrumpi possunt 687,63. Quoniamque modis affligi dicuntur

688,1
 vasa seminata infusa habent non generantur de fœtu 221,56. Semper plena fœtu ne sunt 114,37. Vitalem spiritum cum fœtu humore rapiunt ibid. 19
 vasa spermatica dextra oriuntur à magna dorsii vena & arteria, tunc autem ab infuso humore rapiunt 199,41. Sinistra à sinistris oriuntur emulgentibus 299,50
 vasa radix quid 364,61
 vasorum generatio 217,3
 vasorum in testem implationes 101,18
 vasorum omnium à corde profectorum & testis quodam membrano sunt infusa 236,43
 vasorum refectione unde contingat 688,126. 1059,27
 vasorum secundæ progressus 1054,9
 vas plenum aut vacuum quomodo distinetur 515,10
 Vary qui sunt & dicuntur 661,4
 Vena dicitur ut matris dicitur mulieribus infans 197,38
 Velocitatem causarum concussas, vitales ut genus facilius robur, arguerentur præstando 491,12 54
 Vena dicitur hanc in uterum ducuntur 809
 vena arteriosa 243,11. 323,28
 vena arteriosa à dextro corde fluxu oriatur 216,12
 vena arteriosa dicitur confusa, tunc, fœtus ad pulmones ex dextro corde ventriculo 185,2
 vena arteriosa membranas habet quibusdam adunatis 231,19
 vena cava 276,127. 299,14
 vena ab hepate origo 109,51. 112,124
 vena cava lumbarem, origo vacuum partem inferiorem 145,40
 vena cava suggerit alimentum vniuerso corpori 324,43. Truncus bifido est fuitus 109,49. Valens autem diuisa, velox sequatur morti 221,36
 vena confusa una lumbis repleta 181,18
 181,33
 vena abscissa arteriis que sunt 148,41
 517,60
 vena alens maxillam, maxillam colligentes, ferat gratia constituitur 300,14
 vena arteriosa membranas tres circumdat 237,25
 vena arteriosa, tres adunatas membranas inter seque uterque 216,13
 vena à ventriculo cibum elaboratum suggerit hepati 217,45
 vena cava confusio 143,5. Cuius diuisio & progressus 123,18. 143,26.
 218,15. 118,55.
 vena cava dicitur ad cor sanguinem, vena infusa sunt fœtu membranas inter seque 217,28
 vena cava induramentum 221,31. Inferiora in corde ventriculo dextra 218,35
 Pro-

EPITOMES GALENI

ventriculi retentrix & expulatrix fund-
la 678, 48
ventriculi fici indicia 815, 15
ventriculi flatus poffumus quis 480,
41
ventriculi temperati intemperatib; notæ
53, 35
ventriculi tercia tunica 210, 59
ventriculi tunica, cuius gratia fit duplex
219, 36
ventriculi tunica humores craffi alius in-
buiti, que mediocriter poffulunt
2250, 25
ventriculi uisio: per que medius excre-
toribus 735, 17
ventriculi uisum sunt uisui 198, 27
ventriculi uisulofa diffipulentes curan-
de font per odorata 1251, 21
ventriculo admodum furo, & modici in-
calcfu præter naturam, que uisus
furo conuenit 815, 12
ventriculo affluenti quid acciderit
1101, 25
ventriculo afflicto que phlegmata font fu-
genda 1151, 1
ventriculo calido conuenit con capite frigi-
do, quemodo faciatremum
498, 8
ventriculo demittitur uetudum humo-
res per cefcen uenas, per quas bi pa-
u iurgitque alimemum 704, 02
ventriculo due font uocæ 83, 46
190, 13
ventriculo frigido, in quem pituita de fer-
da à caput, que uisus faciatremum
483, 44
ventriculo infunt quatuor naturales facul-
tates 218, 17
ventriculo furo & frigidiore reddito,
que uisiones conuenit 814, 13
ventriculo furo, modici refrigerato,
que medendi ratio debeat 1bid.
26
ventriculo feli: feli indolgentia conta-
tu natura, & quare 218, 46
ventriculo ftomacho: affectis, feli talia
exhibenda qualia ab affectibus exigi-
tur 975, 41
ventriculo effluat promptuarum co-
mune oratione particularum corporis
217, 35
ventriculo infirmum que roborat
891, 24
ventriculo qui habent biliofum facilius
cibus concoquit corrupta diffiliet
368, 39
ventriculo roborantia 966, 31
ventriculo affluenti cibus in uapori ri-
dorefo corruptit 685, 11
ventriculo afflicto, quales paffus effi-
ciat 602, 18
ventriculo alicuius qualitatem reffut
81, 53
ventriculo auferimus fuauiffimus 198,
28

ventriculo cerebelli cur anterioribus mi-
nor 256, 37
ventriculo cerebri pofferior maxime,
ab anterioribus per infignem uisum,
alimemum ftomachum recipit 1bid. 7
ventriculo cerebri fuuffler & dectur
191, 9
ventriculo cerebri tertius 1bid. 14. In-
ter duas priores & quartum poffe-
riorem, reprimat medius 1bid. 61
ventriculo cibus completum ignis
81, 30
ventriculo cibus exapiendus candulus
177, 56
ventriculo craffi ac carnofi melius co-
quit grauiori 219, 40
ventriculo cur oblongus 219, 10. Duo
habet uocæ inter fe differentes, ra-
tione duarum uisum 224, 10
ventriculo id quod continet totum com-
plectitur 81, 1
ventriculo imbecillus, nifi corroboretur
cibo, recipit totum corporis excrementa
24, 680, 2
ventriculo imbecillus non recte can-
quit 81, 9. Intemprie laborans ca-
lida, non humiditate mediocri, facit
frigide potione curatur 885, 18
Nutrimenti inopia impletur excrementis
biliofis, pituitofis et ferois 87, 16
ventriculo promptuarum cibum
674, 16. Quare roborandus 219,
24
ventriculo quatuor inferius uiferibus
atq; uenis 675, 35
ventriculo quibus inflammation non co-
equent 516, 3
ventriculo quo pellet excrementa excre-
menta 381, 12
ventriculo fue ipfius causa nutrimentum
fufcipit 464, 47. Sui gratia latum
circa cibum contrahit 141, 1
ventriculo trahit uisus rectis, tranfuerfis
expellit cibum & potum 219, 47
ventriculo, uerus, & infelix, quele
præbet nutrimentum 395, 30
uentris differentie pro ciborum differen-
tiis à natura conffitutæ 278, 14
uentris mergi nullus uis 1117, 13
uentris parit uide & quando gignen-
tor 121, 38. Eius proffutius quid au-
xiliatur 1098, 30
Venus immoderata, fpermatice organa
ualde debilitat, & cur 214, 9
uenus que fomena excipiat, à florenti-
bus excrenda 418, 57
uenus quatuor fit falubris 810, 60.
Quibus inopia 476, 16. Redit
corpus laeuus, frigidus, imbecillus et
fucus 451, 55. Sicut & frigidus ef-
peramentis intumefcentia 475, 16.
476, 12
Verrucæ effi non poffunt, qui magnam
et diu frequentant 420, 23

uerari facilius & fpecies 1079, 25
ueratrum alii conuenit, bonum em-
cat 601, 22, 10, 8, 52, 1278,
10
ueratrum epotum, quoniam faciat paffum
579, 33
ueratrum nigrum facit melancholicum
educit 1119, 25
Verba fci fpecies & facilius que 1111,
22
Verbenaceæ recte facilius 1106, 16
Verendia ut moueant 681, 65
ueru temperamentum in medio omnis ex-
creffi confitit 40, 46
ueritas omnibus edum parit 420, 62
ure medij temperamentum 428, 375
37
ur metum, temperatiffimum, que tem-
pere corpora opime habent 569,
24
urms laui quid excret 1097, 3
urms peruenit amaris medicamentis
915, 4
urmiculæ caput in ifini ftomachum præ-
eft 257, 16
ur non dicendum calidum & humidum
41, 5
urmiculæ curatio 951, 16, 1108, 42
ur fubacutum 40, 49
uricæ ad coftis duodecim 134, 40.
Ad lumbos quinq; 1bid. in collo fe-
ptem 1bid.
uricæ ftindus medullæ nutrimentum
250, 43
uricæ superiores decima, medullæ pro-
dudiones habent conuexas, dudiones
autem, conuexas inferiores autem de-
cima contra 289, 27
uricæ totum ftomachum uigintiquatuor
229, 53
uricæ contraxit diuifio 314, 35.
Eorum foramina anguftiora font pau-
latim 1bid. 54
uricæ contraxit humiditas 292, 56. Liga-
mentum 1bid. 53
uricæ arum primarium cur latitudo me-
xima 217, 3
uricæ arum proceffus 114, 60
uricæ offa cur rara font & caufæ
241, 7
Verrugis causa 746, 8
uerugo ad cerebrum pertinet 1bid. 2
uerum uide a ftomacho 102, 2
Vefica 178, 6
uelfa bilis ei expultra 1bid. 3
uelfa claudt potit abfque mefudo
211, 8
uelfa collo incumbens lapidis indicia
723, 36
uelfa collo incumbens lapidis curatio
723, 41
uelfa calculos que conueniunt 1100, 4
uelfa alio propria que 772, 45
uelfa collo innat caruncule argumet
14 1bid. 60
uelfa

EPITOMES GALENI

<i>dendron</i>	471,16	<i>atque sic nasci</i>	1174,18	<i>visus que subiacent</i>	1019,50
<i>visum nervatus indicat vigiliis, & que</i>		<i>Vires a quibus lachrye</i>	915,51	<i>visum que acunt</i>	1144,11
<i>re</i>	736,61	<i>vires die primo aut secundo ab initio mor</i>		<i>visum que ebulliant</i>	671,44
<i>visum medici sumptum offerri formam</i>		<i>bi unde resoluantur</i>	905,61	<i>visus bullitiones</i>	171,11
718,	53	<i>vires imberberes reddidit ob excretri-</i>		<i>visus ebullitionem a crassitie ortum, que</i>	
<i>visum moratorum desuati</i>	69,60	<i>cis motus immoderatos, quomodo re-</i>		<i>suant</i>	1113,46
<i>visum mutatur celeriter</i>	57,19	<i>solvende sunt</i>	910,49	<i>visus instrumentum lucidum, & cur</i>	
<i>visum magna parte, oliv pendat exordii</i>		<i>vires in diutis febribus quare negligen-</i>		<i>112,59,</i>	147,41
119,3,	14	<i>ter</i>	900,41	<i>visus quibus modis excludatur</i>	748,5
<i>visum crasse crassum & dulce, est visum</i>		<i>vires indicant nutriendi formam</i>	911,8	<i>visus sensibilis, est color</i>	146,56
411,	13	<i>vires quando prebeant indicationes utili-</i>		<i>visus sanctorum quide</i>	151,49
<i>visum omni alicui optimum medicamen-</i>		<i>tes, & quando nocent</i>	901,53	<i>visus, visio anime</i>	484,44
<i>tum</i>	513,51	<i>vires resoluantur quoque ob excretionem</i>		<i>Vita brevis, ars longa</i>	534,41.1065,9
<i>visum que febribus commoda presert</i>		<i>non immo dicit concitatio</i>	910,44	<i>vires terminus, cordis vacuities est ab d-</i>	
466,	53	<i>vires sunt servande</i>	916,17 (16	<i>stribus</i>	805,40
<i>visum quibus pulsus immutat</i>	514,	<i>vires robustas quas pulsus induit</i>	995,	<i>vires sunt spiritus, non omnibus possit ac</i>	
17		<i>Vir femina calidior & facior</i>	166,61	<i>commo dori</i>	471,13
<i>visum quando exhiberi possit per canti-</i>		<i>Virgo virilis & collo matricis cur plures</i>		<i>vires sunt una ipsa desideratur ad exaltationem</i>	
<i>nentes febres</i>	918,14	<i>nem inferantur</i>	101,18	<i>pulsus dignationem</i>	518,51
<i>visum quibus epimeris conviciat</i>		<i>vires in convulsionem mulieribus habent pul-</i>		<i>vires moriens nec pulsus nec respiratio pe-</i>	
957,	44	<i>sus longi maiorem & incrementum</i>		<i>rit</i>	491,58
<i>visum quibus non dandum</i>	961,46	<i>vires optimi cur se subducant in solitudi-</i>		<i>vitanda in capitis doloribus que sunt</i>	
<i>visum refrigeratis omnibus utile, quid-</i>		<i>nem</i>	645,41	1108,	56
<i>nam esse debeat</i>	1017,13	<i>vires duplex adest curatio fuliginosa-</i>		<i>vires, sunt vires, aut ipsarum actiones</i>	
<i>visum semper adauget suum</i>	1018,	<i>rum excrementorum</i>	177,44	901,	8
45		<i>vires naturae robur laboribus crescit</i>		<i>Vitulina bilis nimis picea sit, veritas in</i>	
<i>visum febribus apertissimum</i>	468,11. Et	567,	16	<i>speciem ante exale</i>	81,18
<i>cur</i>	71,61	<i>visum consideratio, ad morborum cura-</i>		<i>vitelli cui vis</i>	1140,1
<i>visum tenet moritur visum</i>	411,41	<i>tionem quid faciat</i>	900,11	<i>vitelli omnium facilius quam albe conve-</i>	
<i>visum tertiana correptis quando propi-</i>		<i>visum essentia in quibus consistit</i>	919,	<i>quatur</i>	961,53
<i>nandum</i>	961,18	<i>visum lapsus quibus succedit</i>	16	<i>Vitex obstrudis censeri, mensuris pro-</i>	
<i>visum visus generosorum, & calidum,</i>		<i>visum robori custodiendum que requiritur</i>	41	<i>moet</i>	1066,11
<i>accedit visus refrigerantibus</i>		<i>visum robur in quibus effuditur visus</i>	910,5	<i>vires viceretis intemperentis composuit</i>	
101,	16	<i>sola sit</i>	907,19	<i>ibid.</i>	11
<i>Vitae solium visus</i>	1081,17	<i>visus, est visus ex excretionis suspici-</i>		<i>Vitis omnia trifariam grana redduntur</i>	
<i>viperas ad se frus immo obducit facult-</i>		914,	58	160,	31
<i>tatis labificae, ides ad auctorem ab</i>		<i>visus quot modis servatur</i>	901,1	<i>visici fundus</i>	1066,11
<i>Andromacho electae</i>	1171,14	<i>visus semper sui custodiam indicat</i>		<i>visici semine capitis granitatem parit</i>	
<i>viperas caput non caudent, obire oportet</i>		991,	68	<i>ibid.</i>	17
<i>ad conficiendas artes ibi vocat</i>		<i>visitatis imitatio opes</i>	115,5	<i>Vitigines quid deterget</i>	1078,1.
1134,	40	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	1110,	10
<i>viperas crassius & calidus unguem ge-</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>vitiorum ignis in nobis delitescunt</i>	
<i>rant</i>	1173,43	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	71,	56
<i>viperas cohibitas ab igne salutaris red-</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>vitiorum incrementum refrigerandum</i>	
<i>ducuntur</i>	1179,5	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>ibid.</i>	58
<i>viperas concinnatio</i>	984,5 (16	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>visis agrestis facultas</i>	1069,48
<i>viperas cur appellentur dispates</i>	1114,	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>visis albe & nigre vis</i>	114,58
<i>viperas formae masculis, discrimina</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>visis nigre vis</i>	114,58
1176,	10	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>visis salivae vis</i>	114,58
<i>viperas pellenda vis pilos regerunt</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>Vitres bonos</i>	165,1. & 11
1174,	61	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>vitres commens terra</i>	1116,61
<i>viperas quales deligendae</i>	1176,11	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>vitres a non vivente differt</i>	91,13
<i>viperas quando unandae</i>	<i>ibid.</i>	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>vitres quoniam grana sunt tria</i>	801,56
<i>viperas sola moribus ab ipsismet salis,</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>vires ex effectu, et si rationem rationem,</i>	
<i>opitulentur</i>	1165,17	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>quae dicuntur</i>	714,49
<i>viperas ere excipit gerit on ad mare, et</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>vitres licet nobis etiam si venter cibis no</i>	
<i>visus, caput abscondit post semine ex-</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>centrat: forisvisusque autem per-</i>	
<i>ipsum</i>	1174,13	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>evant, non item</i>	140,4.
<i>viperam effus suum maxime infert</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>vires sine alimento non vivit</i>	169,11
1114,	14	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>q V L C E R A caracore non omnis dy-</i>	
<i>viperam moribus pharmacum</i>	1187,	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>sepeletis</i>	1151,10
11,		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>Vitrea caecide que dicuntur</i>	899,0.
<i>viperas unandi ratio</i>	1181,53	<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	1154,	10
<i>viperam prolem in utero paterna un-</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	<i>vitrea caecide que tibi evadunt</i>	
<i>duum, matris uterum perferendae,</i>		<i>visitatis ubi laboriosa</i>	454,1	857,	11

ultra

I N D E X.

- ulcera curantur cautela ab extremis cal-
facientibus atq; refrigerantibus 854, 33
- ulcera igni ambusta quid inest 112, 34
- ulcera maligna natura que sunt 117, 3
- ulcera maligna, quibus medicamentis cri-
gant 971, 49, 1177, 3
- ulcera maligna quid persone 1112, 31
- ulcera maligna, valentiora requirunt re-
media 1172, 39
- ulcera non sunt exasperanda prius quàm
corpus uniuersum sit purum 853, 51
- ulcera que sanescere prohibeant libi 18
- ulcera quomodo sint trahenda 1170, 58
- ulcera transierunt diligentius quàm resse
trahenda sunt 86, 18
- ulceribus continentibus aduersarius tam
oleosa tam acris 1170, 51. Et cur
1171, 52
- ulceribus continentibus phlegmaticam tem-
peratam deservit libi 62
- ulceribus dyspnoicis atq; malignis me-
dicamentis conueniens 1154, 22
- ulceribus frigidum mordax 1109, 49
- ulceribus uiscipulis potiora esse affert
gentia 1152, 17
- ulceribus interitum parium que me-
dicamentis proficiunt 864, 42
- ulceribus inueteratis que proficiunt
1091, 65
- ulceribus nihil humilem est utile 1151, 38
- ulceribus que ratione medicamenta me-
dicantur 1169, 50
- ulceribus ut desiderari phlegmatica, quos
ipsorum sunt differentia 1169, 14
- ulceribus que medicamentis conueniunt
1174, 1
- ulceribus curanda que requirunt 857, 3
- ulceribus recenti expedit ut exco statim fiat
atq; sanguis 864, 2
- ulceribus curatio 855, 15
- ulceribus curatio duplex scopus
849, 19
- ulceribus curatio generalis curatio 1155, 27
- ulceribus curatio inueterata curatio 1172, 22
- ulceribus deligendi ratio 856, 16
- ulceribus diuina est succi uisus induit
859, 31
- ulceribus si affert tumor, in prius curandus
est 855, 29
- ulceribus inflammatis curatio 1157, 19
- ulceribus labra quomodo excidenda sunt
857, 53
- ulceribus propria curatio unde proficiunt
851, 47
- ulceribus pulmonem, afferre arteria &
facionem discernit 758, 30
- ulceribus rebus in parte scella, curatio
916, 10
- ulceribus simpliciter differentie proprie ut
de fionde 855, 59
- ulceribus foridus & curatio curatio ratio
libi 66
- ulceribus curandorum consilia uniuersa
1157, 35
- ulceribus curatio inueterata plurimum per
singulas anatomias partes 868, 57
- ulceribus malignorum sanorum scopus quis
1171, 60
- ulceribus nomina varia 845, 26
- ulceribus tempora quatuor que 710, 46
- Vlex causam in sano corpore curandi ra-
tio 1156, 53
- ulcus tum canem tum plenum quibus non
remedia poscunt 852, 60, 853, 8,
- 859, 31, 861, 42, 971, 47
- ulcus curandis contrariis, corpus autem
ulceratur, similibus 1156, 40
- ulcus cicdo, quare, quibus sit abluendum
972, 37
- ulcus in hominibus natura minus ficienda
est: ut facili, uel uenient est
852, 64
- ulcus non potest curari nisi curio subiecta
pre naturalis modo se habeat 854, 13
- ulcus quid 11, 60, 845, 12, 856, 42
- ulcus simplex omne non ficiat si affert
debet 851, 59
- ulcus simplex solum agglutinationem de-
siderat 851, 65
- ulcus uniuersum exaffertionis: interfectionem
quomodo dignoscendum 726, 62
- ulcus unde fiat 763, 61
- ulcus uisceris solutio 64, 30
- Vlmi faciles 1130, 39
- Vlmi constat duobus obibus 98, 52
- ulcus extrematis figura 107, 42
- ulcus posita resda libi 11
- ulcus quatuor motus 104, 20
- Vllyffis irrationem ratione conuenit
126, 32
- ulcyli in oculis exandescencia 125, 59
- ¶ V M E L L I C A arteria vinculo letter-
cepit, omnes que in secundo habet-
tur, pulsa desinuntur 140, 24
- umbilici regio, totius corporis adomum
medus 121, 58
- umbilici uase quatuor 105, 3
- umbilici uisceris uisceris 108, 9, 15
- umbilici quid 105, 58
- ¶ V N C I A Antuerpiensis, Brucellensis,
Coloniensis, Romanam superant
tribus obolis 1190, 56
- uncia constat octo drachmis 1154, 59,
- 1160, 13, 1190, 35
- uncia Hippocra, Romana obolis duo-
bus est maior 1190, 54
- uncia libra est duodecima pars 1165, 66
- uncia nota medicinalis 1191, 32
- uncia Parisiensis, Romana est maior in-
tergra ferè drachma 1190, 55
- uncia Veneta, Romana est minor ferè se-
squadrans 1191, 3
- Uulso ex alio obliet, quo minus digerit
tur ut resoluatur succi 882, 12
- unius ex pauca mandragora fu-
gerda 481, 49
- uniones roborentur uentriculum 480, 19
- unio qualis esse debet 439, 59
- Uniuersus mobilis attinet ad gestum 1020, 7
- Viderimus quatuordecim est index 609, 46
- Vardius faciles 187, 4
- Vapurna calcificanda sunt in duplici me-
se 891, 19
- urgente omnia liquenda sunt in duplici
uase 1168, 18
- urgente relaxantia 431, 24
- urgenti bechicri preparatio 127, 26
- urgenti solutio 480, 23
- urgenti spicatum libi 25
- urgens ad apprehendendum opti digi-
torum sanantibus aquarum 196, 18
- urgens cur mediocriter duri 197, 19
- urgens cur semper augentur libi 10
- urgens ratiōis seruatiōis gratia fidei
libi 26
- urgens oculi 709, 60
- urgens oculi primaria ratione pupillam
obscurat 670, 12
- urgens augmentum in longum tendit
197, 35
- urgens capillorum affinitatem uires
1112, 15
- urgens confederatio 161, 4
- urgens gravis gratia eius quod melius
est conditum 197, 16
- Vas, in partibus instrumentis solu-
tis, est impossibile 834, 13
- vasum cornu soluit, que precelest
libi 27
- vasum prestat nature libi 35
- Vitatus solutio 856, 40
- vitatus solutio conueniens mortis simila-
ritas & instrumentum partium
121, 49
- vitum in singulis prestantissimum 141, 1
- vitum pluribus contrariis dici nequit
121, 10
- vitum quid 156, 63
- vitum esse, quod secundum naturam est
489, 45
- ¶ V O C E M que efficiunt 755, 52
- vitum qui affertur uisceris libi 20
- vitum impeditur aut rancore, ad inflama-
tes effluuias circa laryngem, aut a-
fferunt arteriam obortis, quales uis-
tus & medicina ratio conuenit
124, 11
- vitum intercepte arteria Crinitis
124, 3
- vitum necessarius est faciem malis
124, 6
- vitum acutis gravis cause 816, 39
- vitum lenis & afferre cause libi 19
- vitum magnitudinis & paruitatis causa
libi 17
- vitum materia effluuii 150, 55, 151, 62

241,60. 321,42. 721,10.
 715a 39
 uetus argema 754,49. 1240,26
 uetus prius in larynge formati 244,4
 41
 uetus propria uisumenda que 721,15
 uetus raris causa 754,12. 826,18
 Vela maris cor glabra 52,1
 uetus manus masculas 352,42
 Volatus biliofus congruentia 390,47
 uolatus carnes que facilius aggrauat
 cequantur 197,57
 uolatus manus cicut fit facultas 310,0
 58
 Voluntas equi similis 489,32
 uolentes quatuor respirationis fit cause
 484
 36
 Voluptas non in bonis ponenda 310,27
 uoluptas quando fit 672,25
 uoluptas quid 730,43
 uoluptas autem firmiorem potest dis-
 soluere 114,15
 uoluptates habent similitudinem inter se
 commutationem autem secundum ge-
 nera 354,15
 uoluptates que sequende, que fugien-
 de 354,16
 Valula causa 686,18. 770,49
 uolula affectus uix liberatur 700,44
 uolulatio quibus affectibus Ibid. 44
 Vomica uirgo que 1002,44
 Vomere non nisi ad mouendum proci
 uis, regredis 726,16
 uomitus cur non utendum per emulsa-
 tas 461,41
 uomitus quando acri preparandi 1002, 39
 uomitus que ratione olim singulari men-
 sibus uiciter prouocantur 226,50
 uomitus quando utendum 464,60
 uomitus ante cibum quibus conducit
 474
 uomitus a quibus causis mouentur 81,
 51. 688,20
 uomitus quibus & per que prouoca-
 dus 886,59
 uomitus signa que sint 644,10
 Vex cogitationum mentis uocia 321,
 13
 uix fieri non potest, nisi in transitu fit an-
 gustior 245,60
 uix fit breuius tantu, quando decreuit ef-
 flatus 189,9
 uix principissima orationis animae altis
 324, 12
 uix que ex causa prirre aut uicari possit
 754, 51
 uix quando in acronem & magnitudinem
 uicatur 755,6
 uix quando intercipitur 1240,18
 uix que ratione efficitur 322,13
 uix quibus precat 671,55
 V. A. A. G. O. S. 105,65. 221,44
 Veneris quid 227,12
 ueritas una diuina confluit 121,12

ueterem oblique infirmis uisus 212,
 4
 ueterem uisum intra uisum specula-
 le 181,16
 Vires alba, cruditatem indicat 439,
 37
 uires aquosa & tenuis quid indicet
 457,10. 616,40
 uires crasse que 616,31. 721,18
 Virescentes uires 306,5
 uires cur apparuit nobis frigida in bal-
 neo 1030,61. 2032,2
 uires ferine berdece similis quid fi-
 gnet 637,12
 uires color, exierit tempore est noua
 439, 36
 uires currens a quibus fit 714,20
 uires currens ut fit 306,12
 uires humane facultas 1131,21
 uires humane potione multo postulat
 morbo liberari sunt Ibid. 20
 uires latentes representant, furiose
 atque, quid notent 637,15
 uires motus ex quibus de causis ob-
 struatur 690,46
 uires permutatiois species uarie
 457, 40
 uires principul fronde in febribus
 614, 29
 uires purgende cur duo instrumenta,
 alia excrementis purganda tantum
 uicem cum fit 227,40
 uires que habeant multam subtilitatem
 617, 1
 uires que in uiris ac micturibus et que
 in pueris sunt excludi Ibid. 54
 uires reditus inuolutoria quibus oc-
 cidit 773,35
 uires subrifa, subflaua, & subviride
 617, 54
 uires suppressa causa 771,27
 uires suppressa uarie cauiones, pre
 diuinitate casuum 16,25
 uires furas cur per uisum collum ad ex-
 cernatur 506,39
 uires humane orationis indeclinabiles 1131,
 10
 uires indicat concoctionem que fit in ue-
 nis 624,5
 uires in epidermide quales 956,42
 uires intermittentes febrium singulas
 propria 959,60
 uires leuiter que 721,15
 uires leuiter, ferida, & oleaginosa inde
 617, 40
 uires modice pallida quid indicet 439,
 uires que prouocent 961,14
 uires secreti a sanguine, per reuocem in
 uisum demitti 436,18
 uires nigra cur pessima 617,30
 uires nigra perinde ut spiritum nigrum,
 merum demittit 621,34
 uires omnis facultate est calida 1131,6
 uires optima ab humoribus putrefacti-
 bus, aut pessima, quales 705,6

uires optima que 616,3. & 49,
 627,31. 721,5
 uires pallida & sup pallida que 616,
 47
 uiresque excludere pessima que Ibid.
 39
 uiresque metatoni infertio 229,10
 uires res quid significet 419,19
 uiresque uerbosorum differentia triplex
 616, 19
 uires sola indicat naturam humorem in
 ueni delectationem 456,7
 uires quid prouocet 1099,4
 uires succorum qui in uisum continentur
 457,12
 uires suppressa ob resolutionem excernendi
 uix quomodo expellenda 715,16
 uires suppressa, que sint consideranda
 733, 4
 uires turbida quid indicet 457,31
 uires unde suppressa 690,15
 Vires aliam deuit 389,29
 uires facultas 2068,3
 uires extrinsecut uires 114,5
 uires subdant aliam utilitatem magis
 quae purgatione Ibid. 10
 VISTORVM differentia 1114,51
 Vix incrementa uisum sensum, ex uisio-
 ne & hygro conflatur 514,18
 uisus portus quid 318,6
 uisus pulsus abundantia coloris aug-
 mentatur, aut exhaure animalis spiritus
 562, 45
 uisus pulsus quando uigret 562,18
 VITIS affectus uix cum peruer-
 sionibus contingit, causa 777,5
 uires effectus differentia sunt plurime
 774, 18
 uires rollum masculum, naturae carne
 carillaginis 104,31
 uires conuenio 103,47
 uires conuenientia & relaxatio apparet
 ad 678,15
 uires totius a quibus causis durari pos-
 sit 693,16
 uires duritiei quid accellat 1090,29
 uires trofio magna ex parte in ceruice ob-
 tingit 778,22
 uires inflammationis inuenitur uenis in tra-
 re scilicet 997,13
 uires locus affectus quomodo conueni-
 ent 777,31
 uires moderati magnitudo que 105,25
 uires natura & operatio 82,25
 uires effectus triplex causa 161,18
 uires et conuenit & in conceptione, &
 dum phlegmone affligitur 82,48
 uires peruerfiones ad mensuras sequuntur
 suppressa 777,1
 uires prouidentia in propellenda senu
 82, 50
 uires stomachus, uia est partes et seminis
 86, 17
 uires suffocatione affligitur per arterias
 uicem fit peruerfio 1266,41
 uires

I N D E X.

utri suffocatione priuatis, quibus ut utatur 1139, 14	tus instrumenti edione inuenta 151, 47	uicem passorum quae, quales & quamul corpori alimentum praesent 181, 8
utri suffocationis quae sequentia sym- ptomata 1166, 36	utilitatis partium cognitio facit ebira- gos intrepidos 110, 18	uicem passorum quae praesentiores 181, 68
utri suffocationis causa ibid. 45	utilitatis partium cognitio facit ad cogni- scendum affectus 110, 17	uicem sicut gurgulis aut colonellae confert ad uocis conuulsam 176, 8
utri suffocationis curatio 966, 20.	¶ V V A autem, acida, acerbæ & fa- culas 181, 15	uulnera articulorum euadunt carerib 160, 39
utri suffocatio quibus contingat, & quae de causa 774, 59	uicem dulces quam non habeant ibid. 13	uulneri nullum ex pinguis medicament est admodum 271, 48
utri uisus 104, 1	uicem generosa quae sunt ibid. 17	uulnera 21, 55
utri uisus 146, 15	uicem mouet alunt quam fieri desiderant uoluer 180, 61	
in Vtero facultas retentrix & expulsiua eremur 11, 65	uicem non manifestant in frigidis regioni- bus 112, 4	X
uterum constituitur due uicibus obursum posuit 104, 16	uicem passae feminis expertes efficiunt in Cilicia ibid. 1	ANTHILIS 1097, 19
uterus in conceptione ad putandum pra- currit, semini ut fiat eductum 107, 20	uicem posse si astringentes non sunt, non conducunt bene & depati non senten- tibus, sed laboratis affectibus 118, 11	Xenophonitis militis 166, 58
uterus inter uiscum & intestinum redit 103, 13	uicem posse uis 1073, 10. 1156, 15	Xyris cuius sit facultas 1098, 31
uterus non praestat arteris secundarium motum 140, 18	uicem posse, uis uidentius nutritur 182, 15	Y
uterus praegnationem crescit 104, 49	uicem quae magis nutritur, & promptius deiciuntur 111, 14	CAERIDA 169, 8
uterus qui ratione uidetur uigere 770, 38	uicem uicisse facultas ibid. 18	Z
uterus, uelut animal, desiderio proli affi- ctus 106, 17	uicem non abscondenda radices 176, 17	Ea & typus idem frumentis genus 115, 59
utriculorum quomodo dignoscatur 10, 38	uicem quid 691, 8. 706, 53	EX a suis spectis, media inter bot dum & tritum 174, 16
utilitas animalibus prima ab alione ac- cedit, secundum a partibus 111, 17	uicem obseruationem discrimina 131, 14	¶ ZINGIBERIS facultas 1010, 40
utilitas partis non nisi exponitur, nisi in 10, 38	24	Xingiber quid 460, 36
	uicem passorum discrimina & facultas 101 181, 54	Zingibere ossa 172, 18
		Zygoma quid uicem 181, 35. 133, 20
		Zybi facultas 1080, 61

F I N I S.

BASILEAE PER THOMAM GVARI-
NVM, ANNO SALVTIS HVMANÆ
M. D. LXXI.



FINE

LABORATORIO REGIONALE

A. Lombardi

Via Venezia 10, 20121 Milano

Tel. 80408

114

